

## Preis-Aufgaben

des  
**Bereins**  
 zur  
**Beförderung des Gartenbaues**  
 in den Königl. Preuss. Staaten  
 für das Jahr 1832.

Publicirt: Berlin, am 11ten Jahrestage des 23. Juni 1832.

### A.

Frühere noch laufende Preis-Aufgaben.  
 I. (vom Jahre 1831).

Auf die Erziehung einer neuen Varietät von **Wein** aus dem Samen, welcher mit oder ohne vorhergegangene künstliche Kreuzung befruchtet ergibt ist, wird ein Preis von 60 Stück Friedrichsd'or ausgesetzt.

Die neue Varietät muß eine in jeder Beziehung vortheilhafte Frucht liefern, welche in der October-Sitzung des Vereins im Jahre 1836 mit einem Theil der Rebe, woran sie gewachsen, (nebst Blatt) einzusenden ist. Es sind dabei zugleich folgende, durch drei glaubwürdige sachverständige Männer des Preis zu beschließenden Angaben erforderlich:

- 1) von welcher Weinorte durch Selbstbefruchtung, oder von welcher Weinorten durch Kreuzung Befruchtung, der Samen gewonnen sei;
- 2) daß die gezogene Varietät im Jahre 1832 in's freie Land gepflanzt und seitdem darin unausgesetzt verblieben sei;
- 3) daß die übersanfte Traube an besagtem Weinstock an einem ganz freien Spalter, ohne irgend eine künstliche, die Reife befördernde Vorrichtung im Sommer 1835 gereift sei.

Sollten mehrere Konkurrenten für die Preis-Aufgabe auftreten, so wird nach schiedsrichterlichem Ausspruch sachverständiger Weinfachleute der vorzüglichsten Frucht unter den Konkurrenten der Preis zuerkannt werden.

### II. (vom Jahre 1832).

Für die am vollständigsten angestellte gegenseitige Prüfung der Kanal- und der Wasserheizung in gleichem Raum und in Bezug auf dieselben Kultur-Gegenstände, wobei sowohl die Kosten der Anlage und des Betriebes bei beiden zu berücksichtigen, als auch die Wirkungen beider Heizmethoden auf die Erhaltung und das Gedeihen der Gewächse genau zu erforschen sind, wird ein Preis von Sechzig Friedrichsd'or ausgesetzt. Die Abhandlungen sind im Januar 1833 einzusenden.

Berlin. Bei Gelegenheit der ersten diesjährigen Frühlings-Versammlung des Gartenbau-Vereins in seinem Locale zu Neuschönberg am 14. April fand die erste Ausstellung von 264 blühenden Pflanzen in dem königl. botanischen Garten statt. Da der Raum des Versammlungssaales zur Aufnahme einer solchen Zahl blühender Gewächse nicht geeignet ist, so wartete sie in einem kürzlich vollendeten Gewächshause aufgestellt. Der Hauptstolz bestand, außer vielen andern botanischen Seltenheiten, in mehreren Exemplaren *Paeonia Moutan papaveracea* und *Banksiae*, neuholländische Azaleen, Eritren, *Polygonatae*, *Diosmeae*, *Proteaceae*, als *Dryandra*, *Hackera*, *Grevillea concinna*, ferner einige sehr schöne Kamellien, unter denen *Camellia reticulata* von Herrn Möwes mehrere Arten, indische *Eichrysum* und *Gnaphalium* mehrere Arten, indische *Asaleen*, namentlich *Azalea ledifolia*, *Smithi*, *Mahonia* (*Berberis*) 4 Arten aus Californien, *Mimulus variegatus*, *Lehm*, und *quinquevulneris* nob., eine schöne Varietät des ersten, und von *M. guttatus* in dem hiesigen Garten entstanden; mehrere Arten *Chorizanthe*, als 3 *C. Henschmannii*, *Daviesia*, *Hovea Celisii*, *Eutaxiae*, *Pomaderris*, *Scottia*, *trapeziformis*, *Borosiinae*, *Indigofera speciosa*, sämtlich aus Neuholland. *Epidendrum elongatum* und *cochleatum*, *Enkianthus quinqueflorus*, *Sinningia villosa* und *Gloxinia candida*, beide aus Brasilien. *Vaccinium ovatum*, *Viobea saccatonia*, *Teucrium* mehrere Frühlings- und Alpenpflanzen, als: *Primula carniolica*, *glauca*, *integrifolia*, *marginata*, *nivalis*, *mauvensis*, *viscosa*, *villosa*, *verticillata*, *helvetica*, *Clusiana*, *Anemone apennina*, *Ranunculus gangeticus*, *Saxifraga Burseriana* u. a. m.

Bei der 11ten Versammlung des Gartenbau-Vereins am 1ten Mai d. J. zu Neuschönberg, wurden über 200 blühende Pflanzen für die geehrten Mitglieder und eingeführten Fremden zur bequemen Besichtigung aufgestellt. Der Hauptstamm bestand außer vielen herrlichen Frühlings- und Alpenpflanzen, als *Primula*, *Orobis*, *Trillium*, *Saxifraga*, *Anemone alba*, *Ar. ind.*, purp. und *Ar. ind.* *phoenicea*, mehrere *Acaciae*, *Euraxiae*, *Calceolariae*, aus *Balsambore* in Chili, ein prächtiges Exemplar von *Bilbergia iridifolia* Bot. Reg., *Theophrasta longifolia* Jacq., *Besleria ensata* Sleb., *B. rufa* R. Br., *Gastrolobium bilobum* R. Br., *Kennedia prostrata* R. Br., ein neues sehr interessantes *Caladium*, eingeführt aus engl. Gärten als *Dracontium sympheseliolum*, der *Magnolia fuscata* im Geruch ähnlich, *Calanthe veratrifolia* R. Br. aus *Blindien*, *Bignonia cadensis*, *Senecio lilacinus*, *Ipomopsis elegans*, *Epidendrum ciliatum*, eine neue rothblühende *Abutilon* aus *Blindien*, *Genista elegans* sp. nov., *Trillium grandiflorum* R. Br., *A. albicans* Cur., *A. linearis* R. Br., *Polemonium pulchellum*, nebst mehreren andern in dieser Jahreszeit im gut erhaltenen Gewächshause zu sehen blühenden Pflanzen.

III. (vom Jahre 1832).

„Durch welche Mittel kann man die Hyazinthenzwiebeln vor der, unter dem Namen „Küngels Krankheit oder weißer Rogg“ bekannten peckartigen Krankheit schützen, oder wie sind die, von diesem Uebel schon ergriffenen Zwiebeln auf eine sichere Art davon zu heilen?“

Die Beantwortungen sind bis zum ersten Januar 1835 einzuliefern. Der dafür ausgesetzte Preis im Betrage von zwanzig Friedrichsd'or kann erst, nachdem das Mittel geprüft worden ist, ertheilt werden.

B.

Neue Preis-Aufgaben.

IV.

„Welches ist das beste Verfahren, Pflanzen durch Stecklinge zu vermehren und welche die am meisten dazu geeignete Zeit?“

Bei der Beantwortung dieser Frage soll hauptsächlich nur auf die schwer zu vermehrenden Pflanzen, so wie auf diejenigen Rücksicht genommen werden, welche Knorren bilden (sich verknorpeln), und dann nicht leichte Wurzeln schlagen.

Termin der Einlieferung: Januar 1835.

Preis nach geschעהner Prüfung: Zwanzig Friedrichsd'or.

V.

Es wird eine historische Zusammenstellung aller vorgechlagenen und angeblich geprüften Mittel zur Verhütung der den Gärten schädlichen Insekten verlangt, nebst genauer Angabe der Bücher, in welchen sie empfohlen worden. Es soll eine Schrift sein, die den Praktiker in den Stand setze, wahrhaft neue Vorschläge von schon oft da gewesenen mit Sicherheit zu unterscheiden und die Prüfung älterer zu wiederholen, weshalb als Haupt-Erforderniß: Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit der Anordnung zu betrachten sind, indem eine Beurtheilung der Mittel zwar angenehm aber nicht durchaus erforderlich sein wird.

Unter den bis zum Januar 1836 eingehenden Beantwortungen dieser Aufgabe, erhält die beste dem Preis von dreißig Friedrichsd'or.

C.

Vorkaufende Prämie aus der von Seydlitzschen Stiftung.

VI.

Derjenige Cleve der Gärtner-Lehranstalt, welcher auf der dritten Lehrstufe stehend, eine ihm gestellte Aufgabe am genügensten löst, erhält, bei sonst untadelhafter Aufführung, eine Prämie von 50 Thalern aus der von Seydlitzschen Stiftung, welche Summe ihm bei seinem Austritt aus dem Institut übergeben wird, wie bereits im vorigen Jahre publicirt worden.

Abzüglich wird ein anderer Gegenstand zur Preisbewerbung ausgestellt, und vom Vorkaufe eine Commission zur Ertheilung des Preises ernannt werden.

Der Name des Prämienempfängers wird am Jahresfeste öffentlich genannt.

Die Abhandlungen über die Preis-Aufgaben ad II. bis V. werden an den Director oder an den Generalsecretair des Vereins eingesendet. Auf den Titel derselben wird ein Motto gesetzt und ein verriegelter Zettel beigefügt, welcher äußerlich dieses Motto und im Innern den Namen, Stand und Wohnort des Verfassers enthält.

Abhandlungen, die nach den bestimmten Terminen eingehen, oder deren Verfasser sich auf irgend eine Weise genannt haben, werden nicht zur Konkurrenz gelassen.

Wenn den eingehenden Abhandlungen der Preis auch nicht zuerkannt werden sollte, wird doch angenommen, daß die Herren Verfasser nichts desto weniger deren Benutzung für die Druckschriften des Vereins bewilligen. Möchten die Herren Verfasser dies nicht zugehen wollen, so werden sie dies bei Einreichung ihrer Abhandlungen gefälligst zu erkennen geben.

Einiges über Acclimatisirung und Behandlung der Halberde-Pflanzen.

(Schluß.)

Verzeichniß der Halberdepflanzen, welche einer Acclimatisirung am fähigsten sind.

II. Rhododendron,

Rhododendron,

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| R. arboreum.             | R. punctatum.                   |
| - album nov.             | - ponticum angustifol.          |
| - azaloides.             | - fl. pl.                       |
| - fl. alb. odorata.      | - algarbense.                   |
| - catawbiense.           | - crispum.                      |
| - caucasicum.            | - undulatum.                    |
| - caucasioides nov. sps. | - roseum.                       |
| - chamaecistus.          | - chisantum.                    |
| - dauricum.              | - rosmarinifol.                 |
| - cassinefol.            | - macrophyllum.                 |
| - ferrugineum.           | - ponticum fol. aureo variegat. |
| - glomeatum.             | - albo marginatis.              |
| - hirsutum.              | - rotundifol.                   |
| - fol. variegat.         | - parviflor.                    |
| - hybridum.              | - dorieum.                      |
| - magnoliaefol.          | - chrysanthum.                  |
| - maximum.               |                                 |
| - flor. alb.             |                                 |
| - fol. variegat.         |                                 |
| - flor. carnosin.        |                                 |
| - nereifol. nov.         |                                 |
| - ponticum fl. pl.       |                                 |
| - ponticum.              |                                 |
| - cassinefol.            |                                 |
| - latifol.               |                                 |
| - miniatum.              |                                 |
| - palicifol.             |                                 |
| - fol. variegat.         |                                 |
| - pulverulentum.         |                                 |
|                          | Laurus Sassafra.                |
|                          | - benzoin.                      |
|                          | Prun. Lauro-Cerasus.            |
|                          | Acubia japonica.                |
|                          | Paeonia arborea.                |
|                          | - arb. papaveracea.             |
|                          | Cornus florida.                 |
|                          | Cephalanthus occidentalis.      |
|                          | Chionanthus virginica.          |
|                          | Vaccinium arboreum.             |
|                          | Macturia aurantiaca.            |

- Myrica arifera.*
- Gale.
- Calycanthus floridus.*
- pompadura.
- praecox.
- ferox.
- nanus.
- oblongus.
- Nyssa grandidentata.*
- sylvatica.
- villosa.

- Helleborus diptera.*
- retrapeta.

- Itea virginica.*
- Clethra alnifolia.*
- acuminata.
- glauca.
- tomentosa.

- Kalmia angustifolia.*
- glauca.
- latifolia.
- lucida.
- oleaeifol.
- pumila.
- humilior.
- floribunda.
- serotina.
- nitida.

- Comptonia asplenifolia.*
- Gordonia pubescens.*
- Guilandina divica.*

- Andromeda.*
- A. acuminata.*
  - angustifolia.
  - arborea.
  - asplenifol.
  - xilaris.
  - calyculata.
  - angustifol.
  - cassinefol.
  - formosissima.
  - laurina.
  - populifolia.
  - reticulata.
  - americana.
  - arborea.
  - xilaris.
  - angustifolia.
  - calyculata.
  - angustifolia.
  - cassinefolia.
  - speciosa.
  - Catesbaei.
  - coriacea.
  - lucida.
  - myrtifolia.
  - nitida.
  - hyproidea.

- Andromeda.*
- A. marianna.*
  - paniculata.
  - polyfolia.
  - angustifolia.
  - latifolia.
  - media.
  - rosmarinifolia.
  - pulverulenta.
  - rocemosa.
  - serratifol.
  - Walteri.
  - angustifol.

- Azalea.*
- A. calendulacea.*
  - canescens.
  - cumulata.
  - indica.
  - nudiflora.
  - aureo variegata.
  - aurantiaca maxima.
  - globosa alba.
  - grandifl.
  - humilis.
  - pulchella.
  - nutitans splendissima.
  - spurea speciosa.
  - bicolor.
  - cromoisie flambo-gante.
  - Lioni.
  - mixta odorata.
  - praecox.
  - prolifera superba.
  - punicea insignis.
  - purpurea.
  - rubra.
  - rubra nana.
  - superba incarnata.
  - viola odorata.
  - coccinea.
  - maxima.
  - cuprea.
  - splendent.
  - Bollwilleriana.
  - glauca.
  - coronata.
  - hispida.
  - micans.
  - montana.
  - scabra.
  - tortuosa.
  - vitata.

- Azalea.*
- A. periclimenoides.*
  - panicata.
  - bicolor.
  - Guilaume I.
  - humilior.
  - nec plus ultra.
  - quadricolor.
  - tricolor.
  - procumbens.
  - viscosa vitta.
  - serotina.
  - sulphurea.
  - alba duplex.
  - jasmimoides.

- Daphne Cucorum.*
- maximum.
  - Laureola.
  - odora.
  - callina.
  - pontica fl. rub.
  - Tardouira.
  - Le dum palustre.*
  - latifolium.
  - Prinos glaber.*
  - verticillatus.

*Hydrangea arborescens.* *Empetrum nigrum.*

Alle hier aufgeführten Pflanzen mit ihren mir bekannten Varietäten, die sich zu Acclimatisierungsversuchen eignen, werden nach dem Verhältnis ihrer Höhe gepflanzt, so daß sie stufenweise abfallen, und vorn die niedrigsten zu stehen kommen.

Zum Schluß bemerke ich noch, daß ich eine bedeutende Quantität mit ganz besonderm Fleiß zubereiteter ächter Heideerde den Liebhabern in bedeutender Quantität ablassen kann. Da mir daran gelegen ist, die Acclimatisierungsversuche auf alle Weise zu fördern, so sehe ich bei diesem Verkauf mehr auf den Zweck als auf den Gewinn. In Kisten und Säcken läßt sich diese Erde am leichtesten transportiren, auch in großen Ballen. Nur muß sie immer feucht gehalten werden.

Die Erde wird milder, und meßenerweise verkauft: Die Wege zu 30 fr. Bei bedeutender Bestellung mehrerer Walter oder Schffel, kostet die Wege nur 24 fr., mitin das Walter 6 fl. 24 fr. ohne Emballage und Porto. Briefe und Bestellungen werden portofrei erbeten.

Caasfeld, 1833.

- Erica.*
- E. carnea.*
  - herbatica.
  - arborea.
  - australis.
  - mediterranea.
  - scoparia.
  - umbellata.
  - viridis purpur.
  - cineraria alba.
  - rubra.
  - multiflor. alb.
  - rub.
  - polyfol.
  - nana.
  - tetralix alb.
  - rub.
  - umbellata.
  - vulgaris.
  - decumbens.
  - fl. pl.
  - spuria.
  - variegata.
  - alb.
  - rub.
  - cilicaris.
  - stricta.

*Empetrum nigrum.*

Alle hier aufgeführten Pflanzen mit ihren mir bekannten Varietäten, die sich zu Acclimatisierungsversuchen eignen, werden nach dem Verhältnis ihrer Höhe gepflanzt, so daß sie stufenweise abfallen, und vorn die niedrigsten zu stehen kommen.

Zum Schluß bemerke ich noch, daß ich eine bedeutende Quantität mit ganz besonderm Fleiß zubereiteter ächter Heideerde den Liebhabern in bedeutender Quantität ablassen kann. Da mir daran gelegen ist, die Acclimatisierungsversuche auf alle Weise zu fördern, so sehe ich bei diesem Verkauf mehr auf den Zweck als auf den Gewinn. In Kisten und Säcken läßt sich diese Erde am leichtesten transportiren, auch in großen Ballen. Nur muß sie immer feucht gehalten werden.

Die Erde wird milder, und meßenerweise verkauft: Die Wege zu 30 fr. Bei bedeutender Bestellung mehrerer Walter oder Schffel, kostet die Wege nur 24 fr., mitin das Walter 6 fl. 24 fr. ohne Emballage und Porto. Briefe und Bestellungen werden portofrei erbeten.

von Pfaffenrath.

**Sämereien von schönblühenden Blumenpflanzen**  
 bei Herrn Ehr. Deegen in Köstritz.

Als neue, vorzüglich schönblühende oder sonst interessante Pflanzen, welche mein Blumen-Samen-Verzeichniß enthält, erlaube ich mir, Blumenfreunden folgende bemerkenswerthe herauszugeben:

a) schönblühende Sommerpflanzen: *Ageratum Mexicanum*, — *Amaranthus glomeratus*, — *Argemone Barkleyi*.

ana. — A. grandiflorus. — Calandrina speciosa. — Campanula Lorei fl. caeral. pall. — C. L. fl. atrocærulea. — Celosia pyramidalis fl. sang. et lutea. — Chrysanthemum carneat. fl. lur. — Chr. speciosum (?) — Datura ceratocaulis. — D. quercifolia. — D. Tatula gigantea. — Ecoremocarpos scaber. — Erythraea pulchella. — Galardia bicolor. — Helianthus lenticularis. — H. petiolaris. — Kettmia vesicaria. — Leonurus occidentalis. — Loasa tricolor. — Malope malacoides. — M. trisida. — Nemo-phia phaceloides. — Nicotiana glauca. — N. Tabacum decurrens. — Nigella aristata. — N. coerata. — Salpiglossis straminea. — Saponaria vacc. grandiflora. — Senecio elegans fl. pl. purpur. — Silene orchidea. — S. ornata. — S. trinervata. — Solanum formosum. — Thibonia tagetiflora fl. aurea. — Trachymene cærulea. — Zinnia coccinea, überaus prächtig. — Z. elegans fl. albo. — Z. eleg. fl. purpurea.

b) schönblühende perennirende Pflanzen: Amobium alatum. — Antirrhinum bicolor. — Aстранtia heterophylla. — Beta Brasiliensis. — Campanula Sibirica. — C. speciosa. — Coreopsis Atkinsonia. — Delphinium Staphysagria. — Dianthus caucasicus. — D. glaucus. — Dracocephalum speciosum. — Eschholzia californica. — Francoa sonchifolia. — Geum chilense. — G. coccineum. — Lavatera Salvitellensis. — Linum flavum. — Lobelia inflata. — Lupinus polyphyllus. — Oenothera scaulis. — O. Fraseri. — O. splendens. — Papaver croceum. — Penstemon atropurpureus. — P. digitalis. — P. pulchellus. — Potentilla pedata. — P. formosa. — P. Simersiana. — Ranunculus millefoliatus. — Rudbeckia speciosa. — R. triloba. — Silene cuprea. — S. gracilis. — S. multiflora. — Stevia purpurea odorata. — St. serrata. — Veronica grossa. — Zygophyllum foetidum.

c) noch nicht allgemein bekannte Pflanzen: Achyropappus skurioides. — Ascardia Indica. — Calceolaria scabiosaefolia. — Centaurea aurea. — C. Salamantica fl. caerulea. — C. elongata. — Capsicum annum fr. marmoreo. — Collomia grandiflora. — C. linearis. — Collinsia grandiflora. — Dianthus prolifer. — Lyosodium divaricatum. — Mimulus floribundus. — M. moschatius. — Scabiosa rotula. — Spilanthus multiflorus. — Stachys Arabica. — Tritolium Goussonii. — Zea altissima etc.

Die Erziehung des Samens in Reinheit und Vollkommenheit erfordert alle Umsicht und Aufmerksamkeit eines Blumenfreundes, namentlich desjenigen Samens, welcher die, aus der Cultur herorgegangenen Füllungen und verschiedenen Färbungen stets ächt wieder produziren soll. Alle in meinen Blumen-Samen-Verzeichnissen aufgeführten Samen sind in obiger Art erzogen, und kann sie Blumenfreunden als keimfähig, ächt und vorzüglich empfohlen.

### Camellien-Sammlung,

welche für 1833, nach der Wahl der Gebrüder Bannmann zu Bollweiler, (nächst Soult in oberrhein. Departement) in Frankreich, zu veräußern ist; als: 12 gefüllte Sorten mit Namen, zu 30 Franken; 25 Sorten zu 80 Fr.; 50 Sorten zu 200 Fr.; 100 Sorten zu

500 Fr.; 125 Sorten zu 750 Fr. und 150 Sorten zu 1050 Franken.

Die Liebhaber können sich selbst um die im großen Catalog angezeichneten Preise wägen.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Cam. axil. BC. Pollyspora                 | Cam. jap. hybr. Griffonii      |
| * euryoides axillar.                      | • • • • • Halleria             |
| * Hirsii, BC. C. Reina, Bon. C. Nepalsis? | • • • • • Henriette(belle)     |
| * japonica alba (simplici)                | • • • • • Herbe rti            |
| • • • • • rubra (simplici)                | • • • • • humilis              |
| • • • • • hybrida acutipetala             | • • • • • ignescens            |
| • • • • • Aglae                           | • • • • • Impératrice de Brés. |
| • • • • • Atoni (simp.)                   | • • • • • incarnata            |
| • • • • • alba plena                      | • • • • • Japonaise (la pos.)  |
| • • • • • Amelie de Baie                  | • • • • • Johnsonii            |
| • • • • • amplissima (simp.)              | • • • • • Lady Ad. Campbell's  |
| • • • • • atropurpurea                    | • • • • • Lambertii            |
| • • • • • nova                            | • • • • • Lankmannii           |
| • • • • • atoviolacea                     | • • • • • Lippoldii            |
| • • • • • anebifolia                      | • • • • • longifolia (simp.)   |
| • • • • • Bedfordia, Whitina              | • • • • • variegata            |
| • • • • • Berlesiana                      | • • • • • macrophylla          |
| • • • • • Blow                            | • • • • • marmorata            |
| • • • • • Bruzellensis                    | • • • • • Mester's double red  |
| • • • • • Calvert nova                    | • • • • • New imported         |
| • • • • • carnea, Middlemist              | • • • • • Pink                 |
| • • • • • Carolus                         | • • • • • papaveracea          |
| • • • • • cerasina (simp.)                | • • • • • paradoxa             |
| • • • • • Charles Auguste                 | • • • • • Parmentieri          |
| • • • • • cocinea                         | • • • • • grand.               |
| • • • • • Coila                           | • • • • • parviflora           |
| • • • • • colorata                        | • • • • • pourple              |
| • • • • • Colouret                        | • • • • • punctat. pl. invin.  |
| • • • • • Comptoniana                     | • • • • • simplici             |
| • • • • • concata                         | • • • • • simplici             |
| • • • • • conchiflora                     | • • • • • Regina gallica.      |
| • • • • • nova                            | • • • • • Eclipse, Pross       |
| • • • • • conspicua                       | • • • • • Roi des P-bas,       |
| • • • • • coronata rub. pl.               | • • • • • Rex ba.              |
| • • • • • rosea                           | • • • • • rosacea              |
| • • • • • crassifolia                     | • • • • • rosaflorea           |
| • • • • • crassinervis                    | • • • • • rosea flavescens     |
| • • • • • Derbiana                        | • • • • • rosea plena          |
| • • • • • Egertonia                       | • • • • • Rosa mundi           |
| • • • • • electa                          | • • • • • rotundifolia (r.)    |
| • • • • • elegans (semi du.)              | • • • • • rubra plena          |
| • • • • • elegantissima                   | • • • • • miaz.                |
| • • • • • eximia                          | • • • • • salicifolia          |
| • • • • • expansa                         | • • • • • sanguinea            |
| • • • • • fascicularis                    | • • • • • Sinisii              |
| • • • • • fimbriata alba pl.              | • • • • • Single white         |
| • • • • • flaccida (simplici)             | • • • • • Strep-ped            |
| • • • • • flavescens                      | • • • • • splendens            |
| • • • • • foliis marginatis               | • • • • • spoliifera           |
| • • • • • formosa                         | • • • • • supina               |
| • • • • • fulgens, rubicaulis?            | • • • • • Thersiana            |
| • • • • • grandiflorar. ros. (r.)         | • • • • • Trauersii mutab.     |

(Gertl. folg.)