

Sanitäts-Bericht

über die

Königlich Preussische Armee,

das

XII. und XIX. (1. und 2. Königlich Sächsische)

und das

XIII. (Königlich Württembergische) Armeekorps

sowie über die

Kaiserliche Ostasiatische Besatzungs-Brigade

für den Berichtszeitraum vom

1. Oktober 1902 bis 30. September 1903.

31. 12. 1921.

M. J.

Stadt-
bücherei
St. Ing.

~~STADTBÜCHEREI
ST. INGEBRIG
W. GORNIK~~

M. J. J. J.

Sanitäts-Bericht

über die

Königlich Preussische Armee,

das

XII. und XIX. (1. und 2. Königlich Sächsische)

und das

XIII. (Königlich Württembergische) Armeekorps

sowie über die .

Kaiserliche Ostasiatische Besatzungs-Brigade

für den

Berichtszeitraum vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903.

— • —
B e a r b e i t e t

von der

Medizinal-Abteilung

des

Königlich Preussischen Kriegsministeriums.

Mit 30 Karten und 12 graphischen Darstellungen.

— • —
Berlin 1905.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung

Kochstraße 69–71.



2932



Inhaltsverzeichnis.

A. Sanitäts-Bericht über die Königlich Preußische Armee u. s. w.

I. Teil: Bericht über die Gesundheitsverhältnisse der Armee.

| | Seite |
|---|--------------|
| A. Bericht über den Krankenzugang im allgemeinen (Lazarett und Revier) | 7—15 |
| B. Die wichtigeren im Berichtsjahre 1902/03 zur Ausführung gelangten sanitären Maßnahmen | 16 |
| C. Berichterstattung über die einzelnen Gruppen der Lazarett- und Revierkranken im besonderen | 17—160 |
| I. Gruppe: Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen | 17—52 |
| Erste Unterart: Infektionskrankheiten | 18—43 |
| 1. Pocken und Windpocken | 18—19 |
| 2. Scharlach | 20—21 |
| 3. Masern (Röteln) | 21—22 |
| 4. Epidemische Ohrspeicheldrüsenentzündung | 22 |
| 5. Diphtherie (Krupp) | 22—24 |
| 6. Rose | 24—25 |
| 7. Karbunkel (Milzbrand) und Rotz | 25 |
| 8. Wund-Infektionskrankheiten | 25—26 |
| 9. Unterleibstypus | 27—34 |
| 10. Flecktyphus und Rückfallfieber | 34 |
| 11. Wechselfieber | 34 |
| 12. Grippe | 34—36 |
| 13. Tuberkulose | 36—40 |
| 14. Ruhr | 41 |
| 15. Asiatische und einheimische Cholera | 41 |
| 16. Epidemische Genickstarre | 41—43 |
| 17. Starrkrampf (Trismus, Tetanus) | 43 |
| Zweite Unterart: Gelenkrheumatismus und Gicht | 43—47 |
| Dritte Unterart: Blutarmut | 48 |
| Vierte Unterart: Purpura und Skorbut | 48 |
| Fünfte Unterart: Zuckerruhr | 48—49 |
| Sechste Unterart: Vergiftungen | 49 |
| Siebente Unterart: Trichinose | 50 |
| Achte Unterart: Hitzschlag | 50 |
| Neunte Unterart: Bösartige Geschwülste | 50—51 |
| Zehnte Unterart: Andere allgemeine Erkrankungen | 51—52 |
| II. Gruppe: Krankheiten des Nervensystems. | 52—62 |
| Erste Unterart: Geisteskrankheiten | 52—55 |
| Zweite Unterart: Fallsucht | 55—56 |
| Dritte Unterart: Erkrankungen im Gebiete einzelner Nervenbahnen | 56—57 |
| Vierte Unterart: Hirnhaut- und Gehirnerkrankungen ausschl. der tuberkulösen und der epidemischen Genickstarre | 58—59 |
| Fünfte Unterart: Krankheiten des Rückenmarks | 60 |
| Sechste Unterart: Progressive Muskelatrophie | 60 |
| Siebente Unterart: Neurasthenie und Hysterie | 61 |
| Achte Unterart: Andere Krankheiten des Nervensystems | 61—62 |
| III. Gruppe: Krankheiten der Atmungsorgane | 62—78 |
| Erste Unterart: Krankheiten der ersten Atmungswege. Bronchialkatarrh | 62—65 |
| Zweite Unterart: Akute Lungenentzündung | 65—70 |

| | Seite |
|---|----------------|
| Dritte Unterart: Panaritium | 123—124 |
| Vierte Unterart: Zellgewebsentzündung und Ausgänge | 124—125 |
| Fünfte Unterart: Furunkel | 125—126 |
| Sechste Unterart: Gutartige Geschwülste | 126 |
| Siebente Unterart: Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen | 126 |
| XI. Gruppe: Krankheiten der Bewegungsorgane | 126—132 |
| Erste Unterart: Entzündungen der Knochen und der Knochenhaut, Mißbildung der Knochen | 127—128 |
| Zweite Unterart: Entzündungen und Mißbildungen der Gelenke | 128—129 |
| Dritte Unterart: Fufgeschwulst | 129—130 |
| Vierte Unterart: Plattfüßigkeit und Folgezustände. Andere Verbindungen des Fußes und Folgezustände | 130 |
| Fünfte Unterart: Muskelrheumatismus. Andere Krankheiten der Muskeln | 131 |
| Sechste Unterart: Exerzier- und Reitknochen | 131 |
| Siebente Unterart: Krankheiten der Schleimbeutel und Sehnen | 132 |
| XII. Gruppe: Mechanische Verletzungen | 132—158 |
| Erste Unterart: Wundlaufen und Wundreiten | 133 |
| Zweite Unterart: Quetschungen und Zerreißungen | 133—135 |
| Dritte Unterart: Knochenbrüche | 136—139 |
| Vierte Unterart: Verstauchungen | 139—140 |
| Fünfte Unterart: Verrenkungen | 140—141 |
| Sechste Unterart: Schufswunden | 141—155 |
| Siebente Unterart: Hieb-, Schnitt-, Stich-, Rifs-, Quetsch- und Bißwunden | 155—156 |
| Achte Unterart: Verbrennungen | 156 |
| Neunte Unterart: Erfrierungen (Frostschäden) | 156 |
| Zehnte Unterart: Andere Wunden und Verletzungen | 157 |
| Elfte Unterart: Wundverband und Betäubungsmittel | 157 |
| Anhang: Die während des Berichtsjahres in den Garnisonlazaretten ausgeführten Operationen | 157—158 |
| XIII. Gruppe: Andere Krankheiten | 159 |
| Erste Unterart: Selbstverstümmelung | 159 |
| Zweite Unterart: Selbstmordversuche | 159 |
| Dritte Unterart: Vorgetäuschte Krankheiten | 159 |
| Vierte Unterart: Allgemeine Körperschwäche | 159 |
| XIV. Gruppe: Zur Beobachtung | 160 |
| D. Übersicht über Brunnen- und Badekuren | 161—163 |
| E. Bericht über den Krankenabgang | 164—172 |
| 1. Abgang als dienstfähig | 164 |
| 2. Abgang durch Tod | 164—168 |
| a) Todesfälle durch Krankheiten | 166—167 |
| b) Todesfälle infolge von Verunglückung | 167 |
| c) Todesfälle durch Selbstmord | 167—168 |
| d) Anhang | 168 |
| 3. Anderweitiger Abgang | 168—172 |
| a) Abgang durch Dienstunbrauchbarkeit | 169—170 |
| b) Abgang durch Halbinvalidität | 170—171 |
| c) Abgang durch Ganzinvalidität | 171—172 |
| F. Operationsliste. Übersicht über die während des Berichtsjahres 1902/03 in der Armee ausgeführten größeren Operationen | 173—220 |
| G. Übersicht über die im Jahre 1902/03 in den hygienisch-chemischen Untersuchungsstellen der Armee ausgeführten chemischen Untersuchungen | 221—224 |
| H. Zusammenstellung der wichtigeren, in der Zeit vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903 erlassenen, hygienische Maßnahmen betreffenden Verfügungen | 225—226 |

II. Teil: Tabellen zu dem Bericht.

| | |
|---|-----------|
| A. Truppen-Krankenrapporte | 2*—159* |
| Erste Abteilung: Bewegung im Kranken-Zu- und Abgang | 2*—79* |
| 1. Krankebewegung bei den einzelnen Armeekorps | 2*—21* |
| 2. Krankenrapport der ganzen Armee für das Berichtsjahr vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903 | 22*—23* |
| 3. Zusammenstellung der Krankheiten der ganzen Armee | 24*—41* |
| a) Nach Armeekorps | 24*—32* |
| b) Nach der Zeit des Zugangs | 33*—41* |
| 4. Die durchschnittliche Iststärke der Armeekorps in den einzelnen Monaten | 42* |
| 5. Die Häufigkeit der Krankheitsgruppen und wichtigeren Krankheitsformen in den einzelnen Monaten, im Winterhalbjahre 1902/03 und Sommerhalbjahre 1903 nach Armeekorps | 43*—71* |
| 6. Die Krankheitsgruppen u. s. w. in ihrem Verhältnis zur Iststärke der einzelnen Armeekorps | 72*—73* |
| 7. Die im Lazarett und Revier vorgekommenen Erkrankungen in ihrem Verhältnis zur Jahres-Iststärke und den Diensttagen | 74*—76* |
| a. Ohne Unterscheidung in Lazarett- und Revierkranke | 74* |
| b. Mit Unterscheidung in Lazarettkranke, Revierkranke und Lazarett- und Revierkranke | 75*—76* |
| 8. Die Lazarett- und Revierkranken, geschieden nach Truppengattungen in ihrem Verhältnis zur Häufigkeit der Erkrankungen, zur Behandlungsdauer und zur Art des Abganges | 77*—79* |
| Zweite Abteilung: Dienstunbrauchbarkeit der Mannschaften und ihre Ursachen | 80*—90* |
| Anhang: Übersicht der unmittelbar nach der Einstellung wegen körperlicher Untauglichkeit zum Dienst im aktiven Heere wieder Entlassenen, geordnet nach den Ursachen der Dienstuntauglichkeit, nach Armeekorps und nach ihrem Dienstalder | 91*—96* |
| Dritte Abteilung: Halbinvalidität der Mannschaften und ihre Ursachen | 97*—101* |
| Vierte Abteilung: Ganzinvalidität der Mannschaften und ihre Ursachen | 102*—109* |
| Fünfte Abteilung: Die Todesfälle unter den Mannschaften und ihre Ursachen | 110*—135* |
| A. Die durch Krankheiten unter den Mannschaften verursachten Todesfälle | 110*—121* |
| B. Die Verunglückungen in der Armee mit tödlichem Ausgange | 122*—126* |
| C. Die Selbstmorde in der Armee | 127*—134* |
| D. Gesamtübersicht der Todesfälle der ganzen Armee | 135* |
| Sechste Abteilung: Bewegung im Kranken-Zu- und Abgang | 136*—159* |
| 1. Krankenrapport über Spezialanstalten der ganzen Armee für das Berichtsjahr vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903 | 136*—137* |
| 2. Zusammenstellung der Krankheiten bei den Spezialanstalten | 138*—155* |
| a) Nach Truppengattungen | 138*—146* |
| b) Nach der Zeit des Zugangs | 147*—155* |
| 3. Die bei den Spezialanstalten im Lazarett und Revier vorgekommenen Erkrankungen in ihrem Verhältnis zur Jahres-Iststärke und den Diensttagen | 156*—158* |
| a) Ohne Unterscheidung in Lazarett- und Revierkranke | 156* |
| b) Mit Unterscheidung in Lazarettkranke, Revierkranke und Lazarett- und Revierkranke | 157*—158* |
| 4. Die bei den Spezialanstalten vorgekommenen Erkrankungen in ihrem Verhältnis zur Art des Abganges | 159* |
| B. Garnison-Krankenrapporte | 160*—193* |
| Berichtigung zum Sanitäts-Bericht 1901/02 | 194* |

B. Sanitäts-Bericht über die Kaiserliche Ostasiatische Besatzungs-Brigade.

I. Teil: Bericht über die Gesundheitsverhältnisse.

| | |
|--|-------|
| A. Bericht über den Krankenzugang im allgemeinen | 5†—6† |
| B. Die wichtigeren im Berichtsjahre 1902/03 zur Ausführung gelangten sanitären Mafsnahmen | 7†—8† |
| 1. Die Unterkunftsverhältnisse der Truppen | 7† |
| 2. Abfuhrwesen und Wasserversorgung | 7† |
| 3. Lazarettanlagen, Revierkrankenstuben, Erholungsstationen | 7†—8† |
| 4. Einrichtung einer Wutschutzstation beim Feldlazarett Tientsin | 8† |

| | Seite |
|---|---------|
| C. Berichterstattung über die einzelnen Gruppen der Lazarett- und Revierkranken im besonderen . | 9†—20† |
| I. Gruppe: Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen | 9†—14† |
| Erste Unterart: Infektionskrankheiten | 10†—13† |
| 1. Echte und modifizierte Pocken | 10† |
| 2. Unterleibstypus und Typhoid | 10†—11† |
| 3. Malariakrankheiten | 11†—12† |
| 4. Ruhr | 12†—13† |
| 5. Asiatische Cholera | 13† |
| Zweite Unterart: Vergiftungen, einschließlic tierische und alkoholische . | 13† |
| Dritte Unterart: Gelenkrheumatismus | 13†—14† |
| Fünfte Unterart: Hitzschlag und Sonnenstich | 14† |
| Sechste Unterart: Andere allgemeine Erkrankungen, wie Karbunkel, Grippe, Zuckerruhr, Skrofulose, Blutarmut, Leukämie, Bluterkrankheit | 14† |
| II. Gruppe: Krankheiten des Nervensystems . | 14†—15† |
| III. Gruppe: Krankheiten der Atmungsorgane . | 15† |
| IV. Gruppe: Krankheiten der Zirkulationsorgane | 15† |
| Erste Unterart: Krankheiten des Herzens, des Herzbeutels und der Arterien | 15† |
| V. Gruppe: Krankheiten der Ernährungsorgane | 15†—17† |
| Zweite Unterart: Krankheiten des Magens und Darms | 16† |
| Dritte Unterart: Unterleibsbrüche | 16† |
| Vierte Unterart: Krankheiten der Leber, Milz und des Bauchfells | 16—17† |
| VI. Gruppe: Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschließlic der venerischen, Krampfaderbruch, Wasserbruch u. s. w. | 17† |
| VII. Gruppe: Venerische Krankheiten | 17†—18† |
| VIII. Gruppe: Augenkrankheiten | 18† |
| IX. Gruppe: Krankheiten des Ohres | 18† |
| X. Gruppe: Krankheiten der äußeren Bedeckungen | 18† |
| XI. Gruppe: Krankheiten der Bewegungsorgane | 19† |
| XII. Gruppe: Mechanische Verletzungen | 19†—20† |
| Erste Unterart: Verwundungen durch Schußwaffen | 19† |
| Dritte Unterart: Knochenbrüche, Verstauchungen, Verrenkungen | 19† |
| Fünfte Unterart: Sonstige Wunden und Verletzungen, Verbrennungen, Frostschäden. | 20† |
| XIV. Gruppe: Zur Beobachtung | 20† |
| D. Bericht über den Krankenabgang | 20†—21† |
| 1. Abgang als dienstfähig | 20† |
| 2. Abgang durch Tod | 20†—21† |
| 3. Anderweitiger Abgang | 21† |
| E. Operationsliste | 21†—23† |
| F. Bericht über die Tätigkeit des Zahnarztes | 23† |
| G. Bericht über die Tätigkeit des hygienisch-chemischen Laboratoriums in Tientsin . | 24† |

II. Teil: Tabellen zu dem Bericht.

| | | |
|---------------|---|---------|
| Tabelle I. | Krankensbewegung in der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade. Absolute Zahlen | 27† |
| Tabelle II. | Krankenzugang nach Krankheiten und Monaten. In absoluten Zahlen und in ‰ zu den bezüglichen Iststärken | 28†—30† |
| Tabelle III. | Die durch Krankheiten verursachten Todesfälle. Geordnet nach Waffengattungen, Dienstgrad, Todesmonat und Todesort | 31† |
| Tabelle IV. | Die durch Verunglückung verursachten Todesfälle | 32† |
| Tabelle V. | Die durch Selbstmord verursachten Todesfälle | 32† |
| Tabelle VI. | Gesamtübersicht der Todesfälle der Besatzungs-Brigade | 33† |
| Tabelle VII. | Krankenzugang und Todesfälle bei den Lazaretten für 1902/03 | 34†—35† |
| Tabelle VIII. | Krankenzugang auf den einzelnen Transportdampfern | 36†—37† |

A.

Sanitäts-Bericht

über die

Königlich Preussische Armee,

das

XII. und XIX. (1. und 2. Königlich Sächsische)

und das

XIII. (Königlich Württembergische) Armeekorps

für den

Berichtszeitraum vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903.

—
B e a r b e i t e t

von der

Medizinal-Abteilung

des

Königlich Preussischen Kriegsministeriums.

Mit 30 Karten und 9 graphischen Darstellungen.

—

Vorbemerkung.

Mit dem vorliegenden Bericht sind folgende Änderungen in der Rapporterstattung eingetreten:

1. Die bisherige Rapporterstattung gestattete nicht, einen genauen Überblick über die Krankenbewegung bei einer Reihe von militärischen Anstalten (Lehr-Infanterie-Bataillon, Militär-Reit-Institut, Gewehr-Prüfungskommission, Infanterie-Schießschule, Oberfeuerwerkerschule, Kriegsschulen und Militär-Lehrschmieden) zu erhalten. Diese Anstalten setzen sich zum größten Teil oder ganz aus kommandierten Mannschaften zusammen, über welche bisher nur bei dem betreffenden Stammtruppenteil rapportiert wurde. Um nun den Gesundheitszustand bei diesen Anstalten, deren Dienst sich zur Zeit nicht unwesentlich vom allgemeinen Truppendienst unterscheidet, für sich übersehen und gleichzeitig auch Doppelzählungen besser als bisher vermeiden zu können, sind vom 1. Oktober 1902 über die genannten Anstalten besondere Rapporte (Spezialrapporte) eingeführt. Diese Spezialrapporte sind in einer neuen — VI. — Abteilung des II. Teiles tabellarisch zusammengestellt, unbeschadet, daß die Zahlen für die Kommandierten auch noch in den übrigen Tabellen bei ihren Truppengattungen verrechnet sind.

2. Die Rapporte über die Bekleidungsämter, Militär-

Bäcker-Abteilungen, Militärkrankenwärter, Festungsgefängnisse, Arbeiter-Abteilungen und die Disziplinar-Abteilung sind, wie bisher, in sämtlichen Tabellen des II. Teiles zahlenmäßig verrechnet, da sich aber der Dienstbetrieb bei diesen Anstalten und Truppengattungen von denjenigen der eigentlichen Truppen ebenfalls wesentlich unterscheidet und es von Interesse ist, ihren Gesundheitszustand gesondert übersehen zu können, so sind auch ihre Rapporte mit denjenigen der zu 1. aufgeführten Spezialanstalten in der VI. Abteilung des II. Teiles besonders aufgenommen.

3. Die Mannschaften der Schloßgarde-Kompagnie, die Unteroffizier-Vorschüler, Invaliden und Kadetten gehören nicht zu den Mannschaften des aktiven Dienststandes und sind deshalb nicht mehr in den allgemeinen Tabellen verrechnet, sondern nur in der VI. Abteilung bei den Spezialanstalten zahlenmäßig nachgewiesen.

4. Die Pioniere sind für sich allein, die Eisenbahn- und Telegraphentruppen sowie das Luftschiffer-Bataillon gemeinsam unter der Bezeichnung „Verkehrstruppen“ verrechnet.

5. Die Ökonomiehandwerker sind nicht mehr besonders aufgeführt, sondern in der Iststärke und Krankenzahl ihrer Truppenteile verrechnet.

I. Teil.

Bericht

über

die Gesundheitsverhältnisse der Königlich Preussischen Armee,
des XII. und XIX. (1. und 2. Königlich Sächsischen)

und

des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps

während des Zeitraumes

vom **1. Oktober 1902** bis **30. September 1903.**

A. Bericht über den Krankenzugang im allgemeinen.

Am 1. Oktober 1902 befanden sich aus dem Vorjahre in militärärztlicher Behandlung 7102 Kranke, davon 5759 im Lazarett und 1343 im Revier.

Der Krankenzugang betrug im Jahre 1902/03 bei einer Durchschnittsiststärke von 526 554 Mann

| im Lazarett | | im Revier | | im Lazarett und Revier | | im ganzen | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------------------|------|---------------|-------|
| absolute Zahl | ‰ K. | absolute Zahl | ‰ K. | absolute Zahl | ‰ K. | absolute Zahl | ‰ K. |
| 105 693 | 200,7 | 191 494 | 363,7 | 29 212 | 55,5 | 326 399 | 619,9 |

Im Durchschnitt der vorangegangenen 4 fünfjährigen Berichtszeiträume sowie in dem Berichtsjahre 1901/02 betrug der Gesamtzugang:

| | |
|---------------------|-------------|
| 1881/82 bis 1885/86 | 899,6 ‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 | 908,3 „ |
| 1891/92 „ 1895/96 | 812,3 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 | 687,5 „ |
| im Jahre 1901/02 | 603,9 „ |

Die Zahl der Erkrankungen hat gegen das Vorjahr um 16,0 ‰ K. zugenommen. Bei Hinzurechnung der Iststärken und des Krankenzuganges der Schloßgarde-Kompagnie, Invaliden, Kadetten und Unteroffizier-Vorschüler (siehe Vorbemerkung 3) würde sich die Iststärke der ganzen Armee auf 530 824 Mann mit 330 602 Mann Zugang = 622,8 ‰ K. erhöhen. Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahre ist im wesentlichen durch das vermehrte Auftreten der Grippe (+ 7,7 ‰ K.), durch häufigere Erkrankungen der ersten Atmungswege (+ 6,6 ‰ K.) sowie durch den höheren Zugang bei Gruppe XI (+ 1,9 ‰ K.) bedingt worden. Auch in Gruppe VII ist der Zugang wieder um 1,1 ‰ K. gestiegen.

Die Sterblichkeit hat in diesem Berichtsjahre gegen das Vorjahr um 0,10 ‰ K. zugenommen; sie betrug:

| | |
|---|-----------|
| im Durchschnitt der Jahre 1881/82 bis 1885/86 | 4,1 ‰ K., |
| „ „ „ „ 1886/87 „ 1890/91 | 3,3 „ |
| „ „ „ „ 1891/92 „ 1895/96 | 2,8 „ |
| „ „ „ „ 1896/97 „ 1900/01 | 2,2 „ |
| im Jahre 1901/02 | 2,0 „ |

im Jahre 1902/03 2,1 ‰ K.

In welchem Maße die einzelnen Armeekorps an dem Gesamtkrankenzugange beteiligt sind, ergibt sich aus nachstehender Zusammenstellung.

Krankenzugang bei den einzelnen Armeekorps.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| XVII. Armeekorps | 516,7 ‰ K., |
| III. „ | 526,7 „ |
| IX. „ | 527,9 „ |
| VI. „ | 533,5 „ |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 543,7 „ |
| V. Armeekorps | 556,4 „ |
| IV. „ | 556,7 „ |
| X. „ | 558,6 „ |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 578,2 „ |
| XIV. Armeekorps | 599,5 „ |
| XV. „ | 611,1 „ |
| VII. „ | 620,7 „ |
| XVIII. „ | 627,3 „ |
| II. „ | 683,6 „ |
| XVI. „ | 689,8 „ |
| I. „ | 693,3 „ |
| Gardekorps | 703,5 „ |
| VIII. Armeekorps | 707,4 „ |
| XI. „ | 726,7 „ |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | 770,0 „ |
| Armee | 619,9 ‰ K. |
| III. Kgl. Bayer. Armeekorps | 844,4 „ |
| II. „ „ | 860,6 „ |
| I. „ „ | 953,7 „ |

Die Reihenfolge, in welcher die Armeekorps in dieser Zusammenstellung auftreten, hat sich auch in diesem Jahre im Vergleich zu den Vorjahren so erheblich geändert, daß aus ihr allgemein gültige Schlüsse auf den Gesundheitszustand der einzelnen Korps nicht ohne weiteres zu ziehen sind.

Auch in der Verteilung des Zugangs auf Lazarett und Revier weichen die einzelnen Armeekorps unter sich und von den entsprechenden Ziffern der Vorjahre ab. Nur das VIII. Armeekorps hatte, wie im vergangenen Jahre, die meisten Lazarett- und Revierkranken aufzuweisen.

Auf tausend Mann der Iststärke kamen

| Lazarettkranke beim | | Revierkranke beim | | Lazarett- und Revierkranke beim | |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|------|
| XVII. Armeekorps | 170,6 | VI. Armeekorps | 267,7 | IV. Armeekorps | 36,6 |
| V. " | 174,9 | IX. " | 276,9 | V. " | 39,0 |
| Gardekorps | 182,4 | X. " | 282,7 | III. " | 40,6 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 188,7 | IV. " | 289,2 | XIV. " | 46,4 |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | 189,2 | XVII. " | 290,9 | XII. (1. K. S.) Armeekorps | 46,5 |
| VII. Armeekorps | 189,8 | III. " | 294,9 | IX. Armeekorps | 46,6 |
| III. " | 191,2 | XII. (1. K. S.) Armeekorps | 308,5 | XV. " | 51,8 |
| XIV. " | 197,5 | XIX. (2. K. S.) " | 322,9 | XVIII. " | 52,5 |
| XI. " | 200,8 | V. Armeekorps | 342,6 | XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 52,5 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 202,8 | XV. " | 354,8 | VII. Armeekorps | 56,1 |
| IX. Armeekorps | 204,5 | XIV. " | 355,7 | XVII. " | 56,2 |
| XV. " | 204,9 | XVIII. " | 359,7 | VI. " | 57,6 |
| VIII. " | 206,9 | VII. " | 374,8 | I. " | 58,4 |
| X. " | 207,4 | II. " | 398,1 | XI. " | 59,1 |
| VI. " | 208,2 | I. " | 410,1 | XVI. " | 60,8 |
| XVIII. " | 215,2 | XVI. " | 412,8 | Gardekorps | 63,0 |
| XVI. " | 216,2 | VIII. " | 426,3 | II. Armeekorps | 67,9 |
| II. " | 218,4 | Gardekorps | 458,1 | X. " | 68,4 |
| I. " | 224,8 | XI. Armeekorps | 466,9 | XIII. (K. W.) Armeekorps | 70,2 |
| IV. " | 230,9 | XIII. (K. W.) Armeekorps | 511,1 | VIII. Armeekorps | 74,2 |
| Armee | 200,7 | Armee | 363,7 | Armee | 55,5 |

Königlich Bayerische Armee.



| | | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|------|
| III. Armeekorps | 171,1 | III. Armeekorps | 611,9 | III. Armeekorps | 61,4 |
| II. " | 171,7 | II. " | 622,1 | II. " | 66,8 |
| I. " | 212,2 | I. " | 667,9 | I. " | 73,6 |

Bezüglich der in der nächsten Tabelle nachgewiesenen Verteilung der Erkrankungen auf die einzelnen Monate ist gegenüber den Vorjahren keine wesentliche Änderung eingetreten. Die beigefügte graphische Darstellung zeigt, daß der Zugang wie immer vom Januar bis März weitaus am stärksten war. Die Spitze der Kurve, welche im vorigen Jahre im Februar lag, fällt wieder wie vor zwei Jahren

auf den Januar. Bezüglich des Einflusses der Grippe auf die Krankbewegung läßt die nebenanstehende Kurve erkennen, daß der Zugang durch diese Krankheit in den Monaten Januar bis März um 5,6 bzw. 1,9 und 0,8 $\frac{0}{100}$ K. erhöht wurde, während in den übrigen Monaten nur verschwindende Unterschiede vorhanden sind.

| | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Zugang überhaupt |
|--------------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | |
| Absolute Zahl | 21 056 | 29 513 | 27 879 | 38 858 | 32 826 | 32 597 | 24 985 | 24 864 | 23 280 | 28 205 | 23 320 | 19 016 | 326 399 |
| $\frac{0}{100}$ K. | 49,0 | 54,4 | 51,9 | 72,5 | 61,4 | 60,8 | 46,2 | 45,3 | 43,4 | 51,0 | 43,0 | 39,3 | 619,9 |

Krankheitszugang nach Monaten



Die folgende Tabelle weist den Krankenzugang bei den einzelnen Truppengattungen nach.

Den höchsten Krankenzugang hatten, wie in den früheren Jahren, die Arbeiter-Abteilungen einschließlich der Disziplinar-Abteilung des Gardekorps. Sie zeigen gegen das Vorjahr eine Verringerung der Erkrankungsziffer um 302,4 $\frac{0}{100}$ K.

Die nächsthöchste Erkrankungsziffer weisen die Festungsgefängnisse, Pioniere, Oberfeuerwerkerschule und der Train auf.

Am günstigsten stehen in aufsteigender Reihenfolge die Veterinär-Akademie, die Kadettenanstalten, die Landwehrstämme, die Kriegsschulen und die Militär-Bäcker-Abteilungen.

| Truppengattung ¹⁾ | Krankenzugang (berechnet auf 1000 der bezüglichen Iststärke) | | | |
|--|--|--------|---------------------|----------|
| | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | in Summe |
| Infanterie | 193,4 | 352,7 | 53,6 | 599,7 |
| Kavallerie | 220,0 | 371,3 | 54,7 | 646,0 |
| Feldartillerie | 209,2 | 390,9 | 62,3 | 662,4 |
| Fufsartillerie | 214,3 | 375,4 | 63,5 | 653,2 |
| Pioniere | 258,4 | 470,3 | 76,8 | 805,4 |
| Verkehrstruppen | 163,0 | 365,8 | 44,5 | 573,4 |
| Train | 232,6 | 496,7 | 65,0 | 794,3 |
| Maschinengewehr-Abteilungen | 193,0 | 382,0 | 33,5 | 608,6 |
| Militärkrankenwärter | 293,5 | 150,6 | 35,4 | 479,5 |
| Landwehrstämme | 84,8 | 171,3 | 19,0 | 275,1 |
| Bekleidungsämter | 220,5 | 317,1 | 47,1 | 584,8 |
| Oberfeuerwerkerschule | — | 800,0 | — | 800,0 |
| Artillerie-Prüfungs-Kommission | 179,7 | 226,6 | 23,4 | 429,7 |
| Unteroffizierschulen | 175,3 | 385,6 | 52,3 | 613,7 |
| Kriegsschulen | — | 285,7 | — | 285,7 |
| Festungsgefängnisse | 332,0 | 645,1 | 117,4 | 1094,5 |
| Arbeiter- bzw. Disziplinar-Abteilung | 656,3 | 821,0 | 138,4 | 1615,7 |
| Kadettenanstalten | 90,9 | 159,1 | — | 250,0 |
| Unteroffizierschulen | 36,9 | 323,8 | 20,5 | 381,1 |
| Militär-Bäcker-Abteilungen | 187,1 | 139,2 | 21,1 | 347,4 |
| Militär-Veterinär-Akademie | 85,1 | 21,3 | 7,1 | 113,5 |
| Sonstige | 147,2 | 247,5 | 80,3 | 474,9 |
| Armee | 200,7 | 363,7 | 55,5 | 619,9 |

Der durchschnittliche tägliche Krankenstand betrug

| | |
|---|--------------------------|
| im Durchschnitt der Jahre 1881/82 bis 1885/86 | 30,6 $\frac{0}{100}$ K., |
| „ „ „ „ 1886/87 „ 1890/91 | 30,0 „ |
| „ „ „ „ 1891/92 „ 1895/96 | 29,9 „ |
| „ „ „ „ 1896/97 „ 1900/01 | 26,0 „ |
| im Jahre 1901/02 | 24,5 „ |
| im Jahre 1902/03 | 25,3 $\frac{0}{100}$ K. |

Der tägliche Krankenstand hat also nach den relativen Zahlen gegen das Vorjahr um 0,8 $\frac{0}{100}$ K., in Wirklichkeit um täglich durchschnittlich 59 Kranke zugenommen. Die Zunahme verteilt sich fast gleichmäßig auf das Lazarett

¹⁾ Im vorliegenden Berichtsjahre sind die Schloßgarde-Kompagnie, Invaliden, Kadetten und Unteroffizierschüler bei der Berechnung ausser Betracht gelassen worden (siehe Vorbemerkung 3) und sind die entsprechenden Zahlenangaben für diese Truppengattungen aus den bezüglichen Tabellen der sechsten Abteilung (II. Teil) zu ersehen.

und Revier. Es wurden nämlich von 1000 der Durchschnittsiststärke täglich behandelt:

| | im Lazarett | im Revier |
|---------------------|-------------|-----------|
| 1881/86 | 20,6 | 10,0 |
| 1886/91 | 19,5 | 10,5 |
| 1891/96 | 18,9 | 11,0 |
| 1896/1901 | 17,7 | 8,2 |
| 1901/02 | 17,5 | 7,0 |
| 1902/03 | 17,9 | 7,4 |

Einschließlich des am 1. Oktober 1902 vorhanden gewesenen Bestandes sind insgesamt 333 501 Mann in Behandlung gewesen; sie haben 4 861 070 Behandlungstage erfordert. Auf jeden Kranken entfallen demnach im Durchschnitt 14,6 Behandlungstage, gegenüber 14,5 im Jahre 1901/02.

Die durchschnittliche Behandlungsdauer stellt sich, nach Lazarett- und Revierkranken getrennt, wie folgt:

| Es wurden behandelt | Zahl der Behandlungstage | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | überhaupt | im Durchschnitt |
| im Lazarett 140 837 | 3 439 952 | 24,4 |
| im Revier 192 664 | 1 421 118 | 7,4 |

Die Durchschnittszahlen sind von denen des Vorjahres nicht erheblich verschieden.

Über die Zahl der Behandlungstage bei den einzelnen Truppengattungen, gesondert nach der Behandlungsart und insgesamt, gibt nachstehende Übersicht Auskunft.

| bei | Zahl der Behandlungstage | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | für jeden Lazarettkranken | für jeden Revierkranken | für jeden Kranken überhaupt |
| der Infanterie | 24,5 | 7,2 | 14,5 |
| der Kavallerie | 24,1 | 7,6 | 14,8 |
| der Feldartillerie | 24,3 | 7,6 | 14,6 |
| der Fufsartillerie | 25,5 | 7,2 | 15,1 |
| den Pionieren | 24,5 | 7,8 | 14,9 |
| den Verkehrstruppen | 25,9 | 7,0 | 14,0 |
| dem Train | 24,1 | 8,0 | 14,1 |
| den Maschinengewehr-Abteilungen | 22,2 | 6,6 | 12,5 |
| den Militärkrankenwärttern | 20,4 | 8,7 | 16,8 |
| den Landwehrstämmen | 22,5 | 12,7 | 16,6 |
| den Bekleidungsämtern | 24,5 | 6,2 | 14,8 |
| der Oberfeuerwerkerschule | — | 3,0 | 3,0 |
| der Artillerie-Prüfungs-Kommission | 24,3 | 4,1 | 13,6 |
| den Unteroffizierschulen | 20,6 | 7,1 | 12,2 |
| den Kriegsschulen | — | 13,5 | 13,5 |
| den Festungsgefängnissen | 28,3 | 8,6 | 16,9 |
| den Arbeiter-Abteilungen bzw. der Disziplinar-Abteilung | 26,0 | 5,7 | 15,9 |
| den Kadettenanstalten | 9,5 | 12,6 | 11,5 |
| den Unteroffizierschulen | 24,9 | 7,5 | 10,4 |
| den Militär-Bäcker-Abteilungen | 26,5 | 7,8 | 19,2 |
| der Militär-Veterinär-Akademie | 18,5 | 6,0 | 16,1 |
| den Sonstigen | 20,5 | 9,6 | 15,0 |
| der Armee ¹⁾ | 24,4 | 7,4 | 14,6 |

Der Ausfall an Diensttagen betrug für jeden Mann der Armee
im Durchschnitt der Jahre 1881/82 bis 1885/86 11,2 Tage,
" " " " 1886/87 " 1890/91 10,9 "
" " " " 1891/92 " 1895/96 10,9 "
" " " " 1896/97 " 1900/01 9,5 "
" " " " im Jahre 1901/02 " 9,0 "
" " " " 1902/03 " 9,2 "

Von der für das Berichtsjahr festgestellten Gesamtzahl entfallen auf die Behandlung im Lazarett 6,5, im Revier 2,7 Tage.

Ungefähr entsprechend der Reihenfolge, in welcher die einzelnen Truppengattungen an dem Krankenzugange überhaupt beteiligt waren, hatten die Arbeiter-Abteilungen bzw. die Disziplinar-Abteilung, die Festungsgefängnisse, die Pioniere, der Train, die Fußartillerie und die Feldartillerie den größten, die Veterinär-Akademie, die Oberfeuerwerkerschule, die Kadettenanstalten, die Kriegsschulen und die Unteroffiziersvorschulen den geringsten Verlust an Diensttagen. Einzelheiten ergibt die nebenstehende Tabelle.

In der folgenden Übersicht sind die Krankheitsgruppen nach der Höhe des Zuganges zusammengestellt. In der Reihenfolge ist gegenüber dem Vorjahr keine Änderung eingetreten.

Krankenzugang nach Krankheitsgruppen,
geordnet nach der Höhe des Zuganges.

| E s g i n g e n z u | | | | | |
|---------------------|-------|------|-----------------------|------|------|
| bei | | % K. | bei | | % K. |
| Gruppe X | 145,1 | | Gruppe VIII | 15,0 | |
| " XII | 126,6 | | " IV | 12,7 | |
| " V | 89,4 | | " IX | 12,4 | |
| " III | 82,3 | | " XIV | 8,6 | |
| " XI | 67,3 | | " II | 6,0 | |
| " I | 29,5 | | " VI | 5,1 | |
| " VII | 19,4 | | " XIII | 0,42 | |

In den weiterhin beigelegten Übersichten und Tafeln ist ersichtlich gemacht, welche Armeekorps bei den einzelnen Krankheitsgruppen den höchsten und welche den niedrigsten Zugang gehabt haben, wie hoch sich die Zahl der Erkrankungen bei den verschiedenen Armeekorps, getrennt nach Krankheitsgruppen und berechnet auf 1000 der Iststärke ($\frac{0}{0}$ K.) und des Gesamtzuganges ($\frac{0}{0}$ M.) stellt, sowie in welcher Weise sich die Erkrankungen bei den einzelnen Gruppen auf das Winter- und Sommerhalbjahr verteilen.

Ausfall an Diensttagen

| bei | durch Aufenthalt im Lazarett | durch Aufenthalt im Revier | durch Krankheit überhaupt |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| der Infanterie | 6,3 | 2,6 | 8,9 |
| der Kavallerie | 6,9 | 2,8 | 9,8 |
| der Feldartillerie | 6,9 | 3,0 | 9,9 |
| der Fußartillerie | 7,3 | 2,7 | 10,0 |
| den Pionieren | 8,6 | 3,7 | 12,3 |
| den Verkehrstruppen | 5,6 | 2,6 | 8,2 |
| dem Train | 7,4 | 4,0 | 11,4 |
| den Maschinengewehr-Abteilungen | 5,1 | 2,5 | 7,6 |
| den Militärkrankenwärtern | 6,9 | 1,3 | 8,2 |
| den Landwehrstämmen | 2,5 | 2,2 | 4,7 |
| den Bekleidungsämtern | 7,0 | 2,0 | 8,9 |
| der Oberfeuerwerkerschule | — | 2,4 | 2,4 |
| der Artillerie-Prüfungs-Kommission | 4,9 | 0,93 | 5,9 |
| den Unteroffizierschulen | 4,9 | 2,8 | 7,7 |
| den Kriegsschulen | — | 3,9 | 3,9 |
| den Festungsgefängnissen | 13,6 | 5,7 | 19,3 |
| den Arbeiter-Abteilungen bzw. der Disziplinar-Abteilung | 21,9 | 4,8 | 26,7 |
| den Kadettenanstalten | 0,66 | 2,0 | 2,9 |
| den Unteroffiziersvorschulen | 1,6 | 2,5 | 4,1 |
| den Militär-Bäcker-Abteilungen | 5,7 | 1,1 | 6,8 |
| der Militär-Veterinär-Akademie | 1,7 | 0,13 | 1,8 |
| den Sonstigen | 4,9 | 2,4 | 7,3 |
| der Armee ¹⁾ | 6,5 | 2,7 | 9,2 |

| Gruppen | Durchschnittlicher Zugang in der Armee | Höchster Zugang | Geringster Zugang |
|--|--|--|--------------------------------------|
| I. Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen | 29,5 $\frac{0}{0}$ K. | XIII. (K. W.) Armeekorps 44,2 $\frac{0}{0}$ K. | VI. Armeekorps 13,4 $\frac{0}{0}$ K. |
| II. Krankheiten des Nervensystems | 6,0 " | VIII. Armeekorps 7,5 " | III. " 4,4 " |
| III. " der Atmungsorgane | 82,3 " | Gardekorps 98,8 " | III. " 64,8 " |
| IV. " der Kreislaufs- und blutbereitenden Organe | 12,7 " | VIII. Armeekorps 19,6 " | V. " 8,4 " |
| V. Krankheiten der Ernährungsorgane | 89,4 " | XIII. (K. W.) Armeekorps 131,1 " | XVII. " 64,5 " |
| VI. " der Harn- und Geschlechtsorgane | 5,1 " | XIII. (K. W.) " 6,5 " | III. " 3,8 " |
| VII. Venerische Krankheiten | 19,4 " | XII. (I. K. S.) " 34,0 " | XIII. (K. W.) Armeekorps 8,9 " |
| VIII. Augenkrankheiten | 15,0 " | I. Armeekorps 21,0 " | XII. (I. K. S.) " 6,8 " |
| IX. Ohrenkrankheiten | 12,4 " | XVI. " 17,0 " | XII. (I. K. S.) " 8,5 " |
| X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen | 145,1 " | XVI. " 191,5 " | XII. (I. K. S.) " 102,9 " |
| XI. " der Bewegungsorgane | 67,3 " | XI. " 94,1 " | VI. Armeekorps 49,5 " |
| XII. Mechanische Verletzungen | 126,6 " | XIII. (K. W.) Armeekorps 188,6 " | XII. (I. K. S.) Armeekorps 88,7 " |
| XIII. Andere Krankheiten | 0,42 " | IV. Armeekorps 0,76 " | XVI. Armeekorps 0,07 " |
| XIV. Zur Beobachtung | 8,6 " | VII. " 11,4 " | IX. " 3,4 " |

¹⁾ Siehe Anmerkung ¹⁾ auf Seite 10.

Beteiligung der einzelnen Armeekorps

nach $\frac{0}{0}$ K.


| Armeekorps | Gruppe I | | Gruppe II | | Gruppe III | | Gruppe IV | | Gruppe V | | Gruppe VI | | Gruppe VII | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | $\frac{0}{0}$ K. | $\frac{0}{0}$ M. | $\frac{0}{0}$ K. | $\frac{0}{0}$ M. | $\frac{0}{0}$ K. | $\frac{0}{0}$ M. | $\frac{0}{0}$ K. | $\frac{0}{0}$ M. | $\frac{0}{0}$ K. | $\frac{0}{0}$ M. | $\frac{0}{0}$ K. | $\frac{0}{0}$ M. | $\frac{0}{0}$ K. | $\frac{0}{0}$ M. |
| Gardekorps | 30,5 | 43,3 | 5,8 | 8,2 | 98,8 | 140,4 | 14,0 | 19,9 | 113,6 | 161,4 | 5,3 | 7,5 | 24,7 | 35,1 |
| I. Armeekorps | 40,4 | 58,2 | 5,6 | 8,0 | 94,4 | 136,1 | 9,6 | 13,8 | 79,4 | 114,5 | 5,9 | 8,5 | 22,8 | 32,9 |
| II. „ | 35,2 | 51,5 | 6,8 | 9,9 | 82,0 | 120,0 | 11,8 | 17,3 | 86,5 | 126,5 | 4,8 | 7,0 | 18,5 | 27,0 |
| III. „ | 32,3 | 61,3 | 4,4 | 8,3 | 64,8 | 123,1 | 9,3 | 17,7 | 68,6 | 130,3 | 3,8 | 7,2 | 21,4 | 40,7 |
| IV. „ | 19,1 | 34,2 | 5,3 | 9,6 | 65,5 | 117,6 | 10,7 | 19,3 | 73,7 | 132,4 | 4,8 | 8,7 | 16,1 | 28,8 |
| V. „ | 23,3 | 41,9 | 5,9 | 10,5 | 88,3 | 158,8 | 8,4 | 15,2 | 83,5 | 150,1 | 4,8 | 8,6 | 17,9 | 32,2 |
| VI. „ | 13,4 | 25,2 | 5,7 | 10,7 | 79,6 | 149,3 | 10,7 | 20,1 | 68,0 | 127,5 | 4,6 | 8,7 | 22,4 | 41,9 |
| VII. „ | 33,2 | 53,5 | 5,4 | 8,7 | 81,5 | 131,2 | 12,4 | 19,9 | 88,7 | 142,9 | 4,7 | 7,5 | 17,2 | 27,7 |
| VIII. „ | 24,9 | 35,2 | 7,5 | 10,6 | 94,4 | 133,5 | 19,6 | 27,8 | 118,7 | 167,9 | 5,4 | 7,6 | 17,6 | 24,9 |
| IX. „ | 40,8 | 77,4 | 5,7 | 10,9 | 68,3 | 129,4 | 9,3 | 17,7 | 75,1 | 142,2 | 5,0 | 9,4 | 21,0 | 39,9 |
| X. „ | 26,1 | 46,7 | 5,0 | 9,0 | 71,1 | 127,2 | 13,0 | 23,3 | 77,1 | 138,1 | 4,8 | 8,7 | 17,2 | 30,9 |
| XI. „ | 42,5 | 58,4 | 7,4 | 10,2 | 87,9 | 120,9 | 15,5 | 21,3 | 94,3 | 129,7 | 5,9 | 8,1 | 15,2 | 20,9 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps . | 42,9 | 78,8 | 7,4 | 13,5 | 79,9 | 146,9 | 11,4 | 20,9 | 78,5 | 144,3 | 4,5 | 8,2 | 34,0 | 62,5 |
| XIII. (K. W.) Armeekorps . | 44,2 | 57,4 | 7,1 | 9,3 | 91,6 | 119,0 | 17,0 | 22,1 | 131,1 | 170,2 | 6,5 | 8,5 | 8,9 | 11,5 |
| XIV. Armeekorps | 24,9 | 41,5 | 5,7 | 9,6 | 84,8 | 141,4 | 12,8 | 21,3 | 94,8 | 158,1 | 4,6 | 7,7 | 11,5 | 19,1 |
| XV. „ | 24,9 | 40,7 | 6,2 | 10,1 | 76,0 | 124,3 | 14,0 | 22,9 | 89,5 | 146,5 | 5,7 | 9,3 | 23,2 | 38,0 |
| XVI. „ | 24,0 | 34,8 | 4,7 | 6,8 | 88,7 | 128,5 | 15,9 | 23,0 | 101,1 | 146,5 | 5,6 | 8,1 | 15,8 | 22,9 |
| XVII. „ | 20,0 | 38,8 | 4,9 | 9,5 | 72,8 | 140,8 | 10,2 | 19,8 | 64,5 | 124,8 | 4,7 | 9,2 | 21,3 | 41,2 |
| XVIII. „ | 27,7 | 44,1 | 6,8 | 10,9 | 85,3 | 136,0 | 15,7 | 25,0 | 108,1 | 172,3 | 6,4 | 10,1 | 12,0 | 19,2 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps . | 25,4 | 44,0 | 7,2 | 12,5 | 74,3 | 128,6 | 11,2 | 19,3 | 77,0 | 133,1 | 4,6 | 7,9 | 29,0 | 50,2 |
| Armee | 29,5 | 47,5 | 6,0 | 9,6 | 82,3 | 132,8 | 12,7 | 20,4 | 89,4 | 144,2 | 5,1 | 8,3 | 19,4 | 31,3 |
| I. Kgl. Bayer. Armeekorps . | 46,7 | 49,0 | 13,6 | 14,3 | 148,9 | 156,1 | 18,9 | 19,8 | 183,1 | 192,0 | 6,5 | 6,8 | 26,4 | 27,7 |
| II. „ „ „ | 44,7 | 52,0 | 6,4 | 7,4 | 126,1 | 146,6 | 15,9 | 18,5 | 157,4 | 182,9 | 5,7 | 6,6 | 13,6 | 15,8 |
| III. „ „ „ | 43,5 | 51,5 | 10,0 | 11,8 | 135,6 | 160,6 | 12,2 | 14,5 | 181,3 | 214,8 | 6,0 | 7,1 | 13,4 | 15,8 |

an den Krankheitsgruppen

und $\frac{0}{00}$ M.

| Gruppe VIII | | Gruppe IX | | Gruppe X | | Gruppe XI | | Gruppe XII | | Gruppe XIII | | Gruppe XIV | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. |
| 14,4 | 20,5 | 11,6 | 16,5 | 163,4 | 232,2 | 75,4 | 107,2 | 138,9 | 197,5 | 0,44 | 0,62 | 6,9 | 9,8 |
| 21,0 | 30,2 | 16,1 | 23,2 | 176,8 | 255,0 | 66,5 | 95,9 | 145,7 | 210,1 | 0,32 | 0,46 | 9,1 | 13,1 |
| 17,2 | 25,2 | 11,7 | 17,2 | 166,6 | 243,7 | 85,9 | 125,6 | 148,3 | 216,9 | 0,43 | 0,62 | 8,0 | 11,7 |
| 13,7 | 26,1 | 13,3 | 25,3 | 108,8 | 206,7 | 71,9 | 136,6 | 106,8 | 202,8 | 0,43 | 0,81 | 7,0 | 13,3 |
| 12,9 | 23,1 | 14,2 | 25,5 | 137,1 | 246,2 | 59,7 | 107,2 | 128,1 | 230,2 | 0,76 | 1,4 | 8,8 | 15,7 |
| 14,5 | 26,1 | 9,3 | 16,6 | 123,6 | 222,1 | 61,4 | 110,3 | 105,1 | 188,9 | 0,20 | 0,35 | 10,2 | 18,4 |
| 16,2 | 30,4 | 10,7 | 20,0 | 126,2 | 236,6 | 49,5 | 92,8 | 115,0 | 215,7 | 0,43 | 0,80 | 10,9 | 20,4 |
| 15,8 | 25,5 | 11,2 | 18,1 | 141,9 | 228,6 | 72,8 | 117,3 | 124,1 | 199,9 | 0,56 | 0,90 | 11,4 | 18,3 |
| 16,7 | 23,6 | 13,8 | 19,6 | 162,7 | 230,0 | 60,7 | 85,7 | 153,7 | 217,2 | 0,41 | 0,58 | 10,2 | 15,9 |
| 12,9 | 24,5 | 10,9 | 20,6 | 114,9 | 217,7 | 63,3 | 119,9 | 96,9 | 183,5 | 0,36 | 0,68 | 3,4 | 6,4 |
| 13,8 | 24,8 | 11,9 | 21,2 | 148,1 | 265,2 | 56,7 | 101,5 | 104,0 | 186,3 | 0,64 | 1,1 | 9,0 | 16,1 |
| 15,4 | 21,2 | 11,5 | 15,8 | 171,5 | 236,0 | 94,1 | 129,5 | 154,4 | 212,5 | 0,39 | 0,53 | 10,8 | 14,9 |
| 6,8 | 12,5 | 8,5 | 15,7 | 102,9 | 189,2 | 72,9 | 134,0 | 88,7 | 163,1 | 0,25 | 0,46 | 5,3 | 9,8 |
| 13,4 | 17,4 | 11,9 | 15,4 | 158,0 | 205,2 | 80,1 | 104,1 | 188,6 | 245,0 | 0,72 | 0,94 | 10,8 | 14,0 |
| 12,5 | 20,8 | 10,4 | 17,3 | 140,5 | 234,4 | 67,4 | 112,4 | 120,0 | 200,1 | 0,47 | 0,79 | 9,3 | 15,5 |
| 15,7 | 25,7 | 11,1 | 18,2 | 150,1 | 247,2 | 60,0 | 98,1 | 124,7 | 204,0 | 0,19 | 0,31 | 8,9 | 14,6 |
| 17,9 | 26,0 | 17,0 | 24,6 | 191,5 | 277,6 | 63,5 | 92,1 | 137,5 | 199,3 | 0,07 | 0,11 | 6,6 | 9,6 |
| 16,9 | 32,6 | 12,1 | 23,4 | 116,2 | 224,8 | 56,6 | 109,5 | 109,0 | 210,9 | 0,34 | 0,65 | 7,3 | 14,1 |
| 16,0 | 25,5 | 16,3 | 26,0 | 142,1 | 226,6 | 60,1 | 95,8 | 119,8 | 190,9 | 0,72 | 1,2 | 10,4 | 16,6 |
| 13,1 | 22,6 | 12,9 | 22,3 | 131,5 | 227,4 | 73,9 | 127,8 | 109,9 | 190,1 | 0,49 | 0,84 | 7,7 | 13,3 |
| 15,0 | 24,3 | 12,4 | 19,9 | 145,1 | 234,2 | 67,3 | 108,6 | 126,6 | 204,2 | 0,42 | 0,68 | 8,6 | 13,9 |
| 20,0 | 21,0 | 18,2 | 19,1 | 150,7 | 158,0 | 99,1 | 103,9 | 206,8 | 216,8 | 0,43 | 0,45 | 14,4 | 15,1 |
| 20,5 | 23,9 | 17,7 | 20,5 | 167,8 | 195,0 | 100,4 | 116,7 | 165,7 | 192,5 | 0,37 | 0,44 | 18,3 | 21,2 |
| 21,2 | 25,1 | 20,8 | 24,6 | 159,8 | 189,2 | 81,7 | 96,8 | 156,6 | 185,4 | 0,32 | 0,38 | 2,0 | 2,4 |

Zugang in den einzelnen Krankheitsgruppen nach
o/oo K. o/oo M.



Verteilung des Zuganges bei den einzelnen Krankheitsgruppen auf das Winter- und Sommerhalbjahr.

| Krankheitsgruppen und Krankheit | No. der Krank- heiten im Rapport- muster | Zugang von 1000 Mann der Iststärke während des Jahres | Davon entfallen auf das | |
|--|--|---|-------------------------|---------------------|
| | | | Winter- halbjahr | Sommer- halbjahr |
| I. Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen | 1—40 | 29,5 | 20,0 | 9,6 |
| { Typhus | 13 | 0,85 | 0,32 | 0,53 |
| { Wechselfieber | 16 | 0,16 | 0,07 | 0,09 |
| { Grippe | 17 | 11,9 | 10,5 | 1,5 |
| { Tuberkulose { Akute Miliartuberkulose | 18 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| { Tuberkulose { der ersten Luftwege und Lunge | 19 | 1,6 | 0,88 | 0,73 |
| { Tuberkulose { der Knochen und Gelenke | 20 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| { Tuberkulose { anderer Organe | 21 | 0,18 | 0,08 | 0,10 |
| { Ruhr | 22 | 0,17 | — | 0,16 |
| { Akuter Gelenkrheumatismus | 27 | 8,1 | 4,3 | 3,8 |
| II. Krankheiten des Nervensystems | 41—52 | 6,0 | 3,5 | 2,5 |
| III. Krankheiten der Atmungsorgane | 53—63 | 82,3 | 57,0 | 25,8 |
| { Katarrhe der Schleimhäute der Luftwege | 53—57 | 71,9 | 50,9 | 21,4 |
| { Akute Lungenentzündung | 58 | 6,2 | 3,9 | 2,3 |
| { Brustfellentzündung | 60 | 3,8 | 1,9 | 1,9 |
| IV. Krankheiten der Kreislaufs- und blutbereitenden Organe | 64—79 | 12,7 | 6,9 | 5,7 |
| V. Krankheiten der Ernährungsorgane | 80—101 | 89,4 | 51,7 | 37,9 |
| { Mandelentzündung | 82 | 43,9 | 30,2 | 13,9 |
| { Akuter Magen- und Darmkatarrh | 86 u. 89 | 29,3 | 12,6 | 16,6 |
| { Katarrhalische Gelbsucht | 97 | 0,87 | 0,46 | 0,41 |
| VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | 102—111 | 5,1 | 3,1 | 2,1 |
| VII. Venerische Krankheiten | 112—117 | 19,4 | 11,2 | 8,2 |
| VIII. Augenkrankheiten | 118—134 | 15,0 | 8,5 | 6,6 |
| { Darunter: Ansteckende | 118—122 | 0,48 | 0,36 | 0,12 |
| IX. Ohrenkrankheiten | 135—139 | 12,4 | 7,5 | 4,9 |
| { Darunter: Krankheiten des äußeren und mittleren Ohres | 136 u. 137 | 11,8 | 7,1 | 4,8 |
| X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen | 140—148 | 145,1 | 81,1 | 64,2 |
| XI. Krankheiten der Bewegungsorgane | 149—162 | 67,3 | 31,2 | 36,0 |
| XII. Mechanische Verletzungen | 163—192 | 126,6 | 64,4 | 62,2 |
| { Darunter: Knochenbrüche, Verstauchungen, Verrenkungen | 168—184 | 43,6 | 21,9 | 21,7 |
| XIII. Andere Krankheiten | 193—197 | 0,42 | 0,26 | 0,16 |
| XIV. Zur Beobachtung | 198 | 8,6 | 5,4 | 3,2 |
| Summe der Gruppen I bis XIV | 1—198 | 619,9 | 351,9 | 269,2 |

B. Die wichtigeren im Berichtsjahre 1902/03 zur Ausführung gelangten sanitären Maßnahmen.

In einer Reihe von Garnisonen wurden auch in diesem Berichtsjahre Neu- bzw. Erweiterungsbauten von Kasernen und anderen Garnisonanstalten in Gebrauch genommen.

Neue Garnisonlazarette wurden in Anklam (Okt. 1903), Brieg (1.5.03) und Mülheim a. d. Ruhr (1.10.02) bezogen. Verschiedene Lazarette wurden umgebaut oder durch Erweiterungsbauten — Tilsit, Paderborn — vergrößert. In Goslar, Insterburg, St. Averd, Göttingen, Hirschberg sind Lazarett-Neubauten in Angriff genommen.

Im August 1902 wurde das Haupt-Sanitätsdepot Berlin fertiggestellt und seiner Bestimmung, die eine Erweiterung der im § 102 F. S. O. gestellten Aufgaben in sich schloß, übergeben.

Den heutigen Anforderungen entsprechende Operationsräume erhielten die neugebauten bzw. erweiterten Lazarette und die Garnisonlazarette Neifse, Spandau, Brandenburg a. H.

In mehreren Lazaretten wurden Desinfektionsanstalten neu errichtet bzw. die alten Apparate durch neue ersetzt (Hannover, Metz-Stadt, Torgau, Jauer, Cosel, Deutz, Cassel, Jülich).

Im Garnisonlazarett Detmold wird eine besondere Abteilung für Lungenkranke eingerichtet.

Durch Einführung von Sammelheizungen, von Gasglühlicht sowie von elektrischer Beleuchtung (Hannover, Königsberg i. Pr.) wurden in mehreren Lazaretten die bisherigen Anlagen vervollkommnet.

Eine elektrische Feueralarmleitung wurde im Garnisonlazarett I Berlin, ein Lichtbad im Garnisonlazarett II Berlin eingerichtet.

In der vertragsmäßigen Verpflichtung von Krankenpflegerinnen für die Lazarette wurde fortgeföhrt (Bromberg).

Die Verpflegung der Mannschaften aus den Truppenküchen wurde nach wie vor sorgfältigst überwacht, desgleichen der Kantinenbetrieb. Regelmäßige Untersuchungen des Fleisches und der übrigen Lebensmittel und genaue Nährwertberechnungen wurden durchweg von Sanitätsoffizieren angestellt. — Beim I. Armeekorps wurde durch eine Verfügung des Generalkommandos ein wesentlicher Rückgang des Alkoholverbrauchs in den Kantinen erzielt.

Der Trinkwasserversorgung wurde allgemein die größte Aufmerksamkeit geschenkt und ihre Verbesserung durch Neuanlegung von Brunnen, Enteisungsanlagen usw.

angestrebt. In zahlreichen Garnisonen wurden militärfiskalische Gebäude an städtische Sammel-Wasserversorgungsanlagen angeschlossen.

Neue Schwimm- bzw. Badeanstalten wurden in Berlin, Dresden, Potsdam, Glatz, Bernstadt, Lötzen eingerichtet; besondere Waschräume stehen jetzt in vielen Kasernements den Mannschaften zur Verfügung.

In vielen Kasernen wurden zur besseren Lüftung während der Nacht in den Mannschaftsstuben Kippfenster angebracht.

Die Verbesserungen erstreckten sich in gleicher Weise auch auf die Latrinen. Wo es möglich war, wurde der Anschluß an die allgemeine Kanalisation durchgeführt, und die Einführung moderner Systeme in den Abortanlagen und im Abfuhrwesen schritt weiter fort. — Die Feuerlatrinen in Weingarten wurden wegen des starken Geruches wieder abgeschafft.

Umfangreiche Maßnahmen bezüglich anderer, die Gesundheitspflege betreffender Verhältnisse wurden in allen Teilen des Reiches getroffen. Regelmäßige Gesundheitsbesichtigungen und eingehende Belehrungen der Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften über die Bedeutung der Geschlechtskrankheiten und ihre Verhütung, über Hitzschlag, über Hautpflege durch Bäder und über Mund- und Zahnpflege gehörten, wie bisher, zu den ständigen Dienstobliegenheiten der Sanitätsoffiziere. — Im Bereiche des I. Armeekorps wurde die seit 1896 eingeführte Augenkontrolle fortgesetzt; eine Abnahme der dort endemischen kontagiösen Augenentzündung ist unverkennbar.

Im II. Armeekorps wurden durch Verfügung des Generalkommandos in jeder Garnison in Anlehnung an § 23,3 der F. S. O. ständige Überwachungskommissionen eingerichtet, bestehend aus 3 Mitgliedern, darunter 1 Sanitätsoffizier, die mindestens zweimal im Jahre sämtliche Garnisonanstalten auf ihre sanitären Einrichtungen zu revidieren haben.

Regelmäßige Pinselungen der an Schweifsfuß leidenden Mannschaften mit Formalinlösungen sind fast allgemein eingeföhrt.

In Straßburg i. E. wurde wegen einiger Erkrankungen an echten Pocken in der Zivilbevölkerung die Schutzpockenimpfung sämtlicher innerhalb der letzten zwei Jahre nicht geimpften Leute vorgenommen. Eine Erkrankung an Pocken trat im Militär nicht auf.

C. Berichterstattung über die einzelnen Gruppen der Lazarett- und Revierkranken im besonderen.

I. Gruppe: Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen.

(No. 1 bis 40 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | | | |
| 539 | 15 513 | 29,5 | 12 686 | 79,0 | 297 ¹⁾ | 1,9 | 2455 | 15,3 | 15 438 | 96,2 | 614 | 433 597 | 27,0 |

Außerdem erkrankten noch 7 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 5 Invaliden, 300 Kadetten und 192 Unteroffizier-Vorschüler, welche nicht hier, sondern in der sechsten Abteilung des II. Teiles zahlenmäßig nachgewiesen werden.

Im Jahre 1901/02 betrug der Zugang der I. Gruppe 11 970 Mann = 22,1 ‰ K. Die Zunahme im Berichtsjahre um 7,4 ‰ ist wieder durch das häufigere Auftreten der Grippe bedingt, deren Zugang um 4013 Mann = 7,7 ‰ höher war als im Vorjahre.

Die folgende Übersicht gibt über die Zahl der Erkrankungen in den einzelnen Armeekorps Aufschluß. In einer besonderen Spalte ist die Höhe des Zuganges ohne die Grippekranken ersichtlich gemacht. Der Einfluß dieser Krankheit auf die Krankenbewegung der Gruppe I tritt am auffallendsten bei dem XI., I., XIII. (K. W.) und IX. Armeekorps hervor.

Krankenzugang in Gruppe I nach Armeekorps.

| Armeekorps | einschließlich der Grippekranken | | | abzüglich der Grippekranken | | Armeekorps | einschließlich der Grippekranken | | | abzüglich der Grippekranken | |
|--------------------------------------|--|------|------|-----------------------------------|------|---|--|------|------|-----------------------------------|------|
| | abs. Zahl | ‰ K. | ‰ M. | abs. Zahl | ‰ K. | | abs. Zahl | ‰ K. | ‰ M. | abs. Zahl | ‰ K. |
| Gardekorps | 1 260 | 30,5 | 43,3 | 788 | 19,1 | XIII. (K. W.) Armeekorps | 977 | 44,2 | 57,4 | 495 | 22,4 |
| I. Armeekorps | 1 277 | 40,4 | 58,2 | 565 | 17,9 | XIV. Armeekorps | 791 | 24,9 | 41,5 | 556 | 17,5 |
| II. „ | 909 | 35,2 | 51,5 | 489 | 18,9 | XV. „ | 777 | 24,9 | 40,7 | 504 | 16,1 |
| III. „ | 759 | 32,3 | 61,3 | 330 | 14,0 | XVI. „ | 655 | 24,0 | 34,8 | 348 | 12,7 |
| IV. „ | 427 | 19,1 | 34,3 | 279 | 12,5 | XVII. „ | 593 | 20,0 | 38,8 | 510 | 17,2 |
| V. „ | 597 | 23,3 | 41,9 | 381 | 14,9 | XVIII. „ | 727 | 27,7 | 44,1 | 547 | 20,8 |
| VI. „ | 347 | 13,4 | 25,2 | 328 | 12,7 | XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 524 | 25,4 | 44,0 | 420 | 20,4 |
| VII. „ | 895 | 33,2 | 53,5 | 426 | 15,8 | Armee | 15 513 | 29,5 | 47,5 | 9 255 | 17,6 |
| VIII. „ | 669 | 24,9 | 35,2 | 476 | 17,7 | I. K. B. Armeekorps | 1 086 | 46,7 | 49,0 | 734 | 31,6 |
| IX. „ | 1 019 | 40,8 | 77,4 | 520 | 20,8 | II. „ „ „ | 954 | 44,7 | 52,0 | 448 | 21,0 |
| X. „ | 572 | 26,1 | 46,7 | 385 | 17,6 | III. „ „ „ | 810 | 43,5 | 51,5 | 475 | 25,5 |
| XI. „ | 882 | 42,5 | 58,4 | 410 | 19,7 | | | | | | |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 856 | 42,9 | 78,8 | 498 | 24,9 | | | | | | |

Auf die einzelnen Monate verteilt sich der Zugang in folgender Weise:

| | E s g i n g e n z u i m M o n a t | | | | | | | | | | | | Zugang über- haupt |
|---------------|-----------------------------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|--------------------------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | |
| absolute Zahl | 575 | 912 | 1347 | 4015 | 2035 | 1507 | 1158 | 1036 | 852 | 850 | 611 | 615 | 15 513 |
| ‰ K. | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 7,5 | 3,8 | 2,8 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 29,5 |

1) Außerdem starben 5 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.
Sanitäts-Bericht über die Armee. 1902/03. I. Teil.



Erste Unterart: Infektionskrankheiten.
(No. 1 bis 26 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | | |
| 301 | 10 010 | 19,0 | 8589 | 83,3 | 252 ¹⁾ | 2,4 | 1143 | 11,1 | 9984 | 96,8 | 327 | 211 220 | 20,5 |

Außerdem erkrankten noch 2 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 4 Invaliden, 269 Kadetten und 149 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung).

Wie sich dieser Gesamtzugang auf die einzelnen Armeekorps verteilt, ist aus der nachstehenden Tabelle zu ersehen, in der außerdem der Zugang an Grippe (No. 17 des Rapportmusters) und an Tuberkulose (No. 18 bis 21 des Rapportmusters) getrennt dargestellt ist. Den höchsten Zugang haben das IX., I., XI. und XIII. (K.W.) Armeekorps gehabt, bei denen — wie schon bemerkt — die zahlreichen Grippeerkrankungen einen wesentlichen Einfluß auf den Zugang ausgeübt haben.

| Armeekorps | No. 1 bis 26 des Rapportmusters | | | No. 17 des Rapport- musters | | No. 18 bis 21 des Rapport- musters | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|-------------------|---|---------|
| | absol. Zahl | ‰ K. | ‰ M. | absol. Zahl | ‰ K. | absol. Zahl | ‰ K. |
| Gardekorps | 761 | 18,4 | 26,3 | 472 | 11,4 | 88 | 2,1 |
| I. Armeekorps | 947 | 30,0 | 43,2 | 712 | 22,5 | 64 | 2,0 |
| II. " | 698 | 27,0 | 39,5 | 420 | 16,3 | 44 | 1,7 |
| III. " | 567 | 24,1 | 45,8 | 429 | 18,2 | 64 | 2,7 |
| IV. " | 246 | 11,0 | 19,8 | 148 | 6,6 | 26 | 1,2 |
| V. " | 357 | 13,9 | 25,0 | 216 | 8,4 | 35 | 1,4 |
| VI. " | 147 | 5,8 | 10,7 | 19 | 0,7 ⁴⁾ | 45 | 1,7 |
| VII. " | 635 | 23,6 | 38,0 | 469 | 17,4 | 57 | 2,1 |
| VIII. " | 414 | 15,4 | 21,8 | 193 | 7,2 | 56 | 2,1 |
| IX. " | 760 | 30,5 | 57,7 | 499 | 20,0 | 39 | 1,6 |
| X. " | 369 | 16,8 | 30,1 | 187 | 8,5 | 42 | 1,9 |
| XI. " | 607 | 29,2 | 40,2 | 472 | 22,7 | 44 | 2,1 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 547 | 27,4 | 50,4 | 358 | 17,9 | 35 | 1,8 |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | 640 | 28,9 | 37,6 | 482 | 21,8 | 53 | 2,4 |
| XIV. Armeekorps | 425 | 13,4 | 22,3 | 235 | 7,4 | 72 | 2,3 |
| XV. " | 467 | 15,0 | 24,5 | 273 | 8,7 | 59 | 1,9 |
| XVI. " | 432 | 15,8 | 22,9 | 307 | 11,2 | 36 | 1,3 |
| XVII. " | 371 | 12,5 | 24,2 | 83 | 2,8 | 67 | 2,3 |
| XVIII. " | 388 | 14,8 | 23,5 | 180 | 6,8 | 61 | 2,3 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 232 | 11,3 | 19,5 | 104 | 5,1 | 36 | 1,7 |
| Armee | 10 010 | 19,0 | 30,7 | 6258 | 11,9 | 1023 | 1,9 |
| I. K. B. Armeekorps | 612 | 26,3 | 27,6 | 352 | 15,1 | 50 | 2,2 |
| II. " | 651 | 30,5 | 35,5 | 506 | 23,7 | 52 | 2,4 |
| III. " | 535 | 28,7 | 34,0 | 335 | 18,0 | 27 | 1,5 |

1. Pocken und Windpocken. (No. 1 und 2 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | diens- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 7 | 0,01 | 7 | — | — | 7 | — | 11,9 |

Erkrankungen an echten Pocken sind im Berichtsjahre nicht vorgekommen.

Mit Windpocken kam in Potsdam, Königsberg i. Pr., Glatz, Minden, Aachen, Schwerin und Schlettstadt je 1 Mann in Zugang.

Außerdem kamen noch in Potsdam 5, Plön 3, Dresden 1 und Karlsruhe 2 Kadetten in Zugang, welche durch Einführung der Berichterstattung über die Spezialanstalten in jener — siehe sechste Abteilung, II. Teil — zahlenmäßig nachgewiesen werden.

Die nachstehende Übersicht gibt ein Bild von den Erkrankungen an Pocken und Windpocken während der letzten 30 Jahre.

| J a h r | Es erkrankten an | | Es starben an Pocken |
|---------------------|------------------|---|-------------------------|
| | Pocken | modifizierten Pocken und Windpocken | |
| 1873/74 | 2 | 20 | 1 ²⁾ |
| 1874/75 | — | 26 | — |
| 1875/76 | 4 | 17 | — |
| 1876/77 | — | 21 | — |
| 1877/78 | 1 | 15 | — |
| 1878/79 | — | 15 | — |
| 1879/80 | — | 7 | — |
| 1880/81 | 2 | 21 | — |
| 1881/82 | 3 | 13 | — |
| 1882/83 | — | 23 | — |
| 1883/84 | — | 10 | — |
| 1884/85 | 1 | 6 | 1 ³⁾ |
| 1885/86 | — | 7 | — |
| 1886/87 | — | 7 | — |
| 1887/88 | — | 5 | — |
| 1888/89 | 1 | 21 | — |
| 1889/90 | — | 7 | — |
| 1890/91 | — | 6 | — |
| 1891/92 | 1 | 26 | — |
| 1892/93 | — | 22 | — |
| 1893/94 | — | 11 | — |
| 1894/95 | — | 27 | — |
| 1895/96 | 1 | 14 | — |
| 1896/97 | 1 | 13 | — |
| 1897/98 | — | 17 | — |
| 1898/99 | 1 | 20 | 1 |
| 1899/1900 | — | 20 | — |
| 1900/01 | — | 16 | — |
| 1901/02 | — | 14 | — |
| 1902/03 | — | 7 ^{*)} | — |

Das Ergebnis der bei den neuangestellten Mannschaften vorgenommenen Schutzimpfungen ist in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt.

¹⁾ Außerdem starben 2 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

²⁾ Außerhalb militärärztlicher Behandlung.

³⁾ Eingezogener Reservist, zuletzt 7 Jahre vor Beginn der Erkrankung zweimal ohne Erfolg wiedergeimpft.

^{*)} Außerdem 11 Kadetten, welche bei den Spezialanstalten — Sechste Abteilung II. Teil — zahlenmäßig nachgewiesen werden.

Impfungen in der Armee in der Zeit vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903.

| Armeekorps | Zahl der Geimpften | Die erste Impfung war | | Die zweite und dritte Impfung waren | | Gesamtzahl der erfolgreich Geimpften | | Art der zur Anwendung gekommenen Lympe |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| | | von Erfolg | ohne Erfolg | von Erfolg | ohne Erfolg | absolut | % der Geimpften | |
| Gardekorps | 17 348 | 15 196 | 2 152 | 1 347 | 805 | 16 543 | 95,4 | Pissinsche Tierlymphe. |
| I. Armeekorps | 13 838 | 10 775 | 3 063 | 1 513 | 1 550 | 12 288 | 88,8 | Tierlymphe aus dem Königl. Impfinstitut zu Königsberg i. Pr. |
| II. „ | 11 694 | 10 744 | 950 | 497 | 453 | 11 241 | 96,1 | Tierlymphe aus dem Königl. Impfinstitut zu Stettin. |
| III. „ | 10 031 | 8 766 | 1 265 | 845 | 420 | 9 611 | 95,8 | Pissinsche Tierlymphe. |
| IV. „ | 9 707 | 8 637 | 1 070 | 637 | 433 | 9 274 | 95,5 | Tierlymphe aus den Königl. Impfinstituten zu Bernburg und Halle a. S. |
| V. „ | 11 365 | 10 293 | 1 072 | 520 | 552 | 10 813 | 95,1 | Tierlymphe aus dem Königl. Impfinstitut zu Oppeln. |
| VI. „ | 11 389 | 10 740 | 649 | 361 | 288 | 11 101 | 97,5 | Tierlymphe aus dem Königl. Impfinstitut zu Oppeln. |
| VII. „ | 11 871 | 10 757 | 1 114 | 742 | 372 | 11 499 | 96,9 | Tierlymphe aus den Königl. Impfinstituten zu Cassel und Cöln. |
| VIII. „ | 11 628 | 10 754 | 874 | 556 | 312 | 11 310 | 97,3 | Tierlymphe aus dem Königl. Impfinstitut zu Cöln. |
| IX. „ | 11 097 | 9 663 | 1 428 | 881 | 547 | 10 544 | 95,0 | Tierlymphe aus dem Großherzogl. Impfinstitut zu Schwerin. |
| X. „ | 9 708 | 8 021 | 1 676 | 900 | 773 | 8 921 | 91,9 | Tierlymphe aus dem Königl. Impfinstitut zu Hannover. |
| XI. „ | 9 642 | 8 015 | 1 618 | 917 | 701 | 8 932 | 92,6 | Tierlymphe aus den Königl. Impfinstituten zu Cassel und Weimar. |
| XII.(1.K.S.)Armeekorps | 8 909 | 8 516 | 393 | 268 | 125 | 8 784 | 98,6 | Tierlymphe aus dem Königl. Impfinstitut zu Dresden. |
| XIII.(K.W.) „ | 10 057 | 8 375 | 1 680 | 871 | 808 | 9 246 | 91,9 | Tierlymphe aus der Zentral-Impfanstalt zu Stuttgart. |
| XIV. Armeekorps | 14 184 | 12 705 | 1 479 | 1 020 | 459 | 13 725 | 96,8 | Tierlymphe aus der Landes-Impfanstalt zu Karlsruhe. |
| XV. „ | 13 583 | 11 363 | 2 220 | 1 297 | 903 | 12 660 | 93,2 | Tierlymphe aus der Landes-Impfanstalt zu Straßburg i. E. |
| XVI. „ | 12 240 | 11 393 | 847 | 724 | 123 | 12 117 | 99,0 | Tierlymphe aus der Landes-Impfanstalt zu Metz. |
| XVII. „ | 13 056 | 11 208 | 1 847 | 1 000 | 847 | 12 208 | 93,5 | Tierlymphe aus dem Königl. Impfinstitut zu Königsberg i. Pr. |
| XVIII. „ | 10 794 | 9 026 | 1 768 | 1 001 | 767 | 10 027 | 92,9 | Tierlymphe aus dem Königl. bzw. Großherzogl. Impfinstitut zu Cassel u. Darmstadt. |
| XIX.(2.K.S.)Armeekorps | 9 903 | 9 596 | 307 | 158 | 5 | 9 754 | 98,5 | Tierlymphe aus dem Königl. Impfinstitut zu Dresden. |
| Armee | 232 044 | 204 543 ¹⁾ | 27 472 | 16 055 ²⁾ | 11 243 | 220 598 | 95,1 | |

1) 29 Mann schieden vor der ersten Nachschau aus.

2) 6 Mann schieden vor der zweiten bzw. dritten Nachschau aus.

1 Mann wird wegen erfolgloser Impfung im nächsten Jahre geimpft.

23 Mann wurden nicht wieder geimpft.

144 Mann wurden wegen bestehender Pockengefahr in der Zivilbevölkerung Leipzigs einmal, und zwar ohne Erfolg, geimpft.

Über nachteilige Folgeerscheinungen der Schutzpockenimpfung ist nichts berichtet.

2. Scharlach. (No. 3 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 6 | 333 | 0,63 | 290 | 17 | 23 | 330 | 9 | 39,6 |

Außerdem erkrankten in Bensberg 15, Grofs-Lichterfelde 10, Naumburg a. S. 9, Wahlstatt und Coeslin je 1 = 36 Kadetten an Scharlach, welche nicht hier, sondern bei den Spezialanstalten — Sechste Abteilung, II. Teil — zahlenmäßig nachgewiesen werden.

Demnach sind in Wirklichkeit 18 Mann weniger als im Vorjahre an Scharlach zugegangen.

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | |
|---------------------------|-------|--------------------------------|
| 1881/82 bis 1885/86 . . . | 453,4 | Mann = 1,2 $\frac{0}{100}$ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 . . . | 395,4 | „ = 0,95 „ |
| 1891/92 „ 1895/96 . . . | 433,6 | „ = 0,92 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 . . . | 368,4 | „ = 0,71 „ |
| im Jahre 1901/02 . . . | 387 | „ = 0,72 „ |
| im Jahre 1902/03 . . . | 333 | Mann = 0,63 $\frac{0}{100}$ K. |

Zugang der Scharlachkranken nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|---------|-----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 67 | 1,6 | X. | 25 | 1,1 |
| I. | 13 | 0,41 | XI. | 7 | 0,34 |
| II. | 5 | 0,19 | XII. (1. K. S.) | 37 | 1,9 |
| III. | 13 | 0,55 | XIII. (K. W.) | 11 | 0,49 |
| IV. | 5 | 0,22 | XIV. | 16 | 0,50 |
| V. | 11 | 0,43 | XV. | 13 | 0,42 |
| VI. | 7 | 0,27 | XVI. | 18 | 0,66 |
| VII. | 23 | 0,85 | XVII. | 20 | 0,68 |
| VIII. | 18 | 0,67 | XVIII. | 8 | 0,30 |
| IX. | 11 | 0,44 | XIX. (2. K. S.) | 5 | 0,24 |

Zugang der Scharlachkranken nach Monaten.

| | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. Zahl | 21 | 29 | 40 | 42 | 48 | 31 | 36 | 41 | 22 | 6 | 10 | 7 |
| ‰ K. | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |

Scharlachepidemien kleineren Umfanges wurden in Metz-Montigny (12), in der Hauptkadettenanstalt (10), in den Kadettenhäusern Bensberg (15), Naumburg (9) und in Freiburg i. Baden (10) beobachtet.

Der Verlauf war — abgesehen von Bensberg — im allgemeinen leichter Art. In Grofs-Lichterfelde und Naumburg a. S. war die Erkrankung mit größter Wahrscheinlichkeit durch beurlaubte Kadetten eingeschleppt worden.

In Metz-Montigny erkrankten vom Pflegepersonal 2 Sanitätssoldaten und 1 Militärkrankenwärter.

Bei den sonst noch berichteten 127 Erkrankungen liefs sich nur 2mal (Ulm) die Ansteckungsquelle ermitteln, und zwar brachte ein Mann die Krankheit aus seinem von Scharlach befallenen Heimatsdorf mit, und 1 Militärkrankenwärter wurde bei der Pflege eines Scharlachkranken angesteckt.

Sogenannte verkappte Erkrankungen an Scharlach, bei denen die Hautrötung nur wenige Stunden bestand, wurden in Grofs-Lichterfelde von O.-St.-A. Brecht beobachtet. — Bei einer Anzahl Erkrankungen in Dresden (O.-St.-A. Smitt) konnte die Diagnose Scharlach erst auf Grund der später aufgetretenen Abschuppung und Nierenerkrankung gestellt werden. Eine Scharlacherkrankung mit völlig ausgesprochenen Symptomen, aber ohne Fieber, beobachtete St.-A. Neuburger-Berlin.

Scharlach-Diphtherie wurde unter 186 Erkrankungen 15 mal beobachtet.

Bei 6 Kranken (Dresden) wurden Diphtheriestäbchen nachgewiesen.

Bei 3 Kranken in Berlin (St.-A. Neuburger) konnten in den Belägen, die einmal auch in der Nase gefunden wurden, keine Bazillen nachgewiesen werden.

Eine Scharlach-Diphtherieerkrankung in Berlin verlief schnell tödlich; bei zwei anderen wurden ebendort je 2 mal Heilserumspritzungen gemacht, wonach bei beiden Kranken Abstofung der Beläge erfolgte, doch starb der eine der beiden Leute an Herzschwäche.

In Jüterbog setzte bei einem Scharlachkranken am 5. Krankheitstage eine Gesichtrose ein, die nach 5 Tagen mit kritischem Fieberabfall in Heilung überging.

Von anderen Begleit- oder Nachkrankheiten wurden unter 186 Scharlacherkrankungen: Mittelohrkatarrhe 6 mal, Nierenentzündungen — ausschliesslich geringgradiges Eiweißharnen — 5 mal, Bauchfellreizung 1 mal, Brustfellentzündung mit Lungenspitzenverdichtung 1 mal, Herzbeutelentzündung 1 mal, Gelenkerkrankungen 9 mal, akuter Gelenkrheumatismus 1 mal, Gelbsucht 1 mal beobachtet. Ausgesprochene Scharlachfrieseln traten 4 mal auf, einmal Bläschenausschlag an der Lippe und Augenbindehautentzündung.

O.-St.-A. Smitt-Dresden berichtet über eine vorübergehende Stimmbandlähmung und eine kurze Zeit anhaltende Lähmung eines Armes nach Scharlach. — Bei einem Mann in Metz-Montigny führte eine zum Scharlach hinzutretende septische Entzündung des Brustfells, Herzbeutels und der Gehirnhäute zum Tode. — In Neisse starb ein Festungsgefangener 20 Stunden nach der Lazarettaufnahme, er hatte neben Scharlachausschlag eine brandige Entzündung der Mandeln und der Schleimhaut des Nasenrachenraumes. — 2 Leute (Potsdam, Metz-Montigny) wurden wegen Herzklappenfehlers nach Scharlach invalide. Vorübergehendes Auftreten von Geräuschen am Herzen wird öfter erwähnt. — Über eine tödlich verlaufene septische Erkrankung bei einem Kadetten, die von einer Mittelohreiterung bei Scharlach ausging, berichtet St.-A. Stuckert-Bensberg.

Ebenfalls bei einem Kadetten in Bensberg machte eine am 21. Krankheitstage von leicht verlaufenem Scharlach auftretende Nierenentzündung sehr stürmische Erscheinungen:

Es trat plötzlich absolute Harnverhaltung mit allgemeiner Wassersucht, Erbrechen, Krämpfen, lautem systolischen Blasen

am Herzen, Blutungen in die Augenbindehäute und Benommenheit ein. Durch warme Bäder und Schwitzen, Eingießungen von Kochsalzlösungen und innerliche Darreichung von Natrium jodatatum mit Natrium chloratum wurde bald Besserung und nach 8 Tagen Heilung erzielt. (St.-A. Stuckert.)

Eine ähnliche während der Genesung mit ungewöhnlichem Hautausschlag auftretende Erkrankung, die mit dem Tode endete, wurde von O.-St.A. Mankiewitz beobachtet:

Nachdem sich bei dem Grenadier W. in Danzig während der Genesung am 13. Behandlungstage ein Mandelabszess unter hohem Fieber entwickelt hatte, der nach 5 Tagen gespalten war, stellte sich Eiweißharnen und einige Tage später völliges Aufhören der Urinabsonderung ein. Gleichzeitig traten Erbrechen und hellrote, etwas über die Haut erhabene, hirsekorn- bis markstückgroße Flecken am Rumpf und an den Gliedmaßen auf. Unter uraemischen Erscheinungen erfolgte 4 Wochen später der Tod. Die Sektion wurde von den Angehörigen nicht gestattet.

Bei einem Kranken in Konstanz sah St.-A. Wiedemann während der Genesung nach Scharlach plötzlich hysterische Erscheinungen auftreten.

Der Mann hatte in seiner Kindheit angeblich „Hirnentzündung“ überstanden und soll im Jahre 1899 einen epileptischen Anfall gehabt haben. Nach Aussage seiner Mutter war er stets jähzornig und trunksüchtig. Schon nach Ablauf der schweren Scharlacherscheinungen war Schwerbesinnlichkeit und eine gesteigerte nervöse Reizbarkeit bemerkbar. Am 37. Krankheitsstage, als der Kranke lange außer Bett war, wurde er plötzlich während einer Unterhaltung mit Stubenkameraden scheinbar bewußtlos. Auf geringe Reize traten Zuckungen des Körpers mit zeitweisem Überstrecken des Rückens auf. Später war der Kranke eigentümlich erregt und während des Schlafes bestand ein fast unausgesetztes Zucken der Augenlider und der Gesichtsmuskeln. — Trotz zeitweiser Besserung mußte der Mann, da sich die Anfälle noch 2 mal wiederholten, als dienstunbrauchbar entlassen werden.

Die Behandlung des Scharlach war durchgehends eine symptomatische. O.-St.A. Brecht-Groß-Lichterfelde empfiehlt sehr das Acidum acetylosalicylicum (Aspirin), da es ohne zu schaden eine auffallende Besserung des subjektiven Befindens hervorruft.

3. Masern (Röteln). (No. 4 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich | |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--|-------|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | | | Summe |
| 3 | 517 | 0,93 | 511 | — | 3 | 514 | 6 | 18,7 |

Außerdem erkrankten in Potsdam 1, Coeslin 27, Bensberg 21, Oranienstein 10, Naumburg a. S. 5 und Dresden 13 Kadetten, sowie in Annaburg 1 und Neubreisach 2 Unteroffizier-Vorschüler an Masern, welche bei den Spezialanstalten — siehe sechste Abteilung, II. Teil — verrechnet sind.

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | | | |
|---------------------------|-------|------|--------|------|
| 1881/82 bis 1885/86 . . . | 392,4 | Mann | = 1,4 | ‰ K. |
| 1886/87 „ 1890/91 . . . | 438,6 | „ | = 1,5 | „ |
| 1891/92 „ 1895/96 . . . | 391,6 | „ | = 0,83 | „ |
| 1896/97 „ 1900/01 . . . | 526,2 | „ | = 1,0 | „ |
| im Jahre 1901/02 . . . | 557 | „ | = 1,0 | „ |
| im Jahre 1902/03 . . . | 517 | „ | = 0,98 | ‰ K. |

Die Erkrankungen verteilen sich auf die einzelnen Armeekorps (nach der Höhe geordnet) in folgender Weise:

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|----------------|------------------|---------|---------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| IX. | 123 | 4,9 | VIII. | 23 | 0,86 |
| XII. (1.K.S.) | 36 | 1,8 | XIX. (2.K.S.) | 17 | 0,83 |
| V. | 43 | 1,7 | XVII. | 23 | 0,78 |
| XI. | 26 | 1,3 | VII. | 13 | 0,48 |
| XVIII. | 31 | 1,2 | IV. | 10 | 0,45 |
| III. | 24 | 1,0 | XV. | 14 | 0,45 |
| II. | 25 | 0,97 | XIII. (K. W.) | 9 | 0,41 |
| I. | 30 | 0,95 | XVI. | 9 | 0,33 |
| VI. | 24 | 0,93 | G. | 10 | 0,24 |
| X. | 20 | 0,91 | XIV. | 7 | 0,22 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 13 | 25 | 46 | 74 | 108 | 100 | 46 | 33 | 31 | 17 | 14 | 10 |
| ‰ K. | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |

Im Berichtsjahr sind 2 Masernepidemien in Kadettenhäusern beobachtet. (Bensberg mit 17, Coeslin mit 27 Erkrankungen.)

In Bensberg kamen außer den 17 ausgesprochenen Masernerkrankungen 48 atypisch verlaufende Erkrankungen vor: 7 Kadetten hatten 1—2 Tage lang nur Ausschlag und fleckige Rötung der Rachen-, Mund- und Nasenschleimhaut mit Schwellung der Halsdrüsen; 41 Kadetten hatten kein Fieber, aber Lichtscheu und fleckige Entzündung der Augenbindehäute, an denen sich 1 mal kleine Blutergüsse in die Bindehaut zeigten. — 5 mal wurde auch eine Anschwellung der Halsdrüsen beobachtet.

Einmal stellte St.-A. Stuckert während dieser Epidemie einen 3 Tage nach der Entfieberung auftretenden Rückfall fest.

Die Einschleppung der Krankheit erfolgte in Bensberg durch ein schulpflichtiges Aufwärterkind, in Coeslin durch einen vom Weihnachtsurlaub zurückkehrenden Kadetten.

Bei den vereinzelt aufgetretenen Masernerkrankungen liefs sich mehrmals der Umgang mit kranken Zivilpersonen als Quelle der Ansteckung ermitteln.

Erwähnt sei, dafs in Rastatt ein Fahnenjunker von Masern befallen wurde, der mit einem Masernkranke behandelnden Arzt verkehrte. — Die Koplickschen Flecken wurden bei 8 Kranken in Berlin nur 1 mal, bei 4 Kranken in Magdeburg keinmal gefunden. — Ein durch den Tod seiner Mutter sehr erregter Kranker zeigte starke Benommenheit und nach der Entfieberung lange anhaltende Schwerbesinnlichkeit. (St.-A. Plathner-Annaburg.) — Bei 7 leichten Erkrankungen in Lübeck traten schmerzlose Halsdrüenschwellungen auf. — Bei 6 Kranken in Diedenhofen hatte der Ausschlag Quaddeln-

form. — Mittelohreiterungen und Nierenentzündungen werden aus Coeslin und Bensburg berichtet. — Eine sich anschließende Lungenentzündung hatte in Magdeburg einen günstigen Verlauf, während 1 Mann in Breslau daran starb; in Darmstadt trat 1 mal unmittelbar nach der Masernerkrankung Tuberkulose auf.

Unter 110 Erkrankten, über die berichtet ist, hatten 8 bereits Masern in der Kindheit überstanden.

Die Behandlung bot nichts Neues.

4. Epidemische Ohrspeicheldrüsenentzündung. (No. 5 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 2 | 346 | 0,66 | 347 | — | — | 347 | 1 | 14,5 |

Außerdem erkrankten noch 12 Kadetten und 6 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 21 | 0,51 | X. | 15 | 0,68 |
| I. | 25 | 0,79 | XI. | 7 | 0,34 |
| II. | 52 | 2,0 | XII. (1.K.S.) | 31 | 1,6 |
| III. | 14 | 0,60 | XIII. (K. W.) | 18 | 0,81 |
| IV. | 11 | 0,49 | XIV. | 21 | 0,66 |
| V. | 2 | 0,08 | XV. | 31 | 0,99 |
| VI. | 9 | 0,35 | XVI. | 3 | 0,11 |
| VII. | 3 | 0,11 | XVII. | 13 | 0,44 |
| VIII. | 24 | 0,89 | XVIII. | 7 | 0,27 |
| IX. | 29 | 1,2 | XIX. (2.K.S.) | 10 | 0,49 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 12 | 24 | 30 | 55 | 68 | 45 | 27 | 32 | 25 | 15 | 9 | 4 |
| ‰ K. | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |

Epidemisch, aber in geringem Umfange, trat die Ohrspeicheldrüsenentzündung in Königsberg i. Pr. (15) und in Stargard i. Pomm. (26) auf.

Für direkte Übertragung der Krankheit von Person zu Person sprechen Beobachtungen des St.-A. Helm-Stargard i. Pomm.:

Dort dauerte die Epidemie etwa 4 Monate. Alle 3 Bataillone der Garnison waren ziemlich gleichmäßig beteiligt. Der zuerst Erkrankte war ein neueingestellter Mann, in dessen Familie bei seiner Abreise Mumps herrschte. Es erschien mehrmals sehr wahrscheinlich, daß die aus dem Lazarett als geheilt Entlassenen die Krankheit weiter verbreiteten.

Die Entwicklungszeit der Krankheit dauerte in einem sehr klaren Fall von Übertragung auf einen Stubenkameraden 8 Tage.

Von 10 Berichterstatlern sind bei 57 Mumpskranken 13 mal Hodenentzündungen beobachtet worden.

In Flensburg erkrankte ein Mann, während 6 seiner Stubenkameraden von Mumps befallen wurden, nur an Hodenentzündung, ohne daß Tripper oder eine andere Ursache aufzufinden war. (St.-A. Lipkau.) — Bei einem an doppelseitigem Mumps mit linkseitiger Hodenentzündung erkrankten Mann in Gotha schwoll am 10. Tage der andere Hoden unter gleichzeitigem Auftreten einer scharlachartigen Rötung des Rumpfes. — 1 mal mußte die vereiterte Ohrspeicheldrüse eingeschnitten werden (Berlin). — Beide Zungenspeicheldrüsen waren bei einem Mann in Berlin miterkrankt. — 1 mal trat nach einer fieberlos verlaufenen Mumpserkrankung eine fieberhafte, wässrige Brustfellentzündung auf, die zur Invalidität führte. Der Erguß war steril wenigstens für Mäuse nicht krankheitserregend. (St.-A. Voigtel-Berlin.)

5. Diphtherie (Krupp). (Nr. 6 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 7 | 192 | 0,36 | 176 | 3 | 13 | 192 | 7 | 24,9 |

Außerdem erkrankte noch 1 Kadett und 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)



Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------|
| 1881/82 bis 1885/86 | 457,4 Mann | = 1,2 ‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 | 381,8 „ | = 0,92 „ „ |
| 1891/92 „ 1895/96 | 439,0 „ | = 0,93 „ „ |
| 1896/97 „ 1900/01 | 264,6 „ | = 0,51 „ „ |
| im Jahre 1901/02 | 238 „ | = 0,44 „ „ |
| „ „ 1902/03 | 192 „ | = 0,36 „ „ |

Der Anteil der einzelnen Armeekorps an den Diphtherieerkrankungen ist für die letzten 22 Jahre in der nachstehenden Übersicht und graphisch in den Karten I—VI wiedergegeben.

Zugang an Diphtherie bei den einzelnen Armeekorps in ‰ K.

- Für den 5-jährigen Zeitraum von 1881/82 bis 1885/86,
- „ „ „ „ „ 1886/87 „ 1890/91,
- „ „ „ „ „ 1891/92 „ 1895/96,
- „ „ „ „ „ 1896/97 „ 1900/01,
- „ das Berichtsjahr 1901/02,
- „ „ „ 1902/03.



Stadt-
Fischeret
Fishing

| Garde- korps | A r m e e k o r p s | | | | | | | | | | | | | | | | | | Armee | | | | | |
|-----------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|--------------------|-------------------|------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|---------|
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. (I. K. S.) | XIII. (K. W.) | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | XVIII. | XIX. (2. K. S.) | I. | II. | III. | | |
| a | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,98 | 1,6 | 1,1 | 0,50 | 1,1 | 0,65 | 2,5 | 3,1 | 0,73 | 1,1 ¹⁾ | 0,86 | 0,57 | 0,94 | — | — | — | — | 1,2 | 1,3 | 1,2 | — |
| b | 1,1 | 0,53 | 1,0 | 0,60 | 1,3 | 1,2 | 0,43 | 0,52 | 0,41 | 2,5 | 2,2 | 0,89 | 0,59 | 0,88 | 0,49 | 0,80 | 0,34 ²⁾ | 0,23 ²⁾ | — | — | 0,92 | 0,71 | 1,8 | — |
| c | 0,94 | 0,34 | 0,64 | 0,27 | 0,78 | 0,61 | 0,28 | 1,2 | 0,39 | 2,0 | 5,2 | 0,62 | 0,40 | 1,1 | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0,29 | — | — | 0,93 | 0,66 | 0,47 | — 4) |
| d | 0,52 | 0,22 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,42 | 0,16 | 0,31 | 0,29 | 1,3 | 2,1 | 0,32 | 0,69 | 0,47 | 0,33 | 0,44 | 0,52 | 0,39 | 0,17 ³⁾ | 0,45 ³⁾ | 0,51 | 0,29 | 0,20 | 0,11 |
| e | 0,47 | 0,44 | 0,49 | 0,08 | 0,31 | 0,11 | 0,11 | 0,36 | 0,29 | 0,55 | 3,5 | 0,23 | 0,63 | 0,49 | 0,19 | 0,25 | 0,18 | 0,40 | 0,11 | 0,10 | 0,44 | 0,25 | 0,14 | 0,05 |
| f | 0,77 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 0,22 | 0,08 | 0,23 | 0,19 | 0,26 | 0,64 | 1,4 | 0,43 | 0,80 | 0,05 | 0,19 | 0,26 | 0,11 | 0,03 | 0,40 | 0,15 | 0,36 | 0,09 | 0,05 | 0,32 |

Diphtherie-Krankenzugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|--------------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| abs. Zahl | 13 | 14 | 21 | 19 | 24 | 25 | 14 | 23 | 10 | 13 | 5 | 11 |
| $\frac{0}{100}$ K. | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |

Epidemien sind in diesem Jahre nicht berichtet. Die Erkrankungen waren meist leicht.

Die Art der Übertragung konnte nicht immer nachgewiesen werden.

Bei der Pflege von Diphtheriekranken steckte sich ein Militärkrankenwärter in Weilsenfels an.—Im Lazarett Hildesheim erkrankte 1 Mann, der neben einem seit mehr als 2 Wochen von Diphtherie Genesenen gelegen hatte, bei welchem keine Diphtheriebazillen mehr gefunden wurden.—1 einjährig-freiwilliger Militär Apotheker in Leipzig erkrankte 2 Tage nach einer Hilfeleistung bei einem Luftröhrenschnitt an einem diphtheriekranken Kinde.—In Darmstadt brachten 2 Kranke die Diphtherie wahrscheinlich aus dem Manöver mit.—Bei einem Militärgefangenen in Neisse, welcher nach 3 monatiger Einzelhaft erkrankte, konnte der Weg für die Infektion nicht aufgeklärt werden.

Kehlkopfdiphtherie ist selten, Nasendiphtherie nur 1 mal erwähnt.

Völlig fieberlosen Verlauf der Diphtherie beobachtete St.-A. Voigtel-Berlin 4 mal und O.-A. Hellmer-Belgard 1 mal.

Bei letzterem Kranken, der Beläge im Rachen und Kehlkopf, starke Anschwellung der Halsdrüsen und Atemnot zeigte, trat am 5. Krankheitstage, $1\frac{1}{2}$ Tage nach Einspritzung von 3 ccm Heilserum (Behring Nr. III D.), auffallende Herzschwäche und Pulsverlangsamung bis auf 44—48 Schläge auf, die durch Spiritus aethereus und Digitalis beseitigt wurde. Trotz eines

zweiten Anfalls von Herzschwäche beim ersten Aufstehen wurde der Mann wieder dienstfähig.

Folgende Nach- und Begleitkrankheiten sind bei 165 näher berichteten Fällen beobachtet:

Von 2 Nierenentzündungen wurde eine (Berlin) geheilt, die andere, welche in Cassel bei einem Kranken auftrat, der am 60. Tage noch Bazillen hatte, wurde chronisch und führte zur Invalidität.—Wegen Entzündung der Herzinnenhaut mit Verstopfung der Schenkelschlagader wurde 1 Mann in Metz-Montigny Invalide.—Gelenkrheumatismus nach Diphtherie kam 1 mal in Neustettin vor; die Dienstfähigkeit blieb erhalten, Lähmungen wurden 13 mal beobachtet: 10 mal war das Gaumensegel betroffen, 2 Lähmungen (Oldenburg), die einer längeren Behandlung bedurften, sind unter Nr. 43 des Rapportmusters beschrieben.—In Demmin bekam 1 Diphtheriekranker am 3. Tage eine vorübergehende Lähmung des Schlundes. Einen Monat später trat die Lähmung nochmals für kurze Zeit auf und nach dem nächsten Monat wurde der Mann von so starkem Kriebeln in den Fingern und Zehen befallen, daß die Aufnahme ins Lazarett nötig war; 1 mal (Berlin) trat die Gaumensegellähmung erst am 49. Krankheitstage auf.—Vorübergehendes Eiweißharnen wurde 21 mal beobachtet.—Hautausschläge sind 7 mal, Bläschenauschlag am Munde und an der Nase 3 mal erwähnt.

Mit Heilserum wurden 129 frisch Erkrankte und 1 Rückfälliger behandelt; 2 Diphtheriekranken sind gestorben. Sie gehören zu den mit Serum Behandelten.

Bei einem von ihnen (Potsdam) konnte das Serum nicht spezifisch wirken, weil es sich um eine sogenannte Scharlachdiphtherie handelte, bei der keine Diphtheriebazillen gefunden wurden. Der Tod erfolgte unter den Erscheinungen allgemeiner Blutvergiftung.—Bei dem andern Verstorbenen (Schweidnitz) war das Serum erst eingespritzt, als die Atmung trotz Luftröhrenschnittes schon sehr erschwert war. Er starb einige Stunden nach der Verabfolgung des Serums.

Von den mit Serum Behandelten wurden 11 Erkrankungen als schwer, 43 als mittelschwer und 75 als leicht bezeichnet.—Nachteilige Folgen des Serums sind nicht beobachtet.

Die Sterblichkeit an Diphtherie hat im Berichtsjahre 1902/03 um 1,3 % abgenommen.

Es starben:

1) 4jähriger Zeitraum 1882/83 bis 1885/86.

2) Nur Berichtsjahr 1890/91.

3) 3jähriger Zeitraum 1898/99 bis 1900/01.

4) 2jähriger Zeitraum 1899/1900 und 1900/01.

| | | | |
|-----------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1890/91 | von 297 Behandelten | 14 Mann | = 4,7 ‰ |
| 1891/92 | " 302 | " 13 | " = 4,3 " |
| 1892/93 | " 341 | " 21 | " = 6,1 " |
| 1893/94 | " 452 | " 26 | " = 5,8 " |
| 1894/96 | " 1311 | " 38 | " = 2,9 " |
| 1896/97 | " 295 | " 8 | " = 2,7 " |
| 1897/98 | " 265 | " 6 | " = 2,3 " |
| 1898/99 | " 221 | " 7 | " = 3,2 " |
| 1899/1900 | " 265 | " 9 | " = 3,4 " |
| 1900/01 | " 316 | " 6 ¹⁾ | " = 1,9 " |
| 1901/02 | " 253 | " 7 | " = 2,8 " |
| 1902/03 | " 199 | " 3 | " = 1,5 " |

Bei 108 von den 129 spezifisch Behandelten wurde der Nachweis der Löfflerschen Stäbchen geliefert. Bei den übrigen Kranken erfolgte die Behandlung auf Grund der klinischen Erscheinungen.

45 mal ist die Einspritzung am 1., 46 mal am 2. und 17 mal am 3. Tage gemacht. Nach dem 3. Tage wurden 21 Kranke mit Serum behandelt.

Über die Mengen des verbrauchten Serums geben die beiden folgenden Tabellen Auskunft:

1. Menge des bei jeder Einspritzung zur Anwendung gekommenen Heilserums (Antitoxineinheiten).

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 500 Antitoxineinheiten bei | 1 Einspritzung |
| 600 " " | 2 Einspritzungen |
| 900 " " | 1 Einspritzung |
| 1000 " " | 62 Einspritzungen |
| 1500 " " | 54 " |
| 1600 " " | 2 " |
| 2000 " " | 17 " |
| 3000 " " | 1 Einspritzung |

2. Gesamtmenge des bei jedem Krankheitsfalle zur Anwendung gekommenen Heilserums.

| | |
|----------------------------|-----------|
| 500 Antitoxineinheiten bei | 1 Kranken |
| 600 " " | " 1 " |
| 1000 " " | " 56 " |
| 1500 " " | " 41 " |
| 1600 " " | " 2 " |
| 2000 " " | " 16 " |
| 3000 " " | " 6 " |
| 4000 " " | " 3 " |

Über das Verschwinden des diphtherischen Belages sowie der Diphtheriebazillen bei der Serumbehandlung ist folgendes zu berichten:

3. Der diphtherische Belag war verschwunden:

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| am | 1. Tage nach der Einspritzung bei | 7 Kranken |
| " | 2. " " " " " | 21 " |
| " | 3. " " " " " | 23 " |
| " | 4. und 5. " " " " " | je 18 " |
| " | 6. bis 10. " " " " " | 24 " |
| " | 11. " 15. " " " " " | 11 " |
| am 17., 18., 19., 20. u. 30. | " " " " " " | je 1 " |
| bis zum Tode am 2. Tage nicht geschwunden | | 1 mal |
| nicht angegeben | | 1 " |

¹⁾ Außerdem ist noch 1 Kranker nach Diphtherie gestorben, der zahlenmäßig unter No. 3 (Scharlach) verrechnet ist.

4. Diphtheriebazillen wurden zum letzten Male nachgewiesen:

| | |
|---------------------------------|------------|
| am 1. bis 5. Krankheitstage bei | 32 Kranken |
| " 6. " 10. " " | 13 " |
| " 11. " 15. " " | 11 " |
| " 16. " 20. " " | 14 " |
| " 21. " 25. " " | 3 " |
| " 26. " 30. " " | 5 " |
| am 34., 40., 41. u. 60. " " | je 1 " |

nach Abstofung des Belages keine Diphtheriebazillen gefunden 9 mal.

Immunisierungen mit Heilserum sind 24 mal vorgenommen. Es kamen dabei zur Verwendung:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| je 200 Antitoxineinheiten bei | 20 Personen |
| " 1000 " " | 3 " |
| " 1500 " " | 1 Person |

1 mal trat nach einer Einspritzung von 1000 Antitoxineinheiten ein Hautausschlag auf.

6. *Rose.* (No. 7 des Rapportmusters).

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|--------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst-fähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 10 | 619 | 1,2 | 570 | 5 | 33 | 608 | 21 | 24,8 |

Außerdem erkrankten noch 2 Mann der Schloßgardes-Kompagnie, 1 Kadett und 5 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 1881/82 bis 1885/86 . . . | 961,4 Mann | = 2,5 ‰ K., |
| 1886/87 " 1890/91 . . . | 843,8 " | = 2,0 " |
| 1891/92 " 1895/96 . . . | 882,0 " | = 1,9 " |
| 1896/97 " 1900/01 . . . | 562,6 " | = 1,1 " |
| im Jahre 1901/02 . . . | 625 " | = 1,2 " |

im Jahre 1902/03 . . . 619 Mann = 1,2 ‰ K.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|----------------|---------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 55 | 1,3 | X. | 18 | 0,82 |
| I. | 36 | 1,1 | XI. | 15 | 0,72 |
| II. | 32 | 1,2 | XII. (I.K.S.) | 27 | 1,4 |
| III. | 9 | 0,38 | XIII. (K. W.) | 39 | 1,8 |
| IV. | 20 | 0,89 | XIV. | 33 | 1,0 |
| V. | 32 | 1,2 | XV. | 28 | 0,90 |
| VI. | 18 | 0,70 | XVI. | 35 | 1,3 |
| VII. | 39 | 1,4 | XVII. | 42 | 1,4 |
| VIII. | 24 | 0,89 | XVIII. | 48 | 1,8 |
| IX. | 31 | 1,2 | XIX. (2.K.S.) | 38 | 1,8 |

In diesem Berichtsjahre hatten das XIII. (K.W.), XVIII. und XIX. (2. K. S.) Armeekorps den höchsten Zugang aufzuweisen.

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| abs. Zahl | 38 | 61 | 67 | 62 | 58 | 86 | 67 | 58 | 43 | 33 | 21 | 25 |
| ‰ K. | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |

Die Dauer der Behandlung betrug im Durchschnitt der Jahre 1881/82 bis 1885/86 18,7 Tage, „ „ „ „ 1886/87 „ 1890/91 20,3 „ „ „ „ 1891/92 „ 1895/96 21,8 „ „ „ „ 1896/97 „ 1900/01 22,0 „ „ Berichtsjahre 1901/02 25,0 „ im Berichtsjahre 1902/03 24,8 Tage.

Epidemien von Rose sind im Berichtsjahr nicht vorgekommen.

St.-A. Bihler-Heilbronn nimmt an, daß 3 gleichzeitig mit Wundrose an den Füßen in Zugang gekommene Leute, bei denen Wundlaufgeschwüre in einem Zimmer verbunden waren, dessen Fußboden ausgebessert wurde, durch den Schuttbodenstaub angesteckt sind. 3 mal wird eine Ansteckung im Lazarett angenommen (Darmstadt, Diedenhofen, Leipzig).

Bei 147 Kranken, bei denen der Sitz der Erkrankung näher angegeben ist, war 136 mal das Gesicht oder die behaarte Kopfhaut, 11 mal die Gliedmaßen bzw. der Rumpf befallen.

Als Eintrittspforte der Ansteckung wird meistens die Nasenschleimhaut angegeben. Dem Ausbruch der Gesichtrose gingen zuweilen Schnupfen oder leichte Halsentzündungen voraus. Mehrfach nahm die Erkrankung ihren Ausgang von Furunkeln, 1 mal von einer Lidrandentzündung, 2 mal von Operationswunden bei Eiterbrust. 1 mal von einem akuten Mittelohrkatarrh, 2 mal von Quetschwunden infolge Hufschlag, 3 mal von Frostwunden an den Ohrmuscheln; 1 mal trat sie nach der Entfernung eines Zahnes und 1 mal nach einem Insektenstich an der Wange auf. — 17 von 199 Kranken hatten schon früher Rose gehabt. Von Rückfällen wird mehrfach berichtet; 1 Kranker hatte deren 5 (Ulm), einer 6 (Mainz). Ein Kanonier in Berlin war vom November 1902 bis Mai 1903 4 mal von Rose befallen, die dann im Juli 1903 nochmals auftrat und während der Lazarettbehandlung mehrfach rückfällig wurde.

Über das Auftreten von Delirien, starker Pulsverlangsamung (bis 48) und Pulsunregelmäßigkeit nach lytischem Fieberabfall berichtet St.-A. Merzdorf-Leipzig. — Eine vorübergehende Abduzenslähmung trat bei einem Mann auf, der kritisiert hatte, nachdem das Leben bei einer Temperatur von 40,2 und zeitweise aussetzender Atmungs- und Herztätigkeit äußerst bedroht erschienen war (Meiningen).

Während der Genesung trat bei einem sehr geschwächten Manne in Rastatt Körperzittern, Stottern und Gedächtnisschwäche auf. Ein Rose-Rekonvaleszent in Kamenz litt an so starken Gliederschmerzen, daß die Bewegung gehindert wurde. Außerdem bestanden Empfindungsstörungen der Haut und Muskelsteifigkeit.

Brand der Haut wurde 2 mal beobachtet. 1 mal (Mülhausen i. E.) wurde ein handflächegroßes Stück am Unterschenkel, 1 mal die Haut an der ganzen Innenfläche eines Oberarmes brandig. Der Mann wurde dienstunbrauchbar. (St.-A. Brandt-Berlin.)

Über Vereiterung der Halsdrüsen ist 1 mal (Mörchingen), über Abszessbildungen 3 mal (Metz-Stadt, Berlin II, Oppeln) berichtet. 1 mal (Münster) wurde infolge tiefgehender Zellgewebsentzündung zwischen dem zwei- und dreiköpfigen Oberarmmuskel ein 10,0 cm langes und 3,0 cm breites Stück der Muskelbindehaut abgestoßen. 1 mal (Danzig) wurde während der Roseerkrankung Gelbsucht, 1 mal (Berlin) Lungenentzündung beobachtet, welche kritisierte, ohne daß die entzündlichen Erscheinungen der Rose verschwanden.

Akuter Mittelohrkatarrh wurde 1 mal (Ulm), Blasenbildung auf der Haut, starke Abschuppung sowie Haar ausfall mehrfach beobachtet.

Todesfälle durch Beteiligung des Gehirns sind aus Berlin und Weissenburg berichtet.

Zum Tode führte ferner eine Wanderrose infolge Entkräftung durch andauerndes Fieber (Heilbronn) und eine Rose am Rücken, welche eine tiefgehende Entzündung des Gewebes herbeiführte (Karlsruhe).

Bei der Behandlung der Rose sind wiederum zahlreiche Arzneimittel verwendet:

Umschläge mit Spiritus und Sublimatalkohol, Argentum colloidal als Einspritzung in die Blutadern, Credé'sche Salbe, Reumasan u. a. wurden benutzt, ohne daß eine spezifische Wirkung erreicht wurde. Mit Ichthyol hatte St.-A. Keyl-Berlin bei 18 von 19 Erkrankungen gute Erfolge, während St.-A. Neuhaus-Magdeburg bei 8 Erkrankungen keine auffallend günstige Wirkung sah.

7. *Karbunkel (Milzbrand) und Rotz.* (No. 8 und 9 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| — | 6 | 0,01 | 5 | 1 | — | 6 | — | 28,3 |

Der Verlauf eines näher beschriebenen Karbunkels bot nichts Erwähnenswertes. Milzbrand und Rotz kamen nicht vor.

8. *Wund-Infektionskrankheiten.* (No. 10 und 11 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 2 | 50 | 0,09 | 3 | 29 | 15 | 47 | 5 | 49,6 |

Als Ausgangspunkt für die Entstehung der Blutvergiftung bzw. Septikämie oder Pyämie wird bei den 37 berichteten Erkrankungen 5 mal Furunkel angegeben.

Nach der Heilung von Furunkeln an Hand und Unterarm sah St.-A. Sydow-Hannover Schwellung in der Achselhöhle und einen Abszefs in der Augenhöhle auftreten (Invalide). — In Tübingen bildete sich bei einem Mann nach Furunkulose eine paranephritische Eiterung (dienstfähig). — St.-A. Grüder-Berlin beobachtete bei einem mit starker Zellgewebsentzündung an Hals und Brust einhergehenden Furunkel Vereiterung des linken Fufs- und rechten Kniegelenks mit Gelbsucht und schweren Allgemeinerscheinungen. Im Blut wurden Streptokokken nachgewiesen. Durch Absetzen des linken Unterschenkels und Eröffnung des rechten Kniegelenks wurde Heilung erzielt.

10 mal war die Blutvergiftung Folge verschiedener anderer Entzündungen und Eiterungen:

2 mal (Berlin, Wiesbaden) ging sie von Zellgewebsentzündungen aus, je 1 mal führte ein Panaritium (Darmstadt), ein Geschwür der Oberlippe (Berlin), eine verjauchte Eiterblase am Daumen (Salzwedel), ein vereiterter Blutergufs am Oberschenkel (Bernburg), ein Abszefs am Deltamuskel (Metz-Stadt) und weicher Schanker und Bubo (Altona) zur Allgemeinerkrankung an Blutvergiftung.

In Dresden trat nach Ablauf einer Mittelohreiterung Herzinnenhautentzündung mit tödlicher Allgemeininfektion auf.

Kariöse Zähne verursachten bei einem Manne in Posen Knochenmarkvereiterung des Unterkiefers und tödlich endende Sepsis. (O.-St.-A. Schmolling.)

Kleinere Wunden und Verletzungen wurden 9 mal als Eingangspforten für die Infektion nachgewiesen:

So schlofs sie sich an einen Nadelstich (Metz-Montigny) und an eine Schnittwunde am Daumen (Magdeburg) an. — 16 mal ging sie von Hautabschürfungen (Minden, Leisnig, Hannover) bzw. Wundlaufen (Berlin, Magdeburg, Gmünd) aus:

Bei einem Pionier in Minden trat nach Hautabschürfung am Knie Vereiterung des Kniegelenks, der Oberschenkelmuskulatur und kurz vor dem Tode Taubheit und Erblindung ein. Erwähnenswert ist bei diesem Falle, dafs sich nach Jodoformgazetamponade in der Nacht Delirien und Temperaturabfall bis $36,6^{\circ}$ einstellten. Nach Entfernung der Jodoformgaze am nächsten Nachmittage stieg das Fieber am darauffolgenden Tage wieder an und das Bewusstsein wurde wieder völlig frei. (St.-A. Müller.)

1 mal schien die Ansteckung von einem eröffneten und mit Schwefelsäure geätzten Fingergelenk (Darmstadt) ausgegangen zu sein.

Mit Mandelentzündung setzte das Eiterfieber 4 mal ein:

Es bildeten sich bei einem Manne in Tübingen Abszesse am Oberschenkel und den Bauchmuskeln (dienstfähig). — Bei einem Kranken in Metz schlofs sich ein Mandelabszefs an, der unter Auftreten ausgedehnter Hautblutungen und Entzündung fast aller Gelenke in 3 Tagen zum Tode führte. — In Mannheim wurde ein Grenadier nach 200tägiger Behandlung dienstfähig, bei dem im Verlauf einer mit schweren Allgemeinerscheinungen verbundenen Mandelentzündung 2 mal blutige Nierenentzündung und nach Entfieberung plötzlich Schüttelfröste, wässrige Stühle, Milzschwellung, Roseolen, später Brustfellentzündung mit blutigem Auswurf und weiterhin eine Knochenhautentzündung am rechten Oberschenkel aufgetreten waren. (O.-St.-A. Wernicke.)

1 mal (Worms) zeigten sich als erstes Symptom heftige Durchfälle, an die sich schmerzhaftige Auftreibung des Leibes und schwere septische Erscheinungen mit Hautblutungen anschlossen.

8 mal war die Eintrittspforte völlig dunkel:

2 tödlich endende Erkrankungen begannen unter dem Bilde des akuten Gelenkrheumatismus; dabei kam es 1 mal (Posen) zur Vereiterung des Hüftgelenks und Abszefsbildung am 7. Halswirbel und 1 mal (Mörchingen) zu einer durch die Sektion bestätigten Entzündung der Hirn- und Rückenmarkshäute.

Letztere von St.-A. Melot de Beauregard berichtete Erkrankung betraf einen Oberarzt, der 1899 an Pyämie und im Winter 1902/03 mehrfach an schwerer Mandelentzündung und im Januar 1903 an einem Panaritium mit Lymphgefäfsentzündung gelitten hatte. Am 22. März stellten sich zunächst Erscheinungen eines akuten Gelenkrheumatismus, der fast alle grossen Gelenke befallen hatte, und eine Entzündung des Herzbeutels ein. — Nachdem diese gebessert, vorübergehend aber ein äufserst bedenklicher Zustand mit Erbrechen, starkem Verfall und einer Temperatur von $42,7$ aufgetreten war, wurde der Kranke eine Zeit lang von häufigen, 5 Minuten anhaltenden, tonischen Krämpfen der gesamten Muskulatur mit bogenförmiger Überstreckung des Rückens und nach wiederum eingetretener vorübergehender Besserung von allerhand Zitterbewegungen und Gesichtsnervenlähmung befallen; die Kniesehenreflexe schwanden, das Bewusstsein war getrübt. Im Blut fanden sich zahlreiche gelbe Traubenkokken. Argentum colloidal als Salbe und Einspritzung, sowie Einverleibung von Antistaphylokokkenserum versagten. Allmähliche Lähmung beider Lidheber, Auftreten von Schielen und Abweichung des Zäpfchens, Gelbsucht, Verfall der Kräfte; Tod am 30. April 1903.

Von einer Operationswunde aus erfolgte nur 1 mal (Cassel) eine nach 12 Tagen tödlich endende Infektion, und zwar nach Entfernung adenoider Wucherungen aus der Nase:

Es trat hier ein stinkender Abszefs am weichen Gaumen, Mandelbelag, Lungenentzündung mit stinkendem Auswurf und Gesichtrose hinzu.

In den mehrfach aufgetretenen Abszessen wurden 5 mal Trauben- und 6 mal Kettenkokken nachgewiesen. Im Blut wurden Kettenkokken und Traubenkokken einzeln je 2 mal, beide Arten zusammen 1 mal (Posen) gefunden.

Die beiden bakteriologisch erwiesenen Blutinfektionen mit Traubenkokken (Mörchingen, Berlin), deren Entstehung dunkel war und bei denen sich auch kein operativ angreifbarer Eiterherd fand endeten nach 6 bzw. 39 Tagen tödlich, die beiden durch Kettenkokken verursachten Septikämien (St.-A. Grüder-Berlin) wurden durch Absetzen von vereiterten Gliedmaßen zur Heilung gebracht.

Die Behandlung bestand bei den mit Eiterung einhergehenden Erkrankungen in ausgiebiger Spaltung der Eiterherde, eventuell im Entfernen des Hauptherdes durch Absetzen von Gliedmaßen; sonst war sie symptomatisch.

Unguentum colloidal Credé kam als Einreibung 4 mal in Anwendung, jedoch ohne Erfolg.

Das Marmorek'sche Antistreptokokkenserum wurde von O.-St.-A. Vollbrecht-Darmstadt 1 mal ohne und 1 mal anscheinend mit Erfolg angewendet.

9. *Unterleibstypus.* (No. 13 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | % der Behan- delten | absol. Zahl | % der Behan- delten | absol. Zahl | % der Behan- delten | absol. Zahl | % der Behan- delten | | | |
| 110 | 446 | 0,85 | 308 | 55,4 | 45 | 8,1 | 51 | 9,2 | 404 | 72,7 | 152 | 26 680 | 48,0 |

Außerdem erkrankte noch 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang und Todesfälle an Unterleibstypus.

| Berichtszeitraum | Zugang | | | Todesfälle (in militärärztlicher Behandlung) | | |
|---|------------------|------|-----|--|------|------------------------------------|
| | absolute Zahl | ‰K. | ‰M. | absolute Zahl | ‰K. | Von 100 der Behan- delten |
| 1881/82 bis 1885/86 ¹⁾ . . . | 3156,8 | 8,4 | 9,3 | 173,2 | 0,46 | 5,3 |
| 1886/87 bis 1890/91 ¹⁾ . . . | 2068,8 | 5,0 | 6,1 | 117,8 | 0,28 | 5,6 |
| 1891/92 bis 1895/96 ¹⁾ . . . | 1313,8 | 2,8 | 3,4 | 101,2 | 0,21 | 7,5 |
| 1896/97 bis 1900/01 ¹⁾ . . . | 925,4 | 1,8 | 2,6 | 89,2 | 0,17 | 7,5 |
| im Jahre 1901/02 . . . | 489 | 0,90 | 1,5 | 55 | 0,10 | 7,6 |
| im Jahre 1902/03 . . . | 446 | 0,85 | 1,4 | 45 | 0,09 | 8,1 |

(Unter der Rapportnummer 12 „gastrisches Fieber“ werden keine Erkrankungen mehr geführt.)

Der Zugang an Unterleibstypus ist der geringste bisher in der Armee beobachtete. Das Verhältnis der Ge-

storbenen zur Gesamtzahl der Behandelten gestaltet sich im Vergleich zu den Vorjahren wieder etwas ungünstiger.

Die untenstehende Übersicht gestattet einen Vergleich der Verbreitung von Typhuserkrankungen in der deutschen, französischen, österreichischen und italienischen Armee.

Die Beteiligung der einzelnen Dienstaltersklassen an den Typhuserkrankungen ist folgende:

Es standen:

im 1. Dienstjahre 207 Mann = 46,4 % des Gesamtzugangs,
 „ 2. „ 173 „ = 38,8 „ „ „
 „ 3. „ 35 „ = 7,8 „ „ „
 in höheren Dienst-
 jahren . . . 31 „ = 7,0 „ „ „

zusammen 446 Mann.

Der Anteil der einzelnen Armeekorps an den Erkrankungen an Unterleibstypus ist in der Tabelle auf Seite 28 für die letzten Berichtszeiträume zahlenmäßig nachgewiesen und auf den Karten VII bis XII bildlich dargestellt. Den höchsten Zugang hatte das II. Armeekorps mit 3,6 ‰ K. aufzuweisen.

Übersicht über die Erkrankungen und Todesfälle an Typhus in verschiedenen Armeen.²⁾

| Berichtszeitraum | Typhuserkrankungen | | | | Todesfälle an Typhus | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| | Preuß. Armee, XII. (1. K. S.), XIII. (K. W.) und XIX (2. K. S.) Armeekorps ‰ K. | Franz. Armee ‰ K. | Österr. Armee ‰ K. | Italien. Armee ‰ K. | Preuß. Armee XII. (1. K. S.), XIII. (K. W.) und XIX. (2. K. S.) A. K. | | Französische Armee | | Österreichische Armee | | Italien. Armee ‰ K. | |
| | | | | | ‰ K. | % des Zuganges 4) | ‰ K. | % des Zuganges | ‰ K. | % des Zuganges | | |
| 1881/82 bis 1885/86 bzw. 1881 bis 1885 ³⁾ | 8,4 | 14,7 | 6,9 | 7,8 | 0,46 | 5,5 | 4,1 | 27,6 | 1,4 | 20,8 | 2,16 | |
| 1886/87 bis 1890/91 bzw. 1886 bis 1890 ³⁾ | 5,0 | 13,1 | 4,7 | 5,2 | 0,28 | 5,7 | 2,3 | 17,4 | 0,8 | 18,1 | 1,34 | |
| 1891/92 bis 1895/96 bzw. 1891 bis 1895 ³⁾ | 2,8 | 11,3 | 4,2 | 4,8 | 0,21 | 7,7 | 1,9 | 16,5 | 0,66 | 15,8 | 0,79 | |
| 1896/97 bis 1900/01 bzw. 1896 bis 1900 ³⁾ | 1,8 | 10,2 | 3,1 | 5,3 | 0,17 | 9,6 | 1,6 | 15,5 | 0,49 | 15,8 | 0,98 | |
| 1901/02 bzw. 1901 ³⁾ | 0,90 | 4,9 ⁵⁾ | 3,5 | 5,2 | 0,10 | 11,2 | 0,71 ⁵⁾ | 14,6 ⁵⁾ | 0,29 | 13,3 | 0,76 | |
| 1902/03 bzw. 1902 ³⁾ | 0,85 | 4,3 | 1,9 | 4,1 | 0,09 | 10,1 | 0,59 | 13,7 | 0,25 | 13,2 | 0,78 | |

¹⁾ In diesen Jahren ist Unterleibstypus und Gastrisches Fieber zusammengerechnet.

²⁾ In dieser Tabelle ist der Zugang unter Rapportnummer 12 und 13 (gastrisches Fieber und Unterleibstypus) zusammen verrechnet; von 1900/01 ab betrifft sie nur die Rapportnummer 13.

³⁾ Zeitraum für die französische, österreichische und italienische Armee.

⁴⁾ Diese Zahlen sind höher als die Mortalitätszahlen der vorhergehenden Übersicht, weil sie hier nur den Zugang betreffen, während jenen Zahlen Bestand und Zugang zugrunde gelegt sind.

⁵⁾ Diese Zahlen sind auf 1000 Mann der Präsenzstärke berechnet und betreffen bis zum Jahre 1900 die Truppen in der Heimat sowie Algier und Tunis, vom Jahre 1901 ab nur die eigentlichen Truppen in der Heimat ausschließlich derjenigen in Algier und Tunis.

Zugang an Unterleibstypus nach Armeekorps.

| Armeekorps | im 5jährigen Durchschnitt | | | | 1901/02 | 1902/03 | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------|-------------|------|
| | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | | absol. Zahl | ‰ K. |
| | bis 1885/86 | bis 1890/91 | bis 1895/96 | bis 1900/01 | | | |
| | ‰ K. | | | | | | |
| G. | 4,4 | 2,6 | 2,1 | 1,1 | 0,60 | 7 | 0,17 |
| I. | 9,6 | 7,5 | 5,0 | 3,3 | 1,2 | 44 | 1,4 |
| II. | 19,8 | 9,4 | 3,9 | 1,2 | 1,6 | 94 | 3,6 |
| III. | 7,4 | 2,9 | 3,2 | 0,89 | 0,42 | 6 | 0,26 |
| IV. | 7,0 | 4,7 | 1,7 | 1,3 | 0,85 | 15 | 0,67 |
| V. | 9,8 | 5,0 | 3,1 | 1,2 | 0,42 | 5 | 0,20 |
| VI. | 13,6 | 6,7 | 2,0 | 2,2 | 1,3 | 16 | 0,62 |
| VII. | 8,5 | 3,5 | 3,4 | 1,8 | 1,5 | 22 | 0,82 |
| VIII. | 5,2 | 3,1 | 3,6 | 6,1 | 3,0 | 49 | 1,8 |
| IX. | 5,2 | 7,1 | 3,7 | 0,65 | 0,27 | 4 | 0,16 |
| X. | 7,0 | 3,8 | 1,8 | 0,74 | 0,45 | 18 | 0,82 |
| XI. | 6,5 | 3,7 | 1,7 | 0,76 | 1,3 | 15 | 0,72 |
| XII. (1. K. S.) | 4,6 ¹⁾ | 4,2 | 1,4 | 0,87 | 0,19 | 1 | 0,05 |
| XIII. (K. W.) | 8,6 | 2,3 | 1,2 | 1,2 | 0,40 | 19 | 0,86 |
| XIV. | 6,6 | 4,7 | 3,0 | 1,6 | 0,77 | 29 | 0,91 |
| XV. | 9,8 | 6,8 | 2,7 | 2,2 | 1,2 | 26 | 0,83 |
| XVI. | — | 4,6 ²⁾ | 3,4 | 3,1 | 0,73 | 14 | 0,51 |
| XVII. | — | 8,6 ²⁾ | 4,4 | 2,4 | 1,0 | 46 | 1,6 |
| XVIII. | — | — | — | 0,56 ³⁾ | 0,37 | 5 | 0,19 |
| XIX. (2. K. S.) | — | — | — | 1,7 ³⁾ | 0,43 | 11 | 0,53 |
| I. K. B. . . . | 11,4 | 6,6 | 6,4 | 0,83 | 0,29 | 19 | 0,82 |
| II. " | 5,5 | 3,9 | 2,1 | 3,0 | 0,32 | 4 | 0,19 |
| III. " | — | — | — | 0,11 ⁴⁾ | — | 3 | 0,16 |

Wie im einzelnen die Verhältnisse bei den verschiedenen Armeekorps lagen, ergibt die folgende Tabelle:

| Armeekorps | Es standen | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | im 1. Dienstjahre | im 2. Dienstjahre | im 3. Dienstjahre | im 4. und in höheren Dienstjahren |
| Gardekorps | 3 | 3 | 1 | — |
| I. Armeekorps | 20 | 17 | 3 | 4 |
| II. " | 57 | 27 | 6 | 4 |
| III. " | 3 | 2 | 1 | — |
| IV. " | 6 | 8 | 1 | — |
| V. " | 2 | 1 | 1 | 1 |
| VI. " | 10 | 6 | — | — |
| VII. " | 10 | 9 | 2 | 1 |
| VIII. " | 9 | 31 | 4 | 5 |
| IX. " | — | 3 | — | 1 |
| X. " | 4 | 8 | 4 | 2 |
| XI. " | 8 | 3 | 2 | 2 |
| XII. (1. K. S.) A. K. . . . | 1 | — | — | — |
| XIII. (K. W.) A. K. . . . | 12 | 7 | — | — |
| XIV. Armeekorps | 15 | 11 | 1 | 2 |
| XV. " | 13 | 9 | 2 | 2 |
| XVI. " | 2 | 8 | 2 | 2 |
| XVII. " | 25 | 14 | 5 | 2 |
| XVIII. " | 2 | 2 | — | 1 |
| XIX. (2. K. S.) A. K. . . . | 5 | 4 | — | 2 |
| Armee | 207 | 173 | 35 | 31 |

1) 4jähriger Durchschnitt 1882/83 bis 1885/86.

2) ‰ K. des Berichtsjahres 1890/91.

3) 3jähriger Durchschnitt 1898/99 bis 1900/01.

4) 2jähriger Durchschnitt 1899/1900 bis 1900/01.

Die nachstehende Übersicht gibt über die Verteilung des Zuganges auf die verschiedenen Dienstgrade Aufschluss:

| Beim | Unteroffiziere | Gefreite | Gemeine |
|--------------------------------------|----------------|----------|---------|
| Gardekorps | — | 2 | 5 |
| I. Armeekorps | 4 | 6 | 34 |
| II. " | 5 | 12 | 77 |
| III. " | — | 1 | 5 |
| IV. " | — | 1 | 14 |
| V. " | 1 | 2 | 2 |
| VI. " | — | — | 16 |
| VII. " | 3 | 2 | 17 |
| VIII. " | 6 | 5 | 38 |
| IX. " | — | — | 4 |
| X. " | 2 | 2 | 14 |
| XI. " | 2 | 3 | 10 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | — | — | 1 |
| XIII. (K. W.) " | — | 3 | 16 |
| XIV. Armeekorps | 2 | 5 | 22 |
| XV. " | 2 | 2 | 22 |
| XVI. " | 2 | 3 | 9 |
| XVII. " | 4 | 5 | 37 |
| XVIII. " | 1 | — | 4 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 1 | — | 10 |
| Armee | 35 | 54 | 357 |

Von dem Krankenpflegepersonal sind 10 Sanitätsmannschaften und 4 Militärkrankenwärter an Unterleibstypus erkrankt.

Von den ersteren hatten bis zum Beginn der Erkrankung Dienst getan:

bei der Truppe:

4 (1 im 1., 1 im 2., 1 im 3. und 1 in höheren Dienstjahren),

bei der Pflege Typhuskranker:

3 (3 im 3. Dienstjahre),

anderweit im Lazarett:

3 (2 im 2. und 1 in höheren Dienstjahren).

Von den Militärkrankenwärttern waren vorher beschäftigt gewesen:

bei der Pflege Typhuskranker:



2 (2 im 1. Dienstjahre),

auf Urlaub angesteckt:

2 (2 im 2. Dienstjahre).

Es sind demnach im Jahre 1902/03 8 Mann des unteren Pflegepersonals während ihres Dienstes im Lazarett von Unterleibstypus befallen worden. Hierzu kommen noch 7 Mann, welche sich bei Ausbruch des Typhus wegen eines anderen Leidens bereits in Lazarettbehandlung befanden. Im ganzen sind also 15 Mann = 3,4 ‰ des Gesamtzuganges in den Lazaretten an Unterleibstypus erkrankt.

Die Übersicht auf S. 31 gibt über die Zahl der in den letzten 12 Jahren vorgekommenen Lazarettinfektionen Aufschluss.



Audi-
liberri
Ebling

Erkrankungen an Unterleibstyphus

in den größeren¹⁾ Garnisonen der deutschen Armee, alphabetisch geordnet und auf 1000 Mann der Iststärke berechnet.

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ²⁾ | 1902/03 | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| | bis 1885/86 ³⁾ | bis 1890/91 ²⁾ | bis 1895/96 ²⁾ | bis 1900/01 ²⁾ | | Durchschnittszugang ‰ K. | Ist- stärke |
| Aachen | 6,1 | 2,5 | 2,0 | 11,8 | 1,6 | 1 826 | 0,55 |
| Allenstein | 17,8 ³⁾ | 8,1 | 3,1 | 5,4 | 1,5 | 3 862 | 1,6 |
| Altenburg | 2,3 | 2,2 | 1,3 | — | 0,82 | 1 188 | 2,5 |
| Altona-Hamburg | 8,9 | 17,6 | 6,3 | 0,45 | 0,23 | 4 489 | — |
| Amberg | 2,4 | 0,75 | 2,2 | 0,58 | — | 1 633 | — |
| Augsburg | 4,7 | 1,6 | 1,2 | — | — | 2 680 | — |
| St. Averd | 13,2 | 10,0 | 1,7 | 7,9 | 1,6 | 2 479 | 0,40 |
| Bamberg | 2,0 | 1,2 | 0,41 | 0,43 | — | 2 181 | — |
| Bautzen | 4,0 | 1,3 | 0,53 | — | — | 1 768 | — |
| Bayreuth | 1,2 | 2,2 | 0,88 | 0,44 | — | 2 152 | — |
| Berlin | 5,4 | 2,8 | 2,4 | 0,92 | 0,53 | 27 694 | 0,18 |
| Bitsch | 5,7 | 1,5 | 0,63 | — | 0,56 | 1 909 | 2,1 |
| Bonn | 5,9 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 1 421 | — |
| Brandenburg a. H. | 4,7 | 1,8 | 0,92 | 0,59 | 0,28 | 3 615 | — |
| Braunschweig | 4,8 | 1,6 | 0,94 | 0,76 | 0,37 | 2 784 | 1,4 |
| Bremen | 1,5 | 2,9 | 8,1 | 0,74 | 0,71 | 1 324 | — |
| Breslau | 6,6 | 6,0 | 1,2 | 0,82 | 0,35 | 5 581 | 0,72 |
| Brieg | 6,1 | 8,2 | 2,2 | 8,3 | 0,82 | 2 334 | 2,6 |
| Bromberg | 15,7 | 8,0 | 2,9 | 1,7 | 1,8 | 5 355 | 0,37 |
| Cassel | 5,1 | 3,6 | 1,6 | 0,82 | 4,3 | 4 803 | 1,5 |
| Celle | 12,3 | 1,6 | 1,4 | 0,48 | 0,47 | 2 120 | — |
| Charlottenburg | 15,6 | — | — | — | — | 2 189 | — |
| Chemnitz | 7,4 | 21,4 | 2,1 | — | — | 3 278 | 0,92 |
| Coblenz-Ehrenbreit- stein | 4,6 | 2,1 | 2,8 | 6,3 | 1,3 | 6 833 | 1,0 |
| Cöln-Deutz | 4,0 | 2,2 | 3,7 | 3,2 | 1,3 | 10 122 | 0,69 |
| Colmar i. E. | 8,9 | 5,0 | 3,3 | 2,4 | 1,0 | 2 926 | — |
| Cosel | 6,5 | 30,4 | 2,9 | 0,74 | — | 1 261 | — |
| Cottbus | 3,5 | 1,7 | 5,1 | 1,5 | — | 1 295 | — |
| Cüstrin | 4,2 | 2,6 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1 841 | 0,54 |
| Danzig | 7,4 | 4,4 | 3,7 | 1,4 | 0,26 | 7 548 | 0,53 |
| Darmstadt | 3,1 | 0,87 | 0,14 | 0,39 | 0,38 | 5 163 | — |
| Dessau | 7,7 | 4,4 | 1,3 | — | 0,78 | 1 257 | — |
| Deutsch-Eylau | 18,0 | 10,6 | 5,2 | 0,94 | 1,1 | 2 622 | 0,76 |
| Diedenhofen | 9,3 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 0,35 | 3 036 | 0,33 |
| Dieuze | — | 1,1 ⁴⁾ | 1,1 | 0,74 | 0,37 | 2 683 | 0,37 |
| Döbeln | — | 1,8 ⁴⁾ | 1,5 | 0,55 | 0,56 | 1 778 | 0,56 |
| Dresden | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | 0,35 | 11 196 | 0,09 |
| Düsseldorf | 6,3 | 2,0 | 1,5 | 0,51 | 1,0 | 3 840 | 0,26 |

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ²⁾ | 1902/03 | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| | bis 1885/86 ³⁾ | bis 1890/91 ²⁾ | bis 1895/96 ²⁾ | bis 1900/01 ²⁾ | | Durchschnittszugang ‰ K. | Ist- stärke |
| Erfurt | 7,9 | 3,1 | 1,8 | 0,43 | 0,48 | 2 020 | 1,4 |
| Erlangen | 11,5 ⁵⁾ | 1,3 | 0,12 | 1,0 | — | 2 116 | — |
| Flensburg | 4,2 | 5,7 | 0,73 | — | — | 1 289 | — |
| Frankfurt a. M. | 5,5 | 2,7 | 1,2 | 0,44 | — | 2 651 | — |
| Frankfurt a. O. | 4,4 | 0,85 | 4,5 | 0,95 | 0,37 | 5 268 | 0,57 |
| Freiburg i. Baden | 12,5 | 3,9 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2 813 | 0,36 |
| Fürth | — | — | 0,77 | — | 4,7 | 1 215 | — |
| Germersheim | 6,0 | 1,8 | 5,3 | 3,6 | 0,47 | 1 939 | — |
| Giefßen | 1,2 | 3,9 | 1,0 | 0,50 | — | 1 930 | — |
| Glatz | 28,8 | 11,5 | 2,0 | 0,56 | — | 1 757 | 1,1 |
| Gleiwitz | 22,3 | 0,61 | 0,60 | 1,1 | — | 1 831 | — |
| Glogau | 6,8 | 4,8 | 2,0 | 0,91 | — | 3 395 | — |
| Gnesen | 10,7 | 8,5 | 7,5 | 1,8 | 5,1 | 2 474 | 32,7 |
| Görlitz | 2,5 | 1,7 | 0,74 | 1,3 | — | 1 289 | — |
| Göttingen | 8,8 | 6,0 | 1,2 | 0,55 | 1,6 | 1 855 | 0,54 |
| Goldap | 5,5 ⁶⁾ | 16,1 | 4,7 | 2,8 | 1,4 | 1 406 | — |
| Graudenz | 11,4 | 9,9 | 3,6 | 2,5 | 0,50 | 5 802 | 0,69 |
| Groß-Lichterfelde | 2,1 | 0,63 | 1,5 | 0,70 | — | 1 508 | — |
| Gumbinnen | 11,1 | 5,9 | 8,0 | 1,4 | 1,7 | 2 887 | — |
| Hagenau | 12,7 | 5,9 | 2,0 | 3,6 | 1,5 | 3 881 | 3,6 |
| Hagenau-Truppen- Übungsplatz | — | — | — | — | — | 3 000 | — |
| Halberstadt | 5,4 | 3,1 | 1,6 | 0,42 | 0,84 | 2 367 | 0,84 |
| Halle a. S. | 4,9 | 4,9 | 1,4 | 1,2 | 0,48 | 2 061 | 0,49 |
| Hameln | 1,9 | 5,7 | 3,5 | 3,2 | 0,80 | 1 237 | — |
| Hanau | 2,7 | 3,0 | 1,9 | — | — | 1 991 | — |
| Hannover | 4,0 | 2,1 | 1,4 | 0,14 | 0,47 | 7 215 | 2,2 |
| Heilbronn | 1,7 ⁶⁾ | — | 1,5 | 0,81 | — | 1 247 | — |
| Hildesheim | 1,7 | 1,7 | 0,76 | 0,54 | 0,51 | 1 935 | 0,52 |
| Jauer | 3,9 | 1,8 | 1,7 | 3,2 | — | 1 192 | 0,84 |
| Ingolstadt | 4,2 | 2,0 | 1,1 | 0,62 | — | 4 739 | — |
| Inowrazlaw | — | 11,4 ⁴⁾ | 2,6 | 0,51 | 0,47 | 2 121 | — |
| Instertburg | 11,6 | 12,9 | 7,6 | 3,2 | 1,0 | 2 848 | 1,1 |
| Jüterbog | 9,8 | 2,7 | 0,93 | 1,3 | 0,51 | 1 951 | — |
| Kamenz | — | — | — | — | — | 1 182 | — |
| Karlsruhe | 5,1 | 5,3 | 2,7 | 0,85 | — | 4 465 | 0,22 |
| Königsberg i. Pr. | 8,6 | 6,6 | 3,8 | 2,0 | 0,71 | 9 698 | 1,1 |
| Kolberg | 67,6 | 10,1 | 3,0 | 1,6 | 2,4 | 1 390 | — |

1) Garnisonen mit einer Iststärke von mehr als 1000 Mann.

2) Die in den früheren Berichten enthaltenen Iststärken sind wegen Mangels an Raum weggelassen worden. Bis zum Jahre 1900 einschl. beziehen sich die Zugangsziffern auf gastrisches Fieber und Unterleibstyphus.

3) 2jähriger Durchschnitt 1884/86.

4) 4jähriger Durchschnitt 1887/91.

5) 4jähriger Durchschnitt 1882/86.

6) 3jähriger Durchschnitt 1883/86.

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ¹⁾ | 1902/03 | | Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ¹⁾ | 1902/03 | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | bis 1885/86 ¹⁾ | bis 1890/91 ¹⁾ | bis 1895/96 ¹⁾ | bis 1900/01 ¹⁾ | | Durchschnittszugang ‰ K. | Ist- stärke | | Zu- gang ‰ K. | bis 1885/86 ¹⁾ | bis 1890/91 ¹⁾ | bis 1895/96 ¹⁾ | | bis 1900/01 ¹⁾ | Durchschnittszugang ‰ K. |
| Konstanz | 4,7 | 1,9 | 2,3 | 1,1 | 0,55 | 1 767 | — | Posen | 5,8 | 4,4 | 2,4 | 0,90 | 0,48 | 7 600 | — |
| Krotoschin | 28,2 | 5,1 | 0,75 | 1,1 | — | 1 748 | — | Potsdam | 2,8 | 2,9 | 1,3 | 1,0 | 0,57 | 8 698 | 0,11 |
| Lahr | — | — | — | 0,86 ³⁾ | — | 1 568 | — | Prenzlau | 11,1 | 8,3 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 1 257 | — |
| Landau | 25,8 | 8,0 | 5,6 | 0,90 | 0,30 | 3 411 | — | Rastatt | 7,2 | 4,9 | 2,9 | 2,3 | 0,61 | 4 562 | 0,66 |
| Landshut | 3,0 | 3,4 | — | 0,80 | — | 1 112 | — | Rastenburg | — | — | — | 0,56 ³⁾ | — | 1 752 | 2,3 |
| Leipzig | 3,8 | 1,4 | 0,34 | 0,68 | 0,87 | 7 911 | 0,51 | Rawitsch | 7,9 | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | 1 214 | 0,82 |
| Liegnitz | 18,5 | 18,3 | 14,8 | 1,5 | — | 1 764 | 0,57 | Regensburg | 4,7 | 9,2 | 0,75 | 0,58 | — | 1 763 | 0,57 |
| Lissa | 12,1 | 3,2 | 1,8 | 0,81 | 1,6 | 1 243 | — | Rendsburg | 6,7 | 5,3 | 4,7 | 0,50 | 0,51 | 1 997 | 0,50 |
| Lockstedter Lager | — | — | — | — | — | 3 045 | — | Riesa | 8,0 ⁴⁾ | 2,8 | 0,84 | 0,61 | — | 1 866 | — |
| Ludwigsburg | 2,0 | 0,71 | 0,20 | 0,40 | 0,19 | 5 237 | — | Rostock | 2,5 | 4,0 | 2,9 | 1,5 | 0,71 | 1 365 | 0,73 |
| Lübeck | 1,8 | 4,7 | 5,7 | 0,87 | 0,75 | 1 241 | — | Saarbrücken | 1,5 | 3,0 | 3,9 | 16,6 | 12,8 | 3 423 | 5,3 |
| Lyck | 2,8 ²⁾ | 8,1 | 5,2 | 2,1 | 1,6 | 1 922 | 0,52 | Saarburg | 18,1 | 3,4 | 3,7 | 8,9 | 1,9 | 4 005 | 1,5 |
| Magdeburg | 7,8 | 3,6 | 1,6 | 1,9 | 0,29 | 6 921 | 0,58 | Saargemünd | 7,7 | 11,8 | 4,8 | 0,94 | 0,92 | 1 089 | — |
| Mainz | 7,1 | 2,6 | 1,4 | 0,68 | 0,56 | 8 929 | 0,11 | Saarlouis | 3,4 | 5,0 | 8,2 | 3,9 | 0,39 | 2 365 | 0,42 |
| Mannheim | 2,6 | 1,9 | 1,2 | 0,73 | 2,3 | 1 311 | 0,76 | Schleswig | 9,2 | 6,7 | 1,9 | 0,50 | — | 1 920 | — |
| Marienwerder | 1,6 | 3,2 | 9,1 | 1,9 | — | 1 046 | 0,96 | Schneidemühl | — | 30,0 | 6,6 | 0,93 | — | 1 171 | — |
| Meiningen | 16,4 | 4,2 | 0,73 | 0,54 | — | 1 843 | — | Schweidnitz | 10,3 | 2,8 | 0,63 | 3,7 | 0,41 | 2 344 | — |
| Metz | 7,9 | 8,3 | 3,9 | 5,6 | 0,56 | 22 872 | 0,44 | Schwerin | 5,8 | 10,0 | 3,4 | — | — | 2 075 | — |
| Minden | 7,2 | 4,7 | 8,3 | 0,33 | — | 3 207 | 0,31 | Spandau | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 0,67 | 5 948 | — |
| Mörchingen | — | — | 1,6 | 0,64 | 0,65 | 4 533 | 0,88 | Stargard i. Pomm. | 15,5 | 2,3 | 3,7 | 0,55 | 0,54 | 1 774 | 1,7 |
| Mülhausen i. E. | 7,1 | 6,5 | 4,2 | 1,6 | — | 4 207 | — | Stettin | 6,6 | 10,0 | 2,0 | 1,2 | 0,98 | 4 895 | 0,61 |
| Mülheim a. Ruhr. | — | — | — | 9,6 ³⁾ | 4,0 | 1 252 | 2,4 | Stralsund | 71,5 | 30,1 | 9,6 | 2,4 | — | 1 228 | — |
| München | 21,3 | 11,0 | 11,1 | 0,82 | 0,37 | 10 310 | 0,48 | Straßburg i. E. | 9,1 | 5,8 | 2,5 | 1,3 | 1,4 | 16 948 | 0,77 |
| Münster | 14,5 | 6,8 | 3,2 | 1,8 | 3,1 | 4 154 | 0,48 | Stuttgart | 21,0 | 2,9 | 0,98 | 0,22 | 0,86 | 4 550 | 3,5 |
| Naumburg a. S. | 1,4 | 1,6 | 0,68 | 4,6 | 0,69 | 1 429 | 0,70 | Thorn | 11,9 | 11,3 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 7 988 | 1,5 |
| Neiße | 19,6 | 3,1 | 1,6 | 1,1 | 3,0 | 3 924 | 0,51 | Tilsit | 5,4 | 9,4 | 4,1 | 14,3 | 2,0 | 1 917 | 3,7 |
| Neubreisach | 3,3 | 8,2 | 3,4 | 1,3 | — | 1 427 | — | Torgau | 3,6 | 2,6 | 1,0 | 0,70 | — | 3 027 | 0,33 |
| Neuburg a. D. | 2,1 | 4,1 | 1,7 | 0,72 | — | 1 590 | — | Trier | 7,2 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 2,1 | 5 493 | 3,6 |
| Neumünster | 5,7 | 3,6 | 1,9 | — | — | 1 198 | — | Ulm | 8,2 | 2,1 | 1,3 | 0,68 | 0,39 | 7 415 | 0,27 |
| Neu-Ruppin | 3,4 | 5,8 | — | 1,4 | — | 1 792 | — | Weingarten | 6,3 | 3,7 | 1,1 | 1,1 | — | 1 782 | — |
| Neu-Ulm | 2,0 | 2,9 | 0,40 | 1,3 | — | 2 121 | — | Weisenburg | 28,2 | 15,1 | 0,68 | 0,52 | 0,50 | 1 947 | — |
| Nürnberg | 2,3 | 1,2 | 0,37 | 0,32 | — | 3 371 | — | Wesel | 3,0 | 2,2 | 1,9 | 0,84 | — | 4 622 | — |
| Offenburg | — | — | — | — | 0,79 | 1 271 | — | Wiesbaden | 15,5 | 2,9 | 9,8 | 1,3 | 1,2 | 1 621 | — |
| Oldenburg | 9,8 | 4,8 | 2,4 | 2,0 | — | 2 983 | — | Wittenberg | 16,3 | 1,5 | 0,97 | 0,90 | 0,93 | 2 104 | — |
| Oppeln | 10,8 | 5,3 | 1,5 | 0,60 | 6,4 | 1 713 | — | Worms | 1,9 | — | 1,7 | 0,58 | 0,53 | 1 844 | 1,1 |
| Osnabrück | 6,6 | 8,7 | 2,3 | 0,78 | — | 1 599 | 1,3 | Wurzen | — | — | — | 1,3 | 1,5 | 1 362 | — |
| Osterode | — | 19,1 | 10,8 | 3,1 | 1,3 | 2 392 | 6,3 | Würzburg | 4,5 | 1,8 | 1,2 | 0,83 | — | 3 353 | — |
| Ostrowo | 12,1 | 8,8 | 1,4 | 1,9 | — | 1 360 | — | Zabern | 5,4 | 3,4 | 10,1 | 0,73 | 0,74 | 1 317 | — |
| Paderborn | 15,4 | 3,2 | 12,2 | 3,9 | 2,7 | 1 806 | 2,8 | Zittau | 2,1 | 1,3 | — | 0,47 | — | 1 723 | — |
| Passau | 5,8 | 9,0 | 29,9 | 0,78 | — | 1 336 | — | Zweibrücken | 2,7 ⁴⁾ | 5,2 | 2,2 | 0,81 | — | 1 279 | 0,78 |
| Pillau | 3,8 | 7,4 | 2,3 | 0,87 | — | 1 181 | 0,85 | Zwickau | 0,60 | 11,0 | 2,1 | 2,1 | — | 1 831 | — |
| Pirna | — | — | — | — | — | 1 374 | — | | | | | | | | |

¹⁾ Die in den früheren Berichten enthaltenen Iststärken sind wegen Mangels an Raum weggelassen worden.

²⁾ 2jähriger Durchschnitt 1884/86.

³⁾ 3jähriger Durchschnitt 1898/1901.

⁴⁾ 4jähriger Durchschnitt 1882/86.

| Berichtsjahr | Von den Typhuskranken waren im Lazarett erkrankt | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | Sanitätsmannschaften | | Krankenwärter | | andere Mannschaften | |
| | absolute Zahl | % des Zugangs an Typhus | absolute Zahl | % des Zugangs an Typhus | absolute Zahl | % des Zugangs an Typhus |
| 1891/92 | 42 | 3,7 | 18 | 1,6 | 32 ¹⁾ | 2,8 |
| 1892/93 | 27 | 2,6 | 19 | 1,8 | 22 | 2,1 |
| 1893/94 | 18 | 2,2 | 9 | 1,1 | 11 ¹⁾ | 1,3 |
| 1894/95 | 8 | 0,96 | 13 | 1,6 | 10 | 1,2 |
| 1895/96 | 19 | 2,1 | 12 | 1,3 | 20 | 2,2 |
| 1896/97 | 13 | 1,9 | 12 | 1,7 | 9 | 1,3 |
| 1897/98 | 19 | 2,0 | 11 | 1,1 | 12 ²⁾ | 1,3 |
| 1898/99 | 7 | 1,0 | 6 | 0,88 | 8 | 1,2 |
| 1899/1900 | 14 | 1,8 | 8 | 1,0 | 9 | 1,2 |
| 1900/01 | 18 | 2,2 | 24 | 2,9 | 17 | 2,1 |
| 1901/02 | 9 | 1,3 | 9 | 1,3 | 4 | 0,82 |
| 1902/03 | 6 | 1,3 | 2 | 0,45 | 7 | 1,6 |

Die Verteilung der Erkrankungen an Unterleibstyphus auf die einzelnen Monate ist in der nachstehenden bildlichen Darstellung ersichtlich gemacht.


Die diesjährige Monatskurve des Typhuszuganges stimmt im allgemeinen wieder mit derjenigen früherer Jahre überein.

Die Ursache der alljährlich wiederkehrenden Steigerung im September und Oktober ist im Sanitätsbericht 1894/96, Seite 38, erörtert worden.

Im Verlauf und im Anschluss an Unterleibstyphus wurde eine Reihe anderweitiger Erkrankungen beobachtet, welche in nebenstehender Tabelle aufgeführt sind.

| Es kamen vor | Bei wievielen Typhuskranken? | Bei % der Behandelten |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| | Schwere Lungenerkrankungen | 16 |
| darunter: | | |
| Lungenentzündung | 9 | 1,6 |
| Bronchialkatarrh | 1 | 0,18 |
| Verkäsung beider Lungen in den oberen Teilen | 1 | 0,18 |
| Profuse Darmblutungen | 6 | 1,1 |
| Thrombosen | 6 | 1,1 |
| Brustfellentzündungen | 4 | 0,72 |
| Darmp perforationen | 3 | 0,54 |
| darunter: | | |
| Bauchfellentzündung | 1 | 0,18 |
| Nierenentzündungen | 2 | 0,36 |
| Furunkelose | 2 | 0,36 |
| Akuter Gelenkrheumatismus | 1 | 0,18 |
| Typhöse Kehlkopfgeschwüre mit Kehlkopfödem | 1 | 0,18 |
| Chronische Heiserkeit | 1 | 0,18 |
| Herzbeutelentzündung | 1 | 0,18 |
| Nervöse Störung der Herzstätigkeit | 1 | 0,18 |
| Eiterige Ohrspeicheldrüsenentzündung | 1 | 0,18 |
| Bauchfellentzündung | 1 | 0,18 |
| Eiterige Hoden- und Nebenhodenentzündung | 1 | 0,18 |
| Schwerhörigkeit | 1 | 0,18 |
| Mehrfache Abszesse | 1 | 0,18 |
| zusammen | 49 | 88,1 |

Krankenzugang an Unterleibstyphus nach Monaten.



1) Darunter ein einjährig-freiwilliger Arzt, welcher mit der Pflege Typhuskranker betraut war.

2) Darunter ein zur Typhusstation kommandierter Unterarzt d. Res.

Im Berichtsjahr kamen mehrere Typhusepidemien vor.

In Gnesen herrschten 2 Epidemien, eine kleinere mit 26 Erkrankungen von Mitte Februar bis Mitte April 1903, die zweite grössere im September 1903 mit 54 Erkrankungen. An beiden Epidemien war das 6. Pommersche Infanterie-Regiment No. 49 mit 25 bzw. 53, das Dragoner-Regiment von Arnim (2. Brandenburgisches) No. 12 mit nur je 1 Erkrankung beteiligt.

Die 1. (Frühjahrs-) Epidemie wird auf Ansteckung in der Stadt zurückgeführt, wo zu gleicher Zeit Typhus herrschte. Die 2. (Herbst-) Epidemie wurde auf Ansteckung durch Trinkwasser und durch Kontakt im Manöver zurückgeführt.¹⁾ — In Trier erkrankten vom 24. September bis 20. Oktober 1902 23 Mann an Typhus. Die Erkrankungen verteilten sich auf alle 3 dort in Garnison befindlichen Infanterie-Regimenter No. 29, 69, 161. Auch diese Epidemie wird auf Ansteckung in den verseuchten Ortschaften des Hochwaldes während des Manövers zurückgeführt. Der Verlauf war durch zahlreiche Komplikationen gleichfalls schwer. — 1 leichte Epidemie geringeren Umfangs, die offenbar durch Genuss von Salat verursacht ist, der in einem Bache gewaschen war, welcher aus einem verseuchten Tal kam, trat in Schlettstadt auf. — Leicht verliefen auch 14 Erkrankungen beim III. Bataillon Infanterie-Regiments von Grolman (1. Posen-schen) No. 18, für die sich keine sichere Ansteckungsquelle erweisen liess. — Auch für 1 kleine Epidemie in Stuttgart (12) war die Ansteckungsquelle nicht zu ermitteln. In letzterer Garnison waren gleichzeitig von demselben Bataillon 5 Mann wegen Grippe und 15 wegen akuten Darmkatarrhs in das Lazarett aufgenommen. — Auf Grund des Ausfalls der Widalschen Reaktion bei Verwendung auswärtiger (1:25 bis 100) und besonders einiger aus dem Urin oder Stuhl der Kranken selbst gezüchteter Typhusstäme (1:200 bis 7000) ist St.-A. Mühl-schlegel der Ansicht, dass auch bei 15 von diesen Zugängen Typhus vorlag; bei der Infektion seien 3 verschiedene Typhus-stämme beteiligt gewesen.

Bei einigen Erkrankungen, die einzeln oder in kleinen Gruppen in Zugang kamen, liess sich die Gelegenheit der Infektion feststellen.

1 Oberfeuerwerker steckte sich bei der Pflege seiner typhus-kranken Frau an (Danzig), 1 Sergeant hatte sich durch Verkehr in einer Familie, in der mehrere Mitglieder an Typhus erkrankt waren (Metz-Stadt), angesteckt. — 7 Zugänge kamen in Orten vor (Braunsberg, Braunschweig und Strafsburg i. E.), wo gleichzeitig in der Zivilbevölkerung Typhus herrschte. 3 mal (Metz-Stadt, Strafsburg i. E. und Magdeburg) war die Infektion vor der Einstellung erfolgt, 1 mal (Magdeburg) wahr-scheinlich von der an gastrischem Fieber erkrankten Schwester. — Mehrmals (Tilsit und Cassel) werden Erkrankungen auf infizierte Nahrung zurückgeführt. Wirtshausinfektionen werden 4 mal (Danzig) angenommen.

Infektion im Manöver wurde — ausser den schon erwähnten Fällen — 11 mal (Magdeburg, Ulm, Metz-Stadt, Cassel), auf Urlaub 6 mal (Frankfurt a. O., Ulm, Mörchingen, St. A. v. d. Hörsing, Düsseldorf, Mannheim) angenommen.

St.-A. Hohenthal-Deutz berichtet, dass sich 1 Mann, der gewohnheitsmässig rohe Schnecken und Regenwürmer als, mög-licherweise durch diese üble Angewohnheit auf dem Pionier-übungsplatze, den öfter Rheinwasser bespülte, infiziert habe.

Epidemien kleineren Umfangs werden noch aus Thorn (12, Milch) und aus Stolp (7) berichtet; von den letzteren werden 5 Fälle auf Ansteckung innerhalb des Lazarets

¹⁾ Eine ausführliche Beschreibung beider Epidemien gibt St.-A. Exner in der „Deutschen militärärztlichen Zeitschrift“ 1906, S. 127.

zurückgeführt; sie betrafen 1 Sanitätsgefreiten und 1 Militär-krankenwärter, die einen Typhuskranken gepflegt hatten. Ferner 1 Lazarettordonnanz und 2 wegen äusserer Leiden im Lazarett befindliche Husaren.

Eine typhusähnliche Epidemie wurde im Juli 1903 beim Militär-Reit-Institut von O.-St.-A. Steinhausen beobachtet. Nach dem Ausfall der Widalschen Reaktion wurden die Erkrankungen als Paratyphen angesprochen.

O.-St.-A. Bafsmann-Metz berichtet über eine Er-krankung, bei welcher ihm der bakteriologische Nachweis von Paratyphusbazillen gelang; der Krankheitsverlauf war leicht. Nach 7 Tagen erfolgte kritischer Temperatur-abfall, welchem sich eine ungestörte Genesung und Wieder-herstellung der Dienstfähigkeit anschloß. Noch nach 4 Wochen fiel die Serumreaktion auf Paratyphus positiv aus, später nicht mehr.

Die Widalsche Reaktion war in 52 Fällen, in denen ihr Ausfall zahlenmässig erwähnt ist, 47 mal positiv und 5 mal negativ, (2 mal Paratyphus agglutiniert).

Die Diazoreaktion trat wiederum meistens früher auf als die Widalsche Reaktion. St.-A. Schreiber-Trier beobachtete, dass das Auftreten der Diazoreaktion meist eine ungünstigere Prognose gab.

St.-A. Bludau-Königsberg i. Pr. konnte bei einem unter den Erscheinungen von Hirnhautentzündung erkrankten und ge-storbenen Pionier, dessen Sektion verweigert wurde, durch Milzpunktion nach dem Tode Typhusbazillen nachweisen. — 1 mal (St.-A. Neuburger-Berlin) wurden in dem Eiter eines umschriebenen Knochenhautabszesses am linken Unterschenkel Reinkulturen von Typhusbazillen gefunden.¹⁾

In Trier wurden bei 23 Typhuskranken 14 mal die Bazillen im Stuhl und 2 mal im Urin gefunden. St.-A. Merzdorf-Leipzig gelang der Nachweis der Bazillen in allen Fällen im Stuhl und Blut. Durchgehends wurden die Typhusbazillen im Urin seltener nachgewiesen, in Osterode bei 14 Kranken kei-nal. Mehrmals wurden sie im Auswurf gefunden. So auch in einem von St.-A. Villaret-Saarbrücken berichteten Falle, der mit doppelseitiger Lungen- und Brustfellentzündung kompliziert war und bei dem am 36. Krankheitstage unter mehr-maligen heftigen Hustenstößen etwa $\frac{1}{2}$ l hellrotes schaumiges Blut ausgeworfen wurde; der Tod erfolgte durch Herzlähmung. Es fand sich ein großes ringförmiges Geschwür, welches die Stimmbänder fast völlig zerstört hatte.

Über die Komplikationen sei im einzelnen noch berichtet:

Entzündungen eines Kniegelenks, beider Hüft- und Ellbogengelenke mit Abszessbildungen, Eiterblasen am Kreuzbein und an Händen und Füßen beobachtete St.-A. Lincke-Altenburg. — Blutungen in das Unterhautzell-gewebe an den verschiedensten Körperstellen nach vorauf-gegangenen blutigen Stühlen und Blutharnen sahen O.-St.-A. Baehr-Halle a. S. und St.-A. Knoch-Düsseldorf. — Heftige Gelenkschmerzen und mehrere Tage anhaltende Waden-kämpfe beobachtete O.-St.-A. Wegelj-Erfurt, eine 10 Tage anhaltende große Überempfindlichkeit der Fusssohlen St.-A. Ziemer-Tilsit. 1 Jäger in Bitsch, der infolge von 2 Rückfällen etwa 3 Monate fieberte und einen Staphylokokken-abszess bekam, wurde wegen Lähmung beider grossen Zehen invalide.

¹⁾ Deutsche militärärztliche Zeitschrift, 1903, H. 4.

O.-St.-A. Dunbar-Dt. Eylau mußte bei einem Mann, der eine Venenverstopfung bekam, die Brand zur Folge hatte, den linken Unterschenkel amputieren.

Über eine tödliche Darmblutung (etwa 3 Liter Blut) am 16. Behandlungstage berichtet St.-A. Ziemer-Tilsit.

In Danzig starb 1 Mann nach 257 Behandlungstagen, bei dem nach mehrfachen Typhusrückfällen Mandelentzündung mit nachfolgendem Gelenkrheumatismus und Herzzinnenhautentzündung auftrat. — Ausgedehnte Abszessbildungen an verschiedenen Körperstellen werden aus mehreren Garnisonen berichtet. — Im Eiter wurden häufig Typhus- und typhusähnliche Bazillen festgestellt.

Über einen seltenen Sitz eines Typhusgeschwürs berichtet St.-A. Villaret-Saarbrücken. Neben Geschwüren im Darm fand man bei einem leichten, am 28. Tage jedoch infolge heftiger Darmblutung tödlich endenden Typhus ein Geschwür im Wurmfortsatz.

Eine von St.-A. Krüger-Saarburg berichtete Typhuserkrankung machte in den ersten 4 Wochen durchaus den Eindruck einer Blinddarmentzündung, für welche sämtliche subjektiven und objektiven Anzeichen vorlagen. Bei der Operation zeigten Blinddarm und Wurmfortsatz keine krankhafte Veränderung, dagegen fand sich handbreit über der Übergangsstelle vom Dünndarm zum Blinddarm ein taubeneigroßes Darmgeschwür, welches sich deutlich durch die blaurote Färbung kennzeichnete. Die Widalsche Reaktion fiel positiv aus.

Über wiederholtes Auftreten von Roseolen, und zwar in der 2. und in ausgedehnterem Maße in der 4. Woche der Erkrankung, berichtet St.-A. Winkels-Cüstrin.

Typhusrückfälle sind auch in diesem Berichtsjahre wiederholt beobachtet.

Die Behandlungsmethoden unterscheiden sich nicht von denen der letzten Jahre. Die nach den verschiedensten Richtungen hin abgeänderte Kaltwasserbehandlung stand auch in diesem Jahre im Vordergrund.

Von Entfiebungsmitteln kamen außer den gewöhnlichen Lactophenin und einigemal auch Aspirin in Anwendung.

St.-A. Krüger-Saarburg war mit Pyramidon sehr zufrieden. Es gelang, durch Dosen von 0,1 g, 2stündlich verabreicht, das Fieber ohne beunruhigende Nebenerscheinungen auf die regelrechte Körperwärme herabzubringen und zu erhalten. Das Mittel wurde regelmäßig gegeben und nur ausgesetzt, wenn die Temperatur vorübergehend unter 36° oder dauernd unter 37° blieb.

Die Darmblutungen wurden in mehreren Lazaretten mit Gelatinelösung (subkutan und als Einlauf) behandelt. Einen schnellen Erfolg lobt St.-A. Exner-Gnesen.

Eine Übersicht über die diesjährigen Erfolge der einzelnen Behandlungsarten gibt die nachfolgende, alljährlich aufgestellte Tabelle.

An Unterleibstypus wurden im Berichtsjahre — einschließlic des Bestandes — in der Armee behandelt:

| Behandlungsarten | Zahl der Behandelten | | Zahl der Gestorbenen | |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | überhaupt | $\frac{0}{0}$ der Gesamtzahl | überhaupt | $\frac{0}{0}$ der Behandlungsgruppe |
| Streng nach Brandscher Kaltwasserbehandlung | 13 | 23,4 | 2 | 0,12 |
| Nach abgeänderter, der jedesmaligen Eigenart des Kranken angepaßter Kaltwasserbehandlung | 330 | 593,5 | 17 | 1,1 |
| Mit warmen Bädern | 17 | 30,6 | 2 | 0,12 |
| Mit kalten Bädern und inneren Fiebermitteln | 110 | 197,8 | 15 | 0,93 |
| Mit warmen Bädern und inneren Fiebermitteln | 29 | 52,2 | 1 | 0,06 |
| Nur mit inneren Fiebermitteln | 13 | 23,4 | 4 | 0,25 |
| Abwartende (symptomatische) Behandlung | 38 | 68,3 | 4 | 0,25 |
| Nach anderen Behandlungsarten | 6 | 10,8 | — | — |
| Summe | 556 | 1000,0 | 45 | 2,8 |

A b g a n g.

a) Als dienstfähig konnten 308 = 55,4 % aller Behandelten entlassen werden.

b) Gestorben sind 45 = 8,1 %.

Die Sterblichkeitsziffern bei den einzelnen Armeekorps (im Verhältnis zu 100 der insgesamt Behandelten) sind in der folgenden Tabelle angegeben.

| Armeekorps | Unterleibstypus |
|--------------------------------------|-----------------|
| Gardekorps | — |
| I. Armeekorps | 8,5 |
| II. „ | 4,8 |
| III. „ | — |
| IV. „ | 25,0 |
| V. „ | 40,0 |
| VI. „ | 9,1 |
| VII. „ | 11,1 |
| VIII. „ | 8,7 |
| IX. „ | — |
| X. „ | 10,0 |
| XI. „ | 15,8 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | — |
| XIII. (K. W.) „ | 5,0 |
| XIV. Armeekorps | 5,7 |
| XV. „ | 8,6 |
| XVI. „ | 17,6 |
| XVII. „ | 5,4 |
| XVIII. „ | 20,0 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | — |

c) Als anderweitig kamen zur Entlassung 51 = 9,2 % der Behandelten.

Von den an Unterleibstypus Behandelten schieden aus als dienstunbrauchbar 5, als invalide 11 Mann. Die Ursache der Entlassung war:

- 1mal Störung des Blutlaufes im rechten Bein,
- 1 „ Entkräftung des Körpers,
- 1 „ chronische Heiserkeit,
- 4 „ Herzkrankheiten,
- 1 „ Nierenentzündung,
- 1 „ chronische Erkrankung des Brustfells,
- 4 „ Blutaderverstopfungen (Thrombosen) und deren Folgezustände,
- 1 „ Lähmung beider großen Zehen,
- 1 „ erhebliche krankhafte Veränderung des rechten Beins mit Herabsetzung der Gebrauchsfähigkeit,
- 1 „ rechtsseitiger Leistenbruch, entstanden durch Erschlaffung der Bauchdecken.

10. *Flecktyphus und Rückfallfieber.* (No. 14 und 15 des Rapportmusters.)

Wurden im Berichtsjahre nicht behandelt.

11. *Wechselfieber.* (No. 16 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 8 | 82 | 0,16 | 74 | — | 11 | 85 | 5 | 25,7 |

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | |
|---------------------------|-------------|--------------|
| 1881/82 bis 1885/86 . . . | 5343,4 Mann | = 14,2 ‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 . . . | 1670,1 „ | = 4,0 „ |
| 1891/92 „ 1895/96 . . . | 528,2 „ | = 1,1 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 . . . | 191,1 „ | = 0,37 „ |
| im Jahre 1901/02 . . . | 194 „ | = 0,36 „ |
| im Jahre 1902/03 . . . | 82 Mann | = 0,16 ‰ K. |

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|----------------|---------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 3 | 0,07 | XII. (I.K.S.) | 2 | 0,10 |
| I. | 4 | 0,13 | XIII. (K. W.) | — | — |
| II. | 5 | 0,19 | XIV. | 4 | 0,13 |
| III. | 4 | 0,17 | XV. | 9 | 0,29 |
| IV. | 1 | 0,04 | XVI. | 1 | 0,04 |
| V. | 5 | 0,20 | XVII. | 5 | 0,16 |
| VI. | 1 | 0,04 | XVIII. | 5 | 0,19 |
| VII. | 2 | 0,07 | XIX. (2.K.S.) | — | — |
| VIII. | 15 | 0,56 | | | |
| IX. | 5 | 0,20 | I. K. B. . . . | 1 | 0,04 |
| X. | 8 | 0,37 | II. | 4 | 0,19 |
| XI. | 3 | 0,11 | III. | 3 | 0,16 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 9 | 5 |
| ‰ K. | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |

Über 29 Erkrankungen liegen in diesem Berichtsjahre nähere Angaben vor.

20 Kranke waren früher in Malariagegenden des Auslandes gewesen, und zwar in Afrika (4), als Fremdenlegionäre in den Tropen (4), als Teilnehmer an der ostasiatischen Expedition in China (12) und hatten dort zum größten Teil an Wechselfieber gelitten. Bei ihnen kam, soweit angegeben, die drei- und eintägige Form zur Beobachtung.

Bei den übrigen 9 Erkrankten, von denen einer in Oldenburg auf Urlaub und einer in Ostfriesland angesteckt war, während 2 schon vor der Einstellung an Malaria gelitten hatten, lag 5mal die eintägige Fieberform vor.

Ein Kranker in Hameln bekam seinen ersten durch Parasitenbefund im Blut sichergestellten Malariaanfall erst 121 Tage nachdem er China verlassen hatte. Er hatte in China nicht an Malaria gelitten und war auch seit seiner Abreise von Ostasien niemals in Wechselfiebergegenden gewesen.

Mehrfache Nervenentzündung trat bei einer Malariaerkrankung auf, die St.-A. Drenkhahn beschreibt:

Ein Matrose in Altona litt an rückfälliger Malaria, die im Congogebiet erworben war. Es bestand neben hohem Fieber eine Störung des Empfindungsvermögens und zwar zunächst an beiden Händen, später nur in der rechten Hohlhand und an beiden Fußsohlen. Dazu kamen in der ersten Zeit sehr heftige Nervenschmerzen in den beiderseitigen Zwischenrippennerven. Als der Mann nach Chiningebrauch wochenlang fieberfrei gewesen war, traten Schmerzen im Gebiet des rechten Schienbeinnerven, in der Kniekehle und im oberen Teil der Wade auf. Durch Watteeinwicklung, Heißluft-, Elektrizität- und Arsen-Eisenbehandlung wurde sehr langsam eine schliesslich vollständige Heilung erzielt.

Das Fieber konnte fast bei allen Erkrankungen durch Chinin sicher beseitigt werden, 3mal (O.-St.-A. Haehner-Cöln) versagte jedoch die genau nach der Kochschen Vorschrift angewandte Chininkur vollständig, während allmählich gesteigerte Arsengaben Besserung bzw. Heilung brachten. Es handelte sich um Leute, die ihr Leiden in China erworben hatten.

12. *Grippe.* (No. 17 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 3 | 6258 | 11,9 | 6186 | 7 | 57 | 6250 | 11 | 9,5 |

Außerdem erkrankten noch 1 Invalide, 130 Kadetten und 130 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:
 1896/97 bis 1900/01 . . . 6821,6 Mann = 13,9 ‰ K.,
 im Jahre 1901/02 . . . 2245 „ = 4,2 „
 im Jahre 1902/03 . . . 6258 Mann = 11,9 ‰ K.

Die Zahl der Grippeerkrankungen ist im Vergleich zum Vorjahre um 7,7 ‰ K. gestiegen.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|----------------|---------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 472 | 11,4 | XII. (I.K.S.) | 358 | 17,9 |
| I. | 712 | 22,5 | XIII. (K. W.) | 482 | 21,8 |
| II. | 420 | 16,3 | XIV. | 235 | 7,4 |
| III. | 429 | 18,2 | XV. | 273 | 8,7 |
| IV. | 148 | 6,6 | XVI. | 307 | 11,2 |
| V. | 216 | 8,4 | XVII. | 83 | 2,8 |
| VI. | 19 | 0,74 | XVIII. | 180 | 6,8 |
| VII. | 469 | 17,4 | XIX. (2.K.S.) | 104 | 5,1 |
| VIII. | 193 | 7,2 | | | |
| IX. | 499 | 20,0 | I. K. B. . . . | 352 | 15,1 |
| X. | 187 | 8,5 | II. | 506 | 23,7 |
| XI. | 472 | 22,7 | III. | 335 | 18,1 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 64 | 283 | 678 | 3011 | 1014 | 410 | 228 | 166 | 120 | 131 | 95 | 58 |
| ‰ K. | 0,15 | 0,52 | 1,3 | 5,6 | 1,9 | 0,76 | 0,32 | 0,30 | 0,22 | 0,24 | 0,18 | 0,12 |

In diesem Berichtsjahre sind 16 Grippeepidemien näher beschrieben. Sie haben meist nur einen mäßigen Umfang erreicht, außer in Sonderburg, wo innerhalb 5 Wochen 101,1 ‰ der Istsärke eines Bataillons von der Krankheit befallen wurden, und in Jena, wo von einem Bataillon 156 Mann in der Zeit vom 5. Dezember 1902 bis 24. Februar 1903 erkrankten.

In Berlin wurde die Grippe vom 15. Januar 1903 als endemisch herrschend angesehen.

Während bei der Epidemie in Jena ein Einfluß der Witterung nicht beobachtet wurde, häufte sich in Dresden die Zahl der Zugänge bei kaltem trockenem Wetter, starker Staubeentwicklung und Ostwind; mit dem Eintritt von Niederschlägen nahm die Zugangsziffer ab. Auch in Goldap war während der Epidemie das Wetter kalt und stürmisch. In Zittau wurde dagegen zweimal gleichzeitig mit dem Eintritt warmer nasser Witterung eine Erhöhung der Erkrankungsziffer bemerkt. Sämtliche Epidemien herrschten im Winter und besonders in den Monaten Januar und Februar.

Der Charakter der Epidemien wird im allgemeinen als leicht bezeichnet, nur in Gumbinnen war er schwerer, in Jena, Fulda und Zittau wurden verhältnismäßig oft Mitkrankheiten beobachtet.

Vorwiegend war, soweit aus den Berichten ersichtlich, die katarrhalische Form der Influenza, jedoch wurden auch oft nervös-rheumatische und gastrische Formen beobachtet.

In einer Anzahl von Fällen wurde die Diagnose durch den Nachweis der Erreger gestützt. Umfassendere bakteriologische Untersuchungen hat St.-A. Vagedes-Berlin angestellt. Sie sind von St.-A. Neuburger¹⁾ veröffentlicht. Mischinfektionen von Pneumokokken und Influenzastäbchen (Zittau, Berlin) und von Grippeerregern und Kettenkokken (Berlin) wurden mehrfach beobachtet.

Zu den bekannten Ausbrucherscheinungen der Grippe: Schmerzen im Kopf, in den Augenhöhlen, im Kreuz und in allen Gliedern, gesellte sich öfter auch Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Ohnmacht und einige Male Nackensteifigkeit, auch grobe, bis zur Hinfälligkeit gesteigerte Abgeschlagenheit.

Das Fieber, welches öfter mit Schüttelfrost einsetzte, hielt bei den nicht komplizierten Erkrankungen gewöhnlich nur einige Tage an.

Bei einer mit Nackensteifigkeit einhergehenden Grippeerkrankung (St.-A. Voigtel-Berlin), die bakteriologisch sichergestellt war, trat jeden 2. bis 3. Tag (jedoch nicht so regelmäßig wie bei Wechselfieber) morgens ein Anfall mit hohem Fieber (bis 40° und darüber) auf, wobei der Kranke wegen außerordentlich heftiger Kopf-, Augenhöhlen-, Nacken-, Kreuz- und Hüftnervenschmerzen laut jammerte. Nach 7 Anfällen blieb das Fieber fort. Der Mann wurde dienstfähig.

Unter den Komplikationen traten die Lungen- und Brustfellentzündungen in den Vordergrund.

Aus den Einzelberichten lassen sich 48 Lungenentzündungen zusammenstellen, doch kommt noch eine ganze Reihe nicht zahlenmäßig erwähnter Lungenentzündungen hinzu. Besonderen Anteil nahmen die Garnisonen Ulm und Zittau mit 16 bzw. 6 Lungenentzündungen bei einem Gesamtzugang von 93 bzw. 47 Grippekranken.

Bei einem in Ulm Verstorbenen wurde nach dem Tode neben rechtsseitiger eitriger Brustfell- und Herzbeutelentzündung ein Abszess im vorderen Mittelfellraum gefunden. Der Auswurf enthielt zu Lebzeiten des Kranken nahezu Reinkulturen von Grippeerregern.

7mal bestand bei Lungenentzündung gleichzeitig Brustfellentzündung (Tilsit, Zittau, Ulm) und 1mal doppelseitige Eiterbrust (Rathenow).

Bei einem Grippekranken in Schneidemühl entwickelte sich im Anschluß an Lungenentzündung eine schwere Verstopfung der linken Oberschenkelvene und später noch ein akuter Gelenkrheumatismus.

Über Brustfellentzündungen ohne vorhergehende Lungenentzündung wird zahlenmäßig 20mal berichtet, darunter über 6 trockene Entzündungen.

Chronische Lungen- bzw. Bronchialkatarrhe nach Grippe wurden 3mal (Berlin, Mutzig) beobachtet.

1mal schloß sich an Grippe eine tödlich verlaufende Lungentuberkulose (Gotha) und 1mal eine Miliartuberkulose (Zittau) an.

Einen Rückfall von Grippe mit doppelseitigem Lungen- spitzenkatarrh, der Invalidität verursachte, beobachtete St.-A. Gritzka-Schlettstadt.

¹⁾ Zum Krankheitsbild der Influenza. Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1903 Heft 4.

Schädigungen des Herzens sind 8mal beobachtet:

1mal (Ulm) trat ein Herzklappenfehler (Schlufsunfähigkeit der zweizeipfligen Klappe) und 1mal (Arolsen) eine Herzvergrößerung auf; 1 Mann (Stuttgart), der an Blutarmut und Grippe litt, mußte später wegen Herzschwäche entlassen werden. 5mal lag nervöse Herzstörung vor.

Über Nervenschmerzen wird 12mal berichtet.

2mal betrafen sie den oberen Augenhöhlennerven, 5mal den Hüftnerven, 3mal Zwischenrippennerven, 4mal den Nervus trigeminus, darunter 1mal bei Neuralgie des 2. Astes mit Bläschenausschlag der ganzen Gesichtshälfte.

Von einer Entzündung der beiden großen Schenkelnerven berichtet St.-A. Kühnemann-Spandau.

Eine Lähmung beider rückläufiger Kehlkopfnerve wurde in Fulda, eine Gaumensegellähmung von St.-A. Neuburger-Berlin beobachtet. Krampfartige Anfälle wurden bei einem Grippekranken in Sonderburg behandelt.

Auch Gehirnerkrankungen und geistige Störungen sind beobachtet worden:

Eine Hirnhautentzündung, die auf Grippeerreger, welche im Auswurf nachgewiesen waren, zurückgeführt wird, beschreibt St.-A. Bornikoel-Berlin. Der Kranke wurde geheilt, aber invalide.

Tödlich endete eine von St.-A. Krueger-Charlottenburg beobachtete Hirnhautentzündung. Auch hier wurden Influenzabazillen im Auswurf gefunden.

Ausgesprochene Nacken- und Rückensteifheit bei hohem Fieber, verbunden mit Nierenreizung, sah O.-St.-A. Schmidt-Rastatt bei einem Grippekranken.

St.-A. Plathner berichtet, daß 1 Zögling der Unteroffizier-Vorschule Annaburg nach Grippe eine vorübergehende seelische Störung zeigte.

Bei einem Kranken in Ulm, der am 5. Tage fieberfrei war, setzte am 15. Krankheitstage bzw. am 2. Tage der Genesung Schwermut ein. Ein Geschwisterkind vom Vater dieses Kranken litt ebenfalls an Geisteskrankheit.

Mumps wurde als Mitkrankheit 2mal (Zittau, Memel) beobachtet, Mittelohrentzündung 24 mal.

Milzschwellungen sind nur während der Epidemie in Zittau nachgewiesen, und zwar 16 mal unter 47 Kranken. Gelenkerkrankungen kamen im ganzen bei 8 Kranken zur Beobachtung, (Insterburg, Zittau (4), Bromberg, Fulda, Ulm).

Die gastrische Form der Grippe erregte 2mal (Stargard i. Pomm., Ludwigsburg) vorübergehend den Verdacht auf Typhus. — In Ludwigsburg konnte dabei die Widalsche Reaktion nicht nachgewiesen werden, dagegen wurde sie bei einer mit zahlreichen katarrhalischen Lungenentzündungsherden einhergehenden Grippe, bei der jedes Anzeichen für Typhus fehlte, von St.-A. Spiro-Mutzig beobachtet.

In Berlin (St.-A. Keyl) wurde 1 Mann mit den Erscheinungen der Blinddarmentzündung eingeliefert, dessen Erkrankung sich dann als Grippe herausstellte. In Jena wurde Blinddarmentzündung als Mitkrankheit 3mal festgestellt.

1 mal trat als Mitkrankung eine ausgedehnte Zellgewebsentzündung am Unterschenkel auf.

Leichte Schwellungen der Unterkieferdrüsen, verbunden mit Halsschmerzen ohne krankhaften Rachenbefund, wurden öfters in Memel festgestellt.

Bläschenausschlag im Gesicht (Herpes labialis) kam selten vor; dagegen beobachtete St.-A. Haferkorn-Zittau 2 mal einen 1 bis 2 Tage anhaltenden scharlachähnlichen Ausschlag ohne nachfolgende Hautschuppung und 1 mal mehrtägige Hautabschuppung ohne Ausschlag. Auch O.-St.-A. Eichbaum-Karlsruhe sah bei einem Grippekranken einen auf Druck nicht verschwindenden scharlachähnlichen Ausschlag, dem ausgedehnte Bläschenbildung auf der Haut und Abschuppung folgte.

Bei der Behandlung der Grippe sind neue Gesichtspunkte nicht aufgetreten.

13. Tuberkulose. (No. 18 bis 21 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-------------------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 147 | 1023 | 1,9 | 23 | 136 ¹⁾ | 923 | 1082 | 88 | 58,1 |

Außerdem erkrankten noch 3 Invaliden, 1 Kadett und 3 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

An Tuberkulose gingen zu

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| im Jahre 1890/91 | 1418 Mann = 3,3 ‰ K., |
| „ „ 1891/92 | 1361 „ = 3,1 „ |
| „ „ 1892/93 | 1051 „ = 2,4 „ |
| „ „ 1893/94 | 1110 „ = 2,4 „ |
| „ „ 1894/95 | 1144 „ = 2,3 „ |
| „ „ 1895/96 | 1162 „ = 2,3 „ |
| „ „ 1896/97 | 1108 „ = 2,2 „ |
| „ „ 1897/98 | 1002 „ = 1,9 „ |
| „ „ 1898/99 | 867 „ = 1,7 „ |
| „ „ 1899/1900 | 1097 „ = 2,1 „ |
| „ „ 1900/01 | 1075 „ = 2,0 „ |
| „ „ 1901/02 | 1119 „ = 2,1 „ |


im Jahre 1902/03 1023 Mann = 1,9 ‰ K.

Die nächsten drei Tabellen erläutern den Anteil der verschiedenen Erkrankungsformen der Tuberkulose an dem Gesamtzugänge sowie die Verteilung auf die einzelnen Armeekorps und Monate.

Verteilung der Tuberkulose auf die einzelnen Krankheitsformen.

| Krankheitsform (nach dem Rapportmuster) | Zahl der zugegangenen Kranken | ‰ K. | ‰ M. |
|--|-------------------------------|------|------|
| a. Akute Miliartuberkulose (No. 18 des Rapportmusters) | 29 | 0,06 | 0,09 |
| b. Tuberkulose der ersten Luftwege und Lunge (No. 19 des Rapportmusters) | 846 | 1,6 | 2,6 |
| c. Tuberkulose der Knochen und Gelenke (No. 20 des Rapportmusters) | 51 | 0,10 | 0,16 |
| d. Tuberkulose anderer Organe (No. 21 des Rapportmusters) | 97 | 0,18 | 0,30 |
| Summe | 1023 | 1,9 | 3,1 |

¹⁾ Außerdem starben 2 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.



1.1 - 2.0 ‰ K.

2.1 - 3.0 ‰ K.

3.1 - 4.0 ‰ K.

Stad-
bücherei
Elbing

Zugang an Tuberkulose nach Armeekorps.

| Armeekorps | 1896/97 bis 1900/01 | | 1902/03 | | Armeekorps | 1896/97 bis 1900/01 | | 1902/03 | |
|-------------------------|---------------------|-----|-------------|------|-----------------------|---------------------|-----|-------------|------|
| | % K. | | absol. Zahl | % K. | | % K. | | absol. Zahl | % K. |
| G. | 1,9 | 1,9 | 88 | 2,1 | XIII. (K. W.) . . . | 2,1 | 2,3 | 53 | 2,4 |
| I. | 2,2 | 2,5 | 64 | 2,0 | XIV. | 2,4 | 2,9 | 72 | 2,3 |
| II. | 2,1 | 2,4 | 44 | 1,7 | XV. | 1,8 | 1,8 | 59 | 1,9 |
| III. | 2,3 | 2,3 | 64 | 2,7 | XVI. | 2,0 | 1,9 | 36 | 1,3 |
| IV. | 1,7 | 1,4 | 26 | 1,2 | XVII. | 2,0 | 2,1 | 67 | 2,3 |
| V. | 1,5 | 1,6 | 35 | 1,4 | XVIII. | 1,9 ¹⁾ | 2,4 | 61 | 2,3 |
| VI. | 1,9 | 1,6 | 45 | 1,7 | XIX. (2. K. S.) . . . | 2,0 ¹⁾ | 2,2 | 36 | 1,7 |
| VII. | 1,9 | 2,2 | 57 | 2,1 | | | | | |
| VIII. | 1,7 | 1,9 | 56 | 2,1 | | | | | |
| IX. | 1,7 | 1,7 | 39 | 1,6 | I. Kgl. Bayer. . . . | 2,5 | 2,3 | 50 | 2,2 |
| X. | 2,7 | 2,6 | 42 | 1,9 | II. " " | 2,7 | 3,0 | 52 | 2,4 |
| XI. | 2,2 | 1,7 | 44 | 2,1 | III. " " | 1,3 ²⁾ | 1,7 | 27 | 1,5 |
| XII. (1. K. S.) | 1,9 | 1,7 | 35 | 1,8 | | | | | |

| Krankheitsform | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Summe des Zuganges | Abgang | | | | | | Summe des Abganges | Bestand bleiben | Behandlungstage | | |
|---|---------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------|---|
| | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | | dienstfähig | gestorben | anderweitig | in Summe | für jeden Kranken durchschnittlich | | | | | | |
| | | absolut | % der Behandelten | absolut | % der Behandelten | absolut | % der Behandelten | absolut | % der Behandelten | absolut | % der Behandelten | absolut | % der Behandelten | | absolut | % der Behandelten | absolut | % der Behandelten | absolut | % der Behandelten | | | | | |
| Akute Miliartuberkulose . . | 2 | 1 | — | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | — | 3 | 2 | 29 | — | — | 29 | 93,5 | 1 | 3,2 | 30 | 1 | 1 436 | 46,3 | |
| Tuberkulose der ersten Luftwege und Lunge . . . | 97 | 90 | 81 | 37 | 94 | 74 | 83 | 76 | 67 | 84 | 79 | 55 | 26 | 846 | — | — | 79 | 8,4 | 803 | 85,2 | 882 | 61 | 48 975 | 51,9 | |
| Tuberkulose der Knochen und Gelenke | 29 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | — | 51 | 3 | 3,8 | 5 | 6,3 | 57 | 71,3 | 65 | 15 | 8 737 | 109,2 | |
| Tuberkulose anderer Organe . . . | 19 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 14 | 17 | 7 | 10 | 14 | 6 | 1 | 97 | 20 | 17,2 | 23 | 19,8 | 62 | 53,4 | 105 | 11 | 8 794 | 75,8 | |
| Summe . . | 147 | 100 | 90 | 45 | 120 | 89 | 105 | 103 | 80 | 102 | 95 | 66 | 29 | 1023 | 23 | 2,0 | 136 | 11,6 | 923 | 78,9 | 1082 | 88 | 67 942 | 58,1 | |
| % K. . . | | 0,23 | 0,17 | 0,08 | 0,22 | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | 1,9 | — | — | 0,26 | — | — | — | — | — | — | — | — |

In den weiteren, auf Seite 38 befindlichen Übersichten ist der Krankenzugang an Tuberkulose nach den verschiedensten Gesichtspunkten erläutert. Die Beteiligung der einzelnen Armeekorps ist außerdem auf den Karten XIII bis XVI für die letzten 12 Jahre bildlich dargestellt.

a) Akute Miliartuberkulose. (No. 18 des Rapportmusters.)

Bei 11 berichteten Erkrankungen an Miliartuberkulose ist nur 1 mal erbliche Belastung erwähnt.

In 8 Fällen hat sich die Krankheit wahrscheinlich aus nachweisbaren älteren tuberkulösen Herden entwickelt:

1 mal (Krotoschin) aus einer verkästen Bronchialdrüse, 1 mal (Mörchingen) aus einer käsigen Eiter enthaltenden Höhle in einer Lungenspitze, 1 mal aus einer mit Abszessbildung einhergehenden Rippentuberkulose (Frankfurt a. O.); 6 mal bestand bei der Krankmeldung Lungenkatarrh, der 4 mal die Lungenspitzen befallen hatte (Mainz, Colmar i. E., Ludwigsburg,

Oldenburg) und 2 mal allgemein verbreitet war (Bautzen, Ludwigsburg).

Nur bei einem dieser 6 Kranken (Ludwigsburg) konnten Tuberkelbazillen (in spärlichem Auswurf) nachgewiesen werden. Hier wurden bei der Sektion auch ältere Darmgeschwüre gefunden.

Über 1 Fall mit ausgesprochenen Gehirnerscheinungen berichtet St.-A. Melot de Beauregard-Mörchingen. Bei der Sektion wurde allgemeine Miliartuberkulose (auch der weichen Hirnhaut) und fibrinös-eiterige Entzündung am Gehirngrund festgestellt.

Bei 3 Erkrankungen wurde anfangs an das Vorhandensein von Typhus gedacht.

Bemerkenswert sind 2 Erkrankungen mit tödlichem Ausgange, bei welchen die Leichenöffnung außer Miliartuberkulose der inneren Organe eiterig-sulzige Ausschwitzung an der Gehirngrundfläche in der Umgebung der Sehnervenkreuzung, Eiterstreifen längs der Gefäßfurche und stark erweiterte von blutiger Flüssigkeit erfüllte Gehirnkammern (Bromberg) sowie eine abgekapselte, haselnußgroße, mit dem Zelt der harten Hirnhaut verwachsene Geschwulst mit käsig-eiterigem Inhalt (Frankfurt a. M.) ergab. Die erstere Erkrankung ging von Anfang an mit

1) 3 jähriger Durchschnitt 1898/99 bis 1900/01.

2) 2 jähriger Durchschnitt 1899/1900 und 1900/01.

schweren Gehirnerscheinungen einher, der andere Kranke wurde nach Eröffnung eines kalten Rippenabszesses plötzlich $\frac{1}{4}$ Stunde lang bewußtlos. 3 Wochen später starb er plötzlich.

b) Tuberkulose der ersten Luftwege und Lunge. (No. 19 des Rapportmusters.)

Tuberkulöse Erkrankung der Nase ist nur 1 mal (Strafsburg i. E.) bei gleichzeitigem Bestehen einer Lungentuberkulose beobachtet; der eiterige Nasenausfluß enthielt zahlreiche Tuberkelbazillen.

Primäre Tuberkulose des Kehlkopfes ist in den Berichten nicht erwähnt; sekundäre wurde von St.-A. Voigtel-Berlin unter 25 Lungenschwindsüchtigen 9 mal festgestellt.

Nähere Angaben über erbliche Belastung sind nur bei 167 Kranken gemacht, bei 60 von ihnen war sie vorhanden.

Die Ansteckungsquelle liefs sich im allgemeinen nicht feststellen, doch war die Infektion bei einem Reservisten (Berlin) wahrscheinlich durch seine schwindsüchtige Frau, bei einem Mann in Verden durch einen tuberkulösen Stubenkameraden erfolgt.

Für den Ausbruch der Erkrankung werden meist Erkältungen, auch Überanstrengungen im Dienst, Grippe, Masern und Syphilis — je 1 mal — beschuldigt.

Einige Male traten die ersten tuberkulösen Erscheinungen im Anschluß an eine durch äußere Gewalt einwirkung verursachte Lungenblutung auf.

So nach Quetschung der Brust durch Sturz mit dem Pferde bei einem Kürassier in Königsberg i. Pr. (St.-A. Goronzek), 1 mal nach einem Falle beim Sprung über den Kasten (O.-St.-A. Baehr-Halle a. S.). Ein Unteroffizier in Oldenburg bekam Blutspeien, nachdem er von einem bockenden Pferde geprellt war; nach länger währendem Bronchialkatarrh wurden Tuberkelbazillen im Auswurf nachgewiesen.

1 mal (Darmstadt) setzte die Lungentuberkulose mit Bluthusten nach dem Reiten eines hochtrabenden Pferdes ein.

5 Wochen nach einer schweren Quetschung durch ein stürzendes Pferd trat bei einem schwindsüchtig aussehenden Mann in Ratibor doppelseitige Lungentuberkulose auf.

Die Diagnose wurde meist durch den Nachweis der Tuberkelbazillen im Auswurf festgestellt, doch gelang dies in 3 tödlich endenden Fällen zu Lebzeiten der Kranken nicht. 2 mal (Danzig, Beeskow) sicherte die Sektion nachträglich die Diagnose. Über den 3. Fall in Freiburg i. Baden liegt kein Leichenbefund vor.

Die Tuberkulinreaktion wurde zu diagnostischen Zwecken mehrmals angewandt.

Das von Burghart¹⁾ als Frühsymptom der Lungenschwindsucht angegebene Auftreten von feinblasigem Rasseln in den unteren Lungenabschnitten zwischen Brustwarzen und vorderer Achsellinie konnte St.-A. Bornikoel-Berlin bei 25 Kranken niemals finden. Dagegen schien ihm das von Dieudonné empfohlene Verfahren, durch innere Verabreichung von Jodkalium eine vermehrte Absonderung anzuregen, bei einem

Kranken das Erkennen der Krankheit zu erleichtern. Andererseits sah St.-A. Grimm-Frankfurt a. M. bei Verabreichung von Jodkali zu diagnostischen Zwecken bei einem Kranken vorübergehend eine sehr bedrohliche Verschlimmerung eintreten und mahnt zur Vorsicht.

Das von Alexander¹⁾ empfohlene Hilfsmittel der Wirbelbeklopfung zur Stellung der Frühdiagnose hat St.-A. Bornikoel keine sicheren Vorteile geboten, wenn auch öfter eine Schallabschwächung auf dem 7. Halswirbel gleichzeitig mit einem solchen über der Lungenspitze auftrat.

Einige Erkrankungen an Lungentuberkulose boten klinisch erwähnenswerte Erscheinungen:

O.-A. Becker-Beeskow beobachtete eine in $2\frac{1}{2}$ Monaten tödlich endende, mit hohem Fieber verlaufende Lungentuberkulose, welche mitten im fieberhaften Verlauf ein Intervall von 6 Tagen mit subnormalen Temperaturen von 35 bis 36° aufwies.

1 mal (St.-A. Hanel-Coblenz) setzte die Lungentuberkulose mit allgemeiner Neigung zu Blutungen aus den Schleimhäuten und unter die Körperhaut ein.

Eine mit primärem Blasenwurm der Lunge komplizierte Lungentuberkulose, welche tödlich verlief, beobachtete O.-St.-A. Mankiewitz-Danzig. Bei der Obduktion wurden in den anderen Organen keine Blasenwürmer gefunden.

Eine Verstopfung der rechten Schenkelblutader bei Lungenschwindsucht beobachtete St.-A. Aschenbach-Metz.

Mit ungewöhnlich starken Veränderungen an den Klappen der Lungenschlagader, in deren Auflagerungen kleine dem Bakterium coli ähnliche Stäbchen, Streptokokken und Tuberkelbazillen gefunden wurden, verlief eine von St.-A. Knoch-Düsseldorf beobachtete Lungentuberkulose²⁾.

Über eine für einen Finger durchgängige Verbindung zwischen einer tuberkulösen Höhle im rechten untersten Lungensappen und einer Abszesshöhle zwischen Leber und Zwerchfell bei einem an Miliartuberkulose gestorbenen Mann berichtet St.-A. Kietz-Göttingen.

Bei einem Mann mit Lungentuberkulose, die mit Lungenentzündung begonnen hatte und mit eiterigem Mittelohrkatarrh kompliziert war, fand St.-A. Neuhaus-Magdeburg im Mittelohreiter ausschließlich Pneumokokken.

In der Behandlung der Tuberkulose ist gegen die Vorjahre kein wesentlicher Unterschied eingetreten; es kamen hauptsächlich Freiluftliegekuren, gute Ernährung und innerlich Kreosot in Anwendung.

St.-A. Neuhaus-Magdeburg sah bei 4 Kranken von dem Kochschen Alt-Tuberkulin in Verbindung mit kräftiger Ernährung und innerer Darreichung von Kreosot sehr gute Erfolge.

St.-A. Binder-Braunschweig lobt die Laevulose, St.-A. Beck-Mergentheim den Sulsoosotsirup. Auch die Landerersche Einspritzung von zimtsaurem Natrium in die Blutadern (die jedoch nicht immer vertragen wird, O.-St.-A. Mankiewitz), schien bei 7 Kranken (St.-A. Holzinger-Ludwigsburg) entschieden günstig einzuwirken, da eine Gewichtszunahme bis zu 10 kg in 86 Tagen erzielt wurde. Ähnliche Gewichtszunahmen wurden jedoch auch bei der allgemeinen hygienisch-diätetischen Behandlung in Verbindung mit Kreosot von St.-A. Goronzek-Königsberg i. Pr. beobachtet.

¹⁾ Deutsche medizinische Wochenschrift 1903, II. 31.

²⁾ Bericht der Niederrheinischen militärärztlichen Gesellschaft. (Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1903, H. 5.)

Durch das Tuberkuloalbumin wurde nach St.-A. Sachse-Allenstein bei 2 Kranken 5 bzw. 3 Wochen lang die Temperatur entschieden günstig beeinflusst. Auswurf und Lungenbefund blieben jedoch unverändert. Auffallend war aber bei lokaler Anwendung die heilende Wirkung auf Kehlkopfgeschwüre.

St.-A. Aschenbach wandte bei einem Kranken die Einspritzungen von Ameisensäure in wässriger Lösung unter die Haut nach Krull-Güstrow ohne Erfolg an.

Bei 4 Kranken wurden heftige Lungenblutungen durch Gelatineeinspritzungen unter die Haut zum raschen Stillstand bzw. Verschwinden gebracht (St.-A. Reinhard-Straßburg i. E.). Die 2% Gelatinelösung (in physiologischer Kochsalzlösung) bewirkte stets einen Temperaturanstieg bis 40°, der aber schon am nächsten Tage verschwunden war und Wohlbefinden Platz machte.

c) Tuberkulose der Knochen und Gelenke. (No. 20 des Rapportmusters.)

Erbliche Belastung wird hier sehr selten erwähnt.

Als Ursache werden meist mechanische Verletzungen (Stoß, Fall, Quetschung u. s. w.) angegeben.

2 mal (Diedenhofen und St. A. v. d. A.) begann die Erkrankung unter dem Bilde eines akuten Gelenkrheumatismus mit Beteiligung mehrerer Gelenke. Während sich später schwerere tuberkulöse Veränderungen nur an einem Gelenk ausbildeten, heilten die übrigen entzündet gewesenen Gelenke wieder.

Eine Tuberkulose des 7. und 8. Brustwirbels (Saarburg) machte anfangs den Eindruck einer Lungenentzündung.

Eine rechtsseitige Hüftgelenktuberkulose begann unter dem Bilde einer Blinddarmentzündung. Erst die operative Eröffnung eines in der vorgewölbten Blinddarmgegend sich kennzeichnenden, bis zur Leber und ins kleine Becken hinab reichenden Abszesses, brachte die Aufklärung (St.-A. Grüber-Berlin).

Erwähnenswert ist auch die Beobachtung von St.-A. Osann-Freiburg i. Baden, daß eine Lungentuberkulose, welche häufige Lungenblutungen und starken Kräfteverfall des Kranken verursacht hatte, vollkommen zurückging, nachdem ein Arm des Kranken, dessen Ellenbogengelenk schwere Tuberkulose zeigte, abgesetzt war.

Infolge Tuberkulose des 9. und 10. Brustwirbels trat bei einem Mann in Meiningen eine vollkommene Lähmung der Beine, der Blase und des Mastdarmes auf, zu der dann später eine zum Tode führende Hirnhautentzündung trat.

St.-A. Sydow-Hannover beobachtete eine Tuberkulose des 2. und 3. Lendenwirbels mit Senkungsabszesses, der mit 9 Monate anhaltendem Fieber zwischen 37° und 39° verlief, dann aber allmählich ohne Eröffnung des Abszesses heilte und nur eine Steifheit der Wirbelsäule zurückließ.

Bei einer umschriebenen Tuberkulose am Jochbein (Altona) und einer rückfälligen Tuberkulose am Schambein (Magdeburg) wurde durch Operation Dienstfähigkeit erreicht.

Die Behandlung erheischte meistens größere operative Eingriffe, über die die Operationsliste Auskunft gibt.

Bei der abwartenden Behandlung wurde Jodoformglyzerin und 3 mal die Biersche Stauung angewendet.

Durch letztere wurde 2 mal (Colmar i. E., Oppeln) bei Tuberkulose des Knie- und Ellenbogengelenks Besserung, 1 mal (Mergentheim) bei Tuberkulose der Handwurzelknochen, kein Erfolg erzielt.

d) Tuberkulose anderer Organe. (No. 21 des Rapportmusters.)

Über einen Solitär tuberkel, der von der harten Hirnhaut ausging, die Größe einer halben Walnuss hatte und in der motorischen Zone lag, berichtet St.-A. Naether-Dresden.

Wegen rechtsseitiger Kopfschmerzen, links beginnender epileptischer Krämpfe und leichter linksseitiger Gesichtslähmung mußte ein Kasernenwärter in Dresden operiert werden. (Operationsliste No. 22.)

Von 4 Hirnhautentzündungen ist eine (Cleve) wegen des Auftretens von Chorioidealtuberkeln und einer Stauungspapille erwähnenswert.

Ein anderes Mal setzte die Hirnhautentzündung nach einer unter dem Bilde des subakuten Gelenkrheumatismus verlaufenden Erkrankung ein. (St.-A. Bornikoe-Berlin.)

Durch multiple Geschwulstbildung ist folgende Erkrankung bemerkenswert:

Ein Grenadier in Dresden erkrankte unter den Erscheinungen eines hochfieberhaften Gelenkrheumatismus. Jeden Abend auftretende Schüttelfröste mit Milzschwellung, Brustfell- und Herzinnenhautentzündung erweckten bald darauf den Eindruck, daß eine Septikämie (Blutvergiftung) vorliege, besonders, da in dem blutig-serösen Brustfellerguß Staphylokokken nachgewiesen wurden. Im weiteren Verlauf traten Geschwulstbildungen in der Lebergegend und Drüsenanschwellungen über den Schlüsselbeinen auf. Nach dem 9 Monate später erfolgten Tode fanden sich im Mittelfell an den Lungenwurzeln bis apfelgroße Geschwülste, die auf Durchschnitten am Rande markiges in der Mitte erweichtes Gewebe zeigten und durchaus das Ansehen von Sarkomen hatten. Auch in den meisten übrigen Organen fanden sich ähnliche, aber nur stecknadelkopf- bis erbsengroße Geschwülste. Der mikroskopische Befund ergab typischen Tuberkelcharakter der Geschwülste. (St.-A. Naether.)

Bei Bauchfellentzündung mit Erguß schwand der Erguß bei 3 Kranken ohne operativen Eingriff, und zwar 1 mal unter Einreiben des Bauches mit Schmierseife (St.-A. Voigtel-Berlin). Bei diesem Kranken stieg das Körpergewicht in 2 Monaten um 10,5 kg. Die beiden anderen Kranken waren mit hydropathischen Umschlägen (Colmar i. E.), bzw. symptomatisch-diätetisch behandelt (Magdeburg). — 5 mal wurde zur Heilung der tuberkulösen Bauchwassersucht der Bauchschnitt gemacht (s. Operationsliste unter B. 2), 4 mal mit gutem Erfolge (Stettin, Hamburg, Altona, Gumbinnen), 1 mal (Breslau) konnte der Tod nicht aufgehalten werden.

Bei den tuberkulösen Geschwülsten in der Bauchhöhle versagte fast stets eine operative Behandlung.

Dem Ausbruch der Hodentuberkulose ging bei 20 Erkrankungen 12 mal Quetschung des Organs voraus.

Die Tuberkulose der Lymphdrüsen betraf 19 mal Halsdrüsen, darunter 1 mal (Meiningen) zugleich die Achseldrüsen. — 1 mal (Altona) war eine verkäste Ohrspeicheldrüse mit Lymphdrüsentuberkulose verbunden.

Eine fressende Flechte, welche ihren Sitz oberhalb des Handgelenks an der Beugeseite des Unterarms hatte, wurde bei einem Mann in Mörchingen von St.-A. Schayer durch Behandlung mit Milchsäure beseitigt.

Eine zweifelhafte Tuberkulose der Blase (Tübingen) wurde durch die Tuberkulinreaktion sichergestellt. Später wurden auch Tuberkelbazillen im Urin nachgewiesen.

Eine tuberkulöse Erkrankung des Blinddarms (Halberstadt) und zwei tuberkulöse Erkrankungen der Weichteile am Unterschenkel (Danzig, Graudenz) sind in der Operationsliste näher beschrieben.

14. *Ruhr.* (No. 22 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl. | ‰ K. | diens- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 3 | 90 | 0,17 | 68 | 1 | 2 | 71 | 22 | 18,3 |

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1881/82 bis 1885/86 | 582,2 Mann = 1,4 ‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 | 101,2 „ = 0,24 „ „ |
| 1891/92 „ 1895/96 | 148,0 „ = 0,31 „ „ |
| 1896/97 „ 1900/01 | 183,8 „ = 0,35 „ „ |
| im Jahre 1901/02 | 26 „ = 0,05 „ „ |
| im Jahre 1902/03 | 90 Mann = 0,17 ‰ K. |

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|---------|-----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | — | — | X. | 1 | 0,05 |
| I. | 1 | 0,03 | XI. | 2 | 0,10 |
| II. | 5 | 0,19 | XII. (1. K. S.) | 1 | 0,05 |
| III. | 1 | 0,04 | XIII. (K. W.) | 3 | 0,14 |
| IV. | — | — | XIV. | — | — |
| V. | 1 | 0,04 | XV. | — | — |
| VI. | — | — | XVI. | 2 | 0,07 |
| VII. | — | — | XVII. | 70 | 2,4 |
| VIII. | 2 | 0,07 | XVIII. | — | — |
| IX. | 1 | 0,04 | XIX. (2. K. S.) | — | — |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 4 | 31 | 51 |
| ‰ K. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,06 | 0,11 |

Eine Ruhrepidemie (51 Fälle), die das II. und III. Bataillon des Danziger Infanterie-Regiments No. 128 betraf, kam auf dem Schießplatz Gruppe vor. Die Einschleppung geschah durch die umwohnende Zivilbevölkerung, unter der Ruhr endemisch ist. Die meisten Erkrankungen verliefen leicht, einige mittelschwer (Graudenz).

3 akute Ruhrfälle und 11 ruhrverdächtige Erkrankungen kamen in Inowrazlaw in Behandlung. Die Ansteckung war wahrscheinlich während einer Ortsunterkunft in Dörfern an der russischen Grenze durch 2 ruhrkranke russisch-polnische Arbeiter erfolgt.

Bei 2 weiteren akuten Erkrankungen (Prenzlau und Braunschweig) fehlte jeder Anhalt für die Ansteckungsquelle.

Die chronische Form der Ruhr wurde 8 mal beobachtet. 5 mal hatte die Infektion in China, 1 mal bei einem ehemaligen Fremdenlegionär in Tongking, 1 mal im Inneren von Kamerun, 1 mal im Döberitzer Lager stattgefunden. Die Infektionen lagen bis über 2 Jahre zurück. Bei 3 Kranken (Trier, Berlin), die sich während der ostasiatischen Expedition bzw. in Kamerun angesteckt hatten, konnten noch 1/2—1 1/2 Jahre nach der Infektion Ruhramöben im Stuhl nachgewiesen werden.

Die im Auslande erworbenen Ruhrerkrankungen waren 2 mal mit Leberabszessen (Altona und Trier) und 2 mal mit Wechselfieber kompliziert (Berlin und Trier). Der letztere Kranke, der im Oktober 1901 in China an Ruhr erkrankte und im Oktober 1902 einen Leberabszess und Wechselfieber bekam, hatte zwischendurch (Juni 1902) einen Typhus überstanden.

Bei der Behandlung der Ruhr hatte St.-A. Voigtel-Berlin bei 2 von ihm beobachteten Erkrankungen an chronischer Ruhr gute Heilerfolge mit emetinfreier Ipekakuanhawurzel.

Die Anwendung erfolgte nach der von O.-A. Pannwitz herrührenden, von St.-A. Schulz im X. Bande der Bibliothek von Coler, S. 239 zitierten Angabe, nur daß die Verabreichung von Kalomel unterblieb, da es sich um ältere Fälle handelte. Auch gelang es nicht, den Kranken Gaben von 1,0 g beizubringen, da sie erbrochen wurden. Dagegen wurden Pulver von 0,5 g in Oblaten 3 bis 4 mal täglich ohne Beschwerden mehrere Tage hintereinander gut vertragen. Schon nach kurzer Behandlungszeit wurden die Amöben unbeweglich und verschwanden aus dem Stuhl, der auch bald normal wurde.

15. *Asiatische und einheimische Cholera.* (No. 23 und 24 des Rapportmusters.)

Sind in diesem Berichtsjahre nicht vorgekommen.

16. *Epidemische Genickstarre.* (No. 25 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | diens- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 36 | 0,07 | 19 | 7 | 10 | 36 | — | 37,8 |

Über die Zahl der Erkrankungen und über die Sterblichkeit während der letzten 22 Jahre gibt die folgende Übersicht Aufschluß.

| Berichts- zeitraum | Bestand waren | Zugang | | Gestorben | |
|-------------------------------|------------------|---------|------|-----------|---------------------------|
| | | absolut | ‰ K. | absolut | ‰ der Be- handelten |
| 1881/82 bis 1885/86 | 6 | 9,6 | 0,03 | 4,4 | 40,7 |
| 1886/87 - 1890/91 | 2 | 27,6 | 0,07 | 11,0 | 39,3 |
| 1891/92 „ 1895/96 | 6 | 37,8 | 0,08 | 16,6 | 37,9 |
| 1896/97 „ 1900/01 | 3 | 20,0 | 0,04 | 8,6 | 41,7 |
| 1901/02 | 1 | 17 | 0,03 | 7 | 38,9 |
| 1902/03 | — | 36 | 0,07 | 7 | 19,4 |

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Zahl der Zugänge erhöht, während sich das Verhältnis der Gestorbenen zur Zahl der Behandelten äußerst günstig stellt.

Die Verteilung auf die Monate war folgende:

| | Es gingen zu im | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. Zahl | — | — | 1 | 2 | 8 | 17 | 5 | 1 | 1 | — | 1 | — |

In der nachstehenden Tabelle ist die Verteilung der Erkrankungen an epidemischer Genickstarre auf die einzelnen Armeekorps für die Jahre 1881/82 bis 1902/03 angegeben.

Die in den Berichten näher beschriebenen 33 Erkrankungen an epidemischer Genickstarre kamen bis auf einen Fall (Breslau) vorwiegend im Winter und Frühjahr in Zugang.

Über ein epidemisches Auftreten der Krankheit im Februar und März 1903 beim I. Bataillon Infanterie-Regiments Hessen-Homburg No. 166 in Hanau mit 18 Zugängen wird von St.-A. Schunck berichtet.

| Berichts- jahr | Zugang beim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Armee | | |
|-------------------|-----------------|------------|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------------------|-----------------|------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----|
| | Garde- korps | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. (1.K.S.) | XIII. (K.W.) | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | XVIII. | | XIX. (2.K.S.) | |
| | | Armeekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1881/82 . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 1882/83 . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 ¹⁾ | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 1883/84 . . . | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 1884/85 . . . | 1 | — | — | — | — | — | 9 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 1885/86 . . . | 2 | 1 | — | — | — | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | — | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 23 |
| 1886/87 . . . | — | 1 | 4 | 1 | — | — | 5 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 2 | — | 5 | — | — | — | — | 21 |
| 1887/88 . . . | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 5 | 5 | — | 23 | 3 | 2 | 22 | — | — | — | — | — | 65 |
| 1888/89 . . . | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 4 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | 22 |
| 1889/90 . . . | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 1 | — | 3 | 7 | — | — | — | — | — | 19 |
| 1890/91 . . . | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 ²⁾ | 1 ²⁾ | — | — | — | 11 |
| 1891/92 . . . | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 8 | 6 | — | — | — | 18 |
| 1892/93 . . . | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 14 | — | 1 | — | — | — | 25 |
| 1893/94 . . . | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 19 | 2 | 25 | 4 | 1 | 5 | — | — | — | — | 60 |
| 1894/95 . . . | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 6 | — | 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | — | — | — | 46 |
| 1895/96 . . . | 4 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | — | 4 | 1 | — | — | — | 40 |
| 1896/97 . . . | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 7 | — | 4 | 4 | 8 | 2 | — | 5 | — | — | — | — | 38 |
| 1897/98 . . . | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 4 | 3 | 4 | — | — | — | — | 16 |
| 1898/99 . . . | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 3 | — ³⁾ | — ³⁾ | — ³⁾ | 7 |
| 1899/1900 . . | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | 12 | — | — | 22 |
| 1900/01 . . . | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 5 | — | 6 | — | — | 17 |
| 1901/02 . . . | 6 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 1902/03 . . | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | 23 | — | — | 36 |
| Summe . . | 24 | 11 | 8 | 8 | 3 | 17 | 14 | 17 | 9 | 25 | 13 | 48 | 41 | 82 | 56 | 56 | 43 | 9 | 42 | 2 | 528 | |

Die Ansteckung wird bei dieser Epidemie, ebenso wie bei den Erkrankungen in den Jahren 1894, 1895, 1900 und 1901 darauf zurückgeführt, daß die Krankheitserreger in den Kasernenräumlichkeiten vorhanden waren.

¹⁾ Erst seit 1882/83 hier mit verrechnet.

²⁾ Erst 1890/91 formiert.

³⁾ Erst 1898/99 formiert.

Bei den vereinzelt aufgetretenen Erkrankungen konnte nur einmal ein Anhalt für den Weg der Infektion gefunden werden:

Ein als Bursche nach Berlin kommandierter Musketier, der nach Rückkehr von seinem Kommando in Butzbach (Lazarett Giefßen) erkrankte, hatte in einem Hause gewohnt, in dem ein Dienstmädchen an epidemischer Genickstarre erkrankte.

Die vereinzelt aufgetretenen Erkrankungen waren im allgemeinen schwer, nur 1mal (Marburg) wird über eine leichte Erkrankung berichtet, die sich an eine Mandelentzündung an-

schloß. Es war nur hohes Fieber, Kopfschmerzen, starke Benommenheit und Druckempfindlichkeit der Wirbelsäule vorhanden gewesen. Da kurz vorher ein Mann von derselben Kompagnie mit ausgesprochener epidemischer Genickstarre in Zugang gekommen war, wurde diese Erkrankung als abortive Form der Genickstarre angesehen.

Von 18 in Hanau Erkrankten wurden 16 wieder dienstfähig, eine Erkrankung verlief tödlich, und eine führte zur Invalidität.

Der letztere Kranke hatte so starke Erregungszustände gezeigt, daß zeitweise außer der Verabreichung großer Gaben von Morphinum zur Narkose geschritten werden mußte. Auffällig war am Krankheitsbilde ein sehr schneller Wechsel zwischen völliger Orientiertheit und vollständiger Unbesinnlichkeit. Im Nasenschleim wurde der Meningococcus intracellularis Jäger-Weichselbaum nachgewiesen.

Lähmung des linken äußeren geraden Augenmuskels, Schwanken bei geschlossenen Augen, mangelhafte Orientierung bei zusammengesetzten Bewegungen und zunehmende Entzündung beider Sehnerven wurden bei einem Kranken von St.-A. Friedrichs-Giefßen beobachtet.

Lähmungen der verschiedensten Muskeln werden außerdem von mehreren Berichterstattern erwähnt.

O.-A. Werner-Liegnitz sah 1mal Gelbsucht, 3mal Eiweißharnen, 2mal Fehlen der Kniesehnenreflexe, 1mal Gelenkschwellungen, 1mal längere Zeit anhaltende Gedächtnisschwäche und 1mal das Kernigsche Symptom bei 3 von ihm behandelten Kranken.

Bläschenausschlag wurde in Hanau bei den beiden schwer Erkrankten beobachtet, bei den 16 Leichtkranken fand er sich nur 2mal.

Der Erreger der epidemischen Genickstarre wurde 3mal (St.-A. Voigtel, St.-A. Walter, St.-A. Blecher) in der durch Punktion gewonnenen Flüssigkeit des Wirbelkanals gefunden, 1mal auch im Venenblut; 4mal (St.-A. Brüning, St.-A. Schunck, St.-A. Baum-

garten) wurde er aus dem Nasenschleim, zweimal (St.-A. Schunck, O.-St.-A. Wegelj) aus der durch Leichenöffnung gewonnenen eiterigen Gehirnflüssigkeit gezüchtet.

Die Behandlung war stets rein symptomatisch.

17. *Starrkrampf (Trismus, Tetanus)*. (No. 26 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 5 | 0,01 | 2 | 1 | 2 | 5 | — | 48,8 |

Unter den 3 Erkrankungen, über die berichtet ist, verliefen 2 unter schweren Erscheinungen tödlich, eine mit leichterem Verlauf ging in Heilung über.

Der Starrkrampferreger wurde in keinem Falle bakteriologisch nachgewiesen. Als mutmaßliche Eintrittspforte für den Erreger wurden 1mal (O.-St.-A. Brix-Posen) leichte Verletzungen an den Unterschenkeln, die von dem Manne mit schmutzigen Binden selbst verbunden waren, 1mal (St.-A. Hinze-Naumburg a. S.) Brand der Zehen infolge Erfrierens angesehen. Bei dem geheilten Ulanen in Hanau schien die Erkrankung durch Wundreitesgeschwüre verursacht zu sein.

Die Behandlung bestand in allen 3 Fällen, abgesehen von betäubenden Mitteln, in der Einspritzung von Tetanusantitoxin, und zwar wurden 200 bis 500 Einheiten verabfolgt. Zweimal trat ein auffallender Nachlaß der Krämpfe ein, der einmal zur Heilung führte.

Zweite Unterart: Gelenkrheumatismus und Gicht.

(No. 27 bis 29 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | | |
| 201 | 4589 | 8,7 | 3468 | 72,4 | 13 | 0,27 | 1073 | 22,4 | 4554 | 95,1 | 236 | 198081 | 41,4 |

Akuter Gelenkrheumatismus. (No. 27 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 175 | 4281 | 8,1 | 3351 | 13 | 868 | 4232 | 224 | 40,0 |

Von den 4281 Zugängen an akutem Gelenkrheumatismus waren im Berichtsjahre 394 einmal, 68 zweimal, 7 dreimal,

3 viermal und 1 fünfmal rückfällig, so daß die wirkliche Zahl der Erkrankten 3713 beträgt.

Außerdem erkrankten noch 13 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 269 Kadetten und 149 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 1881/82 bis 1885/86 . . . | 3487,5 Mann | = 9,2 ‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 . . . | 4059,2 „ | = 9,8 „ |
| 1891/92 „ 1895/96 . . . | 4221,4 „ | = 8,9 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 . . . | 3972,0 „ | = 7,7 „ |
| im Jahre 1901/02 . . . | 4006 „ | = 7,4 „ |
| im Jahre 1902/03 . . . | 4281 Mann | = 8,1 ‰ K. |

Erkrankungen an akutem und chronischem Gelenkrheumatismus

in den größeren¹⁾ Garnisonen der deutschen Armee, alphabetisch geordnet und auf 1000 Mann der Iststärke berechnet.

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ²⁾ | 1902/03 | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| | bis 1885/86 ³⁾ | bis 1890/91 ²⁾ | bis 1895/96 ²⁾ | bis 1900/01 ²⁾ | | Durchschnittszugang ‰ K. | Ist- stärke |
| Aachen | 8,8 | 8,3 | 7,1 | 7,9 | 13,5 | 1 826 | 7,7 |
| Allenstein | 37,4 ³⁾ | 7,5 | 6,5 | 8,4 | 6,0 | 3 862 | 9,1 |
| Altenburg | 6,9 | 7,4 | 11,6 | 5,5 | 7,4 | 1 188 | 0,84 |
| Altona-Hamburg | 10,2 | 8,6 | 14,9 | 10,4 | 10,6 | 4 489 | 9,1 |
| Amberg | 16,8 | 12,1 | 10,8 | 10,5 | 17,5 | 1 633 | 10,4 |
| Augsburg | 29,3 | 25,0 | 16,1 | 10,9 | 15,1 | 2 680 | 8,2 |
| St. Averd | 16,8 | 5,0 | 9,5 | 6,0 | 5,5 | 2 479 | 5,2 |
| Bamberg | 13,7 | 16,2 | 14,2 | 9,8 | 8,7 | 2 181 | 19,3 |
| Bautzen | 20,8 | 24,1 | 16,4 | 12,4 | 17,9 | 1 768 | 15,3 |
| Bayreuth | 13,4 | 15,3 | 11,8 | 10,2 | 9,0 | 2 152 | 9,3 |
| Berlin | 10,2 | 11,1 | 12,2 | 7,9 | 7,2 | 27 694 | 10,0 |
| Bitsch | 8,3 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 1,7 | 1 909 | 7,9 |
| Bonn | 7,9 | 6,4 | 6,8 | 3,7 | 2,0 | 1 421 | 4,2 |
| Brandenburg a. H. | 11,1 | 8,2 | 9,8 | 7,1 | 4,5 | 3 615 | 4,1 |
| Braunschweig | 12,8 | 14,2 | 11,8 | 7,2 | 5,5 | 2 784 | 5,0 |
| Bremen | 4,4 | 4,3 | 7,2 | 5,2 | 8,6 | 1 324 | 13,6 |
| Breslau | 12,4 | 13,0 | 9,9 | 5,6 | 7,1 | 5 581 | 5,2 |
| Brieg | 7,0 | 10,7 | 10,1 | 6,3 | 6,1 | 2 334 | 4,7 |
| Bromberg | 9,6 | 9,2 | 6,9 | 7,1 | 3,9 | 5 355 | 3,9 |
| Cassel | 9,0 | 8,5 | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 4 803 | 10,4 |
| Celle | 12,7 | 11,3 | 7,3 | 5,8 | 3,8 | 2 120 | 5,1 |
| Charlottenburg | 7,8 | 7,4 | 2,9 | 9,6 | 9,6 | 2 189 | 7,8 |
| Chemnitz | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 13,0 | 16,5 | 3 278 | 12,8 |
| Coblenz-Ehrenbreit- stein | 5,8 | 5,7 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 6 833 | 6,0 |
| Cöln-Deutz | 9,7 | 10,8 | 8,6 | 6,9 | 5,1 | 10 122 | 6,3 |
| Colmar i. E. | 13,8 | 12,0 | 8,8 | 7,9 | 5,9 | 2 926 | 7,2 |
| Cosel | 12,0 | 8,3 | 5,8 | 3,7 | 3,2 | 1 261 | 7,9 |
| Cottbus | 8,7 | 10,8 | 5,8 | 3,7 | 6,5 | 1 295 | 3,9 |
| Cüstrin | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 7,1 | 5,8 | 1 841 | 7,1 |
| Danzig | 8,1 | 9,2 | 8,0 | 11,4 | 5,6 | 7 548 | 6,4 |
| Darmstadt | 15,8 | 13,7 | 15,2 | 8,2 | 5,2 | 5 163 | 12,4 |
| Dessau | 7,7 | 8,7 | 5,0 | 10,8 | 10,9 | 1 257 | 1,6 |
| Deutsch-Eylau | 9,0 | 15,9 | 16,2 | 9,4 | 12,3 | 2 622 | 5,3 |
| Diedenhofen | 6,9 | 8,7 | 7,0 | 6,4 | 5,5 | 3 086 | 4,3 |
| Dieuze | — | 10,4 ⁴⁾ | 9,4 | 4,4 | 7,0 | 2 683 | 4,1 |
| Döbeln | — | 10,7 ⁴⁾ | 13,7 | 7,6 | 8,4 | 1 778 | 10,1 |
| Dresden | 22,7 | 21,0 | 16,0 | 13,8 | 12,6 | 11 196 | 14,5 |
| Düsseldorf | 11,2 | 8,5 | 9,5 | 7,9 | 6,3 | 3 840 | 7,6 |
| Erfurt | 8,3 | 8,3 | 5,0 | 6,0 | 9,1 | 2 020 | 13,4 |
| Erlangen | 9,2 ⁵⁾ | 21,5 | 12,7 | 8,2 | 13,5 | 2 116 | 9,0 |
| Flensburg | 6,6 | 10,3 | 6,6 | 5,4 | 10,8 | 1 289 | 10,9 |
| Frankfurt a. M. | 10,1 | 18,8 | 11,0 | 7,0 | 10,7 | 2 651 | 15,5 |
| Frankfurt a. O. | 13,1 | 11,1 | 7,6 | 8,4 | 8,8 | 5 268 | 7,8 |
| Freiburg i. Baden | 18,1 | 20,9 | 20,3 | 10,3 | 4,6 | 2 813 | 5,3 |
| Fürth | — | — | 9,8 | 5,8 | 2,4 | 1 215 | 6,6 |
| Germersheim | 14,8 | 16,1 | 15,9 | 5,0 | 10,7 | 1 939 | 13,4 |
| Giefßen | 11,9 | 16,3 | 10,7 | 10,4 | 6,7 | 1 930 | 16,6 |
| Glatz | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 4,5 | 2,8 | 1 757 | 3,4 |
| Gleitwitz | 11,1 | 8,5 | 6,6 | 7,4 | 6,0 | 1 831 | 9,3 |
| Glogau | 11,5 | 12,3 | 8,8 | 9,1 | 12,1 | 3 395 | 4,7 |
| Gnesen | 7,7 | 6,4 | 8,9 | 5,1 | 9,2 | 2 474 | 10,5 |
| Görlitz | 9,3 | 16,7 | 8,8 | 4,7 | 5,3 | 1 289 | 16,3 |
| Göttingen | 29,2 | 19,6 | 17,0 | 7,7 | 5,2 | 1 855 | 6,5 |
| Goldap | 12,9 ⁶⁾ | 12,1 | 15,5 | 9,2 | 7,9 | 1 406 | 4,3 |
| Graudenz | 5,0 | 8,7 | 9,2 | 7,1 | 5,3 | 5 802 | 4,5 |
| Groß-Lichterfelde | 9,3 | 4,5 | 11,1 | 7,7 | 3,3 | 1 508 | 10,6 |
| Gumbinnen | 9,4 | 6,6 | 9,6 | 8,5 | 7,9 | 2 887 | 7,3 |
| Hagenau | 9,0 | 13,7 | 8,2 | 7,5 | 7,2 | 3 881 | 2,6 |
| Hagenau (Truppen- übungsplatz) | — | — | — | 1,3 | 1,0 | 3 000 | 1,0 |
| Halberstadt | 9,7 | 10,4 | 5,9 | 8,4 | 12,1 | 2 367 | 7,2 |
| Halle a. S. | 11,1 | 6,6 | 7,1 | 8,0 | 8,2 | 2 061 | 3,4 |
| Hameln | 11,4 | 17,0 | 10,5 | 6,3 | 10,4 | 1 237 | 1,6 |
| Hanau | 10,7 | 7,9 | 8,5 | 13,1 | 19,6 | 1 991 | 2,6 |
| Hannover | 11,1 | 13,5 | 9,4 | 6,6 | 11,5 | 7 215 | 9,7 |
| Heilbronn | 6,8 ⁶⁾ | 14,5 | 13,2 | 9,0 | 11,8 | 1 247 | 7,3 |
| Hildesheim | 17,8 | 12,5 | 9,1 | 4,9 | 7,7 | 1 935 | 5,7 |
| Jauer | 11,8 | 5,5 | 8,7 | 5,3 | 3,9 | 1 192 | 3,4 |
| Ingolstadt | 16,0 | 17,4 | 17,8 | 15,1 | 13,4 | 4 739 | 12,7 |
| Inowrazlaw | — | 10,3 ⁴⁾ | 9,3 | 8,7 | 5,6 | 2 121 | 8,5 |
| Insternburg | 9,3 | 13,8 | 10,6 | 5,6 | 10,0 | 2 848 | 12,3 |
| Jüterbog | 14,7 | 8,1 | 3,7 | 5,6 | 7,7 | 1 951 | 5,1 |
| Kamenz | — | — | — | 5,5 | 26,4 | 1 182 | 11,0 |
| Karlsruhe | 13,6 | 17,7 | 13,7 | 11,5 | 8,1 | 4 465 | 17,7 |
| Königsberg i. Pr. | 11,6 | 13,6 | 11,8 | 9,1 | 8,6 | 9 698 | 10,4 |
| Kolberg | 5,9 | 5,0 | 3,7 | 4,7 | 9,7 | 1 390 | 4,3 |

1) Garnisonen mit einer Iststärke von mehr als 1000 Mann.

2) Die in den früheren Berichten enthaltenen Iststärken sind wegen Mangels an Raum weggelassen worden.

3) 2-jähriger Durchschnitt 1884/86.

4) 4-jähriger Durchschnitt 1887/91.

5) 4-jähriger Durchschnitt 1882/86.

6) 3-jähriger Durchschnitt 1883/86.

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ¹⁾ | 1902/03 | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | bis 1885/86 ¹⁾ | bis 1890/91 ¹⁾ | bis 1895/96 ¹⁾ | bis 1900/01 ¹⁾ | | Ist- stärke | Zu- gang ‰ K. |
| Konstanz | 14,1 | 14,6 | 10,3 | 6,9 | 7,2 | 1 767 | 10,2 |
| Krotoschin | 7,1 | 6,0 | 6,8 | 5,7 | 5,0 | 1 748 | 10,9 |
| Lahr | — | — | — | 10,6 ⁴⁾ | 12,5 | 1 568 | 14,7 |
| Landau | 16,7 | 8,8 | 8,8 | 6,9 | 4,2 | 3 411 | 10,0 |
| Landshut | 19,0 | 13,0 | 17,3 | 14,5 | 11,5 | 1 112 | 9,9 |
| Leipzig | 14,1 | 15,7 | 12,8 | 9,2 | 12,1 | 7 911 | 12,3 |
| Liegnitz | 11,2 | 16,0 | 11,7 | 10,7 | 7,7 | 1 764 | 13,0 |
| Lissa | 16,6 | 16,1 | 7,9 | 5,7 | 16,7 | 1 243 | 7,2 |
| Lockstedter Lager | — | — | — | — | — | 3 045 | 2,0 |
| Ludwigsburg | 13,8 | 11,9 | 11,5 | 9,1 | 2,9 | 5 237 | 10,9 |
| Lübeck | 4,7 | 10,1 | 8,0 | 7,0 | 8,2 | 1 241 | 6,4 |
| Lyck | 10,2 ²⁾ | 6,6 | 8,9 | 4,7 | 6,2 | 1 922 | 10,4 |
| Magdeburg | 10,6 | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 6,0 | 6 921 | 8,7 |
| Mainz | 9,9 | 12,9 | 12,1 | 7,5 | 5,9 | 8 929 | 8,4 |
| Mannheim | 12,8 | 12,7 | 13,7 | 13,2 | 15,8 | 1 311 | 6,9 |
| Marienwerder | 19,7 | 6,3 | 13,1 | 9,5 | 4,8 | 1 046 | 7,6 |
| Meiningen | 4,3 | 8,4 | 8,1 | 8,7 | 4,2 | 1 843 | 5,4 |
| Metz | 9,9 | 11,4 | 8,5 | 8,1 | 9,0 | 22 872 | 7,8 |
| Minden | 10,1 | 10,8 | 9,3 | 5,2 | 8,6 | 3 207 | 8,4 |
| Mörchingen | — | 21,9 ³⁾ | 5,0 | 8,1 | 9,9 | 4 533 | 7,5 |
| Mülhausen i. E. | 10,6 | 13,1 | 11,6 | 10,2 | 8,4 | 4 207 | 4,8 |
| Mülheim a. Ruhr | — | — | — | 11,5 ⁴⁾ | 6,4 | 1 252 | 7,2 |
| München | 25,0 | 22,4 | 21,3 | 19,7 | 20,8 | 10 310 | 24,7 |
| Münster | 8,3 | 13,1 | 11,0 | 11,7 | 7,5 | 4 154 | 11,3 |
| Naumburg a. S. | 5,0 | 3,4 | 19,3 | 6,9 | 1,4 | 1 429 | 3,5 |
| Neifse | 11,8 | 9,5 | 10,2 | 7,1 | 4,3 | 3 924 | 2,5 |
| Neubreisach | 14,7 | 12,8 | 15,7 | 12,0 | 11,6 | 1 427 | 29,4 |
| Neuburg a. D. | 11,4 | 11,2 | 12,8 | 13,0 | 1,3 | 1 590 | 3,1 |
| Neumünster | 9,6 | 7,5 | 9,9 | 4,7 | 5,5 | 1 198 | 3,3 |
| Neu-Ruppin | 12,9 | 10,7 | 6,1 | 5,6 | 12,4 | 1 792 | 4,5 |
| Neu-Ulm | 24,1 | 28,6 | 20,9 | 22,2 | 12,1 | 2 121 | 16,5 |
| Nürnberg | 23,5 | 20,0 | 23,5 | 14,3 | 12,1 | 3 371 | 24,9 |
| Offenburg | — | — | — | 4,2 | 13,4 | 1 271 | 4,7 |
| Oldenburg | 20,0 | 14,1 | 16,7 | 11,8 | 7,8 | 2 983 | 4,7 |
| Oppeln | 12,6 | 10,6 | 7,3 | 8,4 | 7,0 | 1 713 | 7,0 |
| Osnabrück | 11,0 | 11,3 | 15,1 | 14,7 | 8,4 | 1 599 | 6,9 |
| Osterode | — | 7,2 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 2 392 | 6,7 |
| Ostrowo | 6,0 | 5,8 | 11,0 | 6,6 | 3,5 | 1 360 | 1,5 |
| Paderborn | 13,2 | 11,1 | 15,2 | 13,1 | 8,7 | 1 806 | 18,3 |
| Passau | 14,4 | 16,2 | 20,8 | 5,5 | 13,1 | 1 336 | 15,0 |
| Pillau | 5,6 | 17,3 | 8,0 | 4,4 | 4,3 | 1 181 | 10,2 |
| Pirna | 8,1 | 13,1 | 9,8 | 10,7 | 16,4 | 1 374 | 11,6 |

1) Die in den früheren Berichten enthaltenen Iststärken dieser Jahre sind wegen Mangels an Raum weggelassen worden.

2) 2jähriger Durchschnitt 1884/86.

3) Betrifft nur das Berichtsjahr 1890/91.

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ¹⁾ | 1902/03 | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | bis 1885/86 ¹⁾ | bis 1890/91 ¹⁾ | bis 1895/96 ¹⁾ | bis 1900/01 ¹⁾ | | Ist- stärke | Zu- gang ‰ K. |
| Posen | 8,8 | 9,7 | 9,7 | 8,8 | 7,0 | 7 600 | 7,8 |
| Potsdam | 11,8 | 9,7 | 10,2 | 8,0 | 7,5 | 8 698 | 11,5 |
| Prenzlau | 6,0 | 10,0 | 8,2 | 6,5 | 10,2 | 1 257 | 3,2 |
| Rastatt | 7,4 | 8,8 | 7,6 | 7,6 | 3,3 | 4 562 | 6,0 |
| Rastenburg | 6,1 | — | — | 4,5 ⁴⁾ | 9,8 | 1 752 | 3,4 |
| Rawitsch | — | 6,0 | 3,8 | 5,5 | 8,9 | 1 214 | 5,8 |
| Regensburg | 12,2 | 8,3 | 11,2 | 13,4 | 9,7 | 1 763 | 7,4 |
| Rendsburg | 7,3 | 7,5 | 5,2 | 5,5 | 7,1 | 1 997 | 22,5 |
| Riesa | 16,0 ⁵⁾ | 8,5 | 14,3 | 11,6 | 8,6 | 1 866 | 8,6 |
| Rostock | 10,9 | 9,5 | 7,1 | 7,3 | 12,2 | 1 365 | 8,8 |
| Saarbrücken | 9,2 | 8,9 | 5,5 | 7,1 | 4,1 | 3 423 | 9,1 |
| Saarburg | 4,5 | 7,7 | 8,3 | 5,8 | 3,2 | 4 005 | 5,0 |
| Saargemünd | 11,6 | 3,5 | 5,5 | 3,7 | 8,3 | 1 089 | 11,0 |
| Saarlouis | 4,3 | 6,3 | 7,4 | 5,9 | 6,2 | 2 365 | 5,9 |
| Schleswig | 11,5 | 7,4 | 6,8 | 7,0 | 8,7 | 1 920 | 7,3 |
| Schneidemühl | 73,7 | 130,0 | 7,2 | 4,7 | 5,8 | 1 171 | 2,6 |
| Schweidnitz | 10,3 | 8,4 | 8,2 | 6,0 | 6,6 | 2 344 | 6,8 |
| Schwerin | 8,7 | 7,5 | 8,0 | 10,8 | 9,0 | 2 075 | 1,9 |
| Spandau | 7,5 | 5,2 | 6,6 | 7,3 | 7,7 | 5 948 | 6,7 |
| Stargard i. Pomm. | 6,0 | 8,0 | 10,5 | 7,2 | 6,5 | 1 774 | 8,5 |
| Stettin | 10,4 | 10,4 | 9,1 | 7,7 | 8,6 | 4 895 | 7,4 |
| Stralsund | 10,8 | 12,5 | 8,9 | 11,3 | 10,2 | 1 228 | 4,9 |
| Straßburg i. E. | 8,8 | 10,9 | 8,9 | 7,8 | 4,7 | 16 948 | 11,1 |
| Stuttgart | 14,0 | 13,1 | 11,8 | 8,5 | 5,8 | 4 550 | 10,1 |
| Thorn | 8,8 | 9,9 | 9,9 | 8,4 | 5,6 | 7 988 | 6,3 |
| Tilsit | 8,1 | 5,5 | 18,4 | 10,1 | 8,2 | 1 917 | 5,7 |
| Torgau | 9,8 | 6,4 | 5,1 | 5,2 | 8,0 | 3 027 | 7,3 |
| Trier | 10,1 | 8,2 | 6,9 | 8,1 | 4,8 | 5 493 | 6,2 |
| Ulm | 15,8 | 15,9 | 13,7 | 12,4 | 10,2 | 7 415 | 17,1 |
| Weingarten | 31,5 | 33,6 | 18,7 | 22,4 | 13,7 | 1 782 | 10,1 |
| Weissenburg | 7,9 | 5,0 | 5,5 | 3,1 | 7,0 | 1 947 | 4,1 |
| Wesel | 8,1 | 9,9 | 7,2 | 5,4 | 7,8 | 4 622 | 5,2 |
| Wiesbaden | 14,6 | 10,8 | 9,8 | 5,6 | 7,8 | 1 621 | 10,5 |
| Wittenberg | 11,9 | 11,3 | 7,3 | 4,9 | 10,2 | 2 104 | 8,1 |
| Worms | 5,8 | 9,1 | 15,0 | 6,3 | 10,1 | 1 844 | 4,9 |
| Wurzen | — | — | — | 8,8 | 6,8 | 1 362 | 3,7 |
| Würzburg | 14,6 | 15,0 | 11,2 | 8,9 | 11,3 | 3 353 | 12,5 |
| Zabern | 7,2 | 5,1 | 11,6 | 5,8 | 7,4 | 1 317 | 9,8 |
| Zittau | 39,5 | 25,2 | 21,2 | 11,9 | 7,9 | 1 723 | 10,4 |
| Zweibrücken | 4,0 ⁵⁾ | 15,4 | 10,3 | 6,5 | 12,4 | 1 279 | 13,3 |
| Zwickau | 7,8 | 9,8 | 10,4 | 10,7 | 6,5 | 1 831 | 9,8 |

4) 3jähriger Durchschnitt 1898/1901.

5) 4jähriger Durchschnitt 1882/86.

Zugang nach Armeekorps.¹⁾

| Berichtszeit | Gardekorps | Armeekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Armee | Königl. Bayer. Armeekorps | | |
|---|------------|------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-------|-----|------|------|--------------------|--------------|------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|---------------------------|------|--------|
| | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. (I.K.S.) | XIII. (K.W.) | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | XVIII. | XIX. (2.K.S.) | | I. | II. | III. |
| 1881/86 . . . | 8,8 | 8,2 | 6,9 | 8,9 | 7,9 | 7,8 | 9,3 | 7,8 | 7,4 | 8,1 | 11,8 | 9,2 | 14,2 ²⁾ | 14,8 | 10,7 | 8,8 | — | — | — | — | 9,2 | 19,8 | 13,4 | — |
| 1886/91 . . . | 8,5 | 9,5 | 7,6 | 9,1 | 7,1 | 9,2 | 9,2 | 8,7 | 7,8 | 7,8 | 11,0 | 10,8 | 13,6 | 15,3 | 12,5 | 9,9 | 9,4 ³⁾ | 6,1 ³⁾ | — | — | 9,8 | 18,8 | 13,8 | — |
| 1891/96 . . . | 9,1 | 9,4 | 7,2 | 6,6 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 6,7 | 8,3 | 9,7 | 10,4 | 13,0 | 12,9 | 11,3 | 8,1 | 6,9 | 7,8 | — | — | 8,9 | 18,7 | 12,0 | — |
| 1896/1901 . . | 7,4 | 7,7 | 6,5 | 6,2 | 6,9 | 7,3 | 5,6 | 7,5 | 6,7 | 7,3 | 6,9 | 7,1 | 10,4 | 11,0 | 9,3 | 6,2 | 7,6 | 8,6 | 8,3 ⁴⁾ | 12,0 ⁴⁾ | 7,7 | 16,6 | 8,1 | 5) 3,7 |
| 1901/02 . . . | 6,8 | 7,7 | 6,3 | 8,0 | 7,8 | 7,4 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 9,2 | 8,2 | 6,8 | 13,1 | 8,1 | 7,8 | 3,9 | 8,3 | 6,0 | 7,2 | 10,1 | 7,4 | 14,8 | 8,4 | 10,8 |
| 1902/03 $\left. \begin{array}{l} \text{abs.} \\ \text{Zahl} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{0,0 K.} \\ \text{abs.} \\ \text{Zahl} \end{array}$ | 9,5 | 7,8 | 5,8 | 6,0 | 6,7 | 7,2 | 5,8 | 7,5 | 6,8 | 8,6 | 6,9 | 11,0 | 12,6 | 12,7 | 9,7 | 7,6 | 5,7 | 5,4 | 10,5 | 10,5 | 8,1 | 16,4 | 10,9 | 12,1 |
| | 391 | 247 | 150 | 141 | 149 | 185 | 151 | 201 | 183 | 215 | 151 | 229 | 252 | 282 | 308 | 236 | 156 | 160 | 277 | 217 | 4281 | 381 | 233 | 226 |

Der Zugang in den einzelnen Monaten läßt eine Häufung der Erkrankungen in den Winter- und Frühjahrsmonaten mit der höchsten Erhebung im März erkennen.

| | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. Zahl | 134 | 251 | 304 | 494 | 478 | 568 | 531 | 471 | 344 | 334 | 197 | 175 |
| 0,0 K. | 0,31 | 0,46 | 0,57 | 0,92 | 0,89 | 1,1 | 0,98 | 0,86 | 0,64 | 0,60 | 0,36 | 0,36 |

Als dem Gelenkrheumatismus vorangegangene Krankheiten werden auch in diesem Jahre wieder vielfach Entzündungen des Halses, namentlich der Mandeln, erwähnt. St.-A. Schichhold-Dresden glaubt, daß die von Mandelentzündungen eingeleiteten Erkrankungen einen besonders schweren Verlauf nehmen.

Einen Zusammenhang mit Mittelohrentzündungen und mit Verdauungsstörungen glaubt O.-St.-A. Smitt-Dresden bemerkt zu haben. Außerdem werden äußere Schädigungen wie Verstauchungen, Quetschungen und Zellgewebsentzündungen als Veranlassung des Gelenkrheumatismus angegeben.

Auch in diesem Jahre weist wieder ein Berichterstatter (St.-A. Keyl-Berlin) darauf hin, daß bei Leuten der Fußstruppen in überwiegender Mehrzahl die Gelenke der unteren Gliedmaßen befallen werden (vergl. auch San.-Bericht 1899/1900).

Fast alle Erkrankungen verliefen mit Fieber, nur wird aus Leipzig berichtet, daß bei 30 von 96 Kranken während der ganzen Dauer der Behandlung niemals Fieber auftrat (St.-A. Merzdorf). Das Auftreten von Mitkrankheiten verhinderte häufig die Wiederherstellung der

Dienstfähigkeit, die bei den unkomplizierten Erkrankungen fast immer wiederhergestellt wurde.

Unter den Komplikationen stehen Erkrankungen des Herzens organischer wie nervöser Art wieder im Vordergrunde.

Im Garnisonlazarett I Berlin war das Herz fast in 50 % in Trier in 52 % sämtlicher Erkrankungsfälle in Mitleidenchaft gezogen. Andererseits fand St.-A. Waldeyer-Cöln nur bei 1 von 25 Kranken = 4 % und St.-A. Goronzek-Königsberg i. Pr. bei 4 unter 46 Kranken = 8,7 % Beteiligung des Herzens. Letztere 4 Leute wurden wieder dienstfähig.

Von 1088 Erkrankungen an Rheumatismus, über welche zahlenmäßige Angaben vorliegen, wiesen

- 115 Entzündung der Herzklappen bzw. Herzinnenhaut,
- 36 „ des Herzbeutels,
- 1 „ des Herzmuskels,
- 11 nervöse Störung der Herzstätigkeit,
- 4 Herzschwäche,
- 124 sonstige Herzstörungen auf.

Also waren im ganzen bei 26 % Herzbeteiligungen zu konstatieren. Von diesen Kranken wurde eine große Anzahl wieder gesund bzw. dienstfähig, sodafs die Vorhersage bei solchen Herzerkrankungen verhältnismäßig nicht ungünstig erscheint.

Was andere Komplikationen betrifft, so bekamen von den erwähnten 1088 Kranken 4 Lungen- und 10 Brustfellentzündung (zusammen 1,28 %), Nierenentzündung war 5mal im Gefolge, Leber- und Milzschwellung je 1mal. Es sei ferner erwähnt, daß 4mal Scharlach (1mal mit Diphtherie), je 1mal Regenbogenhautentzündung und Entzündung der Hirn- und Rückenmarkshaut, 2mal Drüsenschwellung mit Eiterbildung mit dem Gelenkrheumatismus vergesellschaftet war.

Bezüglich nervöser Störungen liegen mehrere Berichte vor. Bei einem Kranken, welcher bereits entlassen werden sollte, aber plötzlich an einem mit Herzbeutelentzündung komplizierten Rückfall erkrankte, trat zuerst eine starke Aufregtheit, dann völliger Stumpsinn auf. Nach 3 Wochen verschwand dieser Zustand. — Invalide. (St.-A. Keyl-Berlin.)

Von anderen vorübergehenden Störungen ist je 1mal akute Verwirrtheit, mehrwöchiges halluzinatorisches Irresein und Veitstanz mit psychischer Verwirrtheit, welche beide gleichzeitig nach 14 Tagen schwanden, berichtet (St.-A. Schichhold-Dresden).

1) Auf 1000 der Iststärke berechnet.

2) 4jähriger Durchschnitt 1882/83 bis 1885/86.

3) Nur Berichtsjahr 1890/91.

4) 3jähriger Durchschnitt 1898/99 bis 1900/01.

5) 2jähriger Durchschnitt 1899/1900 bis 1900/01.

Auf Wirkung der Salizylsäure führt St.-A. Friedrichs-Giesßen das Auftreten von Delirien bei einem Manne zurück.

Die Haut war häufig beteiligt, vor allem wird mehrfach Purpura, ebenso Erythema nodosum und Intertrigo erwähnt, ferner (als Folge des Aspirins) Miliaria alba.

Unter dem Bilde der Weilschen Krankheit verlief eine von St.-A. Schichhold-Dresden beschriebene Erkrankung. Im Vordergrund der Erscheinungen standen neben Gelenkschwellungen hohes Fieber mit Schüttelfrösten, vorübergehende Bewußtlosigkeit und Krämpfe, Gelbsucht, Eiweiß- und Gallenfarbstoffausscheidungen im Harn sowie Milzschwellung. Der Mann wurde wieder dienstfähig. — Tödlich endete dagegen eine von St.-A. Merzdorf-Leipzig beschriebene Erkrankung eines Gefreiten, die ebenfalls mehr einer allgemeinen Blutvergiftung glich: Entzündung der Herzzinnenhaut, zahlreiche, sich täglich erneuernde Hautblutungen [Purpura], Verminderung des Blutfarbstoffs auf 50%, der Zahl der roten Blutkörperchen auf die Hälfte und Vermehrung der weissen um das Doppelte, teilweise Lähmung der rechten Körperhälfte.

Als Nachkrankheiten bzw. Folgen werden 3mal Schwäche und Ernährungsstörungen einiger Muskeln und Muskelgruppen betont. (Giesßen, Berlin, Königsherg i. Pr.)

In der Behandlung mit inneren Mitteln standen nach wie vor die Salizylsäure und das salizylsaure Natrium im Vordergrund, auch das Aspirin wurde sehr gelobt. — O.-St.-A. Eichbaum-Karlsruhe und St.-A. Neuendorff-Halberstadt berichten, daß die Wirkung der Salizylsäuretablettchen bei der vorgeschriebenen gleichzeitigen Verabreichung von doppelkohlen-saurem Natron (ebenfalls in Tablettenform) sich zuweilen als unwirksam erwiesen habe, während O.-St.-A. Enderle-Weingarten bessere Erfahrungen damit gemacht hat. Die GröÙe der verabreichten Tagesdosen schwankte bei dem salizylsauren Natron von 4,0 bis 12,0 g, bei dem Aspirin von 3,0 bis 8,0 g. Vereinzelt fand auch Salol, Antipyrin, Antifebrin, Phenacetin und Tinctura Colchici Anwendung.

Um den unangenehmen Geschmack und etwaige Magenstörungen durch Salizylsäure und ihre Salze zu verhindern, lieÙ St.-A. Schichhold-Dresden eine Salzsäurelösung unmittelbar danach einnehmen, während St.-A. Grimm-Frankfurt a. M. durch das Hinzufügen von Kognak zur Lösung denselben Erfolg erzielen wollte (Sol. Natr. salicyl ¹⁶/_{180,0}, Spirit. e. vino ad 200,0 S stündlich 1 Eßlöffel). — Als zweckmäßiges Mittel gegen das lästige Ohrensausen wird, wie schon im Sanitätsbericht 1900/01 von O.-St.-A. Brix-Graudenz, auch diesmal wieder ein Aufguß von Mutterkorn angeraten (O.-St.-A. Schian-Rendsburg).

Außerlich kamen meist Ichthyolsalbe (10 bis 20%ig), Jodtinktur, Salizylvasogen, liquor acidi salicylici und zuweilen auch Rheumasan zur Anwendung.

Von dem vereinzelt angewandten Collargol (als Einreibung und intravenös) sind völlig einwandfreie Erfolge nicht berichtet (St.-A. Wiemuth-Potsdam, O.-St.-A. Weber-Darmstadt).

O.-St.-A. Herrmann-Potsdam verwendet heiÙe Breiumschläge aus Leinsamen, dem er Stafsfurter Salz und Jodkali zusetzt.

Von den physikalischen Behandlungsmethoden werden heiÙe Wasser-, Dampf-, Sand- und Soolbäder für den ganzen Körper, örtliche heiÙe Wasser- und HeiÙluftbäder gerühmt, wie überhaupt die Erzeugung von Schweiß, sei es mit, sei es ohne Salizyl, durchweg angestrebt wird.

Die Nachbehandlung erkrankter Gelenke und Glieder war die bisher übliche.

O.-St.-A. Smitt-Dresden bedient sich fast nur der physikalischen Heilmethoden mit Regelung der Kost, unter Bevorzugung der grünen Gemüse und grünen Salate.

Chronischer Gelenkrheumatismus. (No. 28 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | % K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 24 | 269 | 0,51 | 85 | — | 198 | 283 | 10 | 50,9 |

Außerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie und 5 Kadetten. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Auf die einzelnen Monate verteilt sich der Zugang folgendermaßen:

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 26 | 29 | 24 | 19 | 29 | 27 | 13 | 31 | 25 | 17 | 15 | 14 |
| % K. . . . | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Von O.-St.-A. Riebel-Berlin wird berichtet, daß durch das Menzersche Streptokokkenserum bei einem Invaliden dauernde Besserung erzielt wurde, der vorher wegen Steifigkeit aller Gelenke, besonders derjenigen der unteren Gliedmaßen, das Bett nicht verlassen konnte:

Der Kranke war vorher mit den verschiedensten Mitteln — unter anderem auch mit örtlichen HeiÙluftbädern und Stauungshyperämie in der Universitätsklinik zu Kiel ohne dauernden Erfolg behandelt. — Die Einspritzungen riefen anfangs starke, mit Fieber verbundene entzündliche Schwellungen der erkrankten Gelenke hervor. Die Behandlung wurde durch Bäder, Massage und Elektrizität unterstützt. Nach 18 Einspritzungen war eine erheblich freiere Beweglichkeit der oberen Gliedmaßen herbeigeführt und die Gehfähigkeit sowie der Ernährungszustand leidlich wiederhergestellt.

Gicht. (No. 29 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | % K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 2 | 39 | 0,07 | 32 | — | 7 | 39 | 2 | 25,7 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Die Krankengeschichten bieten zu besonderen Bemerkungen keinen Anlaß.

Dritte Unterart: Blutarmut.

(No. 30 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 12 | 518 | 0,98 | 358 | 1 | 156 | 515 | 15 | 25,8 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 55 | 54 | 39 | 57 | 44 | 46 | 28 | 33 | 42 | 50 | 44 | 26 |
| ‰ K. . . . | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |

Außerdem erkrankten noch 6 Kadetten und 7 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Im allgemeinen ist wenig Bemerkenswertes berichtet.

Als Veranlassung werden mehrfach überstandener Typhus und Grippe genannt. Folgende Einzelheiten seien erwähnt:

In dem Stuhlgange eines Musketiers in Hameln wies St.-A. Brücke zahlreiche Eier von *Taenia* und *Oxyuris vermicularis* und einzelne von *Trichocephalus dispar* nach. Nach Abtreibung einer *Taenia saginata* verschwanden deren Eier, während diejenigen der beiden anderen Wurmartarten, von denen niemals ausgewachsene Tiere gefunden wurden, dauernd vorhanden blieben. Die Blutarmut wurde nicht gehoben und es blieb eine Empfindlichkeit des Magens gegen Fleisch und Fett bestehen. — Invalide.

Ein Grenadier in Berlin erholte sich von Blutarmut und zeitweiligen Atembeschwerden nach Entfernung seiner Rachenmandel sehr schnell. (St.-A. Keyl.)

Bei einem anderen Grenadier, der im Anschluß an eine Zellgewebsentzündung am rechten Fuß und Eiterung der Vorsteherdrüse an einem recht erheblichen Grad von Blutarmut mit dauernden abendlichen Temperatursteigerungen und Verstopfung litt, hatten methodisch angewandte hohe Darmeingießungen von reinem Wasser, jeden 2. Tag gegeben, ausgezeichneten Erfolg. (St.-A. Voigtel-Berlin.)

Bei der Behandlung stand durchweg gute und kräftige Ernährung im Vordergrund.

Vierte Unterart: Purpura und Skorbut.

(No. 31 und 32 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 3 | 60 | 0,11 | 50 | 1 | 11 | 62 | 1 | 33,5 |

Außerdem erkrankte noch 1 Kadett an Purpura. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Mehr oder minder waren alle Erkrankungen an Purpura mit Gelenkschwellungen und Schmerzen

verbunden, so daß die Unterscheidung von akutem Gelenkrheumatismus häufig schwierig war. In den meisten Fällen wurde die Erkrankung auf eine Erkältung zurückgeführt. Bei einem Manne in Altona trat sie im Anschluß an Schanker und Bubo auf.

2 mal wurde erhebliche Herabsetzung des Gehaltes an Blutfarbstoff beobachtet (in Altona auf 60, in Königsberg i. Pr. auf 43 ‰). Mehrfach wurden Erkrankungen des Herzens, Herzbeutels, Brustfells, der Lungen und der Nieren (bis zu 20 ‰ Eiweiß im Harn) nachgewiesen.

Mehrmalige Magenblutungen sah O.-St.-A. Reifs-Frankfurt a. O.

Bei den meisten Kranken wurde die Erkrankung rückfällig. Im allgemeinen bestand die Behandlung der Purpura in der Verabreichung von Salizylpräparaten. Einmal scheint die Verwendung von Bierhefe und Gelatine guten Erfolg gehabt zu haben. (St.-A. Goronzek-Königsberg i. Pr.)

Mit Gelenksbeschwerden verliefen auch die berichteten 4 Skorbuterkrankungen, deren Entstehungsursache in keinem Falle klargelegt wurde. O.-St.-A. Zelle-Bruchsal beobachtete, daß ein Kranker trotz Herabsetzung des Farbstoffgehalts und starker Veränderung der Zellelemente des Blutes (Peukilo-, Makro- und Mikrocyten) unter der Behandlung mit Eisen, warmen Bädern und vorsichtiger Massage wieder völlig dienstfähig wurde.

Fünfte Unterart: Zuckerruhr.

(No. 33 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 3 | 33 | 0,06 | 3 | 10 ¹⁾ | 23 | 36 | — | 37,4 |

Als Ursache der Zuckerruhr wurde 1 mal Sturz vom Pferde mit Verletzungen am Kopf und Oberarm (Königsberg i. Pr.), 1 mal Zellgewebsentzündung (Ulm) und 2 mal Durchnässung bzw. Erkältung (Cüstrin, Mörchingen) angegeben.

Die Gefährlichkeit dieser Krankheit bei Personen im jugendlichen Alter zeigt sich darin, daß nicht weniger als 9 von den 17 Kranken, über welche nähere Angaben vorliegen, starben. Der Tod trat 1 mal schon nach 12 (Lyck), 1 mal nach 4 Tagen (Naumburg a. S.) und 1 mal nach 1tägiger (Strafsburg i. E.) Lazarettbehandlung ein.

Der zuletzt erwähnte Kranke wurde eines Morgens, ohne vorher krank gewesen zu sein, bewußtlos in seinem Bett gefunden. Er verstarb nach 24 Stunden in tiefem Koma. (St.-A. Reinhard-Strafsburg i. E.) — Von den übrigen starben noch 5 Leute in bewußtlosem Zustande, 2 an Entkräftung und 1 an Herzschwäche 2 Stunden nach Absetzung eines Beines.

¹⁾ Außerdem starb 1 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Die ausgeschiedene Urinmenge betrug bei einem Kranken bis 10 Liter täglich (Graudenz), der Zuckergehalt in einem anderen Falle 20% (Cüstrin). Aceton wurde im Urin mehrfach nachgewiesen; bei einem Kranken in Cöln war deutlicher Geruch von Aceton in der Ausatemungsluft vorhanden, während es im Harn selbst nicht nachgewiesen werden konnte.

Als Mitkrankheit wird 1 mal eitriger Mittelohrkatarrh genannt, ein anderes Mal wurden von demselben Berichterstatter (St.-A. Aschenbach-Metz) schmerzhafte Wadenkrämpfe bei einem Manne erwähnt, der früher Ischias überstanden hatte.

Die Behandlung wich im allgemeinen nicht von der bisher geübten ab.

Die Leichenöffnungen ergaben in einem Falle starke Blutüberfüllung aller inneren Organe, in einem anderen ausgesprochene Fettleber, Ödem des Gehirns und der weichen Hirnhaut. Am Schädelgrunde fanden sich 50 ccm freie Flüssigkeit, welche Zucker enthielt. (O.-St.-A. Hartog-Naumburg a. S.)

Sechste Unterart: Vergiftungen.

(No. 34 bis 36 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 73 | 0,14 | 63 | — 1) | 9 | 72 | 1 | 16,4 |

a) Alkoholvergiftungen. (No. 34.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 43 | 0,08 | 38 | — 1) | 5 | 43 | — | 10,0 |

Außerdem erkrankte noch 1 Mann der Schloßgardie-Kompagnie und 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zahl der Alkoholvergiftungen nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------------|--|-------------------|------------------------|--|
| | in absoluten Zahlen | | | in absoluten Zahlen | |
| G. | 1 | | X. | 3 | |
| I. | 6 | | XI. | 1 | |
| II. | 2 | | XII. (1. K. S.) . | 5 | |
| III. | 1 | | XIII. (K. W.) . | 1 | |
| IV. | 1 | | XIV. | — | |
| V. | 2 | | XV. | 1 | |
| VI. | 6 | | XVI. | 1 | |
| VII. | 1 | | XVII. | 1 | |
| VIII. | 2 | | XVIII. | 2 | |
| IX. | 4 | | XIX. (2. K. S.) . | 2 | |

Besonders Erwähnenswertes ist nicht berichtet.

1) Ein Mann starb außerhalb militärärztlicher Behandlung.

b) Vergiftungen durch Gase. (No. 35.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 7 | 0,01 | 6 | — | 1 | 7 | — | 34,6 |

2 berichtete Kohlenoxydgasvergiftungen waren durch undichte Gasleitung erfolgt und verliefen günstig.

St.-A. Bornikoel-Berlin glaubt den bei seinem Kranken angewandten Sauerstoffeinatmungen eine günstige Wirkung zuschreiben zu dürfen.

Eine Kohlenoxydgasvergiftung in Posen hatte eine schwere rechtsseitige Lungenentzündung und das Auftreten mehrerer großer Abszesse an beiden Gesäßhälften zur Folge. Während der Lungenentzündung entstand in der anderen Lunge eine Aussackung eines Luftröhrenastes, in der sich Massen von grasgrünem Eiter sammelten, die bei jedem Aufrichten mundvoll entleert wurden. Ihr unerträglicher Geruch und Geschmack benahm dem Kranken jeden Appetit. Invalide nach 7 monatiger Lazarettbehandlung (O.-St.-A. Brix).

c) Vergiftungen durch andere Gifte. (No. 36.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 23 | 0,04 | 19 | — | 3 | 22 | 1 | 22,6 |

Eine Massenerkrankung, die wahrscheinlich durch den Genuß verdorbener Leberwurst hervorgerufen war, wird aus Gnesen berichtet (33 Zugänge, 28 Dragoner und 5 Musketiere); einer der Erkrankten starb am 4. Tage¹⁾, die übrigen wurden dienstfähig. — Eine mit schweren Erscheinungen (Störung des Sehvermögens, Lähmungen) einhergehende Fleischvergiftung in Kulm wurde geheilt. — Nach dem Genuß von Kartoffelsalat erkrankten am 4. April 1903 62 Mann des 2. Oberelsässischen Feldartillerie-Regiments Nr. 51 in Straßburg i. E. mit Erbrechen, Leibscherzen und Durchfällen; die meisten Leute (60) waren am nächsten Tage wieder dienstfähig, die übrigen erst nach 8 tägiger Lazarettbehandlung; es handelte sich wahrscheinlich um Solaninvergiftung.

Ein Sanitätsgefreiter in Deutz benutzte zum Durchseien seines Abendtees eine dicke Schicht Sublimatmull; er erkrankte lebensgefährlich, wurde aber nach 18 Behandlungstagen wieder dienstfähig. — In Leobschütz bekam ein Militärkrankenwärter nach mehrstündigem feuchtem 3% Karbolumschlag um ein Knie Erbrechen und blutigen Urin. Die Erscheinungen hörten nach Fortlassen der Karbolsäure auf. — Ein auf Posten befindlicher Musketier in Lötzen geriet durch Genuß von Tollkirschen in Lebensgefahr. — O.-A. Partenheimer-Straßburg i. E. beobachtete einen vorübergehenden Salizylsäurerausch mit Verwirrtheit und motorischer Unruhe bei einem wegen Gelenkrheumatismus in Behandlung stehenden Feldwibel nach ungefähr 2,0 g Natr. salicyl. in Lösung. — 1 Mann mit chronischer Bleivergiftung in Darmstadt wurde durch Lazarettbehandlung dienstfähig, den gleichen Ausgang nahm eine Vergiftung mit Pilzen (Hagenau) und eine mit Essigsäure (Metz).

1) Verrechnet unter Rapportnummer 91.

Siebente Unterart: Trichinose.

(No. 37 des Rapportmusters.)

Unter dieser Rapportnummer sind Erkrankungen im Berichtsjahre nicht vorgekommen.

Achte Unterart: Hitzschlag.

(No. 38 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 6 | 74 | 0,14 | 70 | 6 1) | 2 | 78 | 2 | 8,5 |

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Erkrankungs- und Sterblichkeitsziffern seit dem Jahre 1881/82.

| | Es kamen in militärärztliche Behandlung | Davon sind gestorben | Außerdem starben außerhalb militär- ärztlicher Behandlung |
|-------------------|---|----------------------------|--|
| 1881/82—1885/86 . | 121,8 Mann = 0,32 ‰ K. | 8,4 | 3,8 |
| 1886/87—1890/91 . | 154,2 „ = 0,37 „ „ | 5,6 | 2,4 |
| 1891/92—1895/96 . | 170,4 „ = 0,36 „ „ | 8,6 | 1,4 |
| 1896/97—1900/01 . | 99,8 „ = 0,19 „ „ | 8,2 | 2,0 |
| 1901/02 | 111 „ = 0,21 „ „ | 10 | — |
| im Jahre 1902/03 | 74 Mann = 0,14 ‰ K. | 6 | 1 |

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 1 | 0,02 | X. | — | — |
| I. | 3 | 0,09 | XI. | 5 | 0,24 |
| II. | 1 | 0,04 | XII. (1.K.S.) | 13 | 0,65 |
| III. | 4 | 0,17 | XIII. (K. W.) | 18 | 0,82 |
| IV. | 5 | 0,22 | XIV. | 2 | 0,06 |
| V. | — | — | XV. | 4 | 0,13 |
| VI. | 2 | 0,08 | XVI. | 1 | 0,04 |
| VII. | — | — | XVII. | 1 | 0,03 |
| VIII. | 6 | 0,22 | XVIII. | 4 | 0,15 |
| IX. | 1 | 0,04 | XIX. (2.K.S.) | 3 | 0,15 |

Das XIII. (K. W.) Armeekorps hatte, wie auch in den Vorjahren, den höchsten Zugang.

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | — | — | — | — | — | 1 | — | 9 | 4 | 12 | 15 | 33 |
| ‰ K. | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,07 |

1) Außerdem starb ein Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

In diesem Jahre kamen ebenfalls wie im Vorjahre im Monat September die meisten Erkrankungen vor.

Hiernach entfielen auf den

| | |
|---------------------|--------|
| September | 44,6 ‰ |
| August | 20,3 „ |
| Juli | 16,2 „ |
| Mai | 12,2 „ |
| Juni | 5,4 „ |
| März | 1,4 „ |

Hitzschlagerkrankungen.

Alle berichteten Fälle boten das bekannte Krankheitsbild dar. Mangel an körperlicher Übung und unlängst überstandene Erkrankungen, besonders auch zeitig bestehende Leiden — selbst geringfügiger äußerlicher Art — haben sich wieder als begünstigende Momente für das Eintreten des Hitzschlages erwiesen.

Von bleibenden Schädigungen sind 3 mal Dehnungen oder Vergrößerungen des Herzens, 1 mal eine über 4 Wochen andauernde Verlangsamung der Sprache erwähnt. (Breslau, Brieg, Eisenach, Mannheim.)

St.-A. Aschenbach-Metz beobachtete einen Musketier, welcher erst unter den Zeichen des Hitzschlages erkrankte, als er, in die Kaserne zurückgekehrt, sich zu Bett begeben hatte.

Eine bei einem an Hitzschlag gestorbenen Manne gemachte Leichenöffnung ergab starke Blutüberfüllung beider Lungen, Blutleere des Gehirns und des Herzens sowie der großen Gefäße. Bezüglich der Behandlung sind neue Erfahrungen nicht gemacht.

Neunte Unterart: Bösartige Geschwülste.

(No. 39 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 10 | 30 | 0,06 | 6 | 14 | 18 | 38 | 2 | 74,1 |

Außerdem erkrankte noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Unter 23 Erkrankungen an bösartigen Geschwülsten, über die näheres berichtet ist, waren 11 Sarkome, 7 Krebsgeschwülste, 2 Strahlenpilzerkrankungen, 1 Endotheliom, 1 Mischgeschwulst und 1 Geschwulst in der Brust, deren Charakter nicht angegeben ist.

Von den 23 Kranken unterzogen sich 16 einer Operation; bei den übrigen 7 bestand entweder keine Aussicht auf Erfolg oder die Einwilligung zur Operation wurde nicht gegeben. Bei 6 von 15 Operierten konnte die Geschwulst wegen ihrer Ausdehnung bzw. wegen Metastasenbildung nicht entfernt werden. Infolgedessen wurde 1 mal Gastroenterostomie (St.-A. Leuner-Riesa) und 1 mal ein künstlicher After (O.-St.-A. Müller-Hannover) angelegt. Von 2 Knochen-Sarkomen, die auf äußere Verletzungen zurückgeführt wurden, schloß sich eins am oberen

Schienenbeinende an eine Hufschlagverletzung gegen das Knie an (Karlsruhe), das andere entstand am Oberarm nach einem Fall auf die Schulter (Diedenhofen).

St.-A. Grüder-Berlin nimmt auch bei einem wegen Mischgeschwulst am linken Hoden und an der linken Halsseite erkrankten Oberfeuerwerker eine äußere Verletzung als Ursache an:

Nach einem Stofs mit dem Säbel soll der linke Hoden, ohne nennenswerte Beschwerden zu bereiten, langsam angeschwollen sein. 1½ Jahre später trat gleichzeitig mit einer durch Stofs auf Urlaub entstandenen, entzündlichen Schwellung des linken Ellenbogengelenks die Geschwulst an der linken Halsseite auf, welche bei der Lazarettaufnahme Mannesfaustgröße besafs. Die Ellenbogenschwellung bildete sich zurück. Durch Entfernung der Geschwülste (Operationsliste unter D) wurde die Dienstfähigkeit des Kranken erhalten. — Beide Geschwülste zeigten fächerigen Bau. Es liefs sich aus ihnen eine milchige, bräunliche Flüssigkeit ausdrücken.

Der im vorigen Sanitätsbericht unter No. 4 auf Seite 42 erwähnte Kranke mit Sarkom des rechten Oberschenkels kam in diesem Berichtsjahre (24. 12. 02) zur Entlassung. Es war wieder eine etwa talergrofsse, harte Geschwulst 13 cm über dem oberen Rande der Kniescheibe zu fühlen. Der Kranke konnte Hausarbeit verrichten.

Der Entstehung von 2 Lymphosarkomen waren Bronchialkatarrhe vorausgegangen (Münster, Krotoschin). Beide Erkrankungen verliefen tödlich. In Krotoschin fand sich neben den Drüsenschwellungen am Halse und in der Achselhöhle eine kindskopfgrofsse Drüsengeschwulst im Mittelfellraum und in der Umgebung der Bauchspeicheldrüse. (St.-A. Biedekarken).

Ein bereits im vorigen Berichtsjahre in Zugang gekommenes Melanosarkom in der Haut der Beugeseite des linken Oberschenkels, ausgehend von einem durch Scheuern mit dem Seitengewehr gereizten Muttermal, wurde in diesem Berichtsjahre ausgeschnitten, da der Kranke einer gröfseren Operation nicht zustimmte. Er starb 17 Tage nach der Ausschneidung der erkrankten Hautteile. Es waren inzwischen Leberschwellung, Auftreibung des Leibes und erhebliche Drüsenschwellung in den Leistenbeugen entstanden. Die Leichenöffnung konnte nicht gemacht werden. Die ausgeschnittene Hautgeschwulst war nach dem Urteil des pathologischen Instituts in Breslau ein Rundzellsarkom, wahrscheinlich melanotischen Charakters, welches anscheinend die breite Muskelbinde noch nicht erreicht hatte.

Von den Karzinomen betrafen 2 den Magen (bezw. 1 auch die Leber), 2 den Mastdarm, 1 die Bauchspeicheldrüse, 1 den Dickdarm und 1 die Haut am Oberschenkel. Dieser Hautkrebs wurde durch Operation geheilt (Berlin); ein an Mastdarmkrebs Operierter konnte als invalide entlassen werden (Brandenburg a. H.), alle übrigen an Krebs erkrankten Leute starben. — Unter den Krebskranken waren 2 Sergeanten (1 Magen- und 1 Mastdarmkrebs) und ein 27 Jahre alter unsicherer Heerespflichtiger (Magenkrebs). Die übrigen Kranken waren unter 23 Jahre alte Mannschaften.

Über Strahlenpilzerkrankungen liegen 5 Berichte vor. O.-St.-A. Clafsen-Düsseldorf sah nach Pferdebifs in dem zweiköpfigen Muskel des linken Oberarms eines Kanoniers eine kugelige Geschwulst auftreten, nach deren Entfernung sich allmählich eine ausgedehnte Eiterung in der Umgebung des im oberen Drittel verdickten Oberarmknochens bildete. Der Eiter enthielt Strahlenpilze. Die vorgenommene Operation (s. Operationsliste unter D.) beseitigte die Eiterung nicht, doch wurden später keine Strahlenpilze mehr gefunden.

Eine Strahlenpilzerkrankung am rechten Unterkiefer und an einem Teil der Schädel- und Gesichtsknochen beobachtete

O.-St.-A. Herhold-Altona. Über die ausgedehnten Operationen bei diesem Kranken s. Operationsliste unter D. — Bei 2 Eiterungen am Unterkiefer wurden in Breslau Strahlenpilze festgestellt. Die Leute wurden nach Ausräumung der Eiterhöhlen dienstfähig. Eine Ansteckungsursache liefs sich nicht ermitteln.

Eine Strahlenpilzerkrankung im Muskel beschreibt St.-A. Herter-Stuttgart: An der Innenseite des rechten Oberschenkels entwickelte sich bei einem Manne eine hühnereigrofsse, derbe Geschwulst, die mit dem Sitzbein zusammenhing und von der aus sich mehrere Fortsätze in die Muskulatur hinein erstreckten. Bei der Operation fand sich die Strahlenpilzerkrankung. Dienstfähig.

Als Endotheliom erwies sich eine von St.-A. Franz-Berlin bei einem Unteroffizier operierte, gummiartige Geschwulst am linken Oberkiefer, die, von der Mittellinie des Gaumens ausgehend, sich bis zum Zahnfortsatz und bis zum vorderen Gaumenbogen erstreckte und von zahlreichen Gefäfsen durchzogen war. Drüsenschwellungen und sonstige Zeichen einer Allgemeinerkrankung bestanden nicht. Die Operation bestand in Ausmeifselung des linken Oberkiefers nach Dieffenbach (s. Operationsliste). Herabsinken des linken Augapfels wurde durch eine Prothese verhindert. Die Heilung ging glatt vonstatten. Der Operierte konnte ohne Beschwerden kauen, die Sprache war etwas näseld, aber deutlich, Doppelsehen bestand nicht; er schied später als invalide aus.

Zehnte Unterart: Andere allgemeine Erkrankungen.

(No. 40 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 3 | 126 | 0,21 | 79 | — | 20 | 99 | 30 | 18,8 |

Wegen Addisonscher Krankheit, die mit sehr starker Bronzefärbung der Haut und häufigen, fast täglichem Erbrechen einherging, wurde ein Pionier in Berlin invalide (St.-A. Bornikoel).

Wegen Anlage zu Blutungen (hämorrhagische Diathese) kam ein Mann in Magdeburg zur Entlassung.

Über 5 Fälle von Weilscher Krankheit wird aus Strafsburg i. E. (1), Hildesheim (2) und Braunschweig (2) berichtet; in Braunschweig wurde deshalb das Baden in der Ocker verboten.

Über ein mit Fieber und Bläschenausschlag an den Lippen verlaufenes Erythema nodosum wird aus Strafsburg i. E. berichtet. 3 Fälle von einfacher Harnruhr sind in Freiburg i. Baden, Ulm, Hadersleben beobachtet.

Über eine Massenerkrankung, deren Natur nicht aufgeklärt werden konnte, wird aus Leipzig berichtet. Es gingen innerhalb 3 Tagen von 2 Kompagnien 20 Mann dem Lazarett zu. Die sehr stürmisch auftretenden Erscheinungen waren schweres Krankheitsgefühl, Schüttelfrost, hohes Fieber, starker Kopfschmerz, Muskelschmerzen, erhebliche Entzündung der Augenbindehäute. Bei mehreren Leuten trat auch Erbrechen, Nasen-

bluten, Leber- und Milzschwellung auf; zum Teil hatten die Leute Durchfälle, andere waren verstopft. Die Körperwärme wurde meist nach 5 bis 6 Tagen des Morgens normal. Nach 4 Wochen konnten alle bis auf 4 dienstfähig entlassen werden. Bei letzteren bestanden als Mitkrankheiten Regenbogenhautentzündung, Heiserkeit, Blutarmut und Darmkatarrh. Influenza, Typhus, Paratyphus sowie Fleischvergiftung wurden auf Grund der angestellten Untersuchungen ausgeschlossen (St.-A. Merzdorf).¹⁾

Eigentümliche Krankheitserscheinungen, die nach der Auffassung von St.-A. Knaak zum Teil dem Bilde der Hirnembolie entsprachen und von ihm auf das Eindringen maligner Infektionserreger zurückgeführt werden, bot ein Kanonier in Straßburg i. E. Der Mann war wegen einer durch das

Exerzieren verursachten Knochenhautentzündung am linken Schienbein in Behandlung. Nach Beendigung eines am 10. Krankheitstage aufgetretenen Fieberzustandes, der sich, von Kopfschmerz, Nackensteifigkeit, Empfindlichkeit der Wirbelsäule und galligem Erbrechen begleitet, 12 Tage lang auf annähernd gleicher Höhe von 39° gehalten hatte, trat unter neuem Fieberanstieg eine Lähmung des rechten Gesichtsnerven, des rechten Arms und der Sprache sowie eine teilweise Lähmung des rechten Beines ein. Die Hautempfindlichkeit war besonders rechts gesteigert. Nach 2 Tagen waren die Symptome größtenteils verschwunden, doch blieben eine unmotiviert heitere Stimmung und Reste der Sprachstörung (kurz abgerissene Sätze, Fehlen mancher Worte) zurück.

II. Gruppe: Krankheiten des Nervensystems.

(Nr. 41 bis 52 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | | |
| 186 | 3143 | 6,0 | 1537 | 46,2 | 47 ²⁾ | 1,4 | 1602 | 48,1 | 3186 | 95,7 | 143 | 108 724 | 32,7 ³⁾ |

Außerdem erkrankten noch 3 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 6 Invaliden, 24 Kadetten und 10 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang in dieser Gruppe weist wiederum eine geringe Zunahme im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 5 Jahre auf. Er betrug im Durchschnitt der Jahre:

1896/97 bis 1900/01 . . . 2773,2 Mann = 5,3 ‰ K.,

im Jahre 1901/02 . . . 3072 „ = 5,7 „

im Jahre 1902/03 . . . 3143 Mann = 6,0 ‰ K.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|-------------|------------------|---------|-----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. . . . | 238 | 5,8 | XII. (I. K. S.) | 147 | 7,4 |
| I. . . . | 176 | 5,6 | XIII. (K. W.) | 158 | 7,1 |
| II. . . . | 175 | 6,8 | XIV. . . . | 183 | 5,7 |
| III. . . . | 103 | 4,4 | XV. . . . | 193 | 6,2 |
| IV. . . . | 119 | 5,3 | XVI. . . . | 128 | 4,7 |
| V. . . . | 150 | 5,9 | XVII. . . . | 145 | 4,9 |
| VI. . . . | 147 | 5,7 | XVIII. . . . | 179 | 6,8 |
| VII. . . . | 145 | 5,4 | XIX. (2. K. S.) | 149 | 7,2 |
| VIII. . . . | 201 | 7,5 | | | |
| IX. . . . | 143 | 5,7 | I. K. B. . | 317 | 13,6 |
| X. . . . | 110 | 5,0 | II. „ . | 136 | 6,4 |
| XI. . . . | 154 | 7,4 | III. „ . | 186 | 10,0 |

¹⁾ Näheres siehe in der „Deutschen militärärztlichen Zeitschrift“, 1905, S. 33: O.-St.-A. Naether, „Eine eigenartige Epidemie im Anschluß an das Kaisermanöver 1903.“

²⁾ Außerdem starben 5 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 292 | 369 | 252 | 367 | 274 | 273 | 222 | 255 | 232 | 261 | 196 | 150 |
| ‰ K. | 0,68 | 0,68 | 0,47 | 0,68 | 0,51 | 0,51 | 0,41 | 0,46 | 0,43 | 0,47 | 0,36 | 0,31 |

Erste Unterart: Geisteskrankheiten.


(Nr. 41 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| | | | | | | | | |
| 43 | 444 | 0,84 | 12 | 4 | 439 | 455 | 32 | 54,4 |

Außerdem erkrankte noch 1 Kadett. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die Zunahme der Geisteskrankheiten stellt die Kurventafel auf Seite 53 dar. — Nachdem im Jahre 1874/75 die durch die Feldzüge hervorgerufene Steigerung überwunden und die Zahl der Erkrankten auf 0,21 ‰ der Kopfstärke gefallen war, hat sie sich durch allmähliche Zunahme jetzt auf das Vierfache erhöht. Die Ursache ist zum großen Teil darin zu sehen, daß auch in der Zivilbevölkerung die Geisteskrankheiten eine fortschreitende Zunahme zeigen und daß somit eine größere Zahl von Leuten zur Einstellung gelangt, deren Geisteszustand nahe der Grenze des Geistesgesunden stehend erst bei den

Die Geisteskrankheiten in der Armee, berechnet auf 1000 der Iststärke.



Anforderungen des Dienstes und durch die Beobachtungen in den militärischen Verhältnissen als minderwertig erkannt werden kann.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen | Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen |
|---------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| G. | 18 | XII. (I. K. S.) . . | 18 |
| I. | 28 | XIII. (K. W.) . . | 30 |
| II. | 20 | XIV. | 30 |
| III. | 13 | XV. | 28 |
| IV. | 27 | XVI. | 12 |
| V. | 16 | XVII. | 30 |
| VI. | 12 | XVIII. | 25 |
| VII. | 15 | XIX. (2. K. S.) . . | 18 |
| VIII. | 46 | | |
| IX. | 18 | I. K. B. . . . | 20 |
| X. | 20 | II. „ . . . | 21 |
| XI. | 20 | III. „ . . . | 18 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 37 | 57 | 41 | 59 | 44 | 49 | 32 | 37 | 29 | 23 | 20 | 16 |

Die über erbliche Belastung angestellten Erhebungen haben 80mal zu einem Resultat geführt. Bei 42 Kranken war Belastung zweifellos vorhanden, bei 38 dagegen nicht. Am häufigsten wurde sie bei Schwachsinnszuständen und bei melancholischen Verstimmungen vorgefunden.

Körperliche Entartungszeichen wurden nur einzeln gefunden. Erwähnt sind: Asymmetrische Schädelbildung, schmaler Gesichtsschädel, enormer Schädelumfang (60,7 cm), Schmalheit und Steilheit des Gaumens, Hervortreten der Stirnhöcker, Ungleichheit und einseitige träge Reaktion der Pupillen, angewachsene Ohrläppchen (Berlin, Metz, Schwedt a. O., Torgau, Hildesheim).

Anzeichen geistiger Entartung waren häufiger festzustellen, namentlich bei Zugängen aus Festungsgefängnissen. Nicht weniger als 8 Kranke hatten vor der Einstellung schon Geistesstörungen überstanden, einige waren sogar schon in einer Irrenanstalt gewesen.

Mehrfach wurde auf traurige Familienverhältnisse und liederliches Leben vor der Einstellung hingewiesen. 8 Leute waren schon mit Gefängnis bestraft gewesen.

Einmal wurde als Ursache der vorwiegend religiösen Verrücktheit Beeinflussung durch Sektierer angegeben (Leipzig). Mechanische Verletzungen des Schädels wurden 12mal beschuldigt, teils unmittelbar, teils nach Jahren die geistige Erkrankung herbeigeführt zu haben.

Im Anschluß an akute Infektionskrankheiten sind 3mal geistige Erkrankungen aufgetreten, 1mal nach akutem

Gelenkrheumatismus und Veitstanz (Berlin), 1mal nach Influenza (Ulm), 1mal nach Lungenentzündung (Görlitz). Es handelte sich um melancholische Zustände, bei dem in Berlin beobachteten Kranken um transitorisches Irresein. — Durch stärkere Gemütsbewegungen wurde bei 4 Kranken ein melancholischer Zustand hervorgerufen, und zwar trug 1mal die Lösung eines Verlöbnisses (Göttingen), 1mal das Verbot, zur Beerdigung des verunglückten Vaters zu reisen (Berlin), 2mal unwiderstehliches Heimatsgefühl (Altenburg, Schneidemühl) die Schuld. Während der Verbüßung einer Arreststrafe wurde der Ausbruch einer Geistesstörung 3mal festgestellt. — Von Giften ist nur der Alkohol, und zwar 11mal, als Ursache der Erkrankung erwähnt.

Unerträgliche Gesichts- und Kopfschmerzen infolge kariöser Zähne sollen einen akuten Verwirrheitszustand ausgelöst haben (St.-A. Brüning-Mainz). — Nach Abtreibung massenhafter Spulwürmer mittels Santonin ging bei einem Manne, der schon lange vor der Einstellung an den Würmern gelitten hatte, ein melancholischer Zustand bald vorüber (St.-A. Seeger-Weingarten).

Von besonderen Krankheitserscheinungen ist 1mal Bettnässen bei einem Sergeanten beobachtet, der infolge chronischen Alkoholmißbrauchs an akutem Irresein mit manisch-depressiven Erscheinungen erkrankt war (St.-A. Merzdorf-Leipzig); im Verlauf einer chronischen Paranoia traten häufig Zuckungen im Gesicht und Zittern des ganzen Körpers ein (St.-A. Bludau-Königsberg i. Pr.).

Unter den einzelnen Krankheitsformen steht hinsichtlich der Häufigkeit der angeborene Schwachsinn mit 61 Erkrankungen obenan, von denen die meisten intellektuelle Schwächezustände, häufig kompliziert mit zeitweise auftretenden Erregungszuständen, waren.

Nächst dem angeborenen Schwachsinn ist die größte Gruppe die der jugendlichen Verblödung. Als Dementia praecox sind 16 Erkrankungen bezeichnet, ferner 2 als Hebephrenie (Altenburg, Torgau) und 5 als Katatonie (Spannungsirresein, Königsberg i. Pr., Straßburg i. E.). Interessant ist folgende Erkrankung wegen der Komplikation mit Hysterie:

Kanonier M. in Frankfurt a. M. wurde dem Garnisonlazarett während der gerichtlichen Untersuchung wegen Fahnenflucht zur Beobachtung überwiesen. Keine erbliche Belastung. M. war infolge großer Schädeldimensionen schwer geboren, entwickelte sich dann aber regelrecht. Im 2. Lebensjahre Fall auf den Kopf aus einem Hochparterre-Fenster. Nach einer schweren Gehirnerschütterung durch Fall beim Spielen auf dem Schulhof im 11. Lebensjahre war aus dem bis dahin aufgeweckten, bescheidenen Knaben ein fauler Schüler mit Neigung zum Prahlen, Lügen und Betrügen geworden. Aus der Schule mit dem Berechtigungsschein für den freiwilligen Dienst entlassen, wechselte er oft seine Stellungen, machte Unterschlagen, entwich nach Paris, vollführte dort sinnlose Hochstapeleien usw. Der Vater liefs ihn in der Hoffnung, daß der Militärdienst erzieherisch wirken werde, als Zweijährig-Freiwilligen eintreten, dennoch hatte M. sein früheres Leben fortgesetzt und war nach Verbüßung längerer Freiheitsstrafen fahnenflüchtig geworden.

Ogleich M. bei der militärärztlichen Untersuchung für geistesschwach und für seine Handlungen nicht voll verantwortlich erklärt war, veranlafte das Gericht eine nochmalige Beobachtung in der Irrenanstalt zu Frankfurt a. M., welche das

militärärztliche Urteil bestätigte. In der Irrenanstalt hatte M. mit Krampfkranken zusammengelegt und erkrankte unter dem Eindrucke des dort Gesehenen an hysterischen Krämpfen schwerer Form. Nachdem das gerichtliche Verfahren wegen anerkannter Geisteskrankheit niedergeschlagen war, erhob M. Invalidenansprüche, weil er sich die Krämpfe durch den ihm dienstlich befohlenen Aufenthalt in der Irrenanstalt zugezogen habe. Die Ansprüche sind anerkannt, M. wurde als invalide entlassen (St.-A. Grimm).

Aus Anlaß des obigen Krankheitsverlaufes macht der Berichterstatter den Vorschlag, daß bei der sicherlich bei manchen Formen von Schwachsinn und ähnlichen Geisteskrankheiten bestehenden, hysterischen Veranlagung während einer Beobachtung in einer öffentlichen Irrenanstalt ausreichende Vorsorge gegen eine etwaige „psychische Ansteckung“ getroffen werden müsse.

Unter den akuten Geisteskrankheiten im engeren Sinne findet sich die Diagnose Manie 6mal, Melancholie in ihren verschiedenen Formen 23mal vermerkt. Mehrmals wurden von diesen Kranken Selbstmordversuche gemacht oder der Selbstmordversuch war das erste sichtbare Zeichen der bestehenden Verstimmung.

Die übrigen akuten Geistesstörungen gehörten zu der Gruppe der akuten halluzinatorischen Verwirrtheit.

Von den mehr chronisch verlaufenden Psychosen ist in erster Linie die Paranoia (Verrücktheit) zu erwähnen, die in diesem Berichtsjahr 15mal beobachtet ist. Daß sich solche Zustände schon in frühem Lebensalter ausbilden können, zeigt die Erkrankung eines Kadetten vom Kadettenhause Wahlstatt.

Er war nicht erblich belastet. Mit 14 Jahren zeigte er bereits ausgesprochene paranoische Wahnvorstellungen und hielt sich für einen Epoche machenden Erfinder. Als Ursache dürfte mangelhafte häusliche Erziehung, für ihn nachteilige Lektüre (Buch der Erfindungen, Elektrizitätslehren u.s.w.) in Betracht kommen (St.-A. Schnütgen).

Erkrankungen an Gehirnerweichung sind 8mal erwähnt.

Bei einem Zeugfeldwebel, welcher plötzlich an einer Gehirnblutung zugrunde ging, lag Verkalkung der Gehirnarterien vor (O.-St.-A. Wegelj-Erfurt). Bei den übrigen Kranken konnte keine bestimmte Ursache nachgewiesen werden, Syphilis wurde stets in Abrede gestellt.

Die Erkrankten waren meist ältere Militärpersonen, Gendarmen und Zahlmeisteraspiranten.

Nur ein Unteroffizier (Trompeter) in Cassel bot schon im Alter von 22½ Jahren die ausgeprägten Zeichen der Gehirnerweichung dar (O.-St.-A. Heineken).

Ferner ist eine große Anzahl epileptischer und hysterischer Psychosen beschrieben, welche mit großen Krampfanfällen, Erregungs- oder Dämmerzuständen einhergingen. Namentlich wurde öfter beobachtet, daß die Kranken in epileptischen Dämmerzuständen fahnenflüchtig wurden. Sie hatten sich tagelang — sogar in der Uniform eines Vorgesetzten — herumgetrieben, folgten bei ihrer Ergreifung willig in die Kaserne und hatten später jegliche Erinnerung an die Geschehnisse der letzten Tage verloren. Eine von St.-A. Voigtel-Berlin in der

deutschen militärärztlichen Zeitschrift (1903 S. 594) ausführlich besprochene Erkrankung gehört hierher.

Die Behandlung bot nichts Bemerkenswertes. Was den Ausgang anbetrifft, so ist zu bemerken, daß zwei Reservisten nach überstandem Säuerwahnsinn für dienstfähig erachtet wurden (Berlin, Stuttgart), ebenso der schon erwähnte Kranke, dessen Verwirrtheit durch Überstehen heftiger Schmerzen hervorgerufen war. Ein Kranker ist gestorben (Erfurt), die übrigen wurden als dienstunbrauchbar bzw. invalide entlassen oder Irrenanstalten überwiesen.

Zweite Unterart: Fallsucht.

(Nr. 42 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 18 | 446 | 0,85 | 5 | 1 ¹⁾ | 444 | 450 | 14 | 31,2 |

Außerdem erkrankten noch 1 Invalide und 2 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen | Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen |
|---------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| G. | 24 | XII. (1. K. S.) . . | 13 |
| I. | 36 | XIII. (K. W.) . . | 15 |
| II. | 31 | XIV. | 24 |
| III. | 12 | XV. | 27 |
| IV. | 24 | XVI. | 17 |
| V. | 23 | XVII. | 26 |
| VI. | 19 | XVIII. | 14 |
| VII. | 31 | XIX. (2. K. S.) . . | 29 |
| VIII. | 27 | | |
| IX. | 18 | I. K. B. . . . | 14 |
| X. | 18 | II. „ . . . | 15 |
| XI. | 18 | III. „ . . . | 15 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 77 | 88 | 44 | 45 | 34 | 28 | 31 | 29 | 25 | 24 | 12 | 9 |

Unter 105 näher beschriebenen Krankheitsfällen ist nur 20 mal = 19% eine erbliche Belastung festgestellt worden.

Diese gegenüber den Angaben aus psychiatrischen Kliniken auffällig niedrige Zahl (Kraepelin fand bei 87%)

1) Außerdem starb ein Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

seiner Epileptiker erbliche Belastung) dürfte dadurch zu erklären sein, daß die Hauptmenge der Epileptiker schon beim Aushebungsgeschäft ausgemustert ist und daß die Leute derartige Erkrankungen in ihrer Familie oft absichtlich verschweigen, weil sie gern zum Militär eingestellt werden wollen.

Bei 47 Kranken wurde nachgewiesen, daß das Leiden schon vor dem Dienstantritt bestanden hatte. 18 mal wird der Ausbruch der Krankheit auf Kopfverletzungen zurückgeführt, 1 mal auf einen bestehenden Wasserkopf (St.-A. Keyl-Berlin). — Bei je einem Kranken traten die ersten Krämpfe nach einem kalten Bade (St.-A. Knoch-Düsseldorf), nach einem Sturz ins Wasser (St.-A. Auburtin-Breslau), nach einem Einbruch auf dem Eis (St.-A. Krueger-Charlottenburg), nach einer starken Verbrühung (O.-St.-A. Wegelj-Erfurt) auf. — Bei 4 bis dahin ganz gesunden Leuten stellten sich die ersten Anfälle während oder bald nach einer anstrengenden Felddienstübung ein (Frankfurt a. O., Düsseldorf, Eisenach, Diedenhofen). Bei einem seit $\frac{3}{4}$ Jahren als Kammerunteroffizier beschäftigten Sergeanten schien die dauernde Erregung und Anspannung durch die übertrieben schwer empfundene Verantwortung die Fallsucht hervorgerufen zu haben (St.-A. Mangelsdorf-Blankenburg).

Bei einem Kranken in Magdeburg trat durch Häufung der Anfälle ein fallsüchtiger Dauerzustand (status epilepticus) ein, in dessen Verlaufe wegen drohender Erstickungsgefahr der Luftröhrenschnitt gemacht werden mußte. Die Anfälle selbst konnten nur durch langdauernde Chloroformnarkose zum Schwinden gebracht werden (St.-A. Neuhaus).

Von auffälligen Dämmerzuständen vor und nach epileptischen Anfällen beobachtete St.-A. Schulz-Höxter, daß bei einem Kranken jedem Krampfanfall ein eigentümlicher, ein- bis mehrstündiger, von Erregungszuständen unterbrochener Schlaf vorausging. — Bei einem Kranken in Saarburg folgte dem Anfall ein schlafüchtiger (komatöser) Zustand, welcher bis zu 3 Tagen dauerte. Bei solchen Zuständen mußte der Urin am ersten Tage mit dem Katheter abgelassen werden. Später erhob sich der Kranke meist allein, kleidete sich an, tastete sich an den Wänden entlang zur Latrine, wobei er zeitweise an die Wand gelehnt schlafend stehen blieb. Nach der Rückkehr von der Latrine suchte er sein Bett wieder auf und verfiel von neuem in den schlafüchtigen Zustand (St.-A. Krüger).

14 mal wurde planloses Fortlaufen von der Truppe, 1 mal Nachtwandeln (St.-A. Melot de Beauregard-Mörchingen) als epileptisches Äquivalent angesprochen.

Hystero-Epilepsie wird 1 mal erwähnt (St.-A. Merzdorf-Leipzig).

Die Behandlung bestand in Darreichung der Brompräparate.

Einige Male wurde wegen anhaltender Unruhe die Überführung in eine Irrenanstalt notwendig.

Dritte Unterart: Erkrankungen im Gebiete einzelner Nervenbahnen.

(No. 43 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 55 | 1111 | 2,1 | 946 | — | 174 | 1120 | 46 | 22,4 |

Außerdem erkrankten noch 2 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 2 Invaliden, 10 Kadetten und 4 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

1896/97 bis 1900/01 . . . 1179,8 Mann = $2,3 \frac{0}{100}$ K.,
im Jahre 1901/02 . . . 1170 „ = $2,2$ „

im Jahre 1902/03 . . . 1111 Mann = $2,1 \frac{0}{100}$ K.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen | Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| G. | 110 | X. | 36 |
| I. | 54 | XI. | 59 |
| II. | 70 | XII. (1. K. S.) . . . | 45 |
| III. | 31 | XIII. (K. W.) . . . | 54 |
| IV. | 29 | XIV. | 53 |
| V. | 59 | XV. | 69 |
| VI. | 60 | XVI. | 63 |
| VII. | 61 | XVII. | 46 |
| VIII. | 46 | XVIII. | 67 |
| IX. | 46 | XIX. (2. K. S.) . . | 53 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 70 | 89 | 81 | 141 | 102 | 95 | 92 | 95 | 89 | 112 | 82 | 63 |

Nervenschmerzen: 70 Erkrankungen an Hüftweh sind in diesem Berichtsjahre näher beschrieben worden, die sämtlich nur ein Bein betrafen. Als Ursache wird in den meisten Fällen Erkältung angenommen, 2 mal wird anstrengendes Marschieren (Erfurt, Kamenz), 1 mal Fall (Breslau), 1 mal Zuckerharnruhr (Metz) beschuldigt. — Die meisten Kranken wurden wieder dienstfähig, nur ein kleiner Teil mußte wegen anhaltender Schmerzen oder wegen eingetretener Muskelabmagerung dienstunbrauchbar bezw. invalide entlassen werden.

Bezüglich der meist in üblicher Weise durchgeführten Behandlung sei erwähnt, daß die Verabreichung von Chinin innerlich und von Antipyrin, unter die Haut gespritzt, mehrfach gerühmt wird.

Nächst der Ischias wurden am häufigsten Neuralgien des dreigeteilten Nerven beobachtet.

Die meisten betrafen den 1. Ast, nur 1 mal wird Beteiligung des 1. und 2. Astes (Tilsit), 1 mal des 1. und 2. Astes und des großen Hinterhauptsnerven (Tilsit) erwähnt. Als Ursache wurde bei 1 Kranken eine kurze Zeit vorher erlittene Gehirnerschütterung angesprochen (Metz), 1 mal Malaria (Altona), 1 mal Typhus (Erfurt), 1 mal Syphilis (Berlin). — 3 Kranke kamen zur Entlassung, darunter 1 Mann mit einer in China erworbenen Neuralgie des 1. Astes, die allen angewandten Mitteln (Chinin, Hypnose, Auswägung des Nerven) trotzte. (St.-A. Drenkhahn-Altona.)

Von 3 Erkrankungen des großen Hinterhauptnerven (Metz, Darmstadt) und 1 Erkrankung des N. genito-cruralis und N. spermaticus nach Entfernung eines sarkomatösen Hodens (Stuttgart) wurden die 3 Ersteren geheilt. Der letzterwähnte Kranke starb an allgemeiner Sarkomatose.

Lähmungen: Von 16 näher beschriebenen Lähmungen des Gesichtsnerven werden 12 auf Erkältungen, 2 auf eine Mittelohreiterung (Altona, Ulm) und 1 auf eine Trippererkrankung (Darmstadt) zurückgeführt.

O.-St.-A. Straufs-Ulm teilt mit, daß eine vollkommene linksseitige Lähmung durch Kopfrückwärtsbeugen entstanden war. Bei der Übung hatte der Mann plötzlich einen Stich in der Gegend des linken Warzenfortsatzes empfunden. Der Mann mußte als invalide entlassen werden.

Lähmung eines Mönchskappenmuskels wurde 2mal beobachtet:

1mal in Altona war sie durch eine von einem Zahngeschwür ausgegangene Eitersenkung am Halse bzw. durch den Einschnitt auf diese verursacht. Die Narbe war leicht verschiebbar. Das Schulterblatt stand stark nach außen geneigt, der ganze Schulterring sank etwas nach vorn und außen. Der Arm konnte nicht bis zur Wagerechten erhoben werden (St.-A. Stude). — Die zweite ähnliche Erkrankung ist aus Stettin berichtet. Der erste Kranke wurde dienstfähig. Der andere war früher wegen Halsdrüsentuberkulose operiert und wurde invalide (St.-A. Vollrath).

Eine bisher in der Literatur noch nicht erwähnte, auf den oberen Teil des Mönchskappenmuskels beschränkte Lähmung beschreibt O.-St.-A. Steinhausen-Hannover.¹⁾ Der Mann war auf der Protze sitzend beim Fahren über einen Graben hoch emporgeschleudert worden, wobei die Schulter wahrscheinlich gezerrt wurde. Invalide.

Lähmung eines großen Sägemuskels wurde 5mal beobachtet, 1mal nach einer Lungenentzündung (Spandau), 1mal nach anstrengendem Turnen (Wage) (Königsberg i. Pr.), 1mal nach Griffeüben (Mainz), 2mal durch Tornisterdruck (Cöln, Metz). 3mal trat Heilung ein.

Von 5 berichteten Fällen von Lähmung des Armnervengeflechts (Erbsche Lähmung) war eine durch Tornisterdruck (Mörchingen), eine durch Bajonettstöße (Stettin) entstanden. Bei den anderen war die Ursache unbekannt. Heilung wurde 2mal erzielt. Lähmungen des deltaförmigen Schultermuskels wurden in Bückeburg, Ludwigsburg und Frankfurt a. M. beobachtet. Als Ursachen wurden Erkältungen angegeben. 1mal wurde durch eine Kur in Wiesbaden Heilung erzielt.

Eine Lähmung des rechten Oberschulterblatt-nerven, die wahrscheinlich seit der Kindheit bestand, wurde in Altona beobachtet. —

Eine Lähmung desselben Nerven, die auf den unteren Zweig bzw. den Untergrätenmuskel beschränkt war, fand sich ebendort bei einem Manne des ostasiatischen Expeditionskorps. Eine bestimmte Ursache war nicht bekannt. Nach mehreren Schmerzanfällen hatte sich ein völliger Schwund des Muskels entwickelt (St.-A. Drenkhahn).

Am Arm war eine isolierte Lähmung des mittleren Nerven nach einer vor der Einstellung erlittenen Maschinenverletzung entstanden (O.-St.-A. Weber-Darm-

stadt). — Von 7 Lähmungen des Speichennerven waren 2 Schlaflähmungen (Oppeln, Ulm), 3 durch Verletzungen: Fall (Oldenburg), Hufschlag (Cassel), Pferdebiß (Darmstadt), 1 ohne bestimmte Ursache entstanden (Diedenhofen). Die 7. Erkrankung war durch eine subkutane Äthereinspritzung verursacht (Höxter¹⁾). Diese und die durch Hufschlag entstandene Lähmung führten zur Entlassung. — Von 4 Lähmungen des Ellenbogens, die 2mal durch Schnittwunden (Berlin, Oppeln), 1mal durch Bruch des Ellenknorrens (Erfurt) und 1mal durch Tragen eines schweren Kastens (Tilsit) verursacht waren, kam nur die letzte mit Erhaltung der Dienstfähigkeit zur Heilung.

Ein Kranker in Mergentheim hatte sich vor der Einstellung durch Quetschung des Ellenbogengelenks eine Ausrenkung des linken Ellenbogensnerven zugezogen. Der Nerv glitt bei jeder Beugung unter ausstrahlenden Schmerzen auf die Vorderfläche des Oberarmknorrens, beim Strecken wieder in seine Furche zurück. Dienstunbrauchbar entlassen. (St.-A. Beck.)

An den Beinen sind 2 isolierte Lähmungen der Wadenbeinnerven beobachtet. Eine doppelseitige war ohne bestimmte Ursache (Mainz), die andere bei einem Chinakrieger nach einer Schußverletzung (Stralsund) entstanden. — St.-A. Vollrath-Stettin beschreibt eine isolierte Lähmung des vorderen Schienbeinmuskels, die anscheinend durch aufsteigende Nervenentzündung von einer Fußverletzung ausgegangen war.

Bei einem mit dem Pferde gestürzten Ulanen aus Saarburg wurde nach mehrfacher Abweisung seiner Versorgungsansprüche bei der kommissarischen Untersuchung in Magdeburg Schwund der rechten Gesäßmuskulatur und Beschränkung in der Auswärtsrollung dieses Beines festgestellt. Beim Stehen neigte der Oberkörper nach links; beim Gehen wurde er zuerst nach rechts hinübergeworfen, um dann sofort auf das linke Bein zu fallen. Es wurde eine Lähmung des oberen Gesäß- und des gemeinschaftlichen Schamnnerven angenommen.

8 Nervenlähmungen nach Diphtherie bestanden jedesmal in Lähmungen bzw. lähmungsartigen Schwachzuständen der Arme und Beine (Oldenburg). Daneben war 1mal das Gaumensegel (Hagenau), 1mal das Gaumensegel, die Akkomodation und die inneren geraden Augenmuskeln gelähmt (Altona). 2 wurden dienstfähig, 2 dienstunbrauchbar entlassen, 4 wurden in Bäder geschickt.

Entzündungen verschiedener Nerven wurden nach Typhus (Mainz, Weingarten), nach Malaria (Altona), sowie nach Grippe (St. A. v. Old) beobachtet. Die Ersteren drei Kranken wurden invalide, letzterer nach Teplitz geschickt.

Eine Nervenentzündung durch Tabakvergiftung wurde bald nach der Einstellung bei einem Musketier in Brieg festgestellt, der schon vor der Einstellung wegen Schwachsichtigkeit durch Tabakvergiftung in einer Augenklinik behandelt war. Er hatte Schmerzen und eine so große Schwäche in den Beinen, daß er beim Exerzieren hinfiel. Starke Herabsetzung der Scharfe. Dienstunbrauchbar entlassen. (St.-A. Lischke.)

¹⁾ Monatsschrift für Unfallheilkunde, 1904, No. 5.

¹⁾ Deutsche militärärztliche Zeitschrift, 1903, Heft 6.

Vierte Unterart: Hirnhaut- und Gehirnerkrankungen
ausschließlich der tuberkulösen und der
epidemischen Genickstarre.

(No. 44 bis 46 des Rapportmusters.)

Erkrankungen der Hirnhaut. (No. 44 des
Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 4 | 55 | 0,10 | 16 | 21 ¹⁾ | 18 | 55 | 4 | 39,4 |

Außerdem erkrankten noch 2 Kadetten. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen | Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen |
|------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| G. | 11 | X. | 2 |
| I. | 4 | XI. | 3 |
| II. | 2 | XII. (I. K. S.) .. | 1 |
| III. | 1 | XIII. (K. W.) .. | 2 |
| IV. | 5 | XIV. | 6 |
| V. | 5 | XV. | 2 |
| VI. | 1 | XVI. | — |
| VII. | 2 | XVII. | 1 |
| VIII. | 1 | XVIII. | 2 |
| IX. | 2 | XIX. (2. K. S.) .. | 2 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |

Als Ursache der Erkrankung wird unter den 38 näher beschriebenen Fällen 2 mal Influenza angenommen (Magdeburg, Stendal), 4 mal Schnupfen und Mandelentzündung (Groß-Lichterfelde, Halberstadt, Kamenz); 2 mal schloß sich die Hirnhautentzündung an Ohreiterungen (Potsdam, Chemnitz), 1 mal an eine Stirnhöhleneiterung (Konstanz), ferner 2 mal an Kopfverletzungen durch Hufschlag (Allenstein) und durch Fall (Harburg) an. Bei einem Kranken ging die Erkrankung von einem Halsdrüsenabszess aus. Diese in 3 Tagen zum Tode führende Hirnhautentzündung setzte 24 Stunden nach Eröffnung des Abszesses ein (O.-St.-A. Rothamel-Königsberg i. Pr.).

¹⁾ Außerdem starb 1 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Bei den übrigen konnte außer Erkältung keine bestimmte Ursache nachgewiesen werden. Bei 10 Leichenöffnungen wurde stets eine eitrige Entzündung der weichen Hirnhaut, meist auch eine starke Erweiterung der Hirnhöhlen gefunden. 1 mal bestand gleichzeitig starke Blutfüllung der Hirngefäße und im rechten Stirnlappen lagen zwischen erweichtem Hirngewebe etwa 50 ccm geronnenes Blut; auch die rechte Seitenhöhle des Gehirns enthielt ein Blutgerinnsel (O.-St.-A. Richter-Stendal).

Die Untersuchung der Hirnflüssigkeit sowie der durch Einstich in den Rückenmarkskanal gewonnenen Flüssigkeit ergab je 1 mal Weichselbaumsche Meningokokken (St.-A. Meinhold-Neu-Ruppin) und Fränkelsche Diplokokken (St.-A. Scholze-Harburg), 3 mal wurden Streptokokken und Staphylokokken gefunden.

Das Krankheitsbild war sehr mannigfaltig und zeigte alle Abstufungen der Symptome; 1 mal wurde auf der Höhe der Erkrankung Zucker im Urin (1,5 ‰) gefunden (O.-St.-A. Mankiewicz-Danzig). — Die 7 mal vorgenommene Punktion des Rückenmarkskanals hatte auf den Krankheitsprozess keinen merklichen Einfluss, eine vorübergehende Erleichterung sah St.-A. Meinhold-Neu-Ruppin.

Der Ausgang war 20 mal der Tod, 11 mal trat — meist nach längerem Aufenthalt in einem Badeort oder Genesungsheim — Dienstfähigkeit ein, 7 mal erfolgte wegen dauernder Schädigungen die Entlassung, darunter 1 mal wegen einer an die Gehirnhautentzündung sich anschließenden Rückenmarksentzündung (spastische Spinalparalyse) (O.-St.-A. Schöngarth-Glogau) und 1 mal wegen einer Peroneuslähmung, welche O.-St.-A. Herrmann-Potsdam aber als Folge eines inzwischen geheilten Wundliegegeschwürs am Kreuzbein ansah.

Krankheiten des Gehirns. (No. 45 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 8 | 73 | 0,14 | 24 | 15 ¹⁾ | 39 | 78 | 3 | 41,3 |

Außerdem erkrankte noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie und 1 Invalide. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen | Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen |
|------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| G. | 6 | X. | 4 |
| I. | 2 | XI. | 4 |
| II. | 5 | XII. (I. K. S.) .. | 4 |
| III. | 4 | XIII. (K. W.) .. | 3 |
| IV. | 2 | XIV. | 7 |
| V. | 5 | XV. | 4 |
| VI. | 1 | XVI. | 2 |
| VII. | 4 | XVII. | 6 |
| VIII. | 2 | XVIII. | 4 |
| IX. | 3 | XIX. (2. K. S.) .. | 1 |

¹⁾ Außerdem starben 2 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 6 | 11 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 |

Gehirngeschwulst wurde 9 mal angenommen: 4 mal konnte die Diagnose durch den Leichenbefund bestätigt werden (Königsberg i. Pr., Krotoschin, Mülhausen i. E., Gießen), 5 mal wurde sie auf Grund der Erscheinungen angenommen (Berlin, Spandau, Göttingen, Heilbronn, Straßburg i. E.).

Bei dem Musketier in Heilbronn trat die Krankheit plötzlich beim Exerzieren in die Erscheinung. Er stand mit stark nach hinten gezogenem Kopfe, blaurot verfärbtem Gesicht und erschwerter Atmung da, sah und hörte angeblich alles, konnte aber nicht sprechen. Nach etwa 3 Minuten verrichtete er seinen Dienst weiter. — Auch die späteren zahlreichen Anfälle im Lazarett traten ohne Vorboten ein. Der Kopf wurde bis zwischen die Schulterblätter nach rückwärts gezogen, so daß die Lufttröhre mit dem Kehlkopf fast einen rechten Winkel bildete. Das Bewußtsein blieb erhalten. Durch gewaltsames Vorwärtsbeugen des Kopfes konnte der Anfall kupiert werden. Gleichzeitig bestand Lähmung des rechten Gesichtsnerven, später auch eine Stimmbandlähmung und Geschmacksstörungen im hinteren Drittel der Zunge, welche nicht mehr schwanden. Die späteren Anfälle gingen mit Bewußtlosigkeit einher. Wegen der Annahme einer Geschwulst am Boden der IV. Gehirnhöhle wurde der Mann als invalide entlassen (O.-St.-A. Kirn).

3 Eiterherde im Gehirn führten sämtlich zum Tode. Der Leichenbefund bestätigte ihr Vorhandensein (Stettin, Breslau, Dresden). Eine Ursache liefs sich nicht feststellen.

7 Gehirnblutungen waren meist durch äußere Gewalteinwirkung entstanden. 1 Mann wurde wieder dienstfähig (Görlitz), 4 mußten wegen einer dauernden Schädigung entlassen werden (Dresden, Straßburg i. E., Wiesbaden, Stuttgart), 2 starben (Königsberg i. Pr., Dresden).

Der Füsilier in Dresden bekam bei einer Übung an der Kletterstange einen stechenden Schmerz im Kopf, liefs sich langsam herab und brach zusammen. Anfangs war er bei Bewußtsein und klagte über Schmerzen hinter den Augen. Bei der Lazarettaufnahme war er bewußtlos. Nach 3 Tagen tot. Bei der Leichenöffnung fand sich eine Blutung in der rechten Sylvischen Grube und ein wallnufsgroßer Erweichungsherd in der Spitze des rechten Schläfenlappens (St.-A. Schichhold).

2 Folgen durch Syphilis bedingter Schlaganfälle wurden durch Schmierkur geheilt (Berlin, Frankfurt a. O.).

Eine gekreuzte Lähmung (linke Gesichtseite, linksseitige Gaumen- und Zungenlähmung und Lähmung des rechten Armes und Beines) beobachtete O.-St.-A. Ohlsen-Züllichau:

Sie war durch eine Verstopfung (Embolie) der Schlagader in der linken Sylvischen Grube bedingt. Der Mann hatte drei

Jahre vorher Gelenkrheumatismus überstanden. Es bestanden Herzgeräusche. Dienstunbrauchbar entlassen.

Gehirn-(Rückenmark-)Erschütterung. (No. 46 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 7 | 206 | 0,39 | 172 | 2 | 29 | 203 | 10 | 26,5 |

Außerdem erkrankten noch 2 Kadetten. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen | Armeekorps | Zugang in absoluten Zahlen |
|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| G. | 13 | X. | 5 |
| I. | 13 | XI. | 7 |
| II. | 13 | XII. (1. K. S.) . | 11 |
| III. | 2 | XIII. (K. W.) . . | 16 |
| IV. | 2 | XIV. | 14 |
| V. | 15 | XV. | 7 |
| VI. | 22 | XVI. | 7 |
| VII. | 9 | XVII. | 5 |
| VIII. | 13 | XVIII. | 13 |
| IX. | 10 | XIX. (2. K. S.) . | 9 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 17 | 25 | 9 | 16 | 12 | 18 | 9 | 28 | 15 | 30 | 14 | 13 |

Sämtliche 40 unter dieser Rapportnummer beschriebenen Erkrankungen sind durch äußere Gewalteinwirkungen (Fall, Hufschlag, Sturz mit dem Rade oder vom Pferde, Faustschlag) veranlaßt worden. 2 mal sprachen gleichzeitige Sprachstörungen und Lähmungen der Gesichts- oder Rumpfnerven für Mitbeschädigung des Gehirns. (Berlin, Ludwigsburg.)

Bei 29 Kranken konnte die Dienstfähigkeit wiederhergestellt werden, 8 wurden invalide, 2 dienstunbrauchbar; die meisten wegen allgemeiner Beschwerden (Kopfschmerzen, Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Krämpfe, gedrückte Stimmung). — 1 Mann starb einige Stunden nach dem Unfall, da Atmung und Herztätigkeit plötzlich stehen blieben. Es wurde eine Gehirnblutung angenommen (St.-A. Brandt-Berlin).

Fünfte Unterart: Krankheiten des Rückenmarks.

(No. 47 und 48 des Rapportmusters.)

| | Bestand waren | | Zugang | | Abgang | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|--|---------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|----|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | | |
| Rückenmarksschwindsucht (No. 47) | 3 | 10 | 0,02 | 2 | — | 9 | 11 | 2 | 46,3 |
| Andere Rückenmarkskrankheiten (No. 48) | 9 | 29 | 0,06 | 2 | 3 | 32 | 37 | 1 | 58,3 |

Außerdem erkrankte 1 Invalide an Rückenmarksschwindsucht. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Bei 4 Kranken waren mehr oder weniger deutliche Erscheinungen von Rückenmarksschwindsucht (Tabes dorsalis) vorhanden.

2 mal (Minden, Frankfurt a. M.) machten Augenerkrankungen, 1 mal Erbrechen, die als gastrische Krisen gedeutet wurden (Königsberg i. Pr.), auf das Leiden aufmerksam. Der Kranke in Frankfurt a. M. hatte 5 Jahre vorher an Tripper und einem schnell geheilten Schanker gelitten. Er wurde durch eine Schmierkur geheilt. Bei 2 anderen lagen keine Zeichen von Syphilis vor, über den 4. fehlen die Angaben (Ludwigsburg). Die 3 letztgenannten wurden invalide.

Akute Rückenmarksentzündung wurde 1 mal beobachtet; nach einer Kur in Wiesbaden trat Dienstfähigkeit ein (St.-A. Grimm-Frankfurt a. M.).

Über chronische Rückenmarksentzündung wird 8 mal berichtet, 1 mal unter Mitbeteiligung der Rückenmarkshäute (St.-A. Gotthold-Sonderburg).

Die Krankheit endete 1 mal mit dem Tode (St.-A. Köhler-Mülhausen i. E.), 7 mal führte sie zur Invalidität (Posen, Angermünde, Naumburg a. S., Freiburg i. Baden, Zwickau, Sonderburg, Berlin Invalidenhaus).

1 mal wurde Sturz mit dem Rade (Naumburg a. S.), 1 mal Influenza (Sonderburg), sonst Erkältung als Ursache genannt. Bei 2 Kranken nahmen St.-A. Blecher-Brandenburg a. H. bzw. St.-A. Mersmann-Wesel Blutungen in die Rückenmarkshöhle an.

In Brandenburg a. H. fiel ein Füsilier, als er sein Spind aufschließen wollte, bewusstlos um. Nach Rückkehr des Bewusstseins klagte er über Schmerzen und Steifigkeit im Nacken und Rücken. Druckschmerzhaftigkeit der Wirbeldornfortsätze bis zum 2. Lendenwirbel, starke Schwäche des rechten Armes. Nach Beseitigung aller Erscheinungen trat 7 Tage später ein ähulicher Anfall mit Pulsverlangsamung auf, der gleichfalls bald vorüberging. Völlige Wiederherstellung.

Ein Kanonier in Wesel erkrankte 2 Tage nach einem verunglückten Sprung vom Sprungkasten mit Schmerzen in beiden Beinen, Harn- und Mastdarmbeschwerden. Es entwickelte sich eine lähmungsartige Schwäche beider Beine mit Aufhebung der Gefühlsempfindung an den Füßen. Der Kniescheibenreflex war erhöht, der Achillessehnenreflex nicht zu erzielen. Wegen der zurückgebliebenen Schwäche der Beine wurde der Mann invalide.

Erkrankungen an spastischer Spinalparalyse werden 3 mal (Berlin, Münster, Hameln), an Seitenstrang-

sklerose 2 mal (Hannover, Berlin) berichtet. Der in Berlin beobachtete Kranke starb an Bulbärparalyse (O.-St.-A. Riebel-Berlin). 3 wurden invalide, 1 dienstunbrauchbar. Bei letzterem hatte sich die Krankheit vor der Einstellung entwickelt (Hameln).

Erkrankungen der Vorderhörner des Rückenmarks wurden in Hirschberg und Mülhausen i. E. beobachtet. Beide führten zur Invalidität.

Eine Erkrankung an Landry'scher Paralyse kam in Goldap vor:

Bei einem Musketier, der an einem sehr heißen, sonnigen Tage während des Marsches an Kopfschmerzen und großem Schwächegefühl erkrankt war, entwickelte sich in 4 Tagen eine völlige Lähmung der Beine und Schwäche der Arme. Die Sehnenreflexe waren erloschen und die Hautempfindlichkeit am ganzen Körper herabgesetzt. Kein Fieber. Unter zunehmender Atemnot entwickelte sich am 4. Tage die Lähmung der Arme in 3 Stunden vollkommen, das Bewusstsein war noch erhalten, das Gefühl aber völlig erloschen. $\frac{1}{2}$ Stunde später wurde das Erstickungsgefühl bei verlangsamter Herztätigkeit äußerst stark. Nach Lähmung der Hals- und Schlingmuskulatur trat Bewusstlosigkeit und 2 Stunden später der Tod ein.

Bei der Leichenöffnung fand sich starke Blutfülle aller Organe, besonders des Gehirns, des verlängerten Marks, des Rückenmarks und seiner Häute. Im pathologischen Institut zu Königsberg i. Pr. wurde an Serienschnitten des Rückenmarks und des verlängerten Marks eine starke Erweiterung der perivaskulären und periganglionären Lymphräume und ein vermehrter Zellgehalt in der grauen Substanz nachgewiesen.

Als Entstehungsursache wird von dem Berichtersteller die Hitzeeinwirkung auf das verlängerte Mark angesprochen (St.-A. Brockmann).

Vielfache Verhärtungsherde im Gehirn und Rückenmark (Multiple Sklerose) sind 5 mal beobachtet worden (Karlsruhe (2), Zittau, Hannover, Altona). 3 wurden als invalide, 2 als dienstunbrauchbar entlassen.

Sechste Unterart: Progressive Muskelatrophie.

(No. 49 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| — | 14 | 0,03 | 4 | — | 9 | 13 | 1 | 40,4 |

Die eine ausführlich beschriebene Erkrankung betrifft einen Trompeter in Lüben:

Er erkrankte im Dezember 1902 an einer Schwäche des linken Zeigefingers und Kribbeln in den Fingerspitzen. Bei seiner Lazarettaufnahme im Februar 1903, die wegen doppelseitiger Aderhautentzündung erfolgte, bestand eine deutliche Abmagerung der kleinen Handmuskeln, besonders der an beiden Daumen- und Kleinfingerballen, ferner Schwund der beiden zweiköpfigen Armmuskeln und des linken Deltamuskels. Durch Bäder, Elektrizität, Massage, Einreibung von grauer Salbe und Darreichung von Jodkalium wurde keine Besserung erzielt. Invalide (O.-St.-A. Schelle).

Siebente Unterart: Neurasthenie und Hysterie.

(No. 50 und 51 des Rapportmusters.)

| | Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich. | |
|-------------------------|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-----------------|---|-------|
| | | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| Neurasthenie (No. 50) | 14 | 324 | 0,62 | 185 | — | 138 | 323 | 15 | 28,4 |
| Hysterie (No. 51) . . . | 17 | 285 | 0,54 | 109 | — | 179 | 288 | 14 | 40,9 |
| zusammen | 31 | 609 | 1,2 | 294 | — | 317 | 611 | 29 | 34,3 |

Außerdem erkrankten an Neurasthenie 1 Invalide, 1 Kadett und 1 Unteroffizier-Vorschüler, an Hysterie 4 Kadetten und 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Von 36 an Neurasthenie Erkrankten waren nur 16 Leute des Mannschaftsstandes und 3 Einjährig-Freiwillige. Die übrigen waren Angehörige höherer Dienstgrade von längerer Dienstzeit.

Als Ursache der Erkrankung wurde angesprochen: Voraufgegangener Unfall 5 mal (Berlin, Magdeburg, Stuttgart, Ludwigsburg, Metz), Schiffbruch 1 mal (Paderborn), Typhus 1 mal (Schweidnitz), Blinddarmentzündung 1 mal (Magdeburg), Onanie 2 mal (Berlin, Metz), chronischer Alkoholismus 2 mal (Berlin). Bei einem Vizewachtmeister (Regimentsschreiber) wurde die Erkrankung auf geistige Überanstrengung (Metz), bei einem Hoboisten auf die anstrengende Tätigkeit in und außer Dienst (Königsberg i. Pr.), bei einem Unteroffizier auf die Anstrengungen der ostasiatischen Expedition (Sonderburg) zurückgeführt.

St.-A. Waldeyer-Cöln macht darauf aufmerksam, daß bei Klagen über Schmerzen in der Leistengegend wahrscheinlich geschlechtliche Überreizung als Ursache der Neurasthenie anzusehen sei.

Nachweisbare erbliche Disposition lag bei 7 Kranken vor.

10 mal wurde Dienstfähigkeit erreicht, mehrmals traten die nervösen Beschwerden im Lazarett zurück, kamen aber sofort wieder, sobald versuchsweise Dienst getan wurde, so daß die Entlassung doch in die Wege geleitet werden mußte.

Bei einem Kranken in Altona (St.-A. Drenkhahn) äußerte sich die Neurasthenie in einer Verlangsamung, bei einem andern in einer Beschleunigung der Atmung. Der erste machte 14 Atemzüge in der Minute, darunter jede halbe Minute einen tiefen Atemzug, bei dem letzteren betrug die Atmungszahl 36—40 in der Minute bei Tage und 26—27 während des Schlafes. Eine bestimmte Ursache war nicht nachzuweisen. Beide Leute wurden dienstunfähig entlassen.

Ungleich häufiger als neurasthenische sind Hysterieerkrankungen beschrieben (91 mal). Mit 2 Ausnahmen (Magdeburg, Potsdam) gehörten sämtliche Leute dem Mannschaftsstande an.

Von den mannigfaltigen Erscheinungen seien folgende erwähnt: Erhöhte Temperatur (Hannover), herabgesetzte Temperatur 35,5° C. (Thorn), Beschleunigung der Atmung auf 40—70 in 1 Minute (Darmstadt, Münster), Weinkrämpfe (Metz), Katalepsie (Berlin), Neigung zu unwahren Angaben und ungerechten Anschuldigungen (Giessen).

Die Hysterie wurde 20 mal durch eine bestimmte Ursache ausgelöst, und zwar 13 mal durch Verletzungen, 3 mal durch Gemütsregungen (Magdeburg, Mühlhausen i. Th., Jüterbog),

je 1 mal durch Schreck (Hildburghausen), durch Influenza (Jena), durch Nierenentzündung (Stuttgart), durch Blinddarmentzündung (Berlin). 2 mal wurden bei Schwachsinnigen hysterische Erscheinungen beobachtet (Berlin, Lübeck). Die dienstlichen Verhältnisse wurden 8 mal für den Ausbruch der Hysterie verantwortlich gemacht. In den übrigen Fällen war keine Ursache nachweisbar. Erbliche Belastung konnte nur 18 mal festgestellt werden.

Hystero-Epilepsie wurde 5 mal beobachtet (Berlin (3), Tilsit, Graudenz).

Interessant ist folgende Mitteilung:

Ein Kanonier in Graudenz, der erblich nicht belastet war, wurde, weil er bei der Truppe 2 Krampfanfälle gehabt haben wollte, dem Lazarett überwiesen. Es fand sich Herabsetzung des Gefühlssinnes, der motorischen Kraft und der elektrischen Erregbarkeit der Muskeln der rechten Körperhälfte. Das Fassungsvermögen war träge. Da diese Erscheinungen schnell zurückgingen und keine Krampfanfälle auftraten, wurde er nach 3 Wochen dienstfähig entlassen. Mehrere Monate war er völlig wohl, bis nach einem Hufschlag gegen den Unterleib echte epileptische Krampfanfälle ohne hysterische Beimischung beobachtet wurden (St.-A. Hoppe).

Bei der Behandlung wurden vielfach Wasseranwendungen aller Art, Elektrizität und Massage zu suggestiven Zwecken benutzt. Hypnose wurde selten versucht, Besserung brachte sie 1 mal (Münster), Heilung niemals. O.-St.-A. Steinhausen-Hannover empfiehlt, bei der Behandlung der Hysterie an folgenden Prinzipien festzuhalten: 1. Verbot jeder überflüssigen Untersuchung, besonders des Suchens nach versteckten Zeichen nach einmal erfolgter Feststellung der Diagnose. 2. Ignorieren aller hysterischen Krankheitserscheinungen dem Kranken gegenüber. 3. Von vornherein wird allen sich akut und stürmisch äufsernden Anfällen mit möglichster Energie entgegengetreten. 4. Unterstützung der suggestiven Behandlung durch hydriatische Prozeduren, Massage, Elektrizität.

Achte Unterart: Andere Krankheiten des Nervensystems.

(No 52 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich | |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|-------|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| 8 | 146 | 0,28 | 60 | 1 ¹⁾ | 92 | 153 | 1 | 32,6 |

Außerdem erkrankten noch 4 Kadetten und 2 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

2 Neueingestellte litten seit mehreren Jahren an Zittern der Glieder (Brieg, Rastatt) und 2 an klonischen Krämpfen einzelner Muskelgruppen (Oppeln, Mörchingen). Sie wurden entlassen, da die militärische Ausbildung unmöglich war.

Unwillkürliche Muskelbewegungen an der linken Hand (Athetose) beobachtete O.-St.-A. Steinhausen-Hannover bei einem Kanonier, der im Alter von 12 Jahren cerebrale Kinderlähmung überstanden hatte. Die Zuckungen sollten erst in jüngster Zeit aufgetreten sein, im Lazarett

¹⁾ Außerdem starb 1 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

verloren sie sich vollständig, so daß der Mann dienstfähig blieb.

Von andern Neurosen wurden Veitstanz 2 mal (Posen, Ludwigsburg), Nachtwandeln 8 mal (Cöln, Ulm, Weingarten (2), Stuttgart (4)), Basedowsche Krankheit 5 mal (Berlin, Annaburg, Cöln, Hildesheim, Rastatt) beobachtet. Unter der Bezeichnung Thomsensche Krankheit werden 3 (Insterburg, Frankfurt a. O. (2)), als Tetanie 1 Erkrankung (Halberstadt) beschrieben.

Eine Erkrankung von flüchtigem Ödem berichtet St.-A. Aschenbach-Metz:

Ein Musketier war wegen einer Hornhautentzündung dem Lazarett überwiesen. Nach schneller Beseitigung derselben trat ohne Veranlassung plötzlich eine ödematöse Schwellung beider Augenlider und des rechten Handrückens auf. In der nächsten Nacht stellte sich plötzlich Atemnot ein bei gleichzeitiger Schwellung des Rachens und des Mundes. Diese Schwellungen wiederholten sich in den nächsten Tagen im Gesicht und an verschiedenen Körperstellen, dann traten sie nicht wieder auf. Kein Eiweiß im Urin. Dienstunbrauchbar entlassen.

III. Gruppe: Krankheiten der Atmungsorgane.

(No. 53 bis 63 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | | |
| 641 | 43 361 | 82,3 | 39 906 | 90,7 | 172 ¹⁾ | 0,39 | 3 254 | 7,4 | 43 332 | 98,5 | 670 | 650 257 | 14,8 |

Außerdem erkrankten noch 10 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 12 Invaliden, 474 Kadetten und 231 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Gegenüber dem Vorjahre ist der Zugang um 2456 Mann = $6,6 \frac{0}{00}$ K. gestiegen.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | | Armeekorps | Zugang | | |
|---------------|--------------|---------|---------|------------------|--------------|---------|---------|
| | abs. Zahl | ‰ K. | ‰ M. | | abs. Zahl | ‰ K. | ‰ M. |
| G. | 4084 | 98,8 | 140,4 | XII. (1. K. S.) | 1595 | 79,9 | 146,9 |
| I. | 2986 | 94,4 | 136,1 | XIII. (K. W.) | 2027 | 91,6 | 119,0 |
| II. | 2120 | 82,0 | 120,0 | XIV. | 2699 | 84,8 | 141,4 |
| III. | 1525 | 64,8 | 123,1 | XV. | 2372 | 76,0 | 124,3 |
| IV. | 1464 | 65,5 | 117,6 | XVI. | 2421 | 88,7 | 128,5 |
| V. | 2263 | 88,3 | 158,8 | XVII. | 2155 | 72,8 | 140,8 |
| VI. | 2056 | 79,6 | 149,3 | XVIII. | 2242 | 85,3 | 136,0 |
| VII. | 2196 | 81,5 | 131,2 | XIX. (2. K. S.) | 1531 | 74,3 | 128,6 |
| VIII. | 2538 | 94,4 | 133,5 | | | | |
| IX. | 1705 | 68,3 | 129,4 | I. K. B. | 3462 | 148,9 | 156,1 |
| X. | 1557 | 71,1 | 127,2 | II. " " | 2691 | 126,1 | 146,6 |
| XI. | 1825 | 87,9 | 120,9 | III. " " | 2524 | 135,6 | 160,6 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 2128 | 3360 | 5089 | 8232 | 6057 | 4713 | 3087 | 2897 | 2114 | 2547 | 1843 | 1294 |
| ‰ K. | 5,0 | 6,2 | 9,5 | 15,4 | 11,3 | 8,8 | 5,7 | 5,3 | 3,9 | 4,6 | 3,4 | 2,7 |

Die Beteiligung der einzelnen Armeekorps und Monate an dem Zugange ist in den vorstehenden Tabellen ersichtlich gemacht.

Die monatlichen Erkrankungsziffern bestätigen die alte Erfahrung von der größten Häufigkeit der Erkrankungen der Atmungsorgane in den Monaten Januar bis März (vergl. auch die graphische Darstellung Seite 63). In diesem Jahre fällt die höchste Erhebung in den Januar, im Vorjahre hatten der Februar und Januar den höchsten Zugang.


Erste Unterart: Krankheiten der ersten Atmungswege. Bronchialkatarrh.

(No. 53 bis 57 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | | |
| 307 | 37 839 | 71,9 | 36 262 | 95,1 | 2 | 0,01 | 1 544 | 4,0 | 37 808 | 99,1 | 338 | 414 516 | 10,9 |

¹⁾ Außerdem starben 5 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Monatlicher Zugang an Krankheiten der Atmungsorgane im allgemeinen (—), an Krankheiten der ersten Atemwege und Bronchialkatarrh (-+-), an Lungentzündungen (----), an Brustfellentzündungen (-----) auf 1000 der monatlichen Iststärke berechnet.



Außerdem erkrankten noch 9 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 12 Invaliden, 446 Kadetten und 209 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Gegen das Vorjahr hat die Erkrankungsziffer der Gruppe III bei dieser Unterart um 2594 Mann = $6,7 \frac{0}{100}$ K. zugenommen.

Aus der graphischen Darstellung (auf Seite 63) ist leicht zu erkennen, daß die für die ganze Gruppe bemerkbare Zunahme der Erkrankungsziffer in den Monaten Januar bis März fast ausschließlich durch Häufung von Erkrankungen der ersten Unterart verursacht ist.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|----------------|---------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 3523 | 85,2 | X. | 1294 | 59,0 |
| I. | 2563 | 81,0 | XI. | 1621 | 78,1 |
| II. | 1785 | 69,1 | XII. (I.K.S.) | 1327 | 66,5 |
| III. | 1277 | 54,3 | XIII. (K.W.) | 1859 | 84,0 |
| IV. | 1254 | 56,1 | XIV. | 2441 | 76,7 |
| V. | 1967 | 76,8 | XV. | 2154 | 69,0 |
| VI. | 1810 | 70,1 | XVI. | 2173 | 79,6 |
| VII. | 1914 | 71,0 | XVII. | 1807 | 61,0 |
| VIII. | 2291 | 85,2 | XVIII. | 2029 | 77,2 |
| IX. | 1433 | 57,4 | XIX. (2. K.S.) | 1317 | 64,0 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 1818 | 2958 | 4577 | 7535 | 5354 | 4191 | 2580 | 2286 | 1739 | 2178 | 1572 | 1051 |
| ‰ K. | 4,2 | 5,5 | 8,5 | 14,1 | 10,0 | 7,8 | 4,8 | 4,2 | 3,2 | 3,9 | 2,9 | 2,2 |

Krankheiten der Nase und Nebenhöhlen.

(No. 53 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 9 | 667 | 1,3 | 570 | — | 97 | 667 | 9 | 16,8 |

Außerdem erkrankten noch 159 Kadetten und 3 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Hartnäckiges Nasenbluten erforderte mehrmals Behandlung im Lazarett.

Nasenpolypen, Muschelvergrößerungen, Spornbildungen an der Nasenscheidewand wurden häufig operiert; in allen Fällen konnte die Dienstfähigkeit erhalten bleiben.

Die Kieferhöhle wurde 5 mal wegen eitriger Entzündung eröffnet (Mülhausen i. E., Berlin, Posen, Cassel, Leipzig). 3 Operierte wurden dienstfähig, 1 invalide und 1 starb an allgemeiner Blutvergiftung. (Siehe auch bei Gruppe V No. 80.)

Stirnhöhlenerkrankungen erforderten 2 mal operativen Eingriff. Die Dienstfähigkeit blieb beide Male erhalten (Posen, Worms).

St.-A. Glatzel-Liegnitz glaubt, daß das Auftreten einer in der Mittellinie scharf abgegrenzten einseitigen Schweißabsonderung auf der ganzen rechten Gesichtshälfte eines Füsiliers, das nach Abtragung eines Grats (Spina) der Nasenscheidewand entstand, durch Reizung der mit den Ästen des dreigeteilten Hirnnerven verlaufenden Schweißfasern des sympathischen Nerven infolge der Operation entstanden sei. Der Mann wurde dienstunbrauchbar.

Derselbe Berichterstatter wandte 1 mal Paraffininjektionen zur Beseitigung der Sattelnase mit sehr gutem Erfolge an.

Akuter Kehlkopf- und Luftröhrenkatarrh und andere Krankheiten der Luftwege und Stimmwerkzeuge. (No. 54 und 55 des Rapportmusters.)

| | Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich | |
|--|---------------|--------------|------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--|-------|
| | | absol. Zahl. | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| Akuter Kehlkopf- u. Luftröhrenkatarrh (No. 54) | 26 | 9910 | 18,8 | 9868 | — | 35 | 9903 | 33 | 7,7 |
| Andere Krankheiten der ersten Luftwege und Stimmwerkzeuge (No. 55) | 5 | 49 | 0,09 | 17 | — | 31 | 48 | 6 | 46,5 |

Außerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 1 Invalide, 147 Kadetten und 57 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

An akuten Kehlkopf- und Luftröhrenkatarrh sich anschließende Lähmung der Giefsbeckenknorpel führte 1 mal (Grauden z), chronische Heiserkeit 3 mal (Ulm) zur Entlassung.

Hysterische Stimmbandlähmung ist 2 mal erwähnt. 1 Invalide in Liegnitz mußte nach längerer Behandlungsdauer ungeheilt entlassen werden, 1 Musketier in Bischofsburg wurde dienstfähig.

Wegen lähmungsartiger Schwäche der Stimmritzen-erweiterer, die im Laufe eines Jahres ohne bekannte Ursache sich entwickelt hatte und das Einatmen sehr erschwerte, wurde 1 Mann in Deutz dienstunbrauchbar.

Akuter Bronchialkatarrh. (No. 56 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich | |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--|-------|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| 184 | 25 932 | 49,2 | 25 597 | 1 | 285 | 25 883 | 233 | 10,3 |

Außerdem erkrankten noch 4 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 10 Invaliden, 139 Kadetten und 143 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Unter 1075 in den Einzelberichten aus 18 Lazaretten zahlenmäßig angeführten Erkrankungen an akutem Bronchialkatarrh wurden als Begleiterkrankungen 4 mal Mittelohrentzündung, 8 mal Brustfellentzündung, 1 mal Nierenentzündung beobachtet.

[St.-A. Schichhold-Dresden fand bei der Untersuchung eines wegen akuten Bronchialkatarrhs zugegangenen Kranken Verlagerung sämtlicher Brust- und Baueingeweide (Situs inversus). Der rechte Hoden hing tiefer als der linke.]

Bei der Heilung der hartnäckigeren Erkrankungen erwiesen sich die Genesungsheime sehr nützlich.

Chronischer Katarrh der Luftwege. (No. 57 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 83 | 1281 | 2,4 | 210 | 1 | 1096 | 1307 | 57 | 40,8 |

Außerdem erkrankten noch 4 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 1 Invalide, 1 Kadett und 6 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die Erkrankungen schlossen sich durchgehends an vorausgegangene akute Katarrhe an und betrafen meist solche Leute, die schon von Kindheit an zu Katarrhen neigten.

In verschiedenen Fällen, in welchen der physikalische Befund für Tuberkulose sprach, konnte der bakteriologische Nachweis trotz eingehender Untersuchungen nicht erbracht werden. (St.-A. Keyl-Berlin, St.-A. Bludau-Königsberg i. Pr., St.-A. Neuhaus-Magdeburg, O.-St.-A. Kraufs-Ulm, O.-St.-A. Schmidt-Rastatt.)

Zweite Unterart: Akute Lungenentzündung.

(No. 58 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|-------------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 108 | 3240 | 6,2 | 2460 | 136 ¹⁾ | 638 | 3234 | 114 | 36,5 |

Außerdem erkrankten noch 21 Kadetten und 10 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Gesamtzugang sowohl als auch die Sterblichkeit haben auch in diesem Berichtsjahre weiter abgenommen. Erkrankungen und Todesfälle an akuter Lungenentzündung.

| Im Durchschnitt der Jahre | Erkrankungen | | Todesfälle | | |
|-------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------------------|
| | absol. Zahl | ‰ K. | absol. Zahl | ‰ K. | ‰ der Behand- delten |
| 1881/82 bis 1885/86 | 4143,4 | 11,0 | 184,2 | 0,49 | 4,3 |
| 1886/87 bis 1890/91 | 4346,8 | 10,5 | 180,8 | 0,43 | 4,0 |
| 1891/92 bis 1895/96 | 4389,2 | 9,3 | 168,2 | 0,36 | 3,7 |
| 1896/97 bis 1900/01 | 3773,0 | 7,3 | 143,2 | 0,28 | 3,7 |
| im Jahre 1901/02 | 3379 | 6,3 | 116 | 0,21 | 3,3 |
| „ „ 1902/03 | 3240 | 6,2 | 136 | 0,26 | 4,2 |

¹⁾ Außerdem starben 2 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Sanitäts-Bericht über die Armee. 1092/03. I. Teil.

In der nachstehenden Tabelle sind die Erkrankungs- und Sterblichkeitsziffern in der Deutschen, Französischen und Österreichischen Armee, soweit sie sich haben feststellen lassen, zum Vergleich nebeneinander aufgeführt.

| J a h r | Erkrankungen an Lungenentzündung ‰ K. | | | Todesfälle an Lungenentzündung ‰ K. | | |
|--|--|-------------------|------------|--|--------------------|------------|
| | Preufs. Armee XII. (I. K. S.) XIII. (K. W.) und XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Frankreich | Österreich | Preufs. Armee ¹⁾ XII. (I. K. S.) XIII. (K. W.) und XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Frankreich | Österreich |
| 1881/82 bis 1885/86 bezw. 1881 bis 1885 ²⁾ | 11,0 | — | 10,8 | 0,50 | — | 1,2 |
| 1886/87 bis 1890/91 bezw. 1886 bis 1890 ²⁾ | 10,5 | — | 8,9 | 0,44 | — | 0,7 |
| 1891/92 bis 1895/96 bezw. 1891 bis 1895 ²⁾ | 9,3 | 8,1 | 7,4 | 0,36 | 0,81 | 0,58 |
| 1896/97 bis 1900/01 bezw. 1896 bis 1900 ²⁾ | 7,3 | 6,1 | 5,8 | 0,28 | 0,60 | 0,45 |
| 1901/02 bezw. 1901 ²⁾ | 6,3 | 4,8 ³⁾ | 5,6 | 0,21 | 0,35 ³⁾ | 0,29 |
| 1902/03 bezw. 1902 ²⁾ | 6,2 | 4,3 | 5,5 | 0,26 | 0,25 | 0,27 |

Die Verteilung des Zuganges auf die einzelnen Monate ist aus der folgenden Übersicht zu ersehen. Die meisten Erkrankungen sind in den Monaten Februar und Januar vorgekommen; demnächst folgen die Monate Mai, Dezember und März.

Die wenigsten Erkrankungen kamen im August vor.

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 141 | 241 | 349 | 451 | 484 | 332 | 306 | 382 | 179 | 156 | 109 | 110 |
| ‰ K. | 0,33 | 0,44 | 0,65 | 0,84 | 0,91 | 0,62 | 0,57 | 0,70 | 0,33 | 0,28 | 0,20 | 0,23 |

Die Höhe des Zuganges bei den verschiedenen Armeekorps während der letzten 22 Jahre ist in der nachstehenden Tabelle zahlenmäßig nachgewiesen und auf den Karten XVII bis XXII bildlich zur Anschauung gebracht. Dafs die 3 nordöstlichen Armeekorps der preussischen Armee, das I., II. und XVII., während der aufgeführten Berichtszeiträume den größten Anteil an dem Gesamtzugänge hatten, geht aus der Tabelle wie aus den Karten deutlich hervor. Den niedrigsten Zugang hatte im vorliegenden Berichtsjahr das XIII. (K. W.) und XIV. Armeekorps.

¹⁾ Hier sind die innerhalb und außerhalb der militärärztlichen Behandlung vorgekommenen Todesfälle verrechnet.

²⁾ Jahreszahlen für die französische und österreichische Armee.

³⁾ Diese Zahlen sind auf 1000 Mann der Präsenzstärke berechnet und betreffen bis zum Jahre 1900 die Truppen in der Heimat sowie Algerien und Tunis, vom Jahre 1901 ab nur die eigentlichen Truppen in der Heimat ausschliesslich derjenigen in Algerien und Tunis.

Erkrankungen an Lungenentzündung

in den größeren¹⁾ Garnisonen der Deutschen Armee, alphabetisch geordnet und auf 1000 Mann der Iststärke berechnet.

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ²⁾ | 1902/03 | | Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ²⁾ | 1902/03 | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | bis 1885/86 ³⁾ | bis 1890/91 ³⁾ | bis 1895/96 ³⁾ | bis 1900/01 ³⁾ | | Durchschnittszugang ‰ K. | Ist- stärke | | Zu- gang ‰ K. | bis 1885/86 ³⁾ | bis 1890/91 ³⁾ | bis 1895/96 ³⁾ | | bis 1900/01 ³⁾ | Durchschnittszugang ‰ K. |
| Aachen | 5,3 | 7,6 | 6,1 | 5,4 | 4,2 | 1 826 | 6,0 | Erfurt | 5,6 | 8,8 | 5,4 | 4,7 | 2,4 | 2 020 | 5,0 |
| Allenstein | 14,2 ⁴⁾ | 22,6 | 23,6 | 13,5 | 6,5 | 3 862 | 11,1 | Erlangen | 19,7 ⁴⁾ | 30,2 | 9,8 | 7,2 | 12,1 | 2 116 | 9,9 |
| Altenburg | 7,5 | 4,6 | 4,4 | 5,5 | 4,1 | 1 188 | 1,7 | Flensburg | 11,3 | 9,7 | 11,7 | 9,2 | 5,4 | 1 289 | 10,1 |
| Altona-Hamburg | 11,8 | 8,3 | 7,3 | 8,4 | 4,3 | 4 489 | 5,8 | Frankfurt a. M. | 7,8 | 9,4 | 6,1 | 6,1 | 0,73 | 2 651 | 5,3 |
| Amberg | 14,5 ⁴⁾ | 24,1 | 10,1 | 10,5 | 2,4 | 1 633 | 16,5 | Frankfurt a. O. | 10,3 | 11,1 | 8,8 | 7,8 | 5,9 | 5 268 | 5,3 |
| Augsburg | 8,9 | 16,4 | 11,5 | 9,8 | 16,6 | 2 680 | 3,7 | Freiburg i. Baden | 7,9 | 7,7 | 3,6 | 4,0 | 1,4 | 2 813 | 3,9 |
| St. Averd | 22,4 | 13,4 | 6,9 | 7,0 | 6,3 | 2 479 | 4,8 | Fürth | — | 12,6 ⁷⁾ | 12,1 | 5,1 | 2,4 | 1 215 | 2,5 |
| Bamberg | 11,6 | 15,0 | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 2 181 | 13,3 | Germersheim | 4,2 | 7,4 | 5,3 | 2,3 | 5,6 | 1 939 | 3,1 |
| Bautzen | 10,1 | 10,7 | 9,5 | 10,8 | 1,7 | 1 768 | 4,5 | Giefßen | 10,1 | 12,9 | 8,6 | 6,0 | 3,1 | 1 930 | 5,2 |
| Bayreuth | 21,0 | 24,1 | 17,5 | 15,1 | 6,8 | 2 152 | 12,5 | Glatz | 6,8 | 10,4 | 10,4 | 5,6 | 5,0 | 1 757 | 4,6 |
| Berlin | 8,9 | 6,7 | 6,4 | 5,3 | 3,9 | 27 694 | 5,2 | Gleiwitz | 22,3 | 12,1 | 7,8 | 7,4 | 6,5 | 1 831 | 7,6 |
| Bitsch | 5,4 | 3,7 | 2,5 | 4,5 | 3,4 | 1 909 | 3,7 | Glogau | 14,9 | 9,3 | 8,5 | 7,0 | 6,4 | 3 395 | 9,4 |
| Bonn | 8,9 | 6,4 | 6,0 | 3,7 | 8,1 | 1 421 | 6,3 | Gnesen | 20,8 | 21,3 | 20,3 | 11,3 | 10,1 | 2 474 | 9,3 |
| Brandenburg a. H. | 13,1 | 5,0 | 7,5 | 4,1 | 3,6 | 3 615 | 3,3 | Görlitz | 5,9 | 9,2 | 8,1 | 6,7 | 2,9 | 1 289 | 6,2 |
| Braunschweig | 13,3 | 13,7 | 9,9 | 6,1 | 8,5 | 2 784 | 5,7 | Göttingen | 13,2 | 13,6 | 9,7 | 5,0 | 2,6 | 1 855 | 5,4 |
| Bremen | 11,6 | 14,3 | 9,0 | 5,2 | 5,7 | 1 324 | — | Goldap | 38,7 ³⁾ | 18,8 | 18,9 | 8,5 | 3,6 | 1 406 | 2,8 |
| Breslau | 10,1 | 13,0 | 12,5 | 9,1 | 5,5 | 5 581 | 4,8 | Graudenz | 31,3 | 20,1 | 13,2 | 10,7 | 7,8 | 5 802 | 7,6 |
| Brieg | 7,9 | 10,7 | 7,2 | 4,9 | 3,7 | 2 334 | 1,7 | Groß-Lichterfelde | 4,1 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 6,6 | 1 508 | 8,0 |
| Bromberg | 30,8 | 20,4 | 16,1 | 11,9 | 5,1 | 5 355 | 5,8 | Gumbinnen | 24,0 | 19,0 | 17,5 | 10,3 | 3,8 | 2 887 | 4,5 |
| Cassel | 6,9 | 9,9 | 5,8 | 5,3 | 1,4 | 4 803 | 4,0 | Hagenau | 6,6 | 9,3 | 13,0 | 9,5 | 6,0 | 3 881 | 6,2 |
| Celle | 12,3 | 12,9 | 11,0 | 7,2 | 5,2 | 2 120 | 5,7 | Hagenau-Truppen- Übungsplatz | — | — | — | 1,3 | 0,67 | 3 000 | 0,67 |
| Charlottenburg | 7,8 | 11,1 | 5,9 | 5,6 | 3,2 | 2 189 | 5,5 | Halberstadt | 6,5 | 5,2 | 7,6 | 5,0 | 7,1 | 2 367 | 4,6 |
| Chemnitz | 9,2 | 10,1 | 14,1 | 10,0 | 11,7 | 3 278 | 5,5 | Halle a. S. | 7,4 | 11,5 | 2,8 | 5,6 | 5,8 | 2 061 | 2,4 |
| Coblenz-Ehrenbreit- stein | 5,8 | 7,0 | 5,8 | 5,2 | 7,0 | 6 833 | 5,7 | Hameln | 11,4 | 18,9 | 12,2 | 6,3 | 4,8 | 1 237 | 5,7 |
| Cöln-Deutz | 7,6 | 8,2 | 9,3 | 4,3 | 2,4 | 10 122 | 4,2 | Hanau | 11,6 | 10,9 | 7,5 | 5,8 | 8,1 | 1 991 | 3,0 |
| Colmar i. E. | 7,3 | 6,5 | 5,1 | 4,1 | 4,2 | 2 926 | 3,8 | Hannover | 11,4 | 12,2 | 8,6 | 5,7 | 5,6 | 7 215 | 6,0 |
| Cosel | 12,0 | 10,1 | 10,2 | 5,2 | 2,4 | 1 261 | 6,3 | Heilbronn | 10,1 ⁶⁾ | 9,7 | 5,8 | 7,3 | — | 1 247 | 2,4 |
| Cottbus | 14,8 | 9,9 | 10,2 | 5,1 | 3,6 | 1 295 | 4,6 | Hildesheim | 14,7 | 14,1 | 9,1 | 10,3 | 7,7 | 1 935 | 4,1 |
| Cüstrin | 13,2 | 11,8 | 10,3 | 9,5 | 7,4 | 1 841 | 6,0 | Jauer | 23,6 | 11,0 | 8,7 | 3,2 | 8,6 | 1 192 | 3,4 |
| Danzig | 24,1 | 19,0 | 18,6 | 10,0 | 10,0 | 7 548 | 9,8 | Ingolstadt | 11,0 | 17,9 | 11,6 | 14,7 | 16,6 | 4 739 | 14,6 |
| Darmstadt | 7,4 | 7,3 | 8,4 | 5,6 | 3,1 | 5 163 | 3,1 | Inowrazlaw | — | 12,6 ⁵⁾ | 18,9 | 22,6 | 5,1 | 2 121 | 6,5 |
| Dessau | 9,2 | 8,7 | 10,1 | 6,7 | 6,2 | 1 257 | 11,9 | Insterburg | 32,5 | 17,5 | 15,7 | 10,0 | 5,8 | 2 848 | 6,0 |
| Deutsch-Eylau | 32,9 | 29,6 | 16,2 | 12,7 | 8,6 | 2 622 | 4,6 | Jüterbog | 9,8 | 16,1 | 3,7 | 8,1 | 5,1 | 1 951 | 2,0 |
| Diedenhofen | 7,7 | 10,8 | 6,7 | 8,5 | 5,9 | 3 036 | 6,6 | Kamenz | — | — | — | 4,1 | 2,6 | 1 182 | 9,3 |
| Dieuze | — | 8,2 ⁵⁾ | 6,8 | 5,2 | 7,7 | 2 683 | 1,5 | Karlsruhe | 7,7 | 7,6 | 6,3 | 4,7 | 4,0 | 4 465 | 3,4 |
| Döbeln | — | 12,5 ⁵⁾ | 12,1 | 7,1 | 9,5 | 1 778 | 8,4 | Königsberg i. Pr. | 21,6 | 15,1 | 14,0 | 10,3 | 12,9 | 9 698 | 10,1 |
| Dresden | 9,9 | 13,9 | 12,1 | 8,8 | 11,6 | 11 196 | 15,9 | Kolberg | 33,5 | 24,4 | 16,3 | 19,8 | 21,8 | 1 390 | 5,0 |
| Düsseldorf | 6,7 | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 6,0 | 3 840 | 5,5 | | | | | | | | |

1) Garnisonen mit einer Iststärke von mehr als 1000 Mann.

2) Die in den früheren Berichten enthaltenen Iststärken sind wegen Mangels an Raum weggelassen worden.

3) 2jähriger Durchschnitt 1884/86.

4) 4jähriger Durchschnitt 1882/86.

5) 4jähriger Durchschnitt 1887/91.

6) 3jähriger Durchschnitt 1883/86.

7) Betrifft nur das Berichtsjahr 1890/91.

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ¹⁾ | 1902/03 | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| | bis 1885/86 ²⁾ | bis 1890/91 ²⁾ | bis 1895/96 ²⁾ | bis 1900/01 ²⁾ | | Durchschnittszugang ‰ K. | Ist- stärke |
| Konstanz | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 3,4 | 2,2 | 1 767 | 5,7 |
| Krotoschin | 16,8 | 9,4 | 20,3 | 6,9 | 3,9 | 1 748 | 7,4 |
| Lahr | — | — | — | 1,8 ³⁾ | 1,6 | 1 568 | 0,64 |
| Landau | 9,1 | 7,3 | 5,6 | 3,9 | 9,6 | 3 411 | 5,9 |
| Landshut | 14,0 | 17,0 | 7,1 | 11,2 | 6,2 | 1 112 | 12,6 |
| Leipzig | 9,3 | 11,8 | 11,8 | 11,0 | 7,1 | 7 911 | 8,3 |
| Liegnitz | 21,1 | 24,2 | 11,7 | 6,1 | 7,1 | 1 764 | 6,2 |
| Lissa | 8,8 | 9,7 | 9,7 | 5,7 | 7,1 | 1 243 | 8,0 |
| Lockstedter Lager | — | — | — | — | — | 3 045 | 2,3 |
| Ludwigsburg | 4,9 | 5,9 | 6,7 | 4,6 | 2,9 | 5 237 | 3,2 |
| Lübeck | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 5,2 | 3,0 | 1 241 | 8,1 |
| Lyck | 31,5 ²⁾ | 26,5 | 16,7 | 9,4 | 9,8 | 1 922 | 6,8 |
| Magdeburg | 16,6 | 10,9 | 8,5 | 8,0 | 6,0 | 6 921 | 9,0 |
| Mainz | 9,0 | 7,8 | 5,4 | 4,1 | 3,9 | 8 929 | 3,8 |
| Mannheim | 13,4 | 7,0 | 5,0 | 4,4 | 1,5 | 1 311 | 10,7 |
| Marienwerder | 11,5 | 6,3 | 8,1 | 9,5 | 5,7 | 1 046 | 11,5 |
| Meiningen | 16,4 | 13,4 | 8,8 | 4,9 | 4,2 | 1 843 | 2,7 |
| Metz | 8,8 | 9,5 | 7,6 | 7,2 | 8,0 | 22 872 | 5,2 |
| Minden | 10,9 | 15,1 | 12,6 | 7,5 | 8,9 | 3 207 | 5,3 |
| Mörchingen | — | 16,6 ⁵⁾ | 11,8 | 6,6 | 4,5 | 4 533 | 4,9 |
| Mülhausen i. E. | 6,6 | 8,7 | 5,1 | 3,5 | 10,4 | 4 207 | 3,1 |
| Mülheim a. Ruhr. | — | — | — | 7,7 ³⁾ | 11,1 | 1 252 | 3,2 |
| München | 14,7 | 12,3 | 10,5 | 9,2 | 6,2 | 10 310 | 7,9 |
| Münster | 11,9 | 16,2 | 14,5 | 9,4 | 9,7 | 4 154 | 14,2 |
| Naumburg a. S. | 8,4 | 10,3 | 6,1 | 3,5 | 3,4 | 1 429 | 4,9 |
| Neifse | 7,2 | 7,5 | 9,0 | 6,9 | 6,3 | 3 924 | 7,9 |
| Neubreisach | 4,9 | 5,5 | 8,2 | 6,3 | 2,6 | 1 427 | 9,1 |
| Neuburg a. D. | 10,0 | 11,2 | 7,6 | 5,8 | 3,9 | 1 590 | 9,4 |
| Neumünster | 10,4 | 6,3 | 9,4 | 7,5 | 4,8 | 1 198 | 2,5 |
| Neu-Ruppin | 12,0 | 13,2 | 15,0 | 6,3 | 4,3 | 1 792 | 7,8 |
| Neu-Ulm | 10,8 | 11,1 | 9,2 | 9,3 | 5,8 | 2 121 | 14,6 |
| Nürnberg | 19,0 | 18,3 | 10,4 | 8,9 | 11,8 | 3 371 | 10,7 |
| Offenburg | — | — | — | 4,2 ³⁾ | 2,4 | 1 271 | 3,9 |
| Oldenburg | 14,5 | 13,4 | 13,3 | 11,1 | 16,6 | 2 983 | 8,7 |
| Oppeln | 14,4 | 8,8 | 10,2 | 11,4 | 4,6 | 1 713 | 8,8 |
| Osnabrück | 22,0 | 26,1 | 21,9 | 9,3 | 20,2 | 1 599 | 14,4 |
| Osterode | — | 22,7 | 15,9 | 10,1 | 8,0 | 2 392 | 8,8 |
| Ostrowo | 19,6 | 14,6 | 8,2 | 3,7 | 2,8 | 1 360 | 16,2 |
| Paderborn | 6,6 | 4,7 | 21,3 | 7,2 | 7,7 | 1 806 | 10,0 |
| Passau | 11,5 | 14,4 | 14,1 | 7,0 | 6,6 | 1 336 | 10,5 |
| Pillau | 16,9 | 19,8 | 12,6 | 16,6 | 19,1 | 1 181 | 5,9 |
| Pirna | 13,4 | 9,1 | 4,9 | 9,8 | 9,3 | 1 374 | 14,6 |

1) Die in den früheren Berichten enthaltenen Iststärken sind wegen Mangels an Raum weggelassen worden.

2) 2 jähriger Durchschnitt 1884/86.

3) 3 jähriger Durchschnitt 1898/1901.

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ¹⁾ | 1902/03 | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| | bis 1885/86 ²⁾ | bis 1890/91 ²⁾ | bis 1895/96 ²⁾ | bis 1900/01 ²⁾ | | Durchschnittszugang ‰ K. | Ist- stärke |
| Posen | 16,7 | 14,7 | 12,2 | 8,3 | 6,6 | 7 600 | 4,9 |
| Potsdam | 7,6 | 5,9 | 7,3 | 6,5 | 4,2 | 8 698 | 6,0 |
| Prenzlau | 13,7 | 15,9 | 12,0 | 5,7 | 3,1 | 1 257 | 2,4 |
| Rastatt | 7,0 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 2,6 | 4 562 | 2,6 |
| Rastenburg | — | — | — | 11,8 ³⁾ | 7,6 | 1 752 | 4,0 |
| Rawitsch | 14,0 | 8,6 | 6,8 | 4,7 | 3,2 | 1 214 | 2,5 |
| Regensburg | 8,4 | 16,5 | 9,0 | 13,4 | 7,4 | 1 763 | 12,5 |
| Rendsburg | 14,6 | 10,7 | 8,7 | 8,0 | 6,6 | 1 997 | 6,0 |
| Riesa | 13,4 ⁴⁾ | 11,4 | 8,4 | 5,5 | 12,7 | 1 866 | 10,7 |
| Rostock | 14,2 | 14,3 | 15,0 | 11,0 | 1,4 | 1 365 | 4,4 |
| Saarbrücken | 7,6 | 10,4 | 9,8 | 6,8 | 5,2 | 3 423 | 2,9 |
| Saarburg | 6,0 | 6,9 | 7,8 | 5,3 | 2,2 | 4 005 | 5,0 |
| Saargemünd | 11,6 | 10,6 | 8,9 | 5,6 | 3,7 | 1 089 | 0,92 |
| Saarlouis | 5,8 | 5,4 | 5,8 | 6,7 | 2,7 | 2 365 | 4,2 |
| Schleswig | 9,2 | 8,9 | 10,6 | 6,0 | 7,1 | 1 920 | 5,2 |
| Schneidemühl | 21,1 | — | 11,2 | 17,7 | 23,2 | 1 171 | 6,8 |
| Schweidnitz | 7,7 | 4,9 | 11,9 | 4,6 | 2,9 | 2 344 | 4,7 |
| Schwerin | 14,0 | 18,5 | 17,1 | 10,8 | 11,8 | 2 075 | 11,6 |
| Spandau | 6,1 | 7,9 | 7,6 | 5,5 | 4,3 | 5 948 | 4,5 |
| Stargard i. Pomm. | 16,7 | 12,0 | 13,1 | 17,7 | 16,9 | 1 774 | 15,2 |
| Stettin | 14,0 | 15,5 | 10,5 | 6,9 | 5,7 | 4 895 | 10,8 |
| Stralsund | 13,3 | 15,0 | 8,9 | 9,7 | 17,3 | 1 228 | 8,1 |
| Straßburg i. E. | 6,6 | 8,4 | 6,4 | 4,9 | 3,9 | 16 948 | 4,9 |
| Stuttgart | 6,1 | 6,6 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 4 550 | 3,5 |
| Thorn | 16,7 | 18,7 | 15,5 | 13,1 | 8,3 | 7 988 | 6,4 |
| Tilsit | 9,4 | 25,0 | 14,3 | 15,9 | 5,1 | 1 917 | 7,8 |
| Torgau | 5,4 | 7,6 | 7,5 | 5,9 | 4,8 | 3 027 | 2,3 |
| Trier | 5,9 | 5,5 | 6,0 | 8,1 | 4,1 | 5 493 | 5,5 |
| Ulm | 7,1 | 6,8 | 5,5 | 4,6 | 5,0 | 7 415 | 3,9 |
| Weingarten | 5,7 | 4,9 | 7,1 | 6,2 | 6,6 | 1 782 | 4,5 |
| Weisenburg | 5,1 | 5,0 | 2,7 | 1,0 | 3,0 | 1 947 | 1,0 |
| Wesel | 7,1 | 10,1 | 10,1 | 5,4 | 4,3 | 4 622 | 2,4 |
| Wiesbaden | 7,3 | 6,9 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 1 621 | 3,7 |
| Wittenberg | 13,9 | 8,9 | 6,8 | 4,9 | 0,46 | 2 104 | 7,6 |
| Worms | 7,7 | 7,3 | 8,3 | 4,0 | 2,7 | 1 844 | 2,7 |
| Wurzen | — | — | — | 10,0 | 2,3 | 1 362 | 5,1 |
| Würzburg | 11,6 | 17,5 | 8,1 | 7,7 | 11,3 | 3 353 | 7,2 |
| Zabern | 3,6 | 5,1 | 5,4 | 2,9 | 4,4 | 1 317 | 6,8 |
| Zittau | 11,8 | 13,9 | 12,3 | 7,1 | 5,1 | 1 723 | 4,6 |
| Zweibrücken | 5,8 ⁴⁾ | 8,8 | 8,4 | 4,1 | 3,9 | 1 279 | 3,9 |
| Zwickau | 7,8 | 9,8 | 5,2 | 7,5 | 3,2 | 1 831 | 5,5 |

4) 4 jähriger Durchschnitt 1882/86.

5) Betrifft nur das Berichtsjahr 1890/91.

| Jahr | a. absol. Zahl b. ‰ K. | Zugang beim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I. II. III. | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | Garde- korps | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. (1. K. S.) | XIII. (K. W.) | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | XVIII. | XIX. (2. K. S.) | Kgl. Bayer. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Armeekorps | | | |
| 1881/82 bis 1885/86 | a b | 243,4 7,6 | 567,8 22,9 | 467,6 19,1 | 283,2 12,2 | 224,4 10,1 | 328,0 14,4 | 236,6 10,3 | 184,4 8,3 | 153,8 6,6 | 253,0 12,0 | 269,0 13,1 | 247,8 8,0 | 243,5 ¹⁾ 9,5 | 105,6 6,2 | 142,6 7,3 | 239,4 8,0 | — | — | — | — | — | 288,4 12,4 | 252,6 10,6 | — |
| 1886/87 bis 1890/91 | a b | 224,0 6,5 | 504,8 19,1 | 451,8 17,0 | 242,4 10,9 | 211,4 9,5 | 289,2 12,5 | 246,8 10,4 | 214,6 9,3 | 149,6 6,6 | 247,6 11,6 | 269,0 13,1 | 274,6 8,5 | 328,8 11,5 | 122,2 6,9 | 150,4 6,5 | 319,2 8,4 | 263,0 ²⁾ 11,0 | 389,0 ²⁾ 17,6 | — | — | 349,8 11,2 | 353,2 11,6 | — | |
| 1891/92 bis 1895/96 | a b | 240,2 6,3 | 418,4 16,4 | 325,8 14,0 | 225,0 9,7 | 167,6 7,0 | 252,8 10,7 | 252,8 10,2 | 244,2 10,2 | 152,6 6,4 | 255,2 11,2 | 236,0 10,6 | 216,8 6,1 | 362,8 10,5 | 115,8 5,8 | 135,2 5,0 | 207,4 7,0 | 198,8 8,1 | 381,8 15,1 | — | — | 271,4 10,7 | 296,4 8,7 | — | |
| 1896/97 bis 1900/01 | a b | 240,6 5,6 | 331,4 11,2 | 308,4 12,1 | 166,2 7,0 | 157,6 6,5 | 177,8 6,9 | 193,0 7,3 | 168,4 6,4 | 161,4 6,0 | 226,2 9,2 | 171,2 7,4 | 136,8 4,7 | 252,8 8,6 | 114,4 5,3 | 117,2 3,9 | 161,4 5,2 | 207,6 7,6 | 320,8 11,5 | 117,3 ³⁾ 5,4 | 149,0 ³⁾ 9,1 | 272,0 10,1 | 232,0 7,5 | 124,0 7,1 | |
| 1901/02 | a b | 200 4,4 | 285 9,0 | 273 10,3 | 107 4,5 | 123 5,4 | 155 5,9 | 168 6,3 | 164 6,0 | 140 5,0 | 196 7,7 | 215 9,6 | 67 3,1 | 178 8,6 | 107 4,8 | 133 4,1 | 134 4,2 | 200 7,3 | 262 8,7 | 97 3,6 | 175 8,4 | 225 9,3 | 161 7,4 | 200 10,5 | |
| 1902/03 | a b | 220 5,3 | 248 7,8 | 219 8,5 | 144 6,1 | 147 6,6 | 183 7,1 | 165 6,4 | 159 5,9 | 150 5,6 | 169 6,8 | 163 7,4 | 91 4,4 | 189 9,5 | 84 3,8 | 122 3,8 | 149 4,8 | 144 5,3 | 228 7,7 | 105 4,0 | 161 7,8 | 209 9,0 | 132 6,2 | 224 12,0 | |

Entstehung. — Als Ursache wurden meistens Erkältungen, Durchnässungen und Überanstrengungen im Dienst angegeben.

Äußere Gewalteinwirkungen werden nur 2 mal mit der darauffolgenden Lungenentzündung in ursächlichen Zusammenhang gebracht:

1 Trainsoldat in Leipzig, der beim Sturz vom Pferde auf die linke Brustseite gefallen war, verspürte gleich danach an dieser Stelle beim Atmen Schmerzen. Sie nahmen allmählich zu. Am 6. Tage wurde eine Entzündung des linken Unterlappens mit zahlreichen Kapseldoppelstäbchen im Auswurf festgestellt (St.-A. Merzdorf).

1 auf Weihnachtsurlaub in Berlin weilender Musketier aus Sensburg fiel am 24. Dezember abends von einem Wagen der elektrischen Bahn und zog sich Quetschungen am Kopf und im Gesicht zu. Er wurde bewusstlos in das Garnisonlazarett I geschafft, wo am 27. Dezember eine typische Lungenentzündung einsetzte, die regelrecht verlief (St.-A. Grüder).

Bezüglich der bakteriologischen Untersuchungen des Auswurfs ist hervorzuheben, daß in Leipzig meist die Friedländer'schen Kapseldoppelstäbchen, in Berlin und Metz fast stets die Fränkischen Krankheitserreger gefunden wurden. Grippe war wiederholt als Ursache der Lungenentzündung zu vermuten. Der bakteriologische Nachweis konnte nur in 8 Fällen (Berlin [3], Leipzig [3], Königsberg i. Pr. [1] und Trier [1]) erbracht werden.

In Breslau schloß sich 1 mal die Lungenentzündung an Masern an und führte zum Tode.

Septische Lungenentzündungen sind 2 mal erwähnt.

In dem einen Falle schloß sich die Erkrankung an einen Abszess, in dem anderen Falle an eine Mandelentzündung mit Gelenkschwellung an. Bei letzterem Kranken wurden in dem

Exsudat einer auf die Lungenentzündung folgenden eitrigen Brustfellentzündung Streptokokken nachgewiesen (St.-A. Schichhold-Dresden). In Mergentheim wurde vermutet, daß eine schwere, wochenlang mit hohem Fieber einhergehende Lungenentzündung mit einem vorausgegangenen Panaritium im Zusammenhang stehe (St.-A. Beck).

Eine asthenische Form der Lungenentzündung wurde 2 mal in Straßburg i. E. beobachtet. Im Auswurf wurden Streptokokken fast in Reinkultur gefunden. Beide Erkrankungen verliefen sehr schwer.

Gehäuftes Auftreten von Lungenentzündung bei einem Truppenteil ist nur 2 mal erwähnt.

In Mainz erkrankten bei einer Batterie 3 und in Ostrowo bei einer Kompagnie 6 Mann innerhalb von 17 Tagen. Eine bestimmte Ursache konnte nicht ermittelt werden. In Mainz war bei allen 3 Erkrankungen nur 1 Oberlappen (2 mal rechts, 1 mal links) befallen und der Krankheitsverlauf sehr schwer.

Aus Hameln wird berichtet, daß die dort vorgekommenen Lungenentzündungen durchweg atypisch verliefen. Es kamen nur katarrhalische und septische, aber keine rein fibrinösen Formen vor. O.-St.-A. Langhoff hat den Eindruck gewonnen, als ob die zeitweiligen Grippeepidemien hierauf von Einfluß sind.

Verlauf. — Von 585 Lungenentzündungen, bei denen der Sitz angegeben ist, waren 294 rechts-, 224 links- und 67 doppelseitig. Das prozentische Verhältnis beträgt hier nach 50,3:38,3:11,5 und stimmt fast genau mit dem im Berichtsjahr 1900/01 gewonnenen Resultat überein.



Die Beteiligung der einzelnen Lungenlappen zeigt nachstehende aus den Berichten von 10 Garnisonen aufgestellte Tabelle über 225 Erkrankungen:

1) 4jähriger Durchschnitt 1882/83 bis 1885/86.

2) Nur Berichtsjahr 1890/91.

3) 3jähriger Durchschnitt 1898/99 bis 1900/01.

4) 2jähriger Durchschnitt 1899/00 bis 1900/01.



Stadt-
bücherei
Elbing

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---|
| rechtsseitig | Unterlappen | 79 | |
| | Mittellappen | 4 | |
| | Oberlappen | 8 | |
| | Unter- und Mittellappen | 14 | |
| | Mittel- und Oberlappen | 3 | |
| | Unter- und Oberlappen | 3 | |
| ganze Lunge | 7 | | |
| linksseitig | Unterlappen | 81 | |
| | Oberlappen | 6 | |
| | ganze Lunge | 9 | |
| doppelseitig | 2 Lappen | beide Unterlappen | 7 |
| | | beide Oberlappen | 1 |
| | 3 Lappen | rechter Unter- und Mittellappen und linker Oberlappen | 1 |
| | | rechter Unterlappen und ganze linke Lunge | 1 |
| | 4 Lappen | ganze linke Lunge, rechter Ober- und Unterlappen | 1 |

Beide Lungen mit Ausnahme des rechten Mittellappens waren je 1 mal in Magdeburg und Oldenburg ergriffen.

Krankheitsbeginn ohne Fieber hat O.-St.-A. Gebrich-Osnabrück beobachtet:

Es entwickelte sich zunächst eine Verdichtung des linken unteren Lappens ohne Fieber. Erst am 7. Tage setzte hohes Fieber ein mit gleichzeitiger Erkrankung des linken oberen und rechten unteren Lungenlappens. Tod am 12. Krankheitstage.

Nachschübe und Befallenwerden neuer Lungenabschnitte nach mehreren fieberfreien Tagen hat St.-A. Stude-Oldenburg (nach 10 Tagen) und in besonders bemerkenswerter Weise O.-A. Helm-Beeskow beobachtet:

1 Kanonier erkrankte an einer Entzündung des linken unteren Lungenlappens. Am 10. Tage kritischer Temperaturabfall (1. Krise). Nach 6 Tagen Entzündung des rechten Unterlappens und Anstieg der Temperatur, die nach 8 Tagen wiederum kritisch abfiel (2. Krise). Nach 37 Tagen Entzündung des linken Oberlappens und plötzlicher Anstieg der Temperatur, die bereits am nächsten Tage auf 37° sank (3. Krise). Nunmehr ungestörte Genesung. Der Erkrankte blieb dienstfähig.

Von einer schnellen Wiederholung der Erkrankung an demselben Lungenabschnitt (rechter Unterlappen), die innerhalb von 4 Wochen, vor Entlassung des Mannes aus dem Lazarett, eintrat, berichtet St.-A. Merzdorf-Leipzig.

O.-St.-A. Schelle-Lüben beobachtete eine nochmalige Erkrankung des linken Unterlappens nach 7 Monaten.

Der typische Bläschenausschlag an den Lippen (Herpes labialis) findet in den Berichten nur wenig Erwähnung.

St.-A. Voigtel-Berlin sah eine Verbreitung des Ausschlages bis auf die Augenlider und die Stirn. — Bei einem Muskulier in Offenburg entstand ein Ausschlag auf der Hornhaut des rechten Auges (St.-A. v. Pezold).

Über den Eintritt der Krisis liegen aus 9 Garnisonen Zahlenangaben vor. Von 163 Lungenentzündungen endeten 124 mit Krisis, und zwar am

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Krankheitstage |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 1 | 6 | 21 | 19 | 25 | 7 | 21 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |

Die Summe der Krisen an ungeraden Tagen beträgt hiernach 79, die an geraden Tagen 45. Das Verhältnis

stellt sich wie 1,8 : 1 und entspricht beinahe dem im Berichtsahre 1900/01 gefundenen Resultat.

Von allen Begleiterkrankungen waren die Brustfellentzündungen mit Ausschwitzung in den Brustfellraum die häufigsten.

Unter 546 Erkrankungen in 22 Garnisonen kamen sie 75 mal vor. Lungenabszefs schloß sich 9 mal an Lungenentzündung an. 6 heilten spontan (Saarburg, St. Avold, Hameln, Wesel, Berlin [2]). In Allenstein brachte die Eröffnung des Abszesses Heilung. Auch in Perleberg hatte dieser Eingriff guten Erfolg, doch starb der Kranke später an den Folgen der zur Beseitigung einer zurückgebliebenen Lungenfistel in Spandau ausgeführten Thorakoplastik (vergl. Operationsliste unter B6). Mehreren Lungenabszessen erlag 1 Kranker in Cöln.

4 weitere Erkrankungen an Lungenabszefs ohne vorausgegangene Lungenentzündung sind unter No. 63 auf Seite 74 erwähnt.

8 mal entwickelte sich ein Herzklappenfehler (siehe Gruppe IV No. 66), 6 mal eine Entzündung des Herzbeutels (Gotha, Mörchingen, Metz, Dresden je 1 mal, Oldenburg 2 mal). Dauernde Beschleunigung und Unregelmäßigkeit des Pulses führte 5 mal zur Dienstunbrauchbarkeit (Berlin, Graudenz, Hameln je 1 mal, Oldenburg 2 mal).

Schwere nervöse Erregungszustände, zum Teil mit religiösen Wahnideen und Verfolgungswahn verbunden, sind 12 mal beobachtet worden. Die Störungen traten zum größten Teil während der eigentlichen fieberhaften Erkrankung und mit Vorliebe kurz vor der Krisis auf (Hildesheim, Osnabrück, Lüben, Magdeburg, St. Avold [2], Straßburg i. E. [2]); in Ulm begannen die Delirien in der ersten fieberfreien Nacht nach der Krisis von neuem. — O.-St.-A. Kraufs weist auf einen Zusammenhang zwischen Hirnerscheinungen und Beteiligung der Nieren hin. — St.-A. Neuburger-Berlin sah bei einer nicht besonders schweren Erkrankung 7 Tage nach erfolgter Krise Delirien auftreten, die etwa 1 Woche anhielten. — In Neifse begann 1 Kranker kurz vor der Krise, welche mit Herzschwäche einherging, zu delirieren und die Nahrungsaufnahme zu verweigern. Der Zustand hielt etwa 10 Tage an. Erst Ernährung mittels Sonde vermochte langsame Besserung zu bringen. — In Posen wurde die Überführung in eine Irrenanstalt wegen dauernder maniakalischer Erregtheit, welche während der Krisis aufgetreten war, notwendig (O.-St.-A. Brix). — Hirnhautentzündung ist 3 mal (Charlottenburg, Cöln, Osnabrück) angegeben.

St.-A. Bornikoel-Berlin sah im Anschluß an eine Lungenentzündung eine Lähmung des rechten großen Sägemuskels, St.-A. Voigtel-Berlin eine Entzündung des Ellenervens. — Besonders auffällig ist eine von O.-A. Heinrich-Münster beobachtete allgemeine Muskelerkrankung. Im Anschluß an eine rechtsseitige Lungenentzündung, welche mit Erguß in den rechten Brustfellraum und Mandelentzündung einherging, entwickelte sich zunächst eine teigige entzündliche Schwellung der Schulter-, Arm-, Rücken- und Bauchmuskulatur unter erheblicher Störung des Allgemeinbefindens. Nach allmählicher Rückbildung dieser Erscheinungen trat Schwund der betroffenen Muskeln und später der Beinmuskulatur ein, der jedoch im Laufe einiger Wochen beseitigt wurde. Der Erkrankte wurde wieder dienstfähig.

Weiterhin sind erwähnt: Gelenkrheumatismus 8 mal, Abszefs in den Muskeln 3 mal, (ein Abszefs in Leipzig erhielt Reinkulturen von Kapseldoppelstäbchen), Erkrankung der Drüsen 1 mal, Nierenentzündung 12 mal, Gelbsucht 3 mal, Eiterung des Tränenackes 1 mal, Mittelohrkatarrh (meist eitrig) 7 mal, Mandelentzündung 2 mal, Stimmbandlähmung 1 mal, Bauchfellentzündung 1 mal, Darm-

lähmung 1 mal, Lungentuberkulose 4 mal, Verschluss der Beckenblutader 1 mal, der linken Schenkelblutader 3 mal und der rechten Schenkelblutader 1 mal.

Behandlung. — Auf die Behandlung ist verhältnismäßig selten näher eingegangen worden.

Bezüglich der Alkoholika findet sich nur je 1 mal die Angabe, dass sie sehr reichlich (St.-A. Keyl-Berlin) und dass sie gar nicht verwendet wurden (St.-A. Voigtel-Berlin), sonst wurden sie in kleineren Gaben oder gegen die Krise hin gereicht. In dieser Form glauben viele nicht auf sie verzichten zu können (St.-A. Goronzek-Königsberg i. Pr., St.-A. Schichhold-Dresden u. a.). — Die medikamentösen Analeptika und Exzitanten sind ebenso wie die Expektorantien in gleicher Weise wie früher verwendet.

Ganz kalte Bäder sind nicht erwähnt. Dagegen wird den lauen Bädern oder lauen Bädern mit langsamer Abkühlung des Bades (30 bis 25 bis 23° C.) oder mit kalten Übergießungen oft eine sehr gute Einwirkung, besonders auf das subjektive Wohlbefinden, zugeschrieben.

Hydropathische oder kalte Entwicklungen sind ebenfalls oft angewandt. Als bequeme Anlegungsweise für die letzteren empfiehlt St.-A. Schichhold-Dresden 6 bis 8 fache westenartige Kompressen von 12 bis 15° C., die 15 bis 20 Minuten liegen bleiben und alle $\frac{3}{4}$ Stunden wiederholt werden können.

Die Eisblase auf dem Kopf behält ihre alte Bedeutung. —

Die Verwendung nur flüssiger nahrhafter Kost bis zur Krise (Milch, Eier) empfehlen St.-A. Neuhaus - Magdeburg, Goronzek-Königsberg i. Pr. und O.-St.-A. Thomas-Freiburg i. Baden.

Die innere Darreichung der Fiebermittel wird fast allgemein verworfen. — St.-A. Neuhaus-Magdeburg hält die Prüfung der Aufrechten Verordnung des salzsauren Chinins (Chinin. mur. 2,5, Urethan 1,25 ad 25,0 täglich 1 mal 5 ccm subkutan unter die seitliche Bauchhaut) nach seinen Erfolgen für angezeigt. St.-A. Keyl-Berlin hat von der Anwendung keinen Einfluss auf den Krankheitsverlauf gesehen.

St.-A. Stolzmann-Osterode glaubt, dass Kreosotgaben in 11 Fällen eine Abkürzung des Krankheitsverlaufs zur Folge gehabt haben.

Bezüglich des Kreosotal läßt O.-St.-A. Mankiewitz-Danzig es offen, ob der günstige Verlauf der Erkrankungen durch das Mittel oder durch ihre gutartige Form bedingt gewesen sei. — Morphium und Digitalis sind oft mit gutem Erfolge verwendet. Kalomel wurde in Gera und Weissenburg im Anfang der Krankheit gegeben.

Der Aderlaß ist bei Blausucht und Atemnot häufig und öfters mit überraschend gutem Erfolge angewendet (St.-A. Neuburger-Berlin, Biederkarken-Krotoschin, Knaak-Straßburg i. E., O.-St.-A. Noetel-St. Avold, Kraufs-Ulm u. a.).

Von Sauerstoffeinatmungen hat St.-A. Neuburger und St.-A. Keyl-Berlin sowie St.-A. Distel-Gmünd gute Wirkungen bei der Blausucht gesehen.

Dritte Unterart: Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes.

(No. 59 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 13 | 159 | 0,30 | 12 = 7,0 | 2 = 1,2 | 139 = 80,8 | 153 | 19 | 45,4 |
| | | | % der Behandelten | | | | | |

Außerdem erkrankten noch 1 Kadett und 2 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

In den nachfolgenden Übersichten ist die Verteilung der Erkrankungen auf die einzelnen Armeekorps und Monate ersichtlich gemacht.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|---------|-----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 17 | 0,41 | X. | 4 | 0,18 |
| I. | 18 | 0,57 | XI. | 6 | 0,29 |
| II. | 6 | 0,23 | XII. (1. K. S.) | 2 | 0,10 |
| III. | 2 | 0,09 | XIII. (K. W.) | 9 | 0,41 |
| IV. | 3 | 0,13 | XIV. | 11 | 0,35 |
| V. | 6 | 0,23 | XV. | 9 | 0,29 |
| VI. | 7 | 0,27 | XVI. | 9 | 0,33 |
| VII. | 9 | 0,33 | XVII. | 5 | 0,17 |
| VIII. | 11 | 0,41 | XVIII. | 12 | 0,46 |
| IX. | 4 | 0,16 | XIX. (2. K. S.) | 9 | 0,44 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 17 | 17 | 16 | 13 | 16 | 9 | 12 | 10 | 8 | 20 | 14 | 7 |
| ‰ K. | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |

Die Entstehungsursache wird 5 mal mit Erkältungen in Verbindung gebracht (Königsberg i. Pr., Düsseldorf, Ulm [3]. Als Veranlassung werden weiter angegeben: 2 mal anstrengende Übungen (Berlin, Ulm), 2 mal langes Blasen (Königsberg i. Pr., Metz), 2 mal Baden bzw. Kopfsprung ins Wasser (Berlin, Ulm), 1 mal Stofs gegen die Brust (Mörchingen), 1 mal schweres Heben beim Geschützdienst (Metz), 1 mal Anstrengung beim Klimmziehen (Osnabrück). Je 1 mal trat Bluthusten im Verlauf von Influenza und Bronchialkatarrh auf (Berlin). Bei 2 Leuten bestand Bluterkrankheit (Mörchingen, Berlin).

Durch die Gelatinebehandlung erreichten St.-A. Goronzek-Königsberg i. Pr. und St.-A. Melot de Beauregard-Mörchingen keinen Erfolg; ersterer sah sogar Erhöhung der Temperatur danach auftreten. Dagegen lobt O.-A. Thalwitzer-Pleß die prompte Wirkung bei einem Ulanen, der vorher durch anhaltende Blutungen sehr erschöpft und mit anderen Mitteln ohne Erfolg behandelt war.

Vierte Unterart: Brustfellentzündung und Ausgänge.

(No. 60 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 207 | 1980 | 3,8 | 1134 = 51,9 | 28 = 1,3 | 830 = 38,0 | 1992 | 195 | 46,8 |
| | | | % der Behandelten | | | | | |

1) Außerdem starb 1 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Außerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 6 Kadetten und 10 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-----|---------------|-----|
| 1881/82 bis 1885/86 . . . | 1592,4 | Mann = | 4,2 | $\frac{0}{0}$ | K., |
| 1886/87 „ 1890/91 . . . | 1916,4 | „ = | 4,6 | „ | „ |
| 1891/92 „ 1895/96 . . . | 2126,4 | „ = | 4,5 | „ | „ |
| 1896/97 „ 1900/01 . . . | 1924,0 | „ = | 3,7 | „ | „ |
| im Jahre 1901/02 . . . | 1984 | „ = | 3,7 | „ | „ |

im Jahre 1902/03 . . . 1980 Mann = 3,8 $\frac{0}{0}$ K.

Die beiden folgenden Tabellen geben über die Verteilung der Erkrankungen auf die einzelnen Armeekorps und Monate Aufschluß.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | absol. Zahlen | $\frac{0}{0}$ K. | | absol. Zahlen | $\frac{0}{0}$ K. |
| G. | 312 | 7,5 | XII. (I. K. S.) | 75 | 3,8 |
| I. | 140 | 4,4 | XIII. (K. W.) . . . | 70 | 3,2 |
| II. | 106 | 4,1 | XIV. | 121 | 3,8 |
| III. | 95 | 4,0 | XV. | 55 | 1,8 |
| IV. | 52 | 2,3 | XVI. | 90 | 3,3 |
| V. | 97 | 3,8 | XVII. | 105 | 3,5 |
| VI. | 68 | 2,6 | XVIII. | 86 | 3,3 |
| VII. | 104 | 3,9 | XIX. (2. K. S.) | 42 | 2,0 |
| VIII. | 83 | 3,1 | I. K. B. | 78 | 3,4 |
| IX. | 91 | 3,6 | II. „ | 82 | 3,8 |
| X. | 88 | 4,0 | III. „ | 68 | 3,7 |
| XI. | 100 | 4,8 | | | |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|------------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 120 | 130 | 137 | 218 | 195 | 168 | 177 | 216 | 181 | 182 | 138 | 118 |
| $\frac{0}{0}$ K. | 0,28 | 0,24 | 0,25 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,33 | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,26 | 0,24 |

Entstehung. — Als häufigste Ursache wird Erkältung angegeben.

Von 131 Erkrankungen aus 14 Garnisonen, über welche genauere Zahlen vorliegen, werden 87 auf Erkältung zurückgeführt. Lungenentzündung wird 7 mal, Bronchialkatarrh 3 mal, Mumps (Berlin), Gelenkrheumatismus (Leipzig), Mandelentzündung (Rastatt), je 1 mal als Vorläufer der Brustfellentzündung erwähnt. Gewalt-einwirkung ist 4 mal als Ursache angegeben.

Sturz mit dem Pferde (Berlin), Fall zur Erde, Fall mit der Brust gegen ein Geländer beim Schwimmen, Bajonettstofs gegen die Brust (Strafsburg i. E. 3 mal).

In Berlin erkrankte ferner 1 Mann, nachdem er sich am Tage vorher beim Ausgleiten auf einem Marsche, um nicht zu fallen, energisch emporgeworfen hatte. Er hatte dabei sofort Brustschmerzen verspürt (St.-A. Voigtel.)

Ein Zusammenhang mit Furunkeln bzw. entzündeten Wunden wird 3 mal angenommen (Berlin 2 mal, Swinemünde 1 mal).

Tuberkulose konnte 10 mal mit Sicherheit nachgewiesen werden (Berlin 5 mal, Osnabrück 2 mal, Metz, Oldenburg, Hildesheim je 1 mal).

Grippe wurde in Spandau, Rathenow und Ulm als die eigentliche Krankheitsursache angesehen.

Im Gefolge chronischer Nierenentzündung trat in Swinemünde eine eiterige Brustfellentzündung bei einem Neueingestellten auf. Heilung durch Rippenaussägung (St.-A. Granier). — 1 mal entwickelte sich die Erkrankung im Anschluß an Erythema nodosum (Braunschweig).

Unter 255 Brustfellentzündungen, von welchen die Berichte aus 16 Garnisonen nähere Zahlenangaben enthalten, waren 133 rechtsseitig, 108 linksseitig und 14 doppelseitig.

Von 221 Erkrankungen aus 15 Garnisonen waren 83 trocken, 130 serös und 8 eiterig.

Als Begleit- bzw. Nachkrankheiten sind angegeben:

Herzbeutelentzündung 8 mal (Tilsit, Cüstrin, Oldenburg, Stuttgart, Strafsburg i. E., Frankfurt a. M. je 1 mal, Erfurt 2 mal), chronische Nierenentzündung 2 mal (Ludwigsburg, Dt. Eylau), Verstopfung der linken Schenkelblutader 3 mal (Cüstrin 2 mal, Oppeln) und der linken Oberarmblutader (Strafsburg i. E.), Herzschwäche 5 mal (Tilsit, Stuttgart, Ulm je 1 mal, Graudenz 2 mal), Sepsis 2 mal (Brandenburg a. H., Hameln), Wundrose 2 mal (Berlin, Metz), je 1 mal: Mittelohreiterung (Tilsit), Gürtelrose, Nessel-ausschlag, eiterige Entzündung der rechten Brustdrüse und Bluthusten (Berlin), Miliartuberkulose (Königsberg i. Pr.), Herzklappenentzündung (Hameln).

Über die Erfolge des Brustschnittes bei Eiterbrust geben die umseitigen Zusammenstellungen Aufschluß. Von den Operierten sind 6 wieder dienstfähig geworden.

Behandlung. — St.-A. Ernst-Worms empfiehlt die Anwendung von Cocain-Adrenalin zur örtlichen Schmerzbetäubung sehr angelegentlich. Man müsse das Mittel nur genügend tief einspritzen und $\frac{1}{2}$ Stunde warten.

Bei der Behandlung sind von den meisten Berichterstatern Schwitzverfahren der verschiedensten Art (heißes Bäder, Einwicklungen, schweißtreibende Mittel) und harntreibende Mittel angewendet. Aus Magdeburg (St.-A. Neuhaus) und Cöln (St.-A. Waldeyer) werden methodische Atemübungen empfohlen, die O.-St.-A. Wegelj-Erfurt unter ärztlicher Aufsicht beim Schwitzen im Moosdorf-Hochhäuslerschen Schwitzapparat anwendete. Letzteres Verfahren befriedigte ihn mehr als die Anwendung von Sandbädern.

Während die meisten Berichterstatte die Punktion nur bei starker Atemnot oder zur Entfernung länger bestehender Exudate anwendeten (St.-A. Bornikoel-Berlin, Goronzek-Königsberg i. Pr., Voigtel-Berlin nicht vor 14 Tagen), empfiehlt St.-A. Kühnemann-Spandau eine frühe Punktion in allen Fällen. Sein Ergebnis ist, daß von 11 Kranken 6 dienstfähig, 5 invalide wurden.

Methodisches Ausatmen gegen Widerstand (Aufblasen von Luftkissen) erwies sich bei der Beseitigung einer nach Empyemoperation zurückgebliebenen Fistel nützlich. (St.-A. Klehmet-Liegnitz.)

I. Metapneumonische Eiterbrust.

| | Art der Operation: mit oder ohne Rippenaus-sägung? | In den ersten 20 Tagen Operierte | | | | | Vom 21. bis 40. Tage Operierte | | | | | Vom 41. bis 60. Tage Operierte | | | | | Noch später Operierte | | | | | Gesamtsumme | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------|-------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | | Zahl | Geheilt | Gestorben | Sterblichkeit % | Mittlere Heilungs-dauer | Zahl | Geheilt | Gestorben | Sterblichkeit % | Mittlere Heilungs-dauer | Zahl | Geheilt | Gestorben | Sterblichkeit % | Mittlere Heilungs-dauer | Zahl | Geheilt | Gestorben | Sterblichkeit % | Mittlere Heilungs-dauer | Zahl | Geheilt | Gestorben | Sterblichkeit % | Mittlere Heilungs-dauer |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schedes Gesamtsumme | mit ohne } | 63 | 51 | 12 | 19,0 | 75 | 129 | 113 | 16 | 12,4 | 73 | 33 | 31 | 2 | 6,0 | 86 | 63 | 53 | 10 | 16,0 | 122 | 288 | 248 | 40 | 13,9 | 83 |
| Davon entfielen auf die Garnisonlazarette | mit ohne | 25 | 22 | 3 | 12,0 | 106 | 45 | 40 | 5 | 11,1 | 108 | 8 | 8 | — | — | 124 | 17 | 15 | 2 | 11,7 | 180 | 95 | 85 | 10 | 10,5 | 110 |
| | Summe | 6 | 2 | 4 | 66,0 | 38 | 14 | 10 | 4 | 28,8 | 75 | 2 | 2 | — | — | 156 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 51 | 26 | 16 | 10 | 38,4 | 77 |
| Garnisonlazarette 1892/94 | mit ohne | 28 | 23 | 5 | 17,9 | 98 | 64 | 60 | 4 | 6,3 | 105 | 6 | 6 | — | — | 153 | 8 | 8 | — | — | 116 | 106 | 97 | 9 | 8,5 | 107 |
| | Summe | 12 | 10 | 2 | 16,7 | 103 | 8 | 8 | — | — | 105 | 9 | 9 | — | — | 99 | 2 | 2 | — | — | 73 | 31 | 29 | 2 | 6,5 | 100 |
| Garnisonlazarette vom 1. April 1894 bis 30. September 1896 | mit ohne | 41 | 39 | 2 | 4,9 | 149 | 49 | 46 | 3 | 6,1 | 109 | 16 | 12 | 4 | 25,0 | 122 | 11 | 11 | — | — | 93 | 117 | 108 | 9 | 7,7 | 123 |
| | Summe | 4 | 4 | — | — | 87 | 13 | 11 | 2 | 15,4 | 101 | 3 | 3 | — | — | 147 | 4 | 4 | — | — | 86 | 24 | 22 | 2 | 8,3 | 102 |
| Garnisonlazarette im 5 jährigen Durchschnitt 1896/97 bis 1900/01 | mit ohne | 15,4 | 14,2 | 1,2 | 7,8 | 109 | 22,2 | 20,4 | 1,8 | 8,1 | 112 | 7,6 | 7,4 | 0,20 | 2,6 | 109 | 5,4 | 4,4 | 1,0 | 18,5 | 125 | 50,6 | 46,4 | 4,2 | 8,3 | 112 |
| | Summe | 0,40 | 0,40 | — | — | 117 | 1,2 | 1,0 | 0,20 | 16,7 | 95 | 0,30 | 0,30 | — | — | 121 | — | — | — | — | — | 2,4 | 2,2 | 0,20 | 8,3 | 108 |
| Garnisonlazarette 1901/02 | mit ohne | 14 | 12 | 2 | 14,3 | 141 | 27 | 27 | — | — | 111 | 4 | 4 | — | — | 108 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 134 | 48 | 45 | 3 | 6,3 | 120 |
| | Summe | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 397 |
| Garnisonlazarette 1902/03 | mit ohne | 19 | 17 | 2 | 10,5 | 119 | 14 | 14 | — | — | 127 | 2 | 2 | — | — | 113 | 4 | 3 | 1 | 25,0 | 106 | 39 | 36 | 3 | 7,7 | 117 |
| | Summe | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 123 | 1 | 1 | — | — | 160 | 1 | 1 | — | — | 138 | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 25,0 | 136 |

II. Idiopathische Eiterbrust.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|
| Schedes Gesamtsumme | mit ohne } | 21 | 19 | 2 | 9,5 | 42 | 37 | 35 | 2 | 5,4 | 68 | 16 | 16 | — | — | 70 | 27 | 23 | 4 | 14,0 | 88 | 101 | 93 | 8 | 7,9 | 66 |
| Davon entfielen auf die Garnisonlazarette | mit ohne | 8 | 7 | 1 | 12,5 | 74 | 9 | 9 | — | — | 90 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | 97 | 22 | 21 | 1 | 4,6 | 91 |
| | Summe | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 100,0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 56 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 56 |
| Garnisonlazarette 1892/94 | mit ohne | 23 | 20 | 3 | 13,0 | 132 | 21 | 20 | 1 | 4,8 | 135 | 8 | 8 | — | — | 134 | 8 | 5 | 3 | 37,5 | 164 | 60 | 53 | 7 | 11,7 | 137 |
| | Summe | 8 | 7 | 1 | 12,5 | 95 | 7 | 5 | 2 | 28,6 | 130 | 2 | 2 | — | — | 142 | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 70 | 19 | 15 | 4 | 21,1 | 111 |
| Garnisonlazarette vom 1. April 1894 bis 30. September 1896 | mit ohne | 25 | 23 | 2 | 8,0 | 119 | 19 | 17 | 2 | 10,5 | 102 | 13 | 12 | 1 | 7,7 | 143 | 8 | 6 | 2 | 25,0 | 92 | 65 | 58 | 7 | 10,8 | 117 |
| | Summe | 5 | 3 | 2 | 40,0 | 99 | 6 | 5 | 1 | 16,7 | 90 | 1 | 1 | — | — | 79 | 2 | 2 | — | — | 191 | 14 | 11 | 3 | 21,4 | 110 |
| Garnisonlazarette im 5 jährigen Durchschnitt 1896/97 bis 1900/01 | mit ohne | 9,6 | 8,8 | 0,80 | 8,3 | 127 | 6,4 | 5,8 | 0,60 | 9,4 | 112 | 3,0 | 2,4 | 0,60 | 20,0 | 95 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 45,5 | 107 | 21,2 | 18,2 | 3,0 | 14,2 | 121 |
| | Summe | 0,40 | 0,40 | — | — | 79 | 0,80 | 0,60 | — | — | 76 | — | — | — | — | — | 0,20 | 0,20 | — | — | 68 | 1,4 | 1,4 | — | — | 75 |

| | Art der Operation: mit oder ohne Rippenaus-sägung? | In den ersten 20 Tagen Operierte | | | | | Vom 21. bis 40. Tage Operierte | | | | | Vom 41. bis 60. Tage Operierte | | | | | Noch später Operierte | | | | | Gesamtsumme | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| | | Zahl | Geheilt | Gestorben | Sterblichkeit % | Mittlere Heilungs-dauer Tage | Zahl | Geheilt | Gestorben | Sterblichkeit % | Mittlere Heilungs-dauer Tage | Zahl | Geheilt | Gestorben | Sterblichkeit % | Mittlere Heilungs-dauer Tage | Zahl | Geheilt | Gestorben | Sterblichkeit % | Mittlere Heilungs-dauer Tage | Zahl | Geheilt | Gestorben | Sterblichkeit % | Mittlere Heilungs-dauer Tage |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garnisonlazarette 1901/02 | mit ohne | 7 1 | 7 1 | — — | — — | 100 71 | 5 — | 5 — | — — | — — | 124 — | 5 — | 4 — | 1 — | 20,0 — | 92 — | 3 — | 2 — | 1 — | 33,3 — | 104 — | 20 1 | 18 1 | 2 — | 10,0 — | 105 71 |
| | Summe | 8 | 8 | — | — | 96 | 5 | 5 | — | — | 124 | 5 | 4 | 1 | 20,0 | 92 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 104 | 21 | 19 | 2 | 10,0 | 103 |
| Garnisonlazarette 1902/03 | mit ohne | 8 — | 7 — | 1 — | 12,5 — | 123 — | 7 1 | 6 — | 1 1 | 14,3 100,0 | 112 26 | 3 — | 2 — | 1 — | 33,3 — | 155 — | 4 — | 4 — | — — | — — | 186 — | 22 1 | 19 — | 3 1 | 13,6 100,0 | 136 26 |
| | Summe | 8 | 7 | 1 | 12,5 | 123 | 8 | 6 | 2 | 25 | 102 | 3 | 2 | 1 | 33,3 | 155 | 4 | 4 | — | — | 187 | 23 | 19 | 4 | 17,4 | 131 |

III. Gesamtergebnis bei metapneumonischer und idiopathischer Eiterbrust.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|
| Schedes Gesamtsumme | mit ohne } | 84 | 70 | 14 | 16,4 | 68 | 166 | 148 | 18 | 10,8 | 66 | 49 | 47 | 2 | 4,2 | 80 | 90 | 76 | 14 | 15,5 | 111 | 389 | 341 | 48 | 12,3 | 78 |
| Davon entfielen auf die Garnisonlazarette | mit ohne } | 39 | 31 | 8 | 20,5 | 94 | 69 | 59 | 10 | 14,8 | 100 | 10 | 10 | — | — | 131 | 27 | 23 | 4 | 14,0 | 146 | 145 | 123 | 22 | 15,5 | 102 |
| Garnisonlazarette 1892/94 | mit ohne } | 71 | 60 | 11 | 15,5 | 110 | 100 | 93 | 7 | 7,0 | 113 | 25 | 25 | — | — | 127 | 20 | 16 | 4 | 20,0 | 123 | 216 | 194 | 22 | 10,2 | 115 |
| Garnisonlazarette vom 1. April 1894 bis 30. September 1896 | mit ohne } | 75 | 69 | 6 | 8,0 | 133 | 87 | 79 | 8 | 9,2 | 105 | 33 | 28 | 5 | 15,2 | 132 | 25 | 23 | 2 | 8,0 | 100 | 220 | 199 | 21 | 9,5 | 118 |
| Garnisonlazarette im 5 jährigen Durchschnitt 1896/97 bis 1900/01 | mit ohne } | 25,8 | 23,8 | 2,0 | 7,8 | 113 | 30,6 | 28,0 | 2,6 | 8,5 | 108 | 11,4 | 10,6 | 0,80 | 7,0 | 106 | 7,8 | 5,8 | 2,0 | 25,6 | 138 | 75,6 | 68,2 | 7,4 | 9,8 | 112 |
| Garnisonlazarette 1901/02 | mit ohne } | 22 | 20 | 2 | 9,1 | 123 | 33 | 33 | — | — | 122 | 9 | 8 | 1 | 11,1 | 100 | 6 | 4 | 2 | 33,3 | 118 | 70 | 65 | 5 | 7,0 | 118 |
| Garnisonlazarette 1902/03 | mit ohne } | 29 | 25 | 4 | 13,8 | 120 | 23 | 21 | 2 | 8,6 | 119 | 6 | 5 | 1 | 16,6 | 138 | 8 | 7 | 1 | 12,5 | 146 | 66 | 58 | 8 | 12,1 | 123 |

IV. Brustschnitt bei sekundärer und metastatischer Eiterbrust.

| Ursprüngliche Krankheit | Zahl | Art der Operation: | | Geheilt | Ge-storben | Sterblich-keit (% der Operier-ten) | Mittlere Hei-lungs-dauer in Tagen |
|---------------------------------------|------|------------------------|------|---------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | mit Rippenaussägung | ohne | | | | |
| Bronchialkatarrh | 5 | 5 | — | 4 | 1 | 20,0 | 85 |
| Grippe | 4 | 4 | — | 3 | 1 | 25,0 | 115 |
| Lungenabszefs | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 66,7 | 112 |
| Blinddarmentzündung | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 84 |
| Mandelentzündung | 2 | 2 | — | 2 | — | — | 135 |
| Zellgewebsentzündung | 2 | 2 | — | 2 | — | — | 138 |
| Tuberkulose | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 83 |
| Sepsis | 2 | 2 | — | — | 2 | 100,0 | 1 |
| Chronische Nierenentzündung | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 240 |
| Dickdarmentzündung | 1 | 1 | — | — | 1 | 100,0 | 4 |
| Wechselfieber | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 53 |
| Summe | 25 | 23 | 2 | 17 | 8 | 32,0 | 95 |

Fünfte Unterart: Lungenerweiterung und Asthma.

(No. 61 und 62 des Rapportmusters.)

| | Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--|-------|
| | | absol. Zahl | ‰ | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| Lungenerweiterung (No. 61) | 4 | 80 | 0,15 | 18 | — | 66 | 84 | — | 25,2 |
| Asthma (No. 62) | 2 | 49 | 0,09 | 19 | — | 29 | 48 | 3 | 18,0 |

Lungenerweiterung und Asthma kamen meist zusammen vor.

Bei einem Ökonomehandwerker, der bei offenem Fenster zu schlafen gewohnt war, wurde ein typischer Asthmaanfall ausgelöst, als das Fenster der Kasernenstube infolge zu großer Kälte geschlossen wurde (Erfurt).

Sechste Unterart: Andere Krankheiten der Atmungsorgane.

(No. 63 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| — | 14 | 0,03 | 1 | 4 ¹⁾ | 8 | 13 | 1 | 30,7 |

Außer den unter Rapport No. 58 erwähnten 9 Erkrankungen an Lungenabszessen nach Lungenentzündung sind hier noch 4 beschrieben, von denen 2 (Danzig) spontan heilten, während 2 (darunter 1 Operierter) starben (Rastenburg, Allenstein).

Es sind somit von 13 Lungenabszessen 8 ohne operativen Eingriff geheilt.

Dies Ergebnis unterstützt die Ansicht, daß bei dieser Erkrankung das abwartende Verhalten den Vorzug verdient (St.-A. Schurig-Magdeburg). — Für sie spricht auch eine Beobachtung aus Danzig, wo bei einem Musketier zur Operation geschritten werden sollte, da das Vorhandensein des Abszesses durch einen stets auf dem Röntgensschirm erscheinenden, gänseei-großen Schatten gesichert erschien. Gerade als der Mann nach längerem Zögern seine Einwilligung zur Operation gegeben hatte, ging zunächst das Fieber, dann alle übrigen Erscheinungen des Abszesses zurück. Der Mann wurde als Ganzinvalid geheilt entlassen (O.-St.-A. Mankiewitz).

Anhang zur III. Gruppe.

Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die Zahl derjenigen Mannschaften, welche die Armee in den

¹⁾ Außerdem starben 2 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

einzelnen Jahren seit 1889/90 durch Krankheiten der Atmungsorgane — einschl. Tuberkulose der ersten Luftwege — verloren hat.¹⁾

Der Gesamtverlust betrug

| | | | |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|
| im Jahre 1889/90 | 3324 Mann | = | 7,9 $\frac{0}{100}$ ‰ K., |
| „ „ 1890/91 | 3032 | = | 7,0 „ |
| „ „ 1891/92 | 3710 | = | 8,5 „ |
| „ „ 1892/93 | 3249 | = | 7,4 „ |
| „ „ 1893/94 | 3338 | = | 7,2 „ |
| „ „ 1894/95 | 3002 | = | 5,9 „ |
| „ „ 1895/96 | 3192 | = | 6,2 „ |
| „ „ 1896/97 | 2906 | = | 5,6 „ |
| „ „ 1897/98 | 2930 | = | 5,7 „ |
| „ „ 1898/99 | 3012 | = | 5,9 „ |
| „ „ 1899/1900 | 3186 | = | 6,1 „ |
| „ „ 1900/01 | 3246 | = | 6,1 „ |
| „ „ 1901/02 | 3331 | = | 6,2 „ |

im Jahre 1902/03 3456 Mann = 6,6 $\frac{0}{100}$ ‰ K.

Bei Betrachtung dieser Zahlen fällt der Abfall der $\frac{0}{100}$ Zahlen im Jahre 1894/95 deutlich in die Augen; die Erklärung für diese Abnahme liegt darin, daß von dem genannten Jahre ab die unmittelbar nach der Einstellung wegen körperlicher Leiden als dienstunbrauchbar entlassenen Mannschaften in einer besonderen Tabelle verrechnet und in den allgemeinen Zahlen über den Krankenabgang nicht enthalten sind. Rechnet man diejenigen Mannschaften, welche infolge von Krankheiten der Atmungsorgane unmittelbar nach der Einstellung aus dem Heere ausschieden, mit hinzu, so ändern sich die Zahlen aus der obigen Tabelle in der folgenden Weise:

Es schieden aus im Jahre:

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---------------------------|
| 1894/95 | 3740 Mann | = | 7,4 $\frac{0}{100}$ ‰ K., |
| 1895/96 | 3901 | = | 7,6 „ |
| 1896/97 | 3679 | = | 7,1 „ |
| 1897/98 | 3807 | = | 7,4 „ |
| 1898/99 | 3617 | = | 7,0 „ |
| 1899/1900 | 3724 | = | 7,1 „ |
| 1900/01 | 3781 | = | 7,2 „ |
| 1901/02 | 3875 | = | 7,2 „ |

1902/03 3989 Mann = 7,6 $\frac{0}{100}$ ‰ K.

Die verschiedenen Arten des Abganges sind aus der Tabelle auf Seite 78 zu ersehen. Bezüglich der als dienstunbrauchbar Entlassenen ist das oben Gesagte zu beachten, ein Vergleich der Jahre 1889/94 mit den Jahren 1894/1901 ist also nicht ohne weiteres angängig.

¹⁾ In den nachstehenden Zahlen sind auch diejenigen Mannschaften enthalten, welche vor ihrer Entlassung nicht in militärärztlicher Behandlung standen.

Abgang infolge von Krankheiten der Atmungsorgane — einschließlich Tuberkulose der ersten Luftwege und Lunge — im Jahre 1902/1903

durch Tod, Dienstunbrauchbarkeit, Halb- und Ganzinvalidität, innerhalb und außerhalb der militärärztlichen Behandlung.

1. Nach Erkrankungsformen und nach Art des Abganges.

| Art des Abganges | Von der Gesamtzahl des Abganges entfallen auf | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------|--|-----|
| | Tuberkulose der ersten Luftwege | Tuberkulose der Lungen und des Brustfells | Lungenblutung | Brustfellentzündung und Ausgänge | Akute Lungenentzündung | Chron. Lungenentzündung (ohne das der Nachweis von Tuberkelbazillen gelang) | Lungenerweiterung | Bronchialkatarrh u. s. w. | Asthma | Alle anderen Krankheiten der Atmungsorgane | |
| Ganzinvalidität | nach äußerer Dienstbeschädigung | — | 4 | 7 | 14 | — | — | 1 | 1 | — | 4 |
| | nach innerer Dienstbeschädigung | 5 | 662 | 109 | 615 | 30 | 69 | 25 | 499 | 10 | 100 |
| | ohne Dienstbeschädigung | — | — | 1 | 3 | — | 2 | 15 | 10 | 6 | 9 |
| Halbinvalidität | nach äußerer Dienstbeschädigung | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| | ohne Dienstbeschädigung | — | — | — | 8 | — | — | 186 | 28 | 41 | 63 |
| Dienstunbrauchbarkeit | — | 48 | 32 | 52 | 2 | 54 | 41 | 246 | 24 | 171 | |
| durch Tod ausgeschieden | 2 | 78 | 2 | 29 | 138 | 1 | — | 1 | — | 5 | |
| Summe . . | 7 | 792 | 151 | 722 | 170 | 126 | 269 | 785 | 81 | 353 | |

2. Nach Truppengattung und nach Art des Abganges.

| Art des Abganges | Truppengattung | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------|------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Infanterie | Kavallerie | Feldartillerie | Fußartillerie | Pioniere | Verkehrstruppen | Train | Bekleidungsämter | Landwehrstämme u. s. w. | Festungsgefängnisse u. s. w. | Sanitätsmannschaften | Militärkrankenwärter | Unteroffizierschulen | Alle anderen Truppengattungen |
| Ganzinvalidität | nach äußerer Dienstbeschädigung | 12 | 10 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| | nach innerer Dienstbeschädigung | 1367 | 235 | 207 | 85 | 74 | 21 | 37 | 18 | 25 | 13 | 20 | 6 | 15 |
| | ohne Dienstbeschädigung | 20 | 8 | 6 | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 4 | — | — |
| Halbinvalidität | nach äußerer Dienstbeschädigung | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | ohne Dienstbeschädigung | 191 | 44 | 33 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 11 | — | 13 | — | 2 |
| Dienstunbrauchbarkeit | 478 | 55 | 57 | 18 | 15 | 5 | 8 | 14 | 3 | 12 | — | 1 | 4 | — |
| durch Tod ausgeschieden | 161 | 32 | 25 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | — |
| Summe . . | 2229 | 386 | 336 | 124 | 100 | 37 | 62 | 39 | 43 | 27 | 41 | 8 | 22 | 2 |

3. Nach Armeekorps, Truppengattung, Dienstgrad, Art des Abganges und Erkrankungsformen.

| Armeekorps | Gesamtzahl | % K. | Truppengattung | | | | | | | | | | | | | | Dienstgrad | | | | | | | | | | Abgang als | | | | Von der Gesamtzahl des Abganges entfallen auf | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|---------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------|--------|--|
| | | | Infanterie | Kavallerie | Feldartillerie | Fußartillerie | Pioniere | Verkehrstruppen | Train | Bekleidungsämter | Landwehrstämme | Festungsgefangnisse | Sanitätsmannschaften | Militärkrankenwärter | Unteroftizierschulen | Alle anderen Truppengattungen. | Feldwebel, Wachtmeister | Sergeanten | Unteroftiziere | Sanitäts- | | Gefreite und Soldaten | Musiker (Hoboisten, Trompeter usw.) | Gefreite und Gemeine | Einjährig-Freiwillige | Sonstige | gestorben | dienstunbrauchbar | halbinvalide | ganzinvalide | Tuberkulose der ersten Luftwege | Tuberkulose der Lungen und des Brustteils | Lungenblutung | Brustfellentzündung und Ausgänge | Akute Lungenentzündung | Chronische Lungenentzündung (ohne Nachweisung von Tuberkelbazillen) | Lungenerweiterung | Bronchialkatarrh | Asthma | Alle anderen Krankheiten der Atmungsorgane |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Feldwebel, Sergeanten, Unteroftiziere | Sanitäts- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gardekorps . . . | 354 | 8,6 | 221 | 35 | 34 | 10 | 4 | 33 | 3 | 7 | — | — | 5 | 1 | — | 1 | 30 | 8 | 10 | 3 | 2 | 24 | 262 | 15 | — | 26 | 29 | 41 | 258 | — | 75 | 18 | 103 | 15 | — | 23 | 85 | 13 | 22 | |
| I. Armeekorps | 240 | 7,6 | 137 | 40 | 29 | 5 | 11 | — | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | 19 | 2 | 3 | 3 | — | 10 | 201 | 2 | — | 11 | 32 | 18 | 179 | — | 57 | 11 | 70 | 6 | 4 | 20 | 54 | 2 | 16 | |
| II. Armeekorps | 172 | 6,7 | 120 | 9 | 14 | 8 | 8 | — | 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 | — | 13 | 4 | 4 | 2 | — | 5 | 143 | 1 | — | 13 | 27 | 11 | 121 | — | 31 | 12 | 40 | 9 | 2 | 9 | 18 | 3 | 48 | |
| III. Armeekorps | 155 | 6,8 | 106 | 19 | 10 | — | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | — | — | — | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 117 | 4 | — | 8 | 23 | 17 | 107 | 2 | 56 | 2 | 32 | 8 | — | 9 | 21 | 9 | 16 | |
| IV. Armeekorps | 131 | 5,9 | 72 | 13 | 16 | 9 | 6 | — | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | — | 2 | — | 26 | 4 | 2 | 3 | — | 11 | 84 | 1 | — | 7 | 25 | 32 | 67 | 2 | 19 | 1 | 21 | 5 | 1 | 12 | 38 | 15 | 17 | |
| V. Armeekorps | 142 | 5,5 | 96 | 11 | 11 | 8 | 2 | — | 2 | 1 | 5 | — | 6 | — | — | — | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 112 | — | — | 10 | 31 | 15 | 86 | — | 26 | 4 | 37 | 12 | — | 12 | 29 | 1 | 21 | |
| VI. Armeekorps | 149 | 5,8 | 92 | 25 | 12 | 9 | 2 | — | 1 | — | 4 | 4 | — | — | — | — | 17 | 4 | 8 | — | — | 4 | 114 | 2 | — | 14 | 33 | 16 | 86 | 1 | 35 | 4 | 25 | 8 | — | 16 | 37 | 1 | 22 | |
| VII. Armeekorps | 196 | 7,3 | 139 | 26 | 17 | 4 | 1 | — | 4 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | 21 | 5 | 2 | — | — | 8 | 151 | 9 | — | 18 | 31 | 19 | 128 | — | 43 | 9 | 45 | 11 | — | 18 | 40 | 4 | 26 | |
| VIII. Armeekorps | 184 | 6,8 | 113 | 17 | 26 | 10 | 2 | 3 | 3 | — | 1 | 7 | — | 1 | 1 | — | 16 | 5 | 6 | — | — | 5 | 146 | 6 | — | 16 | 37 | 14 | 117 | — | 43 | 12 | 26 | 14 | — | 11 | 59 | 2 | 17 | |
| IX. Armeekorps | 153 | 6,1 | 108 | 19 | 14 | — | 4 | — | 1 | 1 | 5 | — | 1 | — | — | — | 11 | 2 | 12 | 1 | — | 11 | 113 | 3 | — | 8 | 30 | 12 | 103 | — | 36 | 3 | 41 | 4 | 5 | 15 | 37 | — | 12 | |
| X. Armeekorps | 145 | 6,6 | 100 | 17 | 14 | — | 4 | — | 5 | — | 3 | — | 2 | — | — | — | 14 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 102 | 7 | — | 21 | 16 | 12 | 96 | — | 32 | 5 | 35 | 16 | 7 | 10 | 29 | 1 | 10 | |
| XI. Armeekorps | 154 | 7,4 | 111 | 11 | 25 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 10 | 3 | 4 | — | 1 | 4 | 128 | 4 | — | 7 | 43 | 11 | 93 | — | 35 | 7 | 26 | 6 | — | 7 | 49 | 9 | 15 | |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 87 | 4,4 | 54 | 15 | 7 | — | 1 | — | 6 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | — | — | 3 | 76 | 2 | — | 20 | 13 | 2 | 52 | 2 | 21 | 3 | 25 | 11 | — | 1 | 17 | — | 7 | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | 158 | 7,1 | 101 | 24 | 15 | — | 8 | — | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 32 | 4 | 3 | 1 | — | 5 | 107 | 6 | — | 5 | 39 | 32 | 82 | — | 33 | 7 | 33 | 1 | 27 | 31 | 11 | 3 | 12 | |
| XIV. Armeekorps | 215 | 6,8 | 161 | 21 | 9 | 5 | 6 | — | 3 | — | 1 | 1 | 2 | — | 6 | — | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 181 | 5 | — | 17 | 50 | 18 | 130 | — | 54 | 9 | 35 | 7 | — | 20 | 75 | 4 | 11 | |
| XV. Armeekorps | 189 | 6,1 | 103 | 24 | 13 | 20 | 18 | — | 3 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 153 | 5 | — | 7 | 58 | 19 | 105 | — | 41 | 12 | 13 | 7 | 18 | 18 | 53 | 2 | 25 | |
| XVI. Armeekorps | 207 | 7,6 | 131 | 20 | 25 | 14 | 7 | — | 1 | 6 | — | — | 2 | 1 | — | — | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 188 | — | — | 14 | 67 | 5 | 121 | — | 29 | 9 | 43 | 13 | 56 | 8 | 38 | — | 11 | |
| XVII. Armeekorps | 177 | 6,0 | 102 | 18 | 24 | 10 | 7 | — | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | — | 12 | 5 | 6 | 3 | — | 6 | 143 | 2 | — | 15 | 26 | 9 | 127 | — | 52 | 6 | 36 | 5 | 4 | 5 | 45 | 8 | 16 | |
| XVIII. Armeekorps | 186 | 7,1 | 123 | 20 | 12 | 9 | 4 | — | 2 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | — | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 143 | 3 | — | 12 | 49 | 25 | 100 | — | 51 | 11 | 28 | 7 | 2 | 23 | 48 | 4 | 12 | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 62 | 3,0 | 39 | 2 | 9 | 3 | 3 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 1 | 2 | — | 5 | 47 | — | — | 7 | 11 | 1 | 43 | — | 23 | 6 | 8 | 5 | — | 1 | 2 | — | 17 | |
| Summe . . . | 3456 | 6,6 | 2229 | 386 | 336 | 124 | 100 | 37 | 62 | 39 | 43 | 27 | 41 | 8 | 22 | 2 | 315 | 72 | 97 | 29 | 12 | 143 | 2711 | 77 | — | 256 | 670 | 329 | 2201 | — | 7792 | 151 | 722 | 170 | 126 | 269 | 785 | 81 | 353 | |

4. Nach Truppengattung, Dienstgrad, Dienstalter, Art des Abganges und Erkrankungsformen.

| | Es schieden aus | | | | davon litten an | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------|----------|---|-----|
| | durch Tod | als dienst-unbrauchbar | als halb-invalide | als ganz-invalide | Tuber- kulose der ersten Luft- wege | Tuber- kulose der Lun- gen und des Brust- fells | Lun- gen- blut- ung | Brust- fell- ent- zün- dung und Aus- gänge | akuter Lungen- ent- zündung | chro- nischer Lungen- entzündung (ohne das der Nach- weis von Tuberkel- bazillen gelang) | Lun- gen- er- wei- terung | Bron- chial- ka- tarrh | Asth- ma | allen an- deren Krank- heiten der At- mungs- organe | |
| a. Truppengattungen | Infanterie | 161 | 478 | 191 | 1399 | 5 | 458 | 92 | 478 | 108 | 85 | 168 | 549 | 48 | 238 |
| | Kavallerie | 32 | 55 | 46 | 253 | 1 | 111 | 15 | 76 | 22 | 9 | 42 | 62 | 8 | 40 |
| | Feldartillerie | 25 | 57 | 34 | 220 | — | 89 | 14 | 75 | 20 | 12 | 23 | 61 | 10 | 32 |
| | Fufsartillerie | 10 | 18 | 10 | 86 | — | 30 | 7 | 24 | 6 | 6 | 7 | 30 | 3 | 11 |
| | Pioniere | 5 | 15 | 5 | 75 | — | 22 | 10 | 26 | 1 | 5 | 5 | 27 | 1 | 3 |
| | Verkehrstruppen | 2 | 5 | 8 | 22 | — | 10 | 1 | 5 | 2 | — | 1 | 8 | 4 | 6 |
| | Train | 6 | 8 | 7 | 41 | — | 15 | 5 | 16 | 4 | — | 9 | 8 | — | 5 |
| | Bekleidungsämter | 4 | 14 | 2 | 19 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | — | 3 |
| | Landwehrstämme | 3 | 3 | 11 | 26 | — | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 |
| | Festungsgefängnisse | 2 | 12 | — | 13 | — | 15 | 1 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | 3 |
| | Sanitätsmannschaften | 4 | — | 13 | 24 | — | 9 | — | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| | Militärkrankenwärter | 1 | 1 | — | 6 | — | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| | Unteroffizierschulen | 1 | 4 | 2 | 15 | — | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| | Alle anderen Truppen- gattungen | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Summe | 256 | 670 | 329 | 2201 | 7 | 792 | 151 | 722 | 170 | 126 | 269 | 785 | 81 | 353 | |
| b. Dienstgrade | Feldweibel usw. | 13 | 1 | 225 | 85 | 2 | 23 | 4 | 15 | 1 | 1 | 131 | 40 | 38 | 69 |
| | Sergeanten | 5 | 1 | 16 | 63 | 2 | 38 | — | 9 | — | 1 | 9 | 14 | 5 | 7 |
| | Unteroffiziere | 10 | 2 | — | 92 | — | 47 | 6 | 15 | 6 | 2 | 1 | 21 | 1 | 5 |
| | Musiker (Hoboisten, Trompeter usw.) | 3 | — | 87 | 53 | — | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 75 | 13 | 9 | 10 |
| | Gefreite und Gemeine | 223 | 631 | 1 | 1868 | 3 | 646 | 135 | 664 | 160 | 114 | 47 | 676 | 24 | 254 |
| | Einjährig-Freiwillige | 2 | 35 | — | 40 | — | 13 | 4 | 13 | 1 | 7 | 6 | 21 | 4 | 8 |
| | Sonstige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| c. Dienstalter | im 1. Monat dienend | 9 | 57 | — | 1 | — | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 16 | 3 | 15 |
| | im 2. Monat dienend | 12 | 180 | — | 5 | — | 17 | 15 | 12 | 8 | 18 | 10 | 77 | 6 | 34 |
| | im 3.—6. Monat dienend | 70 | 272 | — | 273 | 1 | 131 | 35 | 75 | 55 | 40 | 23 | 165 | 12 | 78 |
| | im 2. Halbjahre dienend | 50 | 96 | 1 | 696 | 2 | 186 | 46 | 235 | 39 | 24 | 7 | 222 | 4 | 78 |
| | Summe des 1. Dienstjahres | 141 | 605 | 1 | 975 | 3 | 342 | 101 | 327 | 110 | 88 | 41 | 480 | 25 | 205 |
| | im 2. Jahre dienend | 74 | 54 | — | 736 | — | 258 | 31 | 261 | 45 | 29 | 12 | 182 | 2 | 44 |
| | im 3. Jahre dienend | 18 | 5 | — | 202 | — | 68 | 7 | 91 | 10 | 4 | — | 35 | 1 | 9 |
| im 4. Jahre dienend | 1 | 3 | — | 54 | — | 28 | 4 | 9 | 1 | 1 | — | 9 | 1 | 5 | |
| länger als 4 Jahre dienend | 22 | 3 | 328 | 234 | 4 | 96 | 8 | 34 | 4 | 4 | 216 | 79 | 52 | 90 | |

Infolge von Krankheiten der Atmungsorgane schieden aus

| im Jahre | durch Tod | | | als dienstunbrauchbar | | | als halbinvalide | | | als ganzinvalide | | |
|---------------------|-----------|------|------------------|-----------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | abs. Zahl | ‰ K. | ‰ der Gesamtzahl | abs. Zahl | ‰ K. | ‰ der Gesamtzahl | abs. Zahl | ‰ K. | ‰ der Gesamtzahl | abs. Zahl | ‰ K. | ‰ der Gesamtzahl |
| 1889/90 | 494 | 1,2 | 14,9 | 1 362 | 3,3 | 41,0 | 220 | 0,53 | 6,6 | 1 248 | 3,0 | 37,5 |
| 1890/91 | 456 | 1,0 | 15,0 | 1 151 | 2,6 | 38,0 | 187 | 0,43 | 6,2 | 1 238 | 2,8 | 40,8 |
| 1891/92 | 458 | 1,1 | 12,3 | 1 415 | 3,3 | 38,1 | 244 | 0,56 | 6,6 | 1 593 | 3,7 | 42,9 |
| 1892/93 | 407 | 0,93 | 12,5 | 1 238 | 2,8 | 38,1 | 204 | 0,46 | 6,3 | 1 400 | 3,2 | 43,1 |
| 1893/94 | 435 | 0,93 | 13,0 | 1 163 | 2,5 | 34,8 | 176 | 0,38 | 5,3 | 1 564 | 3,4 | 46,9 |
| 1894/95 | 388 | 0,77 | 12,9 | 646 | 1,3 | 21,5 | 200 | 0,40 | 6,7 | 1 768 | 3,5 | 58,9 |
| 1895/96 | 401 | 0,78 | 12,6 | 570 | 1,1 | 17,9 | 190 | 0,37 | 6,0 | 2 031 | 3,9 | 63,6 |
| 1896/97 | 322 | 0,63 | 11,1 | 443 | 0,86 | 15,2 | 170 | 0,33 | 5,8 | 1 971 | 3,8 | 67,8 |
| 1897/98 | 282 | 0,55 | 9,6 | 528 | 1,0 | 18,0 | 196 | 0,38 | 6,7 | 1 924 | 3,7 | 65,7 |
| 1898/99 | 279 | 0,54 | 9,3 | 749 | 1,5 | 24,9 | 267 | 0,52 | 8,9 | 1 717 | 3,3 | 57,0 |
| 1899/1900 | 323 | 0,62 | 10,1 | 678 | 1,3 | 21,3 | 256 | 0,49 | 8,0 | 1 929 | 3,7 | 60,5 |
| 1900/01 | 270 | 0,51 | 8,3 | 633 | 1,2 | 19,5 | 292 | 0,55 | 9,0 | 2 051 | 3,9 | 63,2 |
| 1901/02 | 237 | 0,41 | 7,1 | 725 | 1,3 | 21,8 | 298 | 0,55 | 8,9 | 2 071 | 3,8 | 62,2 |
| 1902/03 | 256 | 0,49 | 7,4 | 670 | 1,3 | 19,4 | 329 | 0,62 | 9,5 | 2 201 | 4,2 | 63,7 |

Alle weiteren Einzelheiten sind aus den folgenden Übersichten zu ersehen. In den Zahlen der Dienstunbrauchbaren sind überall die unmittelbar nach der Einstellung Entlassenen nicht mitenthalten.

IV. Gruppe: Krankheiten der Kreislaufs- und blutbereitenden Organe.

(No. 64 bis 79 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | | | |
| 223 | 6664 | 12,7 | 5119 | 74,3 | 28 1) | 0,41 | 1555 | 22,6 | 6702 | 97,3 | 185 | 142 898 | 20,7 |

Außerdem erkrankten noch 29 Kadetten und 40 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

In diesem Jahre zeigt die Krankenziffer gegenüber dem Vorjahre eine Abnahme um 0,5 ‰ K. und hat damit den niedrigsten Stand seit 1881 erreicht.

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1881/82 bis 1885/86 . . . | 5026,4 Mann = 13,3 ‰ K., |
| 1886/87 " 1890/91 . . . | 5521,2 " = 13,3 " |
| 1891/92 " 1895/96 . . . | 7106,8 " = 15,1 " |
| 1896/97 " 1900/01 . . . | 7127,6 " = 13,7 " |
| im Jahre 1901/02 . . . | 7119 " = 13,2 " |
| im Jahre 1902/03 . . . | 6664 Mann = 12,7 ‰ K. |

1) Außerdem starben 11 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|------|----------------|------------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 578 | 14,0 | XII. (1.K.S.) | 227 | 11,4 |
| I. | 303 | 9,6 | XIII. (K. W.) | 377 | 17,0 |
| II. | 305 | 11,8 | XIV. | 406 | 12,8 |
| III. | 219 | 9,3 | XV. | 437 | 14,0 |
| IV. | 240 | 10,7 | XVI. | 433 | 15,9 |
| V. | 216 | 8,4 | XVII. | 303 | 10,2 |
| VI. | 277 | 10,7 | XVIII. | 413 | 15,7 |
| VII. | 333 | 12,4 | XIX. (2.K.S.) | 230 | 11,2 |
| VIII. | 528 | 19,6 | | | |
| IX. | 233 | 9,3 | I. K. B. . . . | 440 | 18,9 |
| X. | 285 | 13,0 | II. " " . . . | 339 | 15,9 |
| XI. | 321 | 15,5 | III. " " . . . | 228 | 12,2 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 563 | 668 | 503 | 620 | 560 | 685 | 556 | 501 | 496 | 638 | 522 | 352 |
| ‰ K. | 1,3 | 1,2 | 0,94 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,91 | 0,93 | 1,2 | 0,97 | 0,73 |

Bei den Erkrankungsziffern der einzelnen Monate fallen wesentliche Unterschiede nicht auf.

Erste Unterart: Krankheiten des Herzens.

(No. 64 bis 68 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 88 | 1522 | 2,9 | 277 | 21 ¹⁾ | 1250 | 1548 | 62 | 30,6 |

Außerdem erkrankten noch 7 Kadetten und 10 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | |
|---------------------------|--------|------------------|
| 1881/82 bis 1885/86 . . . | 563,4 | Mann = 1,5 ‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 . . . | 840,2 | „ = 2,0 „ |
| 1891/92 „ 1895/96 . . . | 1357,4 | „ = 2,8 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 . . . | 1604,2 | „ = 3,1 „ |
| im Jahre 1901/02 . . . | 1737 | „ = 3,2 „ |

im Jahre 1902/03 . . . 1522 Mann = 2,9 ‰ K.

Der Gesamtzugang an Herzkrankheiten ist in diesem Berichtsjahre im Vergleich zum Vorjahre um 0,3, der an Herzklappenfehlern um 0,2 ‰ K. zurückgegangen.

Die Zahl der durch Herzkrankheiten invalide Gewordenen hat sich um 0,2 ‰ K. erhöht, die der Dienstunbrauchbaren ist dagegen die gleiche geblieben.

Aus der Behandlung schieden aus:

| | 1896/97 | 1897/98 | 1898/99 | 1899/1900 | 1900/01 | 1901/02 | 1902/03 |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| als dienstfähig | 357 | 342 | 371 | 336 | 325 | 314 | 277 |
| durch Tod . . | 10 | 20 | 16 | 21 | 16 | 14 | 21 |
| anderweitig | 1160 | 1247 | 1308 | 1333 | 1374 | 1467 | 1250 |

Zugang an Erkrankungen des Herzens nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|------|------------------|------------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 124 | 3,0 | XII. (1. K. S.) | 53 | 2,7 |
| I. | 46 | 1,5 | XIII. (K. W.) | 109 | 4,9 |
| II. | 56 | 2,2 | XIV. | 77 | 2,4 |
| III. | 46 | 2,0 | XV. | 95 | 3,0 |
| IV. | 56 | 2,5 | XVI. | 63 | 2,3 |
| V. | 50 | 2,0 | XVII. | 69 | 2,3 |
| VI. | 87 | 3,4 | XVIII. | 127 | 4,8 |
| VII. | 84 | 3,1 | XIX. (2. K. S.) | 68 | 3,3 |
| VIII. | 101 | 3,8 | | | |
| IX. | 46 | 1,8 | I. K. B. | 101 | 4,3 |
| X. | 72 | 3,3 | II. „ „ | 67 | 3,1 |
| XI. | 93 | 4,5 | III. „ „ | 69 | 3,7 |

Der Zugang an Herzkrankheiten in militärärztlicher Behandlung, wie ihn vorstehende Tabelle ergibt, war am höchsten beim XIII. (K. W.), XVIII. und XI. Armeekorps. Es folgen dann das VIII., VI., X., XIX. (2. K. S.), VII., Gardekorps, XV., XII., (1. K. S.), IV., XIV., XVI., XVII., II., III., V., IX. und I. Armeekorps. Wesentlich anders gestaltet sich die territoriale Verteilung der Herzkranken, wenn man sie nach dem Abgange aller — auch der nicht militärärztlich behandelten — Dienstunbrauchbaren und Invaliden betrachtet. Hier ist die Reihenfolge, wie sie aus der Tabelle auf Seite 81 hervorgeht: XIII. (K. W.), VIII., XI., XVIII., VI., Gardekorps, X., XV., VII., II., IV., XIV., XVI., IX., III., V., XVII. und I. Armeekorps.

Noch ein anderes Bild erhält man, wenn man von den Korpsbezirken ausgeht, in welchen die Entlassenen ausgehoben waren. Ihre Reihenfolge ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, in welcher das XVIII. Armeekorps, wie in den Vorjahren, die höchste Erkrankungsziffer zeigt. Es folgen dann das XV., XIII. (K. W.), VIII., VI., XI., IX., VII., X., XIV., XVI., II., IV., V., III., I. und XVII. Armeekorps. Stets ist das XVIII., XV., XIII. (K. W.) und VIII. Armeekorps verhältnismäßig hoch, während das XVII., I., III. und V. Armeekorps am wenigsten beteiligt sind.

Von den wegen Krankheiten des Herzens Entlassenen waren ausgehoben im Bereiche des

| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XIII. (K. W.) | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | XVIII. |
|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|------------------|------|------|------|-------|--------|
| absol. Zahl | 20 | 33 | 43 | 40 | 29 | 70 | 146 | 115 | 65 | 48 | 50 | 119 | 49 | 39 | 7 | 14 | 104 |
| ‰ der 1902 als tauglich Ausgehobenen ²⁾ | 2,8 | 4,6 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 7,0 | 5,5 | 7,2 | 6,0 | 5,0 | 6,6 | 12,2 | 4,9 | 13,0 | 4,8 | 1,9 | 13,6 |

1) Außerdem starben 11 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

2) Berechnet nach den Angaben des Statistischen Jahrbuchs für das Deutsche Reich, fünfundzwanzigster Jahrgang, 1904, Seite 214.

Die nachstehende Tabelle über das Lebensalter zeigt, daß von den 22jährigen, also von den Leuten, die in den beiden ersten Gestellungsjahren zurückgewiesen und erst im letzten Militärpflichtjahre eingestellt sind, 9,1 % mehr wegen Herzkrankheiten entlassen wurden, als es dem Anteil dieser Altersklasse an der Gesamtzahl der Ausgehobenen entsprechen würde.

Vergleicht man die Abgangszahlen der Dienstunbrauchbaren und Invaliden mit dem Vorjahre, so ergibt

sich, daß 7 Armeekorps nur sehr geringe Schwankungen erfahren haben. Beim X., I., VI. und II. Armeekorps ist der Abgang geringer geworden, während er beim Gardekorps, XVIII., XI., VIII., IX., XVI. und VII. Armeekorps zugenommen hat. (Tabelle S. 81.)

Aus der Tabelle über das Dienstalder Entlassenen auf Seite 82 geht hervor, daß die Verhältnisse denen des Vorjahres annähernd gleich geblieben sind.

| Von der Gesamtzahl ¹⁾ der im Jahre 1902 in das Heer eingestellten Tauglichen (Ausgehobene und freiwillig Eingetretene) | | | Von den im Jahre 1902/03 wegen Fehler und chronischer Krankheiten des Herzens und des Herzbeutels Entlassenen waren: | | | | | |
|---|----------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| standen im Lebensalter | betrug die | | Summe | | Dienstunbrauchbare und Unmittelbare | | Ganzinvaliden | |
| | absol. Zahl | % der Gesamtzahl | absol. Zahl | % der Gesamtzahl | absol. Zahl | % der Gesamtzahl | absol. Zahl | % der Gesamtzahl |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| unter 20 Jahren | 25 297 | 9,1 | 113 | 5,1 | 77 | 6,5 | 36 | 3,6 |
| 20jährige | 118 950 | 42,9 | 379 | 17,2 | 261 | 21,9 | 118 | 11,7 |
| 21jährige | 61 551 | 22,2 | 497 | 22,6 | 265 | 22,2 | 232 | 23,0 |
| 22jährige | 65 671 | 23,7 | 722 | 32,8 | 486 | 40,8 | 236 | 23,4 |
| ältere | 6 079 | 2,2 | 489 | 22,2 | 103 | 8,6 | 386 | 38,3 |
| Gesamtzahl | 277 548 | — | 2200 | — | 1192 | — | 1008 | — |

a) *Entzündung des Herzbeutels.* (No. 64 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | % K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 2 | 36 | 0,07 | 4 | 4 ²⁾ | 24 | 32 | 6 | 54,4 |

Das Leiden entwickelte sich nach den vorliegenden Berichten bis auf wenige Ausnahmen bei Erkrankungen an Gelenkrheumatismus. Die Herzinnenhaut war regelmäßig mitbeteiligt. Vier Kranke blieben felddienstfähig, fünf starben. 4 Mann kamen wegen mangelhafter Schluffähigkeit der zweizipfligen Klappe, 1 wegen zurückbleibender Herzschwäche zur Entlassung.

O.-St.-A. Bafsmann-Metz berichtet über einen Todesfall durch eiterige Herzbeutelentzündung nach Grippe-Lungenentzündung. Der Herzbeutel enthielt 2 Liter Eiter. Verklebung der beiderseitigen Brustfellblätter und fettige Entartung der Nieren.

b) *Idiopathische Herzvergrößerung.* (No. 65 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | % K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 6 | 124 | 0,24 | 20 | 1 ²⁾ | 98 | 119 | 11 | 26,7 |

Über akute Entzündung des Herzmuskels wird 11mal berichtet. 6 mal trat die Erkrankung während eines Gelenkrheumatismus, 2 mal nach Lungenentzündung, 1 mal nach Brustfellentzündung, 1 mal nach akutem Bronchialkatarrh und 1 mal 4 Wochen nach überstandener Grippe in die Erscheinung.

Von chronischer Herzmuskelentzündung liegen neun Berichte vor. Als Ursachen sind angegeben: akute Infektionskrankheiten bei 6 Kranken, 4 mal Gelenkrheumatismus, 1 mal Mandelentzündung, 1 mal Scharlach. 1 mal mußte chronischer Alkoholmißbrauch als Ursache angesehen werden (Konstanz [2], Bromberg, Hadersleben,

¹⁾ Die Zahlen in dieser Spalte sind dem Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich, fünfundzwanzigster Jahrgang, 1904, Seite 214, entnommen; sie beziehen sich auf das gesamte deutsche Heer und die Marine.

²⁾ Außerdem starb ein Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

| Form der Herzerkrankung | Anzahl | Von den Entlassenen gehörten an dem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----------------|------|-----|------|-------|--------|-----|-----|
| | | Gardekorps | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XIII. (K.W.) | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | XVIII. | | |
| | | | Armeekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dienstunbrauchbar | Entzündung des Herzbeutels | 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | | |
| | Vergrößerung des Herzens | 117 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 11 | 15 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | |
| | davon: Fettherz | 5 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | |
| | Entartungen und chronische Krankheiten des Herzmuskels | 53 | 4 | 2 | 1 | 3 | — | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | |
| | Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen | 525 | 20 | 15 | 22 | 16 | 30 | 21 | 37 | 19 | 74 | 12 | 24 | 27 | 41 | 33 | 33 | 42 | 15 | 44 | |
| | Nervöse Störung der Herz- tätigkeit und Herzschwäche | 468 | 36 | 9 | 20 | 9 | 12 | 11 | 38 | 29 | 44 | 16 | 22 | 23 | 67 | 23 | 24 | 22 | 12 | 51 | |
| | davon: Basedowsche Krankheit | 9 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | |
| | Herzkrankheiten ohne nähere Bezeichnung | 23 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 3 | 2 | 5 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | |
| | Summe | absol. | 1192 | 69 | 33 | 49 | 31 | 46 | 45 | 87 | 60 | 134 | 42 | 57 | 70 | 129 | 66 | 65 | 69 | 32 | 108 |
| | | ‰ K. | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | 3,4 | 2,2 | 5,0 | 1,7 | 2,6 | 3,4 | 5,8 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 1,1 | 4,1 |
| Ganzinvalide | Entzündung des Herzbeutels | 21 | — | 1 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | |
| | Vergrößerung des Herzens | 117 | 16 | — | 9 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | |
| | davon: Fettherz | 36 | 11 | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | |
| | Entartungen und chronische Krankheiten des Herzmuskels | 59 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | — | 2 | 5 | |
| | Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen | 528 | 66 | 12 | 14 | 20 | 25 | 14 | 23 | 27 | 54 | 18 | 19 | 27 | 42 | 33 | 56 | 19 | 31 | 28 | |
| | Nervöse Störung der Herz- tätigkeit und Herzschwäche | 269 | 43 | 7 | 24 | 6 | 11 | 5 | 28 | 20 | 16 | 6 | 17 | 17 | 14 | 15 | 12 | 7 | 9 | 12 | |
| | davon: Basedowsche Krankheit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | Herzkrankheiten ohne nähere Bezeichnung | 14 | 5 | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | |
| | Summe | absol. | 1008 | 138 | 23 | 56 | 37 | 45 | 24 | 66 | 52 | 74 | 37 | 51 | 62 | 77 | 58 | 79 | 32 | 46 | 51 |
| | | ‰ K. | 1,9 | 3,3 | 0,73 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 0,94 | 2,6 | 1,9 | 2,8 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | 1,2 | 1,6 | 1,9 |
| Summe sämtlicher wegen Herzkrankheiten als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen | absol. | 2200 | 207 | 56 | 105 | 68 | 91 | 69 | 153 | 112 | 208 | 79 | 108 | 132 | 206 | 124 | 144 | 101 | 78 | 159 | |
| | ‰ K. | 4,2 | 5,0 | 1,8 | 4,1 | 2,9 | 4,1 | 2,7 | 5,9 | 4,2 | 7,7 | 3,2 | 4,9 | 6,4 | 9,3 | 3,9 | 4,6 | 3,7 | 2,6 | 6,0 | |

| Form der Herzerkrankung | Anzahl | Die Entlassenen standen dem Dienstalter nach | | | | | | | | Das Leiden | | | | | Eingetreten als | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|----------|------|------|------|--------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|--|-----------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | im Monat | | | im Jahre | | | | über 4 Jahre | hat sich angeblich | | wurde bei der militärärztlichen Untersuchung des neu Eingestellten wahrgenommen | war im Überweisungs-nationalverzeichnis | hat sich während der aktiven Dienstzeit entwickelt | Ausgehoben | Eingetretener | 2- bis 4-jähriger | Freiwilliger | Unteroffizierschüler |
| | | 1. | 2. bis 6. | 7. bis 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | | vor der Aushebung entwickelt | zwischen Aushebung und Einstellung | | | | | | | | |
| Dienstunbrauchbar | Entzündung des Herzbeutels | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | 6 | — | 1 | 2 | — | 6 | — | — | — |
| | Vergrößerung des Herzens | 117 | 63 | 50 | 3 | 116 | 1 | — | — | — | 114 | 2 | 32 | 23 | 1 | 94 | 13 | 9 | 1 |
| | davon: Fettherz | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — |
| | Entartungen und chronische Krankheiten des Herzmuskels | 53 | 17 | 34 | 2 | 53 | — | — | — | — | 47 | 1 | 20 | 12 | 5 | 37 | 10 | 5 | 1 |
| | Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen | 525 | 310 | 187 | 18 | 515 | 9 | — | — | 1 | 443 | 50 | 102 | 93 | 32 | 462 | 19 | 43 | 1 |
| | Nervöse Störung der Herz Tätigkeit und Herzschwäche | 468 | 131 | 295 | 30 | 456 | 9 | 2 | 1 | — | 426 | 24 | 162 | 66 | 18 | 387 | 38 | 39 | 4 |
| | davon: Basedowsche Krankheit | 9 | 2 | 7 | — | 9 | — | — | — | — | 9 | — | 2 | — | — | 8 | — | 1 | — |
| | Herzkrankheiten ohne nähere Bezeichnung | 23 | 11 | 10 | 2 | 23 | — | — | — | — | 21 | 1 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 3 | — |
| | Summe absol. | 1192 | 534 | 578 | 57 | 1169 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1057 | 78 | 323 | 199 | 57 | 1004 | 82 | 99 | 7 |
| | % der Gesamtzahl | — | 44,8 | 48,5 | 4,8 | 98,1 | 1,6 | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 88,7 | 6,5 | 27,1 | 16,7 | 4,8 | 84,2 | 6,9 | 8,3 | 0,59 |
| Ganzinvalide | Entzündung des Herzbeutels | 21 | — | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | — | 2 | — | — | — | 21 | 19 | — | 1 | 1 | |
| | Vergrößerung des Herzens | 117 | — | 11 | 19 | 30 | 16 | 8 | 3 | 60 | — | — | — | 117 | 58 | 8 | 43 | 8 | |
| | davon: Fettherz | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | 36 | 13 | — | 20 | 3 | |
| | Entartungen und chronische Krankheiten des Herzmuskels | 59 | — | 9 | 17 | 26 | 9 | 4 | 1 | 19 | — | — | — | 59 | 36 | 5 | 17 | 1 | |
| | Erkrankungen der Herzinnenhaut und der Herzklappen | 528 | — | 82 | 201 | 283 | 172 | 34 | 11 | 28 | — | — | — | 528 | 408 | 5 | 107 | 8 | |
| | Nervöse Störung der Herz Tätigkeit und Herzschwäche | 269 | — | 27 | 87 | 114 | 69 | 12 | 8 | 66 | — | — | — | 269 | 171 | 7 | 73 | 18 | |
| | davon: Basedowsche Krankheit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | Herzkrankheiten ohne nähere Bezeichnung | 14 | — | — | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 14 | 9 | — | 4 | 1 |
| | Summe absol. | 1008 | — | 131 | 336 | 467 | 278 | 62 | 24 | 177 | — | — | — | — | 1008 | 701 | 25 | 245 | 37 |
| | % der Gesamtzahl | — | — | 13,0 | 33,4 | 46,4 | 27,6 | 6,2 | 2,4 | 17,5 | — | — | — | — | 100,0 | 69,6 | 2,5 | 24,3 | 3,7 |
| Summe sämtlicher wegen Herzkrankheiten als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen | absol. | 2200 | 534 | 709 | 393 | 1636 | 297 | 64 | 25 | 178 | 1057 | 78 | 323 | 199 | 1065 | 1705 | 107 | 344 | 44 |
| % der Gesamtzahl | — | 24,3 | 32,2 | 17,9 | 74,4 | 13,5 | 2,9 | 1,1 | 8,1 | 48,0 | 3,5 | 14,7 | 9,0 | 48,4 | 77,5 | 4,9 | 15,6 | 2,0 | |

Anmerkung: Diese sowie die Tabellen auf Seite 80 u. 81 sind aufgestellt auf Grund der vorhandenen Zählkarten des Garde-, I. bis XI. und XIII. (K. W.) bis XVIII. Armeekorps über die wegen Fehler und chronischer Krankheiten des Herzens und des Herzbeutels als dienstunbrauchbar und ganzinvalide Entlassenen (einschließlich derjenigen Mannschaften, welche unmittelbar bei der Einstellung als dienstunbrauchbar ermittelt sind). Die Dienstunbrauchbaren sind beurteilt nach Anlage 3 zu § 8 und Anlage 4 b 36 zu § 9 der Heerordnung, die Invaliden nach Beilage II b 41 zu § 16 der Dienstanzweisung.

Naumburg a. S. [2]). Bei 3 Kranken liefs sich die Entstehungsursache nicht sicher feststellen.

Erwähnung verdient folgende Beobachtung:

Ein 55jähriger Kasernenwärter in der Unteroffizierschule Potsdam erkrankte an Herzerweiterung durch Herzmuskel-schwäche. 4 Tage später trat eine Verstopfung der Hauptblut-ader in der rechten Kniekehle (Vena poplitea) auf, 5 Tage später wurde auch die Kniekehlschlagader verstopft und der Unterschenkel starb in der Folgezeit ab. Nach Absetzung des rechten Oberschenkels (s. Operationsliste unter C. 3) trat jauchige Eite- rung aus der Operationswunde, wassersüchtige Anschwellung des linken Beins und des Hodensacks ein. Trotz allmählicher Besserung der Wundverhältnisse erfolgte 2½ Monate später der Tod durch Herzinsuffizienz. Die Leichenöffnung wurde nicht gestattet. (O.-St.-A. Reinhardt-Potsdam.)

Von akuter Herzerweiterung liegen 3 Berichte vor:

St.-A. Herter-Stuttgart sah sie beim Turnen, St.-A. Neuhaus-Magdeburg auf einem Manövermarsche auftreten. Die schweren Anfangerscheinungen gingen bei beiden Erkrank- ten schnell zurück, die Leute blieben dienstfähig.

Der dritte Kranke war nach einem fast 8stündigen Marsche ohnmächtig geworden. Er hatte 2 Jahre vorher eine doppel- seitige Lungenentzündung überstanden. Wegen Leistungs- unfähigkeit des Herzens mußte er invalidisiert werden (O.-St.-A. Wegelj-Erfurt).

Über chronische Herzvergrößerung infolge Überanstrengung vor der Dienstzeit berichtet St.-A. Schubert-Hadersleben: Ein Mann hatte sich das Leiden durch anstrengende Berufsarbeit als Tischler, einer als Schmied, ein dritter als Müllerknecht zugezogen.

Ähnliche Beobachtungen berichten O.-St.-A. Kraufs- Ulm und St.-A. Waldeyer-Cöln.

Bei 5 Kranken hatten die Anstrengungen des Militä- rdienstes das gleiche Leiden erzeugt: Bei einem schwäch- lichen Rekruten in Osnabrück (O.-St.-A. Gerich), einem Einjährig-Freiwilligen und einem Sergeanten im 10. Dienst- jahre in Ulm (O.-St.-A. Kraufs), bei einem Trompeter in Erfurt, der nach 1½jähriger Dienstzeit aus dienst- lichen Gründen in die Front zurückgestellt wurde (O.-St.-A. Wegelj). — Nur 1 mal (in Mörchingen) liefs sich gleich- zeitiger Alkoholmißbrauch mit Sicherheit nachweisen.

Einige Male waren in früherer Zeit Infektionskrank- heiten, die möglicherweise eine Schädigung des Herz- muskels bewirkt hatten, vorausgegangen.

Herzbeschwerden bei Fettleibigkeit wurden in Berlin bei einem 29jährigen Einjährig-Freiwilligen beobachtet, der zur Entlassung kam.

c) **Erkrankung der Herzklappen.** (No. 66 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich | |
|------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | | | Summe |
| 36 | 561 | 1,1 | 16 | 11 ¹⁾ | 551 | 578 | 19 | 34,6 |

1) Außerdem starben 2 Mann außerhalb militärärztlicher Be- handlung.

Außerdem erkrankten noch 1 Kadett und 1 Unteroffizier- Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Mit Herzklappenfehlern gingen zu im Durchschnitt der Jahre:

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|------------------|
| 1888/89 bis 1890/91 ¹⁾ | . . . | 438,0 | Mann = 1,0 ‰ K., |
| 1891/92 „ 1895/96 | . . . | 643,0 | „ = 1,4 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 | . . . | 615,2 | „ = 1,2 „ |
| im Jahre 1901/02 | . . . | 686 | „ = 1,3 „ |
| <hr/> | | | |
| im Jahre 1902/03 | . . . | 561 | Mann = 1,1 ‰ K. |

Unter dieser Rapportnummer ist nur ein verhältnis- mäßig kleiner Teil der Herzklappenerkrankungen be- schrieben, da die Berichterstatter die meisten Fälle beim akuten Gelenkrheumatismus erwähnen. — Von den genauer bezeichneten Klappenfehlern sind 82 als Erkrankungen der zweizipfligen Klappe, 7 als Erkrankungen der Klappe der Körperschlagader, 2 als Erkrankungen der zweizipfligen Klappe und der Klappen der Körperschlagader (Berlin, St.-A. Keyl, Erfurt, O.-St.-A. Wegelj) bezeichnet. — 2 neu eingestellte Leute in Potsdam wurden wegen angeborener Verengerung der Lungenschlagader als dienstunbrauchbar entlassen (St.-A. Wiemuth).

Von den Erkrankungen der zweizipfligen Klappe werden 7 als Verengerungen (Berlin 2, Pots- dam 2, Königsberg i. Pr. 2, Freiburg i. Baden 1), die übrigen als ungenügender Verschluss oder als Ver- engerung und ungenügender Verschluss bezeichnet.

Als Ursachen der Erkrankung werden aufer Gelenk- rheumatismus 8mal Lungenentzündung (Königsberg i. Pr., Osnabrück, Darmstadt, Freiberg i. S., Düsseldorf, Leipzig, Metz, Hameln), 1mal rheumatischer Blutausschlag (Purpura rheumatica) (Magdeburg), 1mal rheumatische Quaddeln (Erythema nodosum) (Berlin), 1mal Typhus (Düssel- dorf), 4mal Tripper angegeben. Über letztere Erkrankungen s. bei Gruppe VII No. 112. Eine von ihnen verlief sehr bö- sartig und führte nach einem Monat zum Tode (St.-A. Knoch- Düsseldorf).

Auf Verletzungen wurden 2 Erkrankungen der zwei- zipfligen Klappe zurückgeführt (beide Male Fall auf die linke Brustseite, Höxter, St.-A. Schulz, und Berlin, St.-A. Neu- burger). In letzterem Falle sollte die Verletzung schon in der Kindheit stattgefunden haben, und seitdem sollten auch die Be- schwerden bestehen.

Mehrfach konnten keine Ursachen für die Entstehung des Herzfehlers gefunden werden, so besonders bei einem Manne, der nach nur 2 Tage während Erkrankung unter den Er- scheinungen eines Herzklappenfehlers starb (St.-A. Schumann, Glewitz). Leichenöffnung wurde nicht gestattet. — Bei einem Manne in Spandau traten die Anzeichen des Herzfehlers kurz nach einer Erkältung auf Posten auf. Er starb nach 15 Tagen an Herzbeutel- und Lungenentzündung.

Bei einem Nachtwächter im Invalidenhaus Berlin ent- wickelten sich Herzstörungen infolge eines älteren Klappen- fehlers während einer Erkrankung an Schanker und Bubo.

Von den Fehlern an den Klappen der großen Körperschlagader wurden 3 (Rastatt) auf Anstrengungen

1) Dreijähriger Durchschnitt 1888/89 bis 1890/91.

bei Märschen, 1 (Berlin) auf in der Kindheit überstandenen, rheumatischen Blutausschlag (Purpura) zurückgeführt. Ein Fremdenlegionär, der wegen halbseitiger Körperlähmung in Gießen und Darmstadt in Behandlung kam, hatte infolge seines angeblich nach Ruhr und Typhus entstandenen Aortenfehlers schon mehrmals Schlaganfälle gehabt. (1 Aortenfehler bei Tripper ist in Gruppe VII No. 112 erwähnt.)

d) *Nervöse Störung der Herztätigkeit.* (No. 67 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 39 | 676 | 1,3 | 209 | — | 491 | 700 | 15 | 26,6 |

Außerdem erkrankten noch 6 Kadetten und 9 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Klinisch Bemerkenswertes bieten die vorliegenden Beobachtungen nicht. Es sei nur hervorgehoben, daß weder Herzvergrößerung, noch verlangsamte Schlagfolge (Bradykardie) in den Berichten erwähnt sind.

Von 85 mit nervösen Störungen der Herztätigkeit in Zugang gekommenen Kranken, über die näher berichtet ist, konnten nur 9 (6 in Berlin, 3 in Konstanz) dem Dienst erhalten werden.

Die Störung der Herztätigkeit hatte sich bei der Mehrzahl der Betroffenen allmählich und meistens schon vor der Einstellung entwickelt. Bei einem Manne in Düsseldorf entstand das Leiden plötzlich durch Schreck; bei einem anderen trat die Störung der Herztätigkeit neben anderen nervösen Erschöpfungserscheinungen aus Gram über den Tod der Mutter auf (St.-A. Waldeyer-Cöln).

Wenn die nervösen Herzerscheinungen — was häufig der Fall war — mit anderen Zeichen allgemeiner Nervosität (Gefäßstörungen, Neurasthenie, Hysterie) vergesellschaftet waren, so war die Beurteilung meist einfach, während sie ohne diese erhebliche diagnostische Schwierigkeiten bot.

Zu den nervösen Herzerkrankungen sind gerechnet: 3 Fälle von Kropfherz (Weingarten, Ludwigsburg, Stuttgart), 1 nach chronischem Alkoholismus (Oldenburg), 4 nach Grippe (Metz, Cöln, Ulm, Oldenburg), 1 nach Lungenentzündung (Oldenburg), 1 nach Gelenkrheumatismus (Erfurt). Die Berichterstatter nahmen an, daß in diesen Fällen die Toxine mehr auf die nervösen als auf die muskulären Apparate des Herzens gewirkt hätten.

Auch über eine Erkrankung mit tödlichem Ausgange ist unter dieser Rapportnummer berichtet, da sie entsprechend den Anschauungen von Huchard als nervöser Herztod zu bezeichnen wäre:

Bei einem Einjährig-Freiwilligen in Darmstadt trat unerwartet in der Rekonvaleszenz nach Grippe Herzschwäche auf und führte durch Herzparalyse zum Tode. Eine organische Erkrankung war nicht nachgewiesen worden. Die Leichenöffnung wurde nicht zugelassen (O.-St.-A. Weber).

e) *Andere Herzkrankheiten.* (Nr. 68 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 5 | 125 | 0,24 | 28 | 5 ¹⁾ | 86 | 119 | 11 | 30,7 |

In Königsberg i. Pr. wurde bei 2 Leuten chronische Herzinsuffizienz als wahrscheinliche Folge von Herzmuskelentzündung unbekannter Entstehungsursache beobachtet (St.-A. Goronzek).

Von chronischer Insuffizienz des Herzens nach Lungenentzündung, die vor der Einstellung überstanden war, berichtet O.-St.-A. Kraufs-Ulm bei 2 Leuten, die bald nach der Einstellung wieder zur Entlassung kamen. Bei einem 3. Manne entwickelte sich die Herzinsuffizienz während der Dienstzeit nach Grippe. Der Berichterstatter bringt zum Ausdruck, daß die Insuffizienzerscheinungen wahrscheinlich bei allen dreien durch Herzmuskelerkrankung bedingt waren.

Eine Beobachtung von funktioneller Herzmuskel-schwäche mit anfangs schweren Erscheinungen, ohne Herzhdehnung, teilt St.-A. Voigtel mit:

Bei einem Grenadier in Berlin stellten sich die Anzeichen von Überanstrengung des Herzens nach einer sehr anstrengenden Schwimmübung ein, der ein Marsch in der Sonnenhitze vorausgegangen war. Der Puls war anfangs klein, unregelmäßig und beschleunigt (128 in 1 Minute), später war er verlangsamt; die Herzdämpfung war nicht verbreitert. Nach 13 Tagen dienstfähig.

Anfallsweise auftretendes Herzklopfen (paroxysmale Tachycardie) als einziges Krankheitszeichen am Gefäßsystem ist 3 mal beobachtet worden (Hagenau, Stuttgart, Darmstadt).

Bei einem Neueingestellten in Stuttgart war das Leiden 1 Jahr vor der Einstellung durch Heben schwerer Lasten entstanden. Bei einem Einjährig-Freiwilligen, dessen Mutter herzkrank war, waren die ersten Anfälle in den Entwicklungsjahren aufgetreten (Darmstadt). Die 3. Erkrankung war ebenfalls vor der Einstellung entstanden. Erweiterung des Herzens während der Anfälle wurde nicht beobachtet.

Über Herzsypphilis liegen 2 Berichte vor:

Ein Musketier in Görlitz, der schon bei seiner ersten Syphiliserkrankung vor der Dienstzeit Herzbeschwerden gehabt hatte, mußte, als trotz einer bald nach der Einstellung unternommenen Schmierkur im 1. Dienstjahr neue Beschwerden und eine mäßige Verbreiterung der Herzdämpfung auftraten, entlassen werden, da durch Jodkali nur eine teilweise Besserung erzielt wurde.

In dem anderen Falle nahm St.-A. Naether-Dresden eine syphilitische Herzerkrankung auf Grund des Leichenbefundes an. Eine genaue Vorgeschichte hatte nicht aufgenommen werden können, da der Verstorbene, ein 30jähriger Vizefeldwebel, während einer Bahnfahrt von einer Ohnmacht und vom Tode

¹⁾ Außerdem starben 7 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

überrascht war. Es war nur bekannt, daß der Verunglückte schon im letzten Manöver über Herzbeschwerden geklagt, trotzdem aber noch zur Erlangung einer Zivilstellung angestrengt gearbeitet hatte. — Bei der Leichenöffnung fanden sich Stauungsleber, -Niere und -Milz, Herzmuskelentzündung und Arteriosklerose der Aorta und der Kranzgefäße. Durch die trichterförmig eingezogene rechte Kranzgefäßöffnung konnte nur eine feine Sonde dringen. Die Öffnung des linken Kranzgefäßes wurde ebenfalls durch eine derbe Schwiele fast verlegt. Die ganze Innenfläche der Aorta war höckerig, von zahlreichen Substanzverlusten aus war die Innenhaut weit unterminiert. An einigen Stellen hing sie fetzenartig in die Gefäßlichtung hinein.

Zweite Unterart: Pulsadergeschwulst.

(Nr. 69 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 1 | 3 | 0,01 | 1 | — | 3 | 4 | — | 76,0 |

Von 3 berichteten Erkrankungen war 1 durch Verletzung entstanden.

Diese durch Stofs an der Bettstelle entstandene Pulsadergeschwulst der linken Schläfenschlagader wurde durch Operation entfernt: Die Dienstfähigkeit blieb erhalten (St.-A. Leipprand-Ulm). — Spindelförmige Erweiterung beider Schlüsselbein-schlagadern wurde in Wiesbaden bei einem Manne mit doppelseitiger Halsrippe festgestellt. Der Mann wurde als dienstunbrauchbar entlassen (St.-A. Baumgarten).

In Magdeburg war 1 Musketier ohne vorhergegangene Krankheit (besonders lagen keine Anzeichen von Syphilis vor) zuerst an starker Schwellung des linken Unterschenkels, später an trockenem Brand des Fusses erkrankt. Als Ursache fand sich eine apfelgroße Pulsadergeschwulst in der Kniekehle, für deren Entstehung keine Ursache gefunden werden konnte. Über die Ausschälung der Geschwulst durch St.-A. Kern und die Absetzung des Fusses nach Pirogoff-Güntherscher Methode s. Operationsliste unter C. 5.

Dritte Unterart: Hämorrhoiden und Krampfadern.

(Nr. 70 und 71 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 22 | 839 | 1,6 | 716 | — | 128 | 844 | 17 | 12,4 |

Außerdem erkrankte bei No. 71 noch 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die größeren Hämorrhoidalknoten sind meist chirurgisch behandelt worden. Bei allen Operierten blieb die Dienstfähigkeit erhalten. Die chirurgische Entfernung erfolgte 8 mal mit dem Glüheisen.

18 mal wurden die Knoten blutig (nach der Methode von Whitehead) ausgeschnitten.

Durch Einspritzung von konzentrierter Karbol-Glyzerin-Lösung wurde von O.-St.-A. Roth-Spandau bei mehreren

Kranken, von St.-A. Voigt-Saargemünd bei einem, von St.-A. Lorenz-Metz-Stadt bei 2 Kranken rasche Schrumpfung der Knoten herbeigeführt. Der letzte Berichterstatter empfiehlt die Methode für kleinere Knoten wegen der kurzen Behandlungsdauer.

Bei Bildung größerer Krampfaderen wurde 1 mal durch Unterbindung der Rosenblutader, 5 mal durch Ausschneiden von Stücken der Rosenblutader Heilung erzielt. Alle Operierten blieben dem Militärdienst erhalten.

Vierte Unterart: Venenentzündung.

(Nr. 72 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 4 | 43 | 0,08 | 34 | — | 11 | 45 | 2 | 36,3 |

Außerdem erkrankte noch 1 Kadett. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Verstopfung von Blutadern wurde ausschließlich an den unteren Gliedmaßen beobachtet.

Bei einem an Lungenentzündung erkrankten Manne in Stettin kam es dabei zu einem tiefem Abszefs in der rechten Wade, der nach Einschnitt mit Erhaltung der Dienstfähigkeit heilte (St.-A. Vollrath).

In Naumburg a. S. war die Verstopfung der rechten Rosenblutader nach Blutvergiftung von einem oberflächlichen Rifs mit einem Haken entstanden. Der Mann wurde dienstunbrauchbar.

In Insterburg wurde Marschanstrengung als Ursache einer Verstopfung der rechten Oberschenkelhauptblutader angenommen, und der Mann als Invalide entlassen.

Fünfte Unterart: Krankheiten des Lymphgefäßsystems.

(Nr. 73 bis 75 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 100 | 4172 | 7,9 | 4049 | 2 | 127 | 4178 | 94 | 18,2 |

Außerdem erkrankten noch 21 Kadetten und 28 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die Erkrankungen bestanden meist in Lymphgefäß- und Lymphdrüsen-Entzündungen und -Vereiterungen, welche von entzündeten Wunden ausgegangen waren.

1 mal ging die Entzündung der Achselrösen von den Impfpusteln aus (Diedenhofen). — In Glatz trat infolge einer Leistendrüseneiterung eine Blutung aus der Oberschenkel-schlagader ein, die unterbunden werden mußte (s. Operationsliste unter B. 6).

Über die Behandlung ist dasselbe wie in früheren Jahren zu sagen, in Berlin bewährten sich die Spiritus-verbände.

Sechste Unterart: Kropf.

(Nr. 76 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 5 | 65 | 0,12 | 39 | — | 24 | 63 | 7 | 30,5 |

Einige Male wurde durch teilweise Entfernung der Schilddrüse, bzw. durch Ausschälung größerer Cysten aus der Schilddrüse die Dienstfähigkeit wiederhergestellt. (Siehe Operationsliste.)

Bei einem Musiker in Mülhausen i. E. mit Erscheinungen von Basedowscher Krankheit stellten sich die Herzbeschwerden trotz der Operation nach Wiederaufnahme des Instrumentenblasens wieder ein. Er mußte entlassen werden (St.-A. Würth von Würthenau).

3 Berichterstatter sahen von der Behandlung Kropfkranker mit Thyreoidin günstigen Erfolg (O.-St.-A. Prätorius-Prenz-
lau, St.-A. Leipprand-Ulm, O.-St.-A. Schliephake-Ludwigs-
lust).

Siebente Unterart: Leukämie und perniziöse Anämie.

(Nr. 77 und 78 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 2 | 10 | 0,02 | — | 5 | 6 | 11 | 1 | 59,9 |

Von akuter lymphatischer Leukämie ist eine Beobachtung aus Paderborn berichtet:

Ein Husar hatte nach einer Mandelentzündung ständige Kopfschmerzen. Allmählich trat wassersüchtige Anschwellung der Beine und des Gesichts auf. Bei der Lazarettaufnahme wurde Vergrößerung der Leber und Milz festgestellt. Dann entstanden ausgedehnte Lymphdrüsenanschwellungen, Flüssigkeitsansammlungen in den großen Körperhöhlen, Blutungen aus den Harnwegen, aus der Nase, Hautblutungen. Gegen das Ende der Krankheit trat Einwärtsschielen, Doppelsehen, Lähmungen der unteren Gliedmaßen, unwillkürliche Urin- und Stuhlentleerung auf. Das Verhältnis der Zahl der weissen Zellen zu den roten war 1 : 20. Die Vermehrung betraf ausschließlich die Lymphozyten. Der Kranke starb, die Leichenöffnung wurde nicht gestattet (O.-St.-A. Ebeling).

An chronisch verlaufender myelögener Leukämie starb ein Kranker in Naumburg a. S. Ein zweiter in Mörchingen wurde als Invalide entlassen.

Der Kranke in Naumburg a. S. war ein Vizefeldwebel, der ohne nachweisbare Ursache ganz allmählich eine Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit, Appetitlosigkeit und Brechreiz verspürte. Im Magensaft fehlte nach dem Probefrühstück die freie Salzsäure. Bei der Lazarettaufnahme wurde eine erhebliche Milzgeschwulst festgestellt, die später noch wuchs. Verminderung der roten und Vermehrung der weissen Blutkörperchen, Netzhautblutung, anhaltendes Erbrechen vervollständigten später das Krankheitsbild. Arsen wurde erfolglos gereicht. Die Leichen-

öffnung beschränkte sich auf die Bauchhöhle. Die vergrößerte Milz war mit der Umgebung verwachsen, 25 cm lang, 16 cm breit, 8 cm dick. Trübe Leberschwellung. — Im Milzabstrich fanden sich Charcotsche Kristalle, 5 mal mehr weisse als rote Blutzellen, Zahlreiche Myelozyten Ehrlichs und einzelne einkernige eosinophile Zellen (St.-A. Hinze).

Über Erkrankung an schwerer Blutarmut wird je 1 mal aus Halberstadt und aus Metz berichtet.

Die Krankheitsursache war beidemale nicht zu ermitteln. Bei dem Kranken in Metz bestanden erhebliche Magen- und Darmstörungen. Bei der Leichenöffnung fand sich fettige Entartung der Nieren, des Herzens und Atrophie der Magen- und Darmschleimhaut.

Achte Unterart: Andere Krankheiten der Gruppe IV.

(Nr. 79 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 1 | 10 | 0,02 | 3 | — | 6 | 9 | 2 | 36,5 |

Außerdem erkrankte noch 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Eine Gelenkerkrankung bei einem Bluter ist aus Konstanz berichtet.

Der erkrankte Musketier stammte aus gesunder Familie, in der nachweislich niemals ein Bluter gewesen war. Schon als Kind hatte er bei geringen Verletzungen oft stundenlang geblutet, nach dem 10. Lebensjahre trat öfters schwer zu stillendes Nasenbluten auf. Bei einer nächtlichen Alarmierung war er auf gefrorener StraÙe auf das linke Knie gefallen, wodurch ein Bluterguß im linken Kniegelenk und Hautblutungen in dessen Umgebung entstanden waren. Trotz Ruhigstellung trat eine Krümmung des Knies ein. Bei jedem Versuch, passive Bewegungen zu machen, entstanden Blutungen in der linken Wade. Ohne erkennbare Ursache traten während der späteren, Monate dauernden Lazarettbehandlung skorbutische Erscheinungen an Zahnfleisch und der Zunge, sowie eine Blutung am rechten Unterschenkel auf. Später verlor sich die Neigung zu Blutungen, doch mußte der Mann als Invalide entlassen werden, weil die Streckung des Gelenks durch knöchernen Widerstand verhindert wurde¹⁾ (O.-St.-A. Jäckel).

Unter dem Bilde der Pseudoleukämie begann eine Erkrankung in Wesel, die später als akute lymphatische Leukämie tödlich endete.

Ein Musketier war unter leichter, anhaltender Temperatursteigerung mit Drüsenanschwellung in der linken Leistengegend erkrankt. Einige Wochen später schollen die Drüsen am Halse, die Milz wurde fühlbar, und es stellte sich auffallende Blässe ein. Die weissen Blutkörperchen waren vermehrt. Bald darauf schollen unter Fieberanstieg auch die Drüsen in der rechten Leistengegend und in der Achselhöhle. Eine Zählung der Blutkörperchen ergab 550 000 rote, 26 600 weisse Zellen. Die Vermehrung der weissen Zellen betraf ausschließlich die Lymphozyten. Der Kranke starb nach 5 Monaten in seiner Heimat (O.-St.-A. Mersmann).

¹⁾ Veröffentlicht: St.-A. Wiedemann, Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1904, Heft 1.

V. Gruppe: Krankheiten der Ernährungsorgane.

(No. 80 bis 101 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | | | |
| 366 | 47 078 | 89,4 | 45 438 | 95,8 | 75 1) | 0,16 | 1414 | 3,0 | 46 927 | 98,9 | 517 | 363 675 | 7,7 |

Ferner erkrankten noch 10 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 10 Invaliden, 714 Kadetten und 458 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die Erkrankungsziffer dieser Gruppe ist gegen das vorige Berichtsjahr um 0,5 ‰ K. gestiegen.

Zugang bei den einzelnen Unterarten der Gruppe V während der Jahre 1881/82 bis 1902/03
(auf 1000 Mann der Iststärke berechnet).

| Jahr | Mandel- entzündung (No. 82) | Krankheiten der Zähne, der Zunge, des Rachens, der Speichel- drüsen und der Speiseröhre (No. 80, 81, 83 bis 85) | Akuter Magen- und Darmkatarrh, Brechdurch- fall (No. 86, 89 und 91) 2) | Chronischer Magenkatarrh, Magenkrampf, Blutung bezw. Geschwür (No. 87 und 88) 3) [früher No. 82 bis 84] | Chronischer Darmkatarrh und habituelle Verstopfung (No. 90) 4) [früher No. 86 und 87] | Darm-, Blind- darment- zündung (No. 95) | Bauchfell- entzündung und Ausgänge (No. 96) | Katarrha- lische Gelbsucht (No. 97) | Die übrigen Nummern der Gruppe V | Summe | |
|---------------|-----------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|-------|-------|
| 1881/86 . . . | 50,9 | 17,7 | 66,2 | 1,9 | 1,0 | 0,82 | Die Zahlen sind in denen der übrigen Nummern der Gruppe V enthalten | 2,4 | 3,9 | 144,8 | |
| 1886/91 . . . | 55,5 | 18,7 | 58,1 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | | 1,6 | 4,1 | 142,0 | |
| 1891/96 . . . | 61,4 | 16,8 | 57,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | | 1,3 | 4,3 | 144,9 | |
| 1896/1901 . | 48,0 | 11,6 | 41,1 | 0,93 | 0,15 | 1,6 | | 0,18 | 1,1 | 3,2 | 107,9 |
| 1901/02 . . . | 42,7 | 9,6 | 29,5 | 0,66 | 0,19 | 1,8 | | 0,16 | 0,88 | 3,5 | 88,9 |
| 1902/03 . . . | 43,9 | 8,9 | 29,5 | 0,61 | 0,16 | 1,9 | 0,11 | 0,87 | 3,4 | 89,4 | |

Zugang nach Monaten.

| | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. Zahl | 2410 | 4145 | 4550 | 5761 | 5212 | 4772 | 3459 | 1583 | 2918 | 4147 | 3897 | 2379 |
| ‰ K. | 5,6 | 7,6 | 8,5 | 10,8 | 9,7 | 8,9 | 6,4 | 2,9 | 5,4 | 7,5 | 7,2 | 4,9 |

Die beiden nächsten Übersichten geben ein Bild von der Verteilung der Krankheiten dieser Gruppe auf die verschiedenen Armeekorps, und zwar einschließlic bzw. ausschließlic der Mandelentzündung.

Einschließlic Mandelentzündung.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 4696 | 113,6 | XII. (1.K.S.) | 1567 | 78,5 |
| I. | 2512 | 79,4 | XIII. (K. W.) | 2900 | 131,1 |
| II. | 2234 | 86,5 | XIV. | 3017 | 94,8 |
| III. | 1614 | 68,6 | XV. | 2795 | 89,5 |
| IV. | 1649 | 73,7 | XVI. | 2760 | 101,1 |
| V. | 2140 | 83,5 | XVII. | 1909 | 64,5 |
| VI. | 1756 | 68,0 | XVIII. | 2841 | 108,1 |
| VII. | 2391 | 88,7 | XIX. (2.K.S.) | 1585 | 77,0 |
| VIII. | 3191 | 118,7 | | | |
| IX. | 1873 | 75,1 | I. K. B. . . . | 4259 | 183,1 |
| X. | 1690 | 77,1 | II. " " . . . | 3359 | 157,4 |
| XI. | 1958 | 94,3 | III. " " . . . | 3376 | 181,3 |

1) Außerdem starben 2 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

2) Brechdurchfall ist im Jahre 1896/97 hinzugetreten.

3) Für Magenkrampf ist seit dem Jahre 1896/97 eine Nummer im Rapportmuster nicht mehr enthalten.

4) Desgleichen für habituelle Verstopfung.

Ausschließlich Mandelentzündung.

| Armeekorps | Zugang | | | Armeekorps | Zugang | | |
|-------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|-------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | ‰ M. | | absol. Zahlen | ‰ K. | ‰ M. |
| G. . . . | 2241 | 54,2 | 77,0 | XII. (I.K.S.) | 687 | 34,4 | 63,3 |
| I. . . . | 1261 | 39,8 | 57,5 | XIII. (K.W.) | 1472 | 66,5 | 86,4 |
| II. . . . | 1220 | 47,2 | 69,1 | XIV. . . . | 1532 | 48,1 | 80,3 |
| III. . . . | 807 | 34,3 | 65,1 | XV. . . . | 1440 | 46,1 | 75,5 |
| IV. . . . | 865 | 38,7 | 69,5 | XVI. . . . | 1534 | 56,2 | 81,4 |
| V. . . . | 1206 | 47,1 | 84,6 | XVII. . . . | 941 | 31,8 | 61,5 |
| VI. . . . | 1241 | 48,1 | 90,1 | XVIII. . . . | 1278 | 48,6 | 77,5 |
| VII. . . . | 1159 | 43,0 | 69,3 | XIX. (2.K.S.) | 916 | 44,5 | 76,9 |
| VIII. . . . | 1553 | 57,8 | 81,7 | | | | |
| IX. . . . | 789 | 31,6 | 59,9 | I. K. B. . . | 2162 | 93,0 | 97,5 |
| X. . . . | 792 | 36,1 | 64,7 | II. „ „ . . | 1800 | 84,4 | 98,0 |
| XI. . . . | 1042 | 50,2 | 69,0 | III. „ „ . . | 1620 | 87,0 | 103,1 |

Erste Unterart: Krankheiten der Zähne. Mund- und Rachenkrankheiten (ausschl. Mandelentzündung). Krankheiten der Speicheldrüsen und der Speiseröhre.

(No. 80, 81 und 83 bis 85 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 40 | 4710 | 8,9 | 4682 | 1 | 24 | 4707 | 43 | 6,0 |

Außerdem erkrankten noch 2 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 102 Kadetten und 24 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Krankheiten der Kiefer und Zähne. (No. 80 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 31 | 4178 | 7,9 | 4155 | — | 19 | 4174 | 35 | 5,5 |

Außerdem erkrankten noch 2 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 7 Kadetten und 21 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Unter den zahlreichen, von Zähnen ausgehenden Entzündungen wird 4mal über Oberkieferhöhlen-Eiterungen berichtet.

Ein Neueingestellter wurde sofort entlassen. Bei 2 Leuten wurde durch Aufmeißelungen Heilung erzielt (Berlin, Mülhausen i. E.); doch blieb nur der eine Mann im Dienst. Der Kranke in Berlin mußte wegen entstellender Narbe entlassen werden. — Bei einem Manne in Detmold waren Knochennekrosen und Tränensackeiterungen, vorübergehend auch eine hämorrhagische Nierenentzündung vorhanden.

In Breslau wurden bei 2 Kranken mit Abszessen am Unterkiefer Strahlenpilze nachgewiesen. Ihre Dienstfähigkeit konnte wiederhergestellt werden. Die Quelle der Infektion blieb unbekannt.

Gegen schwer stillbare Blutungen nach dem Zahnziehen empfiehlt St.-A. Brucke-Hameln Tamponade mit Mull, der in heiße Gelatinelösung getaucht ist.

Bei Zahnfleischentzündungen mit Geschwürbildung wurden Spülungen und Pinselungen mit 1 %iger Wasserstoffsuperoxydlösung von O.-St.-A. Langhoff und St.-A. Brucke-Hameln mit Erfolg verwendet.

In der am 1. Mai 1902 eingerichteten zahnärztlichen Station des Garnisonlazarets Leipzig für die Angehörigen der Garnison Leipzig und mehrerer anderer Garnisonorte sind im Berichtsjahre 495 Untersuchungen, 1340 Zahnziehungen, 870 Füllungen, darunter 385 Wurzelfüllungen und 302 Zahneinlagen zur Anwendung von Medikamenten ausgeführt. Außerdem wurden 4 Stifzähne und 53 neue Gebisse hergestellt (O.-A. Sandkuhl).

Zungenentzündung. Andere Mund- und Rachenkrankheiten. (No. 81 und 83 des Rapportmusters.)

| | Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Summe | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | |
| Zungenentzündung (No. 81) | — | 37 | 0,07 | 37 | — | — | 37 | — | 8,6 |
| Andere Mund- und Rachenkrankheiten (No. 83) . | 7 | 322 | 0,61 | 322 | 1 | 3 | 326 | 3 | 8,5 |

Außerdem erkrankten noch 90 Kadetten und 3 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Eine von der Mittellinie nach dem linken Zungenbeinhorn zu verlaufende, 2 1/2 cm lange Fistel einer Kiemgangcyste entfernte St.-A. Würth v. Würthenau in Mülhausen i. E. mit gutem Erfolge bei einem Sanitätssoldaten.

Einem Füsilier in Berlin wurde eine 3,5 cm lange, polypartige, von der linken Mandel ausgehende Geschwulst mit der kalten Schlinge entfernt (St.-A. Bornikoe). — Ein Musketier in Königsberg i. Pr. mußte wegen eines gestielten Fibroms am linken Aryknorpel entlassen werden, da er eine Operation ablehnte.

Zwei Erkrankungen, die mit Flecken- und Bläschenbildung an der Mundschleimhaut wie an den Händen und Füßen einhergingen, wurden als Maul- und Klauenseuche-Ansteckungen angesehen. Eine Ansteckungsquelle wurde nicht nachgewiesen (St.-A. Lincke-Altenburg, St.-A. Gelzuhn-Graudenz).

Eine schwere Mundfäule, die mehrmals wiederkehrte, wurde in Straßburg i. E. erst nach Anwendung von Arsen-Einspritzungen unter die Haut geheilt.

Krankheiten der Speicheldrüsen. (No. 84 der Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 2 | 160 | 0,30 | 156 | — | 1 | 157 | 5 | 12,9 |

Außerdem erkrankten noch 5 Kadetten. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

In Berlin hatte ein Speichelstein, der später entfernt wurde, eine eiterige, sehr schmerzhaftige Entzündung der linken Unterzungendrüse bewirkt.

Krankheiten der Speiseröhre. (No. 85 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 13 | 0,02 | 12 | — | 1 | 13 | — | 15,8 |

3 Berichte über Fremdkörper liegen vor:

Heftige Erstickungserscheinungen beseitigte St.-A. Herrmann Hildesheim durch Herabstoßen eines etwa in der Mitte der Speiseröhre feststehenden großen Fleischstückes, O.-St.-A. Bücken-Münster durch Ausziehen eines mit Erbsuppe herabgeschluckten spitzen Knochenstückes mit dem Münzenfänger.

Ein herabgeschlucktes künstliches Gebiß mit 2 Zähnen wurde von St.-A. Lambert-Lübben nach Anlegung eines Speiseröhrenschnittes vom Munde aus entfernt. Der Mann wurde nach längerer Eiterung dienstfähig (s. Operationsliste unter A 5).

Verengung der Speiseröhre wurde bei 2 Kranken durch Bougieren geheilt.

1 Gefreiter in Spandau wollte im 3. Lebensjahre Natronlauge getrunken haben. Erst im 18. Lebensjahre sollten die ersten Beschwerden aufgetreten und damals gleichfalls durch Bougieren beseitigt sein (O.-St.-A. Roth). Der andere Kranke hatte 2 1/2 Monate vorher in selbstmörderischer Absicht Schwefelsäure getrunken (St.-A. Schmidt-Torgau).

Zweite Unterart: Mandelentzündung.

(No. 82 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 68 | 23102 | 43,9 | 23060 | 2 ¹⁾ | 16 | 23078 | 92 | 5,8 |

Außerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgardie-Kompagnie, 445 Kadetten und 330 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 2455 | 59,4 | XII. (I.K.S.) | 880 | 44,1 |
| I. | 1251 | 39,6 | XIII. (K. W.) | 1428 | 64,5 |
| II. | 1014 | 39,2 | XIV. | 1485 | 46,7 |
| III. | 807 | 34,3 | XV. | 1355 | 43,4 |
| IV. | 784 | 35,1 | XVI. | 1226 | 44,9 |
| V. | 934 | 36,5 | XVII. | 968 | 32,7 |
| VI. | 515 | 19,9 | XVIII. | 1563 | 59,5 |
| VII. | 1232 | 45,7 | XIX. (2.K.S.) | 669 | 32,5 |
| VIII. | 1638 | 61,0 | | | |
| IX. | 1084 | 43,4 | I. K. B. . . . | 2097 | 90,2 |
| X. | 898 | 41,0 | II. " " . . . | 1559 | 73,1 |
| XI. | 916 | 44,1 | III. " " . . . | 1756 | 94,3 |

¹⁾ Außerdem starb 1 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Sanitäts-Bericht über die Armee. 1902/03. I. Teil.

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| abs. Zahl | 921 | 2178 | 2792 | 3560 | 3347 | 2862 | 1799 | 1583 | 1178 | 1317 | 994 | 571 |
| ‰ K. | 2,1 | 4,0 | 5,2 | 6,6 | 6,3 | 5,3 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 1,2 |

Mehrere Berichtersteller erwähnen ein endemisches Auftreten von Mandelentzündungen in den Lazaretten (St.-A. Voigtel-Berlin, St.-A. Goronzek-Königsberg i. Pr.); andere teilen Fälle mit, welche die Ansteckung von Person zu Person beweisen sollen (O.-St.-A. Gehrlich-Osnabrück, St.-A. Wiedemann-Konstanz).

St.-A. Voigtel-Berlin wendet sich gegen den Mißbrauch, daß Erkrankungen, die klinisch das vollkommene Bild der Diphtheritis bieten, den Mandelentzündungen gezählt werden, nur, weil sich aus irgend einem Grunde der bakteriologische Nachweis der Diphtheriebazillen nicht erbringen ließe. Selbst Erkrankungen, deren klinischer Befund zur Anwendung von Diphtherie-Heilserum Veranlassung gegeben haben, wurden später als Mandelentzündungen geführt, weil der bakteriologische Nachweis der Diphtherie ausblieb. Auf diese Weise könnten leicht kleinere Epidemien verkannt werden. Geradezu bedenklich sei es, wenn wegen des fehlenden bakteriologischen Nachweises bei klinisch klaren Diphtheriefällen das bei dieser Krankheit angezeigte therapeutische Handeln verzögert werde. — G.-A. Stricker hält es für dringend nötig, daß bei klinisch für Diphtherie verdächtigen Fällen mit den Serumeinspritzungen nicht bis zur Erbringung des bakteriologischen Nachweises gewartet werde, da dieser Nachweis zuweilen selbst bei echter Diphtherie nicht gelingt.

Bakteriologisch wurden bei der Mandelentzündung am häufigsten Streptokokken, der Staphylococcus pyogenes aureus sowie zahlreiche andere Stäbchen und Kokken gefunden. St.-A. Keyl-Berlin fand 1mal den Fränkelschen Diplokokkus fast in Reinkultur.

Seitdem der Urin bei den einfachen Mandelentzündungen häufiger auf Eiweißgehalt untersucht wird, zeigt sich, daß sich verhältnismäßig oft selbst bei leichten Erkrankungen, Eiweiß nachweisen läßt.

So hat O.-St.-A. Nötel-St. Avold in sämtlichen von ihm beobachteten 21 Fällen Eiweiß im Urin gefunden, St.-A. Herter-Stuttgart unter 30 Fällen 8mal, St.-A. Voigtel-Berlin unter 34 Fällen 3mal.

O.-St.-A. Mankiewitz-Danzig hält es für wünschenswert, daß diese Untersuchung bei jedem an Mandelentzündung Erkrankten auch im Revier vorgenommen, und daß die dazu nötigen Gläser und Reagentien auf den Revierstuben bereit gehalten werden.

Als Nachkrankheiten werden erwähnt: Drüsenschwellungen und Abszesse am Halse, Gelenkrheumatismus, Nierenentzündung, Tubenkatarrh, Ohrspeicheldrüsenentzündung, eiteriger Mittelohrkatarrh, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh, Brustfell-

entzündung, Gelbsucht, Pyämie, masernartiger Ausschlag. Auch Lungenblutung (O.-St.-A. Kraufs-Ulm), Ekzem an Hals und Brust (O.-St.-A. Weber-Darmstadt), Infraorbital-Neuralgie und Tränensackeiterung (St.-A. Neuburger-Berlin) werden aufgeführt. Im Beginn der Mandelentzündung hatte ein Kranker des letztgenannten Beobachters bei einer Fiebertemperatur von 40,3° eine mehrere Stunden anhaltende Bewusstlosigkeit. Nach Angabe seines Hausarztes hatten fieberhafte Erkrankungen bei ihm stets mit bedrohlichen Gehirnerscheinungen eingesetzt.

Von 4 Todesfällen wird berichtet:

In Potsdam starb ein Kranker mit jauchiger Entzündung der Mund-, Rachen- und Nasenschleimhaut an Sepsis und Herzschwäche. Ein zweiter, der im Lazarett als Rekonvaleszent nacheiner Brustfellentzündung von Mandelentzündung befallen war, starb plötzlich beim Aufrichten im Bette. Bei der Leichenöffnung wurde ein großes Blutgerinnsel gefunden, das an der Teilungsstelle der Lungenschlagader festsaß und beide Äste verschloß.

In Cassel starb ein Mann an Ödem des Kehledeckels, das nach einem Mandelabszess aufgetreten war. — In Neu-Ruppin setzte eine nach 5 Monaten tödlich endende Krankheit mit Mandelentzündung ein, die im Sinne von Jürgensen als kryptogenetische Sepsis aufgefaßt wurde. Es waren nacheinander schubweise Nierenentzündung, Schwerhörigkeit, Durchfälle, Brustfellentzündung, Lungenkatarrh aufgetreten.

Für die Behandlung, die im allgemeinen in der alten Weise ausgeübt wurde, empfiehlt St.-A. Brucke-Hameln als besonders wirksam Jodtinktur-Glyzerin-Pinselungen 1:10 und Jodtinktur-Zusatz zu Salzwassergurgelungen. St.-A. Goronzek-Königsberg i. Pr. rühmt Pinselungen mit 1%iger Höllensteinlösung.

Außerdem erkrankten noch 6 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 5 Invaliden, 118 Kadetten und 98 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Krankenzugang an akutem Magenkatarrh und akutem Darmkatarrh nach Monaten.

| | a. absolute Zahl | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|
| | | b. ‰ K. | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August |
| Akuter Magenkatarrh | a. | 484 | 688 | 585 | 801 | 624 | 673 | 553 | 672 | 641 | 1082 | 1045 | 722 |
| | b. | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,9 | 1,5 |
| Akuter Darmkatarrh | a. | 327 | 434 | 492 | 542 | 448 | 464 | 443 | 495 | 423 | 1042 | 1140 | 603 |
| | b. | 0,76 | 0,80 | 0,92 | 1,0 | 0,84 | 0,87 | 0,82 | 0,90 | 0,79 | 1,9 | 2,1 | 1,2 |

Die örtliche Verteilung der akuten Magen- und Darmkatarrhe in den einzelnen Armeekorps zeigt ziemlich erhebliche Unterschiede:

| Zugang an akutem Magenkatarrh nach Armeekorps, ‰ K. | | | | Zugang an akutem Darmkatarrh nach Armeekorps, ‰ K. | | | |
|---|------|-------------------|------|--|------|-------------------|------|
| G. | 20,7 | X. | 14,0 | G. | 13,8 | X. | 8,9 |
| I. | 11,5 | XI. | 17,4 | I. | 15,0 | XI. | 13,4 |
| II. | 18,7 | XII. (1. K. S.) . | 8,0 | II. | 12,5 | XII. (1. K. S.) . | 13,9 |
| III. | 16,5 | XIII. (K. W.) . | 15,1 | III. | 7,0 | XIII. (K. W.) . | 23,9 |
| IV. | 13,5 | XIV. | 17,0 | IV. | 11,8 | XIV. | 12,7 |
| V. | 16,9 | XV. | 15,0 | V. | 12,8 | XV. | 14,4 |
| VI. | 19,9 | XVI. | 23,8 | VI. | 13,0 | XVI. | 16,0 |
| VII. | 19,2 | XVII. | 13,0 | VII. | 8,4 | XVII. | 9,4 |
| VIII. | 19,2 | XVIII. | 17,7 | VIII. | 19,5 | XVIII. | 12,7 |
| IX. | 11,7 | XIX. (2. K. S.) . | 11,6 | IX. | 6,4 | XIX. (2. K. S.) . | 15,3 |

Dritte Unterart: Magen- und Darmkatarrh, Brechdurchfall, Magenblutung bzw. Magengeschwür.

(No. 86 bis 91 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 145 | 15 912 | 30,2 | 15 537 | 5 | 269 | 15 811 | 246 | 7,8 |

Außerdem erkrankten noch 6 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 7 Invaliden, 119 Kadetten und 99 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Akuter Magenkatarrh. Akuter Darmkatarrh. Brechdurchfall. (No. 86, 89 und 91 des Rapportmusters.)

| | Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich | |
|------------------------------|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--|-------|
| | | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| Akuter Magenkatarrh (No. 86) | 69 | 8570 | 16,3 | 8195 | — | 35 | 8530 | 109 | 7,0 |
| Akuter Darmkatarrh (No. 89) | 46 | 6853 | 13,0 | 6768 | — | 25 | 6793 | 106 | 6,8 |
| Brechdurchfall (No. 91) | — | 85 | 0,16 | 83 | 2 | — | 85 | — | 8,7 |

Außerdem erkrankten noch 6 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 5 Invaliden, 118 Kadetten und 98 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Dafs im Anschluß an akute Magenkatarrhe nervöse Störungen der Herztätigkeit auftreten, ist öfter beobachtet worden:

O.-St.-A. Balsmann-Metz-Montigny erwähnt, dafs ein Kranker wegen Störungen der Herztätigkeit, die nach Magenkatarrh aufgetreten waren, als dienstunbrauchbar entlassen werden mußte.

In Stuttgart wurden 16 Kranke vom II. Bataillon Grenadier-Regiments Königin Olga (1. Königl. Württembergischen) Nr. 119, die nach späteren Feststellungen als die leichteren Erkrankungen von einer im Juli 1903 bei diesem Bataillon herrschenden Typhus-Epidemie anzusehen waren, als Darmkatarrh geführt, weil bis zur Zeit ihrer Entlassung der bakteriologische Nachweis noch nicht erbracht war.

Ähnlich wurde wegen des fehlenden bakteriologischen Nachweises der Typhusbazillen ein Musketier in Berlin, der als Bursche seinem im hygienischen Institut mit Arbeiten über Typhus und Paratyphus beschäftigten Stabsarzt Handreichungen gemacht hatte, bei einer fieberhaften Erkrankung unter Darmkatarrh geführt, obgleich der Fieberverlauf durchaus dem Typhus entsprach. Die Körpertemperatur bewegte sich nach einem schnellen Anstieg vom 5.—12. Krankheitstage zwischen 40 und 39° und fiel dann bis zum 21. Krankheitstage in charakteristischer Weise ab. Außerdem bestand Milzschwellung, Roseola und dünnbreiiger Stuhl.

St.-A. Voigtel, der über die letztere, in seiner Abwesenheit von einem Vertreter behandelte Erkrankung berichtet, weist darauf hin, dafs es hier, wie bei der Diphtheritis (s. dort.), Bedenken habe, die Diagnosestellung unter Nichtberücksichtigung des klinischen Verlaufs, allein vom bakteriologischen Befunde abhängig zu machen, schon weil bis zur Erbringung desselben die Zeit für rechtzeitige hygienische Vorbeugungsmafsregeln versäumt werden könne.

Beim akuten Darmkatarrh wurden auch in diesem Jahre mit Tannalbin sehr gute Erfolge erzielt (O.-St.-A. Schmidt-Rastatt).

Chronischer Magenkatarrh. Chronischer Darmkatarrh. (No. 87 und 90 des Rapportmusters.)

| | Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-----------------|--|-------|
| | | absol. Zahl | % K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| Chronischer Magenkatarrh (No. 87) | 10 | 239 | 0,45 | 109 | 1 | 124 | 234 | 15 | 34,9 |
| Chronischer Darmkatarrh (No. 90) | 12 | 85 | 0,16 | 51 | 1 | 37 | 89 | 8 | 40,6 |

Außerdem erkrankten noch 2 Invaliden, 1 Kadett und 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Chronische Magen- bzw. Darmkatarrhe eigentümlicher Art wurden in Stuttgart, Berlin, Freiburg i. Baden, Schneidemühl, Osnabrück und Ulm bei Mannschaften gefunden, welche in Algier, China und Kamerun Malaria, Schwarzwasserfieber oder Ruhr durchgemacht hatten.

Der Ernährungszustand dieser Kranken war häufig ein guter. Der meist vermehrte unregelmäßige Stuhlgang wurde unter großer Unruhe des Darms mit Schmerzen entleert. Er zeigte vielfach oberflächliche Schleimauflagerungen, zuweilen Schleimhautfetzen und Blutspuren und enthielt manchmal unverdaute Speisereste. Öfter war der absteigende Dickdarm als ein starres, unter den Fingern rollendes Rohr durch die Bauchdecken fühlbar. Öfters bestanden allgemeine nervöse Beschwerden. Ruhranöben waren nicht nachweisbar.

St.-A. Hanel-Coblenz berichtet, dafs in dem breiigen, mit Schleim vermengten Stuhl eines Kranken, dessen chronischer Magen-Darmkatarrh jeder Behandlung trotzte, von O.-St.-A. Hünemann fast stets eigenartige Stäbchen in Reinkultur nachgewiesen werden konnten. Sie wuchsen auf Drigalski-Conradischem Nährboden blau aus, standen aber dem Bakterium coli näher als dem Gaffkyschen Typhusbazillus. Der Mann mußte als invalide entlassen werden.

Bei einem an Dickdarmkatarrh erkrankten Sergeanten in Thorn war der harte, knollige Stuhlgang zum Teil von ringförmigen, häutigen Fetzen bekleidet, die sich mikroskopisch als die obersten Schichten der Dickdarmschleimhaut erwiesen. Unter Behandlung mit Sitzbädern, täglichen Tanninklystieren und Karlsbader-Salz trat Besserung, nach einer Kur in Karlsbad völlige Herstellung ein (St.-A. Werner).

Bei chronischer Darmschwäche mit Verstopfung und Schleimabsonderung sah St.-A. Goronzek-Königsberg i. Pr. gute, wenn auch nicht immer anhaltende Erfolge von Sesamöleingießungen nach O.-St.-A. Schultes.¹⁾

2 chronische Darmkatarrhe nach Ruhr wurden von St.-A. Neuburger-Berlin nach längerer Behandlung mit 1/2 %igen Tanninklystieren, Bismuth. subnit. und Salep-schleim zur Heilung gebracht. St.-A. Voigtel-Berlin hat in ähnlichen Fällen emetinfreie Ipekakuanha-Wurzel in Pulverform, 1/2 g mehrmals täglich in Oblaten mit gutem Erfolge angewandt. (Vergl. S. 41.)

Magenblutung bzw. Magengeschwür. (No. 88 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Summe | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | % K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | |
| 8 | 80 | 0,15 | 31 | 1 | 48 | 80 | 8 | 59,0 |

Die Anfänge von 5 unter den 19 in den Stationsberichten erwähnten Erkrankungen ließen sich mit Sicherheit bis vor den Beginn der Dienstzeit verfolgen.

St.-A. Drenkhahn-Altona teilt mit, dafs bei einem Rheumatismuskranken, der niemals vorher Verdauungsbeschwerden gehabt hatte, nach dem Gebrauch von Salizylsäuretabletsen zuerst heftige Leibscherzen, später ein Magengeschwür aufgetreten sei. Das Briegersche Symptom (Schmerzen bei leichten Schlägen an einer bestimmten Stelle des Bauches) war bei diesem Kranken stets vorhanden. Der Mann wurde invalide.

Ein anderer Kranker hatte zum ersten Male im 16. Lebensjahre nach einem Fall mit dem Bauch gegen eine eiserne Schiene an Magengeschwür gelitten. Während der Dienstzeit (6 Jahre später) trat das Blutbrechen nach einem längeren Marsche wieder auf. Der Mann wurde invalide (St.-A. Winter-

¹⁾ Deutsche militärärztliche Zeitschrift, 1898, S. 208 ff.

Sondershausen). — Ein dritter hatte sich beim Aufschwung am Querbaum die Magengegend gestoßen. Bald danach trat häufiges Erbrechen und Blut im Stuhlgang auf. An der großen Krümmung des Magens fand sich eine sehr schmerzhaft Stelle. Invalide (St.-A. Merzdorf-Leipzig). — St.-A. Knaak-Straßburg i. E. führt an, daß der Vater eines wegen Magenblutung behandelten Kranken wiederholt an Blutbrechen gelitten hatte, daß der Großvater eines zweiten an Magenkrebs gestorben sei und daß ein dritter einen Großvater an Magengeschwür und einen Onkel an Magenkrebs verloren habe.

Soweit berichtet ist, wurden alle Kranken unmittelbar nach der Heilung oder sehr bald darauf als dienstunfähig entlassen, weil sie die Mannschaftskost nicht vertragen konnten (St.-A. Stolzmann-Osterode). Nur O.-St.-A. Seemann-Lahr erhielt 3 von 4 Kranken mit Magenblutungen dem Dienst. Seine Behandlung (entsprechende Diät, Wismut und Karlsbader Trinkkur) unterschied sich nicht von der allgemein üblichen.

Vierte Unterart: Unterleibsbrüche.

(No. 92 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 9 | 1028 | 2,0 | 226 | — | 805 | 1031 | 6 | 6,9 |

Außerdem erkrankten noch 3 Kadetten und 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

In der Mehrzahl handelte es sich um Leistenbrüche, 9mal sind Bauchbrüche erwähnt. 2 Brüche in der rechten Leistengegend waren durch direkte Durchtrennung der vor dem äußeren Leistenring gelegenen Bauchdecken entstanden (Hernia paringuinalis s. directa externa). Bei einem dieser Bruchkranken lag der Hode an richtiger Stelle, das andere Mal war er im Bauch verhalten gewesen und erst mit dem Darmbruch hervorgetreten.

Der erstere Bruch war bei einem 15¹/₂ Jahre alten schwächlichen Zögling der Unteroffizier-Vorschule Neubreisach entstanden. Dieser hatte am Abend vorher bei einer Musikübung auf dem Tenorhorn an derselben Stelle Schmerzen verspürt, wo der Bruch am nächsten Morgen ohne besondere Veranlassung plötzlich unter Schmerzen hervortrat. Der Hode lag im Hodensack, der Leistenkanal und der äußere (abdominale) Leistenring war frei durchgängig. Der Bruch war durch eine schlitzförmige, genau vor dem äußeren Leistenring gelegene Öffnung in den Bauchdecken getreten. Die ausgetretene Darmschlinge hatte eine 8 cm breite, fast bis an den vorderen oberen Darmbeinstachel reichende Vorwölbung oberhalb des Poupart'schen Bandes verursacht. Sie liefs sich bei Beckenhochlagerung ohne besondere Schwierigkeit zurückbringen (O.-A. Paulus). — Der andere Bruch war bei einem Grenadier in Danzig beim Heben schwerer Kisten entstanden. Bei ihm war der rechte Hode im Bauch zurückgehalten gewesen. Er fand sich im Bruchinhalt und wurde bei der in der Operationsliste unter B. 4 beschriebenen Operation mit den Darmschlingen in die Bauchhöhle zurückgebracht. Auch bei diesem Bruch reichte die Vorwölbung bis in die Höhe des äußeren vorderen Darmbeinstachels. Der Leistenkanal fehlte. (St.-A. Doebbelin.)

Die Radikaloperation bei eigentlichen Leistenbrüchen wurde einschließlic 9 Operationen bei eingeklemmten Brüchen 46mal (darunter 4mal doppelseitig) vorgenommen. 27 Operationen (darunter 1 doppelseitig) sind nach Bassini ausgeführt. 7mal wurde nach Kocher operiert, die übrigen Operationen sind nicht näher bezeichnet. Das Genauere über diese Operationen findet sich in der Operationsliste unter B. 4. Das Gesamtergebnis ist, daß 30 Operierte darunter 4 mit eingeklemmten Brüchen wieder dienstfähig wurden, während 12 Operierte (4 mit eingeklemmten Brüchen) geheilt, aber als invalide oder dienstunbrauchbar entlassen werden mußten. Todesfälle nach Bruchoperationen sind nicht berichtet, wie unter allen durch die Operationsliste nachgewiesenen Bruchoperationen in den letzten 3 Jahren nur 1 Mann nach Operation eines eingeklemmten Bruches verstorben ist.

Aus dem Bereiche des IV., V., VI., X., XIII. (K. W.) und XVI. Armeekorps liegen keine Berichte über Bruchoperationen vor, die meisten derartigen Operationen (je 10) sind im Bereich des VII. und des XIV. Korps gemacht.

Einmal fand sich im rechtsseitigen Bruchsack der Wurmfortsatz, der abgetragen wurde (Mülhausen i. E.)

Dreimal wurden gleichzeitig bestehende Wasserbrüche beiseitigt (Mülhausen i. E.). In allen Fällen trat Heilung ein. 8 Mann mußten wegen angeblicher Beschwerden durch die Narbenbildung später als invalide bezw. dienstunbrauchbar entlassen werden. Dazu kommen als invalide 4 Leute, die schon vorher als invalide anerkannt gewesen und auf ihren Antrag bei den Bezirkskommandos zur Operation aufgenommen worden waren. Einer von diesen klagte nach der gelungenen Bruchoperation über Schmerzen in einem schon vorher vorhandenen kleinen Krampfaderbruch.

In zwei Fällen ist das Auftreten von Rückfällen bekannt geworden, 1 mal nach der Kocherschen, 1 mal nach der Bassinischen Operation.

Von den wegen Bauchbruch Operierten wurden 3 dienstfähig, 3 mußten wegen angegebener Beschwerden, ein vierter wegen Lungentuberkulose aus dem aktiven Dienst entlassen werden.

Die Behandlung der operierten Brüche nahm bei den nicht eingeklemmten Brüchen durchschnittlich 41,5, bei den eingeklemmten 57 und bei den Bauchbrüchen durchschnittlich 50 Tage in Anspruch.

Ein nach Anlegen eines Bruchbandes aufgetretener Wasserbruch führte zur Dienstunbrauchbarkeit (St.-A. Berger-Frankfurt a. O.)

Fünfte Unterart: Eingeklemmter Bruch und innerer Darmverschluss.

(No. 93 und 94 des Rapportmusters.)

Eingeklemmter Bruch. (No. 93 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 1 | 23 | 0,64 | 12 | 1 | 10 | 23 | 1 | 29,1 |

Außerdem erkrankte noch 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die 9 operierten eingeklemmten Brüche waren sämtlich äußere schräge Leistenbrüche.

Alle Operierten wurden geheilt, 5 blieben dienstfähig, 2 wurden dienstunbrauchbar, 2 als invalide entlassen (s. Operationsliste unter B. 4).

Innerer Darmverschluss. (No. 94 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 1 | 17 | 0,03 | 5 | 8 | 3 | 16 | 2 | 27,4 |

Kotbrechen bzw. Ileus ist in den Berichten im ganzen 20 mal erwähnt.

6 von diesen Kranken (von denen 2 geheilt wurden) sind jedoch unter der folgenden Rapportnummer bei den Operationen wegen Blinddarmentzündung behandelt, da bei ihnen mit ziemlicher Sicherheit ein Zusammenhang mit dieser Krankheit nachgewiesen werden konnte. — Auch 2 unter dieser Rapportnummer aufgeführte Kranke zeigten Veränderungen am Wurmfortsatz, deren Zusammenhang mit der bei beiden vorgefundenen Achsendrehung am Dünndarm jedoch weniger klar zu Tage liegt. Diese waren: ein Musketier in Rastatt, dessen Wurmfortsatz bei der Operation hochgeschlagen und verwachsen gefunden wurde (St.-A. Weber) und ein Kanonier in Ulm, bei dem sich bei der Leichenöffnung eine in einen kleinen Kotballen eingeschlossene Borste im Wurmfortsatz fand. Die Achsendrehung, in welche fast das ganze Dünndarmgekröse einbezogen war, war bei diesem Manne dadurch verursacht, daß ein fast faustgroßer, zwischen den Gekrösblättern liegender Abszess die zugehörige Dünndarmschlinge tief ins kleine Becken herabgezogen hatte (St.-A. Leipprand). —

Von den 14 sonach unter dieser Rapportnummer zu behandelnden Kranken sind 9 operiert, von denen 2 geheilt wurden. Von 5 nicht Operierten sind 3 geheilt, da sich das Hindernis im Darm durch innere Mittel beseitigen liefs.

Die Art des Darmverschlusses bei den 9 Operierten, deren Krankengeschichten in der Operationsliste unter B. 2 näher angegeben sind, war folgende:

1 mal (Colmar, St.-A. Franke) Abschnürung des Darms durch alte Verwachsungen oberhalb der Bauhinschen Klappe. Heilung durch Anlegung eines künstlichen Afters, der später in der Universitätsklinik zu Freiburg i. Baden geschlossen wurde. Dienstfähig. — 3 mal Abschnürungen durch Meckelsche Divertikel (O.-St.-A. Roth-Spandau, O.-St.-A. Boeck-Gumbinnen, O.-St.-A. Gofsner-Brandenburg a. H.). Der Mann in Spandau wurde durch Ausschneidung einer 20 cm langen brandigen Dünndarmschlinge geheilt. Invalide. — 2 mal Achsendrehung des Dünndarms (Rastatt, Ulm, oben erwähnt), 1 mal Narbenstriktur im Dickdarm (O.-St.-A. Wendel-Stuttgart), 1 mal innere Einklemmung einer 30 cm langen Dünndarmschlinge in einer links vom Winslowschen Loch befindlichen Bauchfelltasche, die nach Ansicht des Berichterstatters, St.-A. Berger-Neisse, normal nicht vorkommt. — Die 6 zuletzt aufgeführten Kranken starben. Keiner von ihnen überlebte den nächsten Tag nach der Operation. Nach dem Bauchschnitt war 2 mal die Abtragung eines Meckelschen Divertikels vorgenommen (Gum-

binnen, Brandenburg a. H. Im letzteren Falle gleichzeitig die Ausschneidung einer brandigen Dünndarmschlinge). 1 mal wurden 12 cm Dickdarm entfernt (Stuttgart), 1 mal das eingeklemmte Darmstück befreit (Neisse) und 1 mal eine Achsendrehung gelöst (Rastatt). 1 mal wurde die Verbindung zweier gesunder Darmschlingen (Darmanastomose) hergestellt (Ulm). Der 9. Operierte in Karlsruhe starb erst etwa $\frac{1}{4}$ Jahr nach der Operation zur Beseitigung des Ileus, bei der ein künstlicher After am Blinddarm angelegt war. Das Kotbrechen war bei ihm nach dem Genus großer Mengen von Kommissbrot entstanden. Der Darmverschluss war jedoch wahrscheinlich durch ein 2 cm langes Knochenstück bedingt, das bei Eröffnung des Darms entleert wurde. Nachdem fast 3 Wochen später ein 2 l haltender Abszess in der linken Bauchseite entleert war, erholte sich der Kranke, doch starb er später bei dem Versuch, den künstlichen After zu schließen, an Bauchfellentzündung (St.-A. Hammer).

Eine Gelegenheitsursache für die Entstehung des Ileus haben nur 2 von diesen Kranken angegeben, derjenige in Spandau hatte sich, kurz bevor die Einschnürung durch das Meckelsche Divertikel entstand, durch Erkältung einen Darmkatarrh zugezogen, der in Ulm hatte schon früher an Verstopfung gelitten. In den Tagen vor seiner Erkrankung hatte er sich ebenfalls erkältet und hatte beim Geschützexercieren mehrere Male den Wall hinaufspringen müssen.

Von den 5 nicht operierten Kranken hatten ein Musketier in Hagenau und ein Sergeant in Metz die Vornahme einer Operation trotz schwerer Erscheinungen von Miserere abgelehnt:

Bei ersterem, der am Tage nach der Lazarettaufnahme starb, fand sich kein Hindernis im Darm. O.-St.-A. Crone glaubt, daß sich das Hindernis vielleicht beim Transport der Leiche gelöst habe. Der Dünndarm war durch starke Füllung ausgedehnt und blaurot verfärbt. — Bei dem Sergeanten in Metz war ein Teil des um seine Achse gedrehten S-förmigen Dickdarmabschnittes hinter einer strangförmigen Dünndarmverwachsung in der Gegend der Bauhinschen Klappe eingeschnürt. Die eingeschnürte Stelle lag 65 cm über der Afteröffnung; im Dünndarm wurde ein Bandwurm gefunden (St.-A. Aschenbach).

Von den 3 Erkrankungen, die ohne Operation zur Heilung kamen, konnte eine (Cöln) durch hohe Öl- und Wassereingießungen bald beseitigt werden. Bei den beiden anderen Kranken wurde der Erfolg anscheinend durch Atropineinspritzungen unter die Haut erreicht:

Bei einem Kranken in Mörchingen trat die Lösung erst nach 8tägiger Stuhlverhaltung ein, nachdem innerhalb von 2 Tagen 2 mal 0,003 g Atropin unter die Haut gespritzt und danach mehrere Opiumgaben (0,12) und hohe Eingießungen gegeben waren (St.-A. Melot de Beauregard). Bei diesem Kranken wurde keine Ursache für den Eintritt des Kotbrechens bekannt. — Der dritte Geheilte, ein Musketier in Goslar, hatte plötzlich bei einem mühelosen Stuhlgang eine Wasseransammlung im Samenstrang (hydrocele acuta) bekommen, ohne daß er je vorher an Darmbeschwerden gelitten hatte. In 4 Tagen steigerte sich das Krankheitsbild zu einem ausgeprägten Ileus mit Kotbrechen, sichtbarer Darmperistaltik und auffällig lauten, plätschernenden Darmgeräuschen. Ein chirurgischer Eingriff wurde abgelehnt, Opium und Morphinum versagten selbst bezüglich der Schmerzstillung, die nur durch Atropineinspritzungen von 0,001 g am Tage 2 bis 3 mal zeitweise erreicht wurde. Durch längere Zeit angewandte Magenausspülungen, Öl- und hohe Wassereingießungen wurde schließlich am 14. Krankheitstage Stuhl herbeigeführt. Der Mann wurde wieder dienstfähig. (O.-St.-A. Goerne.)

| Die Operation bestand in | Operiert wurden | | | | | Die Operation | | | | | | |
|---|-----------------|------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-----|-----|----|----|-------|-------------|
| | insgesamt | davon sind | | | gestorben | nach dem 1. Anfall in der Woche | | | | | | |
| | | insgesamt | geheilt | invalide u. dienstunbrauchbar | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.-8. | noch später |
| A. | | | | | | | | | | | | |
| I. Eröffnung eines außerhalb des Bauchfells gelegenen Abszesses | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| II. Eröffnung der Bauchhöhle und Entleerung eines (zwischen Darm- schlingen) abgekapselten Abszesses ¹⁾ | 39 | 37 | 11 | 26 | 2 | 5 | 17 | 9 | 1 | — | 4 | — |
| III. Eröffnung der Bauchhöhle und Entleerung abgekapselter Abszesse bei gleichzeitiger allgemeiner Bauchfellentzündung ²⁾ | 2 | 2 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| IV. Eröffnung der Bauchhöhle und Freilegung von Eiterungen bei allgemeiner Bauchfellentzündung nach Blinddarm-entzündung | 11 | — | — | — | 11 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — |
| Summe der Operationen ohne Entfernung des Wurmfortsatzes | 53 | 40 | 11 | 29 | 13 | 11 | 22 | 11 | 1 | — | 4 | — |
| B. | | | | | | | | | | | | |
| V. bei Entzündung oder Verlötung des Wurmfortsatzes ohne Eiterung nach ersten Anfällen | 16 | 16 | 8 | 8 | — | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | — |
| VI. bei Entzündung oder Verlötung des Wurmfortsatzes ohne Eiterung nach mehreren Anfällen oder bei chronischen Beschwerden | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| VII. bei Schleim- oder Eiteransammlung im Wurmfortsatz | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIII. bei abgekapselten Eiterungen in der Umgebung des Wurm- fortsatzes ¹⁾ | 18 | 15 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| IX. nach einige Zeit vorher ausgeführter Eröffnung abgekapselter Eiterungen (Zweizeitige- oder Nachoperationen) | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | (1) | (2) | (1) | — | — | — | (1) |
| X. bei allgemeiner eitriger Bauchfellentzündung nach Durch- löcherung des Wurmfortsatzes | 7 | 3 | — | 3 | 4 | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
| Summe der Operationen mit Entfernung des Wurmfortsatzes | 68 | 59 | 28 | 31 | 9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | — |
| Gesamtsumme aller Operationen | 121 | 99 | 39 | 60 | 22 | 26 | 30 | 15 | 4 | 4 | 5 | — |

(Die eingeklammerten römischen Zahlen beziehen sich auf die obigen Gruppen.)

¹⁾ Bei je 1 geheilten Kranken in Ostrowo (II) und Münster (VIII) war der Abszefs bei der Operation nicht gefunden, aber bald nach-
²⁾ In Görlitz (III) wurde der spontan abgetrennte Wurmfortsatz 4 Tage nach der Operation in der Wunde gefunden.

Operationen zur Entleerung zweiter Abszesse fanden in Bitsch (II) 8 Tage nach der Operation (zwischen Nabel und Scham-
Abszesse in Potsdam (II) (hinter der Blase durchgebrochen) und in Torgau (VIII) (im Netz) gefunden. Ein subphrenischer Abszefs wurde in
Kotbrechen bzw. Ileus trat 1. bei einem Kranken in Glogau (IV) vor der Operation auf. Der Dünndarm wurde vorgenaht. (Gestorben.)
3. 1 Operierter in Thorn (IX) starb an Darminvagination trotz Lösung derselben 7 Tage nach der Entfernung des Wurmfortsatzes. — 4. Bei einem
zwischen Bauchwand und Netz gestorben. — 5. 1 Operierter in Dresden (IX), der 2 Monate nach der Blinddarmoperation Ileus bekam, wurde nach
gedehnte Verwachsungen des Darms in der Blinddarmgegend und am Wurmfortsatz. Das Kotbrechen blieb bestehen. Gestorben.

An akutem Gelenkrheumatismus erkrankte 1 Mann in Worms (V) 3 Wochen nach der Blinddarmoperation. — 1 Mann in Münster (VIII),
wurde nach einem zweiten Bauchschnitt geheilt. — 1 Mann in Mainz (IX) erkrankte an Verstopfung der rechten Schenkelblutader, 1 Mann in

| wurde ausgeführt nach Rückfällen | | Es fanden sich | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| während oder kurz nach einem frischen Anfall | zur Zeit der Wahl im freien Intervall | Durchlöcherungen des Wurmfortsatzes | Kotsteine | Kotfisteln | Mitkrankheiten an der Lunge |
| bei den Kranken in | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | Berlin (2), Torgau, Ludwigs- lust, Hagenau (Kotsteine frei im Abszefs). | Stettin (Blinddarm), Mainz, Mutzig, Hildesheim, Mün- ster (diese 4 spontan bzw. durch Naht geheilt). Cassel (Dünndarmfistel, zwei Nach- operationen, geheilt). Dieuze (1 Kotfistel und Dünndarm- fistel, Darmausschneidung, ge- storben. Durchbruch des Murphiknopfes.) | Cassel, schwerer Bronchial- katarrh. |
| — | — | — | — | Görlitz (Blinddarm spontan geheilt). | Strafsburg i. E. (etwa 3 Wochen nach der Operation trockene Brustfellentzündung). |
| 1 | — | Rastatt, Stettin, Dieuze (Wurmfortsatz), Trier (Blind- darm). | Göttingen (2 Kotsteine frei in der Bauchhöhle nahe der Blind- darmgegend). Bromberg (im brandigen Wurmfortsatz. — Leichenbefund). | Saarburg (Kotfistel und zwei Eiterfisteln). | Saarburg (Lungenabszefs links, Lungenentzündung rechts). — Göttingen (rechtsseitige ei- trige Brustfellentzündung). |
| 4 | — | — | — | — | — |
| — | — | Cassel (an der Spitze bei gleich- zeitiger Striktur an der Basis). | Prenzlau (im Wurmfortsatz). Breslau (außerhalb des ver- kümmerten Wurmfortsatzes). | Prenzlau (durch plastische Operation geheilt). | Cassel (heftige Bronchitis). |
| 6 | 12 | — | Frankfurt a. O. (bei 3 Kranken im Wurmfortsatz). | — | Münster (Lungenentzündung 4 Tage nach der Operation, rechter Unterlappen). |
| 2 | 1 | — | — | — | Jena (rechtsseitige Lungenent- zündung drei Tage nach der Operation). |
| 3 | 2 | Torgau, Cassel, Metz. Stuttgart, Marburg, Münster, Torgau (Kotsteine im durchlöcherten Wurmfortsatz). — Magdeburg (bei 2 Kranken Kotsteine frei in einem Abszefs). — Berlin (Kotstein am Ende des Blinddarms durchgebrochen). | Preufs. Stargardt, Gnesen, im Wurmfortsatz. | Magdeburg (Kotfistel durch Darmanastomose geheilt). | Torgau (agonales Lungenödem). |
| — | 6 | Thorn (bei der 2. Operation gefunden). | Thorn (bei der ersten Operation Kotsteine mit Borsten einer Zahnbürste im Abszefs). — Mainz (bei der zweiten Oper- ation Kotsteine im geschwür- igen Wurmfortsatz). | Cassel (spontan geheilt). — Oppeln (durch mehrere Nach- operationen geheilt). | Oppeln (rechtsseitige eitriche Brustfellentzündung — ge- heilt). |
| 1 | — | Bei allen Operierten Durch- löcherungen oder brandige Stellen, außerdem bei 2 geheilten Kranken (Cassel, Frei- burg i. Baden) und bei denen in Jena, Cöln und Bückeberg Kotsteine im durchlöcherten Wurmfortsatz. Bei einem ge- heilten Kranken in Mül- hausen i. E. wurde ein Kot- stein 14 Tage nach der Opera- tion entleert. | — | — | — |
| 12 | 21 | — | — | — | — |
| 16 | 21 | — | — | — | — |

her in die Wunde durchgebrochen.

bein) und in Münster (II) 5 Wochen nach der Operation (hinter der Blase) statt. Beide Kranke wurden geheilt. — Bei Gestorbenen wurden zweite Bromberg (IV) eröffnet.

— 2. Bei dem durch Darmanastomose geheilten Kranken in Magdeburg (VIII) machten sich vor letzterer Operation Ileuserscheinungen bemerkbar. — Manne in Saarburg bzw. Strafsburg i. E. (IV) 4 1/2 Monat nach der Operation. Trotz Beseitigung einer abschnürenden strangförmigen Verwachsung, Beseitigung eines abschnürenden Bindegewebsstranges geheilt. — 6. 1 Mann in Berlin, der an Kotbrechen erkrankt war, zeigte bei der Operation aus-

der 14 Tage nach der Blinddarmentzündung eine Mandelentzündung und etwa 1 Woche später Erscheinungen von Bauchfellentzündung bekam, Bückeberg (X) an Blutvergiftung (beiderseitige Mittelohreiterungen und Eiterherde in den Ohrspeicheldrüsen).

Sechste Unterart: Darm-, Blinddarmenzündung.

(No. 95 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 61 | 1026 | 1,9 | 778 | 27 ¹⁾ | 203 | 1008 | 79 | 37,9 |

Außerdem erkrankten noch 33 Kadetten und 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Genauere Angaben liegen bei dieser Nummer nur über Blinddarm- bzw. Wurmfortsatzentzündungen vor.

Die Ursache dieses Leidens wurde seitens der Erkrankten vielfach auf Erkältungen, Anstrengungen beim Turnen, Marschieren, Blasen (Darmstadt) oder auf Genuß schwer verdaulicher Kost (Mülhausen i. E.) zurückgeführt. In je einem Falle sollte Quetschung der rechten Bauchseite durch Fall auf einen Falsrand (Stettin), Quetschung des Unterleibs beim Turnen am Querbaum (Mainz), Stofs gegen den Unterleib beim Kastensprung (Neubreisach bzw. Freiburg i. Baden), Hufschlag gegen den Unterleib (Halle a. S.) und Stofs mit dem Gewehrkolben (Oppeln) das Leiden hervorgerufen haben. Mehrfach gaben die rückfällig an Blinddarmenzündung erkrankten Leute an, daß sie den ersten Schmerz bei schwerem Heben, Springen, Seilziehen und Turnen verspürt hätten.

O.-St.-A. Brecht-Grofs-Lichterfelde glaubt, daß die Blinddarmenzündungen im dortigen Kadettenhause besonders häufig nach eigentümlichen, von Zeit zu Zeit dort epidemisch auftretenden fieberhaften Erkrankungen der Schleimhäute des Rachens und der obersten Luftwege auftreten, die zweifellos infektiöser Natur seien. Nach diesen Katarrhen habe er auch andere infektiöse Krankheiten wie Gelenkrheumatismus, Entzündungen der Hirnhaut, des Mittelohres, der Herzinnenhaut oder der Nieren besonders häufig beobachtet. Bakteriologische Untersuchungen haben bisher keinen Aufschluß gegeben; in einer Anzahl von Fällen waren Influenzastäbchen nachweisbar. — St.-A. Spiller-Jena führt 3 Blinddarmenzündungen auf Influenzainfektion zurück.²⁾

Mehrfach konnte wieder nachgewiesen werden, daß den Blinddarmenzündungen entzündliche Zustände oder Eiterungen vorangegangen waren: Mandelentzündung (Metz), Halsdrüenschwellung (Wahlstatt), Halsdrüsenvereiterung (Bromberg), Lungenentzündung (Münster), Furunkulose (Stettin), weicher Schanker (Lübeck), Zellgewebsentzündung (Metz-Stadt und Metz-Montigny).

St.-A. Melot de Beauregard-Mörchingen glaubt, daß die Ursache einer plötzlich mit starkem Schmerz in der Blinddarmgegend, Erbrechen, starker Aufgetriebenheit des Leibes einsetzenden Blinddarmerkrankung, ein 17 bis 20 cm langer Spulwurm war, nach dessen Abgang Besserung eintrat. — In je einem bei der Operation entfernten Wurmfortsatz fand St.-A. Neumann-Mainz mehrere Oxyuren und harten Kot, St.-A. v. Hippel-Cassel eine 2½ cm lange Schweineborste und 3 freie Härchen. — Bei einem Unteroffizier in Gießen, der vor-

her schon 2 mal erkrankt, 5 Stunden nach einem neuen mit Schüttelfrost, Fieber und Bewusstlosigkeit einsetzenden Anfall operiert wurde, fanden sich in dem entfernten Wurmfortsatz 2 Fischwirbel mit kurzen Gräten, kein Eiter. 6 Wochen später Gelenkrheumatismus. Invalide. (St.-A. Radünz.)

Über die Zahl der im Wurmfortsatz bzw. in der freien Bauchhöhle oder in Abszessen aufgefundenen Kotsteine, gibt die Tabelle auf S. 94 u. 95 Auskunft. In einem Kotsteine fanden sich Borsten von einer Zahnbürste (St.-A. Janz-Thorn). (Vergl. auch unter der vorigen Rapportnummer.)

In der Operationsliste sind 124 durch Blinddarm-entzündung verursachte Operationen aufgeführt, von denen 121 nach ihrer Art, ihrem Umfang, dem Zeitpunkt ihrer Ausführung und nach ihren Ergebnissen in der Tabelle (S. 94 u. 95) zusammengestellt sind. Aus dieser Tabelle sind auch die wichtigsten Operationsbefunde sowie die Mit- und Nachkrankheiten ersichtlich. Der Tabelle entsprechend sind die Operationen in der Operationsliste unter B. 3 geordnet.

Außerdem sind einzelne Operationen an Kadetten in Privatkliniken ausgeführt, ferner wurde 1 Mann in Hirschberg während des Manövers wegen Lazarettchlufs im dortigen Kreis-krankenhaus operiert. Invalide.

Über die 3 nicht in die Tabelle aufgenommenen Leute ist zu bemerken, daß 1 mal nur eine Infiltration in der Umgebung des Blinddarms gefunden wurde (Cöln). Der Mann wurde nach Überstehen einer rechtsseitigen Rippenfellentzündung und Verstopfung beider Oberschenkelblutadern invalide. — 1 mal wurde bei einer nach dem 2. Rückfall von einer Blinddarmenzündung entstandenen fibrinösen Bauchfellentzündung nur die Bauchhöhle drainiert (Metz — gestorben), 1 mal wurde bei einem Feldweibel in Berlin ein nach Blinddarmenzündung entstandener Abszefs unter dem Zwerchfell eröffnet.

Das Gesamtergebnis aller 124 wegen Blinddarm-entzündung unternommenen Operationen ist sonach, daß 101 Kranke = 81,5 % geheilt wurden (von denen 39 = 31,5 % der Gesamtzahl die Dienstfähigkeit wiedererlangten) und 23 = 18,5 % der Gesamtzahl starben.

Von den Kranken, bei welchen zur Zeit der Operation schon eine Bauchfellentzündung bestand, konnten 5 gerettet werden: 2 mit seröser Bauchfellentzündung bei abgekapselten Abszessen (Görlitz, Straßburg i. E.), 3 mit eiteriger Bauchfellentzündung nach Durchbruch des Wurmfortsatzes (Mülhausen i. E., Freiburg i. Baden, Cassel). (Nicht hierher gerechnet ist ein mehrfach rückfällig gewesener Kranker in Jena, bei dem sich seröse Flüssigkeit in der Bauchhöhle aber keine Eiterung am Blinddarm fand.)

Einige Operateure, besonders O.-St.-A. Taubner-Mainz, empfehlen den Wurmfortsatz bei gleichzeitig bestehenden Abszessen erst später nach Heilung der Abszesse zu entfernen. (Zweizeitige Operation.) In 5 Fällen, wo dies Verfahren planmäßig angewendet wurde, hatte es guten Erfolg. In einzelnen anderen Fällen, wo es beabsichtigt war, willigten die Kranken nicht in die zweite Operation, da sie sich durch die erste für geheilt hielten. —

Die Erkrankungen an Blinddarmenzündung, welche durch allgemeine Bauchfellentzündung erschwert

¹⁾ Außerdem starb 1 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

²⁾ Vergl. Schultes, Deutsche medizinische Wochenschrift 1903, No. 42.

waren, endeten sämtlich mit dem Tode. (2 in Königsberg i. Pr., St.-A. Goronzek; 1 in Colmar i. E., O.-St.-A. Schneider; 1 in Charlottenburg, St.-A. Krueger; 1 in Metz, St.-A. Aschenbach; 1 in Posen, O.-St.-A. Brix.)

Bei Bestimmung des Zeitpunktes der Operation wurde die Zählung der weissen Blutkörperchen meist als ein sehr brauchbares diagnostisches Hilfsmittel befunden, das allerdings nur in Verbindung mit den anderen bekannten Merkmalen von Wert ist.

Mehrere Berichterstatter sagen, daß sich in einzelnen Fällen, trotz Vorhandensein von Eiter, kein Ansteigen der Zahl der weissen Blutkörperchen nachweisen liefs (St.-A. Grüder-Berlin. O.-St.-A. Bücken-Münster). In diesen Fällen fanden sich fest abgekapselte Eiterungen. Andererseits konnte Eiter in Fällen nachgewiesen werden, wo weniger als 25 000 weisse Blutkörperchen gezählt waren. — Fehlen des Eiters bei Zählungen zwischen 30 000 bis 40 000 gehörten zu den Ausnahmen. Nur in Allenstein sind einige Male bis 60 000 und bei einem nur 4 Tage fiebernden, ohne Operation geheilten Kranken 160 000 weisse Blutkörperchen gezählt worden. Der Berichterstatter, St.-A. Sachse, schließt hieraus, daß die Steigerung der Zahl der weissen Blutkörperchen kein sicheres Zeichen beginnender Eiterung sei.

In den Berichten findensich einzelne Fälle von operationsloser Selbstheilung der Blinddarmabszesse.

In Alt-Damm und Halle a. S. je 1 mal Durchbruch des Eiters in die Blase und kurz darauf in den Mastdarm. Die Kranken wurden dienstfähig. — Bei einem Kadetten in Wahlstatt brach der Eiter nach dem Mastdarm durch, nachdem er zur Operation nach Breslau übergeführt worden war. (St.-A. Schnütgen.)

Ein Kanonier in Dresden, der mit heftigen Schmerzen im Leibe fieberhaft erkrankt war, meldete sich erst krank, als eine Entzündung am After auftrat, die einem Furunkel glich. Er litt an einer Blinddarmzündung, und das scheinbare Blutschwär stellte sich als die Durchbruchsstelle einer grossen Eiterhöhle im Becken heraus. Spaltung der Fistel. Dienstfähig.

Von Nachkrankheiten werden bei den nicht operierten Kranken aufser Bauchfellentzündung und Sepsis in den Berichten 6 mal rechtsseitige Brustfellentzündung, rechtsseitige Hodenschwellung (Darmstadt), vorübergehende Lähmung des linken vorderen Schienbeinmuskels (Frankfurt a. M.) erwähnt.

Die innere Behandlung hat seit dem letzten Bericht keine wesentliche Wandlung erfahren.

St.-A. Waldeyer-Cöln will statt des Opiums Morphinum angewendet wissen, weil Opium das Krankheitsbild verschleierte, so daß die Bestimmung des Zeitpunktes der Operation erschwert wird. Zu Anfang gibt er ein leichtes Abführmittel, wenn keine Bauchfellreizung vorhanden ist, als Nahrung nur Tee. — O.-St.-A. Nötel-St. Avold hält die Opiumtabletten, auch wenn sie vorschriftsmässig verrieben werden, für weniger wirksam, als die Opiumtinktur. — O.-A. Sedlmair-Münsingen empfiehlt hohe Einläufe mit 3‰ Ichthyollösung in rechter Seitenlage, die besonders grosse subjektive Erleichterung gewähren sollen. — O.-St.-A. Brecht-Grofs-Lichterfelde warnt vor Eingießungen zur Hervorrufung des Stuhlgangs in der Rekonvaleszenz wegen der Gefahr der Lungenembolie; er gibt leichte Abführmittel, wie Bittersalz und ähnliche. Von mehreren Seiten werden örtliche Blutentziehungen durch Blutegel als schmerz- und entzündungslindernd empfohlen. — O.-St.-A. Bücken-Münster rät bei der Nachbehandlung der Bauchoperationen die Monopolbinde (wie sie gegen Hängebauch üblich ist), mit eingelegten Pelotten an der Stelle der Narbe anzuwenden.

Sanitäts-Bericht über die Armee. 1902/03. I. Teil.

Siebente Unterart: Bauchfellentzündung und Ausgänge.

(No. 96 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 4 | 58 | 0,11 | 14 | 25 | 21 | 60 | 2 | 38,9 |

Über 33 Bauchfellentzündungen, die sich an Blinddarmzündungen anschlossen sowie über 4, welche infolge von Blinddarmoperation auftraten, ist unter der vorigen Unterart bzw. in der Operationsliste berichtet.

Unter dieser Rapportnummer sind 15 weitere Erkrankungen beschrieben, bei denen 3 mal der Verdacht vorlag, daß die eigentliche Ursache ebenfalls in einer Blinddarmzündung zu suchen sei (Posen, Paderborn, Flensburg). — Die Ursache der übrigen Erkrankungen war: 1 mal Stofs gegen den Leib beim Hechtsprung über den Kasten (geheilt — Berlin), 1 mal mehrere Abszesse in der Leber (gestorben — Potsdam), 2 mal Durchbruch von Geschwüren im Zwölffingerdarm (gestorben — Detmold und Deutsch-Eylau), 3 mal lag der Verdacht tuberkulöser Erkrankung nahe (invalid — Aurich, Oldenburg, Heilbronn), 1 mal handelte es sich um einen durch die Bauchdecken, unterhalb des Nabels im Durchbruch begriffenen Abszefs unbekannter Herkunft, der nach Einschnitt heilte. Der Kranke wurde dienstfähig (O.-St.-A. Schelle-Lüben).

3 mal war gar keine Ursache festzustellen (Oppeln, Ulm, Ludwigsburg).

Achte Unterart: Katarrhalische Gelbsucht.

(No. 97 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 22 | 458 | 0,87 | 435 | 1 | 18 | 454 | 26 | 25,3 |

Außerdem erkrankten noch 6 Kadetten und 2 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang an katarrhalischer Gelbsucht.

| N a c h A r m e e k o r p s | | | |
|-----------------------------|------|---------------------------|------|
| ‰ K. | | | |
| G. | 0,99 | X. | 1,0 |
| I. | 0,60 | XI. | 0,48 |
| II. | 0,81 | XII. (1. K. S.) | 0,45 |
| III. | 0,43 | XIII. (K. W.) | 0,95 |
| IV. | 0,54 | XIV. | 1,9 |
| V. | 0,98 | XV. | 1,4 |
| VI. | 0,85 | XVI. | 1,1 |
| VII. | 0,70 | XVII. | 0,84 |
| VIII. | 0,97 | XVIII. | 0,53 |
| IX. | 0,64 | XIX. (2. K. S.) | 0,49 |

Die Erkrankungen an einfacher katarrhalischer Gelbsucht bieten nichts Erwähnenswertes.

Die Erkrankungen an akuter fieberhafter Gelbsucht, Weil'sche Krankheit, sind schon bei Gruppe I erwähnt.

Neunte Unterart: Krankheiten der Leber und deren Ausführungsgänge.

(No. 98 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 2 | 48 | 0,09 | 34 | 3 | 11 | 48 | 2 | 30,1 |

Außerdem erkrankte noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Über 3 Fälle von Gallenkoliken wird genauer berichtet, von denen 2 zur Operation kamen.

Bei einem Musketier in Offenburg fanden sich 268 Cholestearin-Steine im Gewicht von 15 g in der Gallenblase (O.-St.-A. Boeckler).

Bei dem anderen Kranken, bei dem sich heftige, teilweise kolikartige Schmerzen unter hohem Fieber im Anschluss an eine biliöse Lungenentzündung eingestellt hatten, fanden sich keine Steine, aber der Diplokokkus Fränkel in der Gallenblase. (Näheres Operationsliste unter B 2.) (O.-St.-A. Evler.)

Aus Krotoschin und Neifse wird über je einen Fall von plötzlichem Leberschwund (akute gelbe Leberatrophie) berichtet. Die Erkrankungen hatten ohne nachweisbare Ursache aktive Mannschaften befallen. Sie endeten in 9 bzw. 8 Tagen tödlich.

Eine dritte Erkrankung an Gelbsucht führte bei einem Füsilier in Bromberg ebenfalls in wenigen (9) Tagen zum Tode. Er war nach einer Erkältung mit hohem Fieber und einem leichten Rachenkatarrh, an den sich eine Lungenentzündung anschloß, dem Lazarett zugegangen.

Zehnte Unterart: Krankheiten des Mastdarms ausschließlich Hämorrhoiden.

(No. 99 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 7 | 82 | 0,16 | 65 | — | 13 | 78 | 11 | 40,1 |

Unter 16 näher beschriebenen Erkrankungen handelte es sich 14 mal um unvollständige Mastdarmpolypen. Alle Kranke, von denen 5 operiert wurden, wurden dienstfähig.

Je 1 mal lag ein haselnußgroßer gestielter Mastdarmpolyp, der entfernt wurde (Schneidemühl), und ein apfelgroßer Mastdarmpolyp vor (Metz). Beide Kranke wurden dienstfähig.

Elfte Unterart: Erkrankungen durch Eingeweidewürmer.

(No. 100 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 2 | 535 | 1,0 | 534 | — | 2 | 536 | 1 | 5,1 |

Über eine Blinddarmentzündung, die nach Ansicht des Berichterstatters durch einen Spulwurm entstanden war, ist unter No. 95 bereits berichtet.

Wie unter No. 94 erwähnt ist, fand sich im Dünndarm eines in Metz an Achsendrehung des Colon sigmoideum gestorbenen Kranken ein Bandwurm bei der Obduktion.

Über 58 Bandwurmkuren wird aus 11 Garnisonen berichtet. 38 mal ist die Art des Wurms angegeben und zwar Taenia solium 13 mal, Taenia saginata 25 mal.

Krampfartige Zustände traten bei einem an Spulwurm leidenden, blutarmen Musketier in Lübeck auf. Die Zustände gingen mit Bewußtlosigkeit einher. Außerdem bestanden hartnäckige Durchfälle. Beides wurde geheilt, nachdem der durch das Auffinden seiner Eier im Stuhlgang entdeckte, 20 cm lange Spulwurm abgetrieben war. — In Berlin konnte ein zur Beobachtung auf Krämpfe, und in Rastatt ein wegen Herzklopfen zugegangener Mann nach Abtreibung eines Bandwurms als geheilt entlassen werden.

Mehrfach ist beobachtet worden, daß die Bandwurmköpfe nach Behandlung mit Farrenwurzelextract nicht entleert wurden (Berlin, Königsberg i. Pr., Ulm). — St.-A. Knaak-Straßburg i. E. klagt über die regelmäßige Unwirksamkeit der Flores Koso. St.-A. Aschenbach-Metz versuchte zweimal Salol zur Bandwurmkur, hatte aber keinen Erfolg.

Zwölfte Unterart: Andere Krankheiten der Ernährungsorgane.

(No. 101 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 4 | 79 | 0,15 | 56 | 2 | 19 | 77 | 6 | 29,0 |

Außerdem erkrankten noch 3 Invaliden und 6 Kadetten. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Aus Posen und Mülhausen i. E. wird über Eiterungen unter der Zwerchfellkuppe berichtet, die ohne bekannte Ursache entstanden waren. Durch Operation wurde die Dienstfähigkeit bei beiden Kranken wieder hergestellt. (Näheres siehe Operationsliste.)

Die gleiche Erkrankung wurde bei 2 Leuten in Schneidemühl und Konstanz vermutet. Bei dem ersteren Kranken trat nach längerem Krankenlager Heilung und Wiederherstellung der Dienstfähigkeit ohne Operation ein, der andere wurde sofort nach der Einstellung als dienstunbrauchbar entlassen. In der

Heimat soll bald darauf, nach erfolgtem Durchbruch in den Darm, Heilung eingetreten sein. (St.-A. Wiedemann-Konstanz.)

Aus Magdeburg berichtet St.-A. Neuhaus, daß ein Sergeant wegen nervösen Erbrechen, das sich schon beim Anblick unappetitlicher Dinge oft dauernd einstellte, als invalide entlassen werden mußte.

O.-St.-A. Kraufs-Ulm berichtet, daß ein Pionier seit fünf Jahren an Wiederkäuen litt. Eier und Flüssigkeiten kehrten

nach 10 bis 15 Minuten, feste Speisen nach $\frac{1}{2}$ Stunde, oft auch noch nach 2 bis 3 Stunden in den Mund zurück. Nur wenn die Speisen so lange im Magen geblieben waren, daß sie bitter schmeckten, spie sie der Kranke aus, sonst kaute und verschluckte er sie wieder. Außer blassem Aussehen und Druckempfindlichkeit des Magens war nichts Krankhaftes bei dem Manne nachzuweisen. Vater und Bruder sollen magenleidend sein. Dienstunbrauchbar.

VI. Gruppe: Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschließlich der venerischen.

(No. 102 bis 111 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | | | |
| 94 | 2702 | 5,1 | 2166 | 77,5 | 25 ¹⁾ | 0,89 | 523 | 18,7 | 2714 | 97,1 | 82 | 64 599 | 23,1 |

Außerdem erkrankten noch 5 Kadetten und 12 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang betrug im Durchschnitt im Jahre:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1881/82 bis 1885/86 . . . | 2699,2 Mann = 7,1 ‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 . . . | 2693,0 „ = 6,5 „ |
| 1891/92 „ 1895/96 . . . | 3174,8 „ = 6,7 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 . . . | 2664,4 „ = 5,1 „ |
| im Jahre 1901/02 . . . | 2802 „ = 5,2 „ |

im Jahre 1902/03 . . . 2702 Mann = 5,1 ‰ K.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|------|----------------|------------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 219 | 5,3 | XII. (I.K.S.) | 89 | 4,5 |
| I. | 187 | 5,9 | XIII. (K. W.) | 144 | 6,5 |
| II. | 124 | 4,8 | XIV. | 146 | 4,6 |
| III. | 89 | 3,8 | XV. | 177 | 5,7 |
| IV. | 108 | 4,8 | XVI. | 153 | 5,6 |
| V. | 122 | 4,8 | XVII. | 140 | 4,7 |
| VI. | 120 | 4,6 | XVIII. | 167 | 6,4 |
| VII. | 126 | 4,7 | XIX. (2.K.S.) | 94 | 4,6 |
| VIII. | 145 | 5,4 | | | |
| IX. | 124 | 5,0 | I. K. B. . . . | 150 | 6,5 |
| X. | 106 | 4,8 | II. | 122 | 5,7 |
| XI. | 122 | 5,9 | III. | 112 | 6,0 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 292 | 323 | 212 | 267 | 266 | 232 | 188 | 181 | 179 | 240 | 193 | 129 |
| ‰ K. | 0,68 | 0,60 | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 0,43 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,43 | 0,36 | 0,27 |

¹⁾ Außerdem starb 1 Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Erste Unterart: Krankheiten der Nieren, Nebennieren und Harnleiter.

(No. 102 und 103 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| | | | | | | | | |
| 33 | 477 | 0,91 | 194 | 25 ¹⁾ | 242 | 461 | 49 | 48,4 |

Außerdem erkrankten bei No. 102 noch 4 Kadetten und 4 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Über Nierenentzündungen sind aus 55 Lazaretten Berichte eingegangen, die jedoch kein vollständiges Bild von dem Verlauf dieser Krankheiten in der Armee geben, weil meist nur die schwereren oder eigenartigen Krankheitsfälle erwähnt sind. Von 103 insgesamt berichteten Nierenentzündungen werden 40 als akute, 38 als chronische, 25 nicht genauer bezeichnet.

a. Akute Nierenentzündung.

Von den akuten Nierenentzündungen wurden 12 als Folge von Erkältungen angesehen. Von Infektionskrankheiten war 4mal Mandelentzündung, 1mal Grippe, 1mal Lungen- und Brustfellentzündung, 1mal eine Phlegmone am Fuß (Braunschweig), 2mal Tripper der Nierenentzündung vorausgegangen. 2mal war Quetschung der Nierengegend die Veranlassung der Krankheit (1mal gleichzeitig Erkältung — Bromberg, 1mal Hufschlag — Ulm). 2mal trat die Nierenentzündung nach reichlichem Biergenusse (Stuttgart, Freiburg i. Baden), 1mal nach Perubalsameinreibungen (Weissenburg) auf. 14mal ist keine Ursache bekannt geworden.

¹⁾ Außerdem starb ein Mann außerhalb militärärztlicher Behandlung.

Von den nach Tripper entstandenen Nierenentzündungen scheint eine (Altona) wesentlich durch eine Harnröhrenverengung beeinflusst gewesen zu sein, da sie nach deren Beseitigung verschwand.

Über Auftreten von Schüttelfrost bei Beginn der akuten Nierenentzündungen wird nur aus Bromberg (Krankheitsursache Quetschung) und Konstanz (Erkältung) berichtet. — Schmerzhaftigkeit der Nierengegend bestand bei je 1 Kranken in Breslau, Düsseldorf und Freiburg i. Baden. Bei dem Breslauer Kranken war während der periodisch unter Schmerzen auftretenden Eiweissausscheidung stets eine fingerdicke Geschwulst in der Gegend des linken Harnleiters zu fühlen. — Auftreten von Lungen- oder Brustfellentzündung oder von beiden Krankheiten während der akuten Nierenentzündung wird aus Berlin I, Hameln und Ulm berichtet. Bei dem Kranken in Berlin, der gleichzeitig einen rotfleckigen Ausschlag am ganzen Körper zeigte, wurde im rostfarbenen Auswurf der *Diplococcus lanceolatus* gefunden. — Je 1 Kranker in Berlin und Colmar i. E. zeigte beim Ausbruch der Nierenentzündung rheumatische Schwellungen der Kniee. Bei dem ersten traten mehrmals Rückfälle der (hämorrhagischen) Nierenentzündung gleichzeitig mit Gelenkschwellungen und Purpura auf. — Bei einem Einjährig-Freiwilligen in Hannover, bei dem die Nierenentzündung nach Mandelentzündung aufgetreten war, beobachtete O.-St.-A. Steinhausen eine eigentümliche pralle Schwellung der Oberarmmuskeln und der Oberschenkelanziehermuskeln, die er als akute Muskelentzündung auffasst, die von Fieber, Drüenschwellungen und einer Lähmung des rechten Ellenbogennerven begleitet war. — Bei der akuten Nierenentzündung wird Bauchwassersucht nur in dem Bericht aus Metz, Erguß in die Brusthöhle in dem aus Berlin II, Sehnervenschwellung (*Retinitis albuminurica*) nur in dem aus Hannover erwähnt. Akute Nierenentzündungen, die mit der hämorrhagischen Form einsetzen, finden sich in den Berichten aus Berlin I, Braunschweig, Oldenburg, Darmstadt, Freiburg i. Baden, Weingarten. — Uraemie ist 8mal verzeichnet. Mehrmals bildeten uraemische Krampfanfälle die erste Krankheitserscheinung. 4 mal führte die Uraemie den Tod herbei (Düsseldorf, Oldenburg, Ulm, Deutsch-Eylau). In Hannover und Alt-Damm wurde je 1 Mann trotz schwerer Uraemie wieder dienstfähig, in Metz und Hameln wurden 2 Leute geheilt, aber invalide.

Bei dem in Düsseldorf unter uraemischen Erscheinungen verstorbenen Kranken bestand völlige Anurie. Außerdem hatte er schwer stillbare Zahnfleischblutungen und ein Herzgeräusch nach dem ersten Ton. — Durchfälle finden sich häufig notiert. — Milzschwellung ist nur bei der durch Sepsis verursachten Erkrankung in Braunschweig gefunden. — Bei dem in Ulm nach Hufschlag erkrankten Manne bildete sich zur Zeit des Rückganges der akuten Erscheinungen ein tuberkulöser Abszess in der Kniekehle.

Übergang der akuten Form der Nierenentzündung in die chronische wird nur aus Hameln, Stuttgart, Metz und Mörchingen berichtet. — Verhältnismäßig oft wurden Nierenkranke wieder dienstfähig, selbst bei schweren hämorrhagischen Formen der Nierenentzündung. — Bei den 4 unter uraemischen Erscheinungen Verstorbenen trat der Tod 1mal am 1. Tage, 3mal zwischen dem 4. bis 6. Tage der Lazarettbehandlung ein; bei ihnen allen bestand hochgradige oder völlige Anurie und sehr reichliche Eiweissausscheidung. Bei einem von ihnen fand sich eine fibrinöse Hirnhautentzündung (Ulm).

Außerdem sind von den in den Berichten erwähnten Kranken an akuter Nierenentzündung gestorben: der nach der Phlegmone am Fuß erkrankte Musketier in Braunschweig (nach 12 Stunden) und 1 nach leichter Grippe erkrankter Oberjäger in Berlin II (nach 2 $\frac{1}{2}$ Monaten).

b. Chronische Nierenentzündung.

Entstehung der chronischen Nierenentzündung aus der akuten Form ist außer den oben erwähnten Fällen nicht berichtet. 8 Kranke hatten das Leiden schon vor der Einstellung gehabt. Die Eiweissausscheidung wurde 3mal am Einstellungstage bemerkt, in den anderen Fällen scheint sie verschwunden und erst nach Erkältungen, Durchnässungen oder Anstrengungen wieder aufgetreten zu sein. — Zeitweise Eiweissausscheidung, die immer erst nach Anstrengungen, z. B. nach mäfsigen Marschleistungen, auftrat, wurde in Frankfurt a. M., Hildburghausen und Hameln beobachtet. — Als selbständige Krankheitsursache wurde Durchnässung nur von einem Sanitätssergeanten in Rastatt angeschuldigt, der während der ostasiatischen Expedition mehrmals hintereinander im Regen biwakiert hatte. — Von Infektionskrankheiten werden als Ursache der chronischen Nierenentzündung angeführt: Mandelentzündung (Berlin I, Königsberg i. Pr.), Diphtherie (Oldenburg), Influenza (Stuttgart), Typhus (Stuttgart), Malaria (in China erworben — Ulm), Syphilis (Erfurt), Tripper (Berlin II). — Auf Crysarobineinwirkung wurde eine Erkrankung in Wiesbaden, auf chronischen Alkoholismus 1 Fall in Königsberg i. Pr. zurückgeführt. Bei 1 im höheren Lebensalter stehenden Kranken in Königsberg i. Pr. gab Arteriosklerose die Grundlage der Nierenentzündung, bei 1 Kranken in Stuttgart wurden Nierensteine als Ursache der Krankheit angesehen. An frühere Quetschungen der Nierengegend hatten sich 3 Erkrankungen (Posen, Stuttgart, Ulm) angeschlossen. Fortgesetzte heftige Erschütterung beim Reiten eines bockenden Pferdes wurde bei 1 invalide gewordenen Ulaen in Düsseldorf als Krankheitsursache anerkannt.

Durch Netzhautschwellung (*Retinitis albuminurica*) bedingte Sehstörungen bildeten 2mal die ersten Krankheitsbeschwerden (1mal bestanden sie in Nachtblindheit (Hameln), das andere Mal trat bald eine vollständige Aufhebung der Sehfähigkeit ein (Altona). — 5mal war ein Bronchialkatarrh das erste Zeichen der Krankheit. 3 von diesen Kranken starben (Diedenhofen, Colmar i. E., Ludwigsburg). Der Mann in Diedenhofen hatte gleichzeitig erhebliche Magenkrämpfe, der in Colmar i. E. Blutbrechen. Spontane Nierenschmerzen bestanden bei 1 Kranken in Rastatt, bei je 1 Kranken in Frankfurt a. M. und Konstanz traten die Schmerzen beim Exerzieren auf. — Schnelle Entwicklung heftiger uraemischer Erscheinungen (Benommenheit, Krämpfe, Asthma uraemicum) bildete das erste Zeichen der chronischen Nierenentzündung bei je 1 Kranken in Altona, Diedenhofen, Colmar i. E. und Osnabrück. Der Mann in Colmar i. E. war anfänglich zur Beobachtung auf Epilepsie in das Lazarett aufgenommen. Die 3 zuerst Aufgeführten starben. — Uraemie wurde außerdem noch bei je 1 Kranken in Rastatt und Mainz beobachtet, im letzteren Falle mit vollständiger Anurie und einer Verbreiterung der Herzdämpfung. — Herzverbreiterung wird auch bei je 1 Kranken in Darmstadt und Leobschütz, Herzfehler bei je 1 Kranken in Magdeburg (Verdickung der Aortenklappen), Rastatt und Jüterbog (Mitralsuffizienz) sowie in Osnabrück beobachtet. Der Kranke in Osnabrück hatte gleichzeitig eine Verstopfung der linken Schenkelblutader. —

Nasenbluten ist bei 1 Kranken in Insterburg notiert, 1 Kranker in Stuttgart litt gleichzeitig an Hysterie.

Über eine Temperaturerniedrigung bis auf 34,4° C berichtet St.-A. Neuhaus-Magdeburg. Der Kranke starb.

Blutbeimengungen im Urin werden in Konstanz und bei der durch Tritt eines Ochsen entstandenen Erkrankung in Ulm angeführt.

Als Schrumpfniere ohne Albuminurie wurde die Erkrankung eines Füsiliers in Sonderburg angesehen, dessen Urinmenge durchschnittlich 3 l bei 1003 spezifischem Gewicht betrug. Im Urin fanden sich einzelne granulirte Cylinder.

Nur 1 mal ist erwähnt, daß 1 Mann mit chronischer Nierenentzündung wieder dienstfähig wurde (Konstanz). 10 Kranke, über die näher berichtet ist, starben; 8 davon in 24 Stunden bis 8 Tagen nach der Lazarettaufnahme. 4 mal wurde bei der Leichenöffnung Schrumpfniere, 1 mal (Darmstadt) die bunte Niere gefunden. 5 Verstorbene standen im dienstpflichtigen Alter, die übrigen gehörten den höheren Dienstgraden an. Ein $\frac{3}{4}$ Jahre im Dienst befindlicher Kanonier mit nachgewiesener Schrumpfniere hatte bis zum Tage der Lazarettaufnahme ohne jede Ahnung von seinem Leiden Dienst getan (Diedenhofen). Die übrigen Verstorbenen konnten nicht obduziert werden.

Unter den Erkrankungen, die weder als akut noch als chronisch bezeichnet sind, befinden sich zunächst 8, die auf Erkältung, und 4, die auf Mandelentzündung zurückgeführt werden. Diese Fälle verliefen fast alle sehr leicht, nur folgende seien erwähnt:

1 Erkrankung in Deutsch-Eylau war durch doppelseitige Lungenentzündung und Verstopfung der linksseitigen Schenkelblutader kompliziert, teigige Schwellungen der Haut reichten bis an die Schulterblätter. — 1 Mann in Leobschütz hatte 14 Tage lang äußerst starke Ödeme, nach deren Verschwinden sein Körpergewicht um 11 Pfund verringert erschien. Er wurde wieder dienstfähig.

An Albuminurie, bei der keine Harnzylinder nachgewiesen werden konnten, litt 1 Mann in Gotha, der früher Gelenkrheumatismus gehabt hatte, 1 Kranker in Berlin II, der an Tripper gelitten hatte, und 1 Mann in Posen, bei dem die Albuminurie nach Entleerung eines Nierensteins verschwand.

In Verden hatten 2 an Nierenentzündung erkrankte Leute durch Versehen in einer Zivilapotheke statt einer Sennabkochung 1 bzw. 2 Eßlöffel voll Opiumtinktur erhalten. Die Vergiftungserscheinungen waren mäsig. Beide Leute wurden von der Nierenentzündung geheilt und dienstfähig.

Wo auf die Behandlung der akuten Nierenentzündung näher eingegangen ist, wird meist die gute Wirkung von Schwitzbädern gerühmt, namentlich bei gleichzeitiger Milchdiät.

Von Diuretin sahen St.-A. Goronzek-Königsberg i. Pr. und St.-A. Brücke-Hameln guten Erfolg. Der letztere in Übereinstimmung mit O.-St.-A. Steinhausen-Hannover auch von Pilocarpin-Einspritzungen im Gegensatz zu den im Sanitätsbericht 1900/01 mitgetheilten Erfahrungen. — St.-A. Bluhm-Bromberg wandte bei sehr hohem Eiweißgehalt des Urins ($20 \frac{0}{100}$) große Dosen Salpetersäure versuchsweise ohne Erfolg an. — Bei allgemeiner Harnvergiftung wurde bei zwei Kranken mit vorübergehendem Erfolge ein Aderlaß gemacht. O.-St.-A. Brösicke-Jüterbog entzog 650, St.-A. Brücke-Hameln 120 ccm Blut. — Ebenso wirkten Einspritzungen von Kochsalzlösung in eine Blutader (St.-A. Knoch-Düsseldorf) und einmalige Einspritzung großer Mengen dieser Lösung unter die Haut (2000 ccm O.-St.-A. Düsterhoff-Dt.-Eylau) nur vorübergehend, während St.-A. Kallina-Weissenburg in 1 Krankheitsfall von 3 mal wiederholten Einspritzungen kleinerer Mengen

Kochsalzlösung (200—500 ccm) unter die Haut einen sehr guten Erfolg sah. — St.-A. Franz-Alt-Damm konnte bei vollständiger Anurie und Uraemie die Urinabsonderung durch Digitalisklystiere wiederherstellen. — Bei den schweren Zahnfleisch- und Magenblutungen des einen Kranken in Frankfurt a. M. hatten Einspritzungen von Gelatinelösung unter die Haut nur zeitweisen Erfolg. Die Anwendung des Wildunger Wassers oder der Gebrauch einer Kur im Bade Wildungen ist mehrfach erwähnt. — Ein Kranker aus Hannover wurde nach Gebrauch einer Badekur in Neuenahr wieder dienstfähig.

Die Behandlung der chronischen Erkrankungen war von der der akuten Formen nicht verschieden. Bei einem Kranken in Rastatt konnten Kochsalzeingießungen nach vorher gegangenem Aderlaß weder die bedrohlichen Erscheinungen der Harnvergiftung mildern noch den tödlichen Verlauf abwenden.

c. Nierenblutung.

Reines Blutharnen trat bei einem Musketier in Lötzen infolge von Erkältung auf. Durch Nachweis von Harnzylindern im Urin wurde 4 Wochen nach der Lazarettaufnahme der Beweis erbracht, daß das Blut aus der Niere stammte (St.-A. Weber). — Nicht sicher aufgeklärt wurde die Herkunft des Blutes bei einem Füsilier in Berlin, der zum ersten Male im 4. Lebensjahr vorübergehend an Blutharnen gelitten hatte. Seit dem 17. Jahre trat das Blut sehr häufig auf. Das Allgemeinbefinden war durchaus nicht beeinträchtigt. Im Urin fanden sich rote Blutkörperchen, Blasenepithelien, aber niemals Zylinder. Eine Beseitigung der Blutung gelang nicht. (St.-A. Bornikoel).

Je 1 Mann in Berlin I und Frankfurt a. M. litt an periodischer Haemoglobinurie, die schon nach leichten Anstrengungen, selbst nach Spaziergängen auftrat. — St.-A. Voigtel fand in dem fast schwarzen Urin seines Kranken keine roten Blutkörperchen. Bei dem Kranken in Frankfurt a. M. wurden einzelne rote Blutkörperchen und blutig gefärbte Zylinder nachgewiesen (St.-A. Grimm.)

d. Nierensteine.

Von den schon bei der chronischen Nierenentzündung und bei der Albuminurie erwähnten Kranken in Stuttgart und Posen hatte der letztere die ersten Schmerzen bei einem Sprung über einen Graben verspürt. Der aus oxalsaurem Kalk bestehende Stein wurde 3 Tage später entleert (O.-St.-A. Brix). — Ein Unteroffizier in Halberstadt kam wegen heftiger Nierenkoliken, die nach einer Wildunger Kur nicht verschwanden, zur Entlassung als invalide. Einen operativen Eingriff hatte er abgelehnt.

e. Wanderniere.

Bei den 3 näher beschriebenen Kranken handelte es sich 1 mal um eine doppelseitige (Zittau), 1 mal um eine linksseitige (Mergentheim), 1 mal um eine rechtsseitige Wanderniere (Posen). Bei dem Kranken in Posen hob sich das Körpergewicht nach Anlegung eines festen Verbandes, der die Verdauungsbeschwerden beseitigte, um 4,0 kg.

f. Andere Krankheiten der Niere und ihrer Umhüllungen.

Über Vereiterung des Zellgewebes in der Umgebung der Niere liegen aus 11 Lazaretten Berichte vor. Um eiterige Erkrankung des Nierengewebes selbst handelte es sich bei 4 Kranken. Die näheren Angaben finden sich in der Operationsliste. — Abschnitt B. 6.

Je 1 Mann in Spandau, Breslau und Mörchingen litt an gonorrhöischer Nierenbeckenentzündung. Bei den beiden zuletzt genannten war die Trippererkrankung 1 Jahr vorhergegangen. Die Nierenbeckenerkrankung des Breslauer Kranken wurde durch einen Fall auf die Nierengegend ausgelöst.

Zweite Unterart: Krankheiten der Blase.

(No. 104 und 105 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 27 | 710 | 1,3 | 535 | — | 193 | 728 | 9 | 25,1 |

Außerdem erkrankten noch 6 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Auch in diesem Berichtsjahre ließen sich in der überwiegenden Mehrzahl die Erkrankungen an Blasenkatarrh auf Tripper zurückführen; auf Erkältungen erst in zweiter Linie. 1 mal (Erfurt) soll sich die Krankheit an eine Quetschung des Hodens durch Fall angeschlossen haben, 1 mal an einen Stoß mit einem Gewehrkolben in die Blasen-gegend (Ulm). Geringe Blutungen wurden während des Verlaufs bei 5 Kranken beobachtet. Als Mitkrankheit bestand 1 mal Harnröhrenverengung (Metz) und 1 mal Entzündung der Vorsteherdrüse (Diedenhofen). — Bezüglich der Behandlung werden Ausspülungen der Blase mit Borsäurelösungen denen mit Höllenstein vorgezogen. O.-St.-A. Langhoff-Hameln empfiehlt die Ausspülungen mit allmählich sich steigernden Mengen Borsäurelösung, um die Fassungskraft der Blase nach und nach zu heben.

Bei den meisten in Zugang gekommenen, an Blasen-schwäche leidenden Leuten bestand die Krankheit von Jugend an. Auffallend groß ist die Zahl der in Ulm Behandelten (28), die fast sämtlich als dienstunbrauchbar wieder entlassen wurden.

Zur Beseitigung des Leidens empfiehlt St.-A. Mangelsdorf-Blankenburg die Einführung einer zu einer 15,0 cm langen Schlinge gedrehten Elektrode aus starkem Draht in den Mastdarm, während die andere Elektrode auf den Damm gesetzt wird. Von anderer Seite wird über guten Erfolg durch Massage des Blasenhalbes vom Mastdarm aus berichtet. (Ulm.)

Über Blasenblutungen liegen aus 4 Lazaretten Mitteilungen vor.

O.-St.-A. Ebeling-Paderborn sah im Anschluß an eine solche vorübergehende Drüsenschwellungen im Scarpaschen Dreieck, in der Leistengegend und am Ellenbogengelenk ohne gleichzeitige Milzschwellung und nachweisbare Vermehrung der weißen Blutkörperchen auftreten. St.-A. Holzinger-Ludwigsburg nimmt in einem Falle eine Zerreißen der Blasen-schleimhaut beim Aufsitzen auf das Pferd als Ursache an.

Dritte Unterart: Krankheiten der Vorsteherdrüse, der Eichel und der Vorhaut sowie Verengerungen der Harnröhre.

(No. 106 bis 108 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 18 | 1071 | 2,0 | 1065 | — | 13 | 1078 | 11 | 12,1 |

Außerdem erkrankte bei No. 107 noch 1 Kadett. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Bei den meisten Erkrankungen an Eicheltripper bestand gleichzeitig Phimose, neben dieser einmal Verlagerung der Harnröhrenmündung nach oben, einmal nach unten und hinten. Zur Beseitigung der Vorhautverengung ist gewöhnlich der einfache Dorsalschnitt angewendet, vor dem jedoch St.-A. Näther-Dresden warnt, weil er wiederholt (im Berichtsjahre 2 mal) Elephantiasis der Vorhaut danach auftreten sah. St.-A. Spiro-Mutzig entfernte nach dem Vorgang des O.-St.-A. Sedlmayr stets die ganze Vorhaut mit Erhaltung des Bändchens durch einen oberen und unteren Längsschnitt, die durch seitliche Schnitte hart an der Kranzfurche verbunden wurden.

Von O.-St.-A. Pfuhl-Hannover wird die Vornahme der Operation unter Schmerzstillung nach Oberst empfohlen, doch soll erst 10 Minuten nach Einspritzung der Cocainlösung mit der Operation begonnen werden.

Harnröhrenverengung gab 4 mal Veranlassung zur Lazarettaufnahme. Die Kranken hatten sämtlich bereits vor ihrer Einstellung daran gelitten.

Vierte Unterart: Wasserbruch.

(No. 109 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 9 | 192 | 0,36 | 160 | — | 34 | 194 | 7 | 23,8 |

Außerdem erkrankten noch 2 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die Zahl der näher berichteten Krankheitsfälle beträgt 46. Als Ursache sind meist direkte mechanische Einwirkungen auf die Hoden oder indirekte durch Sprung, Heben schwerer Lasten und 1 mal verstärkte Benutzung der Bauchpresse beim Erbrechen (Paderborn) beschuldigt. Angeboren war der Wasserbruch 3 mal, vor dem Diensttritt sollte er 4 mal entstanden sein. 36 mal handelte es sich um Wasserbruch des Hodensackes, (22 mal rechts, 13 mal links, 1 mal beiderseits), 5 mal des Samenstranges. Bei 21 Kranken wurde die Operation nach von Bergmann, bei 8 nach von Volkmann vorgenommen, bei 3 nach Winkelmann.

Die Erfolge waren bei allen Operationsmethoden gleich günstig. St.-A. Kern-Magdeburg zieht die Volkmansche Methode vor, weil unter Schleischerscher Anästhesie operiert werden kann. Er sah danach zuweilen vorübergehende Temperatursteigerungen bis 39° auftreten, die indes den Heilungsverlauf in keinem Falle störten. Bei 5 Kranken wurde durch einfachen Einstich, mit nachfolgendem Druckverband, Dienstfähigkeit erzielt. Krotschin 3, Ludwigsburg, Mörchingen je 1.

In Gleiwitz war eine Hydrocele des rechten Samenstranges nach vergeblicher Behandlung mit Lugolscher Lösung durch Einschnitt eröffnet. 4 Wochen nach der Operation fiel der Hode durch die infolge eines Stofses wieder aufgebrochene Narbe vor und mußte abgetragen werden.

Fünfte Unterart: Krampfadernbruch.

(No. 110 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 2 | 104 | 0,20 | 88 | — | 18 | 106 | — | 11,6 |

In Stuttgart und Colmar i. E. wurde je einmal die Ausschneidung eines faustgroßen, hinderlichen Krampfadernbruchs vorgenommen. Beide Operierte blieben dienstfähig (O.-St.-A. Wendel—St.-A. Franke.) — s. Operationsliste unter B. 6.

Sechste Unterart: Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.

(No. 111 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 5 | 148 | 0,28 | 124 | — | 23 | 147 | 6 | 14,7 |

Einfache Harnröhrenkatarrhe ohne nachweisbare Gonokokken sind 14 mal berichtet.

St.-A. Herter-Stuttgart beschreibt 1 Erkrankung an einfacher Harnruhr, die seit 2 Jahren bestand und zur Entlassung führte. Die tägliche Urinmenge schwankte bei mäßiger Flüssigkeitszufuhr zwischen 3300 und 4550 ccm, das spezifische Gewicht zwischen 1004 und 1018. Andere Fälle sind in Gruppe I, 10. Unterart erwähnt.

Eine akute Harnverhaltung ohne nachweisbare Ursache wurde in Metz durch warme Bäder beseitigt. — Entzündung des linken Samenstranges durch Huftritt kam in Diedenhofen 1 mal vor, eine Cyste des Samenstranges wurde in Metz beobachtet. 2 Hodenentzündungen (Metz, Ulm) und eine Hodenatrophie (Metz) wurden auf Quetschungen zurückgeführt.

St.-A. Wiemuth-Potsdam beobachtete bei einem Kranken Spermatorrhoe mit gleichzeitig vermehrter Urinausscheidung (bis zu 4000 ccm). Die Samenfäden zeigten an der Übergangsstelle vom Kopf zum Hals eine krausenförmige Verdickung. Als Ursache wird Überempfindlichkeit des Blasenhalsses und Erschlaffung der Ducti ejaculatorii angenommen, die vermehrte Urinausscheidung auf reflektorische Reizung zurückgeführt.

Einen doppelten Harnröhrenstein, der aus 2 mit den Grundflächen aufeinanderstehenden, kegelförmigen Stücken bestand, wovon jedes einen dunkeln Kern aus harnsauren Salzen in einer breiteren Schicht von phosphorsauren Salzen enthielt, entfernte O.-St.-A. Wendel-Stuttgart durch äußeren Harnröhrenschnitt. Der Stein wog 12,5 g.

St.-A. Würth von Würthenau-Mülhausen i. E. berichtet über einen Kranken, bei dem die Harnröhrenmündung dicht am Hodensack lag und dessen Glied durch eine strangförmige, in der Mitte der Unterfläche gelegene Verdickung (rudimentäre corpora cavernosa urethrae) nach unten gekrümmt gehalten wurde. Der Strang wurde gespalten und dadurch eine ausreichende Aufrichtung ermöglicht. Die Operation der Hypospadie blieb vorbehalten.

VII. Gruppe: Venerische Krankheiten.

(No. 112 bis 117 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | % der Behand- delten | absol. Zahl | % der Behand- delten | absol. Zahl | % der Behand- delten | absol. Zahl | % der Behand- delten | | | |
| 500 | 10 216 | 19,4 | 9790 | 91,4 | — | — | 399 | 3,7 | 10 189 | 95,1 | 527 | 385270 | 36,9 |

Außerdem erkrankten noch 2 Kadetten und 5 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Krankenzugang bei dieser Gruppe betrug im vorigen Berichtsjahre 9910 Mann = 18,3 ‰ K.; in dem vorliegenden Berichtsjahre 10 216 Mann = 19,4 ‰ K., hat sich also im Vergleich mit dem Vorjahre um 306 = 1,1 ‰ K. erhöht.

Der Zugang betrug:

im Jahre 1894/95 . . . 15 119 Mann = 29,9 ‰ K.,
" " 1895/96 . . . 13 125 " = 25,5 "

im Jahre 1896/97 . . . 11 267 Mann = 21,9 ‰ K.

" " 1897/98 . . . 10 812 " = 21,0 "

" " 1898/99 . . . 10 218 " = 19,9 "

" " 1899/1900 . . . 9 625 " = 18,5 "

" " 1900/01 . . . 9 393 " = 17,8 "

" " 1901/02 . . . 9 910 " = 18,3 "

im Jahre 1902/03 . . . 10 216 Mann = 19,4 ‰ K.

Wie sich der Zugang an venerischen Erkrankungen in den größeren Heeren stellt, lehrt die nachstehende Tabelle.

Vorkommen venerischer Erkrankungen in den größeren Armeen in $\frac{0}{0}$ K.

| Berichtszeitraum | Preufs. Armee XII. (1. K. S.), XIX. (2. K. S.) und XIII. (K. W.) Armeekorps | Franz. Armee | Österr. Armee | Italien. Armee | Engl. Inland-Armee | |
|--|---|--------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 1881/82 bis 1885/86 bzw. 1881—1885 ¹⁾ | im Durchschnitt | 35,1 | 58,2 | 73,6 | 102,9 | — |
| 1886/87 bis 1890/91 bzw. 1886—1890 ¹⁾ | | 27,1 | 51,1 | 65,3 | 94,3 | 212,4 ²⁾ |
| 1891/92 bis 1895/96 bzw. 1891—1895 ¹⁾ | | 29,1 | 46,7 | 63,2 | 95,6 | 189,9 |
| 1896/97 bis 1900/01 bzw. 1896—1900 ¹⁾ | | 19,8 | 37,4 | 61,5 | 94,0 | 126,9 |
| 1901/02 bzw. 1901 ¹⁾ | | 18,3 | 30,6 ³⁾ | 60,0 | 87,3 | 105,5 |
| 1902/03 bzw. 1902 ¹⁾ | | 19,4 | 29,9 | 57,5 | 91,5 | 122,7 |

Aus den nachstehenden Übersichten ist zu ersehen, wie sich der Gesamtzugang an venerischen Erkrankungen in den genannten Berichtszeiträumen und auf die einzelnen Armeekorps verteilt. Die wichtigste Krankheitsform dieser Gruppe, die konstitutionelle Syphilis, ist in besonderen Spalten behandelt.

Dieselben Verhältnisse sind in den Karten XXIII bis XXVIII bildlich dargestellt.

Die Verschiebungen gegenüber dem Vorjahre 1901/02 sind in der graphischen Darstellung auf Seite 106 veranschaulicht. Das XIII. (K. W.) Armeekorps hatte, wie in den letzten 9 Berichtsjahren, den geringsten Zugang.

Eine nicht unbeträchtliche Zunahme hat diesmal das V. Armeekorps erfahren, während das II. Armeekorps einen erheblichen Rückgang zu verzeichnen hat.



Zugang an venerischen Krankheiten in der Armee und bei den einzelnen Armeekorps im fünfjährigen Durchschnitt der Berichtsjahre 1881/82 bis 1885/86, 1886/87 bis 1890/91, 1891/92 bis 1895/96, 1896/97 bis 1900/01 sowie für die Berichtsjahre 1901/02 und 1902/03.

| Berichtszeitraum | Venerische Erkrankungen in der Armee (ausschließlich Offiziere) | | Von den venerischen Erkrankungen entfielen auf das | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|--|------------------|-----------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------------------|------------------|-------|------|-------|-----|
| | | | Gardekorps | | | | I. Armeekorps | | | | II. Armeekorps | | | | III. Armeekorps | | | | IV. Armeekorps | | | | V. Armeekorps | | | | | |
| | Summe | | darunter konstitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter konstitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter konstitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter konstitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter konstitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter konstitutionelle Syphilis | | | | | |
| | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | | | | |
| 1881/82 bis 1885/86 | 13 251,2 | 35,1 | 3397,2 | 9,0 | 1171,4 | 36,5 | 260,6 | 8,1 | 1248,2 | 50,4 | 310,0 | 12,5 | 932,0 | 38,0 | 255,4 | 10,4 | 701,8 | 30,3 | 181,0 | 7,8 | 635,6 | 28,6 | 192,0 | 8,6 | 902,0 | 39,6 | 222,2 | 9,8 |
| 1886/87 bis 1890/91 | 11 254,4 | 27,1 | 2476,2 | 6,0 | 937,8 | 27,0 | 191,0 | 5,5 | 845,6 | 32,1 | 187,6 | 7,1 | 883,0 | 33,3 | 225,8 | 8,5 | 521,8 | 23,4 | 126,2 | 5,7 | 477,0 | 21,4 | 135,8 | 6,2 | 854,6 | 37,1 | 158,6 | 6,9 |
| 1891/92 bis 1895/96 | 13 744,8 | 29,1 | 3122,8 | 6,6 | 1198,2 | 31,4 | 221,8 | 5,8 | 786,2 | 30,7 | 178,0 | 7,0 | 683,6 | 29,3 | 149,6 | 6,4 | 742,8 | 32,0 | 180,6 | 7,8 | 710,4 | 29,5 | 232,2 | 9,7 | 665,0 | 28,0 | 129,4 | 5,5 |
| 1896/97 bis 1900/01 | 10 263,0 | 19,8 | 2185,8 | 4,2 | 934,0 | 21,8 | 177,0 | 4,1 | 642,4 | 21,7 | 140,6 | 4,8 | 486,4 | 19,1 | 107,4 | 4,2 | 545,8 | 22,9 | 120,8 | 5,1 | 419,2 | 17,3 | 94,8 | 3,9 | 499,4 | 19,5 | 98,8 | 3,9 |
| 1901/02 | 9 910 | 18,3 | 2150 | 4,0 | 1003 | 22,2 | 206 | 4,6 | 699 | 22,0 | 146 | 4,6 | 624 | 23,5 | 146 | 5,5 | 441 | 18,4 | 88 | 3,7 | 302 | 13,2 | 45 | 2,0 | 342 | 13,1 | 81 | 3,1 |
| 1902/03 | 10 216 | 19,4 | 2179 | 4,1 | 1021 | 24,7 | 196 | 4,8 | 721 | 22,8 | 166 | 5,2 | 477 | 18,5 | 115 | 4,5 | 504 | 21,4 | 111 | 4,7 | 359 | 16,1 | 64 | 2,9 | 459 | 17,9 | 136 | 5,8 |

1) Jahreszahlen für die französische, österreichische, italienische und englische Armee.

2) Nur Berichtsjahr 1890.

3) Diese Zahlen sind auf 1000 Mann der Präsenzstärke berechnet und betreffen bis zum Jahre 1900 die Truppen in der Heimat sowie Algerien und Tunis, vom Jahre 1901 ab nur die eigentlichen Truppen in der Heimat ausschließlich derjenigen in Algerien und Tunis.



Stad-
bakeri
Göteborg

| Berichts- Zeitraum | VI. Armeekorps | | | | VII. Armeekorps | | | | VIII. Armeekorps | | | | IX. Armeekorps | | | | X. Armeekorps | | | | XI. Armeekorps | | | | XII. (1. K. S.) Armeekorps | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | |
| | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. |
| 1881/82 bis 1885/86 | 1137,0 | 49,6 | 329,0 | 14,4 | 586,2 | 26,3 | 197,0 | 8,8 | 716,2 | 30,7 | 194,2 | 8,3 | 700,8 | 33,4 | 138,0 | 6,6 | 605,0 | 29,5 | 135,2 | 6,6 | 752,0 | 24,3 | 262,0 | 8,5 | 1504,2 | 58,7 | 336,0 | 13,1 |
| 1886/87 bis 1890/91 | 692,8 | 29,1 | 162,0 | 6,8 | 482,2 | 20,9 | 137,2 | 5,9 | 488,4 | 21,6 | 128,6 | 5,7 | 510,0 | 23,8 | 90,2 | 4,2 | 344,2 | 16,8 | 75,4 | 3,7 | 559,2 | 17,4 | 132,0 | 4,1 | 1274,2 | 44,5 | 288,8 | 10,1 |
| 1891/92 bis 1895/96 | 736,8 | 29,7 | 179,6 | 7,2 | 552,0 | 23,0 | 128,6 | 5,3 | 557,4 | 23,4 | 136,0 | 5,7 | 588,6 | 25,9 | 100,0 | 4,4 | 449,6 | 20,2 | 118,8 | 5,3 | 746,0 | 20,9 | 194,2 | 5,4 | 1404,8 | 40,8 | 313,0 | 9,1 |
| 1896/97 bis 1900/01 | 558,0 | 21,0 | 145,2 | 5,5 | 394,0 | 15,0 | 83,0 | 3,2 | 439,4 | 16,3 | 108,4 | 4,0 | 513,6 | 20,8 | 90,8 | 3,7 | 335,8 | 14,6 | 79,0 | 3,4 | 436,4 | 15,0 | 113,6 | 3,9 | 933,2 | 31,7 | 186,0 | 6,3 |
| 1901/02 | 510 | 19,2 | 126 | 4,7 | 418 | 15,2 | 117 | 4,2 | 473 | 16,9 | 129 | 4,6 | 506 | 19,9 | 91 | 3,6 | 324 | 14,4 | 77 | 3,4 | 283 | 13,2 | 54 | 2,5 | 654 | 31,6 | 135 | 6,5 |
| 1902/03 | 577 | 22,4 | 142 | 5,5 | 464 | 17,2 | 110 | 4,1 | 474 | 17,6 | 98 | 3,6 | 525 | 21,0 | 101 | 4,0 | 378 | 17,2 | 94 | 4,3 | 315 | 15,2 | 66 | 3,2 | 679 | 34,0 | 138 | 6,9 |


| Berichts- Zeitraum | XIII. (K. W.) Armeekorps | | | | XIV. Armeekorps | | | | XV. Armeekorps | | | | XVI. Armeekorps | | | | XVII. Armeekorps | | | | XVIII. Armeekorps | | | | XIX. (2. K. S.) Armeekorps | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------------|---|
| | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | Summe | | darunter kon- stitutionelle Syphilis | | |
| | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | abs. Zahl | $\frac{0}{00}$ K. | |
| 1881/82 bis 1885/86 | 395,0 | 23,3 | 108,6 | 6,4 | 464,2 | 23,7 | 123,0 | 6,8 | 1100,4 | 36,5 | 220,2 | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1886/87 bis 1890/91 | 262,6 | 14,8 | 53,2 | 3,0 | 445,8 | 19,2 | 87,8 | 3,8 | 1287,0 | 33,9 | 221,0 | 5,8 | 919 | 38,2 | 100 | 4,2 | 1031 | 46,7 | 275 | 12,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1891/92 bis 1895/96 | 370,0 | 18,5 | 106,0 | 5,3 | 646,0 | 23,8 | 157,8 | 5,8 | 1036,2 | 35,2 | 196,4 | 6,7 | 1023,6 | 41,9 | 161,2 | 6,6 | 847,1 | 33,6 | 239,6 | 9,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1896/97 bis 1900/01 | 228,0 | 10,6 | 57,4 | 2,7 | 483,4 | 16,1 | 116,4 | 3,9 | 749,6 | 24,0 | 138,0 | 4,4 | 662,4 | 24,4 | 104,0 | 3,8 | 581,8 | 20,8 | 122,4 | 4,4 | 272,0 | 12,6 | 63,3 | 2,9 | 428,3 | 26,2 | 107,0 | 6,5 | |
| 1901/02 | 214 | 9,6 | 46 | 2,1 | 407 | 12,6 | 75 | 2,3 | 662 | 20,8 | 99 | 3,1 | 502 | 18,3 | 112 | 4,1 | 584 | 19,4 | 148 | 4,9 | 378 | 14,0 | 75 | 2,8 | 584 | 27,9 | 154 | 7,4 | |
| 1902/03 | 196 | 8,9 | 35 | 1,6 | 365 | 11,5 | 56 | 1,8 | 726 | 23,2 | 104 | 3,3 | 432 | 15,8 | 96 | 3,6 | 630 | 21,3 | 138 | 4,7 | 316 | 12,0 | 62 | 2,4 | 598 | 29,0 | 151 | 7,3 | |

1) Vierjähriger Durchschnitt 1882/86.

2) Zugang im Berichtsjahr 1890/91.

3) Dreijähriger Durchschnitt 1898/99 bis 1900/01.

Zugang an venerischen Erkrankungen nach Armeekorps
 in den Jahren 1901/02 und 1902/03 auf 1000 der Iststärke berechnet.



Venerische Erkrankungen

in den größeren¹⁾ Garnisonen der Deutschen Armee, alphabetisch geordnet und auf 1000 Mann der Iststärke berechnet.

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ²⁾ | 1902/03 | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | bis 1885/86 ³⁾ | bis 1890/91 ³⁾ | bis 1895/96 ³⁾ | bis 1900/01 ³⁾ | | Ist- stärke | Zu- gang ‰ K. |
| | Durchschnittszugang ‰ K. | | | | | | |
| Aachen | 39,4 | 42,6 | 24,0 | 11,8 | 8,8 | 1 826 | 6,0 |
| Allenstein | 46,3 ³⁾ | 37,7 | 41,1 | 18,9 | 15,9 | 3 862 | 17,3 |
| Altenburg | 35,3 | 51,1 | 51,6 | 21,2 | 13,9 | 1 188 | 5,9 |
| Altona-Hamburg | 60,5 | 49,3 | 54,4 | 53,6 | 45,8 | 4 489 | 47,0 |
| Amberg | 16,8 ⁴⁾ | 15,1 | 14,4 | 7,6 | 3,6 | 1 633 | 8,0 |
| Augsburg | 32,7 | 29,1 | 37,6 | 31,9 | 27,7 | 2 680 | 35,8 |
| St. Averd | 35,4 | 21,7 | 27,8 | 10,7 | 11,7 | 2 479 | 10,1 |
| Bamberg | 25,3 | 19,1 | 13,4 | 11,1 | 7,3 | 2 181 | 11,5 |
| Bautzen | 47,0 | 34,1 | 24,4 | 19,4 | 16,2 | 1 768 | 22,1 |
| Bayreuth | 18,1 | 7,7 | 7,0 | 6,2 | 9,4 | 2 152 | 12,1 |
| Berlin | 42,6 | 38,0 | 41,8 | 28,3 | 26,8 | 27 694 | 26,3 |
| Bitsch | 16,8 | 14,2 | 6,3 | 12,5 | 6,1 | 1 909 | 8,4 |
| Bonn | 29,7 | 23,2 | 22,6 | 14,6 | 16,8 | 1 421 | 17,6 |
| Brandenburg a. H. | 24,2 | 21,4 | 34,8 | 21,3 | 21,7 | 3 615 | 32,1 |
| Braunschweig | 39,5 | 18,4 | 25,9 | 19,4 | 30,6 | 2 784 | 30,2 |
| Bremen | 24,7 | 22,9 | 31,4 | 14,1 | 12,1 | 1 324 | 20,4 |
| Breslau | 47,0 | 27,0 | 29,2 | 18,5 | 14,7 | 5 581 | 19,4 |
| Brieg | 38,5 | 27,1 | 19,6 | 14,6 | 17,6 | 2 334 | 23,6 |
| Bromberg | 48,8 | 59,7 | 47,6 | 29,9 | 28,4 | 5 355 | 28,4 |
| Cassel | 33,9 | 18,1 | 24,7 | 12,3 | 10,3 | 4 803 | 13,1 |
| Celle | 22,5 | 13,4 | 14,6 | 8,2 | 8,5 | 2 120 | 14,6 |
| Charlottenburg | — | 11,1 | 1,5 | 5,6 | 18,6 | 2 189 | 24,7 |
| Chemnitz | 52,8 | 63,5 | 57,6 | 36,1 | 34,0 | 3 278 | 30,2 |
| Coblenz-Ehrenbreit- stein | 32,6 | 13,8 | 20,0 | 17,9 | 21,3 | 6 833 | 18,3 |
| Cöln-Deutz | 51,3 | 30,9 | 39,6 | 25,3 | 26,8 | 10 122 | 32,8 |
| Colmar i. E. | 28,4 | 33,9 | 32,1 | 18,6 | 16,7 | 2 926 | 14,0 |
| Cosel | 72,0 | 37,8 | 32,8 | 28,0 | 20,5 | 1 261 | 54,7 |
| Cottbus | 43,4 | 25,7 | 51,1 | 20,6 | 17,3 | 1 295 | 15,4 |
| Cüstrin | 31,9 | 21,8 | 26,9 | 27,1 | 13,8 | 1 841 | 16,8 |
| Danzig | 62,9 | 46,5 | 37,0 | 16,8 | 20,7 | 7 548 | 33,3 |
| Darmstadt | 19,2 | 22,7 | 18,1 | 10,9 | 11,5 | 5 163 | 7,2 |
| Dessau | 15,4 | 16,0 | 22,7 | 15,0 | 19,5 | 1 257 | 19,9 |
| Deutsch-Eylau | 60,0 | 39,2 | 30,6 | 19,3 | 17,2 | 2 622 | 11,4 |
| Diedenhofen | 17,0 | 26,3 | 38,9 | 18,3 | 19,0 | 3 036 | 9,2 |
| Dieuze | — | 23,1 ⁴⁾ | 16,6 | 8,6 | 10,3 | 2 683 | 8,2 |
| Döbeln | — | 38,3 ⁴⁾ | 44,0 | 30,0 | 29,1 | 1 778 | 25,3 |
| Dresden | 63,0 | 44,7 | 40,9 | 34,5 | 40,1 | 11 196 | 36,4 |
| Düsseldorf | 43,9 | 41,7 | 38,1 | 22,3 | 31,3 | 3 840 | 29,4 |

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ²⁾ | 1902/03 | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | bis 1885/86 ³⁾ | bis 1890/91 ³⁾ | bis 1895/96 ³⁾ | bis 1900/01 ³⁾ | | Ist- stärke | Zu- gang ‰ K. |
| | Durchschnittszugang ‰ K. | | | | | | |
| Erfurt | 32,1 | 26,3 | 32,5 | 22,0 | 25,8 | 2 020 | 33,2 |
| Erlangen | 29,3 ⁵⁾ | 30,5 | 28,5 | 11,3 | 14,4 | 2 116 | 12,3 |
| Flensburg | 50,6 | 30,9 | 28,6 | 23,8 | 36,9 | 1 289 | 23,3 |
| Frankfurt a. M. | 40,6 | 25,1 | 36,3 | 23,1 | 20,6 | 2 651 | 24,5 |
| Frankfurt a. O. | 34,9 | 25,0 | 31,3 | 24,5 | 18,8 | 5 268 | 15,6 |
| Freiburg i. Baden | 24,3 | 13,8 | 25,4 | 13,9 | 6,7 | 2 813 | 10,3 |
| Fürth | — | 12,6 ⁷⁾ | 31,3 | 1,5 | 0,79 | 1 215 | 0,82 |
| Germersheim | 28,7 | 19,8 | 21,1 | 12,3 | 14,0 | 1 939 | 16,5 |
| Giefßen | 11,9 | 11,2 | 10,2 | 11,4 | 8,8 | 1 930 | 9,3 |
| Glatz | 42,5 | 24,5 | 26,7 | 13,9 | 12,2 | 1 757 | 17,1 |
| Gleiwitz | 55,7 | 38,2 | 33,6 | 30,6 | 27,7 | 1 831 | 21,3 |
| Glogau | 29,0 | 25,8 | 28,1 | 20,9 | 12,1 | 3 395 | 14,7 |
| Gnesen | 62,5 | 57,6 | 36,4 | 30,0 | 42,7 | 2 474 | 24,3 |
| Görlitz | 50,5 | 34,3 | 29,4 | 18,0 | 15,0 | 1 289 | 9,3 |
| Göttingen | 17,5 | 13,6 | 13,3 | 7,7 | 4,2 | 1 855 | 9,7 |
| Goldap | 25,8 ⁶⁾ | 32,2 | 39,8 | 18,5 | 15,1 | 1 406 | 14,2 |
| Graudenz | 54,9 | 61,9 | 43,4 | 25,4 | 26,2 | 5 802 | 23,4 |
| Groß-Lichterfelde | 3,1 | 16,3 | 18,6 | 0,70 | 2,0 | 1 508 | 2,6 |
| Gumbinnen | 20,6 | 21,3 | 22,3 | 18,1 | 17,2 | 2 887 | 18,4 |
| Hagenau | 47,0 | 29,0 | 24,6 | 20,3 | 14,6 | 3 881 | 12,4 |
| Hagenau Truppen- Übungsplatz | — | — | — | — | 0,33 | 3 000 | 0,33 |
| Halberstadt | 30,2 | 17,7 | 31,3 | 21,7 | 15,9 | 2 367 | 16,9 |
| Halle a. S. | 55,5 | 28,7 | 41,0 | 23,3 | 15,5 | 2 061 | 13,6 |
| Hameln | 13,3 | 5,7 | 13,9 | 11,6 | 9,6 | 1 237 | 15,4 |
| Hanau | 14,2 | 13,9 | 15,0 | 15,2 | 14,4 | 1 991 | 13,1 |
| Hannover | 43,7 | 25,6 | 30,1 | 22,2 | 21,2 | 7 215 | 27,9 |
| Heilbronn | 15,2 ⁶⁾ | 22,6 | 19,0 | 4,9 | 5,3 | 1 247 | 3,2 |
| Hildesheim | 17,8 | 16,6 | 20,5 | 10,3 | 10,8 | 1 935 | 10,9 |
| Jauer | 41,3 | 29,3 | 17,3 | 8,5 | 8,6 | 1 192 | 13,4 |
| Ingolstadt | 51,8 | 46,1 | 51,4 | 16,1 | 14,3 | 4 739 | 11,4 |
| Inowrazlaw | — | 27,5 ⁴⁾ | 39,6 | 16,5 | 40,6 | 2 121 | 20,3 |
| Insterburg | 19,7 | 24,0 | 23,7 | 17,2 | 9,6 | 2 848 | 9,1 |
| Jüterbog | 39,1 | 26,9 | 27,1 | 14,4 | 17,3 | 1 951 | 8,7 |
| Kamenz | — | — | — | 17,8 | 18,7 | 1 182 | 27,1 |
| Karlsruhe | 28,7 | 22,5 | 35,0 | 19,7 | 11,5 | 4 465 | 15,9 |
| Königsberg i. Pr. | 58,1 | 28,9 | 31,3 | 23,2 | 29,0 | 9 698 | 28,7 |
| Kolberg | 24,3 | 13,6 | 14,8 | 7,9 | 14,5 | 1 390 | 12,2 |

1) Garnisonen mit einer Iststärke von mehr als 1000 Mann.

2) Die in den früheren Berichten enthaltenen Iststärken sind wegen Mangels an Raum weggelassen worden.

3) 2jähriger Durchschnitt 1884/86.

4) 4jähriger Durchschnitt 1887/91.

5) 4jähriger Durchschnitt 1882/86.

6) 3jähriger Durchschnitt 1883/86.

7) Betrifft nur das Berichtsjahr 1890/91.

| Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ¹⁾ | 1902/03 | | Standort | 1881/82 | 1886/87 | 1891/92 | 1896/97 | 1901/02 ¹⁾ | 1902/03 | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------|------|
| | bis 1885/86 ²⁾ | bis 1890/91 ¹⁾ | bis 1895/96 ¹⁾ | bis 1900/01 ¹⁾ | | Durchschnittszugang ‰ K. | Ist- stärke | | Zu- gang ‰ K. | Durchschnittszugang ‰ K. | Ist- stärke | Zu- gang ‰ K. | | | |
| Konstanz | 9,4 | 15,2 | 17,8 | 14,3 | 8,9 | 1 767 | 11,3 | Posen | 64,8 | 54,1 | 31,3 | 21,6 | 18,1 | 7 600 | 22,9 |
| Krotoschin | 59,1 | 58,1 | 37,6 | 31,4 | 15,1 | 1 748 | 23,5 | Potsdam | 29,6 | 12,7 | 22,0 | 12,8 | 12,8 | 8 698 | 20,7 |
| Lahr | — | — | — | 9,7 ⁴⁾ | 8,6 | 1 568 | 7,7 | Prenzlau | 27,4 | 25,0 | 30,7 | 26,0 | 25,9 | 1 257 | 15,1 |
| Landau | 24,3 | 19,7 | 15,8 | 11,4 | 12,9 | 3 411 | 8,8 | Rastatt | 19,2 | 13,1 | 15,1 | 10,9 | 5,9 | 4 562 | 6,2 |
| Landshut | 60,9 | 49,4 | 57,5 | 47,2 | 59,2 | 1 112 | 27,9 | Rastenburg | — | — | — | 10,1 ⁴⁾ | 18,6 | 1 752 | 18,3 |
| Leipzig | 68,3 | 54,0 | 44,5 | 31,4 | 26,7 | 7 911 | 31,9 | Rawitsch | 26,3 | 30,2 | 27,4 | 13,3 | 12,1 | 1 214 | 19,8 |
| Liegnitz | 27,7 | 26,6 | 21,2 | 16,8 | 7,7 | 1 764 | 20,4 | Regensburg | 34,7 | 30,3 | 28,5 | 15,2 | 12,0 | 1 763 | 13,6 |
| Lissa | 35,3 | 22,6 | 28,1 | 17,9 | 7,9 | 1 243 | 17,7 | Rendsburg | 38,1 | 23,5 | 22,2 | 18,4 | 15,3 | 1 997 | 20,5 |
| Lockstedter Lager | — | — | — | — | — | 3 045 | 0,99 | Riesa | 72,2 ⁵⁾ | 51,1 | 31,9 | 26,2 | 38,1 | 1 866 | 35,9 |
| Ludwigsburg | 31,1 | 17,3 | 18,2 | 9,9 | 12,3 | 5 237 | 7,8 | Rostock | 22,6 | 14,3 | 17,8 | 16,8 | 14,3 | 1 365 | 12,5 |
| Lübeck | 55,7 | 37,8 | 39,6 | 21,8 | 30,7 | 1 241 | 16,9 | Saarbrücken | 22,9 | 20,7 | 21,2 | 20,4 | 13,7 | 3 423 | 15,2 |
| Lyck | 53,8 ²⁾ | 28,7 | 34,4 | 29,8 | 18,6 | 1 922 | 22,4 | Saarburg | 15,1 | 25,8 | 41,5 | 22,6 | 35,3 | 4 005 | 47,9 |
| Magdeburg | 26,1 | 18,2 | 32,6 | 15,0 | 13,2 | 6 921 | 21,4 | Saargemünd | 23,1 | 20,1 | 23,9 | 21,6 | 21,2 | 1 089 | 26,6 |
| Mainz | 28,8 | 20,7 | 22,2 | 16,4 | 15,5 | 8 929 | 9,6 | Saarlouis | 15,9 | 28,5 | 18,1 | 12,6 | 14,0 | 2 365 | 11,8 |
| Mannheim | 28,1 | 19,1 | 18,7 | 11,0 | 17,3 | 1 311 | 10,7 | Schleswig | 19,9 | 16,3 | 15,5 | 12,0 | 17,8 | 1 920 | 21,4 |
| Marienwerder | 21,3 | 18,9 | 25,2 | 10,5 | 12,4 | 1 046 | 9,6 | Schneidemühl | — | 10,0 | 3,3 | 20,5 | 6,6 | 1 171 | 17,9 |
| Meiningen | 13,0 | 14,2 | 19,8 | 16,8 | 12,7 | 1 843 | 13,6 | Schweidnitz | 34,4 | 28,1 | 17,6 | 16,7 | 14,9 | 2 344 | 23,0 |
| Metz | 42,9 | 46,8 | 51,6 | 31,1 | 22,0 | 22 872 | 19,3 | Schwerin | 16,9 | 9,5 | 12,5 | 10,3 | 14,2 | 2 075 | 8,7 |
| Minden | 8,5 | 10,3 | 12,9 | 8,8 | 14,5 | 3 207 | 12,5 | Spandau | 43,4 | 24,7 | 29,6 | 20,9 | 23,1 | 5 948 | 30,4 |
| Mörchingen | — | 21,9 ³⁾ | 13,1 | 10,9 | 11,0 | 4 533 | 12,6 | Stargard i. Pomm. | 16,1 | 17,8 | 13,6 | 7,8 | 7,6 | 1 774 | 11,8 |
| Mülhausen i. E. | 34,5 | 29,0 | 30,7 | 21,8 | 16,4 | 4 207 | 11,9 | Stettin | 36,0 | 22,4 | 27,7 | 15,8 | 24,2 | 4 895 | 14,9 |
| Mülheim a. Ruhr | — | — | — | 3,8 ⁴⁾ | 2,4 | 1 252 | 14,4 | Stralsund | 34,8 | 27,6 | 22,9 | 19,4 | 14,2 | 1 228 | 13,8 |
| München | 64,6 | 56,6 | 57,8 | 37,9 | 46,0 | 10 310 | 33,3 | Straßburg i. E. | 37,5 | 33,7 | 45,3 | 31,6 | 24,8 | 16 948 | 22,7 |
| Münster | 14,5 | 11,8 | 11,9 | 6,3 | 7,0 | 4 154 | 8,7 | Stuttgart | 26,2 | 21,4 | 26,6 | 15,9 | 11,8 | 4 550 | 14,7 |
| Naumburg a. S. | 29,9 | 19,6 | 34,2 | 23,1 | 17,2 | 1 429 | 11,2 | Thorn | 57,8 | 51,0 | 40,0 | 24,9 | 18,5 | 7 988 | 16,7 |
| Neifse | 57,6 | 30,5 | 37,4 | 31,0 | 38,1 | 3 924 | 20,1 | Tilsit | 71,1 | 43,7 | 39,5 | 33,5 | 30,2 | 1 917 | 23,5 |
| Neubreisach | 21,2 | 9,1 | 10,3 | 10,8 | 18,0 | 1 427 | 14,0 | Torgau | 36,1 | 18,5 | 24,9 | 14,3 | 13,2 | 3 027 | 11,6 |
| Neuburg a. D. | 16,5 | 24,4 | 18,6 | 15,9 | 19,6 | 1 590 | 19,5 | Trier | 20,3 | 13,4 | 19,3 | 12,4 | 10,8 | 5 493 | 10,4 |
| Neumünster | 39,1 | 16,7 | 15,8 | 15,9 | 11,9 | 1 198 | 17,5 | Ulm | 18,6 | 11,0 | 17,0 | 11,7 | 8,6 | 7 415 | 12,7 |
| Neu-Ruppin | 34,4 | 23,1 | 24,5 | 11,9 | 12,9 | 1 792 | 15,6 | Weingarten | 16,4 | 11,0 | 12,6 | 5,6 | 5,5 | 1 782 | 1,7 |
| Neu-Ulm | 29,5 | 16,0 | 19,3 | 15,5 | 18,9 | 2 121 | 17,0 | Weisenburg | 24,5 | 15,1 | 17,8 | 8,4 | 9,5 | 1 947 | 21,1 |
| Nürnberg | 43,5 | 46,2 | 41,3 | 25,8 | 29,3 | 3 371 | 27,9 | Wesel | 22,6 | 17,4 | 14,4 | 8,6 | 9,5 | 4 622 | 10,6 |
| Offenburg | — | — | — | 8,4 ⁴⁾ | 3,9 | 1 271 | 8,7 | Wiesbaden | 35,6 | 15,7 | 29,4 | 19,4 | 18,6 | 1 621 | 32,1 |
| Oldenburg | 23,5 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 6,5 | 2 983 | 13,4 | Wittenberg | 23,3 | 18,2 | 28,5 | 23,8 | 9,3 | 2 104 | 20,9 |
| Oppeln | 71,9 | 14,1 | 21,8 | 18,6 | 18,0 | 1 713 | 19,3 | Worms | 21,2 | 14,6 | 20,0 | 9,2 | 12,2 | 1 844 | 13,0 |
| Osnabrück | 30,8 | 7,8 | 6,8 | 5,4 | 2,8 | 1 599 | 6,9 | Wurzen | — | — | — | 26,3 | 16,7 | 1 362 | 21,3 |
| Osterode | — | 29,8 | 23,6 | 16,6 | 22,8 | 2 392 | 24,7 | Würzburg | 50,9 | 33,9 | 26,0 | 14,9 | 17,4 | 3 353 | 16,4 |
| Ostrowo | 33,2 | 27,8 | 39,7 | 23,4 | 13,1 | 1 360 | 27,9 | Zabern | 21,7 | 13,7 | 20,9 | 23,3 | 14,8 | 1 317 | 22,8 |
| Paderborn | 16,4 | 6,3 | 24,3 | 11,1 | 10,4 | 1 806 | 8,9 | Zittau | 64,5 | 29,2 | 29,0 | 32,7 | 25,8 | 1 723 | 26,7 |
| Passau | 33,6 | 22,5 | 27,5 | 28,9 | 19,0 | 1 336 | 26,9 | Zweibrücken | 21,2 ⁵⁾ | 16,0 | 19,0 | 11,4 | 7,8 | 1 279 | 7,0 |
| Pillau | 15,0 | 14,8 | 17,2 | 21,9 | 28,6 | 1 181 | 31,3 | Zwickau | 57,2 | 34,8 | 35,0 | 18,8 | 17,2 | 1 831 | 21,8 |
| Pirna | 26,9 | 32,6 | 34,2 | 30,4 | 21,4 | 1 374 | 28,4 | | | | | | | | |

1) Die in den früheren Berichten enthaltenen Iststärken dieser Jahre sind wegen Mangels an Raum weggelassen worden.

2) 2jähriger Durchschnitt 1884/86.

3) Betrifft nur das Berichtsjahr 1890/91.

4) 3 jähriger Durchschnitt 1898/1901.

5) 4 jähriger Durchschnitt 1882/86.

Reihenfolge der Armeekorps hinsichtlich des Zuganges an

| a) venerische Erkrankungen überhaupt | | | b) darunter Syphilis | | |
|--------------------------------------|------|-----------------|----------------------|------|-----------------|
| Reihenfolge | ‰ K. | Armeekorps | Reihenfolge | ‰ K. | Armeekorps |
| 1 | 34,0 | XII. (1. K. S.) | 1 | 7,3 | XIX. (2. K. S.) |
| 2 | 29,0 | XIX. (2. K. S.) | 2 | 6,9 | XII. (1. K. S.) |
| 3 | 24,7 | Gardekorps | 3 | 5,5 | VI. |
| 4 | 23,2 | XV. | 4 | 5,3 | V. |
| 5 | 22,8 | I. | 5 | 5,2 | I. |
| 6 | 22,4 | VI. | 6 | 4,7 | Gardekorps |
| 7 | 21,4 | III. | 7 | 4,7 | III. |
| 8 | 21,3 | XVII. | 8 | 4,7 | XVII. |
| 9 | 21,0 | IX. | 9 | 4,5 | II. |
| 10 | 18,5 | II. | 10 | 4,3 | X. |
| 11 | 17,9 | V. | 11 | 4,1 | VII. |
| 12 | 17,6 | VIII. | 12 | 4,0 | IX. |
| 13 | 17,2 | VII. | 13 | 3,6 | VIII. |
| 14 | 17,2 | X. | 14 | 3,5 | XVI. |
| 15 | 16,1 | IV. | 15 | 3,3 | XV. |
| 16 | 15,8 | XVI. | 16 | 3,2 | XI. |
| 17 | 15,2 | XI. | 17 | 2,9 | IV. |
| 18 | 12,0 | XVIII. | 18 | 2,4 | XVIII. |
| 19 | 11,5 | XIV. | 19 | 1,8 | XIV. |
| 20 | 8,9 | XIII. (K. W.) | 20 | 1,6 | XIII. (K. W.) |

Wie gewöhnlich hatte der Monat Oktober (Rekruteneinstellung) den höchsten Krankenzugang.

| Monat | Venerische Erkrankungen ‰ K. | Darunter Syphilis ‰ K. |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Oktober | 4,4 | 0,67 |
| November | 1,7 | 0,30 |
| Dezember | 1,0 | 0,22 |
| Januar | 1,7 | 0,34 |
| Februar | 1,6 | 0,37 |
| März | 1,4 | 0,36 |
| April | 1,3 | 0,34 |
| Mai | 1,1 | 0,23 |
| Juni | 1,5 | 0,33 |
| Juli | 1,6 | 0,42 |
| August | 1,6 | 0,36 |
| September | 1,2 | 0,24 |

Nach den Zahlen der nachstehenden Übersicht haben zu der Erhöhung des Gesamtzuganges dieser Gruppe alle drei Unterarten fast gleichmäÙig beigetragen.

Auch die durchschnittliche Behandlungsdauer hat bei diesen Unterarten gleichmäÙig zugenommen.

Beteiligung der einzelnen Unterarten an dem Gesamtzugange und Behandlungsdauer derselben.

| w e g e n | E s g i n g e n z u | | | Durchschnittliche Behandlungsdauer (Tage) |
|--|--|------|---|---|
| | Berichtsjahr a. 1901/02 b. 1902/03 | ‰ K. | % des Gesamtzuganges an venerischen Krankheiten | |
| Trippers und dessen Folgezustände (No. 112 bis 114 des Rapportmusters) | a | 12,0 | 65,5 | 35,1 |
| | b | 12,8 | 66,0 | 37,8 |
| Weichen Schankers und Bubos (No. 115 und 116 des Rapportmusters) | a | 2,3 | 12,8 | 28,1 |
| | b | 2,4 | 12,6 | 31,3 |
| Konstitutioneller Syphilis (No. 117 des Rapportmusters) | a | 4,0 | 21,7 | 38,5 |
| | b | 4,1 | 21,3 | 41,2 |

Die Beobachtung, daß in dem Monat der Rekruteneinstellung der Krankenzugang stets am höchsten war, gab Veranlassung, dieser Erscheinung näher nachzuforschen. Die eingeforderten Nachweisungen ergaben, daß

| | |
|-------------------------|-------|
| im Jahre 1896 | 1461, |
| „ „ 1897 | 1418, |
| „ „ 1898 | 1462, |
| „ „ 1899 | 1462, |
| „ „ 1900 | 1393, |
| „ „ 1901 | 1444, |
| „ „ 1902 | 1629 |

geschlechtskranke Rekruten in die unter preussischer Verwaltung stehenden Armeekorps (Garde-, I. bis XI. und XIV. bis XVIII. Armeekorps) eingestellt waren.

Wie aus den Sanitätsberichten zu entnehmen ist, hatte der ganze Jahreszugang an Geschlechtskrankheiten bei diesen Armeekorps

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| im Berichtsjahre 1896/97 | 9718 = 21,3 ‰ K., |
| „ „ 1897/98 | 9374 = 20,6 „ |
| „ „ 1898/99 | 8856 = 19,5 „ |
| „ „ 1899/1900 | 8325 = 18,3 „ |
| „ „ 1900/01 | 7951 = 17,1 „ |
| „ „ 1901/02 | 8458 = 17,7 „ |
| „ „ 1902/03 | 8743 = 18,9 „ |

betragen.

Die Zahl der geschlechtskrank Eingestellten bildete demnach einen nicht unbeträchtlichen Teil des gesamten Jahreszuganges dieser Krankheitsgruppe. Der Anteil würde sich noch erhöhen, wenn man berücksichtigt, daß von den später im Laufe des Jahres in Zugang kommenden Erkrankungen manche als Rückfälle einer vor dem Dienst Eintritt erworbenen Geschlechtskrankheit aufzufassen sind.

Erste Unterart: Tripper und dessen Folgezustände (ausschließlich Tripper-Blennorrhoe).

(No. 112 bis 114 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 283 | 6747 | 12,8 | 6412 | — | 311 | 6723 | 307 | 36,3 |

Außerdem erkrankten noch 2 Kadetten und 5 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

In allen nicht klar zutage liegenden Fällen wurde die mikroskopische Untersuchung des Harnröhrenausflusses vorgenommen, welche meistens auch für die Art und Dauer der Behandlung ausschlaggebend war.

Der Sitz des Leidens wurde fast eben so allgemein durch die Thompsonsche Zweigläserprobe, in einzelnen Lazaretten auch durch das Urethroskop und Cystoskop festgestellt.

Besonders hartnäckig erwiesen sich die bei der Einstellung gefundenen oft schon jahrelang bestehenden Tripper.

Bei der Behandlung wurden zwar die meisten neueren und neuesten Mittel versucht, auf Grund vielfach unbefriedigender Ergebnisse macht sich aber unverkennbar die Neigung geltend, zu den altbewährten Rezepten insbesondere den Zinksalzen, der Rikord'schen Mischung und dem hypermangansäuren Kali zurückzukehren. (Berichte aus Berlin, Karlsruhe, Frankfurt a. O., Breslau, Trier, Gumbinnen).

In Stetten schwanden die Gonokokken schneller aus dem Ausfluss, wenn nach Spülungen mit Sol. Kal. perm. ein Tampon mit einer Mischung von Jodoform, Perubalsam und Resorcin zu gleichen Teilen bis zum nächsten Urinlassen in die Harnröhre eingelegt wurde.

St.-A. Friedrichs-Braunschweig gab nach Casper¹⁾ 3 bis 4 mal täglich abwechselnd Einspritzungen von Sol. Kal. permang. 1:10000 und Zinklösung 1:200. Sobald der Ausfluss arm an Tripperkeimen war, wurde statt des Permanganats eine Höllensteinlösung verwandt.

In chronischen Fällen fanden die Janetschen Spülungen des hinteren Teiles der Harnröhre ausgedehnte Anwendung.

Außerdem wurden vielfach die Guyonschen Einträufelungen, auch mit Salben armierte Bougies und die Noffkeschen Protargol-Jodoform- und Airolstäbchen mit gutem Erfolge in Gebrauch genommen. (Berichte aus Königsberg i. Pr., Bromberg, Frankfurt a. O., Neifse, Potsdam, Trier).

Die örtliche Ätzung erweiterter Littréscher Drüsen-säcke unter endoskopischer Beleuchtung leistete St.-A. Fischer-Leipzig gute Dienste.

Bei Verengerungen der Harnröhre oder bei Infiltraten wurden Dehnungen mit Metallsonden (Oberländer und Kollmannscher Dilatator, Caspersche Rinnensonde, Rosersche Sonden) in Neifse, Stuttgart und Danzig verwendet.

Die Massage der Harnröhre hält St.-A. Esser-Trier für nützlich.

Für die Behandlung der Nachtripper empfiehlt O.-St.-A. Koerner-Bromberg eine Einspritzung von Chromsäurelösung 1:4000 etwa 2 bis 3 Minuten lang in der Harnröhre zu belassen und unmittelbar danach eine gleichstarke Höllensteinlösung einzuspritzen.

Auf Innehaltung leichter Diät und der Bettruhe wurde durchgehends Wert gelegt.

Die üblichen inneren Mittel wurden mehrfach neben der örtlichen Behandlung verwendet.

St.-A. Herr berichtet, daß einige in Posen behandelte Trippererkrankungen bei Bettruhe, leichter Diät und innerlicher Darreichung von Copaiv-Balsam ohne Einspritzungen heilten.

Wie in früheren Jahren wurden die Kranken erst dann als geheilt angesehen, wenn nach Übergang zu gewöhnlicher Lebensweise und Biergenuß keine Tripperkokken mehr nachgewiesen werden konnten.

Bei Behandlung der Nebenhodenentzündung wandte O.-A. Spaethen-Berlin besonders bei frischen Erkrankungen Heißluftapparate mit gutem Erfolge an; allerdings wurde die Eisblase zuweilen besser vertragen. — Daß die Blutentziehung durch Blutegel stets einen sehr schnellen schmerzlindernden Erfolg gehabt habe, berichtet O.-St.-A. Boeckler-Offenburg.

Periurethrale Abszesse wurden mehrfach beobachtet und heilten nach Spaltung.

Zweimal wurde die Ansiedelung von Tripperpilzen in einem paraurethralen Gange festgestellt. Nach Ausrottung des Ganges erfolgte Heilung. (St.-A. Schulz-Breslau, St.-A. Pfitzmann-Dresden).

Bei chronischer Entzündung der Vorsteherdrüse erwies sich in St. A. vold die Massage unter gleichzeitiger Anwendung von Ichthyolölklystieren (10 %) nutzbringend (St.-A. Stumpff).

Von Tripperrheumatismus sind 42 Fälle berichtet, von denen wohl die meisten schwerere Erkrankungen waren, während die vorübergehenden Gelenkreizungen im allgemeinen unerwähnt geblieben zu sein scheinen.

Die Kniegelenke waren 17mal, die Fußgelenke 5 mal, Hand- und Schultergelenke je 4 mal, und das Brustbein-Schlüsselbeingelenk 1 mal betroffen. 2 mal waren fast sämtliche Gelenke erkrankt.

Über die Entstehungsursachen dieser Mitkrankheit des Trippers wird von St.-A. Brüggemann-Rastenburg mitgeteilt, daß ein später sehr schwer mit Erkrankung zahlreicher Gelenke und mit Herzklappenfehler verlaufener Tripperrheumatismus mit einer Schwellung des rechten Kniegelenks begann, die durch einen Hammerschlag hervorgerufen war.

Gute Erfolge erzielte die Behandlung, welche neben der innerlichen Darreichung von Salicylsäure und ihren Derivaten anfangs in Ruhigstellung der Gelenke, Alkoholverbänden, Watte-einpackungen, feuchten Verbänden, später in heißen Bädern, Dampfduschen mit nachfolgenden kalten Übergießungen, Massage, Einpinselungen mit Jodtinktur oder reinem Ichthyol oder Einreibungen mit Jodkali-, Silber- oder Ichthyolsalbe bestand.

Nur drei Erkrankungen führten wegen zurückbleibender Gelenksteifigkeit zur Dienstunbrauchbarkeit.

4 mal traten im Gefolge des Trippers Herzklappenfehler auf — 3 mal Schlußunfähigkeit der zweizipfligen Herzklappe und 1 mal Schlußunfähigkeit der Aortenklappen — drei von diesen Leuten wurden als dienstunbrauchbar, einer als invalide entlassen.

¹⁾ Berliner Klinische Wochenschrift 1900, No. 22.

Zweite Unterart: Weicher Schanker und Bubo.

(No. 115 und 116 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 64 | 1290 | 2,4 | 1248 | — | 13 | 1261 | 93 | 29,8 |

Über einen phagedänischen Schanker berichtet St.-A. Haering-Danzig: Trotz ausgedehnter Nekrosen kam die Erkrankung nach Spaltung der Vorhaut zur Heilung. Die Leistenröden waren nicht geschwollen.

Bei einem anderen Kranken in Mainz war das Geschwür auf die Harnröhre übergegangen, wo es große Zerstörungen verursachte. Heilung erfolgte erst, als eine dauernde Tropfvorrichtung mit 3 0/10iger Borlösung angewandt wurde (O.-St.-A. Kunow).

Bei der Behandlung der weichen Schankergeschwüre scheint neben der Verwendung zahlreicher neuerer Mittel, wie Wasserstoffsperoxyd, Europhen, Xeroform, Airol die Bepudering mit Jodoform immer noch am meisten bevorzugt zu werden.

Bei den Bubonen gelang es teils die entzündlichen Erscheinungen durch Alkoholverbände, hydropathische Umschläge und Einreibungen mit grauer Salbe zum Rückgang zu bringen, teils durch feuchte Umschläge oder Heißluftbehandlung die Erweichung zu beschleunigen.

Die Langsche Methode wird nicht erwähnt.

Einige Berichtersteller betonen, daß sie die Einschnitte erst nach völliger Erweichung der Drüsen vornahmen. St.-A. Remmert-Berlin nahm 11 mal Ausschälungen vor, bei denen er mehrmals größere Abszesse fand, obgleich keine Fluktuation nachweisbar gewesen war.

Mehrfach gelang es, den Heilungsprozess der nach der Ausschälung der Drüsen zurückgebliebenen Wundhöhle abzukürzen, wenn die Wundränder angefrischt und zugenäht wurden.

Dritte Unterart: Konstitutionelle Syphilis.

(No. 117 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 153 | 2179 | 4,1 | 2130 | — | 75 | 2205 | 127 | 38,5 |

Von den 2179 Zugängen an Syphilis waren 238 einmal, 37 je zweimal, 3 je dreimal und 1 viermal rückfällig, so daß die Zahl der Neuerkrankten 1854 beträgt.

7 mal befand sich die Eingangspforte des Giftes nicht an den Geschlechtsteilen und zwar 1 mal am linken kleinen Finger (Bromberg) und 6 mal an den Lippen (Hannover 4 mal, Gotha, Metz-Montigny).

Als Begleiterscheinungen wurde 1 mal Gelbsucht und 4 mal Regenbogenhautentzündung beobachtet; in Ulm wird einmal hartnäckige Ischias, die zur Dienstunbrauchbarkeit führte, auf Syphilis zurückgeführt.

Bei 3 älteren Unteroffizieren traten tertiäre zerstörende Prozesse in der Nase und am Gaumen auf.

In Königsberg i. Pr. beobachtete O.-St.-A. Nickel einmal Krämpfe, die bald nach Beginn einer Schmierkur auftraten, sich bis zum 12. Tage nach Beginn der Kur einige Male wiederholten und unter dem Bilde der von Fournier beschriebenen Epilepsie auf syphilitischer Basis verliefen. Bei einem anderen Syphilitischen derselben Stube traten wenige Tage nach dem letzten Anfall seines Kameraden kurz hintereinander 2 Krampfanfälle auf, die jedoch mehr den Verlauf hysterischer Krämpfe nahmen. Die Anfälle kehrten später nicht wieder. Beide Leute blieben dienstfähig.

Über das Auftreten vorübergehender maniakalischer Erregungszustände mit Sinnestäuschungen im Verlaufe der Syphilis berichtet St.-A. Lobedank-Hannoversch-Münden.

Einen Fall von galoppierender Syphilis, die in China erworben wurde und nach wenigen Monaten zu tertiären Erscheinungen führte, erwähnt St.-A. Friedrichs-Braunschweig. Heilung wurde durch Schmierkur und sehr hohe Dosen Jodkali erzielt.

Eine ebenfalls in China erworbene syphilitische Erkrankung mit umfangreichen tiefgreifenden von austernschalenartigen Krusten (Rupien) bedeckten Geschwüren wurde durch eine Kur in Aachen geheilt, jedoch erst, nachdem beide Nasenflügel zerstört waren (St.-A. Schröder).

Zwei Fälle von sehr bösartiger Syphilis seien noch erwähnt:

Eine sehr hartnäckige, jeder Behandlung trotzende tertiäre Erkrankung, die stets sofort wieder aufflammte, wenn die Kur unterbrochen oder als beendet angesehen wurde, verursachte bei einem Feldwebel in Berlin große Verschwärungen am Rachen, am hinteren Nasenhöhleneingang und im Kehlkopf. Durch Zerstörung des größten Teils vom weichen Gaumen, war das Schlucken erschwert. Durch das langwierige fieberhafte Leiden war der Kranke so stark heruntergekommen, daß er entlassen und einem Zivilkrankenhause überwiesen werden mußte. (St.-A. Brandt.)

Verhältnismäßig frühes Auftreten tertiärer Formen kam bei einem Unteroffizier in Mülhausen i. E. zur Beobachtung. Im Januar angesteckt, hatte er sich anfangs der militärärztlichen Behandlung entzogen, war aber im März und April mit einer Schmierkur behandelt und vorläufig geheilt. Im Juni trat ein fressendes Geschwür an der Eichel auf, das trotz antisiphilitischer Kuren nicht heilte. Im Januar des folgenden Jahres mußte das Glied amputiert werden. — Die Wunde heilte glatt, doch traten bald unter Fieberbewegungen markstückgroße Geschwüre auf der Stirn, im Rachen, an der Brust und an den Beinen, sowie knollige Verdickungen des linken Hodens und Nebenhodens auf. — Um die Mitte dieses Jahres bildeten sich trotz einer inzwischen gebrauchten Kur in Aachen größere schmerzhaft Knochenaufreibungen auf dem rechten Stirnhöcker, Verdickungen der Gelenkenden der rechten Speiche und Elle, beider rechten Knöchel und des linken inneren Knöchels sowie tiefe Geschwüre in der Mitte des harten Gaumens, an der Nasenwurzel und am rechten Oberschenkel.

Auch dieser Kranke mußte nach Ablauf seiner Kapitulation einem Zivilkrankenhause überwiesen werden. Beide Kranke sind später gebessert worden. (St.-A. Jahn.)

Die Behandlung der sekundären Syphilis bestand in der Mehrzahl der Fälle in energischer Schmierkur bis zu 180 g neben kräftiger Kost und sorgfältiger Mundpflege.

Außerdem gelangten in einer größeren Anzahl von Garnisonen intramuskuläre Einspritzungen von Sublimat, Hydrargyrum salicylicum, bicyanatatum oder chloratum zur Anwendung.

Daneben wurde die Behandlung der örtlichen Erscheinungen in der bisher üblichen Weise gehandhabt. Bei älteren Fällen wurde neben dem Quecksilber stets Jodkali gereicht. In einigen Fällen leisteten auch Jodipincinspritzungen gute Dienste (O.-A. Spaethen-Berlin). Bäder und Schwitzkuren dienten zur Beförderung des Stoffwechsels.

O.-St.-A. Herrmann-Hildesheim wandte an Stelle von grauer Salbe 50% Quecksilbervasogen an und rühmt dieses Mittel, weil es sich leichter einreibt und besser resorbiert werden soll. Auch ist die Behandlung angeblich billiger, da statt 4 g Ung. ciner. nur 3 g Quecksilbervasogen gebraucht werden sollen.

Mit dem Beginn der Schmierkur wurde im allgemeinen bis zum Eintritt der Sekundärerkrankungen gewartet. St.-A. Remmert-Berlin hat nur ausnahmsweise Kranke mit geheiltem harten Schanker bis zum Ausbruch der Sekundärerkrankungen im Lazarett behalten. Die

Leute wurden nach entsprechender Belehrung von dem Truppenarzt weiter beobachtet. Bei der Entlassung wurden die Kranken in einigen Fällen angewiesen, sich nach einem Vierteljahre zu einer erneuten Kur einzufinden.

Die 3 bis 4 malige Wiederholung der Kur, auch ohne daß ein Rückfall abgewartet wird, verlangt St.-A. Wendel-Stuttgart. Diese wiederholte Behandlung im Sinne Fourniers könnte, wenn der Betreffende frei von manifesten Erscheinungen der Lues ist, ohne ihn dem Dienste zu entziehen und ohne ihn krank zu führen, in der Weise durchgeführt werden, daß in wöchentlichen Zwischenräumen unlösliche Quecksilbersalze eingespritzt würden, oder daß graue Salbe nach der von Welander angegebenen Weise bezw. ein Blaschkoscher Merkulintschurz zur Anwendung gelangte.

VIII. Gruppe: Augenkrankheiten.

(No. 118 bis 134 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | | |
| 158 | 7923 | 15,0 | 7510 | 92,9 | — | — | 429 | 5,3 | 7939 | 98,2 | 142 | 105 492 | 13,1 |

Ausßerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 65 Kadetten und 71 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Im Vergleich zum Vorjahre ist der Zugang an Augenkrankheiten um ein geringes gestiegen.

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

1891/92 bis 1895/96 . . . 11 593,2 Mann = 24,6 ‰ K.,

1896/97 „ 1900/01 . . . 9 506,8 „ = 18,3 „

im Jahre 1901/02 . . . 8 017 „ = 14,8 „

im Jahre 1902/03 . . . 7 923 Mann = 15,0 ‰ K.

Gesamtzugang der Augenkrankheiten nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|-------------|------------------|---------|-----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. . . . | 595 | 14,4 | XII. (I. K. S.) | 136 | 6,8 |
| I. . . . | 663 | 21,0 | XIII. (K. W.) | 296 | 13,4 |
| II. . . . | 445 | 17,2 | XIV. . . . | 397 | 12,5 |
| III. . . . | 323 | 13,7 | XV. . . . | 491 | 15,7 |
| IV. . . . | 288 | 12,9 | XVI. . . . | 490 | 17,9 |
| V. . . . | 372 | 14,5 | XVII. . . . | 499 | 16,9 |
| VI. . . . | 419 | 16,2 | XVIII. . . . | 420 | 16,0 |
| VII. . . . | 426 | 15,8 | XIX. (2. K. S.) | 269 | 13,1 |
| VIII. . . . | 448 | 16,7 | | | |
| IX. . . . | 323 | 12,9 | I. K. B. . . | 465 | 20,0 |
| X. . . . | 303 | 13,8 | II. „ . . . | 438 | 20,5 |
| XI. . . . | 320 | 15,4 | III. „ . . . | 394 | 21,2 |

Gesamtzugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 821 | 771 | 565 | 774 | 731 | 752 | 619 | 652 | 666 | 670 | 512 | 390 |
| ‰ K. | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,95 | 0,81 |

A. Ansteckende Augenkrankheiten.

(No. 118 bis 122 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 15 | 253 | 0,48 | 198 | — | 60 | 258 | 10 | 35,1 |

Ausßerdem erkrankten unter No. 118 des Rapportmusters noch 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Mit ansteckenden Augenkrankheiten kamen in militärärztliche Behandlung im Durchschnitt der Jahre:

1881/82 bis 1885/86 . . . 1400,8 Mann = 3,7 ‰ K.,

1886/87 „ 1890/91 . . . 837,0 „ = 2,0 „

1891/92 „ 1895/96 . . . 652,1 „ = 1,4 „

1896/97 „ 1900/01 . . . 404,4 „ = 0,78 „

im Jahre 1901/02 . . . 267 „ = 0,49 „


im Jahre 1902/03 . . . 253 Mann = 0,48 ‰ K.

Die höchste Zugangsziffer hat diesmal das XVII. Armeekorps ($2,3 \frac{0}{00}$ K.) aufzuweisen; dann folgen in absteigender Reihe das I. mit 1,5, III. mit 0,94, II. mit 0,93 und das XVI. Armeekorps mit $0,92 \frac{0}{00}$ K.


Im vorigen Jahre war die Reihenfolge: XVI., I., XVII. und II. Armeekorps.

Die Verminderung der ansteckenden Augenkrankheiten gegen das Vorjahr war am größten im XVI., V. und II. Armeekorps (um $0,98$, $0,25$ und $0,17 \frac{0}{00}$ K.), während beim XVII., III. und VI. Armeekorps eine Zunahme von 1,0, $0,56$ und $0,20 \frac{0}{00}$ K. stattgefunden hat.

Zugang in ansteckenden Augenkrankheiten in $\frac{0}{00}$ K. nach Armeekorps.



Monatlicher Zugang an ansteckenden Augenkrankheiten auf Zehntausend der Monatsstärke berechnet.



Der Zugang war im Oktober, dem Monat der Rekruteneinstellung, wie gewöhnlich, am höchsten.

In welcher Weise die einzelnen Krankheitsformen (ausschließlich No. 122, Tripperblennorrhoe) an der Ge-

samtzahl der ansteckenden Augenerkrankungen teilgenommen haben, ist in nachstehender Tabelle für die am stärksten beteiligten Armeekorps ersichtlich gemacht.

Wegen der mit Beginn des Berichtsjahres 1896/97 einsetzenden Änderung des Rapportmusters mußten bei den ersten beiden Krankheitsformen die Zahlen der früheren Jahre unberücksichtigt bleiben.

Zusammenstellung über die Verteilung des Zuganges auf die einzelnen Arten der ansteckenden Augenkrankheiten von den vier am meisten heimgesuchten Armeekorps und der Armee.

| J a h r | Granulöser Bindehautkatarrh | | | Granulöse Bindehauterkrankung und Folgezustände | | | Akute Blennorrhoe | | | Chronische Blennorrhoe | | | Summe der ansteckenden Augenkrankheiten (ausschließlich Tripperblennorrhoe) | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------|---|----------------------|---------------|------|
| | Zu- gang ‰ K. | Abgang ¹⁾ | | Zu- gang ‰ K. | Abgang ¹⁾ | | Zu- gang ‰ K. | Abgang ¹⁾ | | Zu- gang ‰ K. | Abgang ¹⁾ | | Zu- gang ‰ K. | Abgang ¹⁾ | | |
| | | dienst- fähig | ander- weitig | | dienst- fähig | ander- weitig | | dienst- fähig | ander- weitig | | dienst- fähig | ander- weitig | | dienst- fähig | ander- weitig | |
| I. Armeekorps | 1881/82 bis 1885/86 | — | — | — | — | — | 1,0 | 85,3 | 14,7 | 0,01 | 100,0 | — | 18,2 | 90,9 | 9,1 | |
| | 1886/87 bis 1890/91 | — | — | — | — | — | 0,20 | 75,0 | 25,0 | — | — | — | 9,7 | 86,3 | 13,7 | |
| | 1891/92 bis 1895/96 | — | — | — | — | — | 0,02 | 100,0 | — | 0,02 | 50,0 | 50,0 | 5,8 | 85,8 | 14,2 | |
| | 1896/97 bis 1900/01 | 1,7 | 98,4 | 1,6 | 0,79 | 86,0 | 14,0 | 0,41 | 100,0 | — | — | — | 2,5 | 94,5 | 5,5 | |
| | 1901/02 | 1,2 | 100,0 | — | 0,44 | 100,0 | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 100,0 | — | |
| | 1902/03 | 1,0 | 100,0 | — | 0,51 | 92,9 | 7,1 | 0,03 | — | 100,0 | — | — | — | 1,5 | 95,8 | 4,2 |
| II. Armeekorps | 1881/82 bis 1885/86 | — | — | — | — | — | 0,51 | 89,2 | 10,8 | 0,04 | 66,7 | 33,3 | 13,4 | 94,1 | 5,9 | |
| | 1886/87 bis 1890/91 | — | — | — | — | — | 0,11 | 73,3 | 26,7 | 0,01 | — | 100,0 | 5,1 | 84,1 | 15,9 | |
| | 1891/92 bis 1895/96 | — | — | — | — | — | 0,03 | 75,0 | 25,0 | 0,01 | — | 100,0 | 2,7 | 78,3 | 21,7 | |
| | 1896/97 bis 1900/01 | — | 88,3 | 11,7 | — | 28,1 | 71,9 | — | — | — | — | — | — | 81,1 | 18,9 | |
| | 1901/02 | 1,0 | 74,1 | 25,9 | 0,08 | 33,3 | 66,7 | — | — | — | — | — | 1,1 | 70,0 | 30,0 | |
| | 1902/03 | 0,77 | 66,7 | 33,3 | 0,15 | — | 100,0 | — | — | — | — | — | 0,93 | 58,3 | 41,7 | |
| XVI. Armeekorps | 1891/92 bis 1895/96 | — | — | — | — | — | 0,03 | 75,0 | 25,0 | 0,02 | 50,0 | 50,0 | 1,2 | 62,2 | 37,8 | |
| | 1896/97 bis 1900/01 | 0,47 | 79,7 | 20,3 | 0,07 | 40,0 | 60,0 | — | — | — | — | — | 0,55 | 74,7 | 25,3 | |
| | 1901/02 | 1,8 | 89,1 | 10,9 | 0,15 | 75,0 | 25,0 | — | — | — | — | — | 1,9 | 88,0 | 12,0 | |
| | 1902/03 | 0,92 | 63,0 | 37,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,92 | 63,0 | 37,0 | |
| XVII. Armeekorps | 1891/92 bis 1895/96 | — | — | — | — | — | 0,06 | 42,9 | 57,1 | — | — | — | 5,0 | 83,7 | 16,3 | |
| | 1896/97 bis 1900/01 | 2,3 | 95,8 | 4,2 | 0,33 | 73,9 | 26,1 | — | — | — | — | — | 2,7 | 93,2 | 6,8 | |
| | 1901/02 | 0,90 | 88,9 | 11,1 | 0,33 | 80,0 | 20,0 | 0,03 | 100,0 | — | 0,03 | 100,0 | 1,3 | 87,2 | 12,8 | |
| | 1902/03 | 1,8 | 98,2 | 1,8 | 0,37 | 81,8 | 18,2 | — | — | — | 0,03 | 100,0 | 2,2 | 95,5 | 4,5 | |
| Armee | 1881/82 bis 1885/86 | — | — | — | — | — | 0,15 | 86,2 | 13,8 | 0,01 | 72,2 | 27,8 | 3,7 | 89,0 | 11,0 | |
| | 1886/87 bis 1890/91 | — | — | — | — | — | 0,06 | 74,2 | 25,8 | 0,01 | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 81,5 | 18,5 | |
| | 1891/92 bis 1895/96 | — | — | — | — | — | 0,02 | 76,0 | 24,0 | 0,01 | 40,0 | 60,0 | 1,4 | 76,7 | 23,3 | |
| | 1896/97 bis 1900/01 | 0,64 | 79,4 | 20,6 | 0,12 | 67,8 | 32,2 | 0,01 | 96,2 | 3,8 | — | 44,4 | 55,1 | 0,77 | 77,7 | 22,3 |
| | 1901/02 | 0,40 | 80,9 | 19,1 | 0,08 | 73,5 | 26,5 | — | 100,0 | — | — | 100,0 | — | 0,49 | 79,8 | 20,2 |
| | 1902/03 | 0,38 | 77,8 | 22,2 | 0,08 | 73,7 | 26,3 | 0,01 | 75,0 | 25,0 | — | 100,0 | — | 0,47 | 77,3 | 22,7 |

Erste Unterart: Die kontagiöse Augenentzündung.
(Nr. 118 und 119 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|---------------|-------------|---------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 15 | 244 | 0,46 | 193 | — | 57 | 250 | 9 | 34,3 |

¹⁾ ‰ des Abganges.

Außerdem erkrankte unter No. 118 des Rapportmusters 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe sechste Abteilung des II. Teils.)

Die Mehrzahl der Kranken war schon vor der Einstellung mit diesem Leiden behaftet gewesen. In mehreren Berichten ist erwähnt, daß viele in den westlichen Armeekorps zugegangene Kranke aus den Ostprovinzen stammten. Eine endemische Verbreitung hat die Erkrankung in der Militärbevölkerung nirgends angenommen. Über Erblindungen durch die Krankheit ist nichts berichtet.

Die Behandlung bestand im wesentlichen in Abreibungen der Lidbindehäute mit schwachen Höllenstein- bzw. Sublimatlösungen, in Anwendung des Kupferstiftes, der Knappschens Rollpinzette (O.-St.-A. Krause-Königsberg i. Pr. empfiehlt den Kuhn'schen Expressor) und in Anritzen der Follikel mit nachfolgender Auskratzung. Bei schweren Erkrankungsformen erfolgte die Ausschneidung der Übergangsfalte oder auch des Lidknorpels.

Zweite Unterart: Akute und chronische Blennorrhoe.

(No. 120 und 121 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 5 | 0,01 | 4 | — | 1 | 5 | — | 62,4 |

Bei einem Musketier in Königsberg i. Pr. verlief eine beiderseitige akute Blennorrhoe äußerst stürmisch. Es bestand kein Harnröhrentripper, und es konnten auch im Sekret keine Tripperkokken nachgewiesen werden. Es kam auf dem rechten Auge zum Hornhautdurchbruch und Vorfall der Regenbogenhaut. Durch die erst drei Wochen nach der Erkrankung begonnene spezialistische Behandlung konnte eine mäßige Wiederherstellung der Sehleistung erreicht werden. — Invalide. (O.-St.-A. Krause.)

Dritte Unterart: Tripper-Blennorrhoe.

(No. 122 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 4 | 0,01 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 55,5 |

Ein Arbeitssoldat, der bei gleichzeitigem chronischen Harnröhrentripper an einer sehr hartnäckigen chronischen Tripper-Blennorrhoe litt, behielt Trübungen auf der Hornhaut zurück, die ihn dienstunbrauchbar machten (St.-A. Peters-Magdeburg). Die übrigen Erkrankungen dieser Unterart hatten keine bemerkenswerten Komplikationen.

Die Behandlung durch Pinselungen der Bindehaut mit 1 bis 2%iger Höllensteinlösung und nachfolgender Neutralisierung bewährte sich wieder.

Verteilung des Zuganges auf die einzelnen Augenkrankheiten.

| Nummer des Rapport- musters | Bezeichnung der Krankheiten | Als Be- stand wurden über- nommen | Zugang | | A b g a n g | | | | Behandlungstage | |
|--------------------------------------|--|---|------------------|---------|-------------|------|----------------|------------------|-----------------|--|
| | | | absolute Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | ge- storben | ander- weitig | ins- gesamt | für jeden Kranken durch- schnitt- lich |
| 123 bis 125 | Krankheiten der Lider, der Bindehaut und der Tränenorgane | 66 | 6068 | 11,5 | 5963 | 97,2 | — | 96 | 55 817 | 9,1 |
| 126 | Krankheiten der Augenmuskeln | — | 22 | 0,04 | 16 | 72,7 | — | 5 | 425 | 19,3 |
| 127 | Krankheiten der Hornhaut | 47 | 964 | 1,8 | 939 | 92,9 | — | 37 | 22 056 | 21,8 |
| 128 bis 133 | Krankheiten und Fehler der inneren Augen- teile | 20 | 409 | 0,78 | 218 | 50,8 | — | 197 | 12 837 | 29,9 |
| 134 | Andere nicht ansteckende Augenkrankheiten | 10 | 207 | 0,39 | 176 | 81,1 | — | 34 | 4 942 | 22,8 |

B. Nicht ansteckende Augenkrankheiten.

(No. 123 bis 134 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 143 | 7670 | 14,6 | 7312 | — | 369 | 7681 | 132 | 12,3 |

Außerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 65 Kadetten und 70 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang dieser Unterabteilung betrug:

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| im Jahre 1894/95 | 11 901 Mann = 23,5 ‰ K., |
| „ „ 1895/96 | 10 728 „ = 20,9 „ |
| „ „ 1896/97 | 10 172 „ = 19,8 „ |
| „ „ 1897/98 | 9 880 „ = 19,2 „ |
| „ „ 1898/99 | 8 969 „ = 17,4 „ |
| „ „ 1899/1900 | 8 512 „ = 16,3 „ |
| „ „ 1900/01 | 7 979 „ = 15,1 „ |
| „ „ 1901/02 | 7 750 „ = 14,3 „ |

im Jahre 1902/03 7 670 Mann = 14,6 ‰ K.

Verteilung des Zuganges auf die Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|----------------|---------|-----------------------|----------------|---------|
| | absol. Zahl | ‰ K. | | absol. Zahl | ‰ K. |
| G. | 592 | 14,3 | XII. (1. K. S.) . . . | 136 | 6,8 |
| I. | 614 | 19,4 | XIII. (K. W.) . . . | 296 | 13,4 |
| II. | 421 | 16,3 | XIV. | 397 | 12,5 |
| III. | 301 | 12,8 | XV. | 483 | 15,5 |
| IV. | 282 | 12,6 | XVI. | 465 | 17,0 |
| V. | 359 | 14,0 | XVII. | 432 | 14,6 |
| VI. | 405 | 15,7 | XVIII. | 418 | 15,9 |
| VII. | 420 | 15,6 | XIX. (2. K. S.) . . | 265 | 12,9 |
| VIII. | 446 | 16,6 | | | |
| IX. | 320 | 12,8 | I. K. B. | 464 | 20,0 |
| X. | 301 | 13,7 | II. „ „ | 434 | 20,3 |
| XI. | 317 | 15,3 | III. „ „ | 394 | 21,8 |

Den geringsten Krankenzugang hatte danach das XII. (1. K. S.), XIV. und IV. Armeekorps, den höchsten das I., XVI. und VIII. Armeekorps aufzuweisen.

Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, in welchem Maße die einzelnen Krankheitsformen an der Gesamtzahl der Erkrankungen beteiligt gewesen sind.

Außerdem erkrankten unter No. 123 bis 125 des Rapportmusters noch 60 Kadetten, 63 Unteroffizier-Vorschüler und 1 Mann von der Schloßgarde-Kompagnie,
 unter No. 127 des Rapportmusters 3 Kadetten und 5 Unteroffizier-Vorschüler,
 unter No. 128 bis 133 des Rapportmusters 1 Kadett und 1 Unteroffizier-Vorschüler,
 unter No. 134 des Rapportmusters 1 Kadett. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Erste Unterart: Krankheiten der Lider, der Bindehäute und der Tränenorgane.

(No. 123 bis 125 des Rapportmusters.)

Ein starkes Hautemphysem beider Lider des linken Auges beobachtete O.-St.-A. Schulz-Straßburg i. E. bei einem Pionier, der nach einem Kopfsprung ins Wasser Nasenbluten bekam und nach heftigem Schnauben die linke Lidspalte nicht mehr öffnen konnte. Unter leichter Massage erfolgte bald Heilung.

Ein Mann, der bei sich durch Einbringen eines 1,5 cm langen Streichholzstückes in den Bindehautsack einen hartnäckigen Bindehautkatarrh unterhielt, wurde von St.-A. Oberbeck-Altona entlarvt. Nach Abschluß des Auges wurde Heilung und Dienstfähigkeit erzielt.

Die Behandlung frischer Tränensackleiden mittels Sonden — zuweilen nach vorheriger Schlitzung der Tränenröhrchen — war meist erfolgreich (Berlin, Altona, Königsberg i. Pr., Paderborn, Osnabrück, Konstanz, Metz).

Auch einige hartnäckige und veraltete Leiden konnten durch Entfernung des Tränensackes oder der Tränenrüse geheilt werden (Freiburg i. Baden, Gießen, Magdeburg).

Zweite Unterart: Krankheiten der Augenmuskeln.

(No. 126 des Rapportmusters.)

Über Schieloperationen vergleiche die Operationsliste.

Von den 4 berichteten Augenmuskellähmungen waren 3 im Gebiet des 3. Hirnnerven aufgetreten. — 2 mal (Königsberg i. Pr., Breslau) war die Ursache Syphilis, einmal (Hannover) wurde keine Ursache ermittelt. Eine Lähmung im Gebiet des 6. Gehirnnerven (Danzig) war durch Bruch der Schädelgrundfläche verursacht.

Zwei von diesen Kranken wurden wieder dienstfähig.

Dritte Unterart: Krankheiten der Hornhaut.

(No. 127 des Rapportmusters.)

Die durch mechanische Verletzungen hervorgerufenen und auf Grund einer skrofulösen Veranlagung entstandenen Hornhautleiden waren vorwiegend leichter Art.

Besondere Erwähnung verdienen 9 Erkrankungen von tiefliegender (parenchymatöser bzw. interstitieller) Hornhautentzündung:

Als Ursache wurde 1 mal erworbene (Gleiwitz), 1 mal angeborene Syphilis nachgewiesen (Berlin). Einmal trat die Krankheit am 5. Tage einer Lungenentzündung auf (Offen-

burg) und 1 mal beobachtete O.-St.-A. Krause-Königsberg i. Pr. ebenfalls im Anschluß an eine Lungenentzündung die seltene, in einzelnen kleinen Herden auftretende Form der tiefliegenden Hornhautentzündung (*Keratitis punctata*). Bei den übrigen Erkrankungen blieb die Ursache unbekannt. Nur 3 mal wurde die Erhaltung der Dienstfähigkeit erzielt.

Eine bläschenartige Hornhauterkrankung wurde ohne auffindbare Ursache bei einem Mann während seiner 2jährigen Dienstzeit 6 mal rückfällig (St.-A. Stumpf-St. A v old).

Bemerkenswerte Neuerungen in der Behandlungsweise der Hornhautleiden sind nicht berichtet.

Vierte Unterart: Krankheiten und Fehler der inneren Augenteile.

(No. 128 bis 133 des Rapportmusters.)

Die Entzündungen der Regenbogenhaut werden meist als rheumatische bezeichnet. In den meisten Fällen konnten Erkältungen nachgewiesen werden.

1 mal (Frankfurt a. O.) war Syphilis die erwiesene, 1 mal (Oldenburg) überstandener Tripper die mutmaßliche Ursache.

O.-St.-A. Theisen-Metz berichtet über 2, St.-A. Nicolai-Berlin und O.-A. Vetter-Leipzig über je eine Erkrankung an tuberkulöser Regenbogenhautentzündung; bei einem der aus Metz berichteten Fälle bestanden gleichzeitig nachweisbare krankhafte Veränderungen der linken Lunge.

Besonderes Interesse verdient folgende Einzelbeobachtung: Bei einem Grenadier in Stuttgart, der nie krank gewesen sein wollte, außer daß er schon 3 Jahre vorher an einer Augenkrankheit gelitten habe, trat eine schleichende Regenbogenhautentzündung mit Verwachsungen auf. Nach anscheinender Besserung wurde eine kleine Geschwulst in der Regenbogenhaut bemerkbar, die als Sarkom angesprochen wurde. Eine Operation lehnte der Kranke ab. (O.-St.-A. Wendel.)

Zur Lösung von hinteren Verwachsungen der Regenbogenhaut empfiehlt O.-St.-A. Kunow-Mainz mehrmals am Tage wiederholte Besprühungen des offen gehaltenen Auges mit heifser 2% iger Kochsalzlösung und nachträgliche Einträufelung einer Lösung von Scopolaminum hydrobromicum = 0,02:10,0. O.-St.-A. Kunow hebt besonders hervor, daß das Scopolaminum keine Drucksteigerung im Augapfel bewirkt.

Unter den berichteten Linsenerkrankungen wird eine als angeborener teilweiser Star (Straßburg i. E.) bezeichnet.

Bei einem offenbar schon vor der Einstellung entstandenen Totalstar in Straßburg i. E. blieb die Ursache unbekannt. Bei 1 Kranken in Jena, der bei der Einstellung auf dem erkrankten Auge nur $\frac{1}{15}$ Sehschärfe gehabt hatte, nahm die Sehfähigkeit nach einem Stofs gegen das Auge bei einer Felddienstübung sehr schnell ab. Nach der in der Universitäts-Augenklinik ausgeführten Staroperation blieb der Mann dienstfähig.

Die Ursache der Aderhautentzündungen war nur einmal (Syphilis) feststellbar. In diesem Falle bestand gleichzeitig Hornhaut- und Netzhautentzündung (Frankfurt a. O.).

Bei einer Sehnervenerkrankung, die sich bei einem Füsilier der Unteroffizierschule in Potsdam nach einem Stofs mit dem Wischstock gegen den rechten unteren Augenhöhlenrand entwickelte, blieb es zweifelhaft, ob sie Folge einer Blutung in die Sehnervenscheide oder eines Knochenbruchs war:

3 Tage nach der Verletzung, bei der Lazarettaufnahme, war der äußere Abschnitt des Augapfels blutunterlaufen, die Sehschärfe auf $\frac{1}{30}$ herabgesetzt und der Augenhintergrund zeigte noch keine Veränderungen. 3 Wochen später bot er das Bild des fortschreitenden Sehnervenschwundes. Mit einer Sehschärfe von $\frac{2}{35}$ wurde der Mann $1\frac{1}{4}$ Jahr später als Invalide entlassen. (O.-St.-A. Altgelt.)

Bei den übrigen Sehnervenerkrankungen handelte es sich etwa zu gleichen Teilen um schon vor der Einstellung mehr oder weniger ausgebildeten Sehnervenschwund oder um frische Sehnervenentzündung, für welche häufig Erkältung verantwortlich gemacht wurde.

An Netzhauterkrankungen sind aus 64 Lazaretten mitgeteilt: 10 eigentliche Netzhautentzündungen, 4 Netzhautblutungen (Cüstrin, Hadersleben, Rastatt, Colmar i. E.), 2 unvollständige Verstopfungen (Embolien) der Netzhautschlagadern (Stettin, Ludwigsburg) und 4 Netzhautablösungen (Königsberg i. Pr., Magdeburg, Ulm, Diedenhofen).

Von letzteren waren 2 alte und eine frische (vergleiche auch fünfte Unterart) durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Augapfel verursacht, eine blieb bezüglich ihrer Entstehung zweifelhaft. — Auch bei den übrigen Netzhauterkrankungen konnte keine ausreichende Erklärung der Ursache gefunden werden.

Von Einzelbeobachtungen sei nur eine unvollständige Verstopfung der Netzhautschlagader wegen des ungewöhnlichen Befundes und der Schwierigkeit der Dienstbeschädigungsfrage hervorgehoben:

Ein Reservist der Feldartillerie in Rastatt konnte plötzlich beim Richten mit dem rechten Auge nicht mehr sehen. Das Augenspiegelbild zeigte auffallende Weißfärbung der Schläfenhälfte der rechten Sehnervenscheibe. Die Netzhautschlagadern waren dünn und mehrfach unterbrochen, nur im unteren inneren Viertel der Netzhaut befand sich ein noch blutführender Nebenaast, in seiner Umgebung Spuren frisch ergossenen Blutes. Der diesem noch blutführenden Ast entsprechende Gesichtsfeldbezirk oben aufsen war leistungsfähig, die übrige Netzhaut nicht. Die doppeläugige Einstellung der Sehachsen war erhalten. 14 Tage später war die Blutfüllung in dem erhaltenen Ästchen noch geringer geworden und der Blutfleck in seiner Umgebung zum größten Teil aufgesaugt; das Gesichtsfeld hatte sich weiter verkleinert. Obgleich die für Embolie charakteristische Netzhauttrübung und die kirschrote Verfärbung des Netzhautzentrums (fovea centralis) fehlten, wurde im Hinblick auf die fortschreitende Verödung des anfänglich noch erhaltenen Ästchens, auf die erfolgte Rückbildung der frischen Blutung und auf die Erhaltung der doppeläugigen Einstellung eine frische Erkrankung angenommen. Der Mann wurde als invalide entlassen. (O.-St.-A. Beck-Rastatt.)

Lähmung des Einstellungsvermögens (Accommodation) kam 2 mal (Königsberg i. Pr. und Dar-

kehmen) vor. Bei keiner von beiden Erkrankungen war die Ursache hinreichend aufgeklärt.

6 an Nachtblindheit behandelte Leute (Königsberg i. Pr., Posen, Oppeln, darunter 3 Arbeitssoldaten in Königsberg i. Pr.) wurden nach Regelung der Ernährung wieder dienstfähig. Zu besonderen Bemerkungen gaben die Erkrankungen keinen Anlaß.

Von Strychnin-Einspritzungen (0,5 und 1,0%ig) unter die Haut der Schläfengegend sah St.-A. Voigt-Dresden bei 2 Netzhauterkrankungen einmal keinen und einmal nur sehr geringen Erfolg, während O.-St.-A. Krause-Königsberg i. Pr. eine Erkrankung an Nachtblindheit schnell dadurch besserte.

Fünfte Unterart: Andere Augenkrankheiten.

(No. 134 des Rapportmusters.)

Bei einer rheumatischen Lederhautentzündung in Darmstadt, einer Entzündung des Fettgewebes der Augenhöhle (Orbitalphlegmone) (St.-A. Nicolai-Berlin) und einer Verletzung des Auges durch Fremdkörper (Trier) konnte die Dienstfähigkeit wiederhergestellt werden. Zu letzterem wurde ein Holzsplitter ausgezogen, der 17 Tage lang im Fettgewebe der Augenhöhle gelegen hatte (St.-A. Esser).

Grüner Star führte einmal (Berlin) zu Dienstunbrauchbarkeit.

Unter den zahlreich berichteten Verletzungen des Augapfels handelte es sich 8 mal um schwere Quetschungen ohne Durchtrennung der Augenhüllen, 17 mal um mehr oder weniger tiefgehende Durchbohrungen. Erstere, durch stumpfe Gewalteinwirkung (Steinwurf, Anprall von Eisen- bzw. Holzstücken, Fuftritt, Peitschenhieb, Stockhieb, Schlag mit dem Pferdekopf) verursacht, hatte 2 mal Regenbogenhautabreißung, je einmal Aderhautzerreißung, Netzhautablösung, sogenannte Berlin'sche Trübung der Netzhaut und Verstopfung der Netzhautblutader, ferner gleichzeitig je einmal Regenbogenhautzerfetzung mit Linsenverrenkung und Aderhautzerreißung mit sogenannter Berlin'scher Netzhauttrübung zur Folge.

Die durchbohrenden Verletzungen wurden verursacht 5 mal durch Eisensplitter, je 2 mal durch eine Schusterahle, einen Baumzweig und Stofs mit der Gewehrmündung, je 1 mal entstanden die Verletzungen durch zurückschnellenden Draht, Steinsplitter, eine Packnadel, die Helmspitze, Schlag mit dem Spindschlüssel und Hufschlag.

5 von diesen Verletzungen führten den Verlust des betroffenen Auges herbei, 6 Verletzte wurden wieder dienstfähig.

IX. Gruppe: Ohrenkrankheiten.

(No. 135 bis 139 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | | |
| 165 | 6507 | 12,4 | 5489 | 82,3 | 5 | 0,07 | 988 | 14,8 | 6482 | 97,2 | 190 | 145 578 | 21,8 |

Außerdem erkrankten noch 70 Kadetten und 41 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Krankenzugang hat im Vergleich zum Vorjahre um $0,8 \frac{0}{0}$ K. zugenommen; er betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | | |
|---------------------------|--------|--------|------------------------|
| 1881/82 bis 1885/86 . . . | 4129,8 | Mann = | $10,9 \frac{0}{0}$ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 . . . | 4798,6 | „ = | $11,5 \frac{0}{0}$ „ |
| 1891/92 „ 1895/96 . . . | 6019,4 | „ = | $12,8 \frac{0}{0}$ „ |
| 1896/97 „ 1900/01 . . . | 6283,4 | „ = | $12,1 \frac{0}{0}$ „ |
| im Jahre 1901/02 . . . | 6278 | „ = | $11,6 \frac{0}{0}$ „ |
| im Jahre 1902/03 . . . | 6507 | „ = | $12,4 \frac{0}{0}$ K. |

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|------|-----------------|------------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 479 | 11,6 | XII. (1. K. S.) | 170 | 8,5 |
| I. | 510 | 16,1 | XIII. (K. W.) | 263 | 11,9 |
| II. | 303 | 11,7 | XIV. | 331 | 10,4 |
| III. | 313 | 13,3 | XV. | 348 | 11,1 |
| IV. | 317 | 14,2 | XVI. | 463 | 17,0 |
| V. | 237 | 9,3 | XVII. | 358 | 12,1 |
| VI. | 275 | 10,7 | XVIII. | 429 | 16,3 |
| VII. | 303 | 11,2 | XIX. (2. K. S.) | 266 | 12,9 |
| VIII. | 372 | 13,8 | | | |
| IX. | 271 | 10,9 | I. K. B. . . . | 423 | 18,2 |
| X. | 260 | 11,9 | II. „ „ . . . | 377 | 17,7 |
| XI. | 239 | 11,5 | III. „ „ . . . | 387 | 20,8 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 773 | 630 | 433 | 771 | 671 | 592 | 374 | 414 | 492 | 643 | 471 | 243 |
| ‰ K. | 1,8 | 1,2 | 0,81 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,69 | 0,75 | 0,92 | 1,2 | 0,87 | 0,50 |

Erste Unterart: Krankheiten der Ohrmuschel und des äußeren Gehörganges.

(No. 135 und 136 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 15 | 1402 | 2,7 | 1394 | — | 5 | 1399 | 18 | 10,9 |

Außerdem erkrankten noch 11 Kadetten und 8 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Von den Erkrankungen der Ohrmuschel wird nur die Ohrblutgeschwulst 21 mal erwähnt. Als Ursache werden 14 mal mechanische Verletzungen angegeben, 7 mal blieb sie unbekannt. Heilung erfolgte bei allen Kranken: 1 mal nach Anwendung der Massage, sonst nach Ansaugung des Blutes mit einer Spritze oder nach Entleerung durch Einschnitt mit nachfolgendem Druckverband.

Bei einem Husaren in Danzig heilte die bei einem Sturz vom Pferde fast völlig abgerissene Ohrmuschel ohne wesentliche Formveränderung an. Knorpel und Haut wurden gesondert genäht. (O.-A. Milisch-Langfuhr.)

O.-St.-A. Jäckel-Konstanz berichtet, daß bei 5 Leuten durch Ohrenschmalzverhärtung eitrig-Entzündung des äußeren Gehörganges hervorgerufen worden war. Von der Vornahme der Ausspritzung von Ohrschmalzpfropfen aus gesunden Ohren, nur zum Zweck systematischer Untersuchungen, wie bei der Rekruteneinstellung, wird wiederholt abgeraten (St.-A. Thiel-Bromberg).¹⁾

Bei der Behandlung der Furunkel scheint das abwartende Verfahren mit feuchten Verbänden bzw. Salbenwickeln immer mehr Anhänger zu finden.

Zweite Unterart: Krankheiten des mittleren und inneren Ohres. Schwerhörigkeit.

(No. 137 und 138 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 150 | 5095 | 9,7 | 4085 | 5 | 983 | 5073 | 172 | 24,8 |

Außerdem erkrankten noch 59 Kadetten und 33 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die Ursache der Trommelfellrisse wird aus 12 Lazaretten genau mitgeteilt.

Von 55 Verletzungen waren 32 durch Schlag gegen den Kopf, 16 durch Schalleinwirkung (Knall des Gewehres oder Geschützes), 1 durch Trompeteblasen, je 3 durch Kopfsprung ins Wasser oder Verletzungen mit Strohhalmen entstanden.

¹⁾ S. auch Taubert, Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1903. Heft 12, S. 810.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|---------------------|---------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 372 | 9,0 | XII. (I. K. S.) . . | 148 | 7,4 |
| I. | 404 | 12,8 | XIII. (K. W.) . . . | 219 | 9,9 |
| II. | 247 | 9,6 | XIV. | 265 | 8,3 |
| III. | 259 | 11,0 | XV. | 276 | 8,8 |
| IV. | 238 | 10,6 | XVI. | 369 | 13,5 |
| V. | 178 | 6,9 | XVII. | 283 | 9,6 |
| VI. | 214 | 8,3 | XVIII. | 300 | 11,4 |
| VII. | 220 | 8,2 | XIX. (2. K. S.) . . | 229 | 11,1 |
| VIII. | 280 | 10,4 | | | |
| IX. | 221 | 8,9 | I. K. B. | 355 | 15,3 |
| X. | 179 | 8,2 | II. „ „ | 285 | 13,4 |
| XI. | 194 | 9,3 | III. „ „ | 324 | 17,4 |

Die Behandlung, welche durchgängig in einfachem, trockenem, keimfreien Verschluss des Gehörganges bestand, führte 51 mal zu schneller Heilung, nur 4 mal schloß sich eine akute eitrige Mittelohrentzündung an, für deren Entstehung 1 mal die Größe der Durchlöcherung, 2 mal verspätete Krankmeldung und 1 mal das Eindringen von Wasser beim Baden verantwortlich gemacht wird.

Ein Beispiel für schnellen Wiederersatz des Trommelfelles bietet die Verletzung eines Einjährig-Freiwilligen in Berlin, welcher beim Abfeuern eines Geschützes dicht neben seinem Ohr eine umfangreiche Zerreißen des rechten Trommelfelles erlitt. Zurückgeblieben war nur der obere Teil mit dem Hammergriff und je einem schmalen Streifen am vorderen und hinteren Rande. In 19 Tagen war unter aseptischem Verschluss des äußeren Gehörganges die Neubildung des Trommelfelles, ohne Beeinträchtigung der Hörfähigkeit erfolgt. Dienstfähig. (St.-A. Wagner).

Einzelne vorliegende Berichte über Entzündungen des Trommelfelles, die auf dies Organ beschränkt waren, bieten nichts Besonderes.

Bei den Entzündungen des Mittelohrs muß das Verlangen nach einer strengeren Unterscheidung der Diagnosen „seröse, akut eitrige und chronische“ Mittelohrentzündung, welches schon im Sanitätsbericht 1900/01 ausgesprochen wurde, im Interesse einer genaueren Berichtserstattung wiederholt werden.

Als Ursache für die akuten Mittelohrentzündungen mit seröser oder eitrigem Absonderung werden wie immer äußere Schädigungen (Schlag, starker Schall, Baden u. s. w.) angeführt, ferner von Infektionskrankheiten Mandelentzündung, Grippe, Diphtheritis, Typhus, Scharlach, Masern, Gesichtrose, endlich auch „Erkältungen“ und chronische Leiden der Rachen- und Nasenhöhle.

St.-A. Thiel-Bromberg hält es für notwendig, daß letztere Leiden bei den Untersuchungen für den Schwimmdienst mehr beachtet, und daß Leute mit krankhaften Veränderungen der Nase oder der Rachenorgane vom Schwimmunterricht befreit werden. Diese Maßregel würde in Gemeinschaft mit der allgemeinen Durchführung des „Wattetragens“ in den Ohren während des Schwimmens die Zahl der durch das Baden verursachten Ohrerkrankungen wesentlich herabsetzen.

O.-St.-A. Haehner-Cöln teilt eine Anzahl von Verätzungen des Trommelfelles durch reine flüssige Karbolsäure mit. Die

Säure war versehentlich bei 14 Soldaten statt Olivenöl ins Ohr geträufelt. Kurz nach der Einträufelung spürten die Leute nur einige Stunden lang leichtes Brennen. Nach 6 Tagen wurden 8 von diesen Leuten in das Garnisonlazarett aufgenommen, wo sich bei allen kleine Schorfe am Eingang des Gehörganges und am Ohrfläppchen, bei vieren Trommelfelldurchlöcherung und eitrige Mittelohrentzündung fanden. Abgesehen von der Durchlöcherung waren am Trommelfell und an den Wänden des Gehörganges keine Spuren der Ätzwirkung mehr zu bemerken. 1 Mann wurde invalide, die übrigen blieben dienstfähig.

Bei der Behandlung der akuten serösen Mittelohrentzündungen wie bei den Katarrhen der Eustachischen Röhre wurde allgemein der Hauptwert auf Bettruhe, reizlose Diät und Ableitung auf den Darm bzw. die Haut gelegt.

Örtlich wurden feuchte Umschläge, in seltenen Fällen Blutentziehung und Eis angewendet.

In Frankfurt a. M. wurden bei allen akuten Entzündungen des Mittelohres und bei Furunkeln des äußeren Gehörganges gegen die heftigen Ohrschmerzen stundenlang fortgesetzte Einträufelungen von möglichst warmem, sterilen Wasser mit gutem Erfolg angewendet. (O.-St.-A. Brugger.)

Sonst wurde bei drohendem Eiterdurchbruch durch das Trommelfell allgemein der frühzeitige Trommelfellschnitt vorgenommen.

St.-A. Thiel-Bromberg will die Bezeichnung Trommelfellschnitt durch Trommelfellschnitt ersetzt wissen, weil erstere Bezeichnung verführe, zu kleine Öffnungen zu machen, die dem Eiter nicht hinreichenden Abflusses gewährten.

Bei der Behandlung der akuten eitrigem Mittelohrentzündungen hat das trockene Verfahren, um dessen Einführung besonders O.-St.-A. Müller-Berlin¹⁾ bemüht ist, weitere Anerkennung gefunden (z. B. St.-A. Thiel-Bromberg). Die älteren Behandlungsweisen werden immerhin noch häufig erwähnt.

O.-St.-A. Müller hat in 3 auf einander folgenden Berichtsjahren die Heilung aller an akuter eitrigem Mittelohrentzündung erkrankten Mannschaften auf diese Weise in durchschnittlich 25,8 Tagen erzielt.

Auf eine in der Literatur bisher kaum erwähnte Beziehung der akuten Mittelohrentzündung zum akuten Gelenkrheumatismus macht St.-A. Wagner-Berlin²⁾ aufmerksam. Auch O.-St.-A. Brugger-Frankfurt a. M. beobachtete einen Fall von akuter eitrigem Mittelohrentzündung bei dem in der 3. Woche der Erkrankung ein allgemeiner Gelenkrheumatismus mit hohem Fieber einsetzte.

Die Behandlung der chronischen eitrigem Mittelohrentzündung hat sich gegen die früheren Berichtsjahre nicht geändert; auch diesmal wird wieder großer Wert auf gebührende Berücksichtigung etwaiger Nasen- und Rachenkrankheiten gelegt. — Trotz ihrer Bedeutung für die Beurteilung des Krankheitsprozesses³⁾ wird die genauere Lage des Trommelfelloches nur vereinzelt erwähnt, so daß Zusammenstellungen über diesen Punkt nicht gemacht werden können.

¹⁾ Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1903. Heft 9, S. 616.

²⁾ Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1903. Heft 9, S. 630.

³⁾ Vgl. Leutert, Deutsche medizinische Wochenschrift 1900 No. 39, 40, 41.

St.-A. Thiel-Bromberg schlägt vor, bei großen, in der unteren Trommelfelhälfte gelegenen Durchlöcherungen die Methode der Universitätsohrenklinik in Halle a. S. zu benutzen. Dort werden nach vorheriger Ausspülung des Mittelohrs durch die Eustachische Röhre Einblasungen mit pulverförmigen Mitteln gemacht. — Bei akuten Mittelohrentzündungen und kleinen Trommelfellöchern sei diese Behandlung jedoch nicht zu empfehlen.

Das von Ehrenfried angegebene Verfahren, den Eiter nach vorheriger Einträufelung von Lysollösung anzusaugen, ist in Neisse und Darmstadt ohne besonderen Erfolg versucht worden.

Unter den zahlreichen Operationen wird 3 mal über den Wildeschen Schnitt berichtet, der 2 mal zur Heilung führte. Bei dem 3. Kranken mußte später die Aufmeißelung des Warzenfortsatzes vorgenommen werden. Größere operative Eingriffe wurden 81 mal ausgeführt. Vgl. Operationsliste unter Abschnitt A 2. 66 mal ist die einfache Aufmeißelung und 14 mal die Freilegung aller Mittelohrräume, die sogenannte Radikaloperation gemacht. Letztere Operation wurde meist sofort, nur je 1 mal 1 bzw. 8 Wochen nach der Aufmeißelung vorgenommen. — 5 mal hatten Perlgeschwülste, in allen übrigen Fällen Mittelohreiterungen die Veranlassung zur Operation gegeben.

Bei 62 Operierten wurde vollständige Heilung der Operationswunde erzielt; 46 von diesen blieben dienstfähig, während 16 wegen der Herabsetzung der Hörfähigkeit oder anderer Beschwerden aus dem Militärdienst entlassen werden mußten. Außerdem gaben 7 mal zurückgebliebene, meist schwach absondernde Fisteln Veranlassung zur Entlassung aus dem Militärdienst. — 12 Operierte starben.

Die Ausräumung des Sförmigen Blutleiters wurde 12 mal vorgenommen, wobei 6 mal die innere Drosselblutader unterbunden wurde. 3 mal konnte durch die Ausräumung, 2 mal durch die Unterbindung der Drosselblutader das Leben gerettet werden. 1 Musketier in Breslau, bei dem die Unterbindung gemacht war, blieb sogar dienstfähig.

Mehrfach wurden die Kranken erst durch die Zeichen der beginnenden Blutvergiftung, besonders durch Gelenk- und Gliederschmerzen oder Schwellungen veranlaßt, ihre Zustimmung zur Operation zu geben. Vereiterung von Gelenken oder Bildung von Eiterherden ist bei 5 Kranken vermerkt, von denen 5 genesen, 1 von diesen mit einer Vereiterung des Schlüsselbeinbrustbeingelenks wurde sogar dienstfähig (Breslau).

Die Eröffnung der hinteren bzw. auch der mittleren Schädelgrube wurde bei Ohrerkrankungen zur Aufsuchung von Eiterherden 4 mal vorgenommen: 1 mal vergeblich, da die Hirnhautentzündung am Schädeldach lag (Königsberg i. Pr.),

2 mal wurden Kleinhirnsabszesse eröffnet, doch starben die Kranken an Hirnhautentzündung bzw. Hirnvorfall (Magdeburg, Coblenz), 1 mal konnte durch Eröffnung eines Abszesses unter der harten Hirnhaut das Leben gerettet werden (Stuttgart).

Der Einstich in den Rückenmarkskanal ist nur in 2 Fällen gemacht worden, in welchen er zur Feststellung einer bestehenden Gehirnhautentzündung diente; bei einem dieser Kranken gab der mikroskopische Befund Anlaß zu einem allerdings vergeblichen Heilversuch mit Antistreptokokkenserum (St.-A. Hammer-Karlsruhe).

Bemerkenswert ist die schon erwähnte Erkrankung eines Mannes an rechtsseitiger, akuter eitriger Mittelohrentzündung, bei welchem sich eine Hirnhautentzündung nur an der Schädelwölbung fand. Sie war links stärker als rechts ausgeprägt, und es liefs sich im Eiter neben Staphylokokken der *Diplococcus intracellularis* Weichselbaum-Jäger nachweisen. (St.-A. Gufs-Königsberg i. Pr.)

St.-A. Thiel-Bromberg weist wieder auf die wesentlich günstigeren Erfolge der Frühoperationen hin und betont, daß bei den Aufmeißelungen stets auch der absteigende Schenkel des Querblutleiters freigelegt und revidiert werden müsse, wenn vorher bei einer akuten eitrigen Mittelohrentzündung mit freiem Abfluß des Eiters durch das Trommelfell andauernd hohes Fieber bestanden habe oder wohl gar Schüttelfröste eingetreten sind. Vorausgesetzt ist, daß das Fieber nicht auf eine außerhalb des Ohres und seiner Umgebung liegende Ursache bezogen werden muß.

Die wenigen zur Beobachtung gekommenen Erkrankungen des inneren Ohres bieten nichts Bemerkenswertes.

Über Schwerhörigkeit (No. 138 des Rapportmusters) liegen ebenfalls nur wenige Mitteilungen vor. Meist sind als Ursache alte Leiden des Mittelohres, der Nasen- und Rachenhöhle angegeben, während bei 2 Kranken in der Kindheit überstandener Scharlach bzw. Typhus, bei 3 anderen frühere Verletzungen des Kopfes beschuldigt werden. Die Behandlung bestand in Luftduschen, Katheterismus und pneumatischer Elektromassage des Trommelfelles, während in den Fällen von Labyrinthbeteiligung auch Schwitzbäder zur Anwendung gelangten.

Dritte Unterart: Andere Ohrenkrankheiten.

(No. 139 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | % K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| — | 10 | 0,02 | 10 | — | — | 10 | — | 18,1 |

Die unter dieser Nummer berichteten Krankengeschichten gaben keinen Anlaß zu Bemerkungen.

X. Gruppe: Krankheiten der äußeren Bedeckungen.

(No. 140 bis 148 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| | absol. Zahl | % K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | % der Behandelten | absol. Zahl | % der Behandelten | absol. Zahl | % der Behandelten | absol. Zahl | % der Behandelten | | | |
| 1506 | 76 427 | 145,1 | 75 810 | 97,3 | 11 | 0,01 | 636 | 0,82 | 76 457 | 98,1 | 1476 | 976 598 | 12,5 |

Außerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 1 Invalide, 184 Kadetten und 317 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Welche Änderungen in dieser Gruppe durch das Rapportmuster vom Jahre 1896 eingetreten sind und warum sich seitdem der Gesamtzugang nicht mehr ohne weiteres mit dem der früheren Jahre vergleichen läßt, ist an der gleichen Stelle des Sanitätsberichtes für 1896/97 erörtert.

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1881/82 bis 1885/86 | = 198,6 $\frac{0}{100}$ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 | = 213,0 „ |
| 1891/92 „ 1895/96 | = 214,6 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 | = 167,9 „ |
| im Jahre 1901/02 | 78 653 Mann = 145,5 „ |

im Jahre 1902/03 76 427 Mann = 145,1 $\frac{0}{100}$ K.

Die seit dem Jahre 1896/97 eingetretene wesentliche Verminderung des Zuganges erklärt sich hauptsächlich aus dem Fortfall der früheren Spalte „Hautödem“, deren stets beträchtliche Zugangsziffer sich wohl größtenteils bei Gruppe XI (Spalte 155), zum kleineren Teil auch bei Gruppe XII (Spalte 173) wiederfinden. Zählt man die unter No. 155 verrechneten Kranken dieses Berichtsjahres (13 244 Mann = 25,2 $\frac{0}{100}$ K.) der Gruppe X hinzu, so stellt sich die Zugangsziffer auf 170,3 $\frac{0}{100}$ K. Im Berichtsjahre 1901/02 betrug der Zugang bei Gruppe X, einschließlichs Fußgeschwulst, 169,9 $\frac{0}{100}$ K.

Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse ist jedoch in diesem Berichtsjahre eine geringe Erhöhung eingetreten.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | absol. Zahlen | $\frac{0}{100}$ K. | | absol. Zahlen | $\frac{0}{100}$ K. |
| G. | 6757 | 163,4 | XII. (I.K.S.) | 2054 | 102,9 |
| I. | 5595 | 176,8 | XIII. (K. W.) | 3496 | 158,0 |
| II. | 4304 | 166,6 | XIV. | 4472 | 140,5 |
| III. | 2560 | 108,8 | XV. | 4717 | 150,1 |
| IV. | 3066 | 137,1 | XVI. | 5229 | 191,5 |
| V. | 3165 | 123,6 | XVII. | 3440 | 116,2 |
| VI. | 3258 | 126,2 | XVIII. | 3736 | 142,1 |
| VII. | 3825 | 141,9 | XIX. (2.K.S.) | 2707 | 131,5 |
| VIII. | 4372 | 162,7 | | | |
| IX. | 2867 | 114,9 | I. K. B. . . . | 3504 | 150,7 |
| X. | 3246 | 148,1 | II. „ | 3580 | 167,8 |
| XI. | 3561 | 171,5 | III. „ | 2974 | 159,8 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|--------------------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 4949 | 7647 | 7013 | 7584 | 7188 | 7752 | 6219 | 6111 | 5592 | 6263 | 5533 | 4576 |
| $\frac{0}{100}$ K. . . . | 11,5 | 14,1 | 13,0 | 14,2 | 13,4 | 14,5 | 11,5 | 11,1 | 10,4 | 11,3 | 10,2 | 9,5 |

Sanitäts-Bericht über die Armee. 1902/03. I. Teil.

Erste Unterart: Krätze.

(No. 140 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | $\frac{0}{100}$ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 3 | 1398 | 2,7 | 1395 | — | — | 1395 | 6 | 5,0 |

Außerdem erkrankten noch 8 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang an Krätze, welcher bis zum Jahre 1900/01 stetig abgenommen hat, ist in den beiden letzten Berichtsjahren um ein geringes gestiegen.

Er betrug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| im Jahre 1892/93 | 2658 Mann = 6,1 $\frac{0}{100}$ K., |
| „ „ 1893/94 | 2895 „ = 6,1 „ |
| „ „ 1894/95 | 2989 „ = 5,9 „ |
| „ „ 1895/96 | 2741 „ = 5,3 „ |
| „ „ 1896/97 | 2511 „ = 4,9 „ |
| „ „ 1897/98 | 2017 „ = 3,9 „ |
| „ „ 1898/99 | 1705 „ = 3,3 „ |
| „ „ 1899/1900 | 1374 „ = 2,6 „ |
| „ „ 1900/01 | 1119 „ = 2,1 „ |
| „ „ 1901/02 | 1190 „ = 2,2 „ |

im Jahre 1902/03 1378 Mann = 2,7 $\frac{0}{100}$ K.

Bei Bekämpfung einer ungewöhnlichen Krätzeverbreitung (42 Erkrankungen bei 2 Schwadronen in Stallpönen) führte erst Isolierung der Kranken, gründliche Desinfektion aller Kleidungs- und Wäschestücke und Einreibungen mit β -Naphtholsalbe zu nachhaltigem Erfolge.

Von den neueren Mitteln ist man fast allgemein zu dem Perubalsam zurückgekehrt. Vor zu früher (vor dem 5. oder 6. Tage) Verabreichung von Reinigungsbädern oder gar Schmierseifenbädern (diese sind nur als Vorbereitung zur Krätzkur zweckmäßig, weil sie die Haut auflockern) warnt St.-A. Neubeck-Coeslin, weil sie die Haut besonders an den empfindlicheren Gelenkbeugen reizen, und durch so hervorgerufenes Jucken einen Misserfolg der Einreibungen vortäuschen können.

Zweite Unterart: Akute und chronische Hautkrankheiten. Chronisches Unterschenkelgeschwür.

(No. 141 bis 143 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | $\frac{0}{100}$ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 119 | 5919 | 11,2 | 5730 | — | 167 | 5897 | 141 | 18,1 |

Außerdem erkrankten noch 1 Invalide, 18 Kadetten und 40 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|---------------------|---------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 454 | 11,0 | XII. (1. K. S.) . . | 166 | 8,3 |
| I. | 412 | 13,0 | XIII. (K. W.) . . | 202 | 9,1 |
| II. | 280 | 10,8 | XIV. | 289 | 9,1 |
| III. | 218 | 9,3 | XV. | 403 | 12,9 |
| IV. | 255 | 11,4 | XVI. | 461 | 16,9 |
| V. | 280 | 10,9 | XVII. | 258 | 8,7 |
| VI. | 233 | 9,0 | XVIII. | 320 | 12,2 |
| VII. | 348 | 12,9 | XIX. (2. K. S.) . . | 249 | 12,1 |
| VIII. | 345 | 12,8 | | | |
| IX. | 237 | 9,5 | I. K. B. . . . | 310 | 13,3 |
| X. | 242 | 11,0 | II. „ . . . | 302 | 14,2 |
| XI. | 267 | 12,9 | III. „ . . . | 215 | 11,5 |

Auf die einzelnen Monate verteilte sich der Zugang in ziemlich gleichmäßiger Weise, abgesehen von der fast bei allen Krankheiten bemerkbaren Abnahme im September.

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 596 | 563 | 405 | 615 | 599 | 499 | 499 | 493 | 458 | 461 | 411 | 320 |
| ‰ K. | 1,4 | 1,0 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,85 | 0,83 | 0,76 | 0,66 |

Am häufigsten wurden akute nässende Ekzeme beobachtet.

Als Entstehungsursache eines Ekzems an beiden Händen und Vorderarmen wird einmal (St. A. vold) anhaltendes Arbeiten mit der aus verschiedenen Säuren und Chloriden zusammengesetzten Beize zum Brünieren der Geschütze angegeben.

Bei einem sehr fettleibigen Lehrer trat während der Ausbildungszeit wiederholt eine nässende Flechte auf. St.-A. Brucke-Hamel fand gleichzeitig Traubenzucker im Harn. Die Glykoseurie führt er auf die ungewöhnlich schnelle Einschmelzung des Körperfettes während der Rekrutenausbildung zurück, da sie schwand, als das Körpergewicht gleichbleibend geworden war. Nach dem Aufhören der Zuckerausscheidung wurde auch das Ekzem nicht wieder rückfällig.

Bei einem ausgedehnten borkigen Ekzem, das fast die ganze Kopfhaut ergriffen hatte, sah St.-A. Mantel-Mannheim nach verschiedenen anderen Versuchen erst von einer 20 %igen Naftalan-Zinkpaste endgültigen Erfolg.

Die zahlreichen Erkrankungen an Schuppenflechte boten nichts Bemerkenswertes.

St.-A. Neubeck-Coeslin empfiehlt, statt der bisher üblichen starken Chrysarobinsalben, die jetzt bei den Spezialisten mehr in Gebrauch gekommenen, schwächeren Salben von 0,25—1 % (mit Zinkpaste) zu benutzen, da sich so, bei gleichem Erfolge, unerwünschte Nebenwirkungen besser vermeiden lassen (s. a. Sanitätsbericht 1899/1900). Jeder Chrysarobinanwendung müsse außerdem ein hafterweichendes Verfahren durch Schmierseifenbad oder Salizylspiritus vorausgeschickt werden. — O.-A. Spaethen-Berlin sah in einigen Fällen von Sonnenbädern gute Erfolge.

Über rote Knötchenflechte (Lichen ruber planus), die meist über den ganzen Rumpf verbreitet war, wird aus Bromberg, Breslau, Oldenburg, Cassel und Metz berichtet. Bei dem Kranken in Cassel trug auch die Schleimhaut der Lippen und Wangen kleinste, durch Ausläufer netzartig miteinander verbundene Lichenknötchen.

Bis auf den als dienstunbrauchbar entlassenen Kranken in Breslau wurden alle anderen durch Verabreichung von arseniger Säure oder Fowlerscher Lösung wesentlich gebessert oder geheilt. In Cassel wurde eine Lösung von Natrium arsenicosum 1,3 % nach Köbner unter die Haut eingespritzt.

Pemphigus ähnliche Erkrankungen werden aus Schweidnitz (Mitbeteiligung der Wangenschleimhaut) und Ratzeburg berichtet.

Bei letzterem Kranken, einem Schwimmlehrer, bestanden 5—10-Pfennigstückgroße Blasen am ganzen Körper, besonders an den Händen und Füßen, die jedoch die Streckseiten der Glieder völlig frei ließen. (St.-A. Kaule.)

Acne rosacea wurde in Bromberg mit gutem Erfolge mit Skarifikationen und nachfolgenden Alkoholabreibungen, in Dresden mit Ichthyolzinkpasta behandelt.

Die nicht parasitäre Form der Bartflechte sah St.-A. Beck-Paderborn nach abgelaufener Gesichtrose auftreten. Schwere, immer wiederkehrende Erkrankungen an Bartflechte führten in Berlin I und II und in Mörchingen zur Dienstunbrauchbarkeit. In Münster wurden 2 solche Erkrankungen durch Röntgenstrahlen geheilt.

In Potsdam mußte ein Mann wegen fast universeller Furunkulose, die in 13 Monaten durch eine beinahe ununterbrochene Behandlung nicht zu beseitigen war, entlassen werden. (S. S. 125, Rapportnummer 146.)

Mehrfach wird über Erythema nodosum berichtet.

In Königsberg i. Pr. ging dieser Krankheit 2 mal eine Mandelentzündung voraus.

In Dresden wurde ein Fall von Purpura rheumatica mit Gelenkschwellungen beobachtet (s. auch unter Nierenentzündung).

Ein über den ganzen Körper und die Schleimhaut des Mundes und Rachens ausgebreitetes Erythema exsudativum multiforme heilte schnell unter Arsenikbehandlung (O.-St.-A. Brugger-Mainz).

Von Arzneiexanthenen wird nur ein Ekzem geringeren Umfanges nach Anwendung einer Sublimatlösung 1 % (Torgau), ein Jodoformausschlag (Metz-Montigny) und ein starkes Exanthem nach Sandelöl (Itzehoe) erwähnt.

Eine schwere Quecksilber-Dermatitis ist bei der 7. Unterart beschrieben.

Eine eigentümliche, wohl als akutes umschriebenes Hautödem auf angioneurotischer Grundlage aufzufassende Erkrankung beschreibt St.-A. Schrecker-Dieuze:

Bei einem von Gesichtrose geheilten Hoboisten stellte sich am Abend nach der Lazarettentlassung nach 3 stündigem Flöte-spielen plötzlich unter Jucken und Brennen eine Schwellung der Stirn ein, die am anderen Tage auch die Augenlider, den Hals und die Hände ergriff. In den nächsten Tagen traten auf der geröteten und gespannten Haut kleine, wasserhelle, bald platzende Bläschen auf. 7 Wochen nach der langsam erfolgten Abheilung trat die gleiche Erkrankung unter Mitbeteiligung des Zahn-

fleisches, und zwar abermals nach $\frac{1}{2}$ stündigem Flötenspiel, wieder auf. Da sich die gleiche Erkrankung auch nach 2 weiteren, in mehrwöchigen Abständen mit einer fremden Flöte unternommenen Versuchen einstellte, mußte der Mann das Flötenblasen gänzlich aufgeben.

Ein mangels jeder anderen Ursache ebenfalls als angioneurotisch anzusprechendes Ödem des linken Handrückens, das in Halberstadt beobachtet wurde, trotzte jeder Behandlung, beeinträchtigte aber die Dienstfähigkeit nicht. (O.-St.-A. Festenberg.)

Unter den Erkrankungen an Gürtelrose sind 2 Fälle von Zoster facialis et ophthalmicus in Ulm (mit Beteiligung der Hornhaut) und Frankfurt a.M. bemerkenswert.

Alopecia areata wurde in Dresden mit Erfolg zunächst mit Epikarinspirit und Resorzinsalbe, danach mit Wilkinson'scher Salbe behandelt (St.-A. Pfitzmann). Scherflechte (Herpes tonsurans) des behaarten Kopfes kam in Dresden, Colmar i. E. und anderen Garnisonen vereinzelt vor; gehäuft trat die Erkrankung bei einer Kompagnie des 7. Westpreussischen Infanterie-Regiments No. 155 auf, bei der in zwei Tagen 18 Mann mit Herpes tonsurans der behaarten Kopfhaut, der Bartgegend und im Nacken zuzogen. Die Quelle der Ansteckung konnte nicht ermittelt werden, Weiter-

verbreitung wurde durch Absonderung der Kranken und Desinfektionsmaßregeln verhütet (O.-St.-A. Gruhn-Ostrowo).

Eine Erkrankung an schwieriger Veränderung der Handtellerhaut, Callositas palmaris, mit tiefen Einrissen bis auf die Lederhaut wurde in Dresden mit den gebräuchlichen hornerverweichenden Mitteln geheilt, während ein ähnliches Leiden bei einem mit Fischschuppenkrankheit behafteten Manne in Colmar i. E. zur Dienstunbrauchbarkeit führte.

Fressende Flechte, Lupus, ist nur 2 mal erwähnt und beide Male mit Erhaltung der Dienstfähigkeit geheilt.

Es handelte sich um einen Lupus der Nase bei einem Unteroffizier in Königsberg i. Pr., der erst mit dem Holländerschen Heißluftbrenner, dann mit Röntgenbestrahlung und Pyrogallussalbe behandelt war und um einen Lupus des Handrückens in Mannheim, bei dem nur die Salbe angewendet wurde.

In der Behandlung der Unterschenkelgeschwüre bringen die Berichte nichts Neues.

Die schnelle Wirkung der schon im Sanitätsbericht 1900/01 erwähnten, möglichst heißen (Bor-) Umschläge wird wieder gerühmt (Berlin II).

Dritte Unterart: Panaritium.

(Nr. 144 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | | |
| 85 | 5670 | 10,8 | 5500 | 95,6 | 2 | 0,03 | 145 | 2,5 | 5647 | 98,1 | 108 | 120 586 | 21,0 |

Außerdem erkrankten noch 3 Kadetten und 25 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | |
|---------------------|------------------|-------|
| 1881/82 bis 1885/86 | 25,2 | ‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 | 26,2 | „ „ |
| 1891/92 „ 1895/96 | 20,0 | „ „ |
| 1896/97 „ 1900/01 | 13,6 | „ „ |
| im Jahre 1901/02 | 6089 Mann = 11,3 | „ „ |
| im Jahre 1902/03 | 5670 Mann = 10,8 | ‰ K. |

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|------|--------------------|------------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 310 | 7,5 | XII. (I. K.S.) . . | 287 | 14,4 |
| I. | 335 | 10,6 | XIII. (K. W.) . . | 367 | 16,6 |
| II. | 304 | 11,8 | XIV. | 302 | 9,5 |
| III. | 285 | 12,1 | XV. | 295 | 9,4 |
| IV. | 252 | 11,3 | XVI. | 337 | 12,3 |
| V. | 216 | 8,4 | XVII. | 288 | 9,7 |
| VI. | 234 | 9,1 | XVIII. | 332 | 12,6 |
| VII. | 309 | 11,5 | XIX. (2. K.S.) . . | 201 | 9,8 |
| VIII. | 330 | 12,3 | | | |
| IX. | 274 | 11,0 | I. K. B. . . . | 299 | 12,9 |
| X. | 240 | 11,0 | II. „ | 277 | 13,0 |
| XI. | 172 | 8,3 | III. „ | 161 | 8,6 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Jannar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 379 | 694 | 809 | 604 | 572 | 638 | 485 | 419 | 310 | 308 | 253 | 199 |
| ‰ K. | 0,88 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,90 | 0,76 | 0,58 | 0,56 | 0,47 | 0,41 |

Für die Erfahrung, daß Panaritien am häufigsten bei Leuten des ersten Dienstjahres vorkommen, bieten die Einzelberichte von 9 Garnisonen zahlenmäßige Bestätigung: Von 461 Erkrankungen entfielen 333 auf den ersten, 128 auf die älteren Jahrgänge.

Von 770 Panaritien, bei welchen die Hand bezeichnet ist, betrafen 472 die rechte, 298 die linke Hand. An der rechten Hand überwogen wieder bedeutend die hauptsächlich zum Greifen und zu allen Hantierungen benutzten drei ersten Finger, an der linken Hand war am häufigsten der Daumen erkrankt.

Bei 4 durch Insektenstiche hervorgerufenen Panaritien fiel St.-A. Berger-Frankfurt a. O. das tiefgehende Absterben des Unterhautzellgewebes auf.

Alle Berichterstatter stimmen einmütig für den frühzeitigen, möglichst ausgiebigen Einschnitt, der auch bei den viel angewendeten Spiritusverbänden nicht versäumt werden darf.

Zur Nachbehandlung werden vielfach feuchte Verbände und langdauernde Seifenbäder bevorzugt, O.-St.-A. Schmolling-Posen warnt dagegen vor den feuchten Verbänden, weil sie durch Aufquellen des Zellgewebes die Entleerung des Eiters erschweren. Er bevorzugt den trockenen Jodoformgazeverband wie ihn v. Bergmann empfiehlt. O.-St.-A. Taubner-Mainz lobt von den feuchten Verbänden, daß sie am besten das Steifbleiben der Finger nach langer Ruhigstellung verhüten.

St.-A. Dahlem-Strasburg i. W. Pr. hat von Einreibungen Credéscher Silbersalbe im Anfange der Erkrankung vorzügliche Wirkungen gesehen; sie sollen sowohl das Fieber und das Allgemeinbefinden günstig beeinflussen, wie die Entzündung und Eiterung beschränken, und das Abstoßen abgestorbenen Gewebes beschleunigen. Er behandelte 5 Panaritien.

Trotz frühzeitiger energischer Behandlung ließen sich tieferegreifende Zerstörungen, die bisweilen die Auslösung des Fingers notwendig machten (s. Operationsliste), nicht vermeiden.

Bei einem Manne in Marburg kam es zu pyämischen Metastasen im Schienbein und Fußgelenk, ein Abszess oberhalb der Schambeinfuge brach in die Blase durch. Aufmeißelung des ganzen Schienbeins brachte schließlich die durch Abstoßung vieler kleiner Sequester verzögerte Heilung.

Ein Kranker in Braunschweig starb trotz Auslösung des Fingers und späterer Absetzung bezw. Auslösung des Oberarms (s. Operationsliste unter C. 4).

O.-St.-A. Taubner-Mainz empfiehlt dringend, den wohl schon in einzelnen Garnisonen bestehenden Gebrauch zu verallgemeinern, daß Kranke mit Panaritien und Zellgewebsentzündungen sofort nach dem Revierdienst den Lazaretten überwiesen werden. Bei der jetzigen Form der Lazarettüberweisung werde der Einschnitt mindestens um 6–7 Stunden, oft bis zum nächsten Tage verzögert.

Vierte Unterart: Zellgewebsentzündung und Ausgänge.

(No. 145 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|--------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 906 | 35 356 | 67,1 | 35 113 | 9 | 266 | 35 388 | 874 | 13,0 |

Außerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgardie-Kompagnie, 66 Kadetten und 121 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die Zahl dieser Erkrankungen ist im Vergleich mit dem Vorjahre um 1,8 ‰ K. gestiegen.

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | |
|---------------------|-----------|
| 1881/82 bis 1885/86 | 47,4 ‰ K. |
| 1886/87 „ 1890/91 | 53,6 „ |
| 1891/92 „ 1895/96 | 65,3 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 | 71,4 „ |
| im Jahre 1901/02 | 65,5 „ |
| im Jahre 1902/03 | 67,1 ‰ K. |

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 3043 | 73,6 | XII. (I. K.S.) | 836 | 41,9 |
| I. | 2264 | 71,5 | XIII. (K. W.) | 1489 | 67,3 |
| II. | 1822 | 70,5 | XIV. | 2101 | 66,0 |
| III. | 1031 | 43,8 | XV. | 2443 | 78,2 |
| IV. | 1502 | 67,2 | XVI. | 2737 | 100,2 |
| V. | 1512 | 59,0 | XVII. | 1549 | 52,3 |
| VI. | 1642 | 63,6 | XVIII. | 1739 | 66,2 |
| VII. | 1758 | 65,2 | XIX. (2. K.S.) | 1284 | 62,4 |
| VIII. | 2158 | 80,3 | | | |
| IX. | 1282 | 51,4 | I. K. B. . . . | 1425 | 61,3 |
| X. | 1600 | 73,0 | II. „ „ . . . | 1599 | 74,9 |
| XI. | 1564 | 75,3 | III. „ „ . . . | 1428 | 76,7 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 2016 | 3362 | 3163 | 3404 | 3226 | 3730 | 2918 | 2828 | 2565 | 3036 | 2578 | 2530 |
| ‰ K. | 4,7 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 7,0 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 5,5 | 4,8 | 5,2 |

Im Anschluß an geringfügige Fingerverletzungen entwickelten sich trotz baldiger und ausgiebiger Einschnitte eine Anzahl schwerer Armphlegmonen, die einmal zur Resektion des Handgelenks (Mainz), 4mal zur Absetzung des Oberarms (Metz, Berlin, Braunschweig, Darmstadt) und 1mal zur Auslösung im Schultergelenk (Braunschweig, s. oben) führten. Näheres ist aus der Operationsliste zu ersehen, wo auch die zahlreichen Auslösungen von Fingern aufgeführt sind. — An den unteren Gliedmaßen verschuldeten mehrfach kleine Hautabschürfungen, Wundlaufen u. dergl. Zellgewebsvereiterungen, welche Gliedabsetzungen im Gefolge hatten. 4 mal mußte der Unterschenkel (Berlin 2mal, Metz, Gumbinnen), 1mal der Fuß nach Pirogoff (Spandau) abgesetzt werden. Einer dieser Operierten (Berlin) starb.

In Ulm führte eine von der Ferse (Wundlaufen) ausgehende Zellgewebsentzündung durch schnelle Blutvergiftung (eiterige Brustfellentzündung, miliare Lungenabszesse) in 4 Tagen zum Tode.

In Königsberg i. Pr. entwickelte sich im Anschluß an einen kleinen Furunkel der linken Gesäßhälfte eine stürmische jauchende Phlegmoné am Gesäßs und Oberschenkel; der Tod trat am 6. Tage nach dem Auftreten des Furunkels ein.

In Oldenburg trat nach einem Furunkel der linken Wange eine Eiterung in den linken Schultermuskeln mit septischem Fieber auf. Trotz breiter Eröffnung griff die Eiterung auf den Oberarmknochen, das Ellenbogen- und Handgelenk über. Tod nach 3 Tagen durch Herzlähmung.

In St. A. v. old und in Wiesbaden hatte sich im Anschluß an eine Zellgewebsentzündung am Knöchel bezw. an der Ferse ein eiteriger Erguß im Brustfellraum gebildet, dessen Entleerung durch Rippenausfägung beide Male den Tod nicht aufzuhalten vermochte. Vergleiche Operationsliste unter B. 1.

In Thorn starb ein Mann, bei dem die Haut des Handrückens nach einer kleinen Hautabschürfung brandig geworden war, woran sich eine fortschreitende eiterige Einschmelzung des ganzen Unterhautfettgewebes vom Handrücken bis zur Mitte des Oberarms, später bis zur Schulter anschloß. Die Erkrankung griff dann sprungweise auf den Hals und die anstossenden Teile von Brust und Rücken über. Auch der Zungengrund und eine Mandel wurden brandig.

Zwei Phlegmonen des Augenhöhlengeweibes sind zu erwähnen: Die eine, in Spandau, war von einer Quetschwunde am oberen Augenlid ausgegangen und führte zur Vereiterung des Augapfels und seiner Ausweidung, die andere, in Hannover, schloß sich an einen Furunkel an der rechten Hand an. Letztere siehe Operationsliste unter A. 5.

In Stendal, Schweidnitz und Cöln bedingten tiefe Halsphlegmonen grössere Eingriffe (s. Operationsliste unter A. 5). Sie heilten mit Wiederherstellung der Dienstfähigkeit.

Tödlich verlief dagegen ein tiefer Halsabszess in Jüterbog bei einem Kanonier, der von Beruf „Säbelschlucker“, sich in der Trunkenheit den Säbel eines Feldartilleristen und dann das Seitengewehr eines Fußartilleristen in die Speiseröhre eingeführt hatte. Als wegen der Schluck- und leichten Atembeschwerden ein prophylaktischer Lufröhrenschnitt gemacht werden sollte, starb der Mann plötzlich im Beginn der Narkose. Es fand sich eine große Eiterhöhle in der Umgebung des Rachens und der Speiseröhre. (O.-St.-A. Broesicke.)

Ein Eiterherd hinter dem Brustbein im vorderen Mittelfellraum wurde in Magdeburg eröffnet und geheilt. Mehrfach wird von tiefen Phlegmonen unter der Brust-, Schulter- und Rückenmuskulatur berichtet, die lange und tiefe Einschnitte nötig machten (Berlin I, Brieg [im Anschluß an die Impfung entstanden], Münster, Hanau und Mörchingen). Es trat stets Heilung ein, die Dienstfähigkeit blieb meist erhalten. Bei einem Manne in Königsberg i. Pr. wurde eine Eiteransammlung in den Bauchdecken durch Einschnitt entleert, einige Wochen später ein zweiter Abszess vom Mastdarm aus. Ein faustgroßer Abszess in der Nähe des Mastdarms, der sich bis zum Kreuzbein erstreckte, wurde in Berlin I mit Erhaltung der Dienstfähigkeit geheilt.

Außer den in Gruppe VI erwähnten Abszessen in der Umgebung der Nieren wurden solche in Brandenburg a. H., Freiburg i. Baden und Mörchingen mit gutem Erfolge durch Nierenschnitt operiert (siehe Operationsliste unter B. 6), ebenso in Heilbronn ein Eiterherd in der Lendengegend.

Von den Bauchdecken aus wurde in Düsseldorf ein großer Beckenabszess geöffnet (siehe Operationsliste unter B. 6). — Ein typischer Senkungsabszess längs des großen Lendenmuskels (Psoas) wurde in Braunsberg unterhalb des Poupartschen Bandes am Oberschenkel eröffnet, nachdem der ursprüngliche Eiterherd einige Wochen vorher unterhalb der letzten linken Rippe entleert worden war. Der Mann blieb dienstfähig.

Ausgedehnter, trotz aller therapeutischen Maßnahmen unaufhaltsam fortschreitender Decubitus führte bei einem Typhuskranken in Göttingen zum Tode.

Über die Behandlung der Zellgewebsentzündung finden sich wenig Angaben:

O.-St.-A. Clafsen-Düsseldorf empfiehlt sehr warm „Überschwemmungen“ der freigelegten Gewebe mit Wasserstoff-superoxyd in Lösungen von 3 Gewichts- bzw. 10 Volumprozenten. Die Gewebe erholten sich unter diesem Mittel sehr auffällig, die Reinigung der Wunden gehe schnell vonstatten und die bekannte leichte Ablösung der Schorfe und Borken erleichtere den Verbandwechsel sehr.

O.-St.-A. Vollbrecht sah sehr gute Erfolge von Alkoholverbänden, die er dahin modifiziert hat, daß er eine Mischung von 1 Teil Alkohol auf 3 Teile essigsäure Tonerdelösung verwendet und daß er die Watte der Ersparsnis wegen durch sterilisierte Kissen aus Sägespänen ersetzt. (Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1904, S. 137.)

Fünfte Unterart: Furunkel.

(No. 146 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|--------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 375 | 27 262 | 51,8 | 27 288 | — | 22 | 27 310 | 327 | 9,2 |

Außerdem erkrankten noch 93 Kadetten und 119 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die seit einigen Jahren bemerkbare Verminderung der Furunkel hat auch in diesem Berichtsjahre angehalten.

Es gingen zu im Durchschnitt der Jahre:

1881/82 bis 1885/86 . . . 67,7 $\frac{0}{00}$ K.,

1886/87 „ 1890/91 . . . 76,1 „ „

1891/92 „ 1895/96 . . . 75,9 „ „

1896/97 „ 1900/01 . . . 64,1 „ „

im Jahre 1901/02 . . . 53,4 „ „

im Jahre 1902/03 . . . 51,8 $\frac{0}{00}$ K.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 2774 | 67,1 | XII. (1.K.S.) | 729 | 36,5 |
| I. | 2060 | 65,1 | XIII. (K.W.) | 1364 | 61,7 |
| II. | 1780 | 68,9 | XIV. | 1683 | 52,9 |
| III. | 961 | 40,9 | XV. | 1487 | 47,6 |
| IV. | 963 | 43,1 | XVI. | 1611 | 59,0 |
| V. | 1093 | 42,7 | XVII. | 1252 | 42,3 |
| VI. | 1071 | 41,5 | XVIII. | 1261 | 48,0 |
| VII. | 1318 | 48,9 | XIX. (2.K.S.) | 919 | 44,6 |
| VIII. | 1378 | 51,3 | | | |
| IX. | 986 | 39,5 | I. K. B. . . | 1350 | 58,1 |
| X. | 1084 | 49,5 | II. „ „ . . | 1301 | 61,0 |
| XI. | 1488 | 71,7 | III. „ „ . . | 1114 | 59,8 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 1672 | 2818 | 2456 | 2666 | 2574 | 2669 | 2139 | 2235 | 2111 | 2323 | 2160 | 1439 |
| ‰ K. . . . | 3,9 | 5,2 | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 3,0 |

Wegen chronischer, fortgesetzt rückfälliger Furunkulose mußten in Berlin, Potsdam, Ulm, Metz-Stadt und -Montigny Entlassungen als dienstunbrauchbar erfolgen.

Neuerungen in der Behandlung sind nicht zu verzeichnen. Die innerliche Verabreichung von Bierhefe und Arsen ist nur noch in Berlin mit gutem Erfolge angewendet worden.

O.-St.-A. Heinicke-Gotha machte mit Einspritzungen 2 %igen Karbolwassers (s. a. Sanitätsbericht 1901/02) in die Furunkel günstige Erfahrungen.

In Straßburg i. E. wurde die Furunkulose durch Einpackungen mit dicken Schichten Schmierseife und nachfolgenden Spiritusverbänden sehr günstig beeinflusst.

St.-A. Würth v. Würthenau-Mülhausen i. E. warnt wieder vor dem noch immer geübten „Ausdrücken“, weil dadurch die Verschleppung von Infektionskeimen begünstigt werde. Furunkel am Knie seien besonders früh zu eröffnen, um die so häufige Vereiterung der präpetellaren Schleimbeutel zu verhüten.

Sechste Unterart: Gutartige Geschwülste.

(No. 147 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | % K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 15 | 723 | 1,4 | 701 | — | 20 | 721 | 17 | 15,9 |

Außerdem erkrankten noch 3 Kadetten und 2 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Außer den in der Operationsliste unter D. aufgeführten sind folgende Erkrankungen zu erwähnen:

Eine Dermoidcyste mit Hautbestandteilen wurde in Ulm aus der Schläfengegend, eine solche mit mehreren Haarbüscheln in Frankfurt a. O. aus der Gesäßsgegend entfernt.

In Metz wurde ein Chondrom der linken Ohrmuschel bei einem Manne entfernt, der schon zweimal wegen Blutgeschwulst an derselben Ohrmuschel behandelt worden war. In St. Avold wurde eine glatte Knorpelgeschwulst aus der Scheidenhaut des Hodens herausgeschnitten. — In Mülhausen i. E. lehnte ein Mann die Operation eines präperitonealen Lipoms der Mittellinie des Bauches, zwischen Nabel und Schwertfortsatz, ab, blieb aber dienstfähig. Ein Bruch bestand nicht.

In Colmar i. E. mußte ein Mann, der die operative Entfernung einer cystischen Geschwulst der rechten Ohrspeicheldrüse verweigerte, als dienstunbrauchbar entlassen werden.

Siebente Unterart: Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen.

(No. 148 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | % K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 3 | 99 | 0,19 | 83 | — | 16 | 99 | 3 | 21,7 |

Außerdem erkrankten noch 1 Kadett und 2 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Unter dieser Nummer beschreibt St.-A. Remmert-Berlin folgenden schweren Krankheitsfall:

Ein Kanonier aus Perleberg erkrankte 8 Tage nach Beendigung einer Schmierkur auf Urlaub in Berlin unter Schüttelfrost an einer Hautentzündung mit charakteristischer blätterteigartiger Abschilferung großer Epidermisfetzen, von denen täglich große Mengen aus dem Bett entfernt werden mußten.

Der Zustand war 8 Tage lang wegen anhaltend hohen Fiebers mit Schüttelfrösten, großer Hinälligkeit und Benommenheit sehr ernst. Zweimal traten Darmblutungen auf. Nach Aufhören der Hautabschilferung traten zahllose kirschkern- bis taubeneigroße Hautabszesse auf, von denen wochenlang, täglich 20 bis 40, außer einem großen Eiterherd am rechten Oberarm geöffnet werden mußten.

Eine Besserung des Zustandes trat erst nach Ausschälung der unter neuen Fieberbewegungen größtenteils vereiterten beiderseitigen Leistendrüsen ein. — Die Finger- und Zehennägel, welche fast sämtlich verloren gegangen waren, ersetzten sich wieder. Ein Ausfall der Haare ist nicht erwähnt.

Bei einem Mann in Coblenz aus unbekannter Ursache bald auf einer, bald auf beiden Seiten aufgetretene Schwellungen der Augenlider beseitigte St.-A. Hanel durch Mutterkornaufguß.

XI. Gruppe: Krankheiten der Bewegungsorgane.

(No. 149 bis 162 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | % K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | % der Behand- delten | absol. Zahl | % der Behand- delten | absol. Zahl | % der Behand- delten | absol. Zahl | % der Behand- delten | | | |
| 1023 | 35 445 | 67,3 | 34 107 | 93,5 | 5 | 0,01 | 1358 | 3,7 | 35 470 | 97,3 | 998 | 486 343 | 13,3 |

Außerdem erkrankten noch 3 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 5 Invaliden, 58 Kadetten und 75 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Dafs diese Gruppe durch Neuaufnahme der Spalte 155 „Fufsgeschwulst“ einen beträchtlichen Zuwachs erhalten

hat, ist schon unter Gruppe X auf Seite 121 erwähnt, woselbst auch die Höhe des Zuganges für 1902/03 mit 13 244 Mann = 25,2 % K. angegeben ist. Nach Abzug dieser Zahl beträgt der Gesamtzugang der Gruppe XI nur 22 201 Mann = 42,1 % K.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|----------------|---------------|-------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 3118 | 75,4 | XII. (I.K.S.) | 1455 | 72,9 |
| I. | 2103 | 66,5 | XIII. (K. W.) | 1773 | 80,1 |
| II. | 2219 | 85,9 | XIV. | 2145 | 67,4 |
| III. | 1692 | 71,9 | XV. | 1873 | 60,0 |
| IV. | 1335 | 59,7 | XVI. | 1735 | 63,5 |
| V. | 1572 | 61,4 | XVII. | 1675 | 56,6 |
| VI. | 1278 | 49,5 | XVIII. | 1580 | 60,1 |
| VII. | 1963 | 72,8 | XIX. (2.K.S.) | 1522 | 73,9 |
| VIII. | 1630 | 60,7 | | | |
| IX. | 1579 | 63,3 | I. K. B. . . . | 2305 | 99,1 |
| X. | 1243 | 56,7 | II. „ „ . . . | 2142 | 100,4 |
| XI. | 1955 | 94,1 | III. „ „ . . . | 1521 | 81,7 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 1468 | 3016 | 2051 | 3011 | 2842 | 3832 | 3005 | 2970 | 2934 | 3674 | 2904 | 3738 |
| ‰ K. | 3,4 | 5,6 | 3,8 | 5,6 | 5,3 | 7,1 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 6,6 | 5,4 | 7,7 |

Erste Unterart: Entzündungen der Knochen und der Knochenhaut, Mißbildung der Knochen.

(No. 149 bis 151 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 135 | 5272 | 10,0 | 4968 | 3 | 321 | 5292 | 115 | 18,5 |

Außerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 10 Kadetten und 11 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Knochenhautentzündungen betrafen in der Mehrzahl das Schienbein. Seltener waren Kiefer-, Fuß- und Handknochen und nur 1 mal das Becken befallen.

Während die Erkrankungen am Ober- und Unterkiefer stets von schadhafte Zähnen ausgingen, wurden in den übrigen Fällen meistens mechanische Reizeinwirkungen als Ursache angesehen.

Hierher gehören z. B. 4 Erkrankungen am Fersenbein, die durch Zug der Achillessehne entstanden sein sollen (Schneidmühl, Frankfurt a. O.), und eine Erkrankung des Oberarmbeins am Ansatz des Deltamuskels (Glatz). — 1 mal trat eine Knochenhautentzündung der horizontalen Schambeinäste bei einem Manne auf, der an einem furunkulösen Kopfausschlag litt (Konstanz).

Bei 1 Kranken in Berlin, der nach einem Schlag auf eine Fußbadewanne an Knochenhautentzündung der Mittelhandknochen erkrankte, entwickelte sich eine Ernährungsstörung der ganzen Hand, die Klauenstellung annahm. Invalide.

Über die Behandlung der Knochenhautentzündungen am Schienbein sei erwähnt, daß O.-St.-A. Ritter-Dessau durch Spaltung und Zurückschieben der verdickten Knochenhaut und Vernähung der Hautwunde in 4 Fällen 3 mal guten Erfolg erzielte (s. auch den vorigen Bericht, Seite 120).

Die Anwendung von heißer Luft schien keinen Erfolg zu haben (Berlin).

Als Folge von Knochenhautentzündungen, welche nach einem einmaligen heftigen Reiz (Stoß) eintraten, bildeten sich 2 mal umschriebene, große Knochengeschwülste (Exostosen) am Oberschenkel (Magdeburg, Liegnitz) (s. auch Gruppe XII, No. 165).

Eiterige Entzündungen der Knochen und des Knochenmarks. Aus 24 Lazaretten liegen 32 Einzelberichte vor. Veranlaßt waren die Erkrankungen 2 mal durch Zellgewebsentzündungen, 2 mal durch direkte Verletzung der erkrankten Knochen, 2 mal durch bösartige Furunkel, 3 mal durch Zahnfäule und 1 mal durch einen Fremdkörper (Glassplitter) (Diedenhofen). In 12 Fällen finden sich allgemeine Angaben über mechanische Schädigungen wie Stoß, Schlag oder größere Anstrengung, 10 mal ist keine Ursache angegeben. — 5 Erkrankungen waren Rückfälle einer vor Jahren überstandenen ähnlichen Erkrankung.

Der Sitz der Entzündung war 10 mal der Oberschenkel, je 3 mal der Oberarm, das Schienbein, der Unterkiefer, die Wirbelsäule und das Becken, 2 mal eine Rippe und je 1 mal die Elle, das Wadenbein, Brustbein, Fersenbein und die Fußwurzel.

Die 3 Erkrankungen der Wirbelsäule, von denen 1 vor der Dienstzeit beim Heuaufladen (Mergentheim), 1 beim Wassertragen (Ulm), 1 bei einem Sturz vom Pferde (Metz-Montigny) entstanden sein sollten, schienen tuberkulöser Natur zu sein, ebenso die des Brustbeins (Berlin) und eine Rippenerkrankung (Annaburg). — Während die Krankheit die Röhrenknochen meist primär ergriffen hatte, trat sie bei den maschigen und flachen Knochen entweder metastatisch oder infolge direkter Verletzung auf. Erwähnenswert sind folgende Beobachtungen:

Ein Ulan in Fürstenwalde erkrankte Ende Januar an einem bösartigen Furunkel der Oberlippe, der mehrmals geschnitten wurde. Am 5. Februar trat eine eiterige Entzündung des rechten Fersenbeins auf. Trotz ausgedehnter Aufmeißelung und Auskratzung setzte sich die Erkrankung auf die Fußwurzelknochen fort und der Kräfteverfall machte eine Absetzung im Unterschenkel notwendig. Es wurde der Staphylococcus pyogenes citreus im Eiter nachgewiesen. (O.-St.-A. Grünbaum.) — Bei einem Kanonier in Torgau entstand zunächst nach einem großen Furunkel an der linken Hinterbacke unter heftigem Fieber eine Vereiterung des linken Kniegelenks; nach dessen Aussägung folgte eine Vereiterung des Oberschenkels, welcher schliesslich ausgelöst werden mußte (O.-St.-A. Bock). Siehe Operationsliste unter C. 4.

O.-St.-A. Vollbrecht-Darmstadt wendete einmal zur Ausfüllung der bei einer Aufmeißelung am Oberarm entstandenen Höhle die Jodoform-Knochenplombe von Mosetig-Moorhof an, deren Gebrauch er auf das wärmste empfiehlt. — Die Plombe hat sich auch späterhin nicht gelockert. Vergleiche Operationsliste unter C. 1.

Bemerkenswert ist, daß bei 3 Erkrankungen des Unterkiefers, welche sich an Eiterungen schadhafter Zähne anschlossen, ein Absterben des Knochens in so weiter Ausdehnung Platz griff, daß 1 mal eine ganze Unterkieferhälfte (Altona) und 2 mal der aufsteigende Kieferast verloren gingen (Hildesheim, Danzig). — St.-A. Neumann-Mainz bemerkt, daß wenn sich die Entzündung auf den aufsteigenden Kieferast fortsetzt, eine Spaltung bis auf den scharfen Rand des Unterkieferwinkels nicht genügt, daß man dann die Ansätze der äußeren und inneren Kaumuskel vom Knochen abhebeln muß, um den Eiter, der zwischen ihnen und dem aufsteigenden Kieferast sitzt, Abfluß zu verschaffen. Geschehe das nicht, so trete ein Absterben des von Eiter umspülten Knochens in großem Umfange ein, ja der Eiter könne dann nach der Schädelbasis hin durchbrechen.

Mißbildungen der Knochen. Vereinzelt kamen ohne äußere Ursache entstandene Knochenauswüchse an den Wachstumslinien (Epiphysenlinien) der Knochen vor, die als cartilaginäre Exostosen beschrieben werden.

Ein Musketier in Hameln hatte solche Knochenauswüchse von Walnußgröße an den Wachstumslinien zahlreicher Knochen der Gliedmaßen seit früher Jugend. Der Vater des Mannes soll ähnliche Veränderungen aufweisen. Die Auswüchse werden als multiple chondrogene Osteome nach Virchow gedeutet (St.-A. Brücke). — Bei einem Grenadier in Mannheim wurden 9 Monate nach der Einstellung walnußgroße Knochengeschwülste an beiden Schlüsselbeinen festgestellt, die dicht an der Verbindung der Schlüsselbeine mit dem Schulterblatt saßen, wo die Tornisterriemen diese Knochen kreuzen. In der Jugend hatte der Mann an englischer Krankheit gelitten. Operation wurde abgelehnt, invalide (St.-A. Mantel).

Coxa vara wurden 5 mal beobachtet. In Mülhausen i. E. wurde 1 mal eine frühere seitliche Quetschung des Beckens, 1 mal überstandene englische Krankheit als Ursache angenommen (St.-A. Würth von Würthenau). In Heidelberg sollte eine Verbiegung durch Marschanstrengungen bei schon vorhandener abnormer Weichheit des Knochens entstanden sein (St.-A. Weichel). 2 mal (Brandenburg a. H., Karlsruhe) war keine Ursache angegeben. Alle 5 Kranke wurden als dienstunfähig bzw. invalide entlassen.

Zweite Unterart: Entzündungen und Mißbildungen der Gelenke.

(No. 152 bis 154 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 95 | 2869 | 5,4 | 2330 | 2 | 541 | 2873 | 91 | 24,6 |

Außerdem erkrankten noch 11 Kadetten und 10 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Aus 39 Garnisonen wird über 425 Gelenkentzündungen berichtet. Davon waren 329 akuter und 96 chronischer Art.

Soweit sich bestimmte Angaben über das erkrankte Gelenk finden, war bei den akuten Entzündungen

280 mal das Kniegelenk, 7 mal das Fußgelenk, 3 mal das Hüft- und das Ellenbogengelenk, 2 mal das Hand- und die Fingergelenke, je 1 mal das Schulter-, Kiefer-, Darm-Kreuzbein- und ein Zehengelenk betroffen.

Chronische Entzündungen entfielen 60 mal auf ein Kniegelenk, 12 mal auf ein Hüftgelenk, 9 mal auf ein Fußgelenk, 4 mal auf ein Ellenbogengelenk, 3 mal auf ein Handgelenk, 2 mal auf Zehen- und Fingergelenke und 6 mal auf Gelenke der Wirbelsäule. Der häufigste Sitz der Erkrankung war also bei beiden Arten das Kniegelenk.

Bei den akuten Entzündungen wird als Ursache entweder die Einwirkung einer stumpfen Gewalt oder Verstauchung bzw. „Vertreten“ oder Anstrengung im Dienst angegeben. Nur 6 Erkrankungen durch Tripper werden erwähnt, wobei 5 mal ein Kniegelenk (Düsseldorf, Erfurt, Ulm, Stuttgart) und 1 mal ein Handgelenk (Berlin) befallen war. In der Gelenkflüssigkeit konnte 1 mal der Trippererreger nachgewiesen werden (Düsseldorf).

Infolge einer schweren eiterigen Kniegelenkentzündung, ausgehend von einer Scheuerwunde am Fuß, wurde ein Mann in Oldenburg invalide.

Eine akute Entzündung beider Kiefergelenke sah St.-A. Richter in Heilbronn bei einem wegen Verstauchung eines Fußgelenks im Lazarett befindlichen Musketier unmittelbar nach dem Abendessen auftreten. Da im weiteren Verlauf eine seitliche Verschiebung des Unterkiefers und ein Knacken beim Öffnen des Mundes zurückblieb, war möglicherweise eine Verrenkung des Zwischenknorpels die Ursache der Entzündung.

Chronische Gelenkentzündungen waren zum Teil Restzustände der akuten, zum Teil beruhten sie auf Tuberkulose. Letztere hatte 4 mal das Knie- und 4 mal das Fußgelenk befallen.

O.-St.-A. Doebbelin-Danzig fand bei einem ehemaligen Husaren, der 5 Jahre vorher im Dienst auf den Rücken gestürzt war, eine Verknöcherung der 7. bis 12. Zwischenwirbelscheibe und eine knöcherne Verwachsung der stark nach hinten vorspringenden Dorn- und Querfortsätze. Vermutlich handelte es sich um Tuberkulose.




O.-St.-A. Herrmann-Hildesheim berichtet, daß sich bei einem Invaliden, der in der Schlacht bei Spichern einen Schuß ins rechte Ellenbogengelenk erhalten hatte, im Dezember 1902 ohne besondere Veranlassung Entzündung und Eiterung einstellte, die die in der Operationsliste unter C. 3 erwähnte Absetzung nötig machte. Es wurden versprengte Geschosssplitter, aber keine Kleiderfetzen gefunden.

Von 12 Gelenkkörpern, über welche eingehendere Berichte vorliegen, befanden sich 8 im rechten Kniegelenk, 3 im rechten Ellenbogengelenk, 1 im linken Fußgelenk.

In letzterem Falle handelte es sich um einen nach einem Bruch des äußeren Knöchels verschieblich gebliebenen Knorpel an der vorderen Kante des Wadenbeins. Eine operative Entfernung wurde abgelehnt. Der Mann mußte als invalide entlassen werden (O.-St.-A. Boeck-Gumbinnen). — Das Gleiche war der Fall bei einem Füsilier in Berlin, der ohne besonderen Anlaß mehrfach über Schmerzen im rechten Kniegelenk geklagt hatte. Im Gelenk, das äußerlich nicht verändert erschien, fand St.-A. Grüber durch das Röntgenbild einen pflaumenkerngroßen, umschriebenen Herd im inneren Oberschenkelknorren, an der Grenze zwischen Knorpel und Knochen, der als Vorstufe eines

Zugang an Fußgeschwulst in den Armeekorps,
auf 1000 der Iststärke berechnet.

Karte XXIX u. XXX.





freien Gelenkkörpers gedeutet wurde (Osteochondritis dissecans nach König).¹⁾

Bei den übrigen 10 Erkrankungen wurden die Gelenkkörper operativ entfernt. 9 mal waren sie frei im Gelenk, 1 mal mit der Kapsel verwachsen (Kulm). Mehrmals bestanden Gelenkergüsse. In allen Fällen trat Heilung ein, die 7 mal zur Wiederherstellung der Dienstfähigkeit führte. Die näheren Angaben enthält die Operationsliste unter C. 5.

Bei der Behandlung von Gelenkergüssen tritt ein Teil der Berichterstatter für sofortige Punktion ein,²⁾ die anderen wollen ohne Punktion gleiche Erfolge beobachtet haben.

St.-A. Neumann-Mainz meint, daß es sich im allgemeinen empfehle, sowohl seröse wie blutige Ergüsse anfangs konservativ zu behandeln und sie erst operativ zu entleeren, wenn sie nicht bald aufgesaugt werden; sonst trete leicht eine Verklebung der Gelenkflächen und eine Dehnung der Gelenkkapsel ein. Sehr erhebliche Ergüsse seien am besten sofort zu entleeren.

St.-A. Coste-Straßburg i. E. hat bei Gelenkergüssen gute Resultate mit der Bierschen Stauung erzielt.

Unter Gelenkmifsbildungen ist eine krankhafte Verdickung beider Daumengelenke rechts von Interesse, welche das Bild des schnellenden Daumens hervorrief (St.-A. Sydow-Schneidemühl).

Hallux valgus wurde 2 mal durch eine Operation

beseitigt und Dienstfähigkeit erzielt (Spandau, Mühlhausen i. E.).

Dritte Unterart: Fußgeschwulst.


(No. 155 des Rapportmusters)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 607 | 13 244 | 25,2 | 13 140 | — | 93 | 13 233 | 618 | 12,1 |

Außerdem erkrankten noch 3 Kadetten und 7 Unteroffiziersvorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

In der nachfolgenden Kurventafel ist die Bewegung des Krankenzuganges für den 5jährigen Durchschnitt 1896/97 bis 1900/01 und das Berichtsjahr 1902/03 zur Anschauung gebracht. In jedem Jahre findet sich im Herbst zur Zeit der Exerzierausbildung der neu eingestellten Mannschaften ein erhebliches Ansteigen der Kurve. Ein zweiter Anstieg beginnt mit dem März und erreicht seine größte Höhe im Sommer zur Zeit der großen Exerzier- und Marschanstrengungen. Zwischen beiden Erhebungen liegt der tiefste Abfall jedesmal im Oktober bzw. Dezember bis Februar.

Zugang an Fußgeschwulst nach Monaten auf Tausend der Iststärke berechnet.



1) Veröffentlicht: Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 1903, XVIII.

2) O.-St.-A. Schmidt-Berlin. Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1903, Heft 7.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|-----------------|---------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 1091 | 26,4 | XII. (1. K. S.) | 675 | 33,8 |
| I. | 911 | 28,8 | XIII. (K. W.) | 586 | 26,5 |
| II. | 998 | 38,6 | XIV. | 804 | 25,3 |
| III. | 606 | 25,8 | XV. | 758 | 24,3 |
| IV. | 244 | 10,9 | XVI. | 611 | 22,4 |
| V. | 624 | 24,4 | XVII. | 691 | 23,3 |
| VI. | 429 | 16,6 | XVIII. | 422 | 16,1 |
| VII. | 839 | 31,1 | XIX. (2. K. S.) | 682 | 33,1 |
| VIII. | 513 | 19,1 | | | |
| IX. | 576 | 23,1 | I. K. B. . . . | 633 | 27,2 |
| X. | 412 | 18,8 | II. „ „ . . . | 768 | 36,0 |
| XI. | 772 | 37,2 | III. „ „ . . . | 446 | 24,0 |

Die durchschnittliche Behandlungsdauer (Revier- und Lazarettkranke) war in den einzelnen Armeekorps nicht weniger verschieden als der Krankenzugang. Auch das Verhältnis der im Revier bzw. Lazarett Verpflegten zueinander zeigt sehr wesentliche Unterschiede. Die nachstehende Tabelle, in der die Armeekorps nach der Höhe der Behandlungstage geordnet sind, enthält in der 2. Spalte zugleich die Angabe, wieviel Prozent des Krankenzuganges in Lazarettbehandlung kamen.

| Armeekorps | durchschnittliche Behandlungsdauer | von 100 unter No. 155 des Rapportmusters geführten Kranken kamen in Lazarettbehandlung | Armeekorps | durchschnittliche Behandlungsdauer | von 100 unter No. 155 des Rapportmusters geführten Kranken kamen in Lazarettbehandlung | Armeekorps | durchschnittliche Behandlungsdauer | von 100 unter No. 155 des Rapportmusters geführten Kranken kamen in Lazarettbehandlung |
|-------------------|------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|--|
| XIII. (K. W.) . . | 17,4 | 37,9 | XV. | 12,3 | 33,6 | XIV. | 10,4 | 23,7 |
| III. | 15,1 | 40,3 | VIII. | 11,9 | 25,8 | XIX. (2. K. S.) | 10,4 | 30,9 |
| II. | 14,4 | 41,6 | I. | 11,8 | 32,1 | XI. | 10,0 | 27,6 |
| VI. | 14,3 | 46,5 | G. | 11,6 | 16,8 | XVIII. | 10,0 | 25,6 |
| XVII. | 13,6 | 34,5 | IV. | 11,6 | 39,0 | XVI. | 9,7 | 21,4 |
| IX. | 13,3 | 34,1 | V. | 11,3 | 20,9 | XII. (1. K. S.) | 8,9 | 22,3 |
| X. | 13,1 | 33,9 | VII. | 11,2 | 27,2 | Armee | 12,1 | 30,1 |

Auch in den diesjährigen Berichten sind die Knochenbrüche am Mittelfuß teilweise unter dieser, teilweise unter Rapportnummer 173 verrechnet, so daß sich kein deutliches Bild gewinnen läßt.

Aus 30 Lazaretten sind 1107 Erkrankungen berichtet. In 291 Fällen fanden sich auch bei der Röntgenuntersuchung keine Veränderungen am Knochen.

Unter den Zugängen überwog auch diesmal der erste Jahrgang. In 6 größeren Lazaretten gehörten von 299 Zugegangenen 251 dem ersten Jahrgang an. — Vorzugsweise war wieder der linke Fuß erkrankt.

Bezüglich der strittigen spät auftretenden Schatten im Röntgenbild meint St.-A. Neumann-Mainz, daß man sie zwanglos als Knochenneubildung nach vorausgegangener Knochenentzündung deuten könne.

Als Heilverfahren kamen wie früher in erster Linie unbedingte Ruhe, feuchte Einwickelung des Fußes und Massage in Betracht. O.-St.-A. Heraucourt-Celle empfiehlt heiße Fußbäder mit nachherigen kalten Übergießungen und läßt später die Kranken unter ärztlicher Aufsicht im Lazarett exerzieren. St.-A. Gräfsner-Rendsburg läßt die Kranken sofort mit Gipsverbänden, welche von den Knöcheln bis zu den Zehen reichen, herumgehen. O.-St.-A. Roth-Spandau rühmt die Biersche Stauung am Unterschenkel.¹⁾ Auch Heißluftbäder erwiesen sich wieder als nützlich (Berlin II).

¹⁾ Siehe Veröffentlichung von St.-A. Momburg-Spandau, Deutsche militärärztliche Zeitschrift, 1904.

Vierte Unterart: Plattfüßigkeit und Folgezustände. Andere Verbildungen des Fußes und Folgezustände.

(No. 156 und 157 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|--------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst-fähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 10 | 803 | 1,5 | 631 | — | 179 | 810 | 3 | 14,1 |

Außerdem erkrankten noch 2 Kadetten. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die wegen Plattfußbeschwerden zugegangenen Kranken gehörten größtenteils den neu eingestellten Mannschaften an.

In Ulm und Magdeburg wurde in je einem Falle versucht, eine Rückbildung der Plattfußstellung durch Gipsverbände zu erreichen, die in Chloroformbetäubung bei möglichst in Klumpfußstellung gebrachteten Fuß angelegt waren. Der Erfolg war weder bei diesen noch bei einzelnen mit Heftpflasterverbänden behandelten Kranken befriedigend.

Bei einem in Offenburg zur Beobachtung aufgenommenen Invaliden hatten sich infolge der andauernden, die Nachtruhe störenden Schmerzen, derentwegen vergeblich Nervenabschnidungen am Schienbeinnerven und am großen Rosenerven vorgenommen waren, nervöse Erscheinungen mit tiefer, seelischer Niedergeschlagenheit ausgebildet. St.-A. v. Pezold.

Fünfte Unterart: Muskelrheumatismus. Andere Krankheiten der Muskeln.

(No. 158 und 160 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 48 | 6890 | 13,1 | 6782 | — | 89 | 6871 | 67 | 7,9 |

Außerdem erkrankten noch 2 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 5 Invaliden, 24 Kadetten und 36 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die einzelnen Armeekorps waren an dem Gesamtzugang folgendermaßen beteiligt:

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|--------------------|---------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 668 | 16,2 | XII. (I.K.S.) . | 263 | 13,2 |
| I. | 429 | 13,6 | XIII. (K.W.) . | 409 | 18,5 |
| II. | 335 | 13,0 | XIV. | 541 | 17,0 |
| III. | 233 | 9,9 | XV. | 360 | 11,5 |
| IV. | 222 | 9,9 | XVI. | 327 | 12,0 |
| V. | 300 | 11,7 | XVII. | 274 | 9,3 |
| VI. | 245 | 9,5 | XVIII. | 457 | 17,4 |
| VII. | 377 | 14,0 | XIX. (2.K.S.) . | 293 | 14,2 |
| VIII. | 370 | 13,8 | | | |
| IX. | 225 | 9,0 | I. K. B. | 821 | 35,3 |
| X. | 218 | 9,9 | II. „ „ | 625 | 29,3 |
| XI. | 344 | 16,6 | III. „ „ | 574 | 30,8 |

Die unter Muskelrheumatismus geführten Erkrankungen bieten nichts Bemerkenswertes.

Unter anderen Erkrankungen der Muskeln sind mehrere Fälle von Knochenneubildung innerhalb eines Muskels aufgezählt, über welche in Gemeinschaft mit anderen gleichartigen Erkrankungen in der Gruppe XII unter Rapportnummer 166 berichtet werden wird.

Von 3 Muskelzerreißen war eine Zerreißen des geraden Bauchmuskels in Hannover beim Reiten entstanden. Die zweite ist nur als Einriß in den linken, äußeren, schrägen Bauchmuskel bezeichnet (Metz). — Im dritten Fall hatte ein Ökonomiehandwerker in Mainz plötzlich den linken Fuß nicht mehr gebrauchen können, als er eine Treppe schnell herunterlief. Nach der Anschwellung konnte man mit dem Finger tief zwischen die Wadenmuskulatur und die hintere Schienbeinfläche eindringen. Es wurde angenommen, daß sich der Mann schon vor seiner Einstellung beim Ausgleiten auf der Straße den Schollenmuskel (M. soleus) teilweise abgerissen habe, und daß jetzt eine gleiche Verletzung eingetreten sei. O.-St.-A. Taubner.)

Ein faustgroßer, beim Reiten entstandener Muskelbruch am Anziehermuskel des linken Oberschenkels wurde in Danzig durch O.-St.-A. Doebbelin operativ beseitigt. — Ein gleicher beim Turnen am Klettergerüst entstandener Bruch am rechten Oberschenkel wurde von O.-St.-A. Boeckler in Offenburg durch Druckverbände soweit zurückgebracht, daß er keine Beschwerden mehr machte.

Muskelschwund findet sich 8 mal verzeichnet.

1 mal war der Unter-, 2 mal der Oberschenkel, 5 mal die Muskulatur des Schultergürtels betroffen. Die Ursache war 1 mal vermutlich die von Hoffa beschriebene arthritische

Muskelatrophie (Königsberg i. Pr.), 1 mal eine Lungenentzündung (Osterode); 2 mal war Quetschung des betreffenden Körperteils vorausgegangen (Ludwigsburg, Metz). In 1 Falle handelte es sich wahrscheinlich um ein altes Leiden (Ludwigsburg), 2 mal konnte eine Ursache nicht ermittelt werden (Saarburg, Stuttgart), 1 mal entstand die Krankheit im Anschluß an eine Drüsenoperation (Metz). — 2 Leute wurden dienstfähig (Stuttgart, Saarburg), die übrigen mußten entlassen werden.

Einen der Thomsenschen Krankheit (Myotonia congenita) zuzurechnenden Krankheitsfall berichtet St.-A. Wiemuth:

Der von dem Leiden befallene Jäger in Potsdam gab an, daß er (wie seine 4 Geschwister) von Kindheit an im Anfange einer jeden Bewegung eine Steifigkeit im ganzen Körper empfinde, die erst nach längerer Ausführung der Bewegung verschwinde. Im Vergleich zu der athletenähnlichen Muskulatur des gesund aussehenden Mannes war die rohe Muskelkraft gering. Die aktiv oder passiv zur Bewegung gebrachten Muskeln blieben hinterher 20—30 Sekunden in einem ungewöhnlichen Spannungszustand; bei passiver Beugung eines Gelenks setzten die Beuger einer schnell hinterher vorzunehmenden Streckung etwa 20 Sekunden lang einen erheblichen Widerstand entgegen. Am deutlichsten waren diese Erscheinungen an den Beinen ausgeprägt, wodurch das Gehen sehr behindert wurde. Die elektrische Erregbarkeit der Nerven war regelrecht, die der Muskeln gesteigert. Sie antworteten mit lange andauernden Zusammenziehungen. K. S. Z. = A. S. Z. Öffnungszuckungen waren gar nicht auszulösen. Die von Erb (Handbuch für Elektrotherapie) angegebenen rhythmischen Kontraktionswellen ließen sich nicht nachweisen. Dienstunbrauchbar.

Von sonstigen Krampfzuständen der Muskeln ist 1 mal berichtet:

Ein Mann in Magdeburg bekam, angeblich nach einem Klimmzuge, plötzlich heftige klonische Krämpfe im rechten Kopfnickermuskel, die trotz vielfacher Behandlung bestehen blieben und zur Invalidisierung führten (St.-A. Neuhaus).

Sechste Unterart: Exerzier- und Reitknochen.

(No. 159 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 1 | 42 | 0,08 | 34 | — | 6 | 40 | 3 | 29,8 |

Nur 2 berichtete Erkrankungen im linken großen Brustmuskel bzw. in den ihm benachbarten Faserbündeln des Deltamuskels sind als Exerzierknochen im engeren Sinne aufzufassen, da sie allmählich durch das wiederholte scharfe Einsetzen des Gewehrs entstanden waren (Lübeck, Mörchingen). Die übrigen ähnlichen, meist durch Verletzungen hervorgerufenen Verknöcherungen werden bei No. 165 der Gruppe XII behandelt werden.

Von den 2 Exerzierknochen wurde 1 mit Umschlägen und Massage behandelt. Der Mann wurde nach 3 maligen Rückfällen wieder dienstfähig. Im anderen Falle (Lübeck) wurde ein spindelförmiger, knorpliger Körper mit Knochenkern operativ entfernt. Auch dieser Mann blieb dienstfähig.

Siebente Unterart: Krankheiten der Schleimbeutel und Sehnen.

(No. 161 und 162 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 127 | 6325 | 12,0 | 6222 | — | 129 | 6351 | 101 | 12,3 |

Außerdem erkrankten noch 8 Kadetten und 11 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Unter 217 zahlenmäßig erwähnten Schleimbeutelentzündungen finden sich 24 eitrige. Der Sitz ist 169 mal angegeben, davon waren die vor der Kniescheibe gelegenen Schleimbeutel 143 mal betroffen, 13 mal diejenigen am Ellenbogen, 4 mal die an den Knöcheln, 3 mal die in der Kniekehle, 2 mal die unter dem Schulterblatt und je 1 mal die am Hüftgelenk, Mittelfuß - Großzehengelenk, Sitzbeinknurren und Schlüsselbein.

Die Behandlung der nicht eitrig-entzündungen bestand nach wie vor in Ruhigstellung, Druckverbänden, Aufpinselungen von Jodtinktur, sowie in Punktion und auch gelegentlich in Ausschälung des erkrankten Schleimbeutels.

St.-A. Brandt (Berlin II) wandte mit gutem Erfolge Spiritusverbände an, unter denen sich die geschwollenen Schleimbeutel verkleinerten. Bei den vereiterten ging die Entzündung zurück und der dünnflüssige eitrig-schleimige Inhalt konnte ohne stärkeres Drücken durch einen kleinen Einschnitt entleert werden. St.-A. Brandt spülte außerdem nach jeder Entleerung 1 mal mit 1% iger Höllensteinlösung aus. — Sonst wurden die eitrig-entzündungen sämtlich durch Einschnitt geheilt. Dienstunbrauchbar wurden nur 2 Leute mit Schleimbeutelentzündungen in der Kniekehle, welche die Operation verweigerten (Magdeburg).

Als Ursache der Erkrankung des Kniescheibenschleimbeutels wird häufiges Hinknien bezeichnet (Weingarten, Ulm).

St.-A. Crampe glaubt, daß die Erkrankungen wegen des Anschlagübens im Knieen am rechten Knie häufiger vorkämen.

Über Ausschälung mehrerer Schleimbeutel, besonders am Knie, gibt die Operationsliste unter C. 5 Auskunft.

Von den Erkrankungen der Sehnen sind 3 Fälle von chronischen Sehnenscheidenentzündungen am Handrücken erwähnenswert, die sich durch große Hartnäckigkeit auszeichneten und als sogenanntes hartes Ödem¹⁾ bezeichnet wurden; alle 3 wurden invalide (Magdeburg, Hildesheim (2)).

Erkrankungen an schnellendem Finger sind 4 mal beobachtet (Berlin (2), Brandenburg a. H., Mülhausen i. E.).

In Berlin war der 4. und 5. Finger erkrankt. Nach Ausschneidung einer reiskorngroßen Verdickung der Sehnenscheide des 5. Fingers hörte auch das Schnellen am Ringfinger mit auf. (St.-A. Gröder). — O.-St.-A. Gofsner, Brandenburg a. H., erzielte Besserung durch die Biersche Stauung. In diesen beiden Fällen wird keine Entstehungsursache angegeben. Im dritten von St.-A. Würth v. Würthenau hierher gerechneten Fall war das Leiden nach Aufschlagen mit der Hand beim Kastenspringen entstanden. Der rechte Mittelfinger konnte nicht gestreckt werden; wenn er durch Hilfe eines anderen Fingers gehoben wurde, schnellte er empor. S. auch unter Rapportnummer 154.

Der zuletzt genannte Berichtstatter beobachtete in Mülhausen i. E. auch die einzige berichtete Trommlerlähmung bzw. eine Zerreißen der Sehne des linken langen Daumenbeugers. Die Sehnennaht hatte nur zeitweiligen Erfolg. (Operationsliste unter C. 5.)

In Mülhausen i. E. wurde auch ein Absterben (Gangrän) einer Fußsohlenfascie nach Wundlaufen beobachtet. Heilung mit starker Narbenverziehung.

Von den berichteten eitrig-entzündungen schien eine tuberkulöser Natur zu sein. (O.-St.-A. Weber, Erfurt). Eine Operation wurde abgelehnt. — Die übrigen waren den schwereren Panaritien zuzurechnende Erkrankungen (s. auch Operationsliste unter C.)

Die Schrumpfung der Hohlhandfascie (Dupuytrensche Palmarfascien-Kontraktur) wurde 1 mal unter Schleichscher örtlicher Betäubung in Darmstadt operiert. Zur Vermeidung von Narbenverkürzung wurde ein Krausescher Hautlappen dem Unterarm entnommen, der gut einheilte (O.-St.-A. Vollbrecht).

XII. Gruppe: Mechanische Verletzungen.

(No. 163 bis 192 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | $\frac{0}{0}$ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | $\frac{0}{0}$ der Behand- delten | absol. Zahl | $\frac{0}{0}$ der Behand- delten | absol. Zahl | $\frac{0}{0}$ der Behand- delten | absol. Zahl | $\frac{0}{0}$ der Behand- delten | | | |
| 1588 | 66 655 | 126,6 | 64 897 | 95,1 | 53 | 0,01 | 1757 | 2,6 | 66 707 | 97,7 | 1536 | 925 587 | 13,6 |

Außerdem erkrankten noch 2 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 4 Invaliden, 341 Kadetten und 360 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die stetige Verminderung des Zuganges bei dieser Gruppe hat auch in diesem Berichtsjahre angehalten.

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:
 1881/82 bis 1885/86 166,5 $\frac{0}{0}$ K.,
 1886/87 „ 1890/91 166,9 „
 1891/92 „ 1895/96 159,5 „
 1896/97 „ 1900/01 136,9 „
 im Jahre 1901/02 . 36 904 Mann = 127,7 „
 im Jahre 1902/03 . 66 655 Mann = 126,6 $\frac{0}{0}$ K.

¹⁾ Centralblatt für Chirurgie 1902, No. 43.

In der nachstehenden Übersicht sind die Armeekorps nach der Höhe des Zuganges geordnet und zum Vergleich die entsprechenden Zahlen des Vorjahres hinzugefügt.

| 1902/03 | | Armeekorps | 1901/02 | |
|---------|-------------|-------------------------|-------------|-------|
| ‰ K. | Reihenfolge | | Reihenfolge | ‰ K. |
| 188,6 | 1 | XIII. (K. W.) | 2 | 179,0 |
| 154,4 | 2 | XI. | 1 | 195,5 |
| 153,7 | 3 | VIII. | 3 | 160,6 |
| 148,3 | 4 | II. | 4 | 139,3 |
| 145,7 | 5 | I. | 8 | 130,5 |
| 138,9 | 6 | G. | 12 | 122,0 |
| 137,5 | 7 | XVI. | 5 | 136,8 |
| 128,1 | 8 | IV. | 6 | 135,7 |
| 124,7 | 9 | XV. | 11 | 122,3 |
| 124,1 | 10 | VII. | 9 | 127,5 |
| 120,0 | 11 | XIV. | 7 | 131,0 |
| 119,8 | 12 | XVIII. | 14 | 119,4 |
| 115,0 | 13 | VI. | 15 | 117,4 |
| 109,9 | 14 | XIX. (2. K. S.) | 13 | 120,3 |
| 109,0 | 15 | XVII. | 18 | 103,8 |
| 106,8 | 16 | III. | 20 | 91,2 |
| 105,1 | 17 | V. | 10 | 125,1 |
| 104,0 | 18 | X. | 17 | 104,6 |
| 96,9 | 19 | IX. | 19 | 94,5 |
| 88,7 | 20 | XII. (1. K. S.) | 16 | 111,5 |

Auf die einzelnen Monate verteilen sich die Erkrankungen in folgender Weise:

| | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. Zahl | 4089 | 6125 | 4963 | 6104 | 5819 | 6369 | 5188 | 5573 | 5744 | 7055 | 5476 | 5140 |
| ‰ K. | 9,5 | 11,3 | 9,2 | 11,4 | 10,9 | 11,9 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 12,8 | 10,1 | 8,6 |

Erste Unterart: Wundlaufen und Wundreiten.

(No. 163 und 164 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 33 | 5404 | 10,3 | 5403 | 1 | 6 | 5410 | 27 | 6,6 |

Außerdem erkrankten noch 2 Kadetten und 7 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1881/82 bis 1885/86 | 13 267,2 Mann = 35,1 ‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 | 11 728,6 „ = 28,2 „ |
| 1891/92 „ 1895/96 | 10 713,4 „ = 22,7 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 | 8 038,6 „ = 15,5 „ |
| im Jahre 1901/02 | 6 056 „ = 11,2 „ |
| im Jahre 1902/03 | 5 404 Mann = 10,3 ‰ K., |

hat sich also in den letzten 22 Jahren um 70,7 ‰ verringert.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|-----------------|---------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 353 | 8,5 | X. | 121 | 5,5 |
| I. | 574 | 18,1 | XI. | 295 | 14,2 |
| II. | 367 | 14,2 | XII. (1. K. S.) | 282 | 14,1 |
| III. | 167 | 7,1 | XIII. (K. W.) | 250 | 11,3 |
| IV. | 94 | 4,2 | XIV. | 283 | 8,9 |
| V. | 193 | 7,5 | XV. | 196 | 6,3 |
| VI. | 162 | 6,3 | XVI. | 230 | 8,4 |
| VII. | 338 | 12,5 | XVII. | 252 | 8,5 |
| VIII. | 391 | 14,5 | XVIII. | 255 | 9,7 |
| IX. | 227 | 9,1 | XIX. (2. K. S.) | 374 | 18,2 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 194 | 297 | 297 | 419 | 381 | 609 | 362 | 501 | 504 | 665 | 490 | 685 |
| ‰ K. | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,78 | 0,71 | 1,1 | 0,67 | 0,91 | 0,94 | 1,2 | 0,91 | 1,4 |

Über Wundlaufen und Wundreiten ist nichts Erwähnenswertes berichtet.

Zweite Unterart: Quetschungen und Zerreißen.

(No. 165 bis 167 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 300 | 19 001 | 36,1 | 18 640 | 15 | 310 | 18 965 | 336 | 11,7 |

Außerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 117 Kadetten und 96 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| abs. Zahl | 1193 | 1724 | 1304 | 1781 | 1809 | 1846 | 1457 | 1628 | 1716 | 2091 | 1557 | 895 |
| ‰ K. | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 2,9 | 1,8 |

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|---------------|------|-----------------|---------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 1864 | 45,1 | X. | 698 | 31,9 |
| I. | 1271 | 40,2 | XI. | 885 | 42,6 |
| II. | 1203 | 46,6 | XII. (1. K. S.) | 440 | 22,0 |
| III. | 804 | 34,2 | XIII. (K. W.) | 1031 | 46,6 |
| IV. | 737 | 33,0 | XIV. | 1014 | 31,9 |
| V. | 875 | 34,2 | XV. | 1146 | 36,7 |
| VI. | 951 | 36,8 | XVI. | 1033 | 37,8 |
| VII. | 948 | 35,2 | XVII. | 959 | 32,4 |
| VIII. | 1140 | 42,4 | XVIII. | 900 | 34,2 |
| IX. | 602 | 24,1 | XIX. (2. K. S.) | 500 | 24,3 |

Die Mehrzahl der Quetschungen der Weichteile an den Gliedmaßen waren leichter Natur.

Außer den schon bei Gruppe XI No. 159 erwähnten 2 Exerzierknochen sind 37 Knochengeschwülste in den Berichten genauer erwähnt, welche nach Quetschungen und anderen, starke Blutungen in die Gewebe setzenden Verletzungen entstanden waren. Darunter waren 5 Knochenauswüchse und 32 Verknöcherungen in Muskeln.

Von den Knochenauswüchsen wurden 4 durch Operation entfernt (2 dienstfähig, 2 invalide). Der nicht operierte Mann blieb dienstfähig. Von den Muskelverknöcherungen war 1 nach Hufschlag im rechten Kaumuskel aufgetreten. Dieser schon im vorigen Bericht erwähnte Kranke wurde als Invalide aufgenommen und durch die Operation gebessert (Giefßen).

Von den somit verbleibenden 31 Muskelverknöcherungen sind 13 operiert. 8 Operierte wurden dienstfähig, 5 invalide. Von 18 nicht Operierten wurde 1 invalide. (Siehe auch unter Rapportnummer 180.) Über die Operationen s. Operationsliste unter D.

Von den 5 Knochenauswüchsen saßen 2 (durch Stofs mit dem Fechtgewehr entstanden) am unteren Ende des Oberarmbeins. In beiden Fällen wurde die Dienstfähigkeit wiederhergestellt, 1 mal durch Abmeißelung (Giefßen), das andere Mal durch Ruhigstellung und Umschläge (Mörchingen). — 3 Auswüchse an den Unterschenkelknochen wurden durch Operation beseitigt. Von diesen saßen 2 nach Hufschlag oder aus unbekannter Ursache entstandene Auswüchse am Schienbein. Nach ihrer Abmeißelung wurde 1 Mann (Berlin) dienstfähig, der andere (Stendal) invalide. Auch bei 1 Manne, dem ein nach Fall entstandener Auswuchs am Wadenbein abgemeißelt war (Berlin), trat Invalidität ein.

Von den 32 Muskelverknöcherungen betraf 1, wie oben erwähnt, den rechten Kaumuskel, 10 den inneren Oberarmmuskel. Letztere Erkrankung war 5 mal durch Bajonettstöße, 2 mal durch Hufschlag, 1 mal durch Pferdebifs, 1 mal durch Sturz mit dem Pferde und 1 mal durch Verstauchung verursacht. 7 mal wurde die Geschwulst durch Operation entfernt, wodurch 4 mal die Dienstfähigkeit wiederhergestellt wurde. Von 3 nicht Operierten blieben 2 dienstfähig. — Bei 3 Operierten (Stettin, Metz, Darmstadt) war die Geschwulst dadurch besonders hinderlich, daß sie mit einem Fortsatz tief in den Ellenbogengelenkspalt ragte, und daß die in der Hauptsache dem Muskel angehörige Geschwulste, durch eine Spange mit dem Oberarmbein verwachsen waren. Auf diesen Geschwülsten fanden sich tiefe Furchen als Abdrücke des Gefäßbündels.

Auch eine Geschwulst in Gleiwitz mußte mit der Knochenhaut abgehobelt werden, während bei den übrigen (Lübben, Bromberg, Magdeburg, Minden, Metz, Braunschweig) kein Zusammenhang mit dem Knochen erwähnt wird. Bei den Geschwülsten in Lübben und Gleiwitz wurde im Röntgenbild kein Schatten gesehen, obgleich sich die letztere Geschwulst bei der Operation als eine spongiöse Knochengeschwulst, die eine kleine Cyste einschloß, erwies. — Bei dem Operierten in Darmstadt bildete sich die Geschwulst nach der Operation wieder, bei dem in Stettin entstand eine kammartige Verdickung des Knochens, bei dem in Magdeburg vollkommene Gelenkversteifung.

Von 6 Geschwülsten im zweiköpfigen Oberarmmuskel waren 2 (Frankfurt a. O.) durch Bajonettstofs, 1 (Stendal) durch Hufschlag, 1 nach einer Verstauchung (Bautzen), 2 aus unbekannter Ursache (Mülhausen i. E., Frankfurt a. O.) entstanden. Die Geschwulst in Bautzen zeigte, ähnlich wie die vorher erwähnten Geschwülste, im inneren Oberarmmuskel eine Furche für das Gefäßbündel und einen starken, die Beweglichkeit sehr hindernden Fortsatz nach dem Gelenkspalt hin. Bei keiner von den Geschwülsten im zweiköpfigen Oberarmmuskel wird Zusammenhang mit dem Knochen erwähnt. — Durch Operation wurden 2 Kranke von der Geschwulst befreit (Bautzen, Mülhausen i. E.), von denen der erstere eine Bewegungsbehinderung behielt und invalide wurde, während der andere, wie die 4 nicht Operierten, dienstfähig blieb. —

Von 3 Knochengeschwülsten im Deltamuskel waren 2 durch Bajonettstofs entstanden (Frankfurt a. O.). Der Sitz der einen Geschwulst war dicht am sehnigen Ansatz. Bei der 3. Geschwulst ist keine Entstehungsursache angegeben (Colmar i. E.). Zusammenhang der Geschwülste mit dem Knochen ist nicht erwähnt oder war durch das Röntgenbild nicht nachweisbar. Alle 3 Kranke blieben ohne Operation dienstfähig.

1 Geschwulst im äußeren Kopf des dreiköpfigen Oberarmmuskels war in Minden nach einem Bajonettstofs entstanden. Durch Ausschälung der Geschwulst blieb der Mann dienstfähig.

Von 9 Verknöcherungen in der Oberschenkelstreckmuskulatur waren 5 durch Hufschlag (Brandenburg a. H., Magdeburg, Leobschütz [2], Danzig), 1 nach Sprung über einen Graben (Colmar i. E.), entstanden, während sich 1 nach Sprung über ein Seil aus einem Blutergufs in das rechte Kniegelenk und in die Streckmuskulatur bildete (Mörchingen). Für je einen Fall in Leobschütz und Colmar i. E. ist die Entstehungsursache nicht angegeben. Eine Operation wurde nur bei 3 Leuten in Brandenburg a. H., Danzig und Giefßen ausgeführt, bei denen die Beweglichkeit wesentlich gebessert wurde. Diese 3 wurden invalide, die übrigen Leute blieben dienstfähig. Einem Musketier in Stettin wurde eine hühnereigroße, nach Sturz auf das Gesäß entstandene Knochengeschwulst aus der Gesäßmuskulatur, einem Manne in St. Ahold eine ähnliche Geschwulst aus dem zweiköpfigen Oberschenkelmuskel entfernt, die letzterer zufällig beim Pferdeputzen bemerkt hatte. Beide Leute blieben dienstfähig. — Außer diesen 32 Fällen findet sich über eine Verknöcherung in der Streckmuskulatur am Unterschenkel (Colmar i. E.) nur die Angabe, daß der Mann ohne Operation dienstfähig blieb.

Von 3 Geschwülsten wird erwähnt, daß sie kleine Cysten umschlossen (Gleiwitz, Minden und Bautzen), von letzterer wird angegeben, daß sie mit Endothel ausgekleidet war. — Über die Zusammensetzung der Geschwülste finden sich nur vereinzelte Angaben: Die Geschwulst im zweiköpfigen Oberschenkelmuskel in St. Ahold und der Exerzierknochen in Lübeck bestanden aus Knorpel und Knochen, 1 Geschwulst in

Minden zeigte Knochenkerne in Knorpel-, die andere in Bindegewebsmasse, letztere enthielt die erwähnte Cyste.

Die in Mülhausen i. E. aus dem zweiköpfigen Oberarmmuskel ausgeschnittene Geschwulst bestand aus knochendurchwachsenem Muskelgewebe. — Vor dem am Schienbein abgemeißelten Knochenauswuchs in Berlin lag ein prall gefüllter Schleimbeutel.

Bezüglich der Entstehung der Muskelknochengeschwülste meint St.-A. Franke-Colmar i. E., daß eine Muskelverknöcherung nur dann auftrete, wenn die Knochenhaut mit beschädigt sei, eine Auffassung, die mit der Ansicht anderer Berichterstatter nicht völlig übereinstimmt.

Die Ansichten über die Behandlung und über die Anzeige zur Operation gleichen im allgemeinen den im vorigen Bericht mitgeteilten.

Auch diesmal läßt sich mehrfach erkennen, daß in den Fällen, wo Verknöcherungen entstanden oder wo Rückfälle nach Operationen eingetreten waren, besonders früh mit passiven Bewegungen, Massage und anderen Reizen vorgegangen war, während sich andererseits selbst Blutergüsse, die im Röntgenbilde Schatten hervorriefen, unter Ruhe und hydropathischen Umschlägen zurückbildeten (Diedenhofen). — St.-A. Vollbrecht-Darmstadt führt als Erfahrung an, daß die Knochenauswüchse in der Nähe größerer Gelenke nach Operationen besonders leicht rückfällig werden.

Unter den Quetschungen des Rumpfes wird 7mal von schweren Brustquetschungen berichtet:

Einmal entwickelte sich nach der Entlassung aus dem Militärdienst eine schnell wachsende bösartige Geschwulst an einer Rippe (Ludwigsburg), einmal wurden Krämpfe der rechten Brust- und Schultermuskeln, des rechten Arms und des Zwerchfells beobachtet (Lübben), dreimal bestand Blutauswurf, worauf je 1mal eine Lungenentzündung (Potsdam), Lungenbrand (Minden) und Brustfellentzündung (Magdeburg) folgten.

Zweimal trat trockene Brustfellentzündung ein (Potsdam, Lübben), die in letzterem Falle von Herzbeutelentzündung begleitet war.

Quetschungen der Nierengegend sind 8mal berichtet.

Einmal vereiterte ein großer Bluterguß in der Lendengegend, ohne daß eine Hautwunde bestand (Braunschweig). Die Niere selbst war nicht verletzt.

Einmal trat nach einem Stoß mit dem Fechtgewehr in die Nierengegend häufiger Harndrang auf, ohne daß der Harn etwas Regelwidriges zeigte.

In 5 Fällen waren Blutungen entstanden, die sich durch blutigen Urin oder durch große nachweisbare Blutaustritte bemerkbar machten. In allen diesen Fällen wurde durch Ruhe und Kälteanwendung Heilung erzielt. — Nur bei einer schweren Zerreißung beider Nieren, über die weiter unten berichtet werden wird, trat der Tod ein (Dresden).

Von den berichteten Quetschungen des Hodensackes hatten 3 Wasserbruch (Braunschweig, Osna-brück [2]), 1 (Braunschweig) Brand des Hodens zur Folge. Bei 3 Leuten in Metz entwickelte sich längere Zeit nach Ablauf aller Krankheitserscheinungen Tuberkulose des gequetscht gewesenen Hodens. (St.-A. Lorenz-Metz.)

17 Berichte über Quetschungen des Bauches bringen über die schwierige Frage, wann man bei diesen Verletzungen eine Beschädigung des Darms annehmen und demgemäß operieren soll, nichts Neues.

Auch diesmal ist über mehrere schwere Quetschungen des Bauches berichtet, die alle Erscheinungen schwerer innerer Beschädigungen zeigten, aber dennoch ohne Operation zur Heilung kamen. — Düsseldorf, Cannstadt, Darmstadt, Hufschlag, in letzterem Falle mit Blasenlähmung — Konstanz, Bajonettstoß — Berlin, Schlag mit dem Säbel über die Lebergegend — Weingarten, Fall auf einen Ruderpflock; durch Zerreißung der Bauchmuskulatur, später Bauchbruch. — Andererseits zeigen einige der mitgeteilten Krankengeschichten, daß sich die Aussichten für Erfolg der Operation bei den Darm- und Organzerreißen mit jeder Stunde des Wartens wesentlich verschlechtern (s. Operationsliste unter B. 2.). 2 Leute mit Darmzerreißen, die in Straßburg i. E. (St.-A. Abel) und Danzig (St.-A. Doeppelin¹⁾) kurz nach der Verletzung durch Hufschlag oder Huftritt operiert wurden, konnten geheilt werden, wogegen 2 andere in Hagenau und Posen, von denen letzterer durch den Huftritt nur eine Darmquetschung erlitten hatte, starben, nachdem sich bei der am 2. bzw. 13. Tage vorgenommenen Operation schon eine Bauchfellentzündung vorgefunden hatte.

Der günstige Verlauf der Operation in einem Falle, wo sich der Verdacht einer Darmzerreißen nicht bestätigt fand, läßt den Bauchschnitt an sich weniger bedenklich erscheinen (Colmar). (Siehe auch die weiter unten beschriebenen Eröffnungen der Bauchhöhle bei Stichverletzungen, welche sämtlich heilten.)

Bei 5 Darmzerreißen wurde keine Operation vorgenommen, weil die Erscheinungen von vornherein so schwer waren, daß ein Erfolg unwahrscheinlich erschien (Metz, Colmar, Ludwigsburg) oder weil der Zustand zunächst gefahrlos erschien und sich nachher so schnell verschlimmerte, daß keine Aussicht auf den Erfolg einer Operation mehr blieb. (Mergentheim, Stendal.)

In dem schon vorher erwähnten Falle von doppelseitiger Nierenquetschung in Dresden, die mit einer Nierenzerreißen verbunden war, trug einerseits das Nichtauffinden der einen Nierenzerreißen, in der Hauptsache aber wohl die Schwere der durch Überfahren entstandenen Verletzung die Schuld an dem unglücklichen Ausgang. (St.-A. Naether.)

Harnröhrenverletzungen wurden 2mal beschrieben.

Bei dem einen Verletzten (Magdeburg) heilte die Verletzung, welche sich 3,5 cm hinter der Harnröhrenmündung fand, nach Einlegen eines Verweilkatheters (St.-A. Kern), bei dem anderen, einem Jäger in Marburg, war der Damm durch einen Fußtritt verletzt. Als nach zwei Tagen trotz des Gebrauchs eines Verweilkatheters Fieber eintrat, wurde der äußere Harnröhrenschnitt vorgenommen. Die Harnröhre war in ihrem häutigen Abschnitt in Ausdehnung von 0,5 cm zerfetzt. Tod am folgenden Tage an Blutvergiftung (St.-A. Walter).

¹⁾ Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1903, S. 479.

Dritte Unterart: Knochenbrüche.

(No. 168 bis 179 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | absol. Zahl | ‰ der Behand- delten | | | |
| 557 | 4030 | 7,7 | 3413 | 74,4 | 17 | 0,37 | 668 | 14,6 | 4098 | 89,3 | 489 | 167 179 | 36,4 |

Außerdem erkrankten noch 1 Invalide, 22 Kadetten und 19 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|------|----------------|------------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 484 | 11,7 | X. | 191 | 8,7 |
| I. | 193 | 6,1 | XI. | 195 | 9,4 |
| II. | 121 | 4,7 | XII. (1.K.S.) | 150 | 7,5 |
| III. | 154 | 6,5 | XIII. (K. W.) | 130 | 5,9 |
| IV. | 273 | 12,2 | XIV. | 167 | 5,2 |
| V. | 136 | 5,3 | XV. | 169 | 5,4 |
| VI. | 162 | 6,3 | XVI. | 234 | 8,6 |
| VII. | 217 | 8,1 | XVII. | 231 | 7,8 |
| VIII. | 194 | 7,2 | XVIII. | 260 | 9,9 |
| IX. | 226 | 9,1 | XIX. (2.K.S.) | 143 | 6,9 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| abs. Zahl | 236 | 253 | 210 | 256 | 235 | 317 | 321 | 403 | 368 | 501 | 395 | 535 |
| ‰ K. | 0,55 | 0,47 | 0,39 | 0,46 | 0,44 | 0,59 | 0,59 | 0,73 | 0,69 | 0,91 | 0,73 | 1,1 |

Die Beteiligung der einzelnen Knochen an der Gesamtzahl der Knochenbrüche, die auf dieselben entfallenden Todesfälle und die Behandlungsdauer geht aus nachstehender Zusammenstellung hervor.

| Knochenbrüche | Absolute Zahl | Von den Behandelten (Bestand und Zugang) sind gestorben | | Durch- schnittliche Behandlungs- dauer (Tage) |
|-------------------------------|---------------|---|------------------------|---|
| | | absolute Zahl | ‰ der Be- handelten | |
| des Oberarmes | 79 | — | — | 50,8 |
| des Unterarmes | 331 | — | — | 43,2 |
| der Hand | 462 | — | — | 32,5 |
| des Oberschenkels | 92 | — | — | 81,1 |
| des Unterschenkels | 666 | 1 | 0,13 | 56,7 |
| des Fußes | 1803 | — | — | 26,8 |
| des Kopfes | 221 | 15 | 6,1 | 37,6 |
| des Schlüsselbeines | 227 | — | — | 33,7 |
| des Schulterblattes | 15 | — | — | 38,6 |
| der Rippen | 112 | — | — | 23,6 |
| der Wirbelsäule | 8 | 1 | 11,1 | 73,1 |
| des Beckens | 14 | — | — | 44,1 |
| Summe | 4030 | 17 | 0,37 | 36,4 |

Bei der Behandlung der Oberarmbrüche kamen annähernd gleich häufig und mit demselben Erfolge Streckverbände oder Schienenverbände (Pappschienen nach König oder Gipsschienen) oder in den ersten Tagen Streckverbände, später Schienenverbände zur Anwendung.

Bei einem Chevauleger in Straßburg i. E. trat nach einem Oberarmbruch an der Stelle, wo der Speichennerv dem Knochen anliegt, 14 Tage nach der Verletzung eine allmählich zunehmende Lähmung dieses Nerven auf, die jeder Behandlung durch Elektrizität trotzte.

Eine Entfernung der den Druck verursachenden wuchernden Kallusmassen durch Operation wurde abgelehnt, invalide (St.-A. Coste).

Einen seltenen T-Bruch im unteren Ende der Speiche, dessen einer Schenkel mit der Wachstumslinie, der andere senkrecht darauf nach dem Speichen-Ellengelenk verlief, beobachtete O.-St.-A. Gofsner-Brandenburg a. H.¹⁾

Von selteneren Knochenbrüchen der Hand seien erwähnt: 7 Brüche des Kahnbeins, 4 Brüche des Mondbeins und 1 Bruch des großen und kleinen vieleckigen Beins (Darmstadt).

Zweimal wurde bei ungünstig geheilten Brüchen die Durchmeißelung beider Unterarmknochen vorgenommen, wodurch sich die Erwerbsfähigkeit besserte (St.-A. Osann-Freiburg i. Baden und O.-St.-A. Speck-Wiesbaden).

Bei einem Kadetten in Naumburg a. S. machte St.-A. Metz die Knochennaht bei einem offenen Bruch beider Unterarmknochen, weil zwischengelagerte Muskelmassen die Einrichtung der Bruchenden der Elle hinderten.

Auch St.-A. Naether-Dresden empfiehlt die Knochennaht auf Grund zweier von ihm operierter Unterarmbrüche:

Bei einem frisch Operierten erfolgte die Heilung glatt, bei dem zweiten, einem Invaliden, der 7 Jahre nach der Verletzung operiert wurde, konnte keine Vereinigung erzielt werden, da die infolge der notwendigen Anfrischung der Knochenenden entstandene Lücke auch durch einen Knochenhaut-Knochenlappen nicht überbrückt werden konnte.

Einem Kanonier in Wolfenbüttel mußte das Speichenköpfchen nebst einem mitabgesprengten Knochenstück entfernt werden. Invalide. (O.-St.-A. Werner.)

Bei einer Abreißung des Olecranon wurde 10 Tage nach der Verletzung durch Knochennaht knöcherner Vereinigung und Herstellung der Dienstfähigkeit erzielt. (St.-A. Naether-Dresden.)

¹⁾ Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1903, Heft 11.

Von 27 Brüchen des Oberschenkels, über die Näheres berichtet wird, sind 7 durch anscheinend geringfügige Ursache entstanden:

Sprung über das Sprunggestell (Celle), plötzliches Ansetzen zu schnellem Laufen (Ortelsburg), Ausziehen des Reitstiefels (Hannover), Aufrichten aus knieender Stellung (Berlin, Brandenburg a. H.), Abstofsen zum Springen (Mülhausen i. E.), gewöhnliches Laufen (Leipzig). Zweimal hatte schon vorher an der späteren Bruchstelle grössere Empfindlichkeit bestanden, nach der Verletzung fiel dagegen ungewöhnliche Unempfindlichkeit bei Bewegungen an der Bruchstelle auf. Eine Geschwulst war nicht nachweisbar (O.-St.-A. Schmidt-Leipzig und St.-A. Glogau-Ortelsburg).

Offene Oberschenkelbrüche kamen 3 mal zur Beobachtung. Trotz ungestörter Heilung der Wunden mußten die Verletzten wegen Verkürzung des Beins entlassen werden.

Wegen Heilung in ungünstiger Stellung mußte einmal die Durchmeißelung des Oberschenkelknochens an der alten Bruchstelle vorgenommen werden. Trotz erheblicher Besserung der Stellung wurde der Mann invalide (O.-St.-A. Herhold-Altona).

Bei 2 von 5 berichteten Brüchen des Oberschenkelhalses ist die Entstehung erwähnenswert:

Ein Füsilier in Brandenburg a. H. hatte nach einem Fehltritt beim Exerzieren Schmerzen im rechten Oberschenkel. Er nahm zunächst noch mehrere Tage am Kompagnie-Exerzieren teil. 31 Tage später, als sich die Schmerzen durch Ruhe wesentlich gebessert hatten, rutschte er beim Gehen aus, hielt sich aber, ohne zu fallen, aufrecht. Jetzt bekam er heftige Schmerzen und es wurde ein Schenkelhalsbruch festgestellt (O.-St.-A. Gofsner).

Ein Musketier in Trier brach beim festen Aufsetzen des rechten Beins beim Parademarsch plötzlich vor heftigem Schmerz in der rechten Hüfte zusammen. Die Untersuchung und das Röntgenbild ergaben auch hier einen Schenkelhalsbruch (St.-A. Braun).

Bei zwei weiteren Schenkelhalsbrüchen scheint Fall auf die Seite die Ursache des Bruches gewesen zu sein, doch ist es erwähnenswert, daß beide Leute schon einen Tag vor der Verletzung Schmerzen in der betreffenden Hüfte verspürt hatten (O.-St.-A. Busse-Allenstein und St.-A. Braun-Trier).

Bei einem Manne mit Schenkelhalsbruch in Mainz wurden die Bruchenden nach Ausbleiben der knöchernen Vereinigung durch zwei vernickelte Stahlnägel aneinander gebracht. Trotz anfänglicher Eiterung feste Vereinigung (St.-A. Neumann).

Von 10 Kniescheibenbrüchen wurden 5 genäht, wodurch jedesmal knöcherne Vereinigung erzielt wurde (siehe Operationsliste unter C. 5). Von 5 nicht operierten blieben 2 dienstfähig (Stuttgart und Danzig), letzterer ohne Verschiebung, da der Bandapparat nicht durchtrennt war, wie sich aus dem Röntgenbilde erkennen liefs.

Von den einfachen Unterschenkelbrüchen sind 2 durch ihre Entstehung bemerkenswert:

Bei 2 Musketieren in Stuttgart traten beim Marschieren, ohne daß ein Unfall stattgefunden hatte, ganz allmählich Schmerzen in der Wade auf, das Röntgenbild ergab bei beiden Bruch des Wadenbeins (O.-St.-A. Wendel).

5 mal wurde die knöcherne Vereinigung bei einfachen Unterschenkelbrüchen erst nachträglich erzielt: 1 mal durch Gehverband, 1 mal durch Bewegen der Bruchenden gegeneinander,

durch Biersche Stauung und Geh-Gipsverbände, 3 mal durch die Knochennaht.

Über die Vornahme der Knochennaht bei 2 frischen, offenen Unterschenkelbrüchen (Weissenfels, Darmstadt) und 2 in ungünstiger Stellung geheilten (Halle a. S., Dresden) siehe die Operationsliste unter C. 5.

Ein dritter in ungünstiger Stellung geheilter Bruch beider Unterschenkelknochen wurde in Narkose auf unblutigem Wege wieder getrennt und in guter Stellung geheilt (Wiesbaden).

2 mal mußten bei offenen Knöchelbrüchen Gelenkauswüchsen gemacht werden, da Eiterungen bezw. Eiterfieber entstanden war (siehe Operationsliste unter C. 2, Stralsund und Colmar i. E.).

Die Behandlung der Unterschenkelbrüche erfolgte durchweg mit feststellenden Verbänden, die vielfach als Gehverbände eingerichtet wurden. Um frühzeitig Massage vornehmen zu können, empfiehlt O.-St.-A. Vollbrecht-Darmstadt abnehmbare, wie Korsetts zum Schnüren eingerichtete Gipsverbände.

Von selteneren Brüchen der Fußknochen seien 6 Brüche des Sprungbeins, die sämtlich zur Invalidität führten (Berlin, Brandenburg a. H., Paderborn, Dresden, Mainz, St. A. v. d. A.), 1 Bruch des Fersenbeins (Dresden), 1 Bruch des 1. Keilbeins (Metz), 1 Bruch des Kahnbeins und ersten Keilbeins (Metz), 1 Bruch des Würfelbeins (Paderborn) erwähnt.

Die Berichte aus 17 Garnisonen über 488 Brüche von Mittelfußknochen bieten nichts Neues.

Unter den ausführlicher beschriebenen Knochenbrüchen des Kopfes (einschl. der nur in den Operationslisten angeführten) befinden sich 58 Brüche des Hirnschädels, über deren einzelne Arten und Ausgänge folgende Tabelle Auskunft gibt:

| Brüche des | überhaupt | davon waren | A u s g a n g | | |
|-----------------|-----------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| | | | geheilt und dienstfähig | dienstunfähig | gestorben |
| Schädelgewölbes | 30 | offene 21 | 5 | 11 | 5 |
| | | einfache 9 | 3 | 3 | 3 |
| Schädelgrundes | 28 | offene ¹⁾ 2 | — | — | 2 |
| | | einfache 26 | 10 | 13 | 3 |
| zusammen | 58 | — | 18 | 27 | 13 |
| | | | 45 | | |

Von den Leuten mit offenem Bruch des Schädelgewölbes starben 5, und zwar 2 kurz nach der Verletzung bezw. am folgenden Tage infolge ausgedehnter Zerkümmerung des Schädels und des Gehirns, ein dritter, welcher vor seiner Auffindung längere Zeit, aus Mund und Nase blutend, bewusstlos am Boden gelegen hatte, starb

¹⁾ Als offene Schädelgrundbrüche sind nur solche bezeichnet, bei denen eine Verbindung gleichzeitig vorhandener Hautwunden mit Knochenbruchlinien wahrscheinlich war. Auf Ohrblutungen ist keine Rücksicht genommen.

an Schlucklungenentzündung am zweiten Tage. Die letzten beiden bekamen, trotz Freilegung der Hirnverletzung, eine eiterige Hirnhautentzündung, welcher sie 24 bzw. 28 Tage nach der Verletzung erlagen. Auch bei drei anderen war versucht worden, durch Erweiterung der Wunden und Heben eingedrückter Knochenstücke Hilfe zu bringen.

Bei allen Geheilten wurde die Knochenverletzung der Besichtigung zugänglich gemacht. Nur 4 mal konnte man sich wegen der Geringfügigkeit der Knochenbeschädigung mit einfachem keimfreien Verband begnügen. 12 mal mußten Knochensplitter entfernt werden, 1 mal wurde diese Operation erst vorgenommen, als bei anscheinend geringfügiger Verletzung nach mehrtägigem Wohlbefinden Fieber und Sprachlähmung eintrat. Durch den Eingriff wurde vollkommene Heilung erzielt.

Bei einer Eröffnung der Stirnhöhle durch Knochenbruch erreichte O.-St.-A. Bucker-Münster einen dauernden Verschluss der Knochenlücke dadurch, daß er das eingedrückte Knochenstück mit dem Meißel entfernte, auf kurze Zeit in 4 %ige Borsäure legte und dann wieder einpflanzte. Den zeitweisen Verschluss einer 5 : 4 cm großen Knochenlücke bewirkte O.-St.-A. Vollbrecht-Darmstadt durch eine dünne Silberplatte, welche ohne Beschwerden 20 Wochen lang getragen wurde. Die Lücke hatte sich in dieser Zeit bis auf ein einpfennigstückgroßes Loch verkleinert.

Mit einfachen Gewölbb Brüchen war 2 mal eine Verletzung der mittleren Hirnhautschlagader verbunden.

Einer dieser Leute, bei welchem sich die Blutung nach kurzem Wohlbefinden durch Zeichen zunehmenden Hirndrucks bemerkbar machte, konnte durch Unterbindung des Gefäßes gerettet werden (O.-St.-A. Schmolling-Posen). — Bei dem anderen handelte es sich um eine Spätblutung nach 1½ tägigem vollkommenen Wohlbefinden. Dieser Mann starb (St. A. v. d. A.).

Von bemerkenswerten nervösen Erscheinungen als Folge von Gewölbb Brüchen wurde beobachtet:

Krämpfe 1 mal (O.-St.-A. Griebisch-Hagenau), Wortblindheit 1 mal (O.-St.-A. Rothamel-Königsberg i. Pr.), Sprachlähmung 1 mal (St.-A. Priefer-Saarbrücken), Sprachlähmung und Lähmung eines Armes 1 mal (St.-A. Berger-Frankfurt a. O.).

Die Entstehungsursache der Gewölbb Brüche war 14 mal Hufschlag, 3 mal Sturz vom oder mit dem Pferde, 3 mal Sturz aus dem Fenster, 1 mal Anprall an einen Wagen der elektrischen Bahn, 1 mal Fall gegen eine Ofenbank, 6 mal Hieb mit verschiedenen stumpfen Gegenständen (Besenstiel, Bierglas usw.), 2 mal Hieb mit dem Seitengewehr.

2 Leute in Ulm hatten sich offene Schädelgrundbrüche durch Sturz aus dem Fenster zugezogen.

Sie starben nach wenigen Stunden infolge der Schwere der Zertrümmerung des Schädelgrundes und des Gehirns. Einer hatte aufer dem Schädelgrundbruch noch einen offenen Bruch beider Oberschenkel, einen Bruch des Unterkiefers und einen Bruch des Oberkiefers.

An einfachen Brüchen des Schädelgrundes starben von 26 Verletzten nur 3:

Ein Mann starb wenige Stunden nach der Verletzung offenbar infolge starker Gehirnerschütterung (Berlin). Die Leichenöffnung wurde verweigert. Ein zweiter, der von einem Pferde

geschleift worden und neben dem Schädelbruch eine Zerreißung des Kehlkopfes und Abreißung der Nerven am Schädelgrunde davongetragen hatte, erlag der zunehmenden Atmungslähmung am zweiten Tage (Colmar i. E.). Bei dem dritten, der, abgesehen von einer Pulsverlangsamung, während der ersten beiden Tage keine schweren Krankheitserscheinungen zeigte, dann aber bewußtlos wurde und am vierten Tage starb, konnte durch die Leichenöffnung aufer zwei Sprüngen in der Schädelgrundfläche und wässriger Durchtränkung des Gehirns nichts Regelwidriges festgestellt werden (Münster).

Abgesehen von 2 Verletzten, bei welchen sich die Diagnose „Schädelbruch“ auf Lähmung des Gesichtsnerven, Taubheit und andere schwere Erscheinungen stützte, hatten alle übrigen Ohrblutungen.

Meist wurde keimfreie Watte in den Gehörgang eingeschoben, doch wurde auch dies mehrfach absichtlich unterlassen. O.-St.-A. Rothamel-Königsberg i. Pr. verwirft jede Tamponade sowohl am Ohr wie an der Nase bei Bruch des Siebbeins, weil der völlig freie Abfluß des Blutes und der anderen Wundflüssigkeiten nur so gewährleistet werden könne, wodurch auch der sicherste Schutz gegen Infektion geschaffen werde. Er habe so bei einem Mann mit Zertrümmerung des Siebbeins und sehr starken Blutungen aus der Nase jede Infektion vermieden.

Bei einem Offizier in Cassel, der nach Fall von einer Leiter auf den Hinterkopf völlige Taubheit auf beiden Ohren mit quälenden subjektiven Gehörsempfindungen zurückbehielt, wurde ein Bruch der Schädelgrundfläche durch beide Felsenbeine mit Blutung und späterer Narbenschrumpfung in beiden Labyrinthen angenommen (St.-A. v. Hippel).

Einseitige Taubheit infolge Labyrinthverletzungen wurde auferdem noch 4 mal bei Schädelgrundbrüchen beobachtet.

Bei einem dieser Verletzten blieb auferdem noch ein hoher Grad von Gedächtnisschwäche, häufige Schwindelanfälle und Lähmung der Gesichtsnerven bestehen (O.-St.-A. Richter-Stendal), bei einem zweiten neben der Taubheit völlige Erblindung eines Auges durch Sehnervenschwund (Bruchsal).

Von sonstigen Nervenstörungen wurden bei Schädelgrundbrüchen beobachtet:

Krämpfe 1 mal (Hagenau), vorübergehende Lähmung des Gesichtsnerven 2 mal, bleibende Lähmung desselben Nerven (aufer dem obenerwähnten Manne in Stendal) 1 mal, Augenmuskel- (Abducens) Lähmung 3 mal, 2 mal dauernd (Oldenburg, Danzig), 1 mal vorübergehend (Mainz). — Bei einem Soldaten in Zittau, der bei der Einstellung gut gesehen hatte, entwickelte sich nach einem Schädelgrundbruche beiderseits Schwund des Sehnerven (O.-St.-A. Körner) (s. auch S. 116 unter No. 126).

Von Ohreiterung nach Brüchen des Schädelgrundes wird nur 2 mal berichtet, 1 mal doppelseitig (Mainz), 1 mal einseitig (Wesel).

Die Entstehungsursache der Schädelgrundbrüche war 7 mal Hufschlag, 19 mal Sturz aus größerer oder geringerer Höhe (Pferd, Querbaum, Fenster, Leiter), 2 mal Anprallen des Kopfes an eine Wand bzw. an einen Baum.

Die Brüche der Gesichtsknochen waren fast sämtlich durch Hufschlag entstanden.

Über Brüche des Unterkiefers wird 11 mal berichtet.

Etwa die Hälfte dieser Verletzungen wurde mit gutem Erfolge durch die Naht behandelt, die übrigen wurden mit Draht-

schiene, feststellenden Verbänden oder Befestigungen der Zahnreihen durch Silberdraht zur Heilung gebracht.

Die Brüche der Nasenbeine, Jochbeine und der Oberkiefer bieten nichts Besonderes.

Die Schlüsselbeinbrüche wurden, soweit darüber berichtet ist, fast ausschließlich mit dem Sayreschen Heftpflasterverbande behandelt. Bemerkenswerte Krankengeschichten werden nicht mitgeteilt.

6 Brüche des Schulterblattes sind näher beschrieben.

Es handelte sich 1 mal um einen Bruch der Gräte, 2 mal um Bruch des Körpers, 1 mal um Stückbruch des vorderen Pfannenendes und 2 mal um Bruch des Rabenschnabelfortsatzes. Der Verlauf bot nichts Besonderes.

Über einfache Rippenbrüche ist nichts Bemerkenswertes berichtet.

Von 4 Brüchen der Wirbelsäule, über welche Näheres mitgeteilt wird, betraf je einer den 2. Lendenwirbel, den 12. Brustwirbel, den 6. und den 5. Halswirbel:

Die beiden Leute mit Halswirbelbrüchen, 1 Füsilier in Gumbinnen und 1 Kanonier in Paderborn, zeigten sofort nach dem Unfall (Sturz auf den Kopf aus 1,5 m Höhe und Kopfsprung in einen $\frac{3}{4}$ m tiefen Bach) Lähmung der unteren Gliedmaßen, Lähmung der Atemhilfsmuskeln (reine Zwerchfellatmung), Lähmung der Blase und des Mastdarms, Erektion des Gliedes. Bei dem einen trat der Tod am zweiten, bei dem anderen am

dritten Tage infolge ungenügender Atmung ein. (O.-St.-A. Goebel-Insterburg und O.-St.-A. Stock.)

Bei einem Husaren in Bonn, welcher durch Sturz von einem Heuwagen aus 1 m Höhe den zweiten Lendenwirbel gebrochen hatte, bestanden anfänglich keine Lähmungen, wohl aber Zwerchfellkrämpfe mit stark beschleunigter Atmung (bis 60 Atemzüge) und später zuckende Krämpfe in Armen und Beinen. Diese Erscheinungen verschwanden erst drei Monate nach dem Unfall. Der Verletzte wurde mit Stützkorsett als Invalide entlassen. (O.-St.-A. Oertel.)

Bei einem Pionier in Neifse, fand sich nach einem Sturz von einem 8 m hohen Gerüst anfangs nur Druckschmerzhaftigkeit des 12. Brust- und 1. Lendenwirbels und eine handteller-große unempfindliche Stelle in der Gegend des rechten großen Rollhügels. Allmählich trat dann das Gefühl des Stechens und Brennens in der Haut von der Hüfte bis zum oberen Drittel des Oberschenkels, völlige Stuhlverhaltung und teilweise Harnverhaltung hinzu. In der Gegend des ersten Lendenwirbels entwickelte sich eine buckelartige Vorwölbung. Bei Lagerung auf völlig flachem Bett mit Erhöhung der unteren Rückengegend auf einer untergelegten Rolle sowie späterer Anwendung eines Gipskorsetts trat Heilung und Dienstfähigkeit ein. (O.-St.-A. Arimond.)

Die Beckenbrüche sind, soweit sie von Quetschungen und Zerreißungen innerer Organe begleitet waren, an anderer Stelle besprochen. Die einfachen Beckenbrüche (es wird von 2 Brüchen der Beckenschaufel, 1 Pfannenbruch, 1 Bruch des wagerechten Schambeinastes berichtet) bieten nichts Besonderes.

Vierte Unterart: Verstauchungen.

(No. 180 und 181 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | | |
|------------------|----------------|---------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | | Summe | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | |
| 277 | 18 359 | 34,9 | 17 963 | 96,4 | — | — | 414 | 2,2 | 18 377 | 98,6 | 259 | 230 261 | 12,4 |

Außerdem erkrankten noch 1 Invalide, 118 Kadetten und 151 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|---------|-----------------|------------------|---------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 1238 | 29,9 | X. | 509 | 23,2 |
| I. | 1174 | 57,1 | XI. | 1024 | 49,3 |
| II. | 1001 | 38,7 | XII. (1. K. S.) | 387 | 19,4 |
| III. | 707 | 30,1 | XIII. (K. W.) | 1495 | 67,5 |
| IV. | 934 | 41,8 | XIV. | 1192 | 37,5 |
| V. | 603 | 23,5 | XV. | 1207 | 38,7 |
| VI. | 754 | 29,2 | XVI. | 998 | 36,5 |
| VII. | 880 | 32,6 | XVII. | 892 | 30,1 |
| VIII. | 1238 | 46,1 | XVIII. | 876 | 33,3 |
| IX. | 656 | 26,3 | XIX. (2. K. S.) | 594 | 28,8 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 974 | 2036 | 1252 | 1785 | 1708 | 1852 | 1405 | 1506 | 1471 | 1853 | 1563 | 954 |
| ‰ K. | 2,3 | 3,8 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 2,9 | 2,0 |

Zweimal wurde im Anschluß an Verstauchung des Ellenbogengelenks die Bildung von Muskelverknöcherungen beobachtet, welche schon unter Rapport No. 165 beschrieben sind. (Innerer Oberarmmuskel [Magdeburg], zweiköpfiger Oberarmmuskel [Bautzen]).

Bei Verstauchungen des Kniegelenks mit einigermaßen beträchtlichem Erguß glauben O.-St.-A. Boeckler-

Offenburg und St.-A. Franke-Colmar i. E. durch Punction die Behandlungsdauer erheblich abgekürzt und die Neigung zu Rückfällen vermindert zu haben.

Bei Verstauchungen des Fußgelenks hat O.-St.-A. Plagge-Neustadt i. Ob. Schles. gute Erfolge von dem Hoffaschen Heftpflaster-Gehverband gesehen.

Fünfte Unterart: Verrenkungen.

(No. 182 bis 184 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | absol. Zahl | ‰ der Behand- elten | | | |
| 47 | 562 | 1,1 | 484 | 79,5 | — | — | 82 | 13,5 | 566 | 92,9 | 43 | 17 907 | 29,4 |

Außerdem erkrankten noch 7 Kadetten und 4 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Über die Beteiligung der verschiedenen Gelenke

an dem Gesamtzuge und die Verteilung desselben auf die einzelnen Monate und Armeekorps enthalten die nachstehenden Tabellen das Nähere.

| Art der Verrenkung | Zugang (absolut und ‰ des Gesamtzuges) | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|
| | 1881/86 | | 1886/91 | | 1891/96 | | 1896/97—1900/01 | | 1902/03 | |
| | absolute Zahl | ‰ der Gesamt- zahl der Verren- kungen | absolute Zahl | ‰ der Gesamt- zahl der Verren- kungen | absolute Zahl | ‰ der Gesamt- zahl der Verren- kungen | absolute Zahl | ‰ der Gesamt- zahl der Verren- kungen | absolute Zahl | ‰ der Gesamt- zahl der Verren- kungen |
| Verrenkungen der oberen Gliedmaßen | 1522 | 74,2 | 1644 | 75,9 | 2014 | 76,1 | 2476 | 84,2 | 488 | 86,8 |
| Verrenkungen der unteren Gliedmaßen | 314 | 15,3 | 275 | 12,7 | 342 | 12,9 | 429 | 14,6 | 69 | 12,3 |
| Verrenkungen anderer Gelenke | 216 | 10,5 | 247 | 11,4 | 291 | 11,0 | 35 | 1,2 | 5 | 0,99 |
| Durchschnitt bzw. Summe | 410 | — | 493 | — | 529 | — | 588 | — | 562 | — |

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|------|-----------------|------------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 40 | 0,97 | X. | 25 | 1,1 |
| I. | 20 | 0,63 | XI. | 40 | 1,9 |
| II. | 28 | 1,1 | XII. (I. K. S.) | 9 | 0,45 |
| III. | 22 | 0,94 | XIII. (K. W.) | 34 | 1,5 |
| IV. | 18 | 0,80 | XIV. | 33 | 1,0 |
| V. | 38 | 1,5 | XV. | 26 | 0,83 |
| VI. | 34 | 1,3 | XVI. | 24 | 0,88 |
| VII. | 32 | 1,2 | XVII. | 42 | 1,4 |
| VIII. | 25 | 0,93 | XVIII. | 28 | 1,1 |
| IX. | 24 | 0,96 | XIX. (2. K. S.) | 20 | 0,97 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 47 | 39 | 42 | 49 | 40 | 44 | 36 | 38 | 63 | 71 | 57 | 36 |
| ‰ K. | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,07 |

Am häufigsten sind Verrenkungen des Schultergelenks berichtet, zwei davon waren habituell. Seltener Verrenkungsarten sind nicht mitgeteilt.

Unter den am zweithäufigsten vorgekommenen Ellenbogenverrenkungen traten 2 mal Behinderungen der Beweglichkeit durch Knochenwucherungen von den Bruchlinien des mitbeschädigten Gelenkteils vom Oberarmbein ein. (Gnesen, in der hinteren Oberrollengrube, — Glatz, Knochenstange vom inneren Gelenkknorpel nach der Beuge zu). Außerdem werden noch 3 mal Absprengungen eines Oberarmknorpels erwähnt.

Die unblutige Einrenkung gelang jedesmal.

Bei einem Leutnant in Gumbinnen war bei der Verrenkung der Kronenfortsatz der Elle abgebrochen und die Speichenschlagader zerrissen. Der Offizier wurde wieder dienstfähig. (O.-St.-A. Boeck.)

Von 4 Verrenkungen des Schlüsselbeins befanden sich 2 am Brustbeinende, 2 am Schulterblattende. Von den letzteren mußte eine auf blutigem Wege zurückgebracht und mit Silberdraht in der richtigen Lage gehalten werden. (Siehe Operationsliste unter C. 5 Mainz.)

Verrenkung der Hand wird 3 mal beschrieben. Die Einrenkung gelang mühelos.

Ferner sind zu erwähnen: 1 isolierte Verrenkung des Speichenköpfchens (Bensberg), 3 Verrenkungen des Hüftgelenks, 2 Verrenkungen der Kniescheibe (Wittenberg, Metz).

Offene Verrenkungen werden 5 mal beschrieben, und zwar: 1 Verrenkung des Fußgelenks, 1 am Nagelglied des Daumens, 2 an anderen Fingergliedern, 1 am Grundgelenk der großen Zehe.

Von diesen Verrenkungen konnte diejenige des Fußgelenks und des Daumens leicht zurückgebracht werden. Bei einer Verrenkung des vierten Fingers mußte das Köpfchen des Grundgelenkes abgetragen werden, bei einer am kleinen Finger war Ausschneidung des Gelenks nötig, bei der großen Zehe zeigte sich, daß das eingeklemmte innere Sesambein und eine Verschiebung der Sehne des langen Zehenbeugers ein Hindernis für die Einrenkung bildeten, welches erst durch Entfernung des Sesambeins beseitigt werden mußte. (O.-St.-A. Rahnke-St. Avold.)

Von selteneren Verrenkungen sind zu erwähnen:

1 Verrenkung im Lisfrancschen Gelenk nach innen und oben, entstanden durch Hängenbleiben im Bügel beim Sturz vom Pferde (St.-A. Osann-Freiburg i. Baden), 1 Verrenkung sämtlicher Mittelfußknochen nach außen, durch Fall des Pferdes auf den im Bügel steckenden Fuß des Reiters. (O.-St.-A. Griebisch-Hagenau.) Die Einrenkung hatte keine Schwierigkeiten.

Sechste Unterart: Schufswunden.

(No. 185 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 44 | 291 | 0,55 | 217 | 10 | 62 | 289 | 46 | 35,2 |

Außerdem erlitt noch je 1 Invalide und Kadett eine Schufsverletzung. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Beteiligung der einzelnen Armeekorps in ‰ K. nach der Höhe des Zuganges geordnet.

| Reihenfolge | Armeekorps | ‰ K. | Reihenfolge | Armeekorps | ‰ K. |
|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|------|
| 1 | VIII. | 0,86 | 11 | X. | 0,50 |
| 2 | I. | 0,82 | 12 | IV. | 0,49 |
| 3 | III. | 0,81 | 13 | G. | 0,48 |
| 4 | XIII. (K. W.) | 0,77 | 14 | XVII. | 0,47 |
| 5 | XV. | 0,67 | 15 | VII. | 0,45 |
| 6 | XIX. (2. K. S.) | 0,63 | 16 | VI. | 0,43 |
| 7 | XVI. | 0,59 | 17 | XI. | 0,43 |
| 8 | XIV. | 0,57 | 18 | XVIII. | 0,42 |
| 9 | II. | 0,54 | 19 | IX. | 0,32 |
| 10 | V. | 0,51 | 20 | XII. (1. K. S.) | 0,20 |

| Art der Schufsverletzung | Summe | | | Es wurden getroffen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|---------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------------|---------|-----------|-----|---|
| | Anzahl | geheilt | gestorben | Kopf und Hals | | | Brust | | | Unterleib | | | Rücken | | | Gliedmaßen | | | | |
| | | | | Anzahl | geheilt | gestorben | Anzahl | geheilt | gestorben | Anzahl | geheilt | gestorben | Anzahl | geheilt | gestorben | Anzahl | geheilt | gestorben | | |
| Schufsverletzungen durch Granaten, Schrapnells u. s. w. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| Schufsverletzungen durch Manöverkartuschen | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Schufsverletzungen durch scharfe Patronen | Gewehr- u. Karabinerschüsse | 79 | 11 | 68 | 35 | 2 | 33 | 32 | 3 | 29 | 6 | — | 6 | — | — | — | — | 6 | 6 | — |
| | Revolver- u. Pistolenschüsse | 64 | 34 | 30 | 27 | 6 | 21 | 16 | 8 | 8 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 20 | 20 | — |
| Schufsverletzungen durch freie Explosion von Platzpatronen | Zielmunition, Teschin- und Flobertgeschosse | 38 | 37 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 22 | 22 | — |
| | aus dem Gewehrlauf | 139 | 115 | 24 | 46 | 29 | 17 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | — | — | — | — | 75 | 75 | — |
| Schrotschüsse | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 3 | — |
| Verletzungen durch abgesprengte Geschosse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wasserschüsse | 3 | — | 3 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gewehrschüsse mit anderen Geschossen | 5 | 1 | 4 | 3 | — | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Verletzungen durch Explosion von Patronen, durch Ladehemmungen und zurückschlagende Pulvergase | 28 | 28 | — | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | — |
| Verletzung durch Platzen von Gewehren, durch Kanonenschläge, Zündladungen und dergleichen | 25 | 23 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 14 | 14 | — |
| Summe | 408 ¹⁾ | 274 | 134 | 154 | 76 | 78 | 69 | 25 | 44 | 18 | 7 | 11 | — | — | — | — | — | 167 | 166 | 1 |

1) Außerdem kam noch eine Schufsverletzung vor, über welche nähere Angaben nicht vorliegen, da sich der Mann außerhalb seiner Garnison erschossen hatte.

Einschließlich der Selbstmorde ist über 408 Schufsverletzungen berichtet, die in der vorseitigen Zahlenübersicht näher erläutert sind.

Die wichtigsten Verletzungen sind am Schlufs zusammengestellt.

Schufsverletzungen durch Granaten, Schrapnells u.s.w.

4 Unglücksfälle.

1 Schrapnellschufs aus dem Geschützrohr auf 3000 bis 4000 m Entfernung verursachte eine leichte Hautverletzung an der Wade. — Infolge unvorsichtigen Umgehens mit blindgegangenen Geschossen entstanden 3 schwere Verletzungen durch freie Explosion von Artilleriegeschossen, und zwar war in dem ersteren Fall einem Kanonier bei der Explosion eines Schrapnells das Gesicht verbrannt. Zwei Schufswunden von den unter die Gesichtshaut gedrunghenen Schrapnellkugeln heilten nach Entfernung der Geschosse, doch wurde der Mann dienstunbrauchbar, da die Verbrennungen an beiden Hornhäuten zu Schrumpfung beider Augäpfel und völliger Blindheit führten (1)¹⁾. — Von 2 Explosionen von Granaten ist die eine, bei welcher der rechte Brustfellsack eröffnet war, als geheilt unter No. (2) der Zusammenstellung aufgeführt. Bei der anderen war der rechte Oberschenkel fast ganz abgerissen, das linke Bein durch mehrere grofse Weichteilwunden schwer verletzt. Die Erschöpfung durch die Blutung war so grofs, dafs die in der Operationsliste unter C 3 (Halberstadt) aufgeführte Absetzung des Oberschenkels keine Rettung mehr bringen konnte.

Schufsverletzungen durch Manöverkartuschen.

1 Unglücksfall.

Beim Vorbeilaufen an einer mit Manöverkartuschen feuertenden Feldhaubitze war ein Mann am rechten Oberschenkel getroffen. Die entstandene Hautquetschwunde heilte erst in 120 Tagen (Bromberg).

Schufsverletzungen durch scharfe Patronen.

A. Gewehr- und Karabinerschüsse.

Unter den 79 scharfen Gewehr- und Karabinerschüssen finden sich nur 8, die nicht aus unmittelbarer Nähe abgefeuert wurden. 2mal waren bei Schüssen aus 600 und 300 m Entfernung nur leichte Hautverletzungen (Streifschufs am Hinterkopf und oberflächliche Hautwunden durch Mantelsplitter in der Schlüsselbeingegend) entstanden.

1mal hatte ein Schufs aus 120 m Entfernung einem im Anschlag liegenden Manne den linken Daumenballen und dann als Querschläger die linke Schulter durchschlagen (36).

Durch Unvorsichtigkeit auf dem Schiefsstand war 1mal auf 300 m ein Oberarm (39), 1mal aus 200 m Entfernung ein Kniegelenk durchschossen (38). Bei 1 Schufs aus etwa 1 m blieb das durch Betten usw. aufgehaltene Geschofs im Körper (18). — Diese 6 Verletzten wurden geheilt. Dagegen starb 1 Mann (22), der von einem geisteskranken Kameraden auf 22 m Entfernung durch die Brust und 1 Sergeant, der von einem Posten auf 6 bis 8 m durch den Bauch geschossen war (31). — Durch Unglücksfälle waren zusammen 12 Verletzungen von scharfen Schüssen entstanden und zwar ausser den oben angeführten 8 Schüssen aus mehr oder weniger grofser Entfernung 4 aus nächster Nähe: 1 Abreifsung eines auf die Gewehrmündung gelegten Zeigefingers und 1 Schufs durch den Mittelfufs aus dem beim Gewehrreinigen mit der Mündung aufgesetzten Gewehr (37). 1 Schufs,

der bei einem Mann durch das Losgehen eines aus Fahrlässigkeit nicht entladenen Gewehrs vom Kinn nach dem Genick gegangen war (15), und 1 Schufs, durch den ein Mann auf dem Schiefsstand durch Unvorsichtigkeit in den Bauch getroffen war (34).

In der Absicht, sich selbst zu verstümmeln, schofs sich 1 Mann das auf die Gewehrmündung gelegte Nagelglied vom rechten Zeigefinger ab.

a. Kopf- und Halsschüsse.

31 Selbstmorde,
2 Selbstmordversuche,
2 Unglücksfälle.

Von 35 Kopf- und Halsschüssen hatten 4 die Schädelhöhle nicht eröffnet und zwar war 1mal durch einen Unglücksfall nur ein leichter Streifschufs aus 600 m Entfernung am Hinterkopf entstanden. Bei 1 Mundschufs (Selbstmordversuch) waren nur Teile des Gesichtsschädels fortgerissen (3), 2mal bei 1 Kinn- und 1 Halsschufs war das in selbstmörderischer Absicht abgegebene Geschofs horizontal gegangen und hatte im ersten Falle, der tödlich endete, den Rückenmarkskanal verletzt (14), während bei dem Halsschufs Heilung eintrat, da trotz des Verlaufs des Schufskanals neben dem Kehlkopf keine lebenswichtigen Teile getroffen waren (4).

Aufser dem erwähnten Schufs aus 600 m Entfernung waren alle Kopfschüsse aus unmittelbarer Nähe gekommen.

31 aus unmittelbarer Nähe abgegebene Schüsse (30 Selbstmorde, 1 Unglücksfall) hatten die Schädelhöhle durchdrungen. 2 Leute lebten nach dem Schufs noch eine Stunde, drei 20 bis 35 Minuten, sonst war der Tod sofort oder nach wenigen Minuten eingetreten. Ein Schufs war aus einem Jagdgewehr, die übrigen aus Dienstgewehren oder Karabinern abgegeben.

Bei Gruppierung der 35 Schüsse nach der Lage der Einschufsöffnung überwiegen die Mundschüsse [11]. Dann folgen die Schläfen- [10], Stirn- [8] und Kinnschüsse [3], ferner 1 Halsschufs, 1 Streifschufs am Hinterkopf und 1 Kopfschufs, über den keine Angaben vorliegen, da sich ein Halbinvalide aufserhalb seiner Garnison erschossen hatte. Im einzelnen war:

Von 8 Stirnschüssen waren 1 aus einem Jagdgewehr, die übrigen aus Dienstgewehren oder Karabinern gefallen; alle waren in selbstmörderischer Absicht aus nächster Nähe abgegeben. — Ein Mann, bei dem der Schufs eine sehr steile Richtung durch das Vorderhirn genommen hatte, lebte noch 30 Minuten (10), die übrigen waren sofort tot. Bis auf einen Schufs, der fast quer von einer Stirnhälfte zum Scheitelbein der anderen Seite ging (6), hatten alle Schüsse eine horizontale oder ansteigende Richtung nach hinten genommen. 1mal scheint das rechte Stirn-, Scheitel- und Hinterhauptsbein völlig zertrümmert gewesen zu sein. Die übrigen Schüsse waren 1mal gegen die Nasenwurzel, 2mal gegen das Auge oder den Augenwinkel, sonst gegen verschiedene Punkte der Stirnschuppe gerichtet. Die Zerstörungen an den Knochen und am Gehirn waren bei allen Schüssen sehr ausgedehnt.

Die Wunden am Ein- und Ausschufs verhielten sich sehr verschieden. 1mal entsprach einer 9,5 : 8 cm grofsen Wunde an der Stirn, an deren zerrissenen und zurückgeklappten Hautlappen die zugehörigen Stücke des Schädeldachs hingen, eine 6 : 4 cm grofse, scharfrandige Ausschufsöffnung. Die zwischenliegenden Gehirnteile waren herausgeschleudert. — 2mal waren zerrissene Einschufsöffnungen von 18 : 6 (6) und 9,5 : 6 cm (7) Durchmesser an der Stirn vorhanden, während die Ausschufsöffnungen nur eine kleine runde oder sternförmige Öffnung von 1 : 2 oder 1 cm zeigten. Auch ein Schufs vom rechten Augenwinkel aus (9), der am Einschufs das Auge und fast die ganze Stirn zerrissen hatte, zeigte am Ausschufs nur eine Wunde von 2 cm Durchmesser. Bei einem Schufs durch die Nasenwurzel (5)

¹⁾ Die in () gesetzten Zahlen beziehen sich auf die Zusammenstellung der wichtigeren Schufsverletzungen am Schlusse dieser Unterart.

war der Ein- und Ausschufs klein, er bestand vorn in einer viereckigen Wunde von 1 : 2 cm, hinten in einer Wunde von 2 cm Durchmesser an der Spitze des Hinterhauptshöckers. — Ein zweiter Schufs gegen das Auge war der steil gegangene; bei diesem bildete der Einschufs am Auge ein unregelmäßiges Loch von 3 : 2,5 cm, der Ausschufs eine Wunde von 6 : 2 cm an der Grenze zwischen linkem Stirn- und Scheitelbein (10). Der Schufs aus dem Jagdgewehr hatte über der rechten Stirnhöhle ein 2 cm großes rundes Loch und als Ausschufs einen breiten Knochenspalt von 17 cm Länge über dem Scheitel erzeugt (8).

Von 10 in selbstmörderischer Absicht abgegebenen Schläfenschüssen waren 7 gegen die rechte, 3 gegen die linke Schläfe gefeuert. Die Einschufsöffnungen werden meist als rund, von 1 bis 3 cm Durchmesser angegeben, je 1 mal wird eine handtellergroße bzw. 5 : 2 cm große Wunde erwähnt. (In beiden Fällen ist das Geschofs nicht gefunden.) Alle Schüsse bis auf einen, der an der entgegengesetzten Hinterhauptsseite herauskam, hatten ihren Ausschufs in der gegenüberliegenden Schläfen- oder Scheitelbeingegend. Die vorliegenden Angaben über die Durchmesser der Ausschufswunden schwanken zwischen 2 und 4, einmal 8 cm. — Bei den größeren Ausschüssen ist mehrmals bemerkt, daß Gehirnmassen ausgeschleudert waren. 1 Mann hatte noch 20 Minuten, einer trotz sehr großer Zerstörungen des Gehirns noch eine Stunde gelebt (12), die übrigen waren sofort tot. Mehrmals ist erwähnt, daß ausgedehnte Stückbrüche des Schädeldachs durch die unverletzte Kopfhaut gefühlt wurden. Bei 5 Leichenöffnungen fanden sich stets weitgehende Zertrümmerungen des Knochens am Ein- und Ausschufs (11), (12) und Zermalmungen der zwischenliegenden Gehirnteile.

Von 11 Schüssen in den Mund, führte 1 nicht zum Tode. Er war von einem aus China zurückkehrenden Trainsoldaten in selbstmörderischer Absicht aus dem Karabiner abgegeben (3). Der schon früher erwähnte Mann, dem nur ein Teil des Gesichtsschädels zerschmettert war, blieb am Leben. Im Garnisonlazarett I Berlin wurde das sehr behinderte Schluckvermögen und die Sprache etwas verbessert. — Von den anderen 10 tödlich verlaufenen Mundschiessen, die sämtlich in selbstmörderischer Absicht aus nächster Nähe aus Dienstgewehren abgegeben waren, hatten 8 den Tod sofort herbeigeführt. 1 Unteroffizier hatte sich trotz der Zerreißen der linken Gesichtshälfte und eines Teils des Stirnhirns noch einige Schritte weit von der Schufsstelle nach einer Zimmerecke geschleppt (13), ein anderer lebte trotz einer ähnlich großen Verletzung noch 35 Minuten. Der Einschufs lag 2 mal am Zahnfortsatz des Oberkiefers, aus dem Schneidezähne herausgeschlagen waren. 1 mal wird eine ovale Einschufsöffnung im harten Gaumen von $0,5 \times 2$ cm erwähnt, in den übrigen Fällen wird die Einschufsöffnung als Zertrümmerung des Gaumens bezeichnet oder die Angaben fehlen. — Bei 2 Schüssen wird hervorgehoben, daß die Mundwinkel und die Lippen tief eingerissen waren (14). — Am Ausschufs fanden sich bei 2 Schüssen mit der Richtung nach der Stirn ausgedehnte Zerreißen. Wesentlich kleiner waren die Ausschufsöffnungen bei 4 in den Scheitelbeingegenden ausgetretenen Schüssen, die 1 mal als rundes Loch von 1,5 cm, sonst als sternförmig zerrissene oder viereckige Wunden von 2 bis 3 cm Durchmesser bezeichnet sind. 2 Schüsse, die am Hinterhaupt herausdrangen, verursachten am Ausschufs Löcher von nur 1 bis 2 cm Durchmesser, 1 im Nacken gelegene Ausschufswunde war nur 6×5 mm groß. — Bei 4 Leichenöffnungen wurden stets ausgedehnte Verletzungen des Gehirns und breite Zersplitterungen der Schädelknochen gefunden. — Bei 2 schon erwähnten Mundschiessen (3 und 14) war die Hirnhöhle uneröffnet geblieben, ersterer hatte nur den Oberkiefer, der andere die beiden obersten Halswirbel zersplittert.

An der Vorderseite des Kinns lag der Einschufs bei

einem durch Losgehen seines nicht entladenen Dienstgewehrs verunglückten Musketier (15). Er war 5,5 : 4 mm groß, während sich eine 6 mm große Ausschufsöffnung im Nacken 2 cm unterhalb der Haargrenze fand. — 2 Selbstmörder, die sich mit dem Dienstgewehr in senkrechter Richtung ins Unterkinn geschossen hatten, zeigten pfennigstückgroße Einschufsöffnungen und 1 mal eine markstückgroße Ausschufsöffnung in der Mitte der Stirn mit starker Zertrümmerung des umgebenden Knochens, das andere Mal einen Ausschufs 6 cm oberhalb vom linken Augenbrauenrand mit Zertrümmerung der Augenhöhle und des Augapfels. Diese beiden Selbstmörder waren sofort tot, während der zuerst aufgeführte noch einige Minuten gelebt hatte.

Durch den Hals hatte sich der schon mehrmals erwähnte, am Leben gebliebene Sergeant (4) mit dem Dienstgewehr in selbstmörderischer Absicht geschossen. Er wurde dienstunbrauchbar.

Den ebenfalls schon erwähnten 5 cm langen Streifschufs am Hinterkopf erhielt ein Mann aus Versehen auf dem Truppenübungsplatz im Lockstedter Lager aus 600 m Entfernung. Die oberflächliche Wunde war nach 8 Tagen geheilt. Im Mützenrand fanden sich 2 Löcher.

b. Brustschüsse.

20 Selbstmorde,
9 Selbstmordversuche,
3 Unglücksfälle.

[17 mal war das Herz getroffen.]

Alle berichteten Brustschüsse sind aus dem Dienstgewehr und dem Karabiner und, bis auf die 3 durch Unglücksfälle verursachten, aus nächster Nähe abgegeben. 2 Brustschüsse [1 Hautverletzung durch Mantelsplitter und der Schufs 22] kamen aus 300 bzw. 22 m Entfernung. Ein dritter Schufs, der einzige scharfe Schufs, bei welchem ein Geschofs aus dem Dienstgewehr den Körper nicht verließ, hatte vom nächsten Bett herkommend, einen im Bett liegenden Mann nach Durchschlagung von Strohsäcken, eines Brettes und einer Eisenstange vom Rücken her getroffen (18). Die soeben als erster und dritter aufgeführten Schüsse waren nur in die Haut bzw. die Muskelbedeckungen des Brustkorbes eingedrungen, die Brusthöhle war nicht eröffnet, Ausschufsöffnungen fehlten, und zwar waren bei dem Schufs aus 300 m Entfernung nur 3 linsengroße Hautwunden in der Nähe des rechten Schlüsselbeins entstanden, die nach Entfernung der Mantelstückchen schnell heilten. Bei dem Schufs (18) fand sich das stark gehemmte Geschofs in Höhe der 9. Rippe unter der Haut. — 3 weitere, sämtlich in selbstmörderischer Absicht mit dem Dienstgewehr abgegebene Schüsse hatten nur die Brustwand an den Rippen oder den Rippenknorpeln entlang gehend durchbohrt. 2 davon hatten den Brustfellraum auf ihrem Wege eröffnet, so daß Hautemphysem und in einem Falle Luft-, im andern Blutansammlung im Brustfellraum entstand. Im ersten Falle war das Geschofs zwischen der linken Achselhöhle und dem Brustkorb hindurchgegangen [Nervenlähmung] (16), im anderen hatte es Zerstörungen an der 7. und 8. Rippe hervorgerufen (17). Das Fehlen von Bluthusten machte in beiden Fällen eine Beschädigung des Lungengewebes unwahrscheinlich. — Der dritte hierhergehörige Schufs (19) lag so tief an der linken Seite des Brustkorbes, daß eine Verletzung der Lungen und des Brustfells ausgeschlossen erschien. Die Knorpel der 7. und 8. Rippe waren etwa in der vorderen Achsellinie durchschossen oder zersplittert, das Brustfell war nicht eröffnet, aber ein Bauchschnitt (siehe Operationsliste unter B 2 Münster) zeigte, daß durch die Einwirkung des Schusses eine pfennigstückgroße Blutunterlaufung am Dickdarm hervorgerufen war.

Die 5 bisher aufgezählten Leute wurden geheilt, alle übrigen Brustschüsse endeten tödlich, und zwar war der Tod außer bei 5 Schüssen [1 Schufs gegen die Mitte des Brustbeingriffes

(2 Tage), 1 Schufs durch die rechte Lungenspitze (2 $\frac{1}{2}$ Stunden), 3 Schüsse in den Rippenknorpelgegenden (17, 24 und 37 Stunden)] stets sofort eingetreten.

Der einzige berichtete scharfe Schufs durch Lungengewebe (rechte Spitze) war in selbstmörderischer Absicht aus dem Dienstgewehr abgegeben. In der Absicht, die Blutung zu stillen, wurde die in der Operationsliste unter B 6 Danzig ausgeführte Rippenresektion gemacht. Der Tod trat wenige Stunden später ein.

Von 5 Brustschüssen muß ihrer Lage nach angenommen werden, daß Verletzungen der großen Gefäßstämme neben etwa vorhandenen Lungenverletzungen den schnell eingetretenen Tod herbeiführten. Er trat bei 1 Schuss, der von der Mitte des Brustbeins in Höhe des zweiten Zwischenrippenraums nach einer Stelle dicht links vom Dornfortsatz des zweiten Brustwirbels ging, 2 Tage nach dem aus selbstmörderischer Absicht abgegebenen Schufs, in den anderen Fällen sofort ein. — Bei 2 Schüssen, und zwar bei dem unter No. 22 in der Zusammenstellung aufgeführten, von einem Geisteskranken mit dem Dienstgewehr aus 22 m Entfernung abgegebenen Schufs, und bei einem einwärts von der rechten Brustwarze eingedrungenen, dicht unter dem linken Schulterblattwinkel zum Ausschufs gekommenen Schufs eines Selbstmörders aus dem Dienstgewehr dürfte nach der Lage der Schufsrichtung eine Verletzung der Körperschlagader die Schuld an dem sofortigen Eintritt des Todes getragen haben, wenn nicht Teile des Herzens selbst mitgetroffen waren. 2mal wurde die Verletzung der großen Gefäße durch die Leichenöffnung erwiesen, No. 21 (Körperschlagader und Herzbeutel) und 20 (Lungenschlagader).

Bei 11 von 17 eigentlichen Herzschnüssen, die sämtlich von Selbstmördern aus nächster Nähe abgegeben waren und den Tod sofort herbeiführten, konnte das Vorhandensein einer Herzverletzung nur aus der Lage des Schufskanals geschlossen werden, da keine Leichenöffnung gemacht werden konnte. Über 6 Herzschnüsse, bei denen die Leichenöffnung gemacht ist, ist in der Zusammenstellung genauer berichtet und zwar erwies sich 1 Schufs (23) als Verletzung des linken Vorhofes und der Körperschlagader, bei 1 Schufs (24) war das ganze Herz bis auf den linken Vorhof zerstört. Bei 2 von 4 Schüssen, welche die linke Kammer getroffen hatten, lagen die Verletzungen mehr an der Spitze (25 und 26), von den beiden anderen (27 und 28) war der letztere auch durch das Zwerchfell, am Magen vorbei durch die Milz gedrungen.

Bei 4 Schüssen, die in den untersten Teilen der Brustgegend — 2 in der linken und 2 in der rechten Rippenknorpelgegend — auf oder innerhalb der Brustwarzenlinie eingeschossen waren, dürften weniger die etwaigen Lungenverletzungen, als die Verletzungen der Leber [1mal durch Operation (29) nachgewiesen] oder der Eingeweide des Zwerchfellkuppelraums in Betracht kommen. Nur bei einem von diesen Schüssen, der von 9 cm unterhalb der linken Brustwarze nach einer Stelle 3 cm oberhalb des linken unteren Schulterblattwinkels 3,5 cm links von der Mittellinie ging, trat der Tod sofort ein. Die Ursache dieses schnellen Eintritts des Todes blieb unaufgeklärt, da die Leichenöffnung nicht gestattet wurde. Der Berichterstatter nimmt Verletzung der Körperschlagader an. Ein Musketier in Ratibor, bei dem der Schufskanal etwa die gleiche Lage auf der rechten Körperseite hatte (V. Zwischenrippenraum, unterer Schulterblattwinkel) starb nach 37, ein anderer in Berlin (vorn 8., hinten 10. Rippe rechts) nach 24 Stunden. Auch bei diesen Leuten konnte keine Leichenöffnung vorgenommen werden. Bei dem in der Zusammenstellung unter No. 29 und in der Operationsliste unter B 2 Mülhausen i. E. verzeichneten Sergeanten war die Leber eingerissen und der Magenmund verletzt. Außerdem war das linke Bein durch Quetschung des Rückenmarks gelähmt.

Das Verhältnis der Ein- und Ausschufsöffnungen wird bei den Schüssen, die den Brustkorb durchquerten, meist dahin angegeben, daß der Ausschufs wesentlich kleiner als der Einschufs war, einige Male wird er als gleich bezeichnet und 3mal ist er als größer angegeben. Im übrigen hatten 11 von den Einschufsöffnungen eine Größe von 1,5 bis 3 cm Durchmesser, 6 sind mit 8 mm oder weniger, die übrigen in zwischenliegenden Mafsen oder gar nicht angegeben. Die Größe der Ausschüsse wird 5mal zwischen 1,3 bis 1,5 cm, 10 mal als 0,8 cm oder weniger, sonst mit 1 cm, 1 mal gar nicht angegeben.

c. Schufsverletzungen am Unterleib.

- 1 Selbstmord,
- 3 Selbstmordversuche,
- 2 Unglücksfälle.

Die Bauchschüsse waren sämtlich mit dem Dienstgewehr abgegeben und kamen bei den Selbstmördern und 1 Unglücksfall aus nächster Nähe, bei dem anderen Unglücksfall (Schufs von einem Posten abgegeben) aus 6 bis 8 m Entfernung. Abgesehen von 1 Schufs, bei dem die Zeit des Eintritts des Todes unklar blieb, da der Selbstmörder erst später gefunden wurde, lebten die Verletzten noch 30 Minuten bis 24 Stunden nach dem Schufs. Bei einem Manne war vergeblich versucht, das Leben durch eine Darmausschneidung zu erhalten. (Operationsliste unter B 2-Celle).

Alle 6 Schüsse, von denen 2 in der Herzgrube, die anderen 3 oberhalb, 1 unterhalb vom Nabel ihren Einschufs hatten, sind in der Schufsliste ausführlicher berichtet (30 bis 35). Die in 1 Falle durch den Bauchschnitt, in den übrigen durch den Leichenbefund festgestellten Organverletzungen hier aufzuführen, hiefse die dort gemachten Angaben zu wiederholen. — 1mal war die Brusthöhle mit eröffnet (32). — Die Durchmesser von 4 meist als rund bezeichneten Einschufswunden werden mit 0,7 bis 1,3 cm, die der entsprechenden Ausschufswunden mit 0,7 bis 1,5 cm angegeben. 2 Einschufswunden wurden als quer- oder schräggestellte ovale Wunden von 2:1,25 und 2:1,5 cm bezeichnet, denen Ausschufsöffnungen von 2:1,5 cm und von 0,7 cm entsprachen. Aus letzterer Ausschufsöffnung hing ein kleiner Gewebsetzen.

d. Schufsverletzungen der Gliedmafsen.

- 5 Unglücksfälle,
- 1 Selbstverstümmelung.

Die berichteten scharfen Schüsse an den Gliedmafsen waren sämtlich aus dem Dienstgewehr abgegeben. 4 waren aus unmittelbarer Nähe, 3 aus Entfernungen von 120, 200 und 300 m gekommen. 4 Schüsse hatten obere, 3 untere Gliedmafsen getroffen.

Bei 2 Fingerschnüssen war der Finger unmittelbar vor die Mündung gehalten, wobei einmal das Nagelglied vom rechten Zeigefinger, das andere Mal (Selbstverstümmelung) das Mittelfglied des linken Mittelfingers fast abgerissen wurde. — 1 mal war einem im Anschlag liegenden Manne auf 120 m zuerst der linke Daumenballen durchgeschossen, dann war das Geschos als Querschläger durch die linke Schulter gegangen. Der Mann wurde wieder dienstfähig (36). Ein Schufs aus einem beim Gewehrreinigen mit der Mündung auf den Fußrücken gesetzten Gewehr war hinter dem Köpfchen des 1. und 2. Mittelfußknochens durch den Fuß gegangen (37). 2 Schüsse, aus 300 bzw. 200 m waren auf dem Schiffsstande abgegeben. Ersterer war durch die Schulter, der andere durch das linke Kniegelenk gegangen. Die Heilung nahm bei letzterem einen schnellen Verlauf, obgleich sie durch eine Brustfellentzündung gestört wurde; der Mann wurde dienstfähig (38). — Bei den Schüssen durch den Daumenballen (36) und den Oberarm (39) fand sich ein kleiner Einschufs und je ein 2 cm großer Ausschufs. — Bei dem Schufs

durch den Mittelfufs waren beide Öffnungen klein. — Der Querschläger (36) hatte einen nur etwa 2 cm langen Schufskanal durch den Deltamuskel und eine sehr grofse zerrissene Wunde am Ausschufs verursacht.

B. Revolver und Pistole.

64 Schufsverletzungen, bei denen 13 mal der Armeerevolver, 1 mal ein Offizierrevolver, 44 mal Revolver verschiedener Art, 6 mal Pistolen zur Anwendung kamen. 40 mal handelte es sich um Selbstmord oder Selbstmordversuche, 20 mal um Unglücksfälle, 3 mal um Überfall durch Zivilpersonen, 1 mal um einen Schufs bei einem Fluchtversuch. 29 mal war die Verletzung tödlich, 35 mal ging sie in Heilung über, wobei die Dienstfähigkeit 29 mal erhalten blieb und 6 mal Dienstunbrauchbarkeit die Folge war.

a. Kopf und Hals.

- 21 Selbstmorde,
- 4 Selbstmordversuche,
- 2 Überfälle.

21 Todesfälle, 6 Heilungen, unter ihnen 5 mit Erhaltung der Dienstfähigkeit, 1 mit Dienstunbrauchbarkeit. Unter den Selbstmorden fanden sich 17 Schläfenschüsse. Durch zahlreiche Leicheneröffnungen wurden sowohl bei den Schüssen mit dem Armeerevolver wie bei denen mit anderen Revolvern ziemlich hochgradige Zertrümmerungen der Schädelknochen festgestellt. Für die Zerstörungen mit dem Armeerevolver gibt No. 41 der Zusammenstellung ein Beispiel ab.

In 8 Fällen durchquerte das Geschofs den Schädel, darunter handelte es sich 6 mal um Schläfenschüsse, deren Ausschufs auf der anderen Kopfseite, meist etwas höher und weiter nach hinten, 1 mal im Gehörgang lag. Bei der siebenten Verletzung ging der Schufs von der Mitte der Stirn zum Hinterhaupt, bei der achten vom Gaumen zur Pfeilnaht. Von den geheilten Schüssen waren 2 wegen der Hartnäckigkeit, mit welcher die Selbstmörder auf ihrer Absicht bestanden, bemerkenswert. Der eine schofs sich mit einem Taschenrevolver 1 mal in die Schläfe, 2 mal in die Herzgegend (40), der andere brachte sich ebenfalls mit einem kleinkalibrigen Revolver 4 Schüsse bei (Schläfe, Stirn, Unterkinngengegend, linke Unterrippengegend). Die Verletzungen waren sämtlich unbedeutend, bei der gröfsten hatte die Kugel den Mundboden und den linken Zungenrand durchdrungen und war im Oberkiefer stecken geblieben. Ein Schufs, der von Zivilpersonen im Streit abgegeben war, führte den Verlust eines Auges herbei (Operationsliste unter A 3, Saarbrücken). — 1 mal wurde der Schädel nach einem Schufs mit einem 6 mm-Revolver an der Einschufsöffnung aufgemeißelt und ein Ast der mittleren Hirnhautschlagader unterbunden. Tod 3 Stunden später (42).

b. Brust.

- 7 Selbstmorde,
- 6 Selbstmordversuche,
- 3 Unglücksfälle.

Eine Verletzung durch Unglücksfall verlief tödlich, 2 gingen in Heilung aus. Unter 8 im ganzen erzielten Heilungen blieb 5 mal die Dienstfähigkeit erhalten. — Nur ein Weichteilschufs kam aus 20 m Entfernung, alle anderen aus nächster Nähe. Eine Ausschufsöffnung war nur in 3 Fällen vorhanden, 2 mal bei Schüssen mit dem Armeerevolver, 1 mal mit dem Offizierrevolver M. 88. — Verletzungen des Herzens wurden 2 mal durch die Leichenöffnung nachgewiesen; die eine dieser Verletzungen, bei der zugleich die grofse Körperschlagader angerissen war, ist unter No. 46 der Zusammenstellung beschrieben. Klinisch interessant sind 2 Herzbeutelverletzungen, da der eine Verletzte trotz einer durch Leichenöffnung nachgewiesenen Verletzung des Herzbeutels und Herzmuskels noch 11 Tage

gelebt hatte (47), der andere sogar geheilt wurde, obgleich ein beträchtlicher Ergufs im Herzbeutel und ein geringerer im Brustfellraum eine Verletzung des Herzbeutels wahrscheinlich machte (43). 5 mal heilte das Geschofs in der Brusthöhle ein, 1 mal mit Erhaltung der Dienstfähigkeit (44). Bei einem geheilten Mann war die Dienstunbrauchbarkeit durch nachträglich festgestellte geistige Minderwertigkeit bedingt (45). Bemerkenswert ist ein durch Unglücksfall entstandener Schufs mit dem Offizierrevolver, der beide Brusthöhlen von links unten nach rechts oben durchquerte und die Körperschlagader verletzte (48).

c. Unterleib.

1 Selbstmord, bei welchem das Geschofs nach Verletzung von Leber, Magen, Milz, Zwerchfell und Lunge in der hinteren Brustwand stecken blieb (49).

d. Gliedmassen.

- 17 Unglücksfälle,
- 1 Überfall,
- 1 Fluchtversuch,
- 1 Selbstmordversuch.

Letzterer wurde von einem hochgradig nervösen Menschen begangen. Ein Oberarmschufs verursachte nur Hautabschürfungen. 14 weitere Verletzungen betrafen die oberen Gliedmassen, etwa gleich häufig Oberarm, Unterarm, Hand und Finger, 6 die unteren Gliedmassen. Die Verletzungen waren meist leicht und ohne besonderes Interesse, nur 2 führten zur Dienstunbrauchbarkeit. — Bemerkenswert ist eine Verletzung des Grundgliedes vom linken Mittelfinger bei einem Gefreiten vom 2. Großherzoglich Hessischen Feldartillerie-Regiment No. 61, da durch Röntgenbild nachgewiesen wurde, daß der Knochen durchschlagen war und 4 Querrisse hatte. Obgleich keine völlige Festigkeit erzielt war und eine Operation abgelehnt wurde, blieb die Dienstfähigkeit erhalten. In der Zusammenstellung ist ein Schufs aufgeführt (50), bei welchem ein Geschofs des Armeerevolvers einen Mann am Oberarm und einen dahinterstehenden an der Handwurzel verletzte. Der erstere wurde in 22 Tagen dienstfähig, der zweite invalide.

C. Verletzungen durch Zielmunition, Teschin- und Flobertgeschosse.

- 37 Unglücksfälle,
- 1 Selbstmordversuch.

11 Verletzungen des Kopfes, 4 der Brust, 1 des Bauches, 22 der Gliedmassen, und zwar 14 der oberen und 8 der unteren. Von den Kopfschüssen mit diesen Geschossen führte 1 zum Verlust eines Auges. Der Verletzte, ein Gefreiter vom 9. Badischen Infanterie-Regiment No. 170, hatte beim Abschiefsen eines Teschins nur das Ausdringen von Pulvergasen bemerkt. In der Heidelberger Augenklinik war zuerst vergeblich nach einem Geschofssplitter gesucht worden. Später wurde das Auge wegen heftiger Entzündung entfernt. — Schnell tödlich (5 Stunden) wirkte ein Schufs mit Zielmunition aus 30 m Entfernung bei einem Musketier des 7. Westpreussischen Infanterie-Regiments No. 155. Das Geschofs war dicht hinter der Mitte des linken Kopfnickers eingedrungen und war am hinteren Rande des rechten Kopfnickers unter der Haut zu fühlen. Die Todesursache liefs sich nicht sicher feststellen, da keine Leichenöffnung stattfinden konnte.

Von den Brustschüssen hatte nur 1 Teschinschufs bei einem Selbstmordversuch die Brusthöhle durchschlagen. Die Kugel fand sich unter der Rückenheit (51). Einen seinem Sitz nach sonderbaren Schufs hatte sich ein Ulan vom Ulanen-Regiment Hennigs von Treffenfeld (Altmärkischen) No. 16 mit Zielmunition beigebracht. Der Einschufs safs in der Mitte des Rückens vom männlichen Gliede. Das Geschofs war an der Unterseite nahe

der Wurzel zu fühlen und liefs sich durch Streichen aus der Einschufsöffnung herausdrängen. Heilung nach 9 Tagen. — Mit auffallend guter Beweglichkeit heilte eine, durch einen Schufs mit Zielmunition verursachte, Gelenkverletzung am Mittelglied des rechten Ringfingers bei einem Musketier vom 8. Ostpreussischen Infanterie-Regiment No. 45. — 3 Verletzungen an der Hand führten durch Sehnscheidenentzündung in der Hohlhand zur Invalidität.

Schufsverletzungen durch Platzpatronen.

A. Aus dem Gewehrlauf.

- 107 Unglücksfälle,
- 21 Selbstmorde,
- 9 Selbstmordversuche,
- 2 Selbstverstümmelungen.

a. Kopf und Hals.

- 28 Unglücksfälle,
- 14 Selbstmorde,
- 4 Selbstmordversuche.

Die Angaben über die Entfernung liegen, soweit die Schüsse nicht von Selbstmördern aus unmittelbarer Nähe abgegeben waren, meist zwischen $\frac{1}{2}$ bis 1 m, in je einem Falle waren es 2 und 3 m. Von den Kopfverletzungen durch Unglücksfall starben 4. Einem Kürassier vom Leib-Kürassier-Regiment Grofses Kurfürst (1. Schlesischen) No. 1, dessen Karabiner sich beim Tragen über den Korridor entladen hatte, ging der Schufs in den Mund, der Tod trat durch Zerreiſung der Halsschlagadern sofort ein. — Ein Schufs an der Grenze zwischen dem linken Scheitel- und dem Hinterhauptsbein bei einem Musketier vom Infanterie-Regiment Herwarth von Bittenfeld (1. Westfälischen) No. 13 verursachte unregelmäßige Sprünge in den Schädelknochen bis an das Hinterhauptsloch und Zertrümmerung des Gehirns. — Ein Schufs, der durch Unvorsichtigkeit eines Kameraden einen Mann desselben Regiments getroffen hatte, verursachte im linken Scheitelbein eine markstückgroſe, fast kreisrunde Öffnung. — Bei einem Dragoner des Dragoner-Regiments von Arnim (2. Brandenburgischen) No. 12 wurde vergeblich der Versuch gemacht, eine etwaige Blutung durch Eröffnung der Schädelhöhle zu stillen (siehe Operationsliste A 1, Gnesen). Bei 2 Geheilten, von den durch Unglücksfälle Verletzten, blieb die Dienstfähigkeit nicht erhalten. Darunter war ein von seinem Hintermann in der Schützenlinie angeschossener Musketier vom Infanterie-Regiment Kaiser Friedrich, König von Preußen (7. Württembergischen) No. 125, bei dem nach einem Schufs gegen das linke Ohr 3 Tage lang Bewußtlosigkeit und Temperaturen bis 38,9° bestanden hatten. Nach 90 Tagen mußte er mit Herabsetzung des Gehörs, besonders auf dem rechten Ohr, als invalide entlassen werden. Die übrigen Verletzungen durch Unglücksfälle waren unbedeutend.

Unter den von Selbstmördern abgegebenen Platzpatronenschüssen in den Kopf bietet der unter No. 56 der Zusammenstellung aufgeführte Schufs gegen die rechte Wange, abgesehen von den an sich sehr erheblichen Zerstörungen, die auffällige Erscheinung dar, dafs sich trotz des Zerschellens des Holzgeschosses in der Brücke, wo sich 11 Splitter desselben fanden, eine Ausschufsöffnung von 2 cm Durchmesser (zweifennigstückgrofs) in der gegenüberliegenden Schläfe fand.

Bei allen Schüssen in den Mund, von denen keiner eine Ausschufsöffnung zeigte, war die Zerstörung eine sehr hochgradige. Umsomehr Interesse verdienen 4 Heilungen (52 bis 55). Mit Gaumenprothese oder Zahnersatz konnte in mehreren Fällen ein befriedigender Zustand erzielt werden. 5 andere Mundschüsse endeten durch Blutungen, durch Entzündung von der grofsen Mund-Rachenwunde aus oder durch die Schwere der Verletzung, tödlich (57 bis 61).

St.-A. Wegner-Cassel, rät, dafs bei allen derartigen Schüssen prinzipiell der vorbeugende Luftröhrenschnitt sofort gemacht und dafs ein Schlundrohr durch einen Nasengang eingelegt werde. So könne man erreichen, dafs 1. die Atmung frei und Emphysem vermieden werde, dafs 2. eine feste Tamponade zur Stillung der Blutung und zur Verhinderung des Einfließens von Blut in die Lunge ausführbar sei. — Der unter No. 57 der Zusammenstellung aufgeführte Schufs zeigt, dafs die Gefahr einer Blutung trotz Tamponade noch sehr lange (11 Tage) fortbesteht.

b. Brust.

- 4 Unglücksfälle,
- 5 Selbstmorde,
- 2 Selbstmordversuche.

Sämtliche Schüsse kamen aus nächster Nähe. Bei den Unglücksfällen handelte es sich um unbedeutende Weichteilverletzungen. — Bei einem Grenadier des 2. Badischen Grenadier-Regiments Kaiser Wilhelm I. No. 110 blieben nach Vereiterung eines Blutergusses in der linken Achselhöhle Lähmungserscheinungen am linken Arm und an der Hand zurück. Er wurde dienstunfähig; ebenso ein Kürassier vom Kürassier-Regiment von Seydlitz (Magdeburgischen) No. 7, bei dem der Brustraum vom siebenten Zwischenrippenraum aus eröffnet war. — Narbendruck auf den grofsen mittleren Armnerven führte bei einem Selbstmordversuch zur Dienstunbrauchbarkeit (62). — Der Tod trat bei den Selbstmördern stets nach kurzer Zeit ein. Es handelte sich meist um starke, an explosionsartige Wirkungen erinnernde Zerstörungen. Einige Male war das Herz zerrissen (63). 1 mal führte Blutung aus der Lungenwurzel zum Tode (64).

c. Unterleib.

- 4 Unglücksfälle,
- 2 Selbstmorde,
- 1 Selbstmordversuch.

Von den Unglücksfällen ging 1 Weichteilschufs in Heilung mit Erhaltung der Dienstfähigkeit aus. Bemerkenswert ist die andere, beim Gewehrreinigen entstandene, tödlich verlaufene Verletzung (65), bei welcher ein Leberriſs fast durch die ganze Dicke des Organs entstanden war, obgleich die Bauchhöhle nicht eröffnet war und die Platzpatrone kein Holzgeschofs gehabt hatte.

Eine Leberverletzung, die bei dem Selbstmordversuch angenommen werden mußte, weil bei einem Bauchschnitt (Operationsliste unter B 2, Halberstadt) ein abgetrenntes Stückchen Leber gefunden wurde, heilte ohne besondere Versorgung der Leberwunde.

Von den beiden Selbstmördern lebte ein Dragoner vom Magdeburgischen Dragoner-Regiment No. 6 noch 15 Stunden mit vollständiger Zertrümmerung des linken Leberlappens. In der Bauchhöhle fanden sich 3500 ccm Blut.

d. Gliedmaßen.

- 71 Unglücksfälle,
- 2 Selbstmordversuche,
- 2 Selbstverstümmelungen.

57 Verletzungen der oberen Gliedmaßen (14 am Oberarm, 3 am Unterarm, 40 an der Hand und den Fingern); 18 der unteren Gliedmaßen (8 am Oberschenkel, 9 am Unterschenkel, 1 am Fuß). Eine Verletzung des Unterschenkels endete tödlich durch Wundstarrkrampf (67). 27 mal trat bei der Heilung Dienstunbrauchbarkeit ein, davon 22 mal wegen Hand- und Fingerverletzung, und zwar fast ausnahmslos durch Verlust oder Absetzung von einzelnen Gliedteilen oder ganzen Fingern wegen zu hochgradiger Knochenzerstörung. In einzelnen Fällen waren die Finger mit steifen Gelenken geheilt. Bei den beiden Selbstmordversuchen (2 Schüssen in den Oberarm) blieb die Dienstfähigkeit erhalten.

Von 2 zur Selbstverstümmelung abgegebenen Schüssen führte 1 Schuss durch das Mittelglied des rechten Zeigefingers zur Dienstunbrauchbarkeit. Bei 1 Mann mit einem Schuss durch die linke Hohlhand wurde die Dienstfähigkeit erhalten. — Bemerkenswert ist eine Schussverletzung mit Eröffnung des Ellenbogengelenks und Bruch des Oberarms (66), die mit guter Beweglichkeit zur Heilung kam (Unglücksfall).

B. Durch freie Explosion

entstanden 16 Verletzungen, sämtlich leichter Art, meist an den Händen durch Spielen oder Schlag auf Platzpatronenhülsen. Die Dienstfähigkeit blieb stets erhalten, auch bei einem Musketier des 5. Westpreussischen Infanterie-Regiments No. 148, bei welchem durch drei kleine narbige Trübungen auf der Hornhaut des rechten Auges die Sehschärfe auf $\frac{6}{10}$ herabgesetzt wurde.

Verletzungen durch Schrotschüsse.

6 Unglücksfälle.

3 leichte Verletzungen heilten mit Erhaltung der Dienstfähigkeit. Ein Schuss aus einem Jagdgewehr in den Unterleib endete mit Zerreißung des Querdarms und der Milz $7\frac{1}{2}$ Stunden nach der Verletzung während der Operation tödlich (siehe Operationsliste B 2, Bromberg). — Ein Musketier vom Infanterie-Regiment Prinz Moritz von Anhalt-Dessau (5. Pommerschen) No. 42 wurde wegen Versteifung des rechten Zeigefingers dienstunbrauchbar; einem Vizefeldwebel des Eisenbahn-Regiments No. 3 mußte das verletzte und entzündete linke Auge aus Besorgnis der Miterkrankung des anderen Auges entfernt werden (siehe Operationsliste A 3).¹⁾

Wasserschüsse.

3 Selbstmorde.

1 Schuss in den Mund, 2 in die Brust. Bei allen drei Schüssen war das Gewehr mit Platzpatronen geladen und der Lauf mit Wasser gefüllt. Die Leichenöffnung wurde nicht gestattet. Bei dem Mundschuss war der Schädelgrund und das Gehirn zertrümmert; weitere Angaben fehlen. Bei den beiden Brustschüssen (Musketier R. vom Infanterie-Regiment Generalfeldmarschall Prinz Friedrich Karl von Preußen [8. Brandenburgischen] No. 64 und Soldat S. vom 12. Sächsischen Infanterie-Regiment No. 177) war der Einschuss etwas nach unten und innen von der linken Brustwarze, rund, 2 : 1 und 0,75 : 1 cm im Durchmesser. Ausschuss fehlte. Der Tod trat in allen Fällen sofort ein.

Verletzungen durch Gewehrscüsse mit anderen Geschossen.

4 Selbstmorde,

1 Unglücksfall.

Bei 2 Mundschüssen und 1 Schuss in das Brustbein war auf eine Platzpatrone statt des Holzgeschosses ein scharfes Geschoss gesetzt. Bei dem einen dieser Mundschüsse ging das Geschoss zum Hinterhaupt hinaus (68), der andere, ein Karabinerschuss, wies bei einem Einschuss von 4 cm Durchmesser einen Ausschuss von 1 cm Durchmesser in der Pfeilnaht auf (69). Der Brustschuss (71) ist durch die Art des Ein- und Ausschusses wie durch seinen klinischen Verlauf bemerkenswert. Die auffallend kleine Ein- und Ausschussöffnung charakterisieren wohl die Verletzung infolge der geringen Ladung als gleichartig einer Schussverletzung aus größerer Entfernung. Klinisch interessant ist eine langsam weitergreifende Lähmung, die wohl als Zeichen einer sich allmählich steigenden Druckwirkung auf das Rückenmark anzusprechen ist, ferner die bei Hämorthorax nicht selten beobachtete frühe Temperatursteigerung und die enorme Pulsbeschleunigung.

¹⁾ Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1903, Heft No. 4, S. 218. St.-A. Nicolai.

2 scharfe Schüsse wirkten durch den nicht abgenommenen, von der Kugel mitgerissenen Mündungsdeckel stark zerstörend. Im einen Falle führte der von einem Selbstmörder abgegebene Schuss in das Kinn den Tod sofort herbei (70); im anderen konnte der bei einem Unglücksfall aus 2 m Entfernung getroffene rechte Oberarm erhalten werden, da im wesentlichen nur Weichteile verletzt waren (72).

Verletzungen durch Explosion von Patronen bei Ladehemmung und durch Pulvergase.

Von 28 Unglücksfällen betrafen 13 den Kopf, 15 die oberen Gliedmaßen. 9 Binde- und leichte Hornhautverletzungen heilten mit Erhaltung der Dienstfähigkeit und voller Sehschärfe, davon eine mit leichten randständigen Hornhauttrübungen (Unteroffizier S. vom 8. Ostpreussischen Infanterie-Regiment No. 45). Ein Musketier vom 4. Oberschlesischen Infanterie-Regiment No. 63 wurde wegen Herabsetzung der Sehschärfe durch Hornhauttrübungen dienstunbrauchbar. — Die übrigen 4 Verletzungen betrafen oberflächliche Wunden in der Umgebung des Auges. Von den Verletzungen der oberen Gliedmaßen waren 12 leicht. 2 Gelenkeröffnungen am rechten Ringfinger heilten mit Erhaltung der Dienstfähigkeit.

Ein Musketier, dem Hülsenteile in die rechte Hohlhand eingedrungen waren, wurde invalide.

Verletzungen durch Platzen von Gewehren, durch Kanonenschläge, Zündladungen und dergleichen.

25 Unglücksfälle, 2 mit tödlichem Ausgang, 13 Heilungen mit Erhaltung der Dienstfähigkeit, 10 mit Dienstunbrauchbarkeit. Von den Verletzungen entstanden 18 durch Explosion von Zündladungen, Kanonenschlägen, Schlagröhren, Funkenzündern, Gewehrscschlägen, 7 durch Platzen von Jagdgewehren bzw. einer Flobertbüchse, in der ein Geschoss eingeklinkt war. — 8 Verletzungen betrafen das Gesicht, 1 die Brust, 2 den Unterleib, 13 die oberen, 1 die oberen und unteren Gliedmaßen. 1 Mann blieb trotz zahlreicher Verletzungen durch die Splitter eines bei einer Spielerei explodierten Artilleriezünders (wobei ihm der Bauch aufgerissen, ein Auge und mehrere Fingerglieder zerstört wurden) nach längerem Krankenlager am Leben (73). — 1 Unteroffizier des Feldartillerie-Regiments Generalfeldzeugmeister (1. Brandenburgischen) No. 3 wurde durch Glaskörpertrübungen auf einem Auge fast völlig blind. Die übrigen Kopfverletzungen waren leicht. Die Brustverletzung, bei der der Auswurf mehrere Tage lang leicht blutig gefärbt gewesen war, ging in Heilung über.

An den Folgen der Explosion eines vom Schießplatz Jüterbog mitgebrachten Artilleriezünders starben 2 Bauchverletzte (74 und 75) nach 15 und 17 Stunden, nachdem bei ersterem eine große Rifswunde, welche den Bauch eröffnete, sofort versorgt, bei dem andern am nächsten Morgen der Bauchschnitt gemacht worden war (siehe Operationsliste B. 2, Neu-Ruppin). — Die Dienstunbrauchbarkeit bei 7 Verletzungen an den oberen Gliedmaßen war durch Fingerversteifung oder Verlust von Fingergliedern bedingt. 6 heilten mit Erhaltung der Dienstfähigkeit.

Eingeheilte Geschosse.

Eine durch Röntgenstrahlen entdeckte Chassepotkugel aus dem Feldzuge 1870/71 wurde aus der Rückenmuskulatur entfernt, wodurch der sehr behindert gewesene Gang des Mannes gebessert und seine Schmerzen beseitigt wurden (76 und Operationsliste unter B. 6, Karlsruhe). — Bei 1 in China in einem Gefecht an der großen Mauer von einem Infanteriegeschoss, wahrscheinlich aus 20 m Entfernung in die Kniekehle getroffenen Unteroffizier, war das Geschoss in der Oberschenkelmuskulatur eingeheilt (Berlin).

Zusammenstellung der im Berichtsjahre 1902/03 vorgekommenen wichtigeren Schufsverletzungen (einschl. Selbstmorde).

I. Schufsverletzungen durch Granaten, Schrapnells u. s. w.

Ausgang in Heilung.

1. Kanonier D. vom Masurischen Feldartillerie-Regiment No. 73. 3. Juli 1903. Unvorsichtiges Hantieren mit einem nicht explodierten Schrapnell. — Gesicht, Augen, Ohren, ein Teil des Halses und beide Hände verbrannt. Ohne erkennbare Einschufsöffnung über dem rechten Auge und an der rechten Seite des Kinns je eine Schrapnellkugel fühlbar. Beide wurden entfernt. Unmittelbar nach der Verletzung Sehvermögen links völlig, rechts bis auf schwachen Lichtschimmer erloschen. An beiden Augäpfeln trat Entzündung ein, die zu Schrumpfung der Augäpfel und zu völliger Erblindung führten. Dienstunbrauchbar.

2. Kanonier B. vom Lehrregiment der Feldartillerie-Schiefschule. 29. August 1902. Unglücksfall. Explosion einer 3,7 cm-Granate, an welcher sich B. gegen das Verbot zu schaffen machte. 3 cm lange Wunde mit zerfetzten Rändern in der rechten Brustwarzenlinie am oberen Rand der 7. Rippe. Mäsig starke Blutung, Einsaugen von Luft bei der Atmung, keine Zeichen einer Lungenverletzung. — Temperatursteigerung von kurzer Dauer. Dienstfähig.

II. Schufsverletzungen durch scharfe Patronen.

A. Gewehr- und Karabinerschüsse.

a. Kopf- und Halschüsse.

Ausgang in Heilung.

3. Trainsoldat J. vom Ostasiatischen Expeditionskorps. Auf der Heimreise Karabinerschufs in den Mund in selbstmörderischer Absicht. Schufskanal durch Kinn, Zunge, Gaumen, an der linken Nasenseite heraus. Verlauf: Als J. dem Garnisonlazarett I Berlin zuzug, fehlte vom Mittelstück des Unterkiefers ein Stück von etwa 4 cm; ein Knochenstück, die ganze Innenfläche des linken Unterkiefers darstellend, liefs sich leicht abheben. Die linke Hälfte der Zunge war mit der Nachbarschaft fest verwachsen. Schlucken nur bei stark hintenübergelegtem Kopfe möglich. Reinigung der Wunde. Beweglichkeit der Zunge mechanisch gefördert. Bei der Entlassung war das Schlucken wesentlich gebessert. — Die Sprache war leidlich verständlich. — Dienstunbrauchbar.

4. Sergeant G. vom 2. Thüringischen Infanterie-Regiment No. 32. 22. Dezember 1902. Selbstmordversuch. Gewehr M. 88 Einschufs rundlich, 8 mm Durchmesser hinter dem rechten hinteren Schildknorpelrande. Ausschufs im Nacken etwas höher als der Einschufs, 4 cm rechts von der Mittellinie. Bewusstlosigkeit und Herzschwäche. — Vom 3. bis 5. Tage Sprachstörungen und geringe Lähmungserscheinungen am linken Arm und Bein (cerebrale Erscheinungen). Dauernde Lähmung und Muskelschwund der rechten Schulter (periphere Nervenverletzung). — Dienstunbrauchbar.

Ausgang in Tod.

5. Musketier B. vom Infanterie-Regiment Markgraf Ludwig Wilhelm (3. Badischen) No. 111. 26. März 1903. Selbstmord. Gewehr M. 88. Einschufs in der Mitte der Nasenwurzel, 2:1 cm groß, fast rechteckig. Ausschufs an der Spitze des Hinterhauptbeins rund, 2 cm Durchmesser. — Splitterbruch des Stirnbeins, Knochenspalt über den Scheitel weg. — Leichen-

öffnung: Beide Großhirnhälften fast völlig voneinander getrennt, Balken zertrümmert, Kleinhirn erhalten.

6. Unteroffizier K. vom Eisenbahn-Regiment No. 2. 28. Mai 1903. Selbstmord. Das Gewehr war mit einem Ofenhaken abgezogen und lehnte im Arm der etwas aus dem Bett heraushängenden Leiche. Gewehr M. 88. Tod sofort. Einschufs 18:6 cm grosse Wunde auf dem linken Stirn- und Seitenwandbein, in welcher eine 9:6 cm große Knochenzertrümmerung sichtbar war. Ausschufs 1:2 cm großes, sternförmiges Knochenloch im rechten Seitenwandbein. Leichenbefund: Hirnschale und Schädelgrund in mehrere von der Kopfschwarte und den Weichteilen zusammengehaltene Knochenstücke zersprengt. Großhirn zum Teil herausgeschleudert, zum Teil zermalmt. Kleinhirn unverletzt. Brücke abgerissen.

7. Musketier K. vom 5. Lothringischen Infanterie-Regiment No. 144. 4. Mai 1903. Selbstmord. Gewehr M. 88. Tod sofort. Einschufs in der Stirngegend, 9,5:6 cm groß, mit zackigen geschwärzten Rändern. Ausschufs dicht unter dem Hinterhauptshöcker, rechts, gezackt, 1 cm im Durchmesser. Leichenbefund: Im Schädeldach mehrere lange Risse. Dach der Augenhöhlen, Siebbein und Keilbeinkörper zertrümmert. Untere Hälfte des Stirnlappens, Riechkolben, Sehnervenkreuzung, Brücke und verlängertes Mark zerrissen.

8. Kürassier N. vom Kürassier-Regiment Kaiser Nicolaus I. von Rußland (Brandenburgischen) No. 6. 13. Januar 1903. Selbstmord mit einem Jagdgewehr. Tod sofort. Einschufs in der rechten Stirngegend, rundlich, 2 cm im Durchmesser. Ausschufs links vom Scheitel Knochenspalt von 17 cm Länge und 5 cm Breite. Leichenbefund: Von der rechten Hälfte des Schädeldachs war eine Knochenplatte von 19 cm Länge und 9 cm Breite, von der linken eine solche von 17:10 cm abgesprengt. 4 cm oberhalb der linken Augenbraue war ein Knochenstück von 3 cm Höhe und 6 cm Breite aus dem Zusammenhang gelöst. Vom rechten Großhirn war der Stirn-, vom linken der Stirn- und Scheitellappen zermalmt.

9. Unteroffizier H. vom 2. Kurhessischen Infanterie-Regiment No. 82. 29. Januar 1903. Selbstmord. Infanteriegewehr M. 88. Tod sofort. Einschufs runde Öffnung am rechten inneren Augenwinkel, in dem einen Winkel einer 7 cm breit klaffenden Wunde, die von hier bis zum linken äußeren Augenwinkel und von diesem bis fast an den linken Stirnhöcker reichte. Das linke Auge fehlte, die innere Hälfte des rechten war zerrissen. Ausschufs 2 cm unterhalb des Hinterhauptshöckers, 2 cm Durchmesser. Leichenbefund: Im Stirnbein eine 10 cm lange, 7 cm breite, vom rechten äußeren Augenwinkel bis nahe an den linken Stirnhöcker reichende Knochenöffnung. Das linke Auge und die innere Hälfte des rechten fehlten, Schädel an der Stirn und in der vorderen Schädelgrube bis über den Türkensattel hinaus zersplittert. Hirnstamm und Kleinhirn fast völlig in Brei verwandelt. Unter dem Hinterhauptshöcker eine runde, 2 cm im Durchmesser betragende Öffnung, von der ein Spalt an der Pfeilnaht entlang nach vorn zog und sich mit einem von der Einschufsöffnung kommenden verband.

10. Musketier L. vom Infanterie-Regiment von der Marwitz (8. Pommerschen) No. 61. 24. Juli 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Tod nach 30 Minuten. Einschufs in das linke Auge, das, völlig zerrissen, ein Loch von 3:2,5 cm darstellte. Ausschufs an der Grenze des linken Stirn- und Scheitelbeins, 6 cm lange, 2 cm breite zerrissene Wunde. Linke Augen- und Stirngegend eingefallen. Leichenöffnung: Linkes Auge zerstört. Von einer großen Öffnung im linken Augenhöhrendach gingen zahlreiche Sprünge in die vordere Schädel-

grube, nach den Stirnbeinen und in die mittlere Schädelgrube. Ein Spalt ging weiter durch die Mitte der linken Felsenbeinpyramide. An der Ausschufsöffnung ein ovales, etwa 2 cm neben der Pfeilnaht längs gestelltes Loch von ungefähr 2 : 6 cm GröÙe an der Grenze zwischen Stirn und Scheitelbein, um welches herum 4 gröÙere Knochensplitter durch Knochensprünge abgeteilt waren. 1 Sprung ging bis an die Hinterhauptnaht. Der linke Stirnlappen fast ganz, der rechte in seinem unteren und vorderen Teil zertrümmert. Hirnstock zum Teil zerrissen.

11. Musketier G. vom Königs-Infanterie-Regiment (6. Lothringischen) No. 145. 30. Juni 1903. Selbstmord. Scharfer Schufs aus Gewehr M. 88. Tod sofort. Einschufs in der rechten Schläfe, zwischen dem Ohr und dem äußeren Augenwinkel, rund, 7 mm Durchmesser, Rand gewulstet. Ausschufs links, 3 cm oberhalb vom Ohrmuschelrande, rund, 7 mm Durchmesser, glatter Rand. Leichenbefund: Schädeldach um den Ein- und Ausschufs herum in 18 gröÙere und kleinere Stücke zerbrochen, nach deren Forträumung eine Lücke entstand, die die Stirn- und beide Schläfengegenden umfaßte. Außerdem war das vordere untere Viertel des rechten Scheitelbeins zertrümmert, durch dessen hinteren Rand ein breiter Spalt bis zur Pfeilnaht verlief. Vom linken Scheitelbein war nur hinten oben ein schmaler Rest in Zusammenhang mit dem Rest des Schädeldachs. Am Schädelgrunde war das Keilbein und beide Augenhöhlen-dächer zerbrochen. Außerdem war rechts das Felsenbein, der obere Teil des Oberkieferbeins und das Jochbein zertrümmert. Beide Stirnlappen des Gehirns, ein großer Teil der Schläfenlappen und die Brücke waren in Brei verwandelt.

12. Musketier K. vom 1. Hannoverschen Infanterie-Regiment No. 74. 13. März 1903. Selbstmord. Gewehr M. 88. Tod 1 Stunde nach der Tat. Einschufs in der Mitte der rechten Schläfe unregelmäßig, 2 : 5 cm. Ausschufs an der Stirn, 1 cm links von der Mittellinie, dicht unter der Haargrenze, viereckiges, 1,5 : 2 cm großes Loch; mit unregelmäßigen, zerfetzten Rändern. Leichenbefund: Kranz- und Pfeilnaht gesprengt. Im rechten Seitenwandbein ein am vorderen, unteren Winkel beginnender, dem Schuppenrand gleichlaufender, 12 cm langer Sprung. Das Stirnbein war durch radiär vom Ausschufsloch ausgehende Sprünge in 8 Stücke zersprengt. Im rechten Stirnlappen eine kinderfaustgroÙe Höhle mit zahlreichen kleinen Knochenstücken.

13. Unteroffizier Q. vom Infanterie-Regiment Graf Tauentzien (3. Brandenburgischen) No. 20. 15. Januar 1903. Selbstmord. Gewehr M. 88. Mundschufs. Einschufs harter Gaumen zur Hälfte zerstört. Ausschufs in einer 17 : 10 cm großen Wunde, welche die ganze linke Gesichtshälfte einnahm. Den Blutspuren nach hatte sich der Verletzte noch einige Schritte bis zur nächsten Ecke fortgeschleppt. Leichenbefund: Die ganze linke Oberkieferhälfte zertrümmert; in der linken Stirnbeinhälfte ein Loch von 7 : 5 cm GröÙe, von welchem Sprünge von 8 bis 10 cm Länge in das Stirn- und Scheitelbein gingen. Vom linken Auge nichts zu finden, der linke Stirnlappen in GröÙe eines Hühnereies zertrümmert.

14. Musketier K. vom Infanterie-Regiment Graf Kirchbach (1. Niederschlesischen) No. 46. 30. Juni 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 98. Mundschufs. Einschufs im Gaumen, links längs-oval 2 : 0,5 cm. Ausschufs im Genick in Höhe des 2. Halswirbels, Loch von 6 mm Durchmesser. Tod sofort. Einrisse an beiden Mundwinkeln (links 5, rechts 3 cm lang). Zunge zerfetzt. Rachengebilde von Pulverschleim überzogen. Linke Siebbein- und Oberkieferhöhlen mit flüssigem Blut gefüllt. Linker Oberkiefer stark zersplittert. Linke Hälfte der beiden obersten Halswirbel mehrfach gebrochen, die verlagerten Bruchstücke verengten den Rückenmarkskanal, doch zeigte das Rückenmark auf Durchschnitten keine sichtbaren Veränderungen.

15. Musketier S. vom Infanterie-Regiment von der Goltz (7. Pommerschen) No. 54. 17. August 1903. Gewehr M. 88. Unglücksfall. Losgehen eines aus Fahrlässigkeit nicht entladenen Dienstgewehrs in unmittelbarer Nähe. Tod nach einigen Minuten. Einschufs 1 cm links von der Mitte des Kinns, 5,5 : 4 mm mit zerrissenen Rändern. Ausschufs im Genick, 2 cm unterhalb der Haargrenze, 2 cm rechts von der Mittellinie. 6 mm Durchmesser. Leichenbefund: Mittlerer Teil des Unterkiefers zertrümmert. An der Unterfläche der Zunge 9 cm lange Schufsrinne. Der Schufskanal ging weiter zwischen der unverletzten rechten Halsschlagader und dem Schlundkopf hindurch. Die seitliche Ausbauchung des letzteren zeigte oberhalb des unverletzten Schildknorpels eine 3 cm lange Durchtrennung der Schleimhaut. Querfortsatz des 4. Halswirbels abgesprengt, Rückenmarkshöhle eröffnet; Rückenmark vom 4. Halswirbel bis zur Endverästelung mit geronnenem Blut bedeckt; an Querschnitten nichts Auffälliges bemerkbar.

b. Brustschüsse.

Ausgang in Heilung.

16. Unteroffizier L. vom 10. Rheinischen Infanterie-Regiment No. 161. 23. März 1903. Selbstmordversuch mit Gewehr M. 88. Einschufs oval 1 : 1,5 cm, im linken 2. Zwischenrippenraum, Brustwarzenlinie. Ausschufs fünfpennigstückgroÙ, rund, unter der linken Schulterblattgräte, etwa 6 cm vom äußeren Schulterblattwinkel. Angstgefühl, schmerzhaftes Atmung, kein Bluthusten. Lebhaftes Blutung aus der Ausschufsöffnung, Luftbrust (Pneumothorax) und Hautemphysem. Heilung ohne Störung. Nach 23 Tagen dienstfähig entlassen. 5 Monate später Muskelschwund an der linken Hand und Schulter. Dienstunbrauchbar.

17. Unteroffizier P. vom 3. Hanseatischen Infanterie-Regiment No. 162. 20. Juli 1903. Selbstmordversuch mit Gewehr M. 88. Einschufs im linken 7. Zwischenrippenraum nach außen von der Brustwarzenlinie, rund, 7 mm Durchmesser. Ausschufs in der hinteren linken Achsellinie in Höhe der 9. Rippe, 7 mm Durchmesser, rund. Schufskanal: 7. Rippe am Einschufs zersplittert, 8. Rippe am Ausschufs durchlöchert. Starke Atemnot, Hautemphysem am Ein- und Ausschufs, kein Bluthusten. Bluterguß im linken Brustfellsack. Heilung. Schwartenbildung im linken Brustfellraum. Verbiegung der Wirbelsäule nach rechts. Dienstunbrauchbar.

18. Musketier H. vom 3. Oberschlesischen Infanterie-Regiment No. 62. 21. Oktober 1902. Unglücksfall. Infanteriegewehr M. 88. Der Schufs kam aus dem nebenstehenden Bett eines Kameraden, der sein geladenes Gewehr bei sich hatte. Ehe das Geschofs in den Körper eindrang, hatte es zwei Strohsäcke und ein hölzernes Fußbrett durchbohrt, aus einer Eisenschiene eine runde Rinne herausgeschlagen und war durch die Kopfmattatze hindurchgegangen. Einschufs auf dem linken Schulterblatt, in Höhe der 5. Rippe, handbreit einwärts von der äußeren Achsellinie, Wunde von 4 : 3 cm, in deren Tiefe kleine Knochensplitter vom Schulterblatt und Rofshaare sichtbar waren. Kein Ausschufs. Geschofs vorn links, in Höhe der 9. Rippe, dicht neben der vorderen Achsellinie unter der Haut fühlbar. In den ersten Tagen Husten und Blutauswurf, erhebliche Temperatursteigerung. Heilung verzögert, da sich aus dem Schufskanal nach und nach zahlreiche Rofshaare ausstießen. Anfangs dienstfähig, später (nach 8 Monaten) als invalide entlassen.

19. Unteroffizier A. vom Infanterie-Regiment Herwarth von Bittenfeld (1. Westfälischen) No. 13. 14. November 1902. Selbstmordversuch mit Gewehr M. 88. Einschufs in der linken Rippenknorpelgegend in der Mitte zwischen Brustbein und Brustwarzenlinie dicht unterhalb der 7. Rippe, rund, 0,5 cm

Durchmesser. Ausschufs in der hinteren linken Achsellinie in Höhe der 11. Rippe, von gleicher Gröfse. Schufskanal nur durch die Brustwand. Aus dem unteren Rande des Knorpels der 7. Rippe ein etwa erbsengroßes Stück ausgeschlagen, 8. Rippe zersplittert. Wegen vorhandener Dämpfung in der linken Oberbauchgegend Bauchschnitt (s. Operationsliste unter B 2). Bauchfell durch den Schufs nicht eröffnet. An der Vorderfläche des Dickdarms pfenniggroße Blutunterlaufung. Naht. Heilung. Dienstunbrauchbar.

Ausgang in Tod.

20. Füsilier G. vom Grenadier-Regiment Prinz Karl von Preußen (2. Brandenburgischen) No. 12. 24. Mai 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Einschufs 5 cm oberhalb der linken Brustwarze, rund, 1 cm Durchmesser. Ausschufs im 6. Zwischenrippenraum rechts neben der Wirbelsäule; wie Einschufs. Leichenbefund: Zerreißung des linken oberen Lungenlappens, der linken Lungenschlagader und zweier Äste derselben. Im linken Brustfellsack etwa 1 l Blut.

21. Musketier M. vom 4. Württembergischen Infanterie-Regiment No. 122, Kaiser Franz Joseph von Österreich, König von Ungarn. 11. Mai 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Tod sofort. Einschufs in der Mitte des Brustbeins in Höhe des 3. Zwischenrippenraums, kreisrund, 6 mm Durchmesser. Ausschufs 0,5 cm links vom 5. Brustwirbeldornfortsatz, kreisrund, 8 mm Durchmesser. Leichenbefund: Im Brustbein kreisrundes Loch von 7,5 mm Durchmesser. Im obersten Teil des Herzbeutels ein schlitzförmiges Loch. Im Herzbeutel 300 g geronnenes Blut. Große Körperschlagader 1,5 cm über der Klappe bis auf eine schmale Brücke zerrissen. In der Hinterfläche des Herzbeutels pfennigstückgroße, rundliche Öffnung. Im 5. Brustwirbel 5 mm links von der Mitte ein kreisrundes Loch von 7,5 mm Durchmesser.

22. Pionier H. vom Westpreussischen Pionier-Bataillon Nr. 17. 21. August 1903. Schufs aus 22 m Entfernung von einem wahrscheinlich geisteskranken Kameraden mit Gewehr M. 88 abgegeben. Einschufs in der Höhe der 4. Rippe rechts, rund, 1 cm im Durchmesser, ziemlich glattrandig. Ausschufs oberhalb der linken Gesäßbacke, 1,5 cm im Durchmesser mit zerrissenen Rändern. Leichenbefund: Schufsbruch der 5. Rippe; blutige Durchtrennung des Mittelfells und des inneren Zipfels vom Mittellappen der rechten Lunge. In beiden Brustfellräumen flüssiges Blut. Durchlöcherung des Zwerchfells; an der Leber lochförmiger Einschufs auf der Kuppe; Zertrümmerungshöhle im linken Leberlappen; strahlenförmiger Ausschufs an der Unterfläche der Leber. Durchlöcherung des Gekröses, des linken Lendenmuskels und der linken Darmbeinschaukel (Splitterbruch), großer Bluterguß in der Bauchhöhle.

23. Sanitätsunteroffizier C. vom 1. Oberelsässischen Infanterie-Regiment No. 167. 25. April 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Sofortiger Tod. Einschufs im 3. linken Zwischenrippenraum, etwas nach innen von der Brustwarzenlinie, rund, 1 cm Durchmesser. Ausschufs gleich großes Loch rechts neben der Wirbelsäule, Höhe zwischen 3. und 4. Dornfortsatz. Leichenbefund: Linker Vorhof, große Körperschlagader und linke Lunge zerrissen. Unter dem Gelenk der 4. Rippe Loch im Rippenfell, von dem ein Kanal schräg einwärts zur Ausschufsöffnung führte. Dornfortsatz des 4. Rückenwirbels aus dem Wirbelbogen herausgebrochen. Bluterguß im Wirbelkanal.

24. Sergeant G. vom 6. Thüringischen Infanterie-Regiment No. 95. 19. September 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Einschufs im linken 4. Zwischenrippenraum, rund, 0,5 cm Durchmesser. Ausschufs rechts neben der Wirbelsäule im 4. Zwischenrippenraum. Leichenbefund: Ein- und Ausschufs in Zwischenrippenräumen ohne Knochenverletzung. — Herz

bis auf die linke Vorkammer zerstört. Keine Verletzung der Lungen.

25. Musketier M. vom Infanterie-Regiment Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz (6. Ostpreussischen) No. 43. 4. Mai 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Sofortiger Tod. Einschufs in Höhe der linken 5. Rippe, 3 cm innerhalb der Brustwarzenlinie, rundlich, 0,5 cm im Durchmesser. Ausschufs von gleicher Gröfse, 10 cm links von der Wirbelsäule in Höhe des 7. Brustwirbels. Leichenbefund: Aus der 5. Rippe fehlen 3 cm. Im Herzbeutel 60 ccm, im linken Brustfellsack 2,5 l Blut. Linke Herzkammer an der Spitze 4 cm breit eröffnet. Das herausgeschlagene Stück der 5. Rippe fest in die Spitze des zungenförmigen Lungenlappens eingeklebt. Kleinfingerstarker Schufskanal im Unterlappen der linken Lunge, der sich bis zur Hinterfläche auf 2,5 cm erweitert. An der hinteren Fläche des Brustkorbes im 9. Zwischenrippenraum Öffnung von 1 cm Durchmesser.

26. Musketier K. vom 2. Hannoverschen Infanterie-Regiment No. 77. 18. September 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Tod sofort. Einschufs im 5. Zwischenrippenraum fingerbreit einwärts von der Brustwarzenlinie, 1,5 cm Durchmesser, zerfetzte Ränder. Ausschufs in Höhe der 9. Rippe, 10 cm links von der Wirbelsäule, schlitzförmig, 1,5 cm. Leichenbefund: Im linken Brustfellraum 900 ccm Blut. Herzspitze und linke Kammer in großer Ausdehnung zertrümmert. Am Unterlappen der linken Lunge und im anliegenden Teil des Zwerchfells ein unregelmäßiger, 7 cm langer Schlitz. Vorfal des Magens in den Brustraum. Milz oberflächlich zerfetzt.

27. Gefreiter G. vom Infanterie-Regiment Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz (6. Ostpreussischen) No. 43. 9. Juli 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Tod sofort. Einschufs 3 cm nach innen und etwas nach unten von der linken Brustwarze, oval, 1,5 : 1,7 cm. Ausschufs 1 cm links vom 10. Brustwirbeldorn, 0,5 : 0,6 cm, rundlich, leicht zerfetzt. Leichenbefund: Linke Herzkammer bis auf einen etwa 1 cm breiten Rand zerstört. Im Brustfellsack 2,5 l Blut. Ausgedehnte Zerreißung am Unterlappen der linken Lunge. Hals der 10. Rippe und linker Querfortsatz des 10. Brustwirbels zertrümmert.

28. Unteroffizier W. vom Hohenzollernschen Fufsartillerie-Regiment No. 13. 12. Januar 1903. Selbstmord mit Karabiner M. 91. Tod wahrscheinlich sofort. Einschufs im 4. Zwischenrippenraum, 2 cm einwärts von der Brustwarzenlinie, unregelmäßig, 2 cm Durchmesser. Ausschufs 9 cm links von der Mittellinie des Rückens, am unteren Rand der linken 10. Rippe, rund, 1 cm Durchmesser. Leichenbefund: Herzbeutel, linke Herzkammern und vor dem Herzen gelegener Lungenrand stark zerrissen. Zwerchfellkuppel durchlöchert, 12 cm großer rundlicher Verlust des Bauchfellüberzugs am Magenfundus, ausgedehnte Zerreißung der Milz.

29. Sergeant Z. vom 4. Badischen Infanterie-Regiment Prinz Wilhelm No. 112. 22. Januar 1903. Selbstmordversuch mit dem Gewehr M. 88. Einschufs zwischen 6. und 7. linken Rippenknorpel, einwärts von der Brustwarzenlinie, 0,7 cm Durchmesser, kreisrund. Ausschufs links neben dem Dornfortsatz des 7. Brustwirbels. Große Blutleere, starke Bauchschmerzen, Blutbrechen, Lähmung des linken Beines. Bauchschnitt (s. Operationsliste unter B 2)¹⁾. Schufskanal: Aus dem vorderen Leberrande war, dem Einschufs entsprechend, ein 2 : 5 mm großes Stück herausgeschlagen. Von dieser Stelle gingen 2 Risse in die Leber, die von dem größeren in ihrer ganzen Dicke bis fast an den hinteren Leberrand quer durchtrennt war. Auf der vorderen Magenwand eine 12 cm lange Schufsrinne, die sich

1) Vergl. auch Würth v. Würthenau. Sprengwirkung penetrierender Projektilen u. s. w. Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1904, S. 111.

nach der kleinen Magenkrümmung zu immer tiefer in das Gewebe einsenkte und die Magenwand am rechten Umfang des Magenmundes durchtrennt hatte. Durchlöcherung des Zwerchfells und des hinteren unteren Teils vom linken unteren Lungenlappen. Blutergüsse im Mittelfell- und im rechten Brustfellsack. Zertrümmerungen an der linken Hälfte des 7. Rückenwirbels und den nach links abgehenden Nervenwurzeln. Tod 30 Stunden nach der Verletzung.

c. Schufsverletzungen am Unterleib.

Ausgang in Tod.

30. Musketier B. vom Infanterie-Regiment von Alvensleben (6. Brandenburgischen) No. 52. 3. September 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Tod nach 10 Stunden. Einschufs rund, 7 mm Durchmesser, 6 cm oberhalb und ebensoweit links vom Nabel. Ausschufs zerfetzt, 7 mm breit, in Höhe der 12. Rippe 6 cm links von der Wirbelsäule. Leichenbefund: In der Bauchhöhle etwa 3 l Blut und Speisebrei. An der Vorderwand des Magens zehnpfennigstückgroße, an der Rückwand zweimarkstückgroße Schufswunde. Im Dünndarm, 7,5 cm vom Magen entfernt, querovales, scharfrandiges Loch von 1,5 : 0,8 cm Durchmesser. Zertrümmerung der linken Niere. Im linken Brustfellraum 350 ccm starkblutige Flüssigkeit.

31. Sergeant G. vom Infanterie-Regiment Graf Werder (4. Rheinischen) No. 30. 30. August 1903. Schufs eines Postens aus 6 bis 8 m Entfernung nach vorschriftsmäßigem Anruf. Einschufs 1,3 cm Durchmesser, 3 cm unterhalb des Nabels, 1 cm rechts von der Mittellinie. Ausschufs 1,5 cm Durchmesser, 5 cm rechts von der Mitte des Kreuzbeins. Tod nach 3 Stunden. Leichenbefund: Im rechten geraden Bauchmuskel zerfetztes Loch von 3 : 6 cm Durchmesser. Im Dünndarm 5, im Dünndarmgekröse 4 rundliche Löcher, Verletzung der Unterbauchblutader (Vena hypogastrica). In der Bauchhöhle über 700 ccm Blut. Hinter dem Bauchfell großer Bluterguss.

32. Sergeant C. vom 10. Rheinischen Infanterie-Regiment No. 161. 8. November 1902. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Einschufs 1 cm unterhalb vom linken Rippenbogen, 2,5 cm links von der Mittellinie quergestellt, 1,75 : 1,5 cm Durchmesser, Rand zackig eingerissen. Ausschufs rund, 0,7 cm Durchmesser, 3 cm links von den Dornfortsätzen der letzten Rückenwirbel. Aus der Wunde sah ein Gewebsetzen hervor. Verlauf: Nach $\frac{1}{2}$ Stunde Bewusstlosigkeit, links am Rücken teigige Schwellung bis zum oberen Darmbeinrand, bei der Betastung Knistern. Steigende Dämpfung über der Bauch- und linken Brusthöhle. Tod nach etwa 2 Stunden. Leichenbefund: In der Bauchhöhle 1 l Blut. Im Netz ein Loch von 5 cm, im Querdarm, an seinem linksseitigen Knie, ein solches von 7 : 3 cm Durchmesser, letzteres hat zerrissene Ränder. Dünndarm, etwa 70 cm hinter dem Zwölffingerdarm, fast quer durchgerissen. Oberes Drittel der Milz zertrümmert, ebenso die linke Nebenniere. Linke Niere an ihrer inneren Seite von oben bis unten aufgerissen. Nierenbecken und Markkegel zertrümmert. Leber unverletzt. Im linken Lendenteil des Zwerchfells ein Loch von 2 cm Durchmesser. Linke Lunge unverletzt.

33. Musketier W. vom 2. Hannoverschen Infanterie-Regiment No. 77. 12. August 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Einschufs 1 cm im Durchmesser, 2 cm links und 3 cm oberhalb vom Nabel. Ausschufs 1 cm Durchmesser in der Mitte der linken Gesäßbacke. Bauchschnitt (s. Operationsliste unter B 2, Celle). Tod am Tage nach der Operation.

34. Musketier Z. vom 4. Badischen Infanterie-Regiment Prinz Wilhelm No. 112. 17. November 1902. Schufs mit Gewehr M. 88 aus unmittelbarer Nähe. Unvorsichtigkeit auf dem Schiessstand. Einschufs schräggestellt oval, 2 : 1 $\frac{1}{4}$ cm groß mit gequetschten Rändern, 3 cm oberhalb, 7 $\frac{1}{2}$ cm rechts

vom Nabel. Ausschufs 2 : 1 $\frac{1}{4}$ cm groß, unregelmäßige Ränder, 12,5 cm links von der Wirbelsäule neben der Spitze der 12. Rippe. Tod nach etwa 30 Minuten. Leichenbefund: Verletzung des Grimmdarms an einer, des Leerdarms an zwei Stellen, ferner des Gekröses, Zwölffingerdarms, des unteren Pols der linken Niere und der Bauchschlagader 2 cm oberhalb der Teilungsstelle.

35. Jäger S. vom Großherzoglich Mecklenburgischen Jäger-Bataillon No. 14. 12. März 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Leiche erst nach mehreren Stunden aufgefunden. Einschufs am unteren Ende des rechten Brustbeinrandes. Ausschufs unterhalb des rechten Schulterblattes. Leichenbefund: Zwerchfell vorn und hinten dicht unter der Kuppe durchschossen. Auf der Oberfläche des rechten Leberlappens ein 14 cm langer, 2 bis 3 cm breiter, unregelmäßiger, zwei Drittel des ganzen Lappens durchdringender Einriß. Riß in der rechten Wand des Herzbeutels.

d. Schufsverletzungen an den Gliedmaßen.

Ausgang in Heilung.

36. Musketier T. vom 3. Westpreussischen Infanterie-Regiment No. 129. 6. August 1903. Gewehr M. 88. Unglücksfall während einer Brigadebesichtigung. Schufs mit scharfer Patrone, von der T. getroffen wurde, während er sich knieend im Anschlag befand. 1. Einschufs auf der Streckseite des Mittelhand-Fingergelenks vom linken Zeigefinger, rund, 1 cm Durchmesser. Ausschufs am Rande des Daumenballens in Höhe des Daumensattelgelenks, strahlig, 2 cm Durchmesser. — 2. Einschufs 5 cm unterhalb der linken Schulterhöhe, vorn, in der Längsrichtung des Armes, eine Wunde von Form und Größe eines quertreffenden Geschosses. Ausschufs auf der Rückseite der Schulter, etwa 7 cm lang, 2 bis 3 cm breit, mit zerrissenem Rande. Dazwischen ein etwa 2 cm langer Schufskanal durch den Deltamuskel ohne Knochenverletzung. Spaltung des Schufskanals an der Schulter. Heilung der Handwunde durch erste Vereinigung. Dienstfähig.

37. Musketier K. vom 4. Westpreussischen Infanterie-Regiment No. 140. 16. März 1903. Schufs mit Gewehr M. 88 durch den linken Fuß, infolge Losgehens eines Gewehrs in unmittelbarer Nähe. Einschufs am Fußrücken etwas auswärts vom Grundgelenk der ersten Zehe, rund, 0,5 cm im Durchmesser. Ausschufs gegenüber in der Fußsohle, von gleicher Form wie der Einschufs. Im Schufskanal zahlreiche Knochensplitterchen und ein rundes Pappstückchen. Langsame Heilung unter Abstoßung von Knochensplitterchen. Invalide.

38. Husar H. vom Braunschweigischen Husaren-Regiment No. 17. 22. Mai 1903. Schufs mit Gewehr M. 88 durch das linke Kniegelenk, wahrscheinlich aus 200 m Entfernung. Unglücksfall auf dem Schiessstand. Einschufs 8 cm hinter der Mitte des äußeren Kniescheibenrandes, rund, 1 cm Durchmesser. Ausschufs 4 cm nach innen von der unteren Spitze der Kniescheibe, rund, 0,6 cm Durchmesser. Praller Gelenkerguss. Knochenverletzung durch Röntgenaufnahme nicht festzustellen. Verlauf: H. hatte außer dem Gefühl, als ob er im Augenblick der Verletzung einen Schlag gegen das Knie erhalten hätte, keine Schmerzen. Starke Blutung aus dem Ausschufs. Heilung der Wunden ohne Störung. Aufsaugung des Gelenkergusses. Am 2. Juni bereits Beugung bis zum rechten Winkel möglich. Verzögerung der endgültigen Heilung durch Brustfellentzündung. Nach einer Kur in Wiesbaden dienstfähig.

39. Gefreiter P. vom 11. Königlich Sächsischen Infanterie-Regiment No. 139. 10. August 1903. Infanteriegewehr M. 88. Unglücksfall beim Wechseln der Scheibe durch Unvorsichtigkeit. Schufs auf 300 m Entfernung durch den linken Oberarm. Einschufs rund, 0,6 cm Durchmesser, an der Streckseite des linken Oberarms, 3 cm von der hinteren Achselfalte entfernt. Aus-

schufs 2 cm unterhalb der Spitze der Schulterhöhe, 0,3 cm im Durchmesser mit zerrissenen, nach außen vorgewulsteten Wundrändern. Fieber und etwas Eiterung. Nach der Heilung Spannungsgefühl in der Narbe beim Heben des Armes. Halb-invalide.

B. Revolver- und Pistolenschüsse.

a. An Kopf und Hals.

Ausgang in Heilung.

40. Hilfstrompeter S. vom Hannoverschen Feldartillerie-Regiment No. 26. 25. August 1903. Selbstmordversuch mit 0,7 cm-Taschenrevolver. 3 Einschüsse: 1. In der rechten Schläfengegend, rund, 0,3 cm Durchmesser. 2. In der Herzgegend im linken 4. Zwischenrippenraum, 3 cm einwärts von der Brustwarze. Gleiche Größe. 3. 3 cm oberhalb der linken Brustwarze flache rinnenförmige Wunde, 3,5 cm lang, 0,5 cm breit. Kein Ausschufs. Am 8. Tage linksseitige trockene Rippenfellentzündung. Geschosse auch mit Röntgenstrahlen nicht nachweisbar. Dienstfähig.

Ausgang in Tod.

41. Vizewachtmeister der Reserve H. vom 3. Vorpommerschen Feldartillerie-Regiment No. 38. 18. August 1903. Selbstmord mit dem Armeerevolver. Einschufs in der Mitte zwischen rechtem Ohr und Auge, 2 cm Durchmesser. Ausschufs 5 cm oberhalb vom linken Ohre, 1,5 cm Durchmesser. Leichenbefund: In beiden Schläfenbeinen zwei annähernd gleiche, rundliche, 1:1,5 cm große Öffnungen mit gezackten Rändern. In der Umgebung der Ausschufsöffnung war der Knochen in 8 cm Durchmesser zersplittert, ein Sprung ging durch das Stirnbein bis zur Mittellinie. Auf der linken Seite wies die sehr fest mit dem Schädeldach verwachsene Hirnhaut Verdickungen von strahlenförmiger Zeichnung auf.

42. Trompeter L. vom 4. Württembergischen Feldartillerie-Regiment No. 65. 10. März 1903. Selbstmord mit 0,6 cm-Revolver. Einschufs zehnpennigstückgroß in der Mitte der rechten Schläfenbeinschuppe. Kein Ausschufs. Bewusstlosigkeit, Blutung aus der Wunde. 3 Stunden nach der Verletzung Unterbindung eines starken Astes der mittleren Hirnhautschlagader (Operationsliste unter A, 1). Tod nach 6 Stunden.

b. An der Brust.

Ausgang in Heilung.

43. Füsilier H. vom Niederrheinischen Füsilier-Regiment No. 39. 16. Juni 1903. Selbstmordversuch mit Revolver. Einschufs fingerbreit einwärts von der linken Brustwarze. Kein Ausschufs. Ein kleiner Ergufs im linken Brustfellraum verschwand nach 6 Tagen; ein beträchtlicher Herzbeutelergufs nach 4 Wochen.

44. Hilfshoboist H. vom Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm I. (2. Ostpreussischen) No. 3. 17. Juni 1903. Selbstmordversuch mit 7 mm-Revolver. 2 Einschufsöffnungen im 6. linken Zwischenrippenraum an der Brustwarzenlinie, dicht beieinander, beide rund, 0,9 cm Durchmesser. Kein Ausschufs. 14 Tage lang blutiger Auswurf. In der 7. Woche serös-blutiger Ergufs von 600 ccm aus dem linken Brustfellraum durch Aussaugung entleert. Langsame Heilung. Dienstfähig.

45. Soldat K. vom 12. Königlich Sächsischen Infanterie-Regiment No. 177. 14. Dezember 1902. Selbstmordversuch mit kleinkalbrigem Revolver. Einschufs kreisrund, 7 mm Durchmesser, im 3. Zwischenrippenraume, 5 cm links von der Mitte des Brustbeins. Kein Ausschufs. Schwellung und

Druckschmerz. Geschofs 4 cm links vom Dorn des 6. Brustwirbels in der Muskulatur mit Röntgenstrahlen nachweisbar. Dämpfung links bis zum 2., rechts bis zum 5. Zwischenrippenraume. Zunehmendes Fieber. Probepunktion ergab links blutig-serösen Inhalt mit Einzel- und Doppelkokken, die auf Nährflüssigkeiten nicht zu Kulturen auswuchsen. 18. Dezember 5 cm langer Einschnitt im 6. Zwischenrippenraume; 1,5 l fast reines, dunkles Blut entleert. Fieberabfall. Heilung bis 31. Dezember beendet, später wegen geistiger Minderwertigkeit als dienstunbrauchbar entlassen.

Ausgang in Tod.

46. Unteroffizier H. vom 7. Königlich Sächsischen Feldartillerie-Regiment No. 77. 22. Januar 1903. Selbstmord mit 8 mm-Revolver. Einschufs im 5. linken Zwischenrippenraume in der Brustwarzenlinie. Kein Ausschufs. Tod sofort. Leichenbefund: Schufs durch beide Herzkammern ohne Verletzung der Klappen. In der großen Körperschlagader 1 cm langes Loch. Körper des 8. Brustwirbels und Rückenmark durchschlagen. Geschofs 3 cm rechts vom Dornfortsatz des 7. Brustwirbels unter der Haut.

47. Soldat F. vom 15. Königlich Sächsischen Infanterie-Regiment No. 181. 15. November 1902. Selbstmord mit 6 mm-Revolver. Einschufs im 5. Zwischenrippenraume 2 cm einwärts von der linken Brustwarzenlinie, rund, 1 cm im Durchmesser. Kein Ausschufs. 50 bis 52 Pulse in der Minute bei einer Körpertemperatur bis zu 38,8°. Allgemeinbefinden leidlich gut. Nach 11 Tagen plötzlicher Tod unter Erstickungsanfällen. Leichenbefund: Ein- und Ausschufsöffnung im Herzbeutel. Wand der nicht eröffneten linken Kammer nahe der Spitze und der Querrinne verletzt. Linker oberer Lungenlappen durchschossen. Geschofs neben der Lungenschlagader an den großen Gefäßstämmen. Eiterung in der Umgebung des Schufskanals.

48. Sergeant V. vom Infanterie-Regiment Herzog Ferdinand von Braunschweig (8. Westfälischen) No. 57. 28. August 1903. Schufs mit Offizierrevolver M. 88 aus 1 m Entfernung. Unglücksfall. Einschufs in der linken, hinteren Achsellinie zwischen 10. und 11. Rippe, erbsengroß, mit gequetschten Rändern. Ausschufs vor dem kleinen Höcker am rechten Oberarmkopf. V. sank mit einem Aufschrei tot zusammen. Leichenbefund: In jedem Brustfellsack etwa 1500 ccm Blut. An der oberen äußeren Kante der Milz eine 2 cm tiefe, 6 cm lange, zerrissene Furche. In der linken Hälfte des Zwerchfells zwei 7 cm voneinander entfernte ovale Öffnungen von 1,0:1,5 cm Durchmesser. Im Unterlappen der linken Lunge ein 3 cm langer, 2 cm weiter Schufskanal. In der Körperschlagader in Höhe des 8. Brustwirbels ein fünfpennigstückgroßes Loch mit zerrissenen Rändern. Im Oberlappen der rechten Lunge ein schräg von links unten nach rechts oben ansteigender 8 cm langer, 2 cm weiter Schufskanal.

c. Am Unterleib.

Ausgang in Tod.

49. Unteroffizier S. vom 9. Württembergischen Infanterie-Regiment No. 127. 5. Januar 1903. Selbstmord. Einschufs dicht unter dem linken Rippenbogen, kirschkernegroß. Kein Ausschufs. Das plattgedrückte Geschofs lag 8 cm links von der Wirbelsäule über der 11. Rippe. Bauchschnitt. Leber- und Magenschufs (siehe Operationsliste B. 2, Magdeburg). Tod nach 1½ Tagen im Kollaps mit 35,0° Temperatur.

d. An den Gliedmaßen.

Ausgang in Heilung.

50. Kanonier S. vom 3. Lothringischen Feldartillerie-Regiment No. 69. 3. August 1903. Unvorsichtigkeit beim Scheiben-

schießen. Armeeevolver M. 83. Das Geschofs hatte vorher den rechten Mönchskappenmuskel eines vor S. stehenden Unteroffiziers glatt durchschlagen, dann den inneren Knopf vom linken Ärmelaufschlag des Kanoniers S. eingebault und war durch den Ärmel in das Handgelenk gedrungen. Einschufs zwischen Speiche und Handgelenk, rund, 7 mm Durchmesser. Kein Ausschufs. Anfangs starke Schwellung, aber geringe Entzündungserscheinungen. 28. August Entfernung des an der Spitze etwas abgeplatteten, neben dem Hakenbein liegenden Geschosses und einiger Tuchfetzen durch Einschnitt. Glatte Heilung. Ganzinvalide mit mäfsig beweglichem Handgelenk.

C. Verletzungen durch Zielmunition, durch Teschin- und Flobertgeschosse.

An der Brust.

Ausgang in Heilung.

51. Musketier J. vom Infanterie-Regiment Graf Schwerin (3. Pommerschen) No. 14. 29. Dezember 1902. Selbstmordversuch mit Teschin. Einschufs im 3. Zwischenrippenraume, 3 cm vom linken Brustbeinrand, 0,3 cm im Durchmesser, rund, glattrandig. Kein Ausschufs. Geschofs safs in der Gegend des linken Schulterblattwinkels unter der Haut. Starke Blutung aus der Wunde und Bluthusten. Blutansammlung im linken Brustfellsack. Geschofs am 4. Januar 1903 durch Schnitt entfernt. Chronische Brustfellentzündung. Dienstunbrauchbar.

III. Schufsverletzungen durch Platzpatronen.

A. Aus Gewehrlauf und Karabiner.

a. An Kopf und Hals.

Ausgang in Heilung.

52. Musketier W. vom Deutsch-Ordens-Infanterie-Regiment No. 152. 13. Januar 1903. Selbstmordversuch mit dem Dienstgewehr. Kinn zerschmettert. In die grofse, mit der Mundhöhle in Verbindung stehende Wundhöhle ragten die wagerechten Äste des Unterkieferbeins frei hinein. Ausgedehnte Haut- und Muskelzerreibungen am Hals. Schlucken unmöglich. Künstliche Ernährung. — 19. Januar 1903 Überführung ins Garnisonlazarett Thorn, wo eine plastische Operation am Kinn vorgenommen wurde. — Im Mai wurde im Garnisonlazarett I Berlin ein Ersatzstück für das fehlende Stück des Unterkiefers durch einen Zahnarzt gefertigt. Sprache undeutlich, aber verständlich. Dienstunbrauchbar.

53. Musketier E. vom Infanterie-Regiment Markgraf Ludwig Wilhelm (3. Badischen) Nr. 111. 10. September 1902. Selbstmordversuch. Mundschuß mit dem Dienstgewehr. Gesichtshaut fast unverletzt. Im Oberkiefer fehlten 6 Zähne; im Gaumen ein 4 cm langes, vorn 2 cm, hinten 1 cm breites Loch. Hinterer Teil der Nasenscheidewand zertrümmert. Heilung nach längerer Eiterung. Sprache schwer verständlich. Nach Einfügung einer Gaumenplatte und künstlichem Ersatz der 6 Zähne, war die Sprache fast regelrecht. Schlucken nicht erschwert. Dienstunbrauchbar.

54. Gefreiter A. vom Grenadier-Regiment Kronprinz (1. Ostpreussischen) No. 1. 29. August 1903. Mundschuß mit Radfahrerkarabiner, dessen Mündung A. wahrscheinlich spielend mit den Zähnen berührt hatte. Einschufs linke Hälfte des harten und weichen Gaumens und des Oberkieferzahnfortsatzes zertrümmert. Der Boden der linken Augenhöhle und das Siebbein lagen frei. Linkes Auge erblindet. Kein Ausschufs. Holz- oder Pappeteile von der Platzpatrone nicht gefunden. Verlauf: Ausstopfung der Wunde, geringes Fieber. Ende September Entfernung eines losen Stücks vom Oberkieferzahnfortsatz. Invalide.

55. Jäger A. vom kombinierten Jäger-Regiment zu Pferde. 8. Mai 1903. Selbstmordversuch. Mundschuß aus dem Karabiner. Linkes Oberkieferbein und aufsteigender Unterkieferast völlig zertrümmert. Geringe Benommenheit, starke Blutung, keine Geschofssplitter bemerkt. Einschnitt für ein Eiterableitungsrohr. Ernährung mit Schlundrohr und Klyasma. Verdickung der linken Wange mit behinderter Beweglichkeit des linken Kiefergelenks. Linksseitige Gesichtsnervenlähmung und Schwerhörigkeit. Flüstersprache in 20 cm. Dienstunbrauchbar.

Ausgang in Tod.

56. Sergeant D. vom 1. Nassauischen Infanterie-Regiment No. 87. 20. Juli 1903. Selbstmord durch Platzpatronenschufs aus dem Dienstgewehr. Tod sofort. Einschufs auf der rechten Wange an der hinteren Wurzel des Jochbogens, rund, 1 cm Durchmesser. Ausschufs 2,5 cm hinter dem linken äußeren Augewinkel, fast 2 cm Durchmesser. Leichenöffnung: Schädeldach ohne Verletzungen, Schädelgrund zertrümmert. Brücke zertrümmert, zum Teil auch das Kleinhirn. In der Brücke 11 Splitter des Holzgeschosses.

57. Musketier B. vom Infanterie-Regiment Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz (6. Ostpreussischen) No. 43. Selbstmordversuch. Schufs in den Mund mit dem Dienstgewehr. Zunge stark zerfetzt. Dreifacher Bruch des Unterkiefers. Lufröhrenschnitt und Tamponade der Mund- und Rachenhöhle (siehe Operationsliste A 4). Schienen des Unterkiefers durch Umschlingen der Zähne mit Silberdraht. 7 Tage lang Ernährung mit Klystieren, dann mit der Schlundsonde. Am 11. Tage Entfernung der Kanüle. Am 12. Tage plötzliche Blutung im Munde, Tod vor Ankunft des Arztes.

58. Musketier S. vom Oldenburgischen Infanterie-Regiment No. 91. 19. Februar 1903. Selbstmord. Schufs in den Mund aus dem Dienstgewehr. 3 cm großes unregelmäßiges Loch im Gaumen. Tod nach wenigen Minuten. Leichenbefund: Ein großer Teil des Oberkiefers, der vordere Teil des Pflugscharbeins und der Keilbeinkörper zertrümmert, der Kehlkopf, die Lufröhre und deren Äste mit Blut gefüllt.

59. Husar G. vom Husaren-Regiment König Humbert von Italien (1. Kurhessischen) No. 13. 6. April 1903. Selbstmordversuch. Mundschuß mit dem Karabiner. Ober- und Unterkiefer, harter und weicher Gaumen in großer Ausdehnung zertrümmert. Brandige Entzündung der Wunden. Am 6., 8. und 9. Tage nach der Verletzung ziemlich starke Blutungen aus den brandigen Teilen der Mundhöhle. Tod am 10. Tage.

60. Gefreiter A. vom 2. Badischen Grenadier-Regiment Kaiser Wilhelm I. No. 110. 4. August 1903. Selbstmord. Schufs in den Mund aus dem Dienstgewehr. Ausgedehnte Zerreißung sämtlicher Weichteile der Mund- und Rachenhöhle. Doppelseitiger Bruch des Unterkiefers. Aus Mund und Nase flofs reichlich Blut. Bei dem Versuch, die Blutung aus der Mundhöhle durch Tamponade zu stillen, traten, sobald der Verletzte Rückenlage einnahm, heftige Erstickungsanfälle auf, die durch Anheben des Kehledeckels mit dem Finger beseitigt wurden. Da die Atmung in der Bauchlage möglich war, wurde vom Lufröhrenschnitt in Übereinstimmung mit einem konsultierten Chirurgen zunächst Abstand genommen. 5 Stunden später trat am Halse ein Emphysem auf, das sich schnell über die Brust verbreitete. Die Atmung wurde beschwerlich und konnte nur durch einen schnell ausgeführten Lufröhrenschnitt (Operationsliste unter A 4), jedoch nicht dauernd im Gang erhalten werden. Tod nach 3¹/₄ Stunden. Leichenöffnung nicht gestattet.

61. Musketier H. vom Infanterie-Regiment Markgraf Ludwig Wilhelm (3. Badischen) No. 111. 3. Juli 1903. Selbstmordversuch. Mundschuß mit Platzpatrone aus dem Dienstgewehr. Bewußtlosigkeit. Klonische Krämpfe der Glieder und des Rücken-

marks. Der rechte Oberkiefer vom Schneidezahn auswärts aus allen Verbindungen gerissen, so daß er in Narkose leicht herausgenommen werden konnte. Rechter Augapfel in die große Wundhöhle herabgesunken. Ausstopfung der Wundhöhle mit Jodoformmull. Tod nach 15 Stunden. Leichenbefund: Ausser der Oberkieferverletzung Bruch des Stirnbeins und des Augenhöhlendachs, Abspaltung des rechten kleinen Keilbeinflügels. Zertrümmerungen im rechten Schläfen- und Stirnlappen.

b. An der Brust.

Ausgang in Heilung.

62. Husar B. vom 2. Rheinischen Husaren-Regiment No. 9. 1. September 1903. Selbstmordversuch durch Karabinerschufs. Einschufs: Etwas oberhalb und nach ausen von der linken Brustwarze gezackte, halbhandtellergroße Wunde; eine gleiche Wunde auf der Innenseite im oberen Drittel des Oberarms. Kein Ausschufs. Bluthusten, Erguß in den linken Brustfellsack, der durch Ansaugen entleert wurde. Lähmungserscheinungen im Gebiet des großen mittleren Armnerven (N. median.) durch Narbenschwund. Operative Beseitigung abgelehnt. Dienstunbrauchbar.

Ausgang in Tod.

63. Musketier J. vom Oldenburgischen Infanterie-Regiment No. 91. 20. März 1903. Selbstmord durch Schufs in die linke Brust mit dem Dienstgewehr. Einschufs links neben dem Brustbein über der 5. Rippe, scharfrandig, queroval, 1,8 : 1,2 cm. Kein Ausschufs. Sofortiger Tod. Leichenbefund: Herz durch einen vom Austritt der großen Gefäße zur großen Hohlvene verlaufenden Riß in zwei Hälften getrennt. Andere große Risse in der Milz, der vorderen und hinteren Magenwand und am linken Leberlappen.

64. Unteroffizier S. vom 1. Großherzoglich-Hessischen Infanterie-(Leibgarde-) Regiment No. 115. 13. Oktober 1902. Selbstmord durch Schufs aus dem Dienstgewehr in die linke Brust. Tod am folgenden Tag. Einschufs kreisrund, zehnpennigstückgroß, zwischen linker 3. und 4. Rippe, fingerbreit einwärts von der Brustwarzenlinie. Kein Ausschufs. Leichenbefund: Linke 3. und 4. Rippe zersplittert. Im Oberlappen der linken Lunge Einschufs von 6 mm Durchmesser. Dahinter bis zu 4 cm Durchmesser trichterförmig sich erweiternder Schufskanal, in dem größere zerrissene Gefäße der Lungenwurzel frei liegen. In der Lunge keine Holzsplitter.

c. Am Unterleib.

Ausgang in Tod.

65. Musketier R. vom Infanterie-Regiment König Wilhelm I. (6. Württembergischen) No. 124. 26. April 1903. Unglücksfall beim Gewehrreinigen. Platzpatrone mit Pfropf ohne Holzgeschofs aus dem Dienstgewehr, dessen Mündung unmittelbar am Körper lag. Einschufs in der Magengrube dicht unter dem rechten Rippenrande, 3 bis 4 cm von der Mittellinie entfernt, kirschkerngroß. Hinter dieser Wunde führte ein 2 cm langer Schufskanal nach links oben. Hochgradige Blässe der Haut und der Schleimhäute, heftiger Unterleibsschmerz. Tod nach 15 Stunden. Leichenbefund: Bauchhöhle nicht eröffnet. In der Kuppe der Leber ein langer Riß, hinter welchem sich eine fast die ganze Dicke der Leber durchsetzende Zertrümmerungshöhle fand. Viel flüssiges Blut in der Bauchhöhle. Alle Eingeweide sehr blaß.

d. An den Gliedmaßen.

Ausgang in Heilung.

66. Gardist W. vom 1. Großherzoglich Hessischen Infanterie-(Leibgarde-) Regiment No. 115. 3. September 1903. Unglücksfall durch Unvorsichtigkeit des Hintermannes. Schufs

aus dem Dienstgewehr. Einschufs an der Innenseite des rechten Oberarms dicht über dem Ellenbogengelenk, kreisrund, von Geschofsgröße. Kein Ausschufs. Gelenk eröffnet. Abspaltung des äußeren Gelenkknorrens und Querbruch des rechten Oberarms dicht über dem Ellenbogengelenk durch Röntgenstrahlen nachgewiesen. Heilung mit guter Beweglichkeit im Ellenbogengelenk. Streckung fast unbehindert, Beugung 90°. Invalide.

Ausgang in Tod.

67. Musketier W. vom Infanterie-Regiment von Stülpnagel (5. Brandenburgischen) No. 48. 18. Juni 1903. Einschufs am rechten Unterschenkel; 2 cm große bis auf das Wadenbein gehende Weichteilwunde. Nach anfänglichem Wohlbefinden am 8. Krankheitstage Kinnbackenkrampf. Tetanusbazillen im Blut nachgewiesen. Krämpfe durch Tetanus-Antitoxin nicht beeinflusst. Tod am folgenden Tage.

IV. Verletzungen durch Gewehrschüsse mit anderen Geschossen.

a. Kopf und Hals.

Ausgang in Tod.

68. Unteroffizier M. vom Braunschweigischen Infanterie-Regiment No. 92. 19. Januar 1903. Selbstmord. Infanteriegewehr M. 88. Platzpatrone, der an Stelle des Holzpfropfens ein Geschofs lose aufgesetzt war. Schufs in den Mund. Einschufs im Rachen, unregelmäßig gezackt, 1 cm Durchmesser. Ausschufs in der rechten Hinterhauptsgegend, 2 cm Durchmesser. Tot aufgefunden. Leichenöffnung: Schufskanal ging durch den Grundteil des Hinterhauptsbeins. Die Brücke und der rechte Kleinhirnschenkel waren zertrümmert, im rechten Hinterhauptsappen ein Kanal von 1,5 cm Durchmesser. Zahlreiche Knochenrisse im Schädeldach und Schädelgrund.

69. Gefreiter N. vom Magdeburgischen Husaren-Regiment No. 10. 17. Januar 1903. Selbstmord. Schufs aus Karabiner M. 88, mit Platzpatrone und aufgesetztem Geschofs. Tod sofort. Einschufs im harten Gaumen, 4 cm im Durchmesser, Zahnfortsatz des Oberkiefers mit den Schneide- und Eckzähnen abgesprengt. Ausschufs auf der Mitte des Scheitels in der Pfeilnaht, 1 cm Durchmesser, mit unregelmäßigen Rändern. Leichenbefund: Keilbeinkörper, Knorpel und Knochen der Nasenhöhle völlig, Dach der linken Augenhöhle größtenteils zertrümmert. Schädeldach in drei größere und viele kleinere Stücke zersprengt. Am Schädelgrund mehrere Bruchlinien. Hinterer Teil des Großhirns völlig zerrissen.

70. Unteroffizier H. vom 4. Westpreussischen Infanterie-Regiment No. 140. 5. Mai 1903. Selbstmord. Gewehr M. 88. Schufs mit scharfer Patrone ohne Entfernung des Mündungsdeckels. Tod sofort. Einschufs unter dem Kinn. Die ganze Unterkiefergegend zerfetzt, vom Unterkiefer nur links ein fingergliedlanges Stück erhalten. Ausschufs in der Gegend des völlig zertrümmerten rechten Scheitelbeins. Gehirnmasse in Umgebung der Leiche zerstreut. Das Geschofs und der zerstückelte Mündungsdeckel hatten den Mützensdeckel und die Zimmerdecke durchschlagen.

b. Brust.

Ausgang in Tod.

71. Unteroffizier P. vom Infanterie-Regiment Graf Bülow von Dennewitz (6. Westfälischen) Nr. 55. 28. Juli 1903. Selbstmord mit Gewehr M. 88. Platzpatrone mit aufgesetztem Geschofs einer scharfen Patrone. Einschufs in der Mitte des Brustbeins in Höhe der 2. Rippe, 0,5 cm im Durchmesser, scharfrandig. Ausschufs 4 cm nach links vom 2. Brustwirbel, wo sich über einer 6 cm breiten, hart anzufühlenden halbkugeligen Brausche eine kleine, unregelmäßige Öffnung von 1/4 cm Durch-

messer fand, die fast nur den Eindruck einer Hautabschürfung machte. Verlauf: Blasenlähmung. Puls klein, 130 in der Minute. Abendtemperatur 39,0°. Unter Fortdauer des Fiebers am nächsten Tage Lähmung des linken, nachmittags auch des rechten Beines. Rechtes Bein gefühllos. Am 3. Tage Puls 170. Lungenödem, Tod. Leicheneröffnung nicht gestattet.

c. An den Gliedmaßen.

Ausgang in Heilung.

72. Schütze B. von der Maschinengewehr-Abteilung No. 9. 2. Juli 1903. Schufs mit Karabiner aus 2,5 m Entfernung durch Unvorsichtigkeit eines Kameraden (der nicht entfernte Mündungsdeckel war vom Geschofs mitgerissen). Der rechte Ellenbogen war in rechtwinkliger Stellung getroffen. Ausgedehnte Haut- und Weichteilzerreißungen. Der äußere Oberarmknorren abgerissen, das Ellenbogengelenk eröffnet. — An der rechten Brustseite in Höhe der 10. Rippe eine zweimarkstückgroße Hautabschürfung durch den Mündungsdeckel. Günstiger Heilungsverlauf; Hautüberpflanzung auf die handtellergroße Wundfläche. Invalide.

V. Verletzungen durch Platzen von Gewehren, durch Kanonenschläge, Zündladungen und dergleichen.

Ausgang in Heilung.

73. Kanonier J. des Lehr-Regiments der Feldartillerie-Schießschule. 4. Februar 1903. Explosion eines Feldartilleriegeschosses, an dessen Zündung der Mann mit einem Draht gekratzt hatte, während er das Geschofs in der Hand hielt. Verletzungen: Zerstörung der linken Hornhaut, Ausfluß des Glaskörpers, Zerreißen der linken Wange und der linken Hand bis zur Handwurzel, Abreißen des rechten Daumens und der Hälfte seines Mittelhandknochens, des rechten Zeigefingers und zweier Glieder des Mittelfingers, 3 cm klaffende Rifswunde in der rechten Nebenbrustbeinlinie von der Höhe der Brustwarze bis zu der des Nabels. Bauchhöhle eröffnet. Außer den in der Operationsliste unter C. 4 aufgeführten Gliedausschlüssen und der Auslöftung des linken Augapfels wurde die Bauchdeckenwunde genäht, doch fiel am 3. Tage Netz vor. Neue Naht. Langsame Reinigung der Wunden von den zerrissenen und gequetschten Gewebsetzen. Mäßiges, 7 Wochen anhaltendes Fieber. — Geheilt. Dienstunbrauchbar.

Ausgang in Tod.

74. Gefreiter D. vom Infanterie-Regiment Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin (4. Brandenburgischen) No. 24. 8. August 1903. Durch Schlag verursacht Explosion eines vom Schießplatz Jüterbog mitgebrachten Artilleriezünders. Verletzungen: Zahlreiche Pulverkörner und kleine Metallsplitter in der Gesichtshaut. Im rechten Auge ein Sprengstück. Am linken Daumen, 4. und 5. Finger Zerreißen und Knochenbrüche. Zahlreiche Rifswunden an der Bauchhaut. Aus je einer größeren 2 bis 3 cm langen Wunde in der linken Ober- und rechten Unterbauchgegend war Netz vorgefallen. — Gelenkauslösung des 5. Fingers und der zerrissenen Glieder vom Daumen und 4. Finger. Abtragung des vorgefallenen Netzes nach Unterbindung. Erweiterung der Wunde in der Unterbauchgegend. — Wegen zunehmender Schwäche Beendigung der Operationen; Einlegen von Jodoformmullstreifen durch die Bauchwunden. Tod am folgenden Morgen. Leichenöffnung nicht gestattet.

75. Gefreiter K. desselben Regiments, der in der Nähe des vorigen Verletzten gestanden hatte. Weichteilwunden am ganzen Körper, tiefe Wunde quer über das rechte Schienbein und Knochenspalt. Anfangs keine in die Bauchhöhle dringende Wunde gefunden. Am nächsten Morgen Zeichen einer inneren

Blutung. Bauchschnitt. Tod während der Operation (Operationsliste unter B. 2). Leichenöffnung nicht gestattet. — In einer durch die Operationswunde vorgezogenen Darmschlinge fanden sich dicht nebeneinander 2 je 1 cm große Löcher.

VI. Eingehelte Geschosse.

Ausgang in Heilung.

76. Kriegsinvalide W. vom Bezirkskommando Mosbach. 18. Dezember 1870. Schufs aus dem Chassepotgewehr. Der Schufs war durch den rechten Arm in Höhe der 10. Rippe in die rechte Brustseite gegangen. Es bestanden hexenschufsartige Schmerzen im Rücken, die Füße konnten nur bei festem Aufstützen auf einen Stock vom Boden gehoben und scharrend vorwärts gesetzt werden. Geschofs durch Röntgenstrahlen in Höhe des 3. Lendenwirbels in der Rückenmuskulatur nachgewiesen. Unter Anwendung Schleichscher Anästhesie Entfernung des Geschosses. Bedeutende Besserung des Ganges. Der Mann konnte die Füße ohne Hilfe bis auf einen Stuhlsitz erheben.

Siebente Unterart: Hieb-, Schnitt-, Stich-, Riß-, Quetsch- und Bißwunden.

(No. 186 bis 189 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage für jeden Kranken durchschnittlich |
|---------------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| 305 | 15 606 | 29,6 | 15 448 | 5 | 164 | 15 617 | 294 | 12,2 |

Außerdem erkrankten noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie, 68 Kadetten und 73 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Zugang nach Armeekorps in ‰ K.

| Armeekorps | ‰ K. | Armeekorps | ‰ K. |
|---------------|------|---------------------------|------|
| G. | 36,6 | X. | 26,6 |
| I. | 35,3 | XI. | 31,1 |
| II. | 34,3 | XII. (1. K. S.) | 22,0 |
| III. | 21,7 | XIII. (K. W.) | 34,9 |
| IV. | 28,9 | XIV. | 28,8 |
| V. | 26,3 | XV. | 28,9 |
| VI. | 26,8 | XVI. | 39,3 |
| VII. | 30,3 | XVII. | 22,0 |
| VIII. | 34,2 | XVIII. | 27,5 |
| IX. | 22,3 | XIX. (2. K. S.) | 26,5 |

Bei den Hieb- und Schnittwunden an den Gliedmaßen, welche zu Sehnendurchtrennungen geführt hatten, wurde in allen berichteten Fällen die Sehnennaht, meist mit gutem Erfolge, vorgenommen.

Bei einem Musketier in Osterode wurde der untere (periphere) Stumpf vom langen Daumenstrecker mit der Sehne des äußeren Handstreckers (Ext. carpi. radial. long.) vereinigt, weil es nicht gelang, den oberen Stumpf zu finden. Völlige Gebrauchsfähigkeit. Dienstfähig (O.-St.-A. Duden).

Während in mehreren Fällen durch Schnittverletzungen bis auf eine schmale Hautbrücke abgetrennte Finger zwar anheilten, aber unbrauchbar wurden, konnten 1 Mann in Metz, dem die Strecksehnen und die Knochen an den Grundgliedern zweier Finger durchschnitten waren, und 1 in Metz-Montigny,

dem an demselben Daumen fast die ganze Daumenkuppe und das Grundglied abgetrennt waren, durch Haut- und Sehennahrt wieder so weit hergestellt worden, daß sie dienstfähig blieben.

Eine Eröffnung des Handgelenks durch Schnittwunden mit Sehnedurchtrennungen an der Beugeseite (Fall in Glasscherben) führte zur Versteifung des Gelenks (O.-St.-A. Ziemann-Hanau).

Von den beschriebenen Stichwunden der Brust hatten 6 die Brusthöhle eröffnet. 3 mal wurde Austritt von Luft aus der Wunde, Ansammlung von Luft im Brustfellraume und Luftblähung der Haut gesehen. Die übrigen Verletzten hatten Blutergüsse im Brustfellraum. Bei einem wurde der Bluterguß (450 ccm) punktiert (Bromberg). Abgesehen von einem Musketier in Deutz, bei welchem nach einer Brustfellentzündung ausgedehnte Verwachsung der Brustfellblätter eintrat, wurden sämtliche Verletzte wieder dienstfähig.

Bei einer Lanzenstichverletzung, die am vorderen Rande der rechten Achselhöhle eingedrungen war und die großen Gefäße und Nerven der Achselhöhle unverletzt freigelegt hatte, zeigte neben der Mitte des äußeren Schulterblattrandes eine fünfmarkstückgroße, blaurote Blutgeschwulst an, wohin das Lanzenende gedrungen war. Nach 14 Tagen wurde nach dem Abschluß der Wundheilung auf den nicht zurückgegangenen Bluterguß eingeschnitten und ein 2 qcm großes Stück Rocktuch sowie ein gleich großes Stück wollener Hemdenstoff zum Vorschein gebracht. 2 Tage später wurde noch ein 1 qcm großes Stück Futterstoff und Schneiderwatte aus der Wunde entfernt. Alle diese Fremdkörper hatten keine Spur von Entzündung oder Eiterung hervorgerufen. Schnelle Heilung (O.-St.-A. Reinhardt-Potsdam).

5 Stichverletzungen mit Eröffnung der Bauchhöhle, von denen eine (O.-St.-A. Wendel-Stuttgart) in der rechten Rippenknorpelgegend eingedrungen war und die Leber verletzt hatte, wurden sämtlich durch Bauchschnitt geheilt (s. Operationsliste unter C. 2).

Der Verletzte in Stuttgart wie 2 von St.-A. Hennig in Graudenz Operierte und 1 Mann in Cassel, bei dem St.-A. v. Hippel zwei Darmwunden nähte, wurden sämtlich wieder dienstfähig. Nur 1 Operierter in Spandau wurde invalide.

Zahlreiche Quetschwunden von Finger- und Zehengliedern führten wegen der Größe der Zertrümmerung zur Absetzung der verletzten Glieder.

1 mal (Metz) mußte ein talergroßes Stück des Schädeldachs ausgeheißelt werden, da es nach einem vor dem Dienst Eintritt erhaltenen Schläge mit einem Seidel abgestorben war (Operationsliste unter C. 1).

Von Bisswunden seien ein Katzenbiss und ein Schlangenbiss erwähnt:

Der Katzenbiss führte zur Vereiterung des Grundgelenks des rechten Zeigefingers und schließlichs zur Aussägung dieses Gelenks (Magdeburg).

Einen Schlangenbiss zog sich ein Kanonier in Posen zu, welcher von einer Kreuzotter, die er im Walde am Schwanz ergriffen hatte, in den rechten Daumen gebissen worden war. Der Verletzte hatte die Wunde sofort ausgesogen, trotzdem schwoll Daumen und Hand erheblich an. Einschnitte am Handrücken, Ausbrennen der Bisswunde mit dem Paquelinschen Brenner. Ammon. carbon. und reichlich Ungarwein. Nach neun-tägiger Behandlung dienstfähig (O.-St.-A. Schmolling).

Achte Unterart: Verbrennungen.

(No. 190 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 15 | 1511 | 2,9 | 1495 | 1 | 6 | 1502 | 24 | 13,0 |

Außerdem erkrankten noch 1 Invalide, 2 Kadetten und 6 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Eine Verbrennung, die durch Aufgießen von Petroleum auf verlöschendes Herdfeuer entstanden war, endete infolge ihrer Ausdehnung über den größten Teil des Körpers tödlich (Gnesen). — Als Verbrennung mit Röntgenstrahlen wurde ein geschwüriger Zerfall der Haut in der rechten Leistenbeuge angesehen, der bei einem Kriegsveteranen in Stettin mehrere Tage nach einer Röntgenuntersuchung zur Feststellung einer angeblich im Oberschenkel sitzenden Gewehrkugel aufgetreten war. Nach Angabe des Mannes hatten sich anfänglich nur Bläschen gezeigt. Bei der Aufnahme, 4 Monate später, bestand ein handtellergroßes Geschwür in narbiger Umgebung, das auf den Hodensack übergriff. Heilung durch Hautüberpflanzung. Gebrauchsstörung des Beins durch die Narbe (St.-A. Rudolph).

Neunte Unterart: Erfrierungen (Frostschäden).

(No. 191 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 998 | 1,9 | 980 | 4 | 13 | 997 | 1 | 11,4 |

Außerdem erkrankten noch 1 Kadett und 1 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Der Zugang betrug im Durchschnitt der Jahre:

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| 1881/82 bis 1885/86 | 5,4 | ‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 | 7,1 | „ |
| 1891/92 „ 1895/96 | 4,9 | „ |
| 1896/97 „ 1900/01 | 2,4 | „ |
| im Jahre 1901/02 | 1,8 | „ |

im Jahre 1902/03 1,9 ‰ K.

Bei mehreren Leuten, welche als Fahnenflüchtige bei Kälte im Freien genächtigt hatten, mußten wegen Frostbrand Gliedabsetzungen im Bereich der Füße und der Unterschenkel vorgenommen werden (s. Operationsliste C. 3 und 4).

Bei einem Füsilier in Glogau, welcher sich einige ganz oberflächliche, schnell heilende Frostgeschwüre am linken Ring- und Zeigefinger zugezogen hatte, entwickelte sich als Folgezustand eine Veränderung der Haut, die als „Glanzhaut“ bezeichnet wird.

Die Finger befanden sich in Überstreckung und konnten aktiv gar nicht, passiv nur unter sehr starken Schmerzen gebeugt werden. Die Haut war blaurot und glänzend, auf der Streckseite glänzend marmoriert, äußerst dünn, auf der Unterlage kaum verschieblich und auf Berührung sehr schmerzhaft. Der Mann mußte als invalide entlassen werden (O.-St.-A. Boeck-Gumbinnen).

Zehnte Unterart: Andere Wunden und Verletzungen.

(No. 192 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 10 | 893 | 1,7 | 854 | — | 32 | 886 | 17 | 12,4 |

Außerdem erkrankten noch 3 Kadetten und 3 Unteroffizier-Vorschüler. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Eine Augenverletzung durch Fremdkörper beschreibt St.-A. Peters-Magdeburg:

Bei einem Gefreiten befand sich am oberen Lid und in der Bindehaut des rechten Auges eine 7 mm lange und 2 mm breite, Lid und Augenbäute durchbohrende Wunde. Einblick in das Augeninnere war wegen Blutergusses unmöglich. Das Auge war weich und erblindet. 3 Tage nach dem Unfall wurde aus dem Augapfel ein 2 cm langes, flaches Messingstückchen entfernt. Der Verlauf war schmerz- und entzündungslos; auch das andere Auge blieb vollkommen unbeteiligt, jedoch blieb das verletzte Auge blind.

Elfte Unterart: Wundverband und Betäubungsmittel.

O.-St.-A. Clafsen-Düsseldorf wandte bei einem in zwei gleichartigen Operationen von großen Lymphdrüsenanschwellungen auf beiden Halsseiten befreiten Manne 1 mal Chloroform, das andere Mal Äther an und glaubt dabei festgestellt zu haben, daß die Blutung bei der Ätherbetäubung weit stärker und schwieriger zu beherrschen war als bei der Chloroformbetäubung. Er empfiehlt daher, bei Operationen am Kopfe und Halse dem Chloroform den Vorzug zu geben.

Bei kurz dauernden Operationen raten mehrere Berichterstatter, sich auf den sogenannten Ätherrausch zu beschränken.

Von der örtlichen Schmerzbetäubung: Äthylchlorid, Schleischsche und Oberstsche Methode, wurde bei geeigneten Fällen ausgedehnter Gebrauch gemacht. — Der Ersatz des Kokains durch Eukain B bei den beiden letztgenannten Methoden wird vom St.-A. Rudolph-Stettin wegen seiner großen Billigkeit, der vier- bis fünfmal geringeren Giftigkeit und wegen der Möglichkeit der Sterilisation durch Kochen, warm empfohlen.

Anhang.**Die während des Berichtsjahres in den Garnisonlazaretten ausgeführten Operationen.**

Die wichtigsten Operationen sind in den Operationslisten — Abschnitt F — übersichtlich zusammengestellt. Die Liste enthält:

A. Operationen am Kopf und Hals.

- 22 Eröffnungen des Schädels (No. 1 bis 22),
- 81 Ohroperationen (No. 23 bis 103),
- 66 mal Aufmeißelung des Warzenfortsatzvorhofes (No. 23 bis 88),

- 15 mal Freilegung sämtlicher Mittelohrräume (Radikaloperationen) (No. 89 bis 103),
- 34 Augenoperationen (No. 104 bis 137),
 - 2 mal Ausschneiden der Lidfalten (No. 104 u. 105),
 - 2 „ plastische Lidoperation (No. 106 u. 107),
 - 2 „ Schieloperation (No. 108 u. 109),
 - 1 „ Abtragung eines Flügelfells (No. 110),
 - 6 „ Staroperation (No. 111 bis 116),
 - 3 „ Ausschneiden eines Stückes der Regenbogenhaut (No. 117 bis 119),
 - 7 „ Ausweidung des Augapfels (No. 120 bis 126),
 - 8 „ Auslösung des Augapfels (No. 127 bis 134),
 - 3 „ Operation an den Tränenwegen (No. 135 bis 137),
- 9 Luftröhren- und Kehlkopfschnitte (No. 138 bis 146),
- 54 anderweitige Operationen am Kopf und Hals (No. 147 bis 200),
 - 30 mal Operation von Halsdrüsen (No. 147 bis 176),
 - 4 „ Spaltung bzw. Eröffnung von akuten Entzündungen und Eiterungen am Halse (No. 177 bis 180),
 - 1 „ Ausräumung einer verkästen Ohrspeicheldrüse (No. 181),
 - 1 „ Entfernung des tuberkulös erkrankten Jochbeins (No. 182),
 - 2 „ Entfernung von Teilen des Unterkiefers wegen Knochenmarkentzündung (No. 183 und 184),
 - 2 „ Knochennaht des gebrochenen Unterkiefers (No. 185 und 186),
 - 1 „ Bildung einer zerstörten Nase (No. 187),
 - 2 „ Operation an der Nase (No. 188 und 189),
 - 5 „ Eröffnung der Oberkieferhöhle wegen Eiterung (No. 190 bis 194),
 - 3 „ Eröffnung der Stirnhöhlen (No. 195 bis 197),
 - 1 „ Eröffnung des Siebbeins (No. 198),
 - 1 „ Ausrottung einer Kiemengangsfistel (No. 199),
 - 1 „ Eröffnung der Speiseröhre (zur Entfernung eines verschluckten Gebisses) (No. 200).

B. Operationen am Rumpf.

- 13 Operationen bei eiteriger Brustfellentzündung (No. 201 bis 213),
- 44 Eröffnungen der Bauchhöhle (No. 214 bis 257),
- 125 Operationen bei Blinddarmentzündung (No. 258 bis 382),
- 49 Bruchoperationen (No. 383 bis 431),
 - 1 Operation wegen Harnverhaltung und Harnröhrenverengung (No. 432),
- 71 anderweitige Operationen am Rumpf (No. 433 bis 503),
 - 1 mal Auslösung des ganzen abgestorbenen Schlüsselbeins (No. 433),
 - 1 „ Aussägung eines Teils des Schlüsselbeins (No. 434),

- 2 mal Ausschneidung von Rippen zur Freilegung von Schufskanälen (No. 435 und 436),
 7 „ Operation wegen Knocheneiterung an den Rippen (No. 437 bis 443),
 2 „ Operation wegen Knocheneiterung am Becken (No. 444 und 445),
 1 „ Operation bei Verrenkung des Schlüsselbeins (No. 446),
 1 „ Entfernung einer eingehielten Kugel aus den Rückenmuskeln (No. 447),
 3 „ Eröffnung der Brusthöhle (No. 448 bis 450).
 12 „ Eröffnung von Abszessen neben und um die Niere (No. 451 bis 462),
 7 „ Operation an der Niere und am Nierenbecken (No. 463 bis 469), darunter: Spaltung eines eiterigen Nierensacks (No. 463), des Nierenbeckens (No. 464), der Nierenkapsel (No. 465), der akut vereiterten Niere (No. 466), der tuberkulösen Niere (No. 467), Auslösen der Niere (468) und Nierenfisteloperation (No. 469),
 1 „ Entfernung eines Harnröhrensteins (No. 470),
 2 „ Eröffnung von subphrenischen Abszessen (No. 471 und 472),
 3 „ Eröffnung kalter Abszesse (No. 473 bis 475),
 4 „ Operation wegen Lymphdrüsenentzündung bzw. Vereiterung (No. 476 bis 479), darunter in der Achselhöhle (No. 476), am Becken (No. 477), in der Leistenbeuge (No. 478 und 479),
 1 „ Spaltung einer Mastdarmpistel (No. 480),
 1 „ Absetzen des männlichen Gliedes (No. 481),
 20 „ Kastration (No. 482 bis 501),
 2 „ Ausschälung des Krampfaderbruchs (No. 502 und 503).

C. Operationen an den Gliedmaßen.

- 17 Aufmeißelungen bzw. Auskratzungen an den Röhrenknochen (No. 504 bis 520),
 17 Gelenkaussägungen (No. 521 bis 537),
 59 Gliedabsetzungen (No. 538 bis 596),
 8 mal am Oberarm (No. 538 bis 545),
 16 „ an Hand- und Fingerknochen (No. 546 bis 561),
 9 „ am Oberschenkel (No. 562 bis 570),
 23 „ am Unterschenkel (No. 571 bis 593), darunter mit Plastik nach Mikulicz-Wladimirow (592), nach Pirogoff (593),
 3 „ am Fuß (No. 594 bis 596),
 33 Gliedauslösungen (No. 597 bis 629),
 1 mal an der Schulter (No. 597),
 22 „ an Hand und Fingern (No. 598 bis 619),
 1 „ am Hüftgelenk (No. 620),
 9 „ an Mittelfuß- und Zehengelenken (No. 621 bis 629),

- 53 anderweitige Operationen an den Gliedmaßen (No. 630 bis 682),

- 1 mal Sehennaht am Daumen (No. 630),
 3 „ Narben- und Fasziennahten an der Hand (No. 631 bis 633),
 4 „ Geschossausschneidung (No. 634 bis 637),
 1 „ Operation eines Muskelbruchs (No. 638),
 1 „ Abmeißelung von Knochenvorsprüngen an der großen Zehe (No. 639),
 5 „ Knochennaht bei Kniescheibenbrüchen (No. 640 bis 644),
 3 „ Knochennaht bei frischen Knochenbrüchen (No. 645 bis 647),
 5 „ Knochennaht bei ungenügend verknöcherten Brüchen (No. 648 bis 652),
 3 „ Knochennaht zur Operation schief geheilter Brüche (No. 653 bis 655),
 1 „ Operation zur Entfernung abgestorbener Knochenstücke aus dem Fersenbein (No. 656),
 1 „ Operation zur Entfernung tuberkulöser Gewebe an der rechten Ferse (No. 657),
 10 mal Operation zur Entfernung von Gelenkmäusen (No. 658 bis 667),
 13 „ Ausschälen von Schleimbeuteln, Überbeinen u. s. w. (No. 668 bis 680),
 2 „ Ausschälen von Blut- und Pulsadergeschwülsten (No. 681 und 682).

D. Geschwulstoperationen.

- 60 Geschwulstentfernungen (No. 683 bis 742),
 21 mal Operation zur Abtragung von Verknöcherungen und Knochengeschwülsten (No. 683 bis 703),
 9 „ Ausschälung gutartiger Geschwülste (No. 704 bis 712), darunter Narbengeschwulst (No. 704), Fettgeschwulst (No. 705 bis 707), Fasergeschwulst (No. 708 und 709), Muskelgewebeschwulst (No. 710), Cysten am Halse (No. 711 und 712),
 1 „ Operation zur Entfernung einer adenomatösen Geschwulst (No. 713),
 10 „ Operation zur Entfernung lymphomatöser und sarkomatöser Geschwülste (No. 714 bis 723),
 5 „ Operation zur Entfernung von Krebs- und krebsähnlichen Geschwülsten (No. 724 bis 728),
 2 „ Operation bei Strahlenpilz (No. 729 u. 730),
 12 „ Kropfoperation (No. 731 bis 742).

Die Zahl der eingereichten Operationslisten hat gegen das vorige Berichtsjahr um 138 zugenommen.

XIII. Gruppe: Andere Krankheiten.

(No. 193 bis 197 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | | |
| 9 | 222 | 0,42 | 76 | 32,9 | 27 | 11,7 | 119 | 51,5 | 222 | 96,1 | 9 | 6289 | 27,2 |

Außerdem erkrankte noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Erste Unterart: Selbstverstümmelung.

(No. 193 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| — | 5 | 0,01 | 3 | — | 2 | 5 | — | 61,0 |

Selbstverstümmelung bewirkte ein Kanonier in Neifse durch Abschneiden der rechten Ohrmuschel mit einem Rasiermesser. Er wurde, da die einige Stunden später angenähte Ohrmuschel nicht anheilte, nach Verbüßung seiner Strafe als dienstunbrauchbar entlassen. (O.-St.-A. Arimond.) Vergl. S. 142 und 146.

Zweite Unterart: Selbstmordversuche.

(No. 194 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 6 | 104 | 0,20 | 50 | 27 | 26 | 103 | 7 | 32,8 |

Die Selbstmordversuche mittels Schusswaffen sind bei der XII. Gruppe erörtert.

Bei 13 hier berichteten Erkrankungen, von denen 3 einen tödlichen Ausgang nahmen, handelte es sich 5 mal um Verletzung durch Schnitt (3 mal am Unterarm, 1 mal Unterarm und Hals, 1 mal Puls und Hals), 4 mal um Sturz aus dem Fenster, 3 mal um Erhängen und 1 mal um Trinken von Salzsäure.

Ein Husar in Grimma hatte sich eine oberflächliche Schnittwunde in der linken Pulsadergegend beigebracht und dann den Kehlkopf dicht oberhalb der Stimmbänder und die Speiseröhre bis auf einen schmalen Streifen durchgeschnitten. Starke Blutung aus der Schilddrüse, prophylaktische Tracheotomie, Anlegung einiger Situationsnähte; Fütterung durch Schlundrohr. Reaktionslose Heilung der Verletzung. Sprache etwas heiser. Dienstunbrauchbar. (O.-St.-A. Wilke.)

Einen eigenartigen Selbstmordversuch machte ein Ersatzreservist in Görlitz, indem er sich die Wurzel des männlichen Gliedes bis tief in den Hodensack hinein mit einem schartigen Messer durchtrennte und außerdem eine Weichteilwunde am Halse beibrachte; der Mann, welcher ein starker Schnapstrinker

war, ging am folgenden Tage im Delirium zugrunde. Leichenöffnung: Verwachsung der harten Hirnhaut mit dem Schädel und einem Teile der Gehirnoberfläche zu beiden Seiten des Längsblutleiters. Sandkornartige Einlagerungen. (O.-St.-A. Vehling.)

Ein Jäger in Oels versuchte sich durch Trinken von 2 Eßlöffeln Putzsalzsäure zu vergiften. Es entwickelte sich eine Speiseröhrenverengung, welche zunächst die Anlage einer Magenfistel erforderlich machte. Da sich der Mageninhalt staute, wurde in der Annahme einer Verengung des Magenpförtners eine Magen-Darmfistel gebildet, doch blieb die abführende Schlinge stets leer. Auch der Versuch, die Ernährung durch eine Darmfistel zu bewirken, scheiterte; Tod infolge Entkräftung. (S. Operationsliste unter B. 2). (St.-A. Becker, St.-A. Walter.)

Dritte Unterart: Vorgetäuschte Krankheiten.

(No. 195 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnitt- lich |
|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------------|--|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienst- fähig | ge- storben | ander- weitig | Summe | | |
| 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 42,0 |

Ein Musketier in Altona wufste einen Augenbindehautkatarrh durch Einbringen eines 1,5 cm langen Streichholzstückes zwischen dem Augapfel und dem oberen Augenlid monatelang zu unterhalten. Er wurde von St.-A. Oberbeck entlarvt und nach 1/2 jähriger Behandlung dienstfähig.

Vierte Unterart: Allgemeine Körperschwäche und Altersschwäche.

(No. 196 und 197 des Rapportmusters.)

| | Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | Summe | Bestand bleiben | Behandlungs- tage für jeden Kranken durchschnittlich |
|-----------------------------------|------------------|----------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------------|---|
| | | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | |
| Allgemeine Körperschwäche | 2 | 113 | 0,21 | 22 | — | 91 | 113 | 2 | 20,3 |
| Altersschwäche | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusammen | 2 | 113 | 0,21 | 22 | — | 91 | 113 | 2 | 20,3 |

Außerdem erkrankte noch 1 Mann der Schloßgarde-Kompagnie an Altersschwäche. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

XIV. Gruppe: Zur Beobachtung.

(No. 198 des Rapportmusters.)

| Bestand waren | Zugang | | Abgang | | | | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | absol. Zahl | ‰ K. | dienstfähig | | gestorben | | anderweitig | | Summe | | | Summe | für jeden Kranken (durchschnittlich) |
| | | | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | absol. Zahl | ‰ der Behan- delten | | | |
| 104 | 4543 | 8,6 | 4439 | 95,5 | — | — | 6 ¹⁾ | 0,13 | 4445 | 95,7 | 202 | 66 163 | 14,2 |

Außerdem kamen noch 28 Kadetten und 16 Unteroffizier-Vorschüler zur Beobachtung. (Siehe II. Teil, sechste Abteilung.)

Die Verteilung des Zuganges auf die einzelnen Armeekorps und Monate ergibt sich aus nachstehenden Tabellen.

Zugang nach Armeekorps.

| Armeekorps | Zugang | | Armeekorps | Zugang | |
|---------------|------------------|------|----------------|------------------|------|
| | absol. Zahlen | ‰ K. | | absol. Zahlen | ‰ K. |
| G. | 286 | 6,9 | XII. (1.K.S.) | 106 | 5,3 |
| I. | 287 | 9,1 | XIII. (K. W.) | 238 | 10,8 |
| II. | 206 | 8,0 | XIV. | 296 | 9,3 |
| III. | 165 | 7,0 | XV. | 278 | 8,9 |
| IV. | 196 | 8,8 | XVI. | 181 | 6,6 |
| V. | 262 | 10,2 | XVII. | 216 | 7,9 |
| VI. | 281 | 10,9 | XVIII. | 273 | 10,4 |
| VII. | 306 | 11,4 | XIX. (2.K.S.) | 158 | 7,7 |
| VIII. | 302 | 10,2 | | | |
| IX. | 84 | 3,4 | I. K. B. . . . | 334 | 14,4 |
| X. | 197 | 9,0 | II. " " . . . | 390 | 18,3 |
| XI. | 225 | 10,8 | III. " " . . . | 38 | 2,0 |

Zugang nach Monaten.

| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
|-------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| absol. Zahl | 784 | 613 | 319 | 408 | 323 | 379 | 211 | 218 | 243 | 337 | 286 | 422 |
| ‰ K. | 1,8 | 1,1 | 0,59 | 0,76 | 0,60 | 0,71 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,61 | 0,53 | 0,87 |

Dafs alljährlich im Oktober eine so auferordentlich grofse Zahl von Leuten einer Beobachtung unterworfen werden mufs, erklärt sich aus der in diesem Monat stattfindenden Rekruteneinstellung.

Nichts Bemerkenswertes. Vergleiche auch Bemerkungen zu Gruppe XIV des Sanitäts-Berichts 1901/02.

¹⁾ Siehe Anmerkung ¹⁾ auf Seite 32*).

D. Übersicht über Brunnen- und Badekuren.

| IX. | | | X. | | | XI. | | | XII. (1. K. S.) | | | XIII. (K. W.) | | | XIV. | | | XV. | | | XVI. | | | XVII. | | | XVIII. | | | XIX. (2. K. S.) | | | Summe | | | Laufende Nummer | | |
|----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------|-------|-----|----|-----------------|----|----|
| aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | aktive ¹⁾ | Invaliden | sonstige | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
| 47 | 12 | 1 | 176 | 17 | 1 | 75 | 28 | | 21 | 9 | 5 | 23 | 13 | 1 | 111 | 11 | 4 | 39 | 8 | | 32 | 2 | | 41 | 5 | | 199 | 57 | 5 | 25 | 16 | 10 | 1732 | 415 | 57 | | | |

E. Bericht über den Krankenabgang.

Von den 333 501 insgesamt behandelten Mannschaften sind

dienstfähig geworden . . . 308 970 = $926,4 \frac{0}{0}$ der Behandelten oder $586,8 \frac{0}{0}$ K.,
gestorben 745 = $2,2$ „ „ „ „ $1,4$ „
anderweitig abgegangen . . . 16 495 = $49,5$ „ „ „ „ $31,3$ „ .

Am Schlusse des Berichtsjahres blieben 7291 = $21,9 \frac{0}{0}$ der Behandelten oder $13,8 \frac{0}{0}$ K. in Behandlung.

Als anderweitig abgegangen sind diejenigen Mannschaften verrechnet, welche zur Erholung in die Heimat beurlaubt, in Bäder und Genesungsheime geschickt, oder welche als dienstunbrauchbar bezw. invalide entlassen so-

wie auch den Zivilbehörden oder Irrenanstalten überwiesen wurden. Diese Leute sind also nicht sämtlich aus der Armee ausgeschieden, sondern zum Teil dem Dienst erhalten geblieben.

Wie der Abgang sich in den letzten 10 Jahren gestaltet hat, läßt folgende Übersicht erkennen:

| Von je 1000 der Behandelten sind ausgeschieden aus der militär-ärztlichen Behandlung | 1893/94 | 1894/95 | 1895/96 | 1896/97 | 1897/98 | 1898/99 | 1899/1900 | 1900/01 | 1901/02 | 1902/03 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| als dienstfähig | 917,3 | 908,6 | 908,8 | 929,8 | 922,3 | 924,1 | 924,2 | 917,8 | 910,4 | 926,4 |
| „ gestorben | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| „ anderweitig | 48,8 | 51,5 | 57,2 | 50,2 | 56,8 | 55,3 | 54,8 | 58,9 | 65,7 | 49,5 |

1. Abgang als dienstfähig.

Von je 1000 der insgesamt Behandelten sind 926,4 als dienstfähig entlassen worden. Die entsprechenden Zahlen für die einzelnen Truppengattungen und Armeekorps sind aus folgenden Zusammenstellungen ersichtlich:

| Truppengattungen ¹⁾ | $\frac{0}{0}$ der Behandelten |
|--|-------------------------------|
| Kriegsschulen | 1000,0 |
| Maschinengewehr-Abteilungen | 964,9 |
| Unteroffiziersvorschulen | 958,8 |
| Unteroffizierschulen | 939,5 |
| Train | 939,4 |
| Militär-Veterinär-Akademie | 937,5 |
| Artillerie-Prüfungs-Kommission | 936,9 |
| Pioniere | 934,5 |
| Militär-Bäcker-Abteilungen | 934,2 |
| Fußartillerie | 933,9 |
| Feldartillerie | 932,6 |
| Verkehrstruppen | 932,0 |
| Kavallerie | 928,8 |
| Sonstige | 924,7 |
| Infanterie | 923,9 |
| Landwehrstämme | 915,2 |
| Kadettenanstalten | 909,1 |
| Militär-Krankenwärter | 907,2 |
| Festungsgefängnisse | 903,6 |
| Bekleidungsämter | 899,6 |
| Arbeiter-Abteilungen bezw. Disziplinar-Abteilung | 874,8 |
| Oberfeuerwerkerschule | 750,0 |

¹⁾ Wegen der im Vergleich zum Vorjahr nicht aufgeführten Truppengattungen siehe Vorbemerkung 3.

| Armeekorps | $\frac{0}{0}$ der Behandelten |
|--|-------------------------------|
| I. Armeekorps | 941,8 |
| XI. „ | 940,3 |
| V. „ | 936,9 |
| XIV. „ | 934,7 |
| II. „ | 932,8 |
| IX. „ | 930,4 |
| Gardekorps | 928,1 |
| XVI. Armeekorps | 926,6 |
| III. „ | 926,3 |
| XV. „ | 926,1 |
| XVII. „ | 925,7 |
| XVIII. „ | 923,1 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 922,0 |
| XIX. (2. K. S.) „ | 921,3 |
| VIII. Armeekorps | 921,0 |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | 921,0 |
| IV. Armeekorps | 918,3 |
| VII. „ | 917,1 |
| X. „ | 914,4 |
| VI. „ | 906,3 |
| III. Königl. Bayer. Armeekorps | 956,1 |
| II. „ „ „ | 948,0 |
| I. „ „ „ | 935,7 |

2. Abgang durch Tod.

Von den militärärztlich behandelten Mannschaften sind 745 = $2,2 \frac{0}{0}$ der Behandelten gestorben.

Die Todesursache war

bei 660 = $2,0 \frac{0}{0}$ der Behandelten Krankheit,
„ 53 = $0,16$ „ „ „ Unglücksfall,
„ 32 = $0,10$ „ „ „ Selbstmord.

Das Verhältnis der in militärärztlicher Behandlung Gestorbenen zu den Behandelten in den einzelnen Armeekorps ist in nachstehender Tabelle veranschaulicht. Danach hat das X. Armeekorps den größten, das IX. Armeekorps hingegen den geringsten Verlust durch Tod gehabt.

| Armeekorps | Zahl der Behandelten | | davon sind gestorben | |
|----------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------|
| | absolut | ‰ K. | absolut | ‰ der Behandelten |
| X. Armeekorps . . . | 12 548 | 572,6 | 46 | 3,7 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 11 102 | 556,0 | 34 | 3,1 |
| VI. Armeekorps . . . | 14 243 | 551,7 | 41 | 2,9 |
| V. " . . . | 14 498 | 566,0 | 36 | 2,5 |
| | 331) | | | |
| XVII. " . . . | 15 727 | 531,2 | 39 | 2,5 |
| XVIII. " . . . | 16 770 | 638,0 | 42 | 2,5 |
| Gardekorps . . . | 29 620 | 716,2 | 68 | 2,3 |
| IV. Armeekorps . . . | 12 701 | 567,9 | 29 | 2,3 |
| VII. " . . . | 17 136 | 635,7 | 39 | 2,3 |
| XIV. " . . . | 19 475 | 611,9 | 45 | 2,3 |
| VIII. " . . . | 19 389 | 721,5 | 43 | 2,2 |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | 17 293 | 781,7 | 38 | 2,2 |
| I. Armeekorps . . . | 22 456 | 709,6 | 48 | 2,1 |
| III. " . . . | 12 693 | 539,7 | 27 | 2,1 |
| XI. " . . . | 15 383 | 740,7 | 30 | 2,0 |
| XVI. " . . . | 19 250 | 704,9 | 38 | 2,0 |
| | 36 ¹⁾) | | | |
| II. " . . . | 18 060 | 698,9 | 34 | 1,9 |
| XV. " . . . | 19 527 | 625,3 | 32 | 1,6 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 12 130 | 589,1 | 19 | 1,6 |
| IX. Armeekorps . . . | 13 500 | 541,1 | 17 | 1,3 |
| Armee . . . | 333 501 | 633,4 | 745 | 2,2 |

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind 346 Mann gestorben, und zwar:

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| durch Krankheit | 29 = 83,8 ‰ | } der außerhalb militär- ärztlicher Behandlung Gestorbenen. |
| " Unglücksfall | 86 = 248,6 ‰ | |
| " Selbstmord | 231 = 667,6 ‰ | |

Die Gesamtzahl aller Todesfälle — innerhalb und außerhalb der militärärztlichen Behandlung — belief sich auf 1091 = 2,1 ‰ K.

Davon waren verursacht

| | |
|-----------------|-----------------|
| durch Krankheit | 689 = 1,3 ‰ K., |
| " Verunglückung | 139 = 0,26 ‰ |
| " Selbstmord | 263 = 0,50 ‰ |

Seit dem Jahre 1873/74, also innerhalb von 30 Jahren, hat sich die Zahl der Todesfälle von 6,7 auf 2,1 ‰ K. — d. h. um 68,7 ‰ — verringert.

Es starben:

| Berichtszeitraum | in militär-ärztlicher Behandlung | | innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung | |
|-----------------------------|----------------------------------|------|--|------|
| | absolute Zahl | ‰ K. | absolute Zahl | ‰ K. |
| im Durchschnitt der 5 Jahre | | | | |
| 1881/82 bis 1885/86 | 1079,8 | 2,9 | 1549,0 | 4,1 |
| 1886/87 " 1890/91 | 974,0 | 2,3 | 1379,4 | 3,3 |
| 1891/92 " 1895/96 | 930,4 | 2,0 | 1323,4 | 2,8 |
| 1896/97 " 1900/01 | 829,6 | 1,6 | 1158,8 | 2,2 |
| im Jahre 1901/02 | 724 | 1,3 | 1060 | 2,0 |
| im Jahre 1902/03 | 745 | 1,4 | 1091 | 2,1 |

¹⁾ Siehe Anmerkung ¹⁾ auf Seite 38.

Vorstehende Tabelle gestattet einen Vergleich der Sterblichkeit in der Armee während der letzten 22 Jahre.

Die Verteilung der Todesfälle auf die einzelnen Truppengattungen¹⁾ ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht.

Es starben von

| | ‰ K. |
|--|------|
| den Militär-Krankenwärttern | 3,5 |
| " Festungsgefängnissen | 2,8 |
| " Maschinengewehr-Abteilungen | 2,7 |
| " Landwehrstämmen | 2,7 |
| " Pionieren | 2,6 |
| der Kavallerie | 2,4 |
| " Feldartillerie | 2,3 |
| dem Train | 2,3 |
| der Infanterie | 2,0 |
| " Fußartillerie | 1,8 |
| den Unteroffizierschulen | 1,8 |
| " Bekleidungsämtern | 1,6 |
| " Verkehrstruppen | 1,5 |
| der Oberfeuerwerkerschule | — |
| " Artillerie-Prüfungs-Kommission | — |
| den Kriegsschulen | — |
| " Arbeiter-Abteilungen bezw. der Disziplinar- Abteilung | — |
| " Kadettenanstalten | — |
| " den Unteroffiziersvorschulen | — |
| " Militär-Bäcker-Abteilungen | — |
| der Militär-Veterinär-Akademie | — |
| den Sonstigen | — |

Über das Dienstalter der Verstorbenen gibt die folgende Übersicht Auskunft.

Von je 1000 der Verstorbenen

| gehörten an | zu- sammen | davon waren gestorben infolge von | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | Krank- heit | Unglücks- fall | Selbst- mord |
| dem 1. Dienstjahre | 473,9 | 298,8 | 53,2 | 121,9 |
| " 2. " | 318,1 | 212,6 | 55,0 | 50,4 |
| " 3. " | 68,7 | 41,2 | 13,7 | 13,7 |
| " 4. " | 26,6 | 11,9 | 2,8 | 11,9 |
| höheren Dienstjahren | 112,7 | 66,9 | 2,8 | 43,1 |
| Summe | — | 631,5 | 127,4 | 241,1 |

Die meisten Todesfälle ereigneten sich der Gesamtzahl nach auch in diesem Berichtsjahre bei den Mannschaften des 1. Dienstjahres.

Im Verhältnis zu 1000 der Iststärke betrug bei den einzelnen Armeekorps und bei der Armee der Abgang durch Tod, getrennt nach den einzelnen Todesarten:

¹⁾ Siehe Anmerkung ¹⁾ auf Seite 164.

| Armeekorps | zu- sammen | davon durch | | | Armeekorps | zu- sammen | davon durch | | |
|----------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | Krank- heit | Unglücks- fall | Selbst- mord | | | Krank- heit | Unglücks- fall | Selbst- mord |
| Gardekorps | 2,0 | 1,6 | 0,27 | 0,07 | XIV. Armeekorps | 1,9 | 1,4 | 0,19 | 0,41 |
| I. Armeekorps | 2,2 | 1,4 | 0,35 | 0,44 | XV. " | 1,5 | 0,90 | 0,29 | 0,29 |
| II. " | 2,1 | 1,2 | 0,39 | 0,46 | XVI. " | 2,2 | 1,3 | 0,26 | 0,62 |
| III. " | 2,3 | 0,94 | 0,51 | 0,81 | XVII. " | 2,1 | 1,4 | 0,17 | 0,57 |
| IV. " | 2,2 | 1,1 | 0,31 | 0,80 | XVIII. " | 2,2 | 1,5 | 0,23 | 0,49 |
| V. " | 2,0 | 1,2 | 0,27 | 0,51 | XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 1,5 | 0,83 | 0,24 | 0,39 |
| VI. " | 2,4 | 1,4 | 0,27 | 0,70 | Armee | 2,1 | 1,3 | 0,26 | 0,50 |
| VII. " | 1,8 | 1,3 | 0,37 | 0,19 | I. B. Bayer. Armeekorps | 2,2 | 1,5 | 0,49 | 0,22 |
| VIII. " | 2,1 | 1,6 | 0,15 | 0,41 | II. " " " | 1,8 | 1,4 | 0,38 | 0,33 |
| IX. " | 1,2 | 0,72 | 0,08 | 0,36 | III. " " " | 2,5 | 2,0 | 0,38 | 0,57 |
| X. " | 3,0 | 1,9 | 0,18 | 0,91 | | | | | |
| XI. " | 2,5 | 1,3 | 0,39 | 0,77 | | | | | |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 2,5 | 1,6 | 0,35 | 0,35 | | | | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps . | 2,3 | 1,3 | 0,41 | 0,59 | | | | | |

a. Todesfälle durch Krankheiten.

Infolge von Krankheiten starben:

1. innerhalb der militärärztlichen Behandlung 660 Mann = $2,0 \frac{0}{0}$ aller Behandelten,
2. außerhalb der militärärztlichen Behandlung 29 Mann = $83,8 \frac{0}{0}$ der insgesamt außerhalb der militärärztlichen Behandlung Verstorbenen.

Die Gesamtzahl der Todesfälle durch Krankheiten beträgt demnach 689 Mann = $1,3 \frac{0}{0}$ K.

Auf die einzelnen Armeekorps verteilen sich die Zahlen folgendermaßen:

| Armeekorps | innerhalb der militärärztlichen Behandlung | $\frac{0}{0}$ K. | $\frac{0}{0}$ der Behandelten | außerhalb der militärärztlichen Behandlung | $\frac{0}{0}$ K. | $\frac{0}{0}$ der überhaupt außerhalb der militärärztlichen Behandlung Verstorbenen |
|---------------------------|--|------------------|----------------------------------|--|------------------|---|
| G. | 65 | 1,6 | 2,2 | 3 | 0,07 | 214,3 |
| I. | 42 | 1,3 | 1,9 | 2 | 0,06 | 95,2 |
| II. | 31 | 1,2 | 1,7 | 1 | 0,04 | 50,0 |
| III. | 21 | 0,89 | 1,7 | 1 | 0,01 | 38,5 |
| IV. | 24 | 1,1 | 1,9 | 1 | 0,04 | 47,6 |
| V. | 32 | 1,2 | 2,2 | — | — | — |
| VI. | 36 | 1,4 | 2,5 | 1 | 0,04 | 47,6 |
| VII. | 34 | 1,3 | 2,0 | — | — | — |
| VIII. | 40 | 1,5 | 2,1 | 2 | 0,07 | 142,9 |
| IX. | 17 | 0,68 | 1,3 | 1 | 0,04 | 83,3 |
| X. | 41 | 1,9 | 3,3 | — | — | — |
| XI. | 26 | 1,3 | 1,7 | 1 | 0,05 | 47,6 |
| XII. (1. K. S.) | 33 | 1,7 | 3,0 | 3 | 0,15 | 187,5 |
| XIII. (K. W.) | 28 | 1,3 | 1,6 | 1 | 0,05 | 76,9 |
| XIV. | 40 | 1,3 | 2,1 | 3 | 0,09 | 176,5 |
| XV. | 28 | 0,90 | 1,4 | — | — | — |
| XVI. | 33 | 1,2 | 1,7 | 2 | 0,07 | 95,2 |
| XVII. | 34 | 1,1 | 2,2 | 6 | 0,20 | 260,9 |
| XVIII. | 38 | 1,4 | 2,3 | 1 | 0,04 | 62,5 |
| XIX. (2. K. S.) | 17 | 0,83 | 1,4 | — | — | — |
| Armee | 660 | 1,3 | 2,0 | 29 | 0,06 | 83,8 |
| I. Kgl. Bayer. | 32 | 1,4 | 1,4 | 2 | 0,09 | 153,8 |
| II. " " | 25 | 1,2 | 1,3 | — | — | — |
| III. " " | 29 | 1,6 | 1,8 | 3 | 0,16 | 166,7 |

Über die Sterblichkeit durch Krankheiten bei den verschiedenen Truppengattungen gibt die folgende Übersicht Aufschluss.

Die Militär-Krankenwärter, Festungsgefängnisse und Maschinengewehr-Abteilungen hatten den grössten Verlust der im Berichtsjahr durch Krankheiten vorgekommenen Todesfälle.

| Truppengattungen. ¹⁾ | $\frac{0}{0}$ K. |
|---------------------------------------|------------------|
| Militär-Krankenwärter | 2,8 |
| Festungsgefängnisse | 2,8 |
| Maschinengewehr-Abteilungen | 2,7 |
| Landwehrstämme | 1,6 |
| Feldartillerie | 1,4 |
| Pioniere | 1,4 |

¹⁾ Siehe Anmerkung ¹⁾ auf Seite 164.

| | |
|--------------------------------|------|
| Train | 0,91 |
| Landwehrstämme | 0,80 |
| Kavallerie | 0,64 |
| Infanterie | 0,50 |
| Unteroffizierschulen | 0,46 |
| Feldartillerie | 0,45 |
| Pioniere | 0,36 |
| Fufsartillerie | 0,33 |
| Verkehrstruppen | 0,33 |

Was die Art der Selbstmorde betrifft, so endeten durch:

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Erschießen | 121 Mann = 46,0 | } % aller Selbst- mörder. |
| Erhängen | 75 „ = 28,5 | |
| Ertränken | 31 „ = 11,8 | |
| Überfahrenlassen | 21 „ = 8,0 | |
| Schnitt, Hieb und Stich | 8 „ = 3,0 | |
| Sturz in die Tiefe | 4 „ = 1,5 | |
| Vergiften | 3 „ = 1,1 | |

Weitere für die Selbstmordstatistik in Betracht kommende Angaben sind in den Tabellen des II. Teils enthalten (siehe S. 127* ff.).

d. Anhang.

410 mal (= 37,6% der während des Berichtsjahres vorgekommenen Todesfälle) wurde die Leichenöffnung vorgenommen.

Dabei ergab sich als Todesursache:

| | |
|---|-------|
| Scharlach | 3mal, |
| Rose | 2 „ |
| Karbunkel | 1 „ |
| Hospitalbrand, Pyämie, Septikämie | 9 „ |
| Unterleibstypus | 21 „ |
| Grippe | 4 „ |
| Akute Miliartuberkulose | 12 „ |
| Tuberkulose der ersten Luftwege und Lunge | 25 „ |
| Tuberkulose anderer Organe | 8 „ |
| Epidemische Genickstarre | 5 „ |
| Wundstarrkrampf | 1 „ |
| Akuter Gelenkrheumatismus | 3 „ |
| Blutarmut | 1 „ |
| Purpura | 1 „ |
| Zuckerruhr | 6 „ |
| Vergiftung durch Gase | 1 „ |
| „ „ andere Gifte | 1 „ |
| Hitzschlag | 1 „ |
| Bösartige Geschwülste | 8 „ |
| Geisteskrankheiten | 3 „ |
| Fallsucht | 2 „ |
| Hirnhautentzündung | 12 „ |
| Krankheiten des Gehirns | 9 „ |
| Rückenmarksentzündungen | 2 „ |
| Andere Krankheiten des Nervensystems | 1 „ |
| Akute Lungenentzündung | 34 „ |
| Lungenblutung | 1 „ |

| | |
|---|-------|
| Brustfellentzündung und Ausgänge, ausschl. No. 19 des Rapportmusters | 6mal, |
| Andere Krankheiten der Atmungsorgane | 1 „ |
| Entzündung des Herzbeutels | 2 „ |
| Erkrankung der Herzklappen | 1 „ |
| Andere Herzkrankheiten | 7 „ |
| Vereiterung der Lymphdrüsen | 1 „ |
| Leukämie | 1 „ |
| Perniziöse Anämie | 2 „ |
| Mandelentzündung | 2 „ |
| Andere Mund- und Rachenkrankheiten | 1 „ |
| Magenblutung bzw. Magengeschwür | 1 „ |
| Brechdurchfall | 2 „ |
| Innerer Darmverschluss | 5 „ |
| Darm-, Blinddarm-entzündung | 7 „ |
| Bauchfellentzündung und Ausgänge | 13 „ |
| Krankheiten der Leber und deren Ausführungsgänge | 2 „ |
| Akute und chronische Nierenentzündung | 9 „ |
| Krankheiten des mittleren und inneren Ohrs | 2 „ |
| Zellgewebsentzündung und Ausgänge | 1 „ |
| Entzündung der Knochenhaut und Knochen | 1 „ |
| Chronische Gelenkentzündung | 1 „ |
| Quetschung der Weichteile | 1 „ |
| „ innerer Organe | 3 „ |
| Zerreiſung innerer Organe | 8 „ |
| Knochenbruch des Unterschenkels | 1 „ |
| „ „ Kopfes | 10 „ |
| „ „ der Rippen | 1 „ |
| Schufsverletzungen | 76 „ |
| Erstickung a) durch Ertrinken | 13 „ |
| b) „ Erhängen | 33 „ |
| c) „ andere Ursachen | 2 „ |
| Überfahrenwerden | 6 „ |
| Stich-, Schnitt- und Quetschwunden | 7 „ |
| Sturz in die Tiefe | 2 „ |
| Verbrennung | 1 „ |
| Erfrierung | 1 „ |

3. Anderweitiger Abgang.

| | |
|--|------|
| 16 495 Mann schieden als „anderweitig“ aus der militärärztlichen Behandlung, und zwar wurden | |
| in die Heimat beurlaubt | 259 |
| in Kurorte oder Genesungsheime entsendet | 2611 |
| den Zivilbehörden überwiesen | 7 |
| den Irrenanstalten überwiesen | 8 |
| als dienstunbrauchbar entlassen | 3044 |
| als halbinvalide entlassen | 503 |
| als ganzinvalide entlassen | 3578 |
| nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 5166 |
| bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 998 |
| aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 321 |

a. Abgang durch Dienstunbrauchbarkeit.

Als dienstunbrauchbar wurden im ganzen 7163 Mann = 13,6‰ K. entlassen, und zwar 3044 unmittelbar aus der militärärztlichen Behandlung, während die übrigen zum Teil vorher aus der militärärztlichen Behandlung zu ihren Truppenteilen zurückgetreten, zum Teil auch einer Behandlung gar nicht bedürftig gewesen waren.

Seit dem Jahre 1894/95 werden die Mannschaften, welche alsbald nach der Einstellung in das Heer für körperlich untauglich zum aktiven Militärdienste befunden und entlassen sind, gesondert von den übrigen Dienstunbrauchbaren verrechnet.

Unter dieser Gattung sind geführt:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| im Jahre 1894/95 | 7697 Mann = 15,2‰ K., |
| „ „ 1895/96 | 8028 „ = 15,6 „ |
| „ „ 1896/97 | 8456 „ = 16,4 „ |
| „ „ 1897/98 | 8985 „ = 17,5 „ |
| „ „ 1898/99 | 6079 „ = 11,8 „ |
| „ „ 1899/1900 | 5568 „ = 10,7 „ |
| „ „ 1900/01 | 5452 „ = 10,3 „ |
| „ „ 1901/02 | 5209 „ = 9,6 „ |

im Jahre 1902/03 5315 Mann = 10,1‰ K.

Unter Hinzurechnung der später entlassenen Dienstunbrauchbaren sind demnach im Jahre 1902/03 als zum Dienst im stehenden Heere körperlich untauglich ohne Gewährung einer Invalidenpension im ganzen 12 478 Mann ausgeschieden. In den vorausgegangenen 21 Jahren verhielten sich die entsprechenden Ziffern, wie folgt:

Es wurden im ganzen als dienstunbrauchbar entlassen im Durchschnitt der Jahre

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1881/82 bis 1885/86 | 7 801,6 Mann = 20,7‰ K., |
| 1886/87 „ 1890/91 | 8 584,4 „ = 20,6 „ |
| 1891/92 „ 1895/96 | 10 874,0 „ = 23,0 „ |
| 1896/97 „ 1900/01 | 12 541,0 „ = 24,2 „ |
| im Jahre 1901/02 | 12 393 „ = 22,9 „ |

im Jahre 1902/03 12 478 Mann = 23,7‰ K.

In den folgenden Tabellen sind nur diejenigen Unteroffiziere und Mannschaften berücksichtigt, welche während ihrer Dienstzeit unbrauchbar geworden sind. Über die gleich nach der Einstellung als untauglich Entlassenen enthält der II. Teil des Berichtes (S. 91*—96*) die erforderlichen Angaben.

Die Verluste der einzelnen Truppengattungen durch Abgang an Dienstunbrauchbaren betragen, auf je 1000 der betreffenden Iststärke berechnet, bei:

| | |
|---|-----------|
| den Arbeiter-Abteilungen bzw. der Disziplinar-Abteilung | 62,1‰ K., |
| den Festungsgefängnissen | 40,8 „ |
| der Infanterie | 15,5 „ |
| den Pionieren | 14,1 „ |
| der Fufsartillerie | 12,4 „ |
| den Bekleidungsämtern | 12,4 „ |

| | |
|---|-----------|
| den Militärkrankenwärtern | 12,0‰ K., |
| dem Train | 11,4 „ |
| den Unteroffizierschulen | 11,0 „ |
| der Feldartillerie | 9,9 „ |
| der Kavallerie | 8,7 „ |
| den Verkehrstruppen | 8,0 „ |
| den Landwehrstämmen | 3,5 „ |
| den Maschinengewehr-Abteilungen | 1,3 „ |
| den Militär-Bäcker-Abteilungen | 1,2 „ |

Der Abgang bei den einzelnen Armeekorps während des Berichtsjahres ist aus folgenden Ziffern ersichtlich:

| Armeekorps | ‰ K. | Armeekorps | ‰ K. |
|-------------------------|------|---------------------------|------|
| XIII. (K. W.) | 21,1 | III. | 11,7 |
| VIII. | 19,1 | VI. | 11,6 |
| XVIII. | 17,6 | XIX. (2. K. S.) | 11,5 |
| XI. | 17,2 | X. | 11,4 |
| XVI. | 16,3 | XVII. | 10,5 |
| XV. | 15,9 | I. | 10,4 |
| IX. | 15,8 | XII. (1. K. S.) | 10,1 |
| IV. | 13,4 | G. | 9,8 |
| XIV. | 13,4 | | |
| II. | 13,0 | I. K. B. | 18,1 |
| V. | 12,8 | II. „ | 17,2 |
| VII. | 12,2 | III. „ | 12,7 |

Es standen

| | | |
|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| im 1. Dienstjahre | 88,2 | } % aller Dienstunbrauchbaren. |
| „ 2. „ | 9,4 | |
| „ 3. „ | 1,5 | |
| in höheren Dienstjahren | 0,84 | |

Unter den Entlassenen befanden sich 50 = 0,70‰ der Gesamtzahl Unteroffiziere, 356 = 5,0‰ Einjährig-Freiwillige und 724 = 10,1‰ Zwei-, Drei- und Vierjährig-Freiwillige.

Von der Gesamtzahl der Dienstunbrauchbaren schieden aus:

| | |
|---|----------|
| auf Grund der Anlage 1 zu § 4 der H. O. | 77 Mann, |
| „ „ „ „ 2 „ § 7 „ „ | 138 „ |
| „ „ „ „ 3 „ § 8 „ „ | 946 „ |
| „ „ „ „ 4a „ § 9 „ „ | 2422 „ |
| „ „ „ „ 4b „ § 9 „ „ | 2769 „ |
| aufserdem Mindermafs | 1 „ |
| auf Grund der Beilage IIa der D. A. v. 1. 2. 94 | 335 „ |
| „ „ „ „ IIb „ „ „ „ | 475 „ |

7163 Mann.

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Krankheiten und Fehler verzeichnet, welche hauptsächlich Ursache der Dienstunbrauchbarkeit waren.

Die Krankheiten der Atmungsorgane und des Sehapparates weisen die höchste Zahl auf.

| Von den als dienstunbrauchbar Entlassenen sieden aus wegen | | Krankheiten der Atmungsorgane | | Krankheiten u. Fehler des Sehapparates | | | Unter- leibs- brüche | Herz- krank- heiten | Ohrenkrankheiten | | Ge- lenk- er- kran- kun- gen | Allgemeiner Körper- schwäche, schwachen Knochen- und Muskel- baues, schwacher Brust |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|---|
| | | im gan- zen | darunter Fehler und chronische Krankheiten der Lungen und des Brustfelles | im gan- zen | darunter | | | | im gan- zen | darunter erhebliche, schwer heil- bare Krank- heitszustände des Gehör- apparates | | |
| | | | | | Herabsetzung der Sehschärfe | Kurzichtigkeit | | | | | | |
| Es gehörten an | dem 1. Dienstjahre | 606 | 186 | 607 | 430 | 39 | 411 | 563 | 467 | 353 | 359 | 261 |
| | dem 2. Dienstjahre | 54 | 16 | 19 | 5 | — | 150 | 23 | 37 | 28 | 27 | 9 |
| | dem 3. Dienstjahre | 4 | 3 | 2 | — | — | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | — |
| | dem 4. und höheren Dienstjahren | 5 | 2 | 1 | — | — | 6 | 2 | — | — | 2 | — |
| waren erkrankt | vor dem Diensteantritt | 555 | 163 | 607 | 432 | 39 | 274 | 533 | 477 | 362 | 346 | 259 |
| | während der Dienstzeit | 114 | 44 | 22 | 3 | — | 319 | 57 | 29 | 21 | 47 | 11 |
| Summe | absolut | 669 | 207 | 629 | 435 | 39 | 593 | 590 | 506 | 383 | 393 | 270 |
| | ‰ aller Dienstunbrauchbaren | 9,3 | 2,9 | 8,8 | 6,1 | 0,54 | 8,3 | 8,2 | 7,1 | 5,3 | 5,5 | 3,8 |
| | in ‰ K. der Armee | 1,3 | 0,39 | 1,2 | 0,83 | 0,07 | 1,1 | 1,1 | 0,96 | 0,73 | 0,75 | 0,51 |

b. Abgang durch Halbinvalidität.

Als halbinvalide wurden im ganzen 3924 Mann = 7,5 ‰ K. entlassen. Von diesen befanden sich 503 Mann = 12,8 ‰ bis zu ihrer Entlassung in militärärztlicher Behandlung.

Die Zahl der Halbinvaliden zeigt eine Zunahme um 1,2 ‰ K.

Wie sich der Abgang an Halbinvaliden, auf 1000 der Iststärke berechnet, während der vorausgegangenen 21 Jahre gestaltet hat, zeigt folgende Übersicht:

Es wurden entlassen

| | |
|--|-----------|
| im Jahre 1881/82 bis 1885/86 | 3,2 ‰ K., |
| „ „ 1886/87 „ 1890/91 | 4,7 „ |
| „ „ 1891/92 „ 1895/96 | 6,3 „ |
| „ „ 1896/97 „ 1900/01 | 6,8 „ |
| „ „ 1901/02 | 6,9 „ |
| im Jahre 1902/03 | 7,5 ‰ K. |

Von den einzelnen Waffengattungen verloren (auf 1000 der Iststärke berechnet):

| | |
|--|------------|
| die Arbeiter-Abteilungen bezw. Disziplinar- Abteilung | 16,7 ‰ K., |
| „ Unteroffiziersvorschulen | 12,3 „ |
| der Train | 10,8 „ |
| die Sonstigen | 10,0 „ |
| „ Pioniere | 8,7 „ |
| „ Verkehrsstruppen | 8,5 „ |
| „ Kavallerie | 8,3 „ |
| „ Landwehrstämme | 7,9 „ |
| „ Feldartillerie | 7,4 „ |
| „ Fußartillerie | 7,1 „ |

| | |
|---|-----------|
| die Infanterie | 7,3 ‰ K., |
| „ Bekleidungsämter | 5,9 „ |
| „ Militär-Bäcker-Abteilungen | 5,8 „ |
| „ Festungsgefängnisse | 4,5 „ |
| „ Unteroffizierschulen | 4,4 „ |
| „ Militärkrankenwärter | 4,2 „ |
| „ Maschinengewehr-Abteilungen | 1,3 „ |

Bei den einzelnen Armeekorps stellte sich der Abgang — ebenfalls auf 1000 Mann der Iststärke berechnet — wie folgt:

| Armeekorps | ‰ K. | Armeekorps | ‰ K. |
|----------------|------|---------------------------|------|
| IV. | 10,6 | VIII. | 7,0 |
| G. | 9,6 | XV. | 6,9 |
| I. | 9,0 | XVII. | 6,8 |
| XVIII. | 8,9 | XIII. (K. W.) | 6,5 |
| X. | 8,7 | XIV. | 6,5 |
| VII. | 8,1 | XII. (1. K. S.) | 5,0 |
| IX. | 7,5 | V. | 4,9 |
| III. | 7,4 | XIX. (2. K. S.) | 4,7 |
| VI. | 7,3 | I. K. B. | 7,5 |
| XVI. | 7,3 | II. „ | 6,8 |
| II. | 7,2 | III. „ | 5,7 |
| XI. | 7,2 | | |

Von den Halbinvaliden gehörten an:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| dem 1. und 2. Dienstjahre | 1728 = 44,0 ‰, |
| „ 3. „ 4. „ | 244 = 6,2 „ |
| „ 5. bis 8. „ | 104 = 2,7 „ |
| „ 9. „ 12. „ | 166 = 4,2 „ |
| den höheren Dienstjahren | 1682 = 42,9 „ |

Dem Dienstgrade nach waren unter den Halbinvaliden 1992 = 50,8 ‰ Unteroffiziere und 1932 = 49,2 ‰ Gefreite und Gemeine.

Die nachstehende Übersicht führt diejenigen Gebrechen auf, durch welche die Halbinvalidität hauptsächlich bedingt wurde.

Es schieden aus

| w e g e n | absolute Zahl | o/o aller Halbinvaliden | o/o K. |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Unterleibsbrüche, die durch ein Bruchband zurückgehalten werden können | 1076 | 27,4 | 2,0 |
| Schwäche eines größeren Gelenks und chronischer Gelenkerkrankungen . . . | 571 | 14,6 | 1,1 |
| objektiv nachweisbarer, chronischer Unterleibsleiden, ohne wesentliche Beeinträchtigung des allgemeinen Körperzustandes | 388 | 9,9 | 0,74 |
| stärkerer zylindrischer Erweiterung der Blutadern | 348 | 8,9 | 0,66 |
| andauernder Schwäche eines größeren Gliedes nach Verletzung | 307 | 7,8 | 0,58 |
| übermäßiger Fettleibigkeit | 223 | 5,7 | 0,42 |
| Schwächung des Körpers im allgemeinen | 222 | 5,7 | 0,42 |
| asthmatischer Beschwerden geringeren Grades | 221 | 5,6 | 0,42 |
| den Waffengebrauch erschwerender Steifheit oder Krümmung eines Fingers | 149 | 3,8 | 0,28 |

c. Abgang durch Ganzinvalidität.

Der Abgang infolge von Ganzinvalidität betrug im vorliegenden Berichtsjahre 6814 Mann = 12,9^o/_o K.

Während der letzten 21 Jahre betrug der Abgang wie folgt:

| | |
|------------------------------|---|
| im Jahre 1881/82 bis 1885/86 | 1988,8 Mann = 5,3 ^o / _o K., |
| „ „ 1886/87 „ 1890/91 | 2978,2 „ = 7,2 „ |
| „ „ 1891/92 „ 1895/96 | 4646,4 „ = 9,8 „ |
| „ „ 1896/97 „ 1900/01 | 5648,2 „ = 10,9 „ |
| „ „ 1901/02 | 6430 „ = 11,9 „ |

im Jahre 1902/03 6814 Mann = 12,9^o/_o K.

Von der Gesamtzahl der Entlassenen (6814) befanden sich 3578 = 52,5^o/_o bis zu ihrer Entlassung in militärärztlicher Behandlung.

Die einzelnen Truppengattungen¹⁾ ordnen sich nach der Höhe ihres Abganges an Ganzinvaliden (auf 1000 der Iststärke berechnet) wie folgt:

| | |
|---|--------------------------------------|
| Arbeiter-Abteilungen bzw. Disziplinar-Abteilung | 31,0 ^o / _o K., |
| Kadettenanstalten | 22,7 „ |
| Pioniere | 16,9 „ |
| Festungsgefängnisse | 16,2 „ |
| Train | 14,9 „ |

1) Siehe Anmerkung 1) auf Seite 164.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Militärkrankenwärter | 14,9 ^o / _o K., |
| Landwehrstämme | 14,5 „ |
| Kavallerie | 14,1 „ |
| Feldartillerie | 13,5 „ |
| Fufsartillerie | 13,1 „ |
| Infanterie | 12,5 „ |
| Bekleidungsämter | 12,4 „ |
| Unteroffiziersvorschulen | 12,3 „ |
| Verkehrstruppen | 12,1 „ |
| Unteroffizierschulen | 9,7 „ |
| Militär-Bäcker-Abteilungen | 8,2 „ |
| Militär-Veterinär-Akademie | 7,1 „ |
| Maschinengewehr-Abteilungen | 6,7 „ |
| Sonstige | 3,3 „ . |

Das Gardekorps und II. Armeekorps haben die höchsten Verlustziffern aufzuweisen. Das Nähere ergibt sich aus folgender Zusammenstellung, welche zum Vergleich auch die Zahlen des Vorjahres enthält:

| 1901/02 | | 1902/03 | |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Armeekorps | o/o K. | Armeekorps | o/o K. |
| VI. | 17,6 | G. | 18,2 |
| XIII. (K. W.) | 16,3 | II. | 15,5 |
| VIII. | 15,1 | VIII. | 15,1 |
| G. | 14,5 | XI. | 14,7 |
| X. | 14,3 | VII. | 14,6 |
| I. | 13,8 | X. | 13,9 |
| II. | 13,1 | VI. | 13,7 |
| III. | 12,0 | I. | 13,3 |
| XI. | 11,8 | III. | 13,1 |
| VII. | 11,6 | XIII. (K. W.) | 13,1 |
| XVIII. | 10,4 | XVI. | 13,0 |
| XVII. | 10,8 | XVII. | 12,7 |
| XIX. (2. K. S.) | 10,4 | IX. | 11,8 |
| XVI. | 9,8 | IV. | 11,4 |
| V. | 9,7 | XV. | 11,4 |
| XIV. | 9,4 | XIV. | 10,8 |
| XV. | 9,2 | XVIII. | 10,8 |
| IV. | 8,8 | XII. (1. K. S.) | 9,9 |
| IX. | 8,8 | XIX. (2. K. S.) | 9,9 |
| XII. (1. K. S.) | 8,7 | V. | 9,0 |
| III. K. B. | 13,5 | I. K. B. | 17,1 |
| II. „ „ | 12,2 | II. „ „ | 15,0 |
| I. „ „ | 11,6 | III. „ „ | 14,0 |

Von den Ganzinvaliden waren:

| | |
|--------------------------------|---|
| Unteroffiziere | 1174 = 17,2 ^o / _o , |
| Gefreite und Gemeine | 5640 = 82,8 „ . |

Davon gehörten an:

| | |
|---------------------------|---|
| dem 1. und 2. Dienstjahre | 4974 = 73,0 ^o / _o , |
| „ 3. „ 4. „ | 789 = 11,6 „ |
| „ 5. bis 8. „ | 288 = 4,2 „ |
| „ 9. „ 12. „ | 196 = 2,9 „ |
| den höheren Dienstjahren | 567 = 8,3 „ . |

Von je 1000 Mann der als ganzinvalide Entlassenen waren

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-------|--------|-------|
| erwerbsfähig | 1,2 | | | | |
| teilweise erwerbsunfähig | <table> <tr> <td>dauernd</td> <td>100,3</td> </tr> <tr> <td>zeitig</td> <td>202,1</td> </tr> </table> | dauernd | 100,3 | zeitig | 202,1 |
| dauernd | 100,3 | | | | |
| zeitig | 202,1 | | | | |
| größtenteils „ | <table> <tr> <td>dauernd</td> <td>23,6</td> </tr> <tr> <td>zeitig</td> <td>450,3</td> </tr> </table> | dauernd | 23,6 | zeitig | 450,3 |
| dauernd | 23,6 | | | | |
| zeitig | 450,3 | | | | |
| gänzlich „ | <table> <tr> <td>dauernd</td> <td>16,7</td> </tr> <tr> <td>zeitig</td> <td>205,8</td> </tr> </table> | dauernd | 16,7 | zeitig | 205,8 |
| dauernd | 16,7 | | | | |
| zeitig | 205,8 | | | | |

Die nachstehende Zusammenstellung enthält die Krankheitsformen, welche vorwiegend Ursache der Ganzinvalidität waren.

| Krankheitsart | absolute Zahl | in % zur Gesamtzahl | in % K. |
|--|---------------|---------------------|---------|
| Krankheiten der Atmungsorgane | 2200 | 32,3 | 4,2 |
| Fehler und chronische Krankheiten des Herzens, des Herzbeutels und der großen Gefäße | 1129 | 16,6 | 2,1 |

| Krankheitsart | absolute Zahl | in % zur Gesamtzahl | in % K. |
|--|---------------|---------------------|---------|
| Chronische Krankheiten und wesentliche Fehler der größeren Gelenke | 682 | 10,0 | 1,3 |
| Fehler oder chronische Leiden der Unterleibseingeweide mit Ernährungsstörungen | 300 | 4,4 | 0,57 |
| Chronische Nervenleiden ernster Art | 277 | 4,1 | 0,53 |
| Chronischer Gelenkrheumatismus einschließlich Arthritis deformans | 249 | 3,7 | 0,47 |
| Erhebliche, schwer heilbare Krankheitszustände des Ohres | 242 | 3,6 | 0,46 |
| Chronische entzündliche Knochenleiden, Knochenfraks, Knochenbrand | 192 | 2,8 | 0,36 |
| Chronische Leiden der Urinwerkzeuge, unheilbare Urinfisteln, Steinkrankheit | 168 | 2,5 | 0,32 |
| Sehr umfangreiche, die Funktion des betreffenden Körperteils störende, festsitzende oder stark entstellende Narben | 165 | 2,4 | 0,31 |
| Die Handhabung der Waffen verhindernde Steifheit oder Krümmung eines Fingers | 157 | 2,3 | 0,30 |
| Krankhafte Vergrößerung (Hypertrophie), Schwund, Lähmung von Gliedmaßen | 142 | 2,1 | 0,27 |

F. Operationsliste.

Übersicht über die während des Berichtsjahres 1902/03 in der Armee ausgeführten gröfseren Operationen.

A. Operationen am Kopf und Hals.

1. Eröffnungen des Schädels.

| Lfde. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-----------|---|---|--|--|
| 1 | Jüterbog, S., Kanonier. | Offener Bruch des Stirnbeins, Hufschlag. — 9. April 1903. — Starke Blutung, Knochenstücke tief eingedrückt. | 9. April 1903. Hebung und teilweise Entfernung der eingedrückten Knochenstücke. Umstechung des stark blutenden Längsblutleiters. Ausstopfung mit Jodoformmull. Heilung unter Eiterung. Entlassen mit zehnpfennigstückgrofser Knochenlücke. | Geheilt. Invalide. |
| 2 | Frankfurt a. O., W., Oberleutnant d. R. | Offener Schädelbruch, Sturz vom Pferde. — 15. August 1903. — Andauernde Bewusstlosigkeit. Pulsverlangsamung. Knochen eingedrückt. | 16. August 1903. Erweiterung der Wunde, Entfernung einer, Anheben der anderen eingedrückten Knochenplatten. Freilegen der Hirnoberfläche. Keimfreier Verband. Nur kurzes Aufhören der Pulsverlangsamung. Ausgedehnte Brüche des Schädeldaches und Zertrümmerung gröfserer Teile des Gehirns. | Gestorben am 17. August 1903. Leichenbefund: -Grundes. |
| 3 | Oppeln, R., Musketier. | Offener Bruch des linken Oberarms und Bruch des Stirnbeins. Sturz aus dem Fenster. — 1. Dezember 1902. — Schädelknochen unter dem linken Stirnbeinhöcker eingedrückt. Bewusstlosigkeit. | 1. Dezember 1902. Einschnitt. Herausmeifeln des eingedrückten Knochenstücks. Tod während der Operation an zunehmender Herzschwäche. Äthereinspritzungen ohne Erfolg. | Gestorben am 1. Dezember 1902. |
| 4 | Münster, K., Leutnant. | Offener Schädelbruch mit Eröffnung der Stirnhöhle über den Augenbrauen. Hufschlag. — 9. Februar 1903. — Vordere Stirnhöhlenwand eingedrückt. | 10. Februar 1903. Ausmeiflung des eingedrückten Stückes und Befestigung desselben durch eine Fadenschlinge auf der Knochenlücke. Naht der Wunde; Drains in beiden Wundwinkeln. Fieberloser Verlauf, Knochenstück eingeheilt. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 5 | Wesel, Sch., Kanonier. | Offener Bruch des Stirnbeins. Hufschlag. — 18. März 1903. — Besserung der Wundverhältnisse. | 18. März 1903. Erweiterung der Wunde. Abtragen losgesprengter Knochenteile, Abmeifeln und Abkneifen der Knochenvorsprünge. Die entstandene Knochenlücke war 3,5 cm lang, 2,5 cm breit. Ausstopfen der Wunde. Spätnaht derselben am 15. April mit Seidennähten, welche durch Haut und Knochenhaut gelegt wurden. | Geheilt. Invalide. |
| 6 | Saarbrücken, B., Dragoner. | Offener Schädelbruch in der linken Schläfengegend. Schlag mit einer unbekanntenen Waffe. — 12. November 1902. — Hohes Fieber. Sprachlähmung. | 15. November 1902. Bogenförmiger Schnitt. Zurückpräparieren des Haut-Muskellappens. Heben und Entfernen der zum Teil eingekleiteten und mit Haaren besudelten Knochenstücke. Knochenlücke 3,5 : 2,25 cm. Entfernung der durch die Knochensplitter zertrümmerten Hirnmasse. Verband mit keimfreiem Mull. Allmählicher Abfall des Fiebers. Wiederkehr der Sprache. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 7 | Cassel, K., Husar. | Offener Schädelbruch. Sturz aus dem Fenster. — 11. Juni 1903. — Knochen eingedrückt. | 11. Juni 1903. Hebung eingedrückter Knochenstücke, Entfernung von Haaren, Wundversorgung, keimfreier Verband. Tod nach 4 Stunden. Leichenöffnung nicht gestattet. | Gestorben am 11. Juni 1903. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 8 | Naumburg, H., Kanonier. | Offener Stirnbeinbruch. Hufschlag. — 11. Mai 1903. — Knochen eingedrückt. | 12. Mai 1903. Entfernung eines markstückgroßen eingedrückten Knochenstücks mit dem Meißel. Eröffnung der Stirn- und Schädelhöhle. Jodoformgazeverband. Verlauf fieberfrei. | Geheilt. Invalide. |
| 9 | Karlsruhe, H., Reservist. | Offener Bruch des Stirnbeins und des Ober- und Unterkiefers. Zusammenstoß mit der elektrischen Straßbahn. — 23. März 1903. — Ein 2 cm großes Knochenstück war in die Schädelhöhle eingetrieben. | 23. März 1903. Entfernung des Knochenstücks. Glättung der Knochenränder. Naht des Unterkiefers. Ungestörte Heilung der Schädel- und Kieferverletzungen. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 10 | Hagenau, H., Kanonier. | Offener Schädelbruch. Schlag mit einem Bierglas. — 29. Januar 1903. — Hirndruckerscheinungen. | 29. Januar 1903. Erweiterung der Wunde, Entfernung mehrerer größerer Splitter, Glätten der Knochenränder. Keimfreier Verband. Ungestörte Heilung. Bindegewebiger Verschluss der Knochenlücke. | Geheilt. Invalide. |
| 11 | Straßburg i. E., M., Husar. | Offener Schädelbruch. Hufschlag. — 24. Januar 1903. — Zertrümmerung von Knochen und Gehirnmasse. | 24. Januar 1903. Entfernung der losen Knochensplitter, Hebung eines eingedrückten Knochenstücks. Abtragung der oberflächlichen Schicht des Gehirns. Keine Besserung des Zustandes. Eintritt einer eiterigen Hirnhautentzündung. | Gestorben am 17. Februar 1903. |
| 12 | Straßburg i. E., M., Musketier. | Offener Bruch des linken Stirnbeins. Sturz gegen eine Ofenkante. — 30. August 1903. — Völlige Bewusstlosigkeit. Blutung. wufstseins am 7. Tage. — 18. Oktober 1903. Verschluss der Knochenlücke durch Wagner-Königschen Knochenlappen. — 27. Oktober Entfernung des Knochenlappens wegen Abszesses. Danach ungestörter Verlauf. | 30. August 1903. Die Knochensplitter in der 6:9 cm Ausdehnung zeigenden, eingedrückten Stelle wurden gehoben bezw. zum Teil mit Hilfe des Meißels entfernt. Einzelne Splitter waren bis 3 cm in das Hirn eingekleilt. Unterbindung einer blutenden Hirnhautschlagader. Ausstopfung mit keimfreiem Mull. Rückkehr des Bewusstseins am 7. Tage. — 18. Oktober 1903. Verschluss der Knochenlücke durch Wagner-Königschen Knochenlappen. — 27. Oktober Entfernung des Knochenlappens wegen Abszesses. Danach ungestörter Verlauf. | Geheilt. Dienstunbrauchbar |
| 13 | Metz, H., Kanonier. | Quetschwunde auf der Scheitelhöhe. Schlag mit einem Bierglas. — Vor dem Dienst Eintritt Anfang Oktober 1902. — Andauernd hohes Fieber. | 23. Dezember 1902. Erweiterung der Wunde. Ausmeißelung eines talergroßen abgestorbenen Stückes aus dem Schädeldach. Fieberabfall. Ungestörte Heilung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 14 | Metz, M., Dragoner. | Offener Schädelbruch. Sturz vom Pferde. — 21. September 1903. — Knochen eingedrückt. | 23. September 1903. Entfernung des eingedrückten Knochenstücks mit dem Meißel. Ausstopfen der Wundhöhle mit keimfreiem Mull. Ungestörte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 15 | Graudenz, K., Leutnant. | Schädelbruch (Gewölbe). Sturz mit dem Pferde am 11. November 1902. — Lähmung der rechten Körperhälfte. | 11. November 1902. Freilegen der Bruchstelle. Ausmeißelung eines fünfmarkstückgroßen Knochenstücks, um die in Ausdehnung von 2 bis 3 cm im Bruchspalt eingeklemmte harte Hirnhaut zurückzubringen. Spaltung der harten Hirnhaut, Entleerung eines kleinen Blutgerinnsels. Die Lähmung verschwand sofort nach der Operation, doch kehrte das Bewusstsein nicht zurück. Zunehmender Kräfteverfall. | Gestorben am 20. November 1902. |
| 16 | Darmstadt, M., Kanonier. | Offener Schädelbruch des rechten Seitenwandbeins. Hufschlag. — 11. Mai 1903. — Seitenwandbein eingedrückt. | 12. Mai 1903. Aufmeißelung des Schädels zur Entfernung der Knochensplitter. — 26. Mai 1903. Verschluss der Knochenlücke durch Silberplatte, welche 20 Wochen später wieder entfernt wurde. Die Lücke hatte sich unter der Platte bis zur Größe eines Pfennigstückes verkleinert. Heilungsverlauf ungestört. | Geheilt. Invalide. |
| 17 | Mainz, Sch., Kanonier. | Offener Bruch des rechten Scheitelbeins. Schlag mit einem Besenstiel. — 10. März 1903. — Gefahr des Fortschreitens einer Weichteilerweiterung auf die Hirnhaut. | 23. März 1903. Entfernung zweier eingekleilter Bruchstücke des Scheitelbeins und zahlreicher eingeklemmter Haare. Glättung der Knochenränder mit dem Meißel. Ungestörter Verlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 18 | Posen, R., Trainsoldat. | Einfacher Schädelbruch. Schlag mit einem Zinkeimer. — 26. August 1903. — Rasch zunehmende Hirndruckerscheinungen. | 26. August 1903. Aufmeißelung des linken Seitenwandbeines. Entfernung eines etwa 250 ccm großen Blutgerinnsels. Unterbindung der blutenden mittleren Hirnhautschlagader an 2 Stellen, lose Ausstopfung mit Jodoformgaze. Naht des Hautlappens. Schnelles Verschwinden der Druckerscheinungen. Fieberloser Verlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 19 | Gnesen, R., Gefreiter. | Platzpatronenschußwunde am Hinterkopf. — 21. Februar 1903. — Unglücksfall durch Schuß auf 2 Schritt beim Felddienst. — Bewusstlosigkeit. Pulsverlangsamung. Verdacht auf innere Blutung. | 21. Februar 1903. Aufmeißelung des Schädels an der Stelle der Verletzung. Sprung in der äußeren Tafel der Schädeldecke. Kein freies Blut in der Schädelhöhle gefunden. Tod unter regelmäßigen Zuckungen des Kopfes und der Gliedmaßen nach 4 Stunden. Leichenöffnung nicht gestattet. | Gestorben am 21. Februar 1903. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-----------------------------|--|--|---|---|
| 20 | Ludwigsburg, L., Sergeant (Trompeter). | Revolverschufs in die Mitte der rechten Schläfenbeinschuppe. — 10. März 1903. — Bewusstlosigkeit. Verdacht auf Verletzung der Hirnhautschlagader. | 10. März 1903. Ausmeißelung der Schläfenbeinschuppe in der Umgebung des Einschusses. Unterbindung eines Astes der mittleren Hirnhautschlagader. Tod 3 Stunden nach der Verletzung. befund: Großer Bluterguss unter der harten Hirnhaut über den hinteren Abschnitt des Großhirns. Kugel in der linken Hirnhälfte, nahe dem Hirngrund. Im Schädeldach 15 cm langer Sprung von der Einschufsöffnung bis zum Hinterhaupt. | Gestorben am 10. März 1903. Leichenöffnung: |
| 21 | Breslau, K., Invalide. | Eiterherd im Gehirn, vermutlich als Folge einer Vereiterung von Fußknochen. — Ende Juni 1903. — Hirndruckerscheinungen. | 12. September 1903. Freilegung des Kleinhirns nach Kocher-Krause. Trotz vielfacher Einstiche wurde kein Eiter gefunden. Anfangs Nachlaß der Hirndruckerscheinungen. 20. September Erbrechen und Unruhe. Wallnufsgroße Eiterhöhle im linken Kleinhirn, Eiter im linken Felsenbein und Mittelohr. | Gestorben am 21. September 1903. Leichenöffnung: |
| 22 | Dresden, R., Kasernenwärter. | Tuberkelgeschwulst (Solitär tuberkel) im Gehirn. — Allmählich entstanden. — Heftige Kopfschmerzen, Krämpfe. | 6. Juli 1903. Bildung eines Haut-Periost-Knochenlappens über der motorischen Zone. Spaltung der harten Hirnhaut. Entfernung einer kirschgroßen, der Innenseite der Hirnhaut aufsitzenden Geschwulst. Knochenlappen entfernt, da er die während der Operation vergrößerte Öffnung nicht deckte und zerbrochen war. Naht. Linksseitige Lähmung des Gesichts, Arms und Beines. Hirnvorfall bis Faustgröße. Fieber, Eiterung. zerfallene Gehirnmasse, Eiter in den Hirnkammern und an der Hirnbasis. | Gestorben am 3. September 1903. Leichenbefund: Im Inneren des Vorfalles und an der |
| 2. Ohrenoperationen. | | | | |
| 23 | Berlin, H., Gefreiter. | Akute Mittelohrentzündung rechts. Erkältung. — 13. Dezember 1902. — Fieber. Starke Eiterung. Senkung der hinteren und oberen Gehörgangswand. Starke Druckempfindlichkeit des Warzenfortsatzes. | 22. Dezember 1902. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes. Auskratzen des erkrankten Knochens. Der freigelegte absteigende Schenkel des Bluteiters gesund. Jodoformgazeverband. — 23. Dezember 1902 Spaltung einer vor der Operation entstandenen Eiter-senkung an der Innenseite des rechten Kopfnickers. Heilung. Flüstersprache 5 bis 6 m. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 24 bis 61 | 38 Aufmeißelungen des Warzenfortsatzes, welche im wesentlichen der unter der vorigen Nummer geschilderten Operation gleichen, sind wegen Fortschreitens der eiterigen Mittelohrentzündung auf den Warzenfortsatz vorgenommen worden in Berlin (9), Königsberg i. Pr. (2), Gumbinnen, Insterburg, Stettin, Rathenow, Cüstrin, Saarbrücken, Cassel, Dresden, Ulm mit Ludwigsburg zusammen 9, Mülhausen i. E. (2), Straßburg i. E., Metz, Danzig, Langfuhr, Graudenz (2), Mainz, Wiesbaden. Bei allen Operierten erfolgte Heilung. Einer der in Königsberg i. Pr. Operierten wurde wegen eines anderen Leidens invalidisiert. Flüstersprache nicht unter 4 m. | | 38 geheilt. Dienstfähig. | |
| 62 | 1 Kranker in Ulm wurde nach Aufmeißelung beider Ohren dienstfähig. | | Geheilt. Dienstfähig. | |
| 63 | Breslau, B., Muskettier. | Abgelaufene eiterige Mittelohrentzündung links. Ursache unbekannt. — Mitte November 1902. — Schwellung und Schmerzhaftigkeit des Warzenfortsatzes bei regelrechtem Trommelfellbild. | 10. Dezember 1902. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes. Die Knochenhaut war stark verdickt und mit dem Knochen fest verwachsen. Kein Eiter. Schwinden der Beschwerden. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 64 | Berlin, G., Hilfshoboist. | Akute eiterige Mittelohrentzündung links. Schnupfen. — 9. Oktober 1902. — Starke Eiterung. Fieber. Tiefstand der oberen Gehörgangswand. Starke Druckempfindlichkeit des Warzenfortsatzes. | 18. Oktober 1902. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes. Eiterdurchbruch vom Warzenfortsatz unter die Haut der hinteren Gehörgangswand. Auskratzen des Warzenfortsatzes mit Entfernung seiner Spitze. Jodoformgazeverband. — 12. Dezember 1902 Wundrose über den ganzen Körper. Heilung. Flüstersprache 4 bis 5 m. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 65 | Berlin, H., Grenadier. | Akute eiterige Mittelohrentzündung rechts. Ursache unbekannt. — 10. Februar 1903. — Schwellung und Schmerz in der Gegend des Warzenfortsatzes. | 14. März 1903. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes mit Freilegung des Bluteiters, dessen Wand bis 2 cm weit nach hinten von der Naht zwischen Hinterhaupts- und Schläfenbein mit Fleischwärzchen bedeckt und von Eiter umspült war. Knochenfistel in der Gegend der genannten Naht. Entfernung des Knochens, bis der Bluteiter ein gesundes Aussehen zeigte. Jodoformgazeverband. Regelrechter Wundverlauf. Flüstersprache 8 m. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 66 bis 72 | Bei 7, in Breslau (2), Hannover, Karlsruhe, Schwerin, Cassel und Butzbach, ausgeführten ähnlichen Aufmeißelungen trat zwar Heilung ein, doch mußten die Operierten wegen andauernder Beschwerden oder hochgradiger Herabsetzung der Hörfähigkeit entlassen werden. | | 7 geheilt. 7 invalide. | |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-----------|------------------------------------|---|---|---|
| 73 bis 75 | | 3 Leute wurden nach Aufmeißelungen dienstunfähig, weil die Eiterung nicht ganz beseitigt war (Danzig, Stettin, Offenburg). | | 3 gebessert. 3 invalide. |
| 76 | Tilsit, P., Musketier. | Akute eiterige Mittelohrentzündung rechts. Erkältung. — 2. März 1903. — Druckempfindlichkeit des Warzenfortsatzes. Eiterfieber. Verdacht auf Verstopfung des rechten queren Blutleiters. | 23. März 1903. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes mit Freilegung des queren Blutleiters, welcher von Eiter umspült war, aber gesund aussah. Jodoformgazeverband. Nach kurzer Besserung septisches Fieber, Benommenheit. Ein weiterer Eingriff wurde wegen großer Schwäche des Kranken unterlassen. | Gestorben am 28. März 1903. |
| 77 | | Auch in Ulm starb ein Musketier, bei dem der vorhandenen und durch Blutungen vergrößerten Schwäche wegen ein weiterer Eingriff als die Aufmeißelung nicht ratsam erschien. Bei der Leichenöffnung wurde der Querblutleiter verstopft gefunden. | | 1 gestorben. |
| 78 | Königsberg i. Pr., E., Pionier. | Akute eiterige Mittelohrentzündung rechts. Ursache unbekannt. — 3. Februar 1903. — Schmerzhaftigkeit des Warzenfortsatzes. Fieber. Leichtes Frösteln. Kopfschmerzen. Erbrechen. | 3. März 1903. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes, in welchem nur ein Tropfen Eiter und wenig Fleischwärtchen gefunden wurden. Ausräumung der Zellen. Eröffnung der hinteren und mittleren Schädelgrube. Beide frei von Eiter. Keimfreier Verband. Dauernd hohes Fieber. Erbrechen. Kopfschmerzen nach dem Scheitel. Überempfindlichkeit an der Brust und am rechten Arm. Nackensteifigkeit. Unruhe. Zuckungen. Wundhöhle reizlos. Schädelwölbung, links stärker. Bakteriologisch: Diplococcus intracellularis Weichselbaum-Jaeger, daneben Traubenkokken. | Gestorben am 10. März 1903. Leichenöffnung: Eitrige Hirnhautentzündung an der |
| 79 | Tübingen, R., Musketier. | Akute eiterige Mittelohrentzündung rechts. Ursache unbekannt. — Starke Eiterung. Kopfschmerzen. Erbrechen. Nackenstarre. Unregelmäßiger Puls. | Aufmeißelung des Warzenfortsatzes. Ausräumung des Blutleiters. Einige Tage später Delirien. Krämpfe. Hohes Fieber. Anschwellung des rechten Knies. Eröffnung des Gelenkes. Allmähliche Heilung mit steifem Knie. | Geheilt. Invalide. |
| 80 | | Mit gleich günstigem Erfolge wurde die Ausräumung des Blutleiters unmittelbar nach der Aufmeißelung in Giefßen vorgenommen. Eine Hirnhautentzündung, welche Störungen an beiden Augen hervorgerufen hatte, verschwand. | | Geheilt. Invalide. |
| 81 und 82 | | Bei 1 Soldaten in Chemnitz und 1 Kadetten in Potsdam wurde das Fortschreiten der Hirnhautentzündung durch die im Anschluß an die Aufmeißelung bzw. 8 Tage später vorgenommene Ausräumung des Blutleiters nicht aufgehalten. Beide Kranke starben. | | 2 gestorben. |
| 83 | Breslau, S., Musketier. | Akute eiterige Mittelohrentzündung links. Baden. — August 1902. — Starke Eiterung. Tiefstand der oberen Gehörgangswand. Druckempfindlichkeit des Warzenfortsatzes. Annahme einer Verstopfung des Blutleiters. | 2. Oktober 1902. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes mit Freilegung des Querblutleiters, welcher an der Umbiegung mit Fleischwärtchen bedeckt, weiter unten aber gesund war und flüssiges Blut enthielt. Fieber blieb bestehen. — 4. Oktober schmerzhaftes Schwellen des rechten Schlüsselbein-Brustbeingelenkes. — Am 5. Oktober Schüttelfrost. 6. Oktober 1902. Unterbindung der inneren Drosselblutader, da der Blutleiter verstopft war (Probepunct). Auslöfung desselben. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 84 | Stuttgart, S., Grenadier. | Akute eiterige Mittelohrentzündung links. Erkältung. — 2. Dezember 1902. — Hohes Fieber. Schmerzhaftigkeit des Warzenfortsatzes. Dauernd hohes Fieber. Anschwellung auf der linken oberen Halsseite. tritts der inneren Drosselblutader zwischen Schädelgrund und harter Hirnhaut. — 6. Januar 1903. Eröffnung des vereiterten linken Kniegelenks. Fieberabfall. Allmähliche Heilung aller Operationswunden. Kniegelenk fast völlig beweglich. | 24. Dezember 1902. Aufmeißelung und Auskratzen des Warzenfortsatzes. Jodoformgazeverband. Hohes Fieber. Schüttelfröste. 27. Dezember 1902. Ausräumung des Querblutleiters. 2. Januar 1903. Ergebnislose Freilegung der mittleren Schädelgrube. Unterbindung der verstopften inneren Drosselblutader. Erweiterung der Knochenöffnung nach der hinteren Schädelgrube. Eröffnung einer großen Eiteransammlung in der Gegend des Durchtritts der inneren Drosselblutader zwischen Schädelgrund und harter Hirnhaut. — 6. Januar 1903. Eröffnung des vereiterten linken Kniegelenks. Fieberabfall. Allmähliche Heilung aller Operationswunden. Kniegelenk fast völlig beweglich. | Geheilt. Invalide. |
| 85 | Magdeburg, K., Ökonemiehandwerker. | Akute eiterige Mittelohrentzündung links. — 12. Januar 1903. — Schwellung und Schmerzhaftigkeit am Warzenfortsatz. Gelbsucht, Erbrechen. Hirnvorfall. — 11. Februar 1903. Abtragung des Hirnvorfalles und Eröffnung eines Abszesses am rechten Oberarm. Andauernd Fieber, Gelbsucht, Benommenheit. — 20. Februar. Weitere Aufmeißelung am Blutleiter entlang wegen Verdachts eines Hirnabszesses. Reichlicher Eitererguß anscheinend aus dem Kleinhirn. Kräfteverfall. | 29. Januar 1903. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes. Andauernd Schüttelfrost. — 4. Februar 1903. Brustfellentzündung. 6. Februar 1903. Entfernung des Warzenfortsatzes und des Daches der Paukenhöhlengrotte. Unterbindung der inneren Drosselblutader. Eröffnung des Querblutleiters. Jodoformgazeverband. Fieber, Gelbsucht, Erbrechen. Hirnvorfall. — 11. Februar 1903. Abtragung des Hirnvorfalles und Eröffnung eines Abszesses am rechten Oberarm. Andauernd Fieber, Gelbsucht, Benommenheit. — 20. Februar. Weitere Aufmeißelung am Blutleiter entlang wegen Verdachts eines Hirnabszesses. Reichlicher Eitererguß anscheinend aus dem Kleinhirn. Kräfteverfall. | Gestorben am 25. Februar 1903. Leichenöffnung: Ausgedehnte eitrige Hirnhautentzündung besonders am Kleinhirn. Kleinhirnabszefs. |

| Lfd. No | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|----------------------------------|---|---|--|
| 86 bis 88 | | | | 3 gestorben. |
| | | Auch bei 1 Gefreiten in Deutz, 1 Füsilier in Karlsruhe und 1 Kadetten in Bensberg mißlang der Versuch, das Fortschreiten der Eitervergiftung bezw. der Hirnhautentzündung durch Aufmeißelung des Warzenfortsatzes und durch eine 12 bezw. 2 bzw. 6 Tage später vorgenommene Unterbindung der inneren Drosselblutader aufzuhalten. Bei dem Kranken in Karlsruhe war außerdem eine Einspritzung von Antistreptokokkenserum gemacht, da bei einem Rückenmarksstich Kettenkokken nachgewiesen waren. Der Kadett hatte schwere psychische Störungen, Lähmungen im Gebiet des 3., 4. und 6. linken Gehirnnerven und Zuckungen am linken Arm und Bein gezeigt. | | |
| 89 | Königsberg i. Pr., K., Füsilier. | Akute eiterige Mittelohrentzündung links. Baden. — 24. Juli 1903. — Ödem und Schmerzhaftigkeit des Warzenfortsatzes. Fieber. | 11. August 1903. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes. Jodoformgazeverband. Fieberfrei. Dauernd reichliche Eiterung. 10. Oktober 1903. Radikaloperation. | Geheilt. Invalide. |
| 90 | Coblenz, N., Unteroffizier. | Chronische eiterige Mittelohrentzündung rechts seit mehreren Jahren. Ursache unbekannt. Hohes Fieber. Hirnreizerscheinungen. Schwinden des Bewußtseins. 29. April 1903. Auslöfelung des verstopften Blutleiters. — 30. April 1903. Eröffnung eines haselnußgroßen Kleinhirnabszesses. — Vom 1. Mai ab Eiterung unter der harten Hirnhaut in der hinteren Schädelgrube. Gehirnvorfall. | 23. April 1903. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes, der eine eitergefüllte Höhle darstellte, die bis zur hinteren Schädelgrube und zum Blutleiter reichte. Jodoformgazeverband. Zunahme des Fiebers und der Hirnreizerscheinungen. 27. April 1903. Radikaloperation mit Eröffnung der mittleren Schädelgrube. Freilegung des schwarzverfärbten Blutleiters. | Gestorben am 18. Mai 1903. |
| 91 | Münster, S., Musketier. | Akute eiterige Mittelohrentzündung. — 10. März 1903. — Eiterherd im Warzenfortsatz. | 12. März 1903. Radikaloperation nach Stacke. Guter Verlauf. Flüstersprache 3 m. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 92 | | | Mit gleich günstigem Erfolge wurde bei einem Traingemeinen in Münster eine zweite Radikaloperation nach Stacke ausgeführt. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 93 bis 95 | | | 1 Gefreiter in Metz, 1 Husar in Düsseldorf und 1 Füsilier in Königsberg i. Pr. wurden durch die Radikaloperation geheilt, jedoch wegen zeitweise auftretender Kopfschmerzen als Invalide entlassen. Der Gefreite in Metz hörte Flüstersprache auf 10 m. Bei dem Füsilier in Königsberg i. Pr. war das Fieber erst nach Eröffnung großer Abszesse in der Kreuzbein- und Blinddarmgegend (letztere außerhalb des Bauchfells) verschwunden. | 3 geheilt. 3 Invalide. |
| 96 und 97 | | | In Metz wurde 1 Unteroffizier wegen einer nach der Radikaloperation zurückgebliebenen schwach absondernden Fistel, in Neu-Ruppin 1 Musketier wegen rechtsseitiger Gesichtsnervenlähmung invalide. Bei letzterem hatte der Querblutleiter ausgeräumt werden müssen. | 2 gebessert. 2 Invalide. |
| 98 | Ulm, S., Musketier. | Chronische eiterige Mittelohrentzündung rechts, akute links. Grippe. — Lazarettaufnahme 20. Februar 1903. — Stinkende Eiterung rechts. Druckschmerz an der oberen Gehörgangswand. Beklopfen der rechten Kopfhälfte schmerzhaft. Starker Schwindel. | 6. März 1903. Radikaloperation rechts. Abgestorbener Knochen in der Paukenhöhle. Jodoformgazeverband. Anfangs Besserung. Vom 23. März ab starke Stirn- und Hinterkopfschmerzen. Zuckungen am ganzen Körper. Benommenheit. Atmungskrämpfe. | Gestorben am 29. März 1903. Leichenöffnung: Beginnende eiterige Hirnhautentzündung. |
| 99 | Berlin, T., Grenadier. | Chronische eiterige Mittelohrentzündung rechts. Ursache unbekannt. — 30. Juli 1903. — Reichliche Eiterung. Schüttelfröste. Druckempfindlichkeit des Warzenfortsatzes. Kopfschmerzen. | 11. August 1903. Radikaloperation, bei welcher eine große Perlgeschwulst gefunden wurde, die den ganzen Warzenfortsatz bis zum Blutleiter sowie die Grotte und den obersten Teil der Paukenhöhle einnahm. Hammer und Ambos nicht mehr vorhanden. Am Blutleiter und an der Berührungsstelle mit der Geschwulst eine umschriebene Verdickung der Wandung. Oberer und unterer Lappen aus dem äußeren häutigen Gehörgang. Jodoformgazeverband. — 13. Oktober 1903. Überpflanzung von 5 Hautläppchen in die Wundhöhle. | Geheilt. Invalide. |
| 100 bis 102 | | | Mit demselben günstigen Erfolge wurde eine Perlgeschwulst bei einem Invaliden in Gießen (Koernersche Lappenbildung) entfernt, während je 1 Musketier in Jena und Hildesheim nach derselben Operation wegen zurückgebliebener, schwach absondernder Fisteln invalidisiert werden mußten. | 1 geheilt. 2 gebessert. 3 Invalide. |
| 103 | Königsberg i. Pr., G., Kanonier. | Chronische eiterige Mittelohrentzündung links, seit dem 11. Lebensjahr. Ursache unbekannt. — 25. Oktober 1902. — Andauernde Eiterung. Fieber. Frösteln. Ödem an der Spitze des Warzenfortsatzes. | 15. Dezember 1902. Aufmeißelung des Warzenfortsatzes. Große Perlgeschwulst, welche bis an den mit Fleischwärzchen bedeckten Blutleiter heranreichte. Entfernung der Perlgeschwulst. Keimfreier Verband. Dauernd hohes Fieber und übelriechende Eiterung. — 22. Dezember 1902. Pupillenstarre links, Stauungspapille, Hirnhautentzündung. | Gestorben am 25. Dezember 1902. Leichenöffnung: Wandständige Blutleiterverstopfung. Eiterige Hirnhautentzündung. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 3. Augenoperationen. | | | | |
| 104 | Königsberg i. Pr., W., Dragoner. | Granulöse Bindehauterkrankung beiderseits. — 26. Januar 1903. — Erfolglosigkeit anderer Behandlung. | 3. Juni 1903. Ausschneidung der oberen Übergangsfalte und des Lidknorpels am rechten Auge. — 30. Juli 1903. Die gleiche Operation am linken Auge. Heilung durch Bildung von Granulationspfropfen verzögert. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 105 | Düsseldorf, M., ehem. Musketier. | Granulöse Bindehauterkrankung beiderseits. — 28. Oktober 1902. — Hartnäckigkeit des Leidens. | 11. November 1902. Ausschneidung beider oberer Übergangsfalten und eines Teils der Lidknorpel. Ungestörter Heilungsverlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 106 | Tientsin, J., Unteroffizier. | Vollständige Umkehrung des linken Augenlides nach außen durch alte Brandnarben im Gesicht und an den Händen. Dschunkenbrand in China. — 31. Oktober 1901. | 12. November 1902. Plastische Operation nach Lostrennung des oberen und unteren Augenlides, horizontale Schnitte. Einpflanzung gestielter Hautlappen aus dem Oberarm. Nach 10 Tagen Durchtrennung des Hautstiels. Die anfänglich angeheilten Lappchen stießen sich fast völlig ab, doch wurde für das obere Lid Richtigestellung erzielt. | Gebessert. Invalide. |
| 107 | Dresden, S., Gefreiter. | Zerquetschung beider Lider des linken Auges und Bruch des oberen Augenhöhlenrandes. Hufschlag. — 16. Juni 1903. — Gefahr schlechter Narbenbildung. | 18. August 1903. Naht der Lider und der Bindehaut und Ersatz fehlender Teile durch Lappenbildung (Plastik). Xeroformverband. Heilung größtenteils durch erste Verklebung ohne entstellende Narbe. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 108 | Berlin, W., Ökonomiehandwerker. | Einwärtsschielen rechts von 5 bis 6 mm Ablenkung. Ursache unbekannt. — 16. Januar 1903. — Entstellung. | 20. Januar 1903. Durchtrennung des inneren geraden Augenmuskels, gute Stellung des Auges. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 109 | Langfuhr, E., Husar. | Lähmung des rechten äußeren geraden Augenmuskels nach Schädelbruch. — 7. November 1902. — Doppelsehen und Entstellung. | 27. Dezember 1902. Durchschneidung des geraden inneren Augenmuskels. Glatte Heilung. | Gebessert. Invalide. |
| 110 | Meiningen, B., Vizefeldwebel. | Flügelfell am linken Auge. Ursache und Erkrankungstag unbekannt. Beeinträchtigung des Sehvermögens. | 15. Oktober 1902. Abtragung des Flügel felles und Naht der Bindehaut. Glatte Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 111 | Berlin, K., Fahrer. | Schichtstar beiderseits; links stärker. Ursache unbekannt. — 9. Mai 1903. — Herstellung des Sehvermögens. | 14. Mai 1903. Linearschnitt, Kapselrißs. Entfernung der Starmassen. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 112 | Kehl, P., Sergeant. | Grauer Star des rechten Auges. Ursache unbekannt. — Erkrankungstag unbekannt. — Herstellung des Sehvermögens. | 4. Juli 1903. Entfernung der Linse mit der Kapsel nach Linearschnitt und Regenbogenhautausschneidung. Ungestörte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 113 | Jena, S., Musketier. | Grauer Star links. Entstehungsursache unbekannt. Verschlimmerung durch Stofs. — Erkrankungstag unbekannt. — Herstellung des Sehvermögens. | 9. Juli 1903. Entbindung der Linse mit Regenbogenhautausschnitt. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 114 | Königsberg i. Pr., F., Kanonier. | Verletzungsstar links. Eisensplitter beim Hufbeschlag. — 6. Juli 1902. — Reifer Star. | 25. Oktober 1902. Entbindung des Stares nach modifiziertem Gräfeschen Linearschnitt. Ausschneidung eines Stückes der Regenbogenhaut. Glatte Heilung. Nachstar und geringe Verwachsung der Regenbogenhaut. | Geheilt. Invalide. |
| 115 | Stettin, E., Ökonomiehandwerker. | Verletzungsstar rechts durch Stich mit einer Ahle. — 4. Januar 1903. — Herstellung des Sehvermögens. | 26. Januar 1903. Entbindung des Stares durch oberen Lappenschnitt nach Gräfe und Regenbogenhautausschneidung. — Verwachsung der Regenbogenhaut und teilweiser bindegewebiger Verschluss des Regenbogenhautausschnittes. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 116 | Karlsruhe, R., Gefreiter. | Verletzungsstar links. Stahlsplitter in der Linse. Verletzung in der Anzeigerdeckung. — 12. März 1903. — Entzündungserscheinungen des inneren Auges. | 5. Mai 1903. Nach vergeblichem Versuch, den Stahlsplitter mit dem Magneten zu entfernen, Regenbogenhautausschneidung und Auslöfelung der Linse. — Ungestörter Heilungsverlauf. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|---------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 117 | Metz, G., Musketier. | Chronische Regenbogenhautentzündung und Aderhautentzündung links. — 24. Mai 1903. — Drohender Pupillarverschlufs. | 14. Juli 1903. Regenbogenhautausschneidung im inneren oberen Viertel. Glatte Heilung. Schneller Rückgang der Entzündung. | Gebessert. Invalide. |
| 118 | Breslau, K., Obergefreiter. | Regenbogenhautzerreißung und Linsen trübung am rechten Auge. Verletzung durch aufsteigende Pulvergase beim Abschießen eines Böllers. — 22. Juli 1903. — Sehstörung. | 22. Juli 1903. Ausschneidung des abgerissenen Regenbogenhautstückes. — Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 119 | Stettin, P., Traingemeiner. | Durchbohrende Verletzung des rechten Auges. Stich mit einer Schusterahle. — 9. August 1902. — Pupillarverschlufs. | 4. November 1902. Regenbogenhautausschneidung, Discission der Linsenkapsel. Der Regenbogenhautausschnitt füllte sich wieder durch bindegewebige Masse. | Geheilt. Invalide. |
| 120 | Karlsruhe, E., Dragoner. | Zerreißung der linken Hornhaut mit Vorfall der Regenbogenhaut durch glühenden Eisensplitter. — 29. Juli 1902. | 31. Juli 1902. Entfernung der Linse und des vorgefallenen Stückes der Regenbogenhaut. Heilung. Blindheit durch Kapsel- und getriebten Linsenrest. | Geheilt. Invalide. |
| 121 | Breslau, K., Unteroffizier. | Zerreißung der rechten Hornhaut, Regenbogenhaut und Linse durch einen großen unbekanntgebliebenen Fremdkörper. — 11. Februar 1903. — Eitrige Entzündung der Wunde. | 14. Februar 1903. Ausweidung des rechten Augapfels nach Gräfebunge. Glatter Wundverlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 122 | Düsseldorf, G., Füsilier. | Zerstörung des rechten Augapfels durch Explosion beim Spielen mit einer Platzpatrone. — 30. September 1902. — Vereiterung des Augeninnern. | 6. Oktober 1902. Ausweidung des rechten Augapfels. Ungestörter Wundverlauf. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 123 | Straßburg i. E., K., Gefreiter. | Fremdkörper im rechten Auge. Beim Reinigen eines Fahrrades einge drungen. — 4. Februar 1903. — Vereiterung des Augeninnern. | 26. Februar 1903. Ausweidung des Augapfels. Ungestörter Wundverlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 124 | Jüterbog, K., Kanonier. | Zerstörung des rechten Auges durch Explosion einer Zündladung. — 4. Februar 1903. | 4. Februar 1903. Auslöf felung des Augapfels mit Erhaltung der harten Haut. Heilung ohne Störung. | Geheilt. Invalide. |
| 125 | Posen, H., Füsilier. | Tiefgehende Stichverletzung des rechten Auges mit einer Packnadel. — 23. Juni 1903. — Vereiterung des Augeninnern. | 4. Juli 1903. Ausweidung des rechten Auges. Vernähung der Lederhautöffnung. Ungestörter Heilungsverlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 126 | Jüterbog, J., Kanonier. | Rifs in der harten Haut des linken Auges durch Explosion eines Fußartilleriezünders. (Gleichzeitige Verletzungen an den Händen, am Bauch u. s. w. Zusammenstellung der Schufsverletzungen No. 73.) — 4. Februar 1903. — Gefahr der Vereiterung. | Auslöf felung des Auges. Geheilt. Guter Stumpf. Künstliches Auge. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 127 | Berlin, K., Dragoner. | Schwere Augen- und Schädelverletzung durch Hufschlag. — 9. Juni 1903. — Zerquetschung des rechten Auges. | 11. Juni 1903. Ausschälung des rechten Augapfels. Guter Verlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 128 | Stolp, B., Husar. | Schwund des linken Augapfels. Verletzung durch Zündhütchensplitter. — 23. Juli 1902. — Gefahr der Miterkrankung des anderen Auges. | 17. Januar 1903. Auslösung des linken Auges. Bindehautnaht. Ungestörter Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 129 | Berlin, H., Reiter. | Entzündung der tieferen Teile des rechten Auges. Steinsplitterverletzung auf dem Schießstande. — 30. Juni 1903. — Gefahr der Miterkrankung des linken Auges. | 4. Juli 1903. Auslösung des rechten Augapfels. Ungestörte Wundheilung. | Geheilt. Invalide. |
| 130 | Bruchsal, L., Dragoner. | Quetschung des rechten Auges durch Stockschlag. — 13. November 1902. — Gefahr der Miterkrankung des linken Auges. | 29. Dezember 1902. Entfernung des rechten Augapfels. Glatte Wundheilung. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|--|--|---|----------------------------------|
| 131 | Diedenhofen, W., Musketier. | Lederhautrifs mit Vorfall des Strahlenkörpers rechts. Stofs mit der Gewehrmündung seitens eines Kameraden. — 14. März 1903. — Schrumpfung des Auges. | 10. April 1903. Entfernung des rechten Augapfels mit Schonung der Muskelstümpe. Wundnaht. Glatte Wundheilung. | Geheilt. Invalide. |
| 132 | Berlin, B., Dragoner. | Tiefgehende Augapfelverletzung rechterseits durch einen bei der Stellmacherarbeit abgesprengten Eisensplitter. — 8. Oktober 1902. — Gefahr der Miterkrankung des linken Auges. | 18. November 1902. Auslösung des rechten Auges. Glatter Wundverlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 133 | Saarbrücken, F., Kanonier. | Schufsverletzung des linken Auges. — 22. Februar 1903. — Gefahr der Vereiterung. | 25. Februar 1903. Herausnahme des Augapfels. Jodoformgaze-tamponade. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 134 | Berlin, B., Vizefeldwebel. | Schrotschufs ins Gesicht aus einer Pistole. — 1. Dezember 1902. — Entzündung des inneren Auges. | 2. Dezember 1902. Herausnahme des linken Auges. Glatte Wundheilung. Künstliches Auge. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 135 | Königsberg i. Pr., Z., Musketier. | Verengung der Tränenabflußwege beiderseits infolge chronischen Nasenleidens. — 22. Oktober 1902. — Aussichtslosigkeit anderer Behandlung. | 4. November 1902. Operation nach Weber-Stilling. Kein dauernder Erfolg. | Gebessert. Dienstunbrauchbar. |
| 136 | Giessen, R., Musketier. | Tränenkanalverengung rechts. Ursache unbekannt. — 28. Februar 1903. — Eiterige Entzündung des Tränensackes. | 7. März 1903. Ausschälung des rechten Tränensackes, Auskratzung der kariösen Siebbeinzellenwand. Ungestörter Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 137 | Magdeburg, M., einj.-frei w. Kanonier. | Eiterige Tränendrüseneuzündung rechts. Stofs von einem Pferdekopf. — 10. Februar 1903. — Eiteransammlung in der Tränendrüse. | 15. Februar 1903. Spaltung des Tränendrüsensabszesses, Jodoformgazeverband. Glatter Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |

4. Luftröhrenschnitte.

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|--|
| 138 | Schweidnitz, S., Kanonier. | Diphtherie. — 5. Dezember 1902. — Erstickungsgefahr. | 6. Dezember 1902. Oberer Luftröhrenschnitt. Nach kurzer Erleichterung neue Atembeschwerden. Tod an Lungenödem 2 Stunden nach der Operation. | Gestorben am 6. Dezember 1902. |
| 139 | Magdeburg, S., Musketier. | Atembehinderung durch Ansangung von Schleim und Speichel in den Kehlkopf und die Luftröhre während epileptischer Bewusstlosigkeit. — 16. September 1903. — Drohende Erstickung. | 22. September 1903. Oberer Luftröhrenschnitt. Nach Beseitigung des Atemhindernisses wieder langdauernde Krämpfe, welche erst durch eine 15stündige ununterbrochene Chloroformbetäubung beseitigt werden konnten. Die Bewusstlosigkeit schwand erst am 25. September 1903. Verheilung der Wunde am 25. Oktober 1903. | Geheilt. Invalide. |
| 140 | Straßburg i. E., M., Musketier. | Kehlkopfgeschwüre nach Unterleibstypus. — 27. August 1903. — Ödem der Stimmbänder. | 1. September 1903. Luftröhrenschnitt unterhalb des Ringknorpels. Später Erweiterung des Schnittes nach oben, Entfernung eines Polypen unterhalb der Stimmbänder. Kehlkopföffnung durch Schwellung der Kehlkopfschleimhaut bis auf einen schmalen Spalt verengt; Bougieren erfolglos. Entlassung mit Kanüle. | Ungeheilt. Invalide. |
| 141 | Minden, H., Garnisonkünstler. | Kehldeckelödem nach eiteriger Ohrspeicheldrüsenentzündung. — Mitte November 1902. — Hochgradige Atemnot mit Benommenheit. | 27. November 1902. Typischer oberer Luftröhrenschnitt, Kanüle. Vorübergehende Besserung, später zunehmende Herzschwäche. | Gestorben am 28. November 1902. |
| 142 | Königsberg i. Pr., B., Musketier. | Zerreißung der Zunge und Bruch des Unterkiefes durch Platzpatronenschufs in den Mund. — 19. Dezember 1902. — Erstickungsgefahr durch Blutung. | 19. Dezember 1902. Luftröhrenschnitt ohne Narkose am vornübergebeugten Kranken. Tamponade der Mund- und Rachenhöhle. 7 Tage lang Ernährung vom Mastdarm aus, später durch Schlundsonde. Am 12. Tage tödliche Blutung aus der Unterkieferarterie. | Gestorben am 30. Dezember 1902. |
| 143 | Trier, V., Musketier. | Platzpatronenschufs in den Mund. — 27. April 1903. — Erstickungsanfälle. | 27. April 1903. Oberer Luftröhrenschnitt ohne Betäubung. Blutung aus dem stark zertrümmerten Oberkiefer und aus den Siebbeinzellen durch Tamponade nicht stillbar. Atmung frei. | Gestorben nach 24 Stunden. |

| Lfde. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-----------|-----------------------------|--|---|------------------------------|
| 144 | Mannheim, A., Gefreiter. | Doppelter Unterkieferbruch, Zerfetzung der Zunge und des Gaumens durch Platzpatronenschuß in den Mund. — 4. August 1903. — Rasch auftretendes über Hals und Brust sich verbreitendes Hautemphysem. | 4. August 1903. Oberer Luftröhrenschnitt unter leichter Chloroformbetäubung 5 Stunden nach der Verletzung. Tod bald nach der Operation. | Gestorben am 4. August 1903. |
| 145 | Colmar i. E., L., Dragoner. | Brüche des Schädelgrundes, des Ober- und Unterkiefers sowie Zerreißen des Kehlkopfs. — Sturz vom Pferde. — 12. Juli 1903. — Behinderung der Atmung durch Herabfließen von Blut in den Kehlkopf. | 12. Juli 1903. Kehlkopfschnitt. Atmung anfangs freier. Später zunehmende Atmungslähmung. (Folge der Zerreißen der Nerven am Schädelgrunde.) | Gestorben am 14. Juli 1903. |
| 146 | Schwerin, L., Kanonier. | Mandelentzündung. — Ursache unbekannt. — 28. April 1903. — Erstickungsgefahr. | 3. Mai 1903. Unterer Luftröhrenschnitt. Kanüle bis 5. Mai 1903. Hautemphysem in der Umgebung der Wunde. | Geheilt. Dienstfähig. |

5. Anderweitige Operationen am Kopf und Hals.

| | | | | |
|-------------|---|---|--|--|
| 147 | Münster, S., Kanonier. | Drüsenanschwellung an beiden Seiten des Halses. Schon vor der Einstellung hatten Drüsenanschwellungen bestanden. Mitte April 1903 Verschlimmerung durch Erkältung im Dienst. — Erweichung der Drüsen. | 28. Mai 1903. Linke Halsseite. Bogenförmiger Schnitt parallel dem Unterkiefer und T-Schnitt von der Mitte desselben senkrecht nach unten. Zweiter Schnitt vom Zitzenfortsatz des Schläfenbeines bis zum Schlüsselbein. Rechte Halsseite: 10 cm langer Schnitt am vorderen Rande des Kopfnickers. Ausschälung einer großen Zahl von Drüsen, die zum Teil verkäst waren. Naht und Drainage. Fieberlose Heilung durch erste Verklebung. Verdickung der Weichteile in der Umgebung der Narben schwand nur langsam. | Geheilt. Invalide. |
| 148 und 149 | 2 ähnliche doppelseitige Erkrankungen wurden in Rendsburg und Düsseldorf durch Operation geheilt. Bei dem Düsseldorfer Kranken waren die Drüsen nicht verkäst und die Wunde heilte durch erste Verklebung. | | | 2 geheilt. 1 dienstfähig. 1 Invalide. |
| 150 | Metz, D., Gefreiter. | Lymphdrüseneschwulst an der rechten Halsseite. Entstehungsursache unbekannt. — 16. August 1902. — Wunsch des Erkrankten. | 17. November 1902. Langer Schnitt am vorderen Kopfnickerrande. Entfernung eines faustgroßen Drüsenpakets, welches von der Schädelbasis bis zum Schlüsselbein reichte und mit der Gefäßscheide innig verwachsen war. Tamponade mit Jodoformgazestreifen. Darüber Naht. Ungestörte Wundheilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 151 bis 162 | Bei 12 weiteren Drüsenausschälungen am Halse (7 rechts, 4 links, 1 ohne Angabe der Seite) wurde 10 mal (Allenstein, Brandenburg a. H., Posen, Düsseldorf, Rastatt, Ludwigsburg (3), St. Avoild, Frankfurt a. M.) die Dienstfähigkeit wiederhergestellt, 2 mal trat nach beendeter Heilung Dienstunbrauchbarkeit ein (Glogau, Schweidnitz). Besondere Ursachen für die Erkrankung, die 1 mal schon vor der Einstellung bestanden hatte, konnten nicht festgestellt werden. 1 mal (Ludwigsburg) wurden 2 Pakete am Halse und in der Oberschlüsselbeingrube entfernt, 2 mal wurde der Schnitt am hinteren Rande des Kopfnickers gewählt (Allenstein, St. Avoild), sonst scheint an dessen vorderem Rande eingegangen zu sein. Die Drüsen waren meistens im Inneren verkäst, mehrmals mit den Gefäßen verwachsen, 2 mal reichten sie vom Schädelgrunde bis zum Schlüsselbein. | | | 12 geheilt. 10 dienstfähig, 2 dienstunbrauchbar. |
| 163 | Münster, T., Ökonomiehandwerker. | Drüsenanschwellungen an der linken Halsseite. Ursache unbekannt. — Vor 4 Jahren zuerst bemerkt. | 23. Februar 1903. 8 cm langer Schnitt parallel dem Unterkieferande. Während der Ausschälung der Drüsen Unterbindung der äußeren Unterkieferarterie. Naht. Drain. Im April mehrfach neue Drüsenanschwellungen, die wiederholte Operationen nötig machten. | Geheilt. Invalide. |
| 164 bis 168 | Bei 5 anderen am Kinn bezw. hinter den Kieferwinkeln gelegenen Drüsenpaketen (2 rechts, 1 links, 2 ohne Angabe) wurde in allen Fällen durch die Ausschälung der meist verkästen Drüsen die Dienstfähigkeit wiederhergestellt. Eine besondere Ursache der Erkrankung liefs sich in keinem Falle feststellen. In Allenstein wurde die Heilung durch einen bläschenförmigen Hautausschlag gestört. | | | 5 geheilt. 5 dienstfähig. |
| 169 | Allenstein, W., Musketier. | Drüseneschwulst unterhalb des rechten Unterkiefers, die seit dem 11. Jahr bestand und seit Mitte Januar 1903 ohne bekannte Ursache schnell gewachsen war. Lazarettaufnahme 10. Februar 1903. | 20. Februar 1903. Chloroformbetäubung. 7 cm langer Schnitt unterhalb des Unterkiefers, Auslösen der vielfach mit der Umgebung verwachsenen, über hühnereigroßen Geschwulst mit der Schere. Jodoformgazetamponade. Heilung ohne Eiterung. Am 27. Februar wurde W. wegen syphilitischer Erscheinungen auf die gemischte Station verlegt. Ende März 4 cm lange, 1 cm breite verschiebliche Narbe. Die Drüse enthielt in ihrer Mitte eine etwas über kirschgroße Eiterhöhle. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 170 | Brandenburg a. H., M., Kürassier. | Tuberkulöse Lymphdrüsenentzündung an der rechten Halsseite. — Ursache unbekannt. — Allmähliche Entwicklung. — Gröfse der Geschwulst und Fieber. | 25. März 1903. Hautschnitt vom Warzenfortsatz bis zum Schlüsselbein und Winkelschnitt auf diesen im unteren Drittel des Halses. Herauslösen von etwa 50 Drüsen ohne wesentliche Blutung. Grofse Gefäße, Nervenstämme und Wirbelquerfortsätze lagen frei. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|--|---|--|-------------------------------|
| 171 | Wandsbek, G., Husar. | Tuberkulöse Drüsenentzündung an der rechten Halsseite. — 28. April 1903. — Starke Schwellung, Fieber, Schmerzen. Wunsch des Kranken. | 2. Mai 1903. Auslösung eines großen Drüsenpakets durch einen bogenförmigen, unter dem rechten Ohr beginnenden, 6 cm langen Schnitt nach vorn unten und einen zweiten Schnitt am vorderen Rande des Kopfnickers. Langsame Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 172 | Liegnitz, B., Grenadier. | Tuberkulöse Lymphdrüsenentzündung an der rechten Halsseite. Erbliche Belastung. — Anfang Januar 1903. — Rasche Zunahme der Drüsen-schwellung unter Schmerzen. | 12. Januar 1903. 12 cm langer Schnitt am hinteren Rande des Kopfnickers. Ausschälung eines großen zum Teil verkästen Drüsenpakets. Glatte Heilung, Auftreten einer bohnen großen Drüse. Rechtsseitiger Lungenspitzenkatarrh. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 173 | Insterburg, G., Kanonier. | Tuberkulöse Drüsenentzündung an der rechten Halsseite nach geheimer Drüsenvereiterung in der rechten Oberschlüsselbeingrube. — 23. Februar 1903. — Wunsch des Kranken. | 27. Februar 1903. 12 cm langer Schnitt am hinteren Rande des Kopfnickermuskels. Eröffnung der gemeinsamen Drosselblutader bei Ausschälung der mit ihr verwachsenen Drüsen. Unterbindung. Eiterfieber. Doppelseitige Lungenentzündung, Bildung zahlreicher Eiterherde u. a. in beiden Mittelohren. Tod an allgemeiner Blutvergiftung. | Gestorben am 19. Juni 1903. |
| 174 | Meiningen, L., Musketier. | Tuberkulöse Drüsen an der rechten Halsseite und in der rechten Achselhöhle; Miliartuberkulose. — 28. Januar 1903. — Erweichung der Drüsen. | 13. Juni 1903. Ausräumung der Drüsen am Halse und in der Achselhöhle. Glatte Heilung. Tod infolge von Miliartuberkulose. | Gestorben am 28. Juni 1903. |
| 175 | Stettin, W., Musketier. | Tuberkulöse Lymphdrüsen an beiden Halsseiten nach Halsentzündung. — 12. Mai 1903. — Wachsen und Erweichung der Drüsen. | 29. Juni 1903. Eröffnung mehrerer Abszesshöhlen unter beiden Unterkieferästen, Auslösung bzw. Auskratzung aller fühlbaren Drüsenknollen. Auftreten neuer Drüsen-schwellungen, Vereiterung und Fistelbildung. Mit Spiritusverbänden, Jodoformglyzerineinspritzungen und innerlichen Mitteln Besserung; abermalige Operation abgelehnt. | Ungeheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 176 | Danzig, M., Grenadier. | Hochgradige Halsdrüsentuberkulose beiderseits. Erkältung. — Tag der Erkrankung unbekannt. — Lebensgefahr durch Kräfteverfall. 1902 gleiche Operation auf der linken Seite mit Erhaltung des Kopfnickers und Freilegung des 11. Gehirnnerven. Operationsdauer je 4 Stunden. Glatte Wundverlauf. Im Versorgungsgebiet des 11. Gehirnnerven rechts Lähmung, links Schwäche. Gestörte Beweglichkeit des vornübergeneigten Kopfes. Tuberkulose innerer Organe nicht nachzuweisen. | 26. Juli 1902. Ausräumung des rechten vorderen und hinteren Halsdreiecks. Durchschneidung des Kopfnickers und Freilegung der rechten gemeinsamen Drosselblutader vom Warzenfortsatz bis zum Eintritt in die Brusthöhle. Es gelang nicht, den in festverwachsenen Drüsen eingebetteten 11. Gehirnnerven freizulegen. 4. September 11. Gehirnnerven. Operationsdauer je 4 Stunden. Glatte Wundverlauf. Im Versorgungsgebiet des 11. Gehirnnerven rechts Lähmung, links Schwäche. Gestörte Beweglichkeit des vornübergeneigten Kopfes. Tuberkulose innerer Organe nicht nachzuweisen. | Geheilt. Invalide. |
| 177 | Schweidnitz, Z., Sergeant (Trompeter). | Zellgewebsentzündung an der rechten Halsseite nach Verletzung an der Wange. — 8. November 1902. — Schnelles Fortschreiten der Entzündung. | 10. November 1902. Schnitt vom Kieferwinkel bis zum Brustbein neben einem vorhandenen Querschnitt. Ausschälung des sulzig veränderten Zellgewebes bis auf die großen Gefäße. Tamponade. Fortschreiten der Entzündung bis an die Brustwarze. Vom 13. November ab fieberfrei. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 178 | Frankfurt a. O., R., Kanonier. | Karbunkel im Nacken; Ursache unbekannt. — Ende September 1903. — Blutvergiftung. | 29. September 1903. Ausschneiden des Karbunkels auf der Grenze des gesunden Gewebes. Tamponade. Zurückgehen der Blutvergiftung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 179 | Cöln-Deutz, B., Musketier. | Tiefer Halsabszess, Furunkel im Nacken. — 1. März 1903. — Nackenschmerzen, Fieber. | 16. März 1903. Durch Einschnitt seitlich auf die Halswirbelsäule Entleerung eines unter den tiefen Halsmuskeln bis zum Schlüsselbein reichenden Abszesses. Langsame Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 180 | Stendal, M., Unteroffizier | Tiefer Halsabszess, von vernachlässigtem Zahngeschwür. — 14. Januar 1903. — Schmerzen, Fieber. | 15. Januar 1903. Schnitt gleichlaufend mit dem Unterkieferast, stumpfes Vordringen gegen die Halswirbelsäule, Entleerung einer in Höhe des 2. bis 3. Halswirbels befindlichen Höhle mit dickem, jauchigen Eiter. Drainage, häufige Ausspülungen. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 181 | Altona, H., Musketier. | Käsig-eiterige Entzündung der linken Ohrspeicheldrüse und tuberkulöse Lymphdrüsenentzündung. — Ursache unbekannt. — 1. Juli 1903. — Zunehmende Schwellung; Wunsch des Kranken. | 24. Juli 1903. Unter Schleichscher Lokalanästhesie 8 cm langer bogenförmiger Schnitt über die Ohrspeicheldrüse, deren käsig entarteter Teil zugleich mit einer haselnußgroßen Lymphdrüse entfernt wurde. Jodoformgazetamponade. Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 182 | Hamburg, K., Musketier. | Tuberkulöse Knochenmarkentzündung des rechten Jochbeins; Erkältung; gleichzeitig Vereiterung schlechter Zahnwurzeln. — 14. Juli 1903. — Zunehmende Schwellung des Jochbeins. | 19. Juli 1903. Bogenförmiger Schnitt über das rechte Jochbein. Entfernung des kranken Knochens und seiner Umgebung. Drainage, Naht. Beim Auskratzen des Zahnwurzelgrundes an der Stelle der entfernten Zähne Eröffnung der Highmorshöhle, Tamponade. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|------------------------------------|---|---|--|
| 183 | Posen, K., Obergefreiter. | Infektiöse Knochenmarkentzündung der rechten Unterkieferhälfte (Septicämie). Wahrscheinliche Ursache 2 kariöse Mahlzähne. — 16. Oktober 1902. — Hohes Fieber, Schüttelfröste, stinkender Eiter mit Streptokokken. | 31. Oktober 1902. Hautschnitt am unteren Rande der rechten Unterkieferhälfte, Aussägung des rechten Unterkieferastes am Kinn, Auslösung aus dem rechten Kiefergelenk. Naht. Gegen Kräfteverfall Kochsalzinfusionen. Unter hohem Fieber und Schüttelfrösten erlag der Kranke. | Gestorben am 7. November 1902. |
| 184 | Altona, T., Gefreiter. | Knochenmarkentzündung am linken Unterkiefer. — Erkältung im Dienst Ende Februar 1903. — Schwellung und hohes Fieber. | 23. März 1903. Schnitt am linken wagerechten Unterkieferrand. Entfernung der linken Unterkieferhälfte. Unterbindung der äußeren Halsschlagader. — 25. April 1903. Ausschneidung einer Fistel. Langsame Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 185 | Berlin, R., Kürassier. | Bruch des Unterkiefers. Hufschlag. — 22. Februar 1903. — Ungünstige Stellung der Bruchenden. | 24. Februar 1903. Erweiterung der vorhandenen Quetschwunde, Knochennaht mit 2 Silberdrähten. Ausstopfen mit Jodoformgaze. Eine anfangs vorhandene Fistel schloß sich nach Entfernung der Silberdrähte und eines kleinen abgestorbenen Knochenstückchens. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 186 | Mainz, V., Kanonier. | Offener Bruch des Unterkiefers. Hufschlag. — 9. Dezember 1902. — Verschiebung der Bruchenden. | 16. Dezember 1902. Freilegung der Bruchenden, Entfernung eines abgesprengten Stückes. Knochennaht mit Silberdraht. Befestigung der Zähne des Unterkiefers aneinander mit Silberdrahtschlinge. Langsame Heilung nach Abstofsung eines abgestorbenen Knochenstückchens. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 187 | Magdeburg, F., Arbeitssoldat. | Knorpelgeschwulst und Verbiegung der Nasenscheidewand nach rechts ohne bekannte Ursache. — Angeblich seit Jahren bestehend. — Behinderung der Nasenatmung rechts. | 25. September 1903. Spaltung des Nasenrückens in der Mittellinie, Freilegen der rechten Nasenhälfte, Abtragung der haselnußgroßen Geschwulst von der knorpeligen Nasenscheidewand. Ungestörter Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 188 | Brandenburg a. H., G., Füsilier. | Verbiegung der Nasenscheidewand ohne bekannte Ursache. — Während der Entwicklungsjahre entstanden. — Atembeschwerden. | 21. November 1902. Loslösen des linken Nasenflügels. Auslösen der stärksten verbogenen Seite der Scheidewand unter der Knorpelhaut. Glatter Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 189 | Münster, H., Unteroffizier d. Res. | Nasenpolypen. Rechtsseitige Naseneiterung, Schwerhörigkeit. — November 1902. — Ursache unbekannt. Wunsch des Kranken. | November 1902. — Mehrfache Operationen zur Entfernung der Polypen mit der Schlinge, zur Abtragung der Rachenmandel und Entfernung des vorderen Endes der rechten mittleren Nasenmuschel. Vergebliche Punktion der Oberkieferhöhle. Fortbestehen der Schwerhörigkeit. | Ungeheilt. Übungsunfähig entlassen. |
| 190 | Berlin, B., Grenadier. | Vereiterung der linken Oberkieferhöhle. Ursache unbekannt. — 12. Januar 1903. — Fistel an der linken Wange. | 26. Januar 1903. Langenbeckscher Resektionsschnitt. Ausschneidung der Fistel. Abtragung abgestorbener Knochenteile von der vorderen Oberkieferwandung. Entleerung des Eiters aus der Oberkieferhöhle. Tamponade. Fieberfreier Verlauf. Bildung einer festen, aber etwas entstellenden Narbe. | Geheilt. Dienstunfähig. |
| 191 | Leipzig, W., Soldat. | Vereiterung der rechten Oberkieferhöhle nach eiteriger Zahntzündung. — 5. Juli 1903. — Hohes Fieber und Benommenheit, Eiterverhaltung, drohende Blutvergiftung. | 13. Juli 1903. Eröffnung der rechten Oberkieferhöhle von der Wange aus und, da die Eiterung bis zur Stirnhöhle sich erstreckte, auch Eröffnung dieser Höhle. Entfernung zahlreicher stinkender Granulationen. Fortleitung der Eiterung durch das Siebbein. Hirnerscheinungen. Hirnhautentzündung, allgemeine Blutvergiftung. Abszels an der Nasenscheidewand links, eiterige Zerstörung eines Teiles des Nasengerüsts und der Siebbeinplatte. Beginnende Vereiterung der rechten Augenhöhle. | Gestorben am 17. Juli 1903. Leichenbefund: Eiterige. |
| 192 | Mülhausen i. E., B., Leutnant. | Eiterung in der rechten Oberkieferhöhle. Plötzliche Verschlimmerung nach Gewehrkolbenstoß beim Schießen am 20. Mai 1903. — Dauernde Schmerzen, eiteriger Ausfluß aus der Nase. | 21. Mai 1903. Eröffnung der rechten Oberkieferhöhle vom Zahnbett des ausgezogenen 2. Backzahnes und von der Nase aus. Tamponade und tägliche Ausspülung. Heilung nach 21 Tagen. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 193 | Posen, P., Sanitätssoldat. | Vereiterung der linken Oberkieferhöhle nach eiteriger Zahntzündung. — 15. Februar 1903. — Schwellung und Schmerzhaftigkeit. | 20. Februar 1903. Nach Entfernung einer Zahnwurzel Erweiterung des Wurzelfaches mit dem Knochenbohrer. Darauf Durchstoßung der seitlichen Wand der Oberkieferhöhle mit dem Krauseschen Trokar von dem linken unteren Nasengange aus. Durchspülung mit Borsäurelösung und Drainage mit Jodoformgaze. Glatte Heilung nach 18 Tagen. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 194 | Cassel, H., Musketier. | Vereiterung der linken Oberkieferhöhle. Angeblich nach Schnupfen. — Ende April 1903. — Schwellung und Schmerzhaftigkeit. | 7. Mai 1903. Entfernung des 2. Backzahnes und Eröffnung der Kieferhöhle vom Zahnfache aus unter Benutzung des Elektromotors. Ausspülung mit Kochsalzlösung und Tamponade mit Jodoformgaze. Glatter Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 195 | Worms, P., Musketier. | Vereiterung der linken Stirnhöhle nach chronischem Tränensackleiden. — 14. Mai 1903. — Schwellung und Schmerzhaftigkeit in der Stirn- und Kopfschmerzen. | 26. Mai 1903. Eröffnung und Auskratzung der Stirnhöhle. Herstellung einer weiten Verbindung mit der Nase. Glatter Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 196 | Posen, S., Füsilier. | Vereiterung der rechten Stirnhöhle. Ursache unbekannt. — 30. Oktober 1902. — Andauernde Schmerzen und Eiterabsonderung. | 15. Dezember 1902. Aufmeißelung und Auskratzung der rechten Stirnhöhle. Drainrohr nach der Nase. Allmähliche Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 197 | Hannover, F., Musketier. | Vereiterung der rechten Stirnhöhle. Pyämisches Fieber und Kopfschmerzen nach Furunkel an der rechten Hand. 27. Dezember 1902. | 6. Januar 1903. Eröffnung der rechten Stirnhöhle. Weder in dieser noch in der Tiefe der durch Schrägschnitt am oberen Rande eröffneten Augenhöhle wurde Eiter gefunden. Stärkere Vortreibung des Augapfels. 16. Januar 1903. Schnitt am unteren Augenhöhlenrande. Reichliche Eiterentleerung aus der Tiefe. Heilung ohne Störung. | Geheilt. Invalide. |
| 198 | Worms, K., Musketier. | Siebbeinhöhleenerkung. Alte Entzündung der Tränenwege links. — 16. März 1903. — Eiteransammlung im Siebbein. | 26. Mai 1903. Eröffnung des Siebbeins durch Abmeißelung eines Teiles der inneren Augenhöhlenwand und Anlegung einer Öffnung in der linken Nasenwandung. Äußere Hautnaht, Tamponade der linken Nasenhöhle. Glatte Heilung der äußeren Wunde. Eiterabsonderung aus der Nasenhöhle bis Anfang Juli. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 199 | Mülhausen i. E., K., Sanitäts-soldat. | Angeborene Halsfistel (mittlere Kiemengangcyste). — 31. Oktober 1902. — Verschluss der Fistel. | 31. Oktober 1902. Ausrottung des bis zum Zungenbein reichenden Ganges. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 200 | Lübben, B., Schütze. | Fremdkörper in der Speiseröhre. Beim Husten verschlucktes Gebiß, Kautschukplatte mit 2 Zähnen. — 28. Mai 1903. — Erfolglosigkeiten aller Versuche, das Gebiß mit Schlundzange u. s. w. zu entfernen. Tamponade mit Jodoformgaze. In den nächsten Tagen katarrhalische Lungenerscheinungen, mäßiges Fieber. Später normaler Verlauf. Von Anfang Juli Speiseröhre dicht; Mitte August Schlufs der Wunde. Heiserkeit. | 29. Mai 1903. Chloroformbetäubung. Schnitt am Innenrand des linken Kopfnickers von der Kehlgrube bis 2 Fingerbreit oberhalb des Ringknorpels. Nach Aufsuchen und Eröffnen der zusammengehaltenen Speiseröhre fand sich das Gebiß hinter dem Kehlkopf, die Zähne nach unten. Eine Herausbeförderung aus der Wunde gelang nicht. Entfernung vom Munde aus, nachdem das Gebiß mittels der Kornzunge nach oben in den Schlund gestofsen war. | Geheilt. Dienstfähig zur Reserve. |

B. Operationen am Rumpf.

1. Operationen bei eiteriger Brustfellentzündung.¹⁾

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|-----------------------------|
| 201 | Mörchingen, B., Ober-leutnant. | Linksseitige eiterige Rippenfellentzündung nach Erkältung. — 26. Februar 1903. — Entleerung des nachgewiesenen Eiters. | 30. März 1903. Ausschneidung eines 4 cm langen Stückes der 7. Rippe, Eröffnung des Brustfellraumes und Eiterentleerung. Nachlaß des Fiebers, Verheilung der Operationswunde nach Aufhören der Eiterung. Zunahme des Körpergewichts. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 202 | Metz, D., Musketier. | Linksseitige Eiterbrust nach Erkältung. — 4. Januar 1903. — Entleerung des Eiters. | 1. Februar 1903. Aussägung eines 5 cm langen Stückes der linken 7. Rippe in der Achsellinie zur Eröffnung des linken Brustfellraums. Keine Neigung zur Verkleinerung der Wundhöhle. — 7. März 1903. Ausschneidung eines 12 bzw. 6 cm langen Stückes von der 4. bzw. 5. Rippe. Hebung des Kräftezustandes. | Geheilt. Invalide. |
| 203 | Rathenow, B., Husar. | Rechtsseitige Eiterbrust nach Grippe und Lungenentzündung. — 22. Februar 1903. | 28. Februar 1903. Rippenausschneidung rechts. 2 bis 3 l dünnflüssiger Eiter entleert. — 5. März 1903 Nachweis von Eiter im linken Brustfellsack. Rippenausschneidung links. Lunge mit dem Brustfell verwachsen, kein Eiter. Probestiche in der Umgebung ergaben ebenfalls keinen Eiter. Herzschwäche. | Gestorben am 17. März 1903. |

¹⁾ Es sind im ganzen 91 Operationen bei eiteriger Brustfellentzündung ausgeführt worden. Von diesen sind in die Operationsliste nur 13 aufgenommen worden, welche die verschiedenen Arten der Operation und des Heilungsverlaufes charakterisieren sollen. Sämtliche Operationen wegen Brustfellentzündung sind nach Art und Zeit der Operation, Ausgang und Behandlungsdauer zahlenmäßig in den Tabellen der III. Gruppe erörtert worden.

| Lfde. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-----------|---------------------------------|---|--|--|
| 204 | Frankfurt a. M., B., Musketier. | Linksseitige eiterige Brustfellentzündung nach Lungenentzündung. — 23. Februar 1903. — Entfernung des nachgewiesenen Eiters. Lunge erfolglos blieb. 12. September 1903. Ausschneidung der 6. bis 10. Rippe, Druchtrennung und Ablösung der Schwarten. Tamponade. Zunächst Abnahme der Eiterung, später Kräfteverfall, doppelseitige Bronchitis und Herzschwäche. | 4. März 1903. Ausschneiden eines 5 cm langen Stückes der 6. linken Rippe und Eiterentleerung. Fortdauer der Eiterung, keine Erweiterung der stark geschrumpften Lunge. — 17. Mai 1903. Ausschneiden eines 5 cm langen Stückes der 8. Rippe zur besseren Ableitung des Eiters. Da diese Operation wie die Anwendung des Verfahrens von Perthes zur Ausdehnung der geschrumpften | Gestorben am 6. Oktober 1903. |
| 205 | Berlin, M., Grenadier. | Rechtsseitige Lungen- und Brustfellentzündung nach Erkältung. — 9. Dezember 1902. — Entleerung des nachgewiesenen Eiters, der Reinkulturen von Streptokokken enthielt. | 17. Dezember 1902. Ausschneiden eines 6,5 cm langen Stückes der 9. Rippe zur Eröffnung des Brustfellsackes. 1 l trübe, seröse Flüssigkeit entleert. Anhaltende Eiterung und abendliche Temperatursteigerungen. — 9. März 1903. Entfernung je eines 8 bis 9 cm langen Stückes von der 8., 7. und 6. Rippe. Ungestörte Heilung. — Am 2. Mai 1903 Wunde geschlossen. | Geheilt. Dienstunfähig. |
| 206 | Metz, F., Musketier. | Linksseitige eiterige Brustfellentzündung. Ursache unbekannt. — 25. Oktober 1902. — Entleerung des Eiters. | 5. November 1902. Ausschneiden eines 12 cm langen Stückes der 9. und 10., Entfernung der ganzen 11. und 12. linken Rippe, Entleerung von 1500 ccm Eiter. Keine Neigung zur Heilung. — 12. Dezember 1902. Entfernung des Restes der 9. Rippe, Aussägung eines 7 cm langen Stückes der 7. und 8. linken Rippe. Ver- | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 207 | Liegnitz, E., Grenadier. | Linksseitige eiterige Brustfellentzündung. Ursache unbekannt. — 9. November 1902. — Behinderung des Atmens. Eiternachweis. | 24. November 1902. Ausschneiden eines 5 cm langen Stückes der linken 8. Rippe und Eiterentleerung. Günstiger Verlauf. Eine Fistel schloß sich bald nach Vornahme von starken Ausatmungsbewegungen. Sekundärnaht, strichförmige Narbe. Herz blieb etwas nach links verzogen. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 208 | Alleustein, P., Ökoniehändler. | Rechtsseitige Eiterbrust und Abszesse in der rechten Lunge ohne bestimmte Ursache. — 30. Oktober 1902. — Hohes Fieber, Eröffnung der Eiterhöhlen. am 10. Dezember im 11. Zwischenrippenraum und am 22. Dezember 1902 in der Gegend unterhalb des rechten Rippenbogens neue Eiterherde eröffnet. Fortschreitende Erschöpfung. | 19. November 1902. Unter Schleichscher Betäubung Ausschneidung eines 1,5 cm langen Stückes der 6. Rippe. Nach Durchtrennung des Brustfellsackes etwa 2 l trübe blutig-wässrige Flüssigkeit entleert. — 22. November 1902 durch Einschnitt im 7. Zwischenrippenraum 400 ccm dicker Eiter entleert. Wegen fortgesetzter Neuanammlungen von Eiter wurden am 27. November im 6., am 28. im 7., | Gestorben am 28. Dezember 1902. Leichenbefund: Abszesse im rechten Mittel- und Unterlappen und in der Leber. |
| 209 | Berlin, R., Invalide. | Linksseitige Brustfistel nach Eiterbrustoperation. — 16. Mai 1902. — Dauernde Absonderung aus der Fistel. Ausschneidung möglichst großer Stücke der 5. bis 8. Rippe. Entfernung aller schwartigen Verdickungen. Zur Verkleinerung der etwa 2 Fäuste großen Wundhöhle wird der nach oben geklappte Hautlappen senkrecht gespalten, worauf die Ränder der beiden Teile lateral mit dem unteren Wundrande vernäht wurden, so daß nur ein medianer dreieckiger Spalt offen blieb. Feste Tamponade. Die Wunde verkleinerte sich allmählich, doch blieb trotz mehrerer Nachoperationen eine Fistel zurück. | 16. Dezember 1902. Ausschneidung eines weiteren Stückes der früher resezierten 8. und 9. sowie Ausschneidung eines Stückes der 7. Rippe. Keine Neigung zur Heilung. — 18. Februar 1903. Umschneidung der Fistel mit halbmondförmigem, nach unten konvexem Schnitt von etwa 20 cm Länge, Aufklappen des Hautlappens und | Fistelbildung. Invalide. |
| 210 | St. AvoId, B., Kanonier. | Linksseitige Eiterbrust. — 14. Januar 1903. — Zellgewebsentzündung am rechten inneren Knöchel. Venenentzündung. Eiterfieber. | 13. Februar 1903. Ausschneidung eines 2 cm langen Stückes der 7. Rippe in der hinteren Achsellinie. Eröffnung und Drainage des Brustfellraums. Anhaltendes Eiterfieber und eiterige Entzündung in mehreren Gelenken der unteren Gliedmaßen. Herzschwäche. | Gestorben am 21. Februar 1903. |
| 211 | Wiesbaden, W., Füsilier. | Serös-eiteriger Erguß im linken Brustfellraum. — 5. August 1903. — Zellgewebsentzündung an der rechten Ferse. Hohes Fieber, allgemeine Blutvergiftung. | 13. August 1903. Ausschneidung eines 5 cm langen Stückes der 6. Rippe in der Schulterblattlinie, Entleerung des Brustfellraums, Drainage. Fortschreiten der Entzündung am rechten Unterschenkel. Herzschwäche. | Gestorben am 14. August 1903. |
| 212 | Hannover, S., Musketier. | Eiterbrust nach Blutvergiftung, die von einer kleinen Verletzung an der Hand ausging. — 26. Januar 1903. | 31. Januar 1903. Aussägung eines Stückes der 7. Rippe. Entleerung von 750 ccm serös-eiteriger Flüssigkeit, die Streptokokken enthielt. | Gestorben am 31. Januar 1903. |
| 213 | Frankfurt a. O., S., Invalide. | Fistel auf dem Rücken nach einem im Februar 1903 von einem Zivilarzt zur Eröffnung der Eiterbrust im 9. rechten Zwischenrippenraum ausgeführten Einschnitt. — Neue Eiteransammlung im Brustfellraum. | 7. März 1903. Einschnitt auf die alte Narbe. Ausschneidung von 4 cm aus der 8. Rippe. Gegenöffnung an der vorderen Brustwand an einer Stelle, wo der Eiter unter die Haut durchgebrochen war. Drainage. Durchspülungen mit Borsäurelösung. Wegen beiderseitiger Spitzentuberkulose Überführung in ein Zivilkrankenhaus am 20. Juli 1903. | Ungeheilt. Einem Krankenhaus überwiesen. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|--|------------------------------------|--|---|---|
| 2. Eröffnungen der Bauchhöhle (Laparotomien). | | | | |
| 214 | Danzig (Langfuhr), W., Husar. | Quetschung des Bauches und der Brust durch Sturz mit dem Pferde und Hufschlag. — 29. Juli 1902. — Annahme einer Darmzerreißung. Später Zeichen einer umschriebenen Lungeneiterung. | 29. Juli 1902. Bauchschnitt in der Mittellinie. Im Dünndarm ein querer Rifs, daneben ein etwa talergroßes Loch. Ausschneiden eines 12 cm langen Darmstückes. Czerny-Lembertsche Naht. Günstiger Verlauf. Nach Eintritt von Erscheinungen, die für einen Eiterherd in der rechten Lunge sprachen; am 29. August 1902 Ausschneiden von 2 Stücken aus der 9. und 10. rechten Rippe neben der Wirbelsäule. Entleerung des walnufgroßen, im Lungengewebe befindlichen Eiterherdes. Später glatter Heilungsverlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 215 | Hagenau, J., Kanonier. | Quetschung des Bauches durch Hufschlag. — 26. August 1903. — Allgemeine Bauchfellentzündung. Verdacht auf Darmzerreißung. | 27. August 1903. Längsschnitt in der Mittellinie. Allgemeine Bauchfellentzündung. 40 cm oberhalb des Blinddarms rundes Loch von 0,75 cm Durchmesser. Ausschneiden eines Darmstückes (Resektion). Vereinigung der Darmenden durch den Murphyknopf. Ausstopfen der Bauchhöhle. Fortschreiten der Bauchfellentzündung. An der Operationsstelle nichts Regelwidriges. Keine weiteren Verletzungen am Darm. Allgemeine Bauchfellentzündung. | Gestorben am 28. August 1903. Leichenbefund: An der Operationsstelle nichts Regelwidriges. Keine weiteren Verletzungen am Darm. Allgemeine Bauchfellentzündung. |
| 216 | Straßburg i. E., P., Kanonier. | Quetschung des Bauches durch Hufschlag. — 8. September 1903. — Reizung des Bauchfells. Verdacht auf Darmzerreißung. | 8. September 1903. Längsschnitt in der Mittellinie. Beginnende Bauchfellentzündung. Etwa 18 cm unterhalb des Pfortners ein 4 cm langes klaffendes Loch im Dünndarm. Speisebrei in der Bauchhöhle. Darmausschneidung (Resektion); Vereinigung durch den Murphyknopf. Teilweiser Schluß der Bauchwunde. Am 19. September Spätnaht. Am 24. September Abgang des Knopfes. Günstiger Heilungsverlauf. Feste Narbe. | Geheilt. Invalide. |
| 217 | Dresden, K., Kanonier. | Quetschung des Bauches. Überfahren. — 24. Januar 1903. — Zeichen innerer Blutung. | 24. Januar 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie. Austupfen flüssigen Blutes aus der Bauchhöhle. Entfernung der von ihrem Gefäßstiel zum größten Teil abgerissenen, 2 flache Risse zeigenden Milz. Entfernung der quer durchgequetschten linken Niere. Naht. Eingießungen in den Mastdarm. Zunehmende Herzschwäche. | Gestorben am 24. Januar 1903. Leichenbefund: Bruch der 9. bis 11. Rippe. Starke Blutung in der Muskelbinde des Rückens. Zerquetschung der rechten Niere. |
| 218 | Colmar i. E., A., Gefreiter. | Beckenbruch. Quetschung des Bauches. Überfahren. — 18. August 1903. — Verdacht einer Darmzerreißung mit Blutung in die Bauchhöhle. | 19. August 1903. Bauchschnitt. Vor der Operation wiederholte Kochsalzinfusionen zur Kräftigung des Herzens. 15 cm langer Schnitt in der Mittellinie. Keine Darmzerreißung, dagegen starke Quetschungen am absteigenden Dickdarm und Blutung in die Bauchhöhle. Blutstillung. Abspülung der Darmschlingen mit warmer Kochsalzlösung. Naht der Bauchdecken. Ungestörte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 219 | Posen, S., Kanonier. | Quetschung des Unterleibs durch Huftritt. — 2. März 1903. — Vermutete eiterige Bauchfellentzündung. | 15. März 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie 18 cm lang. Freier Eiter zwischen den Dünndarmschlingen. Austupfen und Jodoformgazeausstopfung; teilweise Naht. Fortschreiten der allgemeinen eiterigen Bauchfellentzündung. | Gestorben am 16. März 1903. Leichenbefund: Dünndarmschlingen mit eiterigem Belag bedeckt. An 3 Stellen beginnender Brand des Darms. |
| 220 | Stuttgart, H., Ökonomiehandwerker. | Stichwunde in der rechten unteren Brustseite. — 13. Januar 1903. — Vermutete Eröffnung der Bauchhöhle mit Verletzung von Eingeweiden. | 13. Januar 1903. Erweiterung der Wunde am äußeren Rande des rechten geraden Bauchmuskels. Eröffnung der Bauchhöhle in Ausdehnung von 10 cm. Auf der Leberoberfläche eine 1 cm lange, oberflächliche, leichtblutende Stichwunde, keine weitere Verletzung von Eingeweiden. Einlegen eines Jodoformgazestreifens nach der Wunde hin. Naht der übrigen Wunde. Heilung ohne Störung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 221 | Graudenz, G., Musketier. | Stichverletzung des Bauches mit einem Taschenmesser. — 1. August 1903. — Blutung aus der oberen Bauchdeckenarterie. | 1. August 1903. Schnitt in der Mittellinie, 12 cm lang vom Schwertfortsatz bis fast zum Nabel und 6 cm langer Querschnitt nach rechts am oberen Drittel der ersteren. Entfernung von Blutgerinnseln. Unterbindung der oberen Bauchdeckenarterie (Art. epigastrica superior). Naht der Bauchdecken mit Ausnahme des Schnittes, das ausgestopft wird. Guter Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 222 | Graudenz, J., Musketier. | Messerstich in den Bauch. — 1. August 1903. — Einklemmung eines Teiles des Netzes in die Stichwunde. | 2. August 1903. Längsschnitt in der Mittellinie und Querschnitt auf die Mitte des Längsschnittes. Abtragung des eingeklemmten Netzstückes. Naht der Bauchdecken bis auf eine Öffnung für einen Gazedocht. Ungestörter Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|--|--|---|--|
| 223 | Cassel, F., Husar. | Stichverletzung des Bauches. Lanzenstich 5 cm oberhalb vom Poupartschen Band. — 17. April 1903. — Netzvorfall. Zeichen innerer Blutung. | 17. April 1903. Verlängerung der Stichwunde am Aufsenrand des rechten geraden Bauchmuskels. Naht zweier Wunden im Dünn darm, Ausstopfen eines Schlitzes in der Gekröswurzel, Ausstopfen des Blutes aus der Bauchhöhle. Naht der Wunde bis auf die Öffnung für den Mullstreifen. Glatter Verlauf trotz geringer Eiterung der eigentlichen Stichwunde. Feste Bauchnarbe. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 224 | Spandau, B., Pionier. | Stichwunde des Bauches. Fall auf eine eiserne Gitterstange. — 20. Februar 1903. — Annahme einer Darmverletzung. | 21. Februar 1903. Erweiterung der Stichwunde. Darm unverletzt. Abtragung eines verletzten Netzstückes. Jodoformgazedocht. Naht. Heilung nur durch Stichkanalleitung etwas verzögert. Feste Narbe. | Geheilt. Invalide. |
| 225 | Neu-Ruppin, K., Gefreiter. | Bauchverletzungen durch Explosion eines Zünders. — 8. August 1903. — Zeichen innerer Blutung. (Über zahlreiche weitere Verletzungen s. Schufsliste No. 75). | 9. August 1903 morgens. Chloroformbetäubung. Bei Beginn der Betäubung Entleerung eines blutigen Stuhls. Bauchschnitt in der Mittellinie. In der Bauchhöhle viel dunkles Blut. Wegen plötzlichen Kräfteverfalls Operation abgebrochen. Kurze Zeit später trotz Kochsalzeingießungen und Wiederbelebungsversuchen Tod. Leichenöffnung nicht gestattet. Ein durch die Operationswunde vorgezogenes Darmstück zeigte 2 Durchlöcherungen. | Gestorben am 9. August 1903. |
| 226 | Halberstadt, D., Kürassier. | Platzpatronenschufsverletzung in der rechten Oberbauchgegend. (Leberverletzung.) — 20. August 1903. — Selbstmordversuch durch Karabinerschufs auf dem Schießplatz Alten-Grabow. Regelung der Wundverhältnisse. | Kurz nach der Verletzung im Schießplatzlazarett Spaltung der Schufswunde nach rechts und links, bis die vorliegende Darm schlinge vorgezogen werden konnte. Beim Absuchen des unverletzt gefundenen Darms fand sich ein abgerissenes Leberstück von 2 : 2,5 : 0,5 cm Gröfse. Am unteren Leberrande wurden Ausbuchtungen gefühlt. Jodoformmulldochte. 6 Tage lang Fieber und peritonitische Erscheinungen. Einreibungen mit Credéscher Salbe und Collargol einspritzungen. Verbände längere Zeit mit Galle durchfeuchtet. Heilung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 227 | Danzig (Langfuhr), F., Husar. | Platzpatronenschufs in den Bauch. Selbstmord. — 14. Mai 1903. — Innere Blutung. | 14. Mai 1903. Eröffnung der Bauchhöhle. Schnitt durch die Einschufsöffnung. Milz zertrümmert. Loch im Zwerchfell. — Wegen Kräfteverfalls Tamponade. Tod 1/4 Stunde nach der Operation. | Gestorben am 14. Mai 1903. |
| 228 | Bromberg, B., Füsilier. | Schrotschufs in der linken Oberbauchgegend. Entladung eines Jagdgewehrs durch Unglücksfall auf der Jagd. — 15. Juli 1903. — Innere Blutung. | 15. Juli 1903. Bauchschnitt ohne Betäubung, Schnitt über die Einschufsöffnung parallel dem linken Rippenbogen. Loch im Zwerchfell, durch welches Netz in die Brusthöhle vorgefallen war. Trotz Einspritzung von 1200 ccm Kochsalzlösung Tod während der Operation. | Gestorben am 15. Juli 1903. Leichenbefund: Milz und Querdarm zerrissen. |
| 229 | Neu-Ruppin, D., Gefreiter. | Schufswunden am Unterleib durch Explosion eines Geschoszünders. Unglücksfall. — 8. August 1903. — Netzvorfall. Zahlreiche weitere Verletzungen. (Schufsliste No. 74). | 9. August 1903. Erweiterung zweier Wunden und Abtragung des aus ihnen vorgefallenen Netzes nach Unterbindung desselben. Weitere operative Eingriffe wegen zunehmender Schwäche unterlassen. Tamponade. Tod am folgenden Morgen. | Gestorben am 10. August 1903. |
| 230 | Celle, W., Musketier. | Schufswunde im Bauch. Geschofs aus dem Dienstgewehr. Selbstmord. — 12. August 1903. — Zeichen einer Darmverletzung. (Schufsliste No. 33). | 12. August 1903. Bauchschnitt. Entfernung von 30 cm Dünn darm, der 5 mal durchschossen war. Naht. Grauweiße Beläge auf den Dünn darmschlingen. Tod am folgenden Tage unter zunehmender Herzschwäche. | Gestorben am 13. August 1903. |
| 231 | Münster, A., Unteroffizier. | Scharfer Schufs nahe dem linken unteren Rippenrande. Schufsliste No. 19. — 14. November 1902. — Vermutung einer Darmverletzung wegen nachweisbarer Dämpfung in der linken Bauchseite. | 14. November 1902. Freilegung und teilweise Entfernung der zerschossenen 7. und 8. Rippe. Bauchschnitt parallel dem Rippenrand. Bauchfell unverletzt. An der Vorderfläche des Querdarms eine pfennigstückgrofse Blutunterlaufung. Drainage und Naht der Bauchwunde. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 232 | Mülhausen i. E., Z., Sergeant. | Bauchschufs mit scharfer Patrone aus dem Dienstgewehr. Selbstmordversuch. (Schufsliste No. 29.) — 22. November 1902. — Innere Blutung. | 22. November 1902. Bauchschnitt. Ausgedehnte Leber- und Magen naht. Tamponade der Leberwunde. 14 Stunden nach der Operation plötzlicher Tod. ¹⁾ | Gestorben am 23. November 1902. Leichenbefund s. Schufsliste. |
| 233 | Magdeburg (Standort Ulm), S., Unteroffizier. | Selbstmord durch Revolverschufs dicht unter dem linken Rippenbogen. — 5. Januar 1903. — Herzschwäche. Innere Blutung. | 6. Januar 1903. Eröffnung der Bauchhöhle durch kreuzförmigen 10 : 14 cm langen Schnitt über den Einschufs hinweg. Naht einer 1 cm langen Wunde an der Vorderfläche des Magens. Tamponade eines 5 cm langen Risses im linken Leberlappen. Jodoformgazeta mponade. Tod nach 12 Stunden. | Gestorben am 6. Januar 1903. Leichenbefund: Der Schufskanal ging weiter durch die hintere Magenwand, die Milz, Zwerchfell und 11. Rippe. |

¹⁾ Deutsche militärärztliche Zeitschrift, 1904, S. 111.

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|--|--|--|--|
| 234 | Breslau, P., Sergeant. | Bauchfelltuberkulose nach Lungentuberkulose. — 8. Januar 1903. — Heilversuch. | 6. Februar 1903. 10 cm langer Bauchschnitt über die Drüsen- geschwulst, die mit dem Darm vielfach verwachsen war. Lösung der Verwachsungen zwischen Darm und Netz. Etagennaht. Heilung der Wunde. | Gebessert. Dienst- unfähig. |
| 235 | Breslau, N., Grenadier. | Bauchfelltuberkulose nach Lungentuberkulose. — 11. Juli 1903. — Durch Bauchwassersucht bedingte Beschwerden. | 14. August 1903. Bauchschnitt zwischen Nabel und Schambein. Ent- leerung von 5 bis 6 l gelber, trüber Flüssigkeit. Drainage, Ver- band. Andauernde Flüssigkeitsabsonderung. Der Kranke starb an Erschöpfung. | Gestorben am 24. Sep- tember 1903. |
| 236 | Hamburg, Z., Musketier. | Darm- und Bauchfelltuberkulose. Ur- sache unbekannt. — 28. April 1903. — Lebensgefahr. Wunsch des Kranken. | Bauchschnitt in der Mittellinie. Glatte Wundheilung. Fieber und Flüssigkeitsansammlung kehrten nicht wieder. | Besserung. Invalide. |
| 237 | Stettin, S., Gefreiter. | Chronische tuberkulöse Bauchfell- entzündung nach Quetschung des Bauches beim Turnen. — Anfang März 1903. — Andauerndes remit- tisches Fieber. Erguß in der Bauchhöhle. | 9. Mai 1903. Bauchschnitt 6 cm lang zwischen Nabel und Scham- beinfuge. Bauchfell mit zahlreichen Knötchen durchsetzt und mit dem Netz verwachsen. Stumpfe Durchtrennung. 1 l trübe Flüssig- keit entleert. Ausschneidung eines Stückes des knotig verdickten Netzes. Naht. Glatte Wundheilung. Im Bauch strang- und plattenförmige Verdickungen fühlbar. Seifeneinreibungen. | Gebessert. Invalide. |
| 238 | Mainz, M., Musketier. | Knollige Bauchfelltuberkulose. Ur- sache unbekannt. — 11. Dezember 1902. — Zur Sicherung der Diagnose auf Wunsch des Kranken. | 21. Januar 1903. Bauchschnitt vom Nabel zur Schambeinfuge. Über das ganze Bauchfell verbreitete und mit den Därmen verwachsene, nicht operierbare Geschwulstknoten vorgefunden. Naht. Mikro- skopisch: Drüsentuberkulose. Trotz weiteren Wachsens der Ge- schwülste 10 kg Gewichtszunahme. | Ungeheilt. Invalide. |
| 239 | Mülhausen i. E., R., Dragoner. | Geschwulst in der Nabelgegend. Ur- sache unbekannt. — 7. Februar 1903. — Entfernung der Geschwulst. | 16. Februar 1903. 5 cm langer Bauchschnitt unterhalb des Nabels in der Mittellinie. Aus kleinen tuberkulösen Drüsen bestehende Geschwulst des Gekröses, die nicht operierbar war. Glatte Heilung der Wunde. | Ungeheilt. Dienst- unbrauchbar. |
| 240 | Glogau, ¹⁾ K., Unteroffizier. | Tuberkulöse Drüsengeschwulst des Gekröses und des absteigenden Astes des Dickdarms. — Tag der Erkrankung unbekannt. — Wachsen der Geschwulst und Fieber. | 25. Mai 1903. Bauchschnitt. Freilegen der faustgroßen Geschwulst im Gekröse des Dickdarms. Von ihrer Entfernung wurde wegen der Größe und mutmaßlicher Metastasenbildung abgesehen. Wund- naht. Unter fortgesetztem Fieber und Kräfteverfall erlag der Kranke. | Gestorben am 31. Mai 1903. |
| 241 | Ortelsburg, R., Jäger. | Tuberkulöse Geschwulst des Bauch- fells. — Ursache unbekannt. — Februar 1903. — Aussichtslosigkeit anderer Behandlung. | 14. April 1903. 7 cm langer Bauchschnitt vom Nabel abwärts mit Durchtrennung der Geschwulst. Entfernung unmöglich. Wundnaht, Drainage am unteren Wundwinkel. Heilung erfolgte nicht. Unter Kräfteverfall und subnormalen Temperaturen bis 34,6° starb der Kranke. | Gestorben am 5. Mai 1903. Leichenbe- fund: Aufser der 20 cm langen, 16 cm breiten, bis 2 cm dicken, mit Tuberkeln durchsetzten Geschwulst fanden sich tuberkulöse Beläge auf fast allen Brust- und Baueingeweiden. Größere Tuberkel in den Lungen und Ergüsse in beiden Brust- fellsäcken und in der Bauchhöhle. |
| 242 | Ludwigslust, P., Invalide. | Strahlenpilzerkrankung des Unter- leibes. — 1. Mai 1901. — Drohender Durchbruch einer Eiteransammlung in den Bauchdecken. | 30. Januar 1903. Spaltung des Abszesses. Auskratzung einer Fistel im Beckenbindegewebe. Nach mehrfacher Fistelbildung Heilung der Operationswunde durch Fleischwärzchenbildung. Bei der Entlassung am 28. April 1903 bestand noch eine nicht operable faustgroße Geschwulst zwischen Blase und Mastdarm. | Ungeheilt in die Heimat entlassen. |
| 243 | Berlin, J., Schütze. | Eiterige Bauchfellentzündung. — 13. Juni 1903. — Ursache unbekannt. Anhaltendes Erbrechen, zeitweise kotig. | 19. Juni 1903. Bauchschnitt rechts von der Mittellinie. Darm stark gebläht und gerötet. Vom kleinen Becken und von der Leber her übelriechender Eiter. Därme durch dicke fibrinöse Schwarten ver- wachsen. Jodoformgazetamponade. Erneutes Erbrechen. Zu- nehmender Verfall. | Gestorben am 20. Juni 1903. |
| 244 | Straßburg i. E., W., Unteroffizier. | Eiterige Bauchfellentzündung. Durch- bruch tuberkulöser Darmgeschwüre. — 7. Mai 1903. — Hohes Fieber. Lebensgefahr. | 10. Juli 1903. Typischer Schrägschnitt parallel dem Leistenbände. Entleerung abgekapselter trüber Flüssigkeit. Tamponade. Bildung eines Eiterherdes oberhalb der Blase. Eröffnung 13. Juli 1903. Verfall unter heftigen Leibscherzen. | Gestorben am 14. Juli 1903. Leichenbe- fund: Ver- dichtung einer Lungenspitze, tuberkulöse Geschwüre im Dickdarm. Am Darm 2 kirschgroße Öffnungen. |

¹⁾ Siehe St.-A. Kownatzki: Zur Kasuistik der Mesenterialtumoren. Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1904, Heft 5.

| Lfde. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-----------|----------------------------------|---|---|---|
| 245 | Oels, M., Jäger. | Verengung der Speiseröhre nach Salzsäureverätzung. Selbstmordversuch. — 15. Juli 1903. — Andauerndes Erbrechen. Abmagerung, hochgradige Schwäche. Erbrechen. Annahme einer Verengung des Magenpförtners. — 15. September 1903. — Nach Erweiterung des alten Schnittes Einpflanzung einer Leerdarmschlinge in den Magen. Verschluss der Magenfistel. Die abführende Schlinge blieb leer. Anlegung einer Dünndarmfistel. Ernährung durch Eingießungen. | 13. August 1903. Ohne Narkose in fast bewußtlosem Zustande Bauchschnitt neben der Mittellinie. Freilegung des Magens und Eröffnung desselben nach Anheftung an die Bauchwand. Einnähen eines Nelaton-Katheters. Hautnaht. Künstliche Ernährung. Anfangs Erbrechen. Vereiterung der linken Ohrspeicheldrüse. Spaltung. Ernährung teils von der Magenfistel, teils vom Munde aus. Öfteres | Gestorben am 26. September 1903. |
| 246 | Offenburg, W., Musketier. | Gallensteinkolik. Ursache unbekannt. — 9. Dezember 1902. — Dauerndes hohes Fieber. Schwellung in der Gegend der Gallenblase. Erbrechen, Kräfteverfall. | 10. Januar 1903. 8 cm langer Schnitt am Rippenbogen entlang. Eröffnung der Gallenblase, die stark erweitert und verdickt war. Entleerung von 268 haselnuß- bis stecknadelknopfgroßen Cholestearinsteinen im Gesamtgewicht von 15 g. Drainage der Gallenblase. Fieberloser Verlauf. Nach 4 Wochen Schluß der Wunde. Keine Beschwerden. Die Narbe hinderte angeblich das Tragen des Koppels. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 247 | Treptowa.R., M., Füsilier. | Entzündung der Gallenausführungsgänge. 4 Monate vorher. Lungenentzündung mit Gelbsucht. Nach der Operation in der Galle der Diplokokkus Fränkel nachgewiesen. — 2. Juli 1903. — Kräfteverfall. Heftige Schmerzen in der Gallenblasengegend. Fieber. | 29. Juli 1903. 6 cm langer Schnitt am rechten Rippenbogen entlang und senkrecht dazu ein 8 cm langer Schnitt. Einnähen der Gallenblase in die Bauchwunde. Eröffnung. Glasdrainage. Danach Aufhören der Schmerzen. Schwinden der Gelbsucht und des Fiebers. — 23. November 1903. Schluß der Gallenfistel durch Naht unter örtlicher Betäubung. Seit 15. Dezember 1903 Aufhören jeder Gallenabsonderung nach außen. | Geheilt. Invalide. |
| 248 | Ludwigsburg, B., Unteroffizier. | Darbeschwerden. Sturz mit dem Pferde. — 18. August 1901. — Verdacht auf Geschwulst in der Bauchhöhle. | 21. Januar 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie. Kein krankhafter Befund. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Invalide wegen Nervenschwäche. |
| 249 | Karlsruhe, M., Kanonier. | Innerer Darmverschluss. Kotstauung nach Genuß großer Mengen von Kommisbrot und Verschlucken eines 2 cm langen Knochenstücks (das später aus dem künstlichen After entleert war). — 13. März 1903. — Lebensgefahr. Großer Kräfteverfall. | 18. März 1903. Bauchschnitt. Vornähen des Blinddarms in die Bauchwunde. Eröffnung. Entleerung großer Mengen Kot und Gas sowie eines großen Knochenstücks. Später Fieber, Dämpfung der linken Bauchhälfte, starker Kräfteverfall. — 6. April 1903. Bauchschnitt links. Eröffnung eines großen abgekapselten Eiterherdes von 2 l Inhalt. Drainage. Allmähliche Besserung. Kotentleerung auf natürlichem Wege. — 16. Juni 1903. Verschluss des künstlichen Afters am Blinddarm. Versenkung des geschlossenen Darmes, Ausstopfung der Bauchdeckenwunde. 6 Tage lang guter Verlauf. — 22. Juni plötzlich Bauchfellentzündung. Wiedereröffnung des Darms ohne Erfolg. | Gestorben am 23. Juni 1903. Leichenöffnung: Beginnende Bauchfellentzündung. Die Darmnaht hatte nicht nachgegeben. |
| 250 | Colmar i. E., M., Unteroffizier. | Innerer Darmverschluss. Alte Bauchfellentzündung und Darmverwachsung. — 23. August 1903. — Kräfteverfall. | 26. August 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie. Darmverschluss durch alte Verwachsungen dicht oberhalb der Bauhinschen Klappe. Anlegen eines künstlichen Afters handbreit oberhalb der Bauhinschen Klappe. Bauchdeckennaht. Nach Hebung der Kräfte Verlegung in die Universitätsklinik Freiburg i. B. Dort 18. Dezember 1903 Auffrischung der Dünndarmenden, ringförmige Darmnaht. Heilung ohne Störung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 251 | Stuttgart, B., Grenadier. | Innerer Darmverschluss. Ursache unbekannt. — 8. Juli 1903. — Beginnende Bauchfellentzündung. | 18. Juli 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie unterhalb des Nabels. Narbenverengung in der Gegend der S-förmigen Krümmung. Ausschneiden eines 12 cm langen Dickdarmstückes. Naht des Darms und der Bauchwunde. Bauchfellentzündung. | Gestorben am 19. Juli 1903. |
| 252 | Spandau, S., Pionier. | Innerer Darmverschluss. Heftige Erkältung und Darmkatarrh. — 10. Mai 1903. — Lebensgefahr. | 15. Mai 1903. Bauchschnitt. Abschnürung durch einen daumengroßen Dünndarmanhang (Divertikel). Ausschneidung eines 30 cm langen, im Absterben begriffenen Dünndarmstückes. Darmnaht mit Murphyknopf. Ungestörte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 253 | Gumbinnen, H., Füsilier. | Innerer Darmverschluss. Ursache unbekannt. — 30. Januar 1903. — Kotbrechen, schneller Kräfteverfall. | 3. Februar 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie. Umschnürung des Dünndarmes 1,20 m oberhalb der Bauhinschen Klappe durch einen 10 cm langen Meckelschen Darmanhang. Durch Lösung und Abtrennung des abgestorbenen Meckelschen Anhangs wurde der Darm sofort durchgängig. Nach der Operation Erholung; in der Nacht Verfall. Herzschwäche. | Gestorben am 4. Februar 1903. |
| 254 | Neifse, S., Pionier. | Innerer Darmverschluss. Ursache unbekannt. — 2. Januar 1903. — Lebensgefahr. | 6. Januar 1903. Bauchschnitt. Einklemmung einer Dünndarmschlinge in einer Bauchfelltasche (hernia omentalis?). Lösung des eingeklemmten Darmstückes. Tod nach 2 1/2 Stunden. | Gestorben am 7. Januar 1903. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| 255 | Brandenburg a. H., M., Füsilier. | Innerer Darmverschluss. Erkrankung auf Urlaub. — 28. Dezember 1902. — Ursache unbekannt. Lebensgefahr. Bauchfellentzündung. 2 1/2 Stunden. Grofse Herzschwäche, Kochsalzlösung subkutan. 2 Stunden später reichlicher dünner Stuhlgang, kurz danach Tod an Herzschwäche. | 31. Dezember 1902. Bauchschnitt. Abschnürung und Achsendrehung einer 50 cm langen Dünndarmschlinge durch einen 12 cm langen Meckelschen Darmanhang. Abtragung des Darmanhangs und Ausschneidung der blauschwarzen, augenscheinlich brandigen Dünndarmschlinge. Darmaht. Bauchnaht. Dauer der Operation | Gestorben am 1. Januar 1903. |
| 256 | Ulm, B., Kanonier. | Darmverschluss, plötzlich beim Exerzieren entstanden. — 23. Januar 1903. — Koterbrechen. | 28. Januar 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie. Achsendrehung fast des ganzen Dünndarmgekröses. Feste Verklebungen mit den umliegenden Darmschlingen. Anlage einer künstlichen Verbindung (Anastomose) des Darms ober- und unterhalb des Hindernisses. Drainage. Bauchnaht. Erbrechen. Herzschwäche. | Gestorben am 29. Januar 1903. |
| 257 | Rastatt, v., Musketier. | Innerer Darmverschluss. (Achsendrehung einer 2 m langen Dünndarmschlinge.) Ursache unbekannt. — 17. September 1903. — Kräfteverfall. Annahme einer allgemeinen Bauchfellentzündung nach Wurmfortsatzeiterung, da der Kranke im August 1903 eine Blinddarmentzündung durchgemacht hatte. | 18. September 1903. Bauchschnitt in der Blinddarmgegend. Entleerung trüber, übelriechender Flüssigkeit. Achsendrehung einer 2 m langen, dunkelblaurot verfärbten Dünndarmschlinge um etwa 180°. Zurückdrehen, wonach die geblähte Darmschlinge unter Gurren zusammenfiel. Wurmfortsatz kleinfingerdick, hinten oben fest verwachsen. Wegen Schwäche Abbruch der Operation. Naht der Bauchwunde, Drainage. Kräfteverfall. Kochsalzlösung unter die linke Brusthaut, Kamfer. Herzschwäche. | Gestorben am 19. September 1903. |
| 3. Operationen bei Blinddarmentzündungen. | | | | |
| 258 | Halberstadt, K., Musketier. | Tuberkulose des Blinddarms. Ursache und Tag der Erkrankung unbekannt. — Lazarettaufnahme 25. April 1903. — Fieber, unstillbare Durchfälle und Kräfteverfall. | 20. Juli 1903. Schrägschnitt. Wurmfortsatz nicht gefunden, ebenso wenig Eiterherd. Blinddarm- und Gekrösetuberkulose. Entfernung der tuberkulösen Herde unmöglich. Schnell eintretende Blutarmut. | Gestorben am 21. Juli 1903. |
| 259 | Stettin, B., Kanonier. | Blinddarmentzündung. Erkältung. — 3. Mai 1903. — Schwellung in der Blinddarmgegend. Weifse Blutkörperchen 20 000. | 14. Mai 1903. Schrägschnitt. 250 ccm stinkender, zwischen Blinddarm und Dünndarmschlingen eingekapselter Eiter entleert. 1 cm großes Loch im Blinddarm. Gummidrain. Jodoformgazetamponade. Nach anfänglicher Besserung erneutes Fieber. — 21. Mai 1903 stumpfe Eröffnung einer nahe der Harnblase gelegenen hühneri-grofsen Eiterhöhle. Heilung der Kotfistel 1. Juni, der Wunde 4. Juli. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 260 | Gnesen, W., Musketier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 12. Mai 1903. — Eiter-nachweis in der rechten Weiche und Nierengegend. | 26. Juni 1903. Schnitt 12 cm lang parallel der rechten 12. Rippe. Reichliche Eiterentleerung. Gegenöffnung 2 cm vor dem vorderen oberen Darbeinstachel. Regelrechter Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 261 | Ostrowo, H., Musketier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. (Lag vom 17. bis 29. Juli 1903 im Lazarett wegen Quetschung eines Fingers, die ohne Eiterung verlaufen sein soll.) — 30. Juli 1903. — Verdacht auf Eiterung. | 3. August 1903. Schrägschnitt. Eröffnung der Bauchhöhle. Verklebung der vorliegenden Darmschlingen. Bei 2 Punktionen mit der Pravazspritze kein Eiter gefunden. Gazeausstopfung. — 9. August 1903 Durchbruch des Eiters nach der Bauchwunde. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 262 | Coblenz, W., Musketier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 28. Juni 1903. — Eiterung. | 8. Juli 1903. Schrägschnitt. Öffnung einer abgesackten, aufserhalb des Bauchfells gelegenen Eiterhöhle. Jodoformgazeausstopfung. Heilung durch Fleischwärzchenbildung. | Geheilt. Invalide. |
| 263 | Posen, P., Unteroffizier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 14. November 1902. — Vermutung von Eiter wegen Zunahme der weifsen Blutkörperchen (von 16 000 am 17. November auf 22 500 am 28. November). | 28. November 1902. Schrägschnitt. Entleerung einer Eiterhöhle dicht am vorderen Darbeinstachel. Wurmfortsatz nicht sichtbar. Drainage. Naht. Guter Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 264 bis 270 | Bei 7 weiteren ebenfalls dienstfähig wiederhergestellten Operierten (3 Unteroffizieren, 4 Mannschaften) hatte sich die Operation wie im obigen Falle auf die Eröffnung eines 30 ccm bis 1 l grofsen abgekapselten Eiterherdes beschränkt, und zwar 6mal (Stettin, Torgau [2], Leipzig, Ettlingen, Strafsburg i. E.), weil der Wurmfortsatz nicht zu Gesicht kam, 1mal (Graudenz), weil er so fest verwachsen war, dafs seine Ablösung unmöglich erschien. Die Schnittführung wird 6mal als Schrägschnitt, 1mal als Bauchschnitt in der Blinddarmgegend bezeichnet. Nur 1mal lag der Abszefs hinter dem Blinddarm (Stettin). In Torgau fand sich in einem Abszefs ein Kotstein, in Graudenz wurde ein Stück Netz entfernt. 6 Operationen wurden während oder nach dem ersten Anfall, und zwar je 3 in der 2. und 3. Woche nach der Krankmeldung ausgeführt; 1 Kranker (Ettlingen) wurde 4 Tage nach einem Rückfall operiert. Bildung von Bauchbrüchen oder Tragen von Bandagen ist nicht erwähnt. | | | 7 Kranke geheilt. 7 dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|---|--|--|--|
| 271 | Münster, E., Musketier. | Blinddarmentzündung. Erkältung. — 13. Mai 1903. — Abszefsbildung. | 20. Mai 1903. Schrägschnitt. Entleerung einer großen jauchigen Eiterhöhle. Gegenöffnung in der Lendengegend. Drainage. Beim ersten Verbandwechsel am 23. Mai Entleerung von Kot aus beiden Wunden. Schluß der Kotfistel von selbst. — 27. Juni 1903. Eröffnung einer zweiten Abszefshöhle. Wurmfortsatz nicht gefunden. Naht der Bauchwunde bis auf eine Drainöffnung. Glatte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 272 | Berlin, F., Ökonomiehandwerker. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 11. April 1903. — Nachweisbare Eiteransammlung. | 23. April 1903. Schrägschnitt. 300 ccm stinkender Eiter aus einer seitlich vom Blindarm liegenden Höhle entleert. Wurmfortsatz nicht sichtbar. Jodoformgazetamponade. Nach 3 Tagen fand sich ein bohnengroßer Kotstein in der Wunde. Gute Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 273 bis 296 | Bei weiteren 24 Operierten, bei denen gleichfalls ein 30 ccm bis 1 l großer, zwischen Darmschlingen abgekapselter Abszefs eröffnet wurde, ohne daß der Wurmfortsatz zu Gesicht kam, wurde ebenfalls völlige Heilung der Wunde erzielt, die Dienstfähigkeit aber nicht erhalten (Berlin, Stettin, Halle, Torgau, Görlitz, Oberglogau, Paderborn, Parchim, Ludwigslust, Lübeck, Hildesheim, Meiningen, Cassel, Dresden, Straßburg i. E. [3], Hagenau, Bitsch, Mutzig, Mainz [3], Worms) (5 Unteroffiziere, 19 Mannschaften, darunter 1 Ökonomiehandwerker). Die Schnittführung wird 9mal als Schrägschnitt, 6mal als Bauchschnitt (1mal am Außenrande des rechten geraden Bauchmuskels), 3mal als Flankenschnitt, sonst nicht genauer bezeichnet. 2mal wurden Gegenöffnungen in der Lendengegend gemacht (Mainz). Die Eiterhöhle war 1mal mehrfach gekammert (Stettin), ihre Lage war 2mal hinter dem Blindarm (Berlin, Oberglogau), 3mal (Mainz [2], Worms) hinter dem aufsteigenden Dickdarm, 1mal (Görlitz) an dessen Innenrande, 3mal (Paderborn, Dresden, Lübeck) im kleinen Becken, 1mal (Cassel) hinter der Blase, sonst ist sie nicht näher angegeben. In Bitsch mußte außer dem Abszefs am Blindarm ein zweiter vor der Blase eröffnet werden. Kotsteine wurden in Berlin, Ludwigslust und Hagenau gefunden. Der Operierte in Cassel hatte nach der Operation einen schweren Bronchialkatarrh zu überstehen; bei ihm zeigte sich der Darm nach der Heilung schwer durchgängig. Bei je einem Operierten (Mainz, Mutzig, Hildesheim und Cassel) waren anfänglich Kotfisteln entstanden, von denen sich die beiden ersten von selbst schlossen, die dritte durch einfache Naht, die vierte durch 2 Nachoperationen beseitigt wurde. Bei den Kranken in Torgau und Oberglogau war die Operation nach 1 bzw. mehreren Rückfällen der Blinddarmentzündung, bei den übrigen 4mal in der 1. Woche, 10mal in der 2. Woche, 4mal in der 3. Woche, 1mal in der 4. Woche, 3mal in der 6. bis 8. Woche nach dem ersten Anfall vorgenommen. Neigung zur Bildung eines Bauchbruchs wird nur 1mal (Bitsch) erwähnt. Der Kranke in Görlitz und 2 Kranke in Mainz wurden mit fester Narbe und einer Leibbinde bzw. einer bruchbandartigen Bandage entlassen. | | 24 Kranke geheilt. 21 invalide. 3 dienstunbrauchbar. | |
| 297 | Potsdam, F., Jäger. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 28. Oktober 1902. — Wachsender Abszefs. | 10. November 1902. Schrägschnitt. $\frac{1}{2}$ l Eiter entleert. Tamponade. Heftiges Erbrechen, zunehmende Schwäche. Leichenöffnung: Ein zweiter, zwischen Blase und Mastdarm gelegener Eiterherd war — wahrscheinlich beim Erbrechen nach der Narkose — in die Bauchhöhle durchgebrochen. | Gestorben am 11. November 1902. |
| 298 | Dieuze, M., Musketier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 27. August 1903. — Eiteransammlung. durch Verwachsungen sehr erschwert. Murphyknopf. Besserung. 10 Tage später Durchbruch des Darmverengerung. Rascher Verfall. | 4. September 1903. Schrägschnitt. Eröffnung einer sehr großen Eiterhöhle. Wurmfortsatz nicht sichtbar. — 9. September 1903. Kotfistel. 2 Tage später eine zweite Fistel an einer hohen Dünndarmschlinge. Starker Kräfteverfall. — 7. Oktober 1903. Ausschneidung eines 60 cm langen Dünndarmstückes mit der Fistel; Murphyknopf. Besserung. 10 Tage später Durchbruch des Darmverengerung. Rascher Verfall. 30. Oktober Lungenentzündung. | Gestorben am 1. November 1903. |
| 299 | Görlitz, H., Musketier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 31. Juli 1903. — Bauchfellentzündung. Abszefsbildung. öffnung in der Mittellinie unterhalb des Nabels. Jodoformgazedocht. Abfall des Fiebers. Am 8. August lag der abgestoßene Wurmfortsatz beim Verbandwechsel in der Wunde. Im Blindarm ein linsengroßes Loch, aus dem sich Kot entleerte. Mit Bandage entlassen. | 4. August 1903. Schrägschnitt. Entleerung einer größeren Menge klarer seröser Flüssigkeit. Nach Lösung frischer Verklebungen am Blindarm quollen aus der Tiefe gegen 100 ccm dicker kotig riechender Eiter hervor. Wurmfortsatz in der Tiefe undeutlich sichtbar, nicht erreichbar. Ausstopfung mit Jodoformgaze. Gegenöffnung in der Mittellinie unterhalb des Nabels. Jodoformgazedocht. Abfall des Fiebers. Am 8. August lag der abgestoßene Wurmfortsatz beim Verbandwechsel in der Wunde. Im Blindarm ein linsengroßes Loch, aus dem sich Kot entleerte. Guter Heilungsverlauf unter fortgesetzter Jodoformgazetamponade. | Geheilt. Invalide. |
| 300 | Straßburg i. E., S., Militärgefangener. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 15. Mai 1903. — Zunehmende Auftreibung des Leibes. Kräfteverfall. | 16. Mai 1903. Schrägschnitt. Entleerung viel blutig-seröser Flüssigkeit aus der freien Bauchhöhle. Eröffnung eines zwischen den Dünndarmschlingen gelegenen Eiterherdes. Wurmfortsatz nicht sichtbar. Im Juli kurze Zeit rechtsseitige trockene Brustfellentzündung. Sonst ungestörter Verlauf. Beginnender Bauchbruch. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 301 | Stettin, P., Hilfsheboist. | Blinddarmentzündung. Erkältung. — 25. April 1903. — Bauchfellentzündung, Kotbrechen. Kräfteverfall. | 4. Mai 1903. Schrägschnitt. Zahlreiche Verklebungen des Bauchfelles und der geröteten aufgeblähten, mit fibrinösen Belägen bedeckten Darmschlingen. Blindarm von stinkendem Eiter umgeben. Jodoformgazestreifen. 2 Gummidrains. Kochsalzlösung. Kampferäther. Abends zur weiteren Drainage der Bauchhöhle Schnitt in der Mittellinie. Alle Därme verklebt. Jodoformgaze. Einstopfung nach Mikulicz. 4 Stunden später Tod. darm verwachsen, an 2 Stellen durchlöchert. | Gestorben am 5. Mai 1903. Leichenöffnung: Wurmfortsatz hinter dem Blind- |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|------------------------------------|--|--|--|
| 302 bis 305 | | Auch bei 4 weiteren, trotz der Operation verstorbenen Kranken in Weissenfels, Trier, Dieuze, Graudenz (1 Unteroffizier, 3 Mannschaften) hatte schon vor der Operation eine durch Blinddarm- bzw. Wurmfortsatzentzündung hervorgerufene Bauchfellentzündung bestanden. Als Zeichen derselben werden erwähnt: Eiterige und schwartige Beläge auf den Därmen und Eiteransammlungen zwischen teils verwachsenen, teils verklebten Eingeweiden und Darmschlingen: Graudenz im kleinen Becken, Weissenfels am Darmbein und zwischen Dünndarmschlinge, Trier und Dieuze am Blinddarm und hinter der Blase. Die Operationen sind zwischen dem 3. und 8. Tage, einmal 17 Tage nach der Erkrankung ausgeführt. Der Tod trat 3 mal innerhalb des ersten, 1 mal am 4. Tage nach der Operation ein. Der Wurmfortsatz wurde 1 mal bei der Operation zerstört (Trier), 1 mal bei der Leichenöffnung durchlöchert gefunden (Dieuze). | | 4 Kranke gestorben. |
| 306 | Rastatt, S., Sanitätsgefreiter. | Blinddarm- und Bauchfellentzündung. Ursache unbekannt. — 2. Juni 1903. — Kräfteverfall. Erguß in der Bauchhöhle. | 7. Juni 1903. Bauchschnitt in der Blinddarmgegend. Entleerung von eiterig-kotiger Flüssigkeit aus der Bauchhöhle. Blinddarm mit Wurmfortsatz fest verklebt. Herausnahme des durchlöcherten Wurmfortsatzes wegen der Verwachsungen nicht möglich. Ausspülung der Bauchhöhle mit Kochsalzlösung. Gazeausstopfung. Kräfteverfall, Tod an Herzschwäche. | Gestorben am 8. Juni 1903. |
| 307 | Göttingen, K., Musketier. | Blinddarm- und rechtsseitige Brustfellentzündung. Ursache unbekannt. — 2. Mai 1903. — Allgemeine Bauchfellentzündung. | 6. Mai 1903. Je 1 Längsschnitt in der Mittellinie und 8 cm weiter nach rechts. Entleerung von $\frac{1}{2}$ l eiteriger, stinkender Flüssigkeit. Verwachsungen und Verklebungen. In der Blinddarmgegend 2 Kottsteine, der größere bohnen groß. 4 Stunden darauf Tod. Allgemeine eiterige Bauchfellentzündung. Im stark geknickten, verdickten Wurmfortsatz 3 Durchlöcherungen. Harnleiterverengerung links (angeboren). Nierenbeckenerweiterung (Hydronephrose). Rechtsseitige eiterige Brustfellentzündung. | Gestorben am 6. Mai 1903. Leichenöffnung: |
| 308 | Glogau, B., Musketier. | Blinddarm- und Bauchfellentzündung. Ursache unbekannt. — 14. Februar 1903. — Zeichen von Darmverschluss, Koterbrechen. | 17. Februar 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie. Eiterige Bauchfellentzündung mit starken Belägen auf den Darmschlingen. In der Gegend des Wurmfortsatzes grobe Eiterhöhle. Querer Schnitt nach rechts. Einnähen einer Dünndarmschlinge in den unteren Winkel des Längsschnitts. Eröffnung des Darms. Naht bis auf die Öffnung für einen Jodoformgazetampon. | Gestorben am 17. Februar 1903. |
| 309 | Berlin, J., Schütze. | Alte Blinddarm- und Bauchfellentzündung. Eiterige Bauchfellentzündung. — 13. Juni 1903. — Andauerndes Erbrechen zuletzt von kotigen Massen. und Schwartenbildung. Daher Unterbrechung der Operation, Jodoformgazetamponade, Offenlassen der Wunde, trockener Verband. Fortsetzung des Koterbrechens, das nach einigen Kokaingaben (innerlich) aufhörte. Bald nach Mitternacht Tod. | 19. Juni 1903. 20 cm langer Schnitt parallel dem Poupart'schen Bande. In der Blinddarmgegend Verwachsung der Därme zu einem Klumpen. Wurmfortsatz nach hinten verlagert, fest mit Darmschlingen verwachsen. Vom kleinen Becken her Entleerung stinkenden Eiters, ebenso von der Leber her, überall Verwachsungen | Gestorben am 20. Juni 1903. |
| 310 | Bromberg, K., Grenadier zu Pferde. | Blinddarm- und Bauchfellentzündung. — 21. Februar 1903. — Eiterige Bauchfellentzündung. — 25. Februar 1903. — Seit Anfang Februar 1903 Drüsenvereiterung an der linken Halsseite. | 2. März 1903. Schnitt am Aufsenrande des rechten geraden Bauchmuskels. Wurmfortsatz anscheinend gesund. Zweiter Schnitt am Aufsenrand des linken geraden Bauchmuskels, etwa $\frac{1}{4}$ l stinkender Eiter aus der freien Bauchhöhle entleert. 9 Tage später Eiter im linken 10. Zwischenrippenraum punktiert. — 14. März 1903. Ausschneidung eines Stücks der 10. Rippe. Durchtrennung des Zwerchfells, Entleerung eines großen Abszesses unter demselben. Schneller Verfall. stein. Mehrere Eiterherde zwischen den verklebten Darmschlingen. | Gestorben am 14. März 1903. Leichenöffnung: Wurmfortsatz brandig, in ihm ein großer Kot- |
| 311 | Saarburg, St., Ulan. | Blinddarm- und Bauchfellentzündung. Ursache unbekannt. — 4. Mai 1903. — Eiterfieber, Kräfteverfall. verschluss, Bauchschnitt. Dünndarm 2 m unterhalb des Magens durch eine strangförmige Verwachsung zwischen vorderer Bauchwand und Netz scharf abgeschnürt. Lösung der Verwachsung. Fortschreiten der Bauchfellentzündung. alter hühnereigroßer Abszess, im rechten abgelaufene Lungenentzündung. Zwischen Milz und Zwerchfell taubenei-großer alter Abszess. In der linken Niere bohnen großer alter Abszess. Darm oberhalb der abgeschnürten Stelle stark aufgetrieben. Abgekapselte hühnereigroße Eiterherde am durchlöcherten Wurmfortsatz und zwischen schwartigen verwachsenen Dünndarmschlingen. Allgemeine Bauchfellentzündung. | 14. Mai 1903. Schrägschnitte in beiden Unterbauchgegenden. Viel Eiter entleert. Kochsalzeingießung unter die Haut. Athereinspritzungen. Langsame Erholung. Rechts Kotfistel; links 2 Eiterfisteln. — 2. August 1903. Verlegung in das Garnisonlazarett I Straßburg i. E. — 3. Oktober 1903. Zeichen von innerem Darm- | Gestorben am 3. Oktober 1903. Leichenöffnung: Im linken unteren Lungenlappen ein |
| 312 | Cassel, D., Musketier. | Blinddarm- und Bauchfellentzündung. Ursache unbekannt. — 3. Januar 1903. — Deutlich sichtbarer, druckempfindlicher Wurmfortsatz. | 23. Januar 1903. Bauchschnitt am Aufsenrand des rechten geraden Bauchmuskels. Schwierige Lösung flächenhafter Verwachsungen, dabei mehrfache Verletzungen der Darmserosa, die übernäht werden. Abtragung des Wurmfortsatzes. In der Schleimbant zahlreiche Blutungen, in der Mitte eine Striktur, am Ende eine Durchlöcherung. Naht. Fieberfreier Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|---------------------------------|---|--|--|
| 313 bis 319 | | Bei 7 weiteren Operierten in Breslau (2), Sonderburg, Jena, Rudolstadt und Cassel (2) (1 Wallmeister, 2 Unteroffiziere, 4 Mannschaften) wurde die Wiederherstellung der Dienstfähigkeit durch Abtragung des meist nach oben umgeschlagenen, stets stark mit dem Blinddarm, in Cassel 1 mal mit dem Dünndarm, das andere Mal auch mit dem Netz verwachsenen Wurmfortsatzes erreicht. Die Schnittführung wird 1 mal als Schrägschnitt, 6 mal als Bauchschnitt (2 mal am Rande des rechten graden Bauchmuskels) bezeichnet. Bei dem Operierten in Sonderburg war der Wurmfortsatz misfarbig und teilweise zerfallen, bei denen in Cassel zeigte er Geschwüre und starke Verengerungen, in Jena waren Schleimhautblutungen vorhanden. In Sonderburg konnte nur ein Teil des stark verwachsenen Wurmfortsatzes abgetragen werden, der Rest wurde übergelüht. Eiterungen am Wurmfortsatz sind nicht erwähnt. Alle 7 Operationen wurden nach dem 1. Anfall, und zwar 4 mal in der 1. Woche, 2 mal in der 2. und 1 mal in der 3. Woche ausgeführt. Bauchbrüche und Tragen von Bandagen sind nicht erwähnt. | | 7 Kranke geheilt. 7 dienstfähig. |
| 320 | Cassel, F., Musketier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 5. Januar 1903. — Fühlbarer, empfindlicher Wurmfortsatz. | 20. Januar 1903. Bauchschnitt am Außenrand des rechten graden Bauchmuskels. Abtragung des Wurmfortsatzes. In der Schleimhaut Blutaustritte, in der Spitze eine 2 1/2 cm lange Schweineborste und 3 freie Härchen. Glatte Heilung. Klagen über Schmerzen in der Narbe. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 321 bis 326 | | Ähnlich wie in vorstehendem Falle wurde bei 6 weiteren Operationen in Breslau (2), Cassel, Mülhausen i. E., Mainz, Worms (1 Unteroffizier, 5 Mannschaften) durch Abtragung des Wurmfortsatzes Heilung erzielt, jedoch blieb die Diensttauglichkeit nicht erhalten. Die Schnittführung wird je 1 mal als Schräg- und Flankenschnitt, 4 mal als Bauchschnitt (1 mal von der Leiste zum Nabel, 1 mal am Außenrande des rechten graden Bauchmuskels) bezeichnet. Der Wurmfortsatz war in allen Fällen entzündet, außerdem 1 mal verwachsen und nach der Niere zu hochgeschlagen (Mülhausen i. E.), 1 mal enthielt der verkümmerte Wurmfortsatz einen Kotstein (Breslau), 1 mal zeigte er 2 Strikturen und Schleimhautblutungen (Cassel). Eiterung ist nie erwähnt. Der Operierte in Cassel hatte eine heftige Bronchitis zu überstehen, der in Worms erkrankte 5 Wochen nach der Operation an schwerem Gelenkrheumatismus. Die Operationen fanden 2 mal in der 1., je 1 mal in der 2., 4., 5. und 6. bis 8. Woche nach der Krankmeldung beim 1. Anfall statt. Bauchbrüche sind nicht erwähnt. Der Operierte in Mainz wurde bei fester Narbe mit bruchbandartiger Bandage entlassen. | | 6 Kranke geheilt. 4 invalide. 2 dienstunbrauchbar. |
| 327 | Prenzlau, B., Musketier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. Verschlimmerung durch den Dienst. — 12. November 1902. — Eiterbildung. | 24. November 1902. Einschnitt. Abtragung des in erhebliche Schwarten eingebetteten entzündeten, einen Kotstein enthaltenden Wurmfortsatzes. — Kotfistel. — 9. Dezember 1902 erfolglose Naht der Fistel. Verlegung in das Garnisonlazarett Frankfurt a. O. — 9. Mai 1903. Breite Mobilisierung und Anfrischung der Fistel. Naht der Blinddarmwand in 3 Schichten. — Dieffenbachsche Plastik zum Verschluss der großen Bauchwunde (Hautschnitt 5 cm nach außen von der Wunde, Verschiebung der abgelösten Haut nach der Fistel zu, Naht über der Fistel). Heilung der vernähten Wunde durch erste Verklebung, des Defekts durch Fleischwärzchen. | Geheilt. Invalide. |
| 328 | Mainz, G., Gefreiter. | Chronische Blinddarmentzündung. Erster Anfall 5 Jahre vorher. Ursache nicht bekannt. Wunsch des Kranken wegen dauernder Beschwerden. | 27. Mai 1903. Flankenschnitt. Wurmfortsatz verdickt, in ihm Geschwürsbildung, harter Kot und mehrere Oxyuren. Abtragung desselben. Naht. Glatte Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 329 bis 333 | | Von 5 weiteren Kranken in Frankfurt a. O., Breslau, Ettlingen, Straßburg i. E. (2) (2 Unteroffiziere, 3 Mannschaften), bei denen chronische Beschwerden die Veranlassung zur Operation gegeben hatten, blieb 1 (Ettlingen) dienstfähig, die 4 anderen wurden nach beendeter Heilung invalide. Der 1. Anfall lag meist weit zurück, 1 mal war er in der Kindheit nach dem Heben einer Reckstange aufgetreten (Ettlingen). Die Schnittführung wird 3 mal als Schräg-, 2 mal als Flankenschnitt bezeichnet. Der Wurmfortsatz erwies sich bei allen Operierten chronisch entzündet, 3 mal war er verwachsen, 1 mal (Straßburg i. E.) mit dem Netz, 1 mal enthielt er einen Kotstein (Frankfurt a. O.). Eiterung ist nicht erwähnt. Sämtliche Operationen sind zur Zeit der Wahl im freien Zwischenraum ausgeführt. Über Bauchbrüche und Tragen von Bandagen finden sich keine Angaben. | | 5 Kranke geheilt. 1 dienstfähig. 4 invalide. |
| 334 | Frankfurt a. O., S., Füsilier. | Chronische Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 11. Juni 1903. — Operation im anfallsfreien Zustand auf Wunsch des Kranken. | 18. Juli 1903. Flankenschnitt. Entleerung eines eingedickten, abgekapselten Abszesses, in demselben ein erweichter Kotstein und wachstumsfähige, nicht virulente Staphylokokken. Entfernung des Wurmfortsatzes. Naht. Drainage. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Invalide. |
| 335 | Frankfurt a. O., S., Grenadier. | Chronische Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. Erster Anfall Ende Juni 1902. — 3. Oktober 1902. — Rückfall mit Druckempfindlichkeit in der Blinddarmgegend. Gefahr eines neuen Rückfalls. Vermehrung der weißen Blutkörperchen vom 13. bis 17. Oktober von 11 000 auf 17 000. | 18. Oktober 1902. Flankenschnitt. Entfernung des fest in der Tiefe der Darmbeinhöhlung verwachsenen Wurmfortsatzes. Naht. Im entzündeten Fortsatz lag ein Kotstein. Am 20. Oktober Zeichen von Blutvergiftung. Beim Verbandwechsel kein Eiter. Entfernung der Nähte. Tamponade. Am 21. Oktober Tod an Herzschwäche. schmutzig - weißen Belägen. Wurmfortsatznaht verklebt. Umschriebene Bauchfellentzündung. | Gestorben am 21. Oktober 1902. Blinddarm grauschwarz verfärbt, mit |
| 336 | Cassel, W., Ökonomiehandwerker. | Blinddarmentzündung. Dauerndes Sitzen bei der Arbeit. — 10. Juni 1903. — 4 mal akute Anfälle. Schmerzhaftigkeit der Blinddarmgegend. | 23. Juni 1903. Bauchschnitt am Außenrande des rechten graden Bauchmuskels. 11 cm langer, in der Mitte abgeknickter Wurmfortsatz mit gewulsteter Schleimhaut und Blutaustritten in derselben. Abtragung. Bauchnaht. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|----------------------------|---|--|---|
| 337 bis 345 | | Von 9 weiteren Kranken in Brandenburg a. H., Torgau, Münster (2), Mülheim a. Ruhr, Hannover, Jena, Neubreisach, Graudenz (1 einjährig-freiwilliger Arzt, 2 Unteroffiziere, 5 Mannschaften, 1 Invalide), bei denen der chronisch entzündete, mehrmals auch mit dem Blinddarm verwachsene Wurmfortsatz ebenfalls nach mehrfachen Rückfällen abgetragen war, wurden 8 als dienstfähig wiederhergestellt, 1 nach vollendeter Heilung invalide (Münster). Die Schnittführung wird 7mal als Schrägschnitt, 2mal als Bauchschnitt bezeichnet. Der Wurmfortsatz war 1mal mit dem Netz verwachsen (Graudenz), 1mal zeigte er 2 Strikturen (Münster), mehrmals wird er als verwachsen, scharf oder mehrfach geknickt bezeichnet. Bei dem Kranken in Jena fand sich klare seröse Flüssigkeit in der Bauchhöhle. — Der operierte Invalide in Münster hatte 4 Tage nach der Operation eine Lungenentzündung im rechten Unterlappen zu überstehen. Die Operationen fanden 2mal 4 bzw. 8 Tage, 2mal in der 2. bzw. 3. Woche nach dem letzten Anfall, sonst zu frei gewählter Zeit, statt. Von Bauchbrüchen bezw. von Tragen von Bandagen ist nichts erwähnt. | | 9 Kranke geheilt. 8 dienstfähig. 1 invalide. |
| 346 | Gotha, B., Musketier. | Blinddarmentzündung. Erkältung. — 4. April 1903. — 3 maliger akuter Anfall. Druckempfindlichkeit in der Blinddarmgegend. | 29. Juni 1903. Bauchschnitt am Aufsenrande des rechten geraden Bauchmuskels. Abtragung des stark verwachsenen Wurmfortsatzes. Seine Mündung war verschlossen, seine Höhle durch Schleimansammlung ausgedehnt (Hydrops). Naht. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 347 | Jena, G., Musketier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 29. November 1902. — Brechreiz. Schmerzen. | 2. Dezember 1902. Bauchschnitt. Lösung des mit seinem Ende im kleinen Becken festgewachsenen Wurmfortsatzes und Abtragung desselben. In ihm dicker, jauchiger Eiter, dicht vor dem Durchbruche. Drainage. Am 3. Tage nach der Operation Lungenentzündung im rechten Unterlappen. 5 Tage später Krise. Leichte Vorwölbung der Bauchnarbe. | Geheilt. Invalide. |
| 348 | Jena, T., Sergeant. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 18. November 1902. — Seit Herbst 1897 mehrfache Rückfälle. Schmerzen in der Blinddarmgegend. | 1. Dezember 1902. Schrägschnitt. Mäßige Verwachsungen in der Blinddarmgegend. Abtragung des mit dickem Eiter gefüllten Wurmfortsatzes. Naht der Bauchwunde. Zunächst Wohlbefinden. — 14. Dezember Aufplatzen der Bauchwunde und reichliche Eiterentleerung. Heilung durch Fleischwärtchen. Bandage. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 349 | Graudenz, R., Hauptmann. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 11. Januar 1903. — Lebensgefahr. | 12. Januar 1903. Schrägschnitt. Wurmfortsatz nach hinten verlugert und verwachsen. An seiner Spitze ein kleiner, in Verwachsungen eingebetteter Eiterherd. Abtragung des Wurmfortsatzes. Seidenübernähhung des Stumpfes. Ausstopfung der Eiterhöhle mit Jodoformgaze. Wundnaht. Anfangs Eiterung der Wunde, später glatter Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 350 bis 360 | | Bei 11 weiteren Kranken, von denen 5 in Stettin, Torgau, Gnesen, Münster, Preussisch-Stargardt (2 Unteroffiziere, 3 Mannschaften) als dienstfähig, 6 Mannschaften (einschließlich 1 Einjährig-Freiwilligen) (Berlin, Breslau, Paderborn, Cassel, Stuttgart, Metz) nach völliger Heilung als invalide entlassen wurden, fanden sich Eiterherde am Wurmfortsatz. — Die Schnittführung wird 9mal als Schrägschnitt, 2mal als Bauchschnitt, 1mal am Rande des rechten geraden Bauchmuskels bezeichnet. 1mal wurde dem Schrägschnitt ein Querschnitt hinzugefügt (Münster). Der Wurmfortsatz wird 4mal als durchlöchert, 1mal als gleichzeitig abgestorben bezeichnet (Torgau, Cassel, Metz, Stuttgart); 5mal war er mit Darm, 1mal mit der Blase verwachsen (Münster); er wurde in allen 11 Fällen entfernt. 3mal fanden sich Kotsteine im abgetragenen Wurmfortsatz (Preussisch-Stargardt, Gnesen, Stuttgart). Der Abszefs lag 3mal an der Spitze des Wurmfortsatzes, 1mal umspülte er diesen, 1mal reichte er bis zur Wirbelsäule. 1mal (Münster) wurde er bei der Operation nicht gefunden, brach aber kurz darauf durch. Die Operationen fanden 3mal in der 1., 2mal in der 2., je 1mal in der 3., 4. und 6. Woche nach dem 1. Anfall statt; 1mal wurde bei einem mehrmals rückfälligen Kranken 15 Tage nach dem letzten Rückfall operiert. 1mal fand sich 1 hühnerigroßer Abszefs bei einem im freien Zwischenraum operierten Kranken (Stettin). Bei dem Kranken in Münster wurden im Abszefseiter Staphylokokken nachgewiesen. Bauchbrüche und Gebrauch von Bandagen sind nicht vermerkt. | | 11 Kranke geheilt. 5 dienstfähig. 6 invalide. |
| 361 | Magdeburg, B., Invalide. | Chronische Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 17. August 1898. — Wunsch des Kranken wegen häufiger Rückfälle. Kotfistel, aus der sich am 29. September 1903 ein kleiner Tupfer entleerte. Anfang Oktober 1903 Erscheinungen von Darmverschluss. — 17. Oktober 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie. Herstellung einer Verbindung (Anastomose) zwischen Krummdarm und Querdarm. Gute Heilung. Schluß der Fistel am 20. November 1903. Zuweilen Unruhe im Leibe. | 11. August 1903. 12 cm langer Schnitt am Aufsenrande des rechten geraden Bauchmuskels. Kirschgroßer Eiterherd zwischen verklebten Darmschlingen und Netz. In diesem ein Kotstein und der 2 cm lange Wurmfortsatz, der mit einem Stück des Netzes abgetragen wurde. Jodoformgasetamponade. Fieberloser Verlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 362 | Marburg, A., Jäger. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 30. Mai 1903. — Eiteransammlung. | 31. Mai 1903. Schrägschnitt. Entleerung eines großen Abszesses mit stinkendem Eiter. Abtragen des im unteren Drittel brandigen, von einem Kotstein durchlöcherten Wurmfortsatzes. Vernähung des Stumpfes, Einstülpung in den Blinddarm. Vernähung der Darmserosa. Gegenöffnung in den Mastdarm, da der Abszefs ins kleine Becken reichte. Bauchdeckennaht mit Silberdraht. Fieberfreier Verlauf. Durchschneiden der Silberdrähte, Heilung durch Fleischwärtchen. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|-----------------------------|---|--|--|
| 363 | Münster, M., Kanonier. | Blinddarmentzündung. Erkältung. — 12. Januar 1903. — Abszefsbildung. kleinerer Abszesse. Drainage. Guter Verlauf. Nach 14 Tagen Mandelentzündung. Am 7. Februar 1903 plötzlich heftige Schmerzen in der linken Bauchgegend. Erbrechen, Kräfteverfall. — 8. Februar 1903. Schrägschnitt in der linken Seite. Entleerung einer kleinen Menge trüber Flüssigkeit, kein Eiter. Darmschlingen überall verklebt. Einige Tage Fieber. Heilung. Bildung von Bauchbrüchen beiderseits. Verweigerung weiterer Operationen. | 14. Januar 1903. Schrägschnitt. Entleerung von jauchigem Eiter. Im durchlöcherten Wurmfortsatz 3 Kotsteine, einer davon haselnußgroß. Entfernung des Wurmfortsatzes. Eröffnung mehrerer kleinerer Abszesse. Drainage. Guter Verlauf. Nach 14 Tagen Mandelentzündung. Am 7. Februar 1903 plötzlich heftige Schmerzen in der linken Bauchgegend. Erbrechen, Kräfteverfall. — 8. Februar 1903. Schrägschnitt in der linken Seite. Entleerung einer kleinen Menge trüber Flüssigkeit, kein Eiter. Darmschlingen überall verklebt. Einige Tage Fieber. Heilung. Bildung von Bauchbrüchen beiderseits. Verweigerung weiterer Operationen. | Geheilt. Invalide. |
| 364 | Berlin, H., Pionier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 17. Juli 1903. — Anhaltendes Fieber. Erbrechen kotig riechender Massen. | 1. August 1903. Schrägschnitt. Durch ein Geschwür am Ende des Blinddarms war ein bohnengroßer Kotstein durchgebrochen. Entfernung eines Teils des Blinddarms mit dem Wurmfortsatz. Bauchfell frei. Eröffnung einer hinter dem Blinddarm bis hinter die Leber hinaufreichenden Eiterhöhle. Sublimatauspülung. Jodoformgazetamponade. Herzschwäche. Einspritzung von Kampfer- und Kochsalzlösung unter die Haut. | Gestorben am 2. August 1903. |
| 365 | Torgau, M., Unteroffizier. | Blinddarmentzündung im Rückfall. Ursache unbekannt. — 28. Februar 1903. — Verdacht auf eiterige Bauchfellentzündung (Erbrechen, Atemnot, Cyanose). | 5. März 1903. Schrägschnitt. 40 ccm stinkender Eiter entleert. Abtragung des durchlöcherten, einen Kotstein enthaltenden Wurmfortsatzes. Jodoformgazeausstopfung. Erbrechen, Unbesinnlichkeit. Tod an Lungenödem. Eiterherd im großen Netz. Im kleinen Becken 50 ccm Eiter. Eiterige Auflagerungen auf dem Bauchfell. | Gestorben am 8. März 1903. Leichenöffnung: |
| 366 | Magdeburg, B., Musketier. | Blinddarmentzündung. Erkältung. — 12. Dezember 1902. — Verdacht auf Bauchfellentzündung infolge Durchbruchs von Eiter. Verlauf fieberfrei, trotzdem Unruhe. 38,4° Körpertemperatur sehr schneller | 14. Dezember 1902. Schnitt nach Sonnenburg. 200 ccm übelriechender, dünner, anscheinend abgekapselter Eiter entleert. Erweiterung der Wunde durch senkrechten Schnitt. Wurmfortsatz vom Netz umhüllt, pfennigstückgroß durchlöchert, in seiner Nähe 2 Kotsteine. Abtragung des Wurmfortsatzes. Jodoformtamponade. Appetitmangel, Stuhldrang, leichte Gelbsucht. 19. Dezember bei Puls. Tod am 20. Dezember. | Gestorben am 20. Dezember 1902. Leichenöffnung: Allgemeine eiterige Bauchfellentzündung. |
| 367 | Mainz, L., Musketier. | Blinddarmentzündung. Zusammenpressen des Unterleibs beim Turnen am Querbaum — 5. August 1903. — Eiteransammlung. | 13. August 1903. Flankenschnitt. Eröffnung einer Eiterhöhle hinter dem aufsteigenden Dickdarm. Drainage. Guter Wundverlauf. 10. September 1903. Entfernung des entzündlich verdickten, in Verwachsungen eingebetteten Wurmfortsatzes. Drainage. Schnelle Vernarbung. Bruchbandartige Bandage. | Geheilt. Invalide. |
| 368 | Mainz, K., Feldwebel. | Blinddarmentzündung. Erkältung. — 24. August 1903. — Eiteransammlung, Kräfteverfall. | 12. September 1903. Flankenschnitt. Entleerung einer Eiterhöhle hinter dem aufsteigenden Dickdarm. Drainage. Fistelbildung. 30. September 1903. Wiedereröffnung der Bauchhöhle. Zwischen eiterdurchtränkten Verwachsungen wurde der durch Geschwürsbildung abgetrennte, entzündlich verdickte Wurmfortsatz gefunden und entfernt. Drainage. Schnelle, feste Vernarbung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 369 | Mainz, B., Musketier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 3. November 1902. — Eiteransammlung. | 10. November 1902. Flankenschnitt. Eröffnung einer hinter dem Dickdarm gelegenen Eiterhöhle. Drainage. Vorübergehende Verstopfung der linken Schenkelblutader. 18. Dezember 1902. Wiedereröffnung der Bauchhöhle. Entfernung des Wurmfortsatzes, in demselben 1 Kotstein und 1 Geschwür. Drainage. Glatte Heilung. Mit bruchbandartiger Pelotte entlassen. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 370 | Dresden, H., Unteroffizier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 5. Juni 1903. — Schwellung und Druckempfindlichkeit der Blinddarmgegend. Vermehrung der weißen Blutkörperchen. Eine flächenhaft mit dem Blinddarm verwachsene Dünndarmschlinge lag rittlings abgeknickt über einem 5 cm langen, bleistifticken, vom Blinddarm zu einer anderen Dünndarmschlinge ziehenden Gewebstrang. Lösung der Verwachsungen. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | 9. Juni 1903. Schrägschnitt. Eröffnung einer Eiterhöhle. Drainage. 25. Juni 1903. Abtragen des Wurmfortsatzes. Im Wurmfortsatz ein linsengroßer Kotstein, in der Spitze ein dem Durchbruch nahes Geschwür. Heilung teilweise durch erste Verklebung. Anfang August Leibschmerz, Stuhlverhaltung, Erbrechen. 9. August 1903. Beckenhochlagerung. Bauchschnitt in der Mittellinie. Eine flächenhaft mit dem Blinddarm verwachsene Dünndarmschlinge lag rittlings abgeknickt über einem 5 cm langen, bleistifticken, vom Blinddarm zu einer anderen Dünndarmschlinge ziehenden Gewebstrang. Lösung der Verwachsungen. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 371 | Oppeln, M., Musketier. | Blinddarmentzündung. Angeblich Stofs mit dem Gewehrkolben. — 18. Dezember 1902. — Eiteransammlung. 25. Mai 1903. Eröffnung der rechten Brustfellhöhle von der Bauchwunde aus. Drainage. Allmähliche Heilung des Empyems. — 15. September 1903. Verlegung in das Garnisonlazarett Breslau zur Beseitigung der Darmfistel. — 13. November 1903. Naht der Darmfistel. Heilung. | 21. März 1903. Flankenschnitt. Eröffnung einer Eiterhöhle. Gazeausstopfung. Darmfistel. 2. Mai 1903. Vernähen der Darmfistel. Abtragung des Wurmfortsatzes. Aufplatzen der Darznaht und nochmaliges erfolgloses Vernähen. Rechtsseitiges Empyem. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 372 | Thorn, P., Büchsenmacher. | Blinddarmentzündung. Ursache vor der Operation nicht bekannt. — Ende April 1902. — Blinddarmentzündung. | 3. Mai 1902. Eröffnung einer Eiterhöhle am Blinddarm, in welcher sich ein Kotstein fand, der Borsten einer Zahnbürste enthielt. Nach der Heilung fortgesetzte Beschwerden. 18. November 1902. Bauchschnitt. Abtragung des verdickten, durchlöcherten, einen kleinen Eiterherd enthaltenden Wurmfortsatzes. Bauchnaht. — 21. November 1902. Leibschmerzen. Erbrechen. Magenspülung. Atropin ohne Wirkung. 24. November 1902 starke Blutung aus der Wunde. Kotgeruch. Öffnung der Wunde. Ein Stück des Dünndarms in den Blinddarm eingestülpt, der invaginierte Darm und Teile des Netzes brandig. Nach Lösung der Einstülpung Stuhlgang. Wegen des schnell zunehmenden Kräfteverfalls Darmresektion nicht ausführbar. Herzschwäche. | Gestorben am 24. November 1902. |
| 373 | Mülhausen i. E., M., Musketier. | Blinddarmentzündung, angeblich infolge von Sauerkrautgenußs. — 26. Mai 1903. — Allgemeine Bauchfellentzündung. Kräfteverfall. | 27. Mai 1903. Bauchschnitt. Ausgedehnte eiterige Bauchfellentzündung infolge Durchbruchs eines Wurmfortsatzabszesses. Entfernung des durchbrochenen Wurmfortsatzes. Gazeausstopfung, offene Behandlung. Nach 14 Tagen Entleerung eines Kotsteins. Lange Eiterung. Verweigerung der Sekundärnaht. | Geheilt. Invalide. |
| 374 | Freiburg i. Baden, W., Musketier. | Blinddarmentzündung. Stofs gegen den Leib beim Kastensprung. — 18. Februar 1903. — Bauchfellentzündung. | 25. Februar 1903. Schrägschnitt. Hervorströmen von Eiter von allen Seiten. Entfernung des am Ende durchlöcherten, einen Kotstein enthaltenden Wurmfortsatzes. Entleerung einer großen, hinter der Leber hervorquellenden Eitermenge. Drainage. Ausfüllung der Höhle mit Gaze. Günstiger Wundverlauf. Bauchbandage. | Geheilt. Invalide. |
| 375 | Cassel, R., Ökonomehandwerker. | Blinddarmentzündung. Rückfall durch Überanstrengung. — 21. November 1902. — Eiterbildung, beginnende Bauchfellentzündung. | 28. November 1902. Bauchschnitt. Eröffnung mehrfacher Abszesse zwischen den Darmschlingen, Entfernung des zur Hälfte zerstörten Wurmfortsatzes. Gazeausstopfung. Fieberfreier Verlauf, nach 8 Tagen Kotfistel, nach 11 Tagen selbsttätiger Schluß derselben. Zurückbleiben eines geringen Bauchbruchs. | Geheilt. Invalide. |
| 376 | Bückerburg, B., Jäger. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 25. Januar 1903. — Allgemeine Bauchfellentzündung. | 27. Januar 1903. Schrägschnitt. Abtragung des stark verwachsenen, von jauchigem Eiter umgebenen Wurmfortsatzes. In demselben 3 Kotsteine und 1 perforiertes Geschwür. Tamponade, teilweise Naht der Bauchwunde. Eiterverschleppung nach beiden Ohrspeicheldrüsen, beiderseits eiteriger Mittelohrkatarrh. Bauchfellentzündung. Darmlähmung. | Gestorben am 11. Februar 1903. |
| 377 | Potsdam, P., Garde du Corps. | Blinddarm- und Bauchfellentzündung. Ursache unbekannt. — 3. April 1903. — Handbreite Dämpfung. Erbrechen. | 7. April 1903. Flankenschnitt. In der Bauchhöhle wenig trübe Flüssigkeit. Abtragung des eiterig zerfallenen Wurmfortsatzes. Tamponade. Herzschwäche. öffnung: Faustgroßer Abszefs unter der Leber und jauchige Bauchfellentzündung. | Gestorben am 8. April 1903. Leichen- |
| 378 | Jena, O., Musketier. | Blinddarmentzündung. — 10. November 1902. — Heftige Schmerzen. Auftreibung des Leibes. | 13. November 1902. Schrägschnitt. Freier Eiter in der Bauchhöhle. Bauchschnitt in der Mittellinie: Wurmfortsatz an der Spitze brandig, kaffeebohngroßer Kotstein. Abtragung des Wurmfortsatzes und eines Stückes des vereiterten Netzes. Reinigung der Därme mit Kochsalzlösung. Vernähung der Operationswunde in der Mittellinie. Verfall der Kräfte. | Gestorben am 15. November 1902. |
| 379 | Cöln, B., Musketier. | Eiterige Blinddarm- und Bauchfellentzündung. Ursache unbekannt. — 28. Mai 1903. — Kräfteverfall. | 3. Juni 1903. Schrägschnitt. Entfernung des durch einen Kotstein durchbohrten Wurmfortsatzes. Drain. Schneller Kräfteverfall. | Gestorben am 4. Juni 1903. |
| 380 | Cöln, E., Musketier. | Blinddarmentzündung. Ursache unbekannt. — 21. Februar 1903. — Kräfteverfall. | 1. März 1903. Schrägschnitt. Infiltration der Umgebung des Blinddarms, kein Eiter, Wurmfortsatz nicht krankhaft verändert, wird nicht entfernt. Verlauf: Heilung der Operationswunde ohne Störung, rechtsseitige seröse Rippenfellentzündung und Verstopfung (Thrombose) beider Oberschenkelblutadern. | Geheilt. Invalide. |
| 381 | Metz, K., Musketier. | Bauchfellentzündung nach Blinddarmentzündung (2. Rückfall). Überanstrengung beim Felddienst. — 25. März 1903. — Allgemeine Bauchfellentzündung. | 30. März 1903. Schrägschnitt. Entleerung trüber, mit Fibrinflocken durchsetzter Flüssigkeit. Starke Rötung des Bauchfells. Einlegen eines Tampons. Schluß des übrigen Teils der Wunde durch Naht. Obduktion nicht gemacht. | Gestorben am 1. April 1903. |
| 382 | Berlin, S., Feldwebel. | Blinddarmentzündung, rechtsseitige Eiterbrust und Eiterherd zwischen Zwerchfell und rechtem Leberlappen. — 12. Juni 1903. — Nachweis von Eiter mit bacterium coli in Reinkultur im Brustfellraum. | 3. Juli 1903. Ausschneidung der 7. rechten Rippe zwischen vorderer und mittlerer Achsellinie. Entleerung von wenig Eiter. Am 18. Juli Durchbruch des Abszesses zwischen Zwerchfell und Leber nach der Wunde. — 18. Juli 1903. Weitere Ausschneidung der 7. Rippe bis zur Knorpel-Knochengrenze, und ausgiebige Eröffnung des Abszesses mit dem Paquelin. Drainage. Tamponade. Langandauerndes Fieber, langsame Hebung der Kräfte. Badekur in Landeck. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|---|--|--|-----------------------------|
| 383 | Danzig, M., Grenadier. | Bauchwandbruch rechts (Hernia paringuinalis dextra). Tragen schwerer Kisten. — 18. September 1902. — Wunsch des Kranken. | 9. Oktober 1902. Schnitt über die Geschwulst fort. Eröffnung des in der Bauchwand liegenden sehr zarten Bruchsacks. Lösung des im Bruchsack liegenden, mit diesem verwachsenen Hodens. Zurückbringen des Bruchinhalts und des Hodens in die Bauchhöhle. Naht der etwa markstückgroßen, in der Gegend der inneren Öffnung des Leistenkanals (annulus inguinalis abdominalis) gelegenen Bruchpforte. Hautnaht. Glatte Verlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 384 | Mainz, S., Pionier. | Leistenhoden links. Bruchanlage rechts. Angeboren. Schmerzen in beiden Leistengegenden. | 3. September 1902. Vorziehen des linken verkümmerten Hodens. Verkleinerung der Bruchpforte durch 2 Silbernähte, rechts ebenso. Glatte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 385 | Ettlingen (Karlsruhe), B., Sergeant. | Rechtsseitiger Leistenbruch. Leistenhode rechts. — Sprung am 29. August 1902. — Wunsch des Kranken. | 20. August 1903. Radikaloperation nach Bassini. Annäherung des Leistenhodens an den Grund des Hodensacks. Glatte Heilung. Hode stieg wieder zur Höhe des Schambeins empor. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 386 | Mülhausen i. E., E., Musketier. | Linksseitiger Leistenbruch infolge Kohlentragens. — 10. Januar 1903. — Wunsch des Kranken. | 14. Januar 1903. Radikaloperation nach Bassini. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 387 bis 416 | Bei weiteren 30 Bruchleidenden wurden 33 Operationen des Leistenbruchs (16 rechts, 11 links, 3 doppelseitig) vorgenommen, von denen 23 (bei 4 Offizieren, 5 Unteroffizieren, 12 Mannschaften — darunter 4 Ökonomiehändler —, 2 Kadetten) zur Heilung mit Erhaltung der Dienstfähigkeit führten. 7 Operierte (1 Unteroffizier, 2 Mannschaften, 4 Invaliden) wurden bzw. blieben Invalide. Was das Nähere über die einzelnen Operationsarten anbetrifft, so wurden: von 22 nach Bassini Operierten 16 dienstfähig (Berlin, Groß-Lichterfelde, Brandenburg a. H., Königsberg i. Pr., Stettin, Altona, Dresden [2], Karlsruhe [2], Mülhausen i. E. [4], Straßburg i. E., Graudenz), darunter 1 doppelseitig Operierter (Berlin). 3 Operationen wurden bei Invaliden ausgeführt (Charlottenburg, Stettin, Münster) und 3 Leute schieden nach beendeter Heilung als Invalide aus: 1 Grenadier in Karlsruhe wegen Schmerzen in der Narbe, 1 Gefreiter in Hamburg wegen eines gleichzeitigen, nicht operierten linksseitigen Leistenbruchs, 1 Unteroffizier in Stettin, bei dem trotz Heilung durch erste Verklebung ein Rückfall eintrat. Weiter ist über die nach Bassini Operierten zu bemerken, daß bei dem Invaliden in Charlottenburg Krampfaderbruch auf derselben Seite bestand. Bei 2 Operierten in Mülhausen i. E. wurde gleichzeitig ein Wasserbruch nach Winkelmann entfernt, bei einem von diesen befand sich der Wurmfortsatz im Bruchsack, mit dem er verwachsen war. Bei dem doppelseitig Operierten in Berlin war links nur eine Bruchanlage vorhanden gewesen, während rechts das Netz mit dem Bruchsack verwachsen war. In Dresden mußte die Narbe einer Blutung wegen nochmals geöffnet werden. Von 5 nach Kocher Operierten wurden 4 dienstfähig (Bückerburg, Münster [2], Mainz), darunter 2 doppelseitig Operierte (Münster, Mainz); 1 Operation (Münster) war bei einem Invaliden ausgeführt. Der Operierte in Bückerburg wurde nach einem Rückfall zum 2. Male operiert. 3 Operierte in Münster, bei denen keine Operationsart angegeben ist, wurden dienstfähig (2 rechtsseitig, 1 linksseitig). Bei 1 von ihnen befand sich im Bruchsack und im Leistenkanal vor dem Bruchsack je eine gestielte Fettgeschwulst, die abgetragen wurde. | | 30 Kranke geheilt. 23 dienstfähig. 7 Invalide. | |
| 417 | Mülhausen i. E., S., Musketier. | Rechtsseitiger eingeklemmter Leistenbruch. Klettern am Eskaladiergerüst. — 7. August 1903. — Einklemmungserscheinungen. | 7. August 1903. Bauchschnitt. Blutiges Bruchwasser. Radikaloperation nach Bassini. Operation eines gleichzeitig bestehenden Wasserbruches nach Winkelmann. Hautseidenknopfnah. Glatte Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 418 bis 425 | Außerdem wurden bei 8 Leuten des Mannschaftsstandes (darunter 2 Ökonomiehändler) 8 weitere Operationen des eingeklemmten Bruchs (5 rechts, 3 links) ausgeführt, und zwar 3 nach Bassini (Königsberg i. Pr., Stettin, Straßburg i. E., 1 dienstfähig, 2 dienstunbrauchbar), 1 nach Czerny (Thorn, dienstfähig), 4 ohne Angabe einer bestimmten Operationsmethode (Münster, Coblenz, Wiesbaden, Leipzig, 2 dienstfähig, 2 invalide). Bei dem Operierten in Stettin mußte verwachsenes Netz abgetrennt werden. Die Einklemmung bzw. der Bruch war 4mal aus unbekannter Ursache, 2mal beim Heben schwerer Gegenstände, je 1mal beim Kastensprung und beim Halten eines unruhigen Pferdes entstanden. | | 8 Kranke geheilt. 4 dienstfähig, 2 invalide, 2 dienstunbrauchbar. | |
| 426 | Jena, L., Sergeant. | Bauchbruch in der Mittellinie. Beim Turnen entstanden. — 17. November 1902. — Schmerzen. | 13. Januar 1903. Bauchschnitt bis zum Bauchfell. Auf demselben ein Fettklumpchen, das die Vorwölbung bedingte. Abtragung, Naht des eingerissenen Bauchfells. Sofortiges Schwinden der Beschwerden. Heilung durch Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 427 | Straßburg i. E., B., Militärgefangener. | Bauchbruch in der weißen Linie, 3 Finger breit über dem Nabel. Stofs gegen den Querbaum. — Oktober 1902. — Verdauungsbeschwerden. Schmerzen bei Rumpfbewegungen. | 21. März 1903. Entfernung der über haselnußgroßen Geschwulst (Netz, dahinter Bruchsack). In der ganzen oberen Bauchhälfte ausgedehnte alte Verwachsungen zwischen Netz und vorderer Bauchwand. Lösung derselben. Etagnah. Beschwerden, anfangs gebessert, nahmen dann wieder zu. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |

4. Bruchoperationen.

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|----------------------------|--|---|--|
| 428 bis 431 | | Außerdem wurden 4 Netz enthaltende, nufsgröfse Bauchbrüche in der weifsen Linie bei Leuten des Mannschafftsstandes in Danzig, Mainz, Strafsburg i. E. (2) operiert. 2 Leute wurden dienstfähig, 2 nach beendeter Wundheilung invalide. Bei dem Kranken in Danzig war Netz mit dem Bruchsack verwachsen. Bei dem Kranken in Mainz hatte vorher eine Blinddarmrentzündung bestanden. Nach Heilung des Bauchbruchs erkrankte er an Halsdrüsenentzündung und Lungentuberkulose. Die Entstehungsursache blieb in diesen 4 Fällen unbekannt. | | 4 Kranke geheilt. 2 dienstfähig. 2 invalide. |

5. Operationen wegen Harnverhaltung und Harnröhrenverengung.

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|-----------------------------|
| 432 | Breslau, L., Unteroffizier. | Verengung der Harnröhre nach Tripper. — 13. März 1903. — Harnverhaltung (s. auch lfd. No. 464). | 22. Juni 1903. Hoher Steinschnitt, da Erweiterung der Verengung vom Damm aus unmöglich. Einführung eines Katheters, Naht. Guter Wundverlauf. Der Urin wurde im Strahl aus der Bauchfistel entleert. | Fistelbildung. Invalide. |
|-----|-----------------------------|---|---|-----------------------------|

6. Anderweitige Operationen am Rumpf.

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|---|
| 433 | Offenbach, B., Musketier. | Absterben des linken Schlüsselbeins. — 12. November 1902. — Zellgewebsentzündung am rechten Zeigefinger infolge Verbrennung mit Schwefelsäure. Knocheneiterung. | 26. Dezember 1902. Ausschälung des ganzen Schlüsselbeins. Tamponade. Glatte Heilung. Das Schlüsselbein hatte sich wieder gebildet. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 434 | Danzig, H., Invalide. | Knochenhautentzündung am linken Schlüsselbein bei beiderseitiger Mittelohrentzündung. — 7. Oktober 1902. — Hohes Fieber. | 14. Oktober 1902. Freilegung der inneren Hälfte des Schlüsselbeins, Aussägung eines 2 cm langen Stückes zur Entleerung eines hinter ihm befindlichen Abszesses. Fieberabfall. Lebhaftige Neubildung von Knochen. Langsamer Schluß der Wunden. Entlassung. — 8. Juli 1903 erneute Auskratzung von schwammigen Knochenwucherungen. Heilung. | Geheilt. |
| 435 | Darmstadt, S., Unteroffizier. | Platzpatronenschufs in die linke Brustseite. Selbstmordversuch. (Schufsliste No. 64.) — 13. Oktober 1902. — Starke Blutung. | 14. Oktober 1902. Abtragung der Bruchenden der 3. und 4. zertrümmerten Rippe mit der Knochenzange nach Hautschnitt durch die Einschußöffnung und parallel dem Brustbeinrande. Lunge zusammengefallen. Blutende Stelle nicht zugänglich. Tamponade der Brusthöhle. Tod nach 31 Stunden an Verblutung. | Gestorben am 14. Oktober 1902. Leichenöffnung (s. Schufsliste No. 64). |
| 436 | Danzig, H., Musketier. | Brustschufs. (Einschuß vorn in Höhe der 3. Rippe, Ausschufs unter der Schultergräte, Mitte zwischen Schulterhöhe und Wirbelsäule.) Selbstmordversuch mit Gewehr M. 88. — 2. Juli 1903. — Lebensgefahr. | Ausschneidung eines 5 cm langen Stückes der 3. Rippe, Ausstopfung der stark blutenden Lungenwunde mit steriler Gaze. Tod nach 2 1/2 Stunden. | Gestorben am 2. Juli 1903. |
| 437 | Hildesheim, R., Invalide. | Tuberkulose der linken 3. Rippe mit Eiterbildung. Ursache unbekannt. — 31. Januar 1901. — Abszefs über der linken 3. Rippe. | 13. Dezember 1902. 10 cm langer Schnitt auf der 3. linken Rippe bis zum Brustbein. Auskratzung der tuberkulösen Gelenkverbindung mit dem Brustbein. Tamponade mit Jodoformgaze, teilweise Naht. Fieberloser Verlauf. | Geheilt. |
| 438 | Oldenburg, H., Musketier. | Tuberkulose der rechten 7. Rippe. Stoß beim Turnen. — 19. Mai 1903. — Abszefs in Höhe der 7. Rippe. | 8. Juni 1903. Bogenschnitt auf der 7. Rippe von der vorderen bis zur hinteren Achsellinie. Entleerung des Eiterherdes; Freilegen der 7. Rippe Tamponade. Mehrere Monate Eiterabsonderung. Badekur in Oeynhaus. Störung der Armbewegung durch Verwachsung der Narbe mit der 7. Rippe. | Geheilt. Invalide. |
| 439 | Stettin, S., Ökonomiehandwerker. | Tuberkulose des vorderen Teils der linken 4. Rippe mit kalter Abszefsbildung. Muskelzerrung durch Kohlentragen und Druck beim Bügeln. — Januar 1903. — Die bakteriologisch erwiesene tuberkulöse Natur des Leidens. | 16. Februar 1903. Spaltung des Abszesses durch den großen Brustmuskel hindurch, Ausschabung der Höhle. Entfernung eines 7 cm langen Stückes vom vorderen Ende der 4. Rippe. Gegenöffnung längs der 5. Rippe. Tamponade und Drainage. Muskelnah. Glatte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 440 | Münster, B., Musketier. | Tuberkulose der rechten 8. Rippe. Ursache und Tag der Erkrankung unbekannt. Abszefsbildung und Fieber. | 2. Februar 1903. Eröffnung des Abszesses. Abmeifselung des erkrankten Knochenstückes. Drainage. Fistelbildung. — 15. April 1903 Aussägung eines 10 cm langen Rippenstückes. Glatte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 441 | Glogau, N., Kanonier. | Knocheneiterung an der rechten 7. Rippe. Hufschlag. — 22. April 1903. — Beseitigung einer Eiterfistel. | 5. August 1903. Spaltung der Fistel; Ausschneidung eines 8 cm langen Knochenstückes aus der Rippe. Ausstopfung mit Jodoformgaze. Jodoformglyzerin. Fistel. | Fistelbildung. Invalide. |

| Lfde. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-----------|--|---|--|--|
| 442 | Wesel, G., Sanitätsunteroffizier. | Knochenmarkentzündung an der rechten 9. Rippe. Erkältung. — 11. Mai 1903. — Entfernung des eiternden Knochenstückes. | 16. Mai 1903. Schnitt längs der Rippe; Entleerung von etwa 80 ccm Eiter. Entfernung eines 8 cm langen toten Knochenstückes. Tamponade mit Jodoformgaze. Fistel. | Fistelbildung. Invalide. |
| 443 | Insterburg, L., Sanitätsunteroffizier (s. No. 343, San.B.01/02). | Eiterige Knochenmarkentzündung der rechten 7. Rippe. Alte Stichverletzung beim Brotschneiden. — 12. März 1902. — Entfernung von Eiterfisteln. | 18. Oktober 1902. 16 cm langer Schnitt auf der Rippe. Aufmeißelung derselben. Entfernung eines 5 cm langen toten Knochenstückes. Jodoformgazeausstopfung. Ausschneiden der Fisteln. Naht. Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 444 | Berlin, J., Grenadier. | Tuberkulose des Kreuzbein-Becken gelenks. Ursache unbekannt. — 11. Februar 1903. — Fieber und Eiterung. | 8. April 1903. Freilegung der Gelenkverbindung des Kreuzbeins mit dem Becken durch hufeisenförmigen Schnitt, Abmeißelung der erkrankten Knocheile, Rand des hinteren großen Darmbeineinschnittes und hinteren unteren Darmbeinstachels. Drain, Tamponade, aufsaugender Verband. Abfall des Fiebers, Heilung ohne Fistel. Gang unbehindert. | Geheilt. Invalide. |
| 445 | Oppeln, W., Unteroffizier. | Eiterige Knochenmarkentzündung der linken Beckenhälfte und septische Bauchfellentzündung. Verschlimmerung eines alten Leidens durch Erkältung im Dienst. — 13. Mai 1903. — Andauerndes hohes Fieber. | 23. Mai 1903. Freilegung des linken Sitzbeinknorrens und des linken Hüftgelenks durch zwei aufeinander senkrecht stehende Schnitte. Ausmeißelung eines taubeneigroßen, von Eiter umgebenen Knochenstückes. Ausstopfung. Blutvergiftung. Kräfteverfall. in der rechten Lunge, in beiden Nieren und eiterig-fibrinöse Herzbeutelentzündung. | Gestorben am 24. Mai 1903. Leichenbefund: Eiterherde |
| 446 | Mainz, H., Gefreiter. | Verrenkung des Schulterblattendes vom rechten Schlüsselbein. Fall auf die rechte Schulter. — 9. September 1902. — Unmöglichkeit der Einrenkung. | 15. September 1902. Schnitt gleichlaufend mit dem Schlüsselbein. Einrenkung des Knochens und Anheften des Schlüsselbeins an die Schulterhöhe mit Silberdraht. Glatter Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 447 | Karlsruhe, W., Invalide. | Geheilte Chassepotkugel durch den rechten Oberarm in die rechte Brustseite. — 18. Dezember 1870. — Lazarettaufnahme 16. Januar 1903. Seit Jahren bestehende hexenschufartige Schmerzen und Störungen des Ganges. Kugel durch Röntgenstrahlen in der Rückenmuskulatur nachgewiesen. | 18. Januar 1903. Unter örtlicher Betäubung. Längsschnitt rechts vom Dornfortsatz des 3. Lendenwirbels. Entfernung einer in den langen Rückenmuskeln fest eingewachsenen Chassepotkugel. Heilung ungestört. Sehr erhebliche Besserung aller Beschwerden, besonders des Gehens. | Geheilt. |
| 448 | Leipzig, P., Soldat. | Linksseitiger Pneumothorax infolge von Lungentuberkulose. — 5. November 1902. — Verdrängung des Herzens nach rechts bis über die Mittellinie und seröser Erguß in den linken Brustfellsack. Ruhigstellung und Heilung der Brustfistel der Lunge im Sinne der Ratschläge von Unverricht. Handbuch der praktischen Medizin. | 15. November 1902. Einschnitt im 5. Zwischenrippenraum in der Achsellinie in das Brustfell unter örtlicher Eucain-Betäubung. Sehr viel Luft und etwa 750 ccm seröse Flüssigkeit entleert. Einlegen eines dicken Drains, dessen äußeres Ende durch einen Drahtkorb für Luftzutritt (nach Unverricht) freigelassen wird. Trockner Verband. Fortschreitende Lungentuberkulose. Verfall der Kräfte nicht aufzuhalten. | Gestorben am 15. Dezember 1902. |
| 449 | Perleberg, W., Kanonier. | Lungenabszess im linken Unterlappen nach linksseitiger Lungenentzündung. — 22. Februar 1903. — Eröffnung des nachgewiesenen Abszesses. linken Oberlappen. — 2. und 8. Juli 1903 | 17. März 1903. Eröffnung des linken Brustfellraumes nach Ausschneidung eines 6 cm langen Stückes der 8. Rippe. 750 ccm stinkender Eiter entleert. Der Abszess stand mit dem Brustfellsack in Verbindung. Zur Herbeiführung besseren Abflusses wurden am 23., 30. März und 1. April 1903 Stücke von der 8. und von der 9. Rippe entfernt. Bildung eines 2. Abszesses im linken Unterlappen. — 2. und 8. Juli 1903 Eröffnung dieses Abszesses von der vorderen Brustwand her. Reichliche Eiterentleerung und schnelle Besserung. Heilung mit Fistelbildung hinten. | Fistelbildung. Am 31. August 1903 in das Garnisonlazarett Spandau verlegt. |
| 450 | Allenstein, B., Dragoner. | Lungenabszesse nach linksseitiger Lungenentzündung. — 14. März 1903. — Hohes Fieber, starker Kräfteverfall, Nachweis von Eiter in der linken Brusthälfte. | 20. April 1903. Eröffnung der linken Brusthöhle mit Ausschneidung eines 4 cm langen Stückes der 8. Rippe. Brustfellsack leer. Durchtrennung der Lunge in etwa 3 cm Breite und etwa 5 cm Tiefe und Entleerung von 60 ccm Eiter. Tamponade. — 25. April 1903 Eröffnung eines 2. Abszesses von derselben Wunde aus und Entleerung von 70 ccm Eiter. Am 23. und 27. April wurden während mehrerer Stunden 120 bzw. 150 ccm fast rein eitrigem Auswurf ausgehustet. Schneller Heilungsverlauf. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|--|--|---|----------------------------------|
| 451 | Braunsberg, T., Füsilier. | Abszefs in der linken Nierengegend — 11. März 1903. — Veranlassung unbekannt. Eiternachweis durch Probeeinstich. | 2. April 1903. Einschnitt auf den Abszefs unterhalb der 12. Rippe. Reichlich blutiger Eiter aus der Tiefe entleert. Fistelbildung. 3 Wochen später Eitersenkung unterhalb vom Poupartschen Bande nach aufsen von den Gefäßen. — 11. Juni 1903 Einschnitt ober- und unterhalb vom Poupartschen Bande. Heilung 12. August 1903. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 452 | Mainz, T., Füsilier. | Vereiterung des Zellgewebes um die linke Niere. Ursache unbekannt. — 11. März 1903. Beseitigung der Eiteransammlung. | 14. Juni 1903. Längsschnitt unterhalb des Poupartschen Bandes, Gegenöffnung oberhalb desselben. Drainage. Rascher Fieberabfall. Ungestörter Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 453 | Breslau, M., Gefreiter. | Vereiterung des Zellgewebes um die rechte Niere. Ursache unbekannt. — 18. Mai 1903. — Beseitigung der Eiterung. | 20. Mai 1903. Einschnitt auf der 12. Rippe und Ausschneidung eines 5 cm langen Stückes. Stumpfe Eröffnung des Abszesses. Drainage. Ungestörter Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 454 | Metz, L., Musketier. | Linksseitiger paranephritischer Abszefs. Erkältung im Manöver. — 25. September 1902. — Eiterbildung. Kräfteverfall, Fieber. | 20. November 1902. 10 cm langer Querschnitt in der linken Lendengegend. Entleerung von 2 ccm chokoladenfarbigem Eiter. Jodoformgazetamponade, teilweise Naht. Ungestörter Verlauf. Dauernd Schmerzen in der linken Schenkelbeuge. | Geheilt. Invalide. |
| 455 | Mülhausen i. E., F., Sergeant. | Linksseitiger paranephritischer Abszefs nach Furunkel (?) — Juli 1902. — Fieber. Zunehmender Kräfteverfall. | 15. Januar 1903. Schnitt parallel dem linken Rippenbogen. Nach mühsamer Durchtrennung mehrerer Zentimeter dicker Schwarten, Abbruch der Operation wegen Collapses. Tamponade. Am 2. Tag öffnete sich der Abszefs von selbst, reichliche Eiterentleerung. Ungestörte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 456 | Erbach, M., Musketier. | Rechtsseitiger paranephritischer Abszefs nach rechtsseitiger Brustfellentzündung. — 30. Juli 1903. — Beseitigung des Eiters. | 8. August 1903. Simonscher Schrägschnitt, Eiterentleerung. Der Eiter enthält Reinkulturen von Staphylococcus aureus. Ungestörter Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 457 | Freiburg i. Baden, F., Musketier. | Rechtsseitiger perinephritischer Abszefs. Ursache unbekannt. — 17. November 1902. — Hohes Fieber. | 27. November 1902. Schrägschnitt parallel der 12. Rippe von der Wirbelsäule bis zum Darmbeinkamm. Freilegung der rechten Niere ohne Durchtrennung der Kapsel. Tamponade. Nach zweimaliger geringer Eiterverhaltung ungestörter Verlauf. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 458 bis 462 | In ähnlicher Weise wurden aus unbekannter Ursache entstandene Eiterherde neben der Niere (2 rechts, 3 links) in Brandenburg a. H., Magdeburg, Trier, Rudolstadt und Mörchingen zur Heilung gebracht. Diese fünf Leute wurden invalide. | | | 5 Kranke geheilt. 5 Invalide. |
| 463 | Danzig, S., Kanonier. | Eiterige Sackniere. Fall auf einen Lafettenschwanz. — 10. Februar 1903. — Nachweis des Eiters durch Probestich. | Bogenschnitt von der 11. Rippe nach unten vorn. Eröffnung des etwa 1 l Eiter enthaltenden Sacks. Drainage. Fistel. Der Kranke wurde einem Zivilkrankenhause überwiesen. | Fistelbildung. Invalide. |
| 464 | Breslau, L., Unteroffizier. | Eiterung im rechten Nierenbecken nach Tripper. — 13. März 1903. — Eiteransammlung (s. auch lfde. No. 432). | 11. April 1903. Schnitt unter dem rechten Rippenbogen in der hinteren Achselhöhlenlinie, Eröffnung des Nierenbeckens und Spaltung eines kleinen Abszesses am unteren Pol der Niere. Drain ins Nierenbecken, Tamponade. | Geheilt. Invalide. |
| 465 | Glogau, F., Invalide. | Nierentuberkulose. Erkältung im Januar 1900. — Tag der Erkrankung unbekannt. — Wunsch des Kranken. | 29. Januar 1903. Schnitt dicht unterhalb der 12. Rippe am vorderen Rand des M. sacrolumbalis bis zum Darmbeinkamm. Freilegung der Niere, die keine Unregelmäßigkeit aufwies. Spaltung der Kapsel im unteren Umfang. Drainage. Naht. Schmerzen fast völlig geschwunden. Im Urin waren Tuberkelbazillen nachgewiesen. | Geheilt. |
| 466 | Frankfurt a. M., E., Gefreiter. | Rechtsseitige Eiterniere im Anschluß an eine fieberhafte Darmerkrankung im Manöver 1902. Hohes Fieber und Kräfteverfall. | 2. November 1902. Schnitt von der vorderen Achselhöhlenlinie parallel zum Rippenbogen und unter diesem bis zur Mittellinie. Ablösung des mit dem unteren Leberrand verwachsenen Dickdarms, dabei Eiterentleerung aus der Tiefe. Tamponade. — 24. November, nach Verklebung des Bauchfells gegen die Eiterhöhle, Eröffnung der von mehreren walnufgroßen Eiterherden durchsetzten Niere. Auskratzen der Herde. Drainage. In den ersten Wochen entleerten sich noch einige kleinere Eiterherde. Danach ungestörter Verlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 467 | Mainz, G., Kanonier. | Tuberkulose der linken Niere. — Nach Erkältung am 25. Juni 1902 aufgetreten. — Eiterfieber. Lebensgefahr. | 16. Oktober 1902. Simonscher Schnitt in der linken Lendengegend. Freilegung und Spaltung der Niere bis ins Nierenbecken. Entleerung des Eiters, Drainage. Urinfistel nach der Lendengegend. Im Eiter Tuberkulosestäbchen. Trotz beginnender Blasen-tuberkulose Zunahme der Kräfte. Überführung in ein Zivilkrankenhaus. | Ungeheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|----------------------------|--|--|--|
| 468 | Düsseldorf, A., Invalide. | Eiterige Entzündung der rechten Niere nach Blasenzerreißung und Vereiterung der Blase. Andauerndes Fieber und Kräfteverfall. | 2. Juli 1903. Bogenförmiger Schnitt von der rechten 12. Rippe zum Darmbeinkamm. Auslösung der mit Eiterherden durchsetzten Niere. Tamponade. Andauerndes Fieber. Entleerung großer Eitermengen mit dem Urin. Schneller Kräfteverfall. | Gestorben am 16. Juli 1903. Leichenbefund: |
| | | Tiefgehende Vereiterung der Blasenschleimhaut, des rechten Harnleiters und der Vorsteherdrüse. | | |
| 469 | Magdeburg, K., Invalide. | Fistel in der linken Nierengegend nach Operation wegen einer paranephritischen Eiterung in einem Krankenhause am 15. November 1902. — Beseitigung der Fistel und des zeitweise auftretenden Blutharnens. | 21. Juli 1903. Schnitt nach v. Bergmann. Ausschneidung der Fistel, in deren Tiefe ein 4 cm langes Drainrohr gefunden wurde. Naht. Jodoformtamponade. Ungestörter Wundverlauf. Der Urin enthielt bei der Entlassung trotz sehr gutem Allgemeinbefinden Eiweiß und etwas Blut. | Geheilt. |
| 470 | Stuttgart, M., Dragoner. | Harnröhrenstein im häutigen Harnröhrenabschnitt. Eitriger Ausfluss seit langer Zeit vor der Einstellung (am 2. Oktober 1902). (Im Kindesalter Steine abgegangen.) | 13. Oktober 1902. Äußerer Harnröhrenschnitt über dem fühlbaren Körper. Entfernung des aus 2 Teilen bestehenden Steins. Heilung ohne Störung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 471 | Breslau, S., Musketier. | Eiteransammlung im Unterzwerchfellraum links ohne bekannte Ursache. — Tag der Erkrankung unbekannt. Aufnahme in das Lazarett am 15. September 1903. — Eröffnung des nachgewiesenen Eiterherdes. | 18. September 1903. Schnitt in der Gegend der linken Niere durch Haut und Muskeln bis auf den Eiterherd und zur Erleichterung des Eiterabflusses Ausschneidung eines 3 cm langen Stückes von der 12. Rippe. 29. September 1903 wegen dauernder Temperatursteigerungen und nachgewiesenem Erguß im linken Brustfellsack Eröffnung desselben unter Entfernung eines 6 cm langen Stückes der 7. Rippe und Entleerung von 1 l Eiter. Die Körperwärme blieb erhöht. | Gestorben am 15. Oktober 1903. |
| 472 | Posen, S., Unteroffizier. | Eiterherd zwischen Zwerchfell und rechtem Leberlappen. Ursache unbekannt. — 15. November 1902. — Nachweis von Eiter. | 25. Dezember 1902. Schnitt in der rechten Schulterblattlinie von der 12. Rippe bis zum Hüftbeinkamm. Entleerung von 200 ccm Eiter. Drainage und Jodoformgazeausstopfung. — Fistel. 27. Februar 1903 Entfernung der 12. Rippe. Spaltung der Fistel. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 473 | Potsdam, W., Grenadier. | Abszefs in der linken Hüftbeingegend. Ursache unbekannt. Anfang Oktober 1902. Entleerung des Eiters. | 15. Oktober 1902. Eröffnung des Abszesses durch Einschnitt. Reichliche Eiterentleerung. Ausstopfung. Fistelbildung. — 31. Dezember 1902 Ausräumung und Ausschneidung der Fistel. Fortbestehen der Eiterung von dem wahrscheinlich erkrankten Kreuzbein-Darmbein-gelenk. Weitere Operation abgelehnt. | Ungeheilt. Invalide. |
| 474 | Mainz, B., Kanonier. | Senkungsabszefs in der linken Beckenhälfte. Ursache unbekannt. — 9. Januar 1903. — Kräfteverfall. Nötige Entleerung des Eiters. | 23. März 1903. Lendenschnitt vom Rippenbogen zum hinteren Darmbeinstachel. Entleerung von 3 l stinkendem Eiter. Die Eiterhöhle reichte bis in das Becken. Drainage. Langsame Heilung. Keine Beschwerden. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 475 | Düsseldorf, K., Füsilier. | Beckenabszefs in der Gegend des rechten Hüftmuskels. Ursache unbekannt. — Mitte Februar 1903. — Anhaltendes Fieber. Kräfteverfall. | 18. April 1903. Eröffnung des bis zum großen Hüftmuskel sich erstreckenden Eiterherdes in der rechten Unterbauchgend. Bauchhöhle nicht eröffnet. Drainage und Tamponade. Fieberabfall. Langsame ungestörte Vernarbung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 476 | Stuttgart, H., Kanonier. | Tuberkulöse Drüsen in der linken Achselhöhle. Ursache unbekannt. Vereiterung der Drüsen. | 27. November 1902. Ausräumung der Achselhöhle. Tamponade. Ungestörter Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 477 | Stettin, B., Sergeant. | Tuberkulöser Senkungsabszefs im Hodensack, ausgehend von verkästen Drüsen des Beckens. Zerrung oder Quetschung beim Stolpern. — Dezember 1902. — Wunsch des Kranken. | 26. Januar 1903. Öffnung des Abszesses am Hodensack. Auskratzen der Granulationen. 12 cm langer Schnitt über den Leistenkanal. Freilegung einer wurstförmigen, vom Leistenring durch die Muskulatur in den Bogrosschen Raum sich einsenkenden Abszefsbildung, die hier mit einem an den großen Gefäßen liegenden, zum Teil verkästen Drüsenpaket zusammenhing. Auslösung dieser Drüsen. Samenstrang nicht erkrankt. Jodoformgaze. Drainage. Naht. Glatte Heilung, ohne Hinterlassung von Beschwerden. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 478 | Glatz, A., Füsilier. | Vereiterter Bubo links. Ursache unbekannt. — 27. Oktober 1902. — Fieber. | 5. November 1902. In der linken Leistenbeuge 10 cm langer Hautschnitt etwas unterhalb vom Poupartschen Bande. Stumpfes Ausschälen. Naht des größten Teils der Wunde. Drainage, trockener Verband. Anfangs ungestörte Heilung unter Fleischwärtchenbildung. — Mitte Dezember Entzündung, später Fistelbildung, die trotz Ausschälens einer weiteren Drüse am 22. Januar 1903 fortschritt. — 17. März 1903 Ausschneiden der mit der Unterlage stark verwachsenen Narbe; Entfernung neuer Drüsen nach Spaltung der großen Oberschenkelbinde. — 22. März 1903. Blutung aus der Oberschenkel Schlagader. Kochsalzeinspritzungen. Reizmittel. Tod. | Gestorben 24. März 1903. Leichenöffnung: zahlreiche, zum Teil verkäste Lymphdrüsen zwischen den Muskeln bis zur Mitte des Oberschenkels. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|-------------------------------------|---|--|---|
| 479 | Breslau, S., Gefreiter. | Großer Bubo nach Schanker. — 13. Juli 1903. — Vereiterung der Drüsen. | Am 3. August 1903. Ausschälung. Tamponade. Glatter Wundverlauf. | Geheilt, später wegen Gelenkrheumatismus als dienstunbrauchbar entlassen. |
| 480 | Mülhausen i. E., H., Oberleutnant. | Tuberkulöse Mastdarmfistel. Ursache unbekannt. — 25. Februar 1903. — Wunsch des Kranken. | 2. März 1903. Spaltung der Fistel. Unvollständige Fistel. Weite Unterminierung der Haut. Offene Wundbehandlung. Vorzeitig notwendige Entlassung. — 8. August 1903 nochmalige Spaltung, Ausbrennen. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 481 | Mülhausen i. E., G., Unteroffizier. | Fressender harter Schanker. — 22. Juli 1902. — Zerstörung der Eichel, Bildung einer Harnröhrenfistel. Erfolglosigkeit der Allgemeinbehandlung. | 26. Januar 1903. Absetzung des Gliedes mit einem Schnitt. Naht der Schwammkörper mit Catgut, Hautnaht in senkrechter Richtung, Harnröhrenplastik. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 482 | Braunschweig, D., Musketier. | Brand des linken Hodens und Samenstrangs infolge von Quetschung. — 23. Juli 1903. — Andauernde Entzündung und erhebliche Schmerzen. | 1. August 1903. Entfernung des oberhalb des Poupartschen Bandes gelegenen, blau-schwarz gefärbten Hodens mit dem brandig gewordenen Teil des Samenstranges. Schluß des zum Teil gespaltenen Leistenkanals, des Leistenringes und der Muskulatur mit Catgut. Hautnaht mit Seide. Jodoformgaze. Verband. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 483 | Stettin, M., Sergeant. | Gummöse Hodengeschwulst links. — Seit 5 Monaten. — Erfolglosigkeit der Allgemeinbehandlung, Wunsch des Kranken. | 11. August 1903. Herausnahme des Hodens nach vorhergehender doppelter Unterbindung des Samenstranges im äußeren Leistenring nach Ablösung des Samenleiters. Verband, Suspensorium. Nach der Operation häufiges Erbrechen und Nachblutung in den Hodensack. Fieberloser Wundverlauf. Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 484 | Metz, K., Kanonier. | Hodentuberkulose links. Quetschung. — 9. August 1903. — Unwirksamkeit anderer Behandlung. | 9. September 1903. Entfernung des linken Hodens und Nebenhodens mit den erkrankten Hüllen. Tamponade, teilweise Naht. Wundheilung ungestört. Im Anschluß linksseitige Knie- und Hüftgelenkentzündung sowie Auftreten von zwei tuberkulösen Abszessen am rechten Unterarm. Heilung der Abszesse und Kniegelenkentzündung. Besserung der Hüftgelenkerkrankung durch Streckverband. | Gebessert. Invalide. |
| 485 | Rudolstadt, E., Musketier. | Tuberkulose beider Hoden, Fistelbildung rechts. Ursache unbekannt. — September bzw. November 1902. — Beseitigung der tuberkulösen Herde. | 31. Juli 1903. Kastrierung rechts und Einlegung eines Paraffinhodens. Verlauf normal. Prothese heilte gut ein. | Gebessert. Invalide. |
| 486 | Straßburg i. E., A., Pionier. | Tuberkulose beider Hoden. Quetschung des linken Hodens beim Turnen. — 27. Februar 1903. — Vereiterung und Fistelbildung. | 5. Mai 1903. Entfernung beider Hoden. Offene Wundbehandlung. Blasenkatarrh. Abszefs der Vorsteherdrüse, Eröffnung am 30. Juni 1903 vom Mastdarm aus. 16. Juli 1903. Abszefs, der mit der Harnröhre zusammenhing, links vom After eröffnet. Wenig absondernde Urinfistel. Wunden vernarbt bis auf kleine Urinfistel. | Fast geheilt. Invalide. |
| 487 bis 501 | | 15 weitere Kastrationen wegen Hodentuberkulose bieten in den Einzelheiten nichts Besonderes. 14 Operierte wurden geheilt; 1 mal blieb eine Fistel bestehen (Hagenau). 1 Mann wurde wieder dienstfähig (Ulm), 4 wurden dienstunbrauchbar (Wesel, Hagenau, Graudenz, Liegnitz); 10 wurden invalide Metz (3), Lüneburg, Berlin (2), Bromberg, Straßburg i. E., Wesel, Münster. | | 14 geheilt. 1 ungeheilt. 1 dienstfähig. 4 dienstunbrauchbar. 10 invalide. |
| 502 | Stuttgart, R., Reiter. | Sehr großer Krampfaderbruch links. Allmähliche Entwicklung. — Lazarettaufnahme am 7. Januar 1903. — Unfähigkeit, im Dienst zu verbleiben. | 13. bzw. 8. Januar 1903. Ausschälung des Krampfaderbruchs nach Isolierung des Samenstrangs, der Samenstrangarterie und Unterbindung der zu- und abführenden Venen. Längsschnitt, quer genäht. Ungestörte Heilung. | 2 geheilt. 2 dienstfähig. |
| 503 | Colmar i. E., P., Unteroffizier. | Apfelgroßer Krampfaderbruch links. Verschlimmerung durch Quetschung am Querbaum. — 5. Januar 1903. — Unfähigkeit, im Dienst zu verbleiben. | | |

C. Operationen an den Gliedmaßen.

1. Resektionen an den Röhrenknochen.

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--------------------|
| 504 | Darmstadt, G., Kanonier. | Knochenmarkvereiterung am linken Oberarm. Ursache unbekannt. Anfänglich akuter Gelenkrheumatismus vorgetäuscht. — 4. August 1903. — Unmöglichkeit anderer Heilung. | 2. September 1903. Ausräumung des kranken Knochens. Ausfüllung der großen Knochenhöhle mit der Jodoformknochenplombe nach Mosetig v. Moorhof. Heilung in 9 Wochen mit glatter, verschieblicher, in Hauthöhe liegender Narbe. | Geheilt. Invalide. |
|-----|--------------------------|--|--|--------------------|

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|--|---|---|-----------------------|
| 505 | Magdeburg, K., Obergefreiter. | Chronische Entzündung des Knochenmarks am linken Oberarm. Ursache unbekannt. — 11. Juli 1903. — Anhaltende Schmerzhaftigkeit. | 28. Juli 1903. 15 cm langer Schnitt am Aufsenrande des zweiköpfigen Oberarmmuskels. Aufmeißelung der Markhöhle, Auslöfflung, Ausstopfen mit Jodoformgaze. Ungestörte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 506 | Frankfurt a. O., E., Musketier. | Chronische Knochenmarkentzündung am linken Oberarm. Ursache unbekannt. — Ende Juni 1902. — Zunehmende Ernährungsstörungen und Knochenfistel. | 20. Dezember 1902. Aufmeißelung im oberen Drittel des linken Oberarms. Entfernung mifsfarbener Granulationen. Tamponade. 21. April 1903 breite Aufmeißelung und Reinigung der Markhöhle bis in den Oberarmkopf hinein. Entleerung eines Abszesses. Unter feuchten, Alkohol- und Jodoformgazeverbänden Besserung. | Gebessert. Invalide. |
| 507 | Straßburg i. E., K., Musketier. | Alte Knochenmarkentzündung am unteren Ende der rechten Elle. Ursache unbekannt. — 30. Mai 1903. — Bewegungsbehinderung und Schmerzen. | 8. Juni 1903. Aufmeißelung und Auslöfflung einer alten mit Granulationen gefüllten, 2 cm langen Knochenhöhle. Ungestörte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 508 | Magdeburg, U., Kanonier. | Eiterige Knochenmarkentzündung der rechten Elle nach Zerrung des Armes durch ein widerspenstiges Pferd. — 10. September 1902. — Fisteleiterung. | 27. November 1902. Langer Schnitt an der Ellenseite; breite Aufmeißelung der Markhöhle, Entfernung von 4 abgestorbenen Knochenstücken von 2 bis 11 cm Länge. Neubersche Einstülpungsnahte. Heilung nach 5 Wochen; geringe Bewegungsstörung. | Geheilt. Invalide. |
| 509 | Gera, E., Musketier. | Eiterige Knochenmarkentzündung am rechten Oberschenkel. Angeblich Bajonettstofs. — Erkrankungstag unbekannt. — Mehrere Eiterfisteln. | 1. Juli 1903. Ausgedehnte Aufmeißelung und Auskratzung der Markhöhle. — Langsame Heilung. Gut verschiebliche Narbe. | Geheilt. Invalide. |
| 510 | Die gleiche Operation wurde in Straßburg i. E. mit demselben Erfolge bei einem aus unbekannter Ursache erkrankten Pionier vorgenommen. | | | Geheilt. Invalide. |
| 511 | Metz, R., Kanonier. | Knochenmarkentzündung am rechten Oberschenkel ohne bekannte Ursache. — 27. Dezember 1902. — Hohes Fieber. | 14. Januar 1903. 15 cm langer Schnitt an der Aufsenseite des Oberschenkels. Entleerung eines Abszesses unter der Beinhaut. Aufmeißelung der Markhöhle. Ausstopfen mit Jodoformgaze. Andauernde Eiterung. Fieber. — 8. April 1903. Einschnitt von der Innenseite. Entfernung eines 4 cm langen abgestorbenen Knochenstückes. Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 512 | Stade, G., Invalide. | Zu Rückfällen neigende Knochenmarkentzündung des rechten Oberschenkelknochens. Furunkel am Knie im September 1902. Rückgang des Ernährungszustandes. | 9. Mai 1903. 25 cm langer Schnitt. Aufmeißelung der Markhöhle, Auskratzung und Entfernung mehrerer bis 6 cm langer, abgestorbener Knochenstücke. Wiederholte Auskratzung. Langsame Heilung mit leidlicher Beweglichkeit im Knie. Narbe fest mit dem Knochen verwachsen. | Geheilt. |
| 513 | Stettin, A., Kanonier. | Eiterige Knochenmarkentzündung am linken Oberschenkel nach Zellgewebeerterung am Rücken, die durch Erschütterungen beim Exerzieren entstanden sein sollte. — 6. und 15. April 1903. — Auftreibung des Knochens, Nachweis von Eiter. | 21. April 1903. Einschnitt durch die Streckmuskulatur. Aufmeißelung der Markhöhle. Auslöfflung des vereiterten Marks. Ausstopfung mit Jodoformgaze. — 30. Juni 1903. Einschnitt in der Narbe von der ersten Operation. Entfernung eines 8 cm langen, 1 cm breiten abgestorbenen Knochenstückes, Auskratzung der Knochenhöhle. Verschluss der Wunde durch tiefgreifende Nahte. Glatte Heilung; Narbe mit dem Knochen verwachsen. | Geheilt. Invalide. |
| 514 | Trier, T., Invalide. | Chronische Entzündung des Oberschenkelknochens. Ursache und Erkrankungstag unbekannt. Starke Eiterung. | 6. Januar 1903. Schnitt an der Aufsenseite, Freilegung des Oberschenkelknochens, Abmeißelung abgestorbener Knochenteile, Ausstopfung mit keimfreier Gaze. | Geheilt. |
| 515 | Mainz, S., Obergefreiter. | Offener Bruch beider Unterschenkel durch Überfahren. — 22. September 1902. — Eiterige Knochenmarkentzündung des rechten Schienbeins. | 20. Dezember 1902. Auskratzung der Markhöhle, Entfernung von kleinen abgestorbenen Knochenstückchen. Langdauernde Eiterung. Verstopfung eines Lungengefäßes (Lungenembolie). Dauerbäder. Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 516 | Schneidmühl, St., Musketier. | Eiterige Knochenmarkentzündung am rechten Schienbein. Anstrengung bei Märschen. — August und September 1902. — Aussichtslosigkeit anderer Behandlung. | 7. November 1902. Eröffnung des Eiterherdes am rechten Schienbein. Eiterung bestand fort. — 12. Dezember 1902. Aufmeißelung der Markhöhle des Schienbeins, Entfernung eines toten Knochenstückes von 1,5 cm Länge. Auslöfflung des vereiterten Marks. Langsame ungestörte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 517 | Schneidmühl, M., Gefreiter. | Eiterige Knochenmarkentzündung am rechten Schienbein nach größeren Märschen. — Allmähliche Entwicklung im August und September 1903. — Schmerzhaftes Auftreibung des Knochens. | 29. Januar 1903. Freilegung des oberen Schienbeindrittels. Aufmeißelung der Markhöhle. Auslöfflung des vereiterten Marks. Langsame Heilung erst nach nochmaliger Auskratzung am 27. Juni 1903, Ätzungen mit Terpentin. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|
| 518 | Bromberg, K., Grenadier. | Knochenmarkentzündung am rechten Schienbein durch Stofs. — 25. Januar 1903. — Entfernung eines Eiterherdes. | 2. Februar 1903. Spaltung des Eiterherdes. Anhaltende Fistel-eiterung. — 24. Februar 1903. Aufmeißelung der Markhöhle. Dauernde Entleerung von Knochenteilchen. — 8. April 1903. Aufmeißelung des Schienbeins in seiner ganzen Länge. Entfernung eines abgestorbenen Knochenstücks. — 8. Juli 1903. Wiederholung der Operation. Einpflanzung von Hautlappen in die Operationswunde. Heilung unter Bierscher Stauung. | Geheilt. Invalide. |
| 519 | Dresden, B., Unteroffizier. | Eiterige Knochenmarkentzündung am linken Schien- und Sprunggelenk. Erkältung. — 10. April 1903. — Fistelbildung. | 1. September 1903. Aufmeißelung der Markhöhle des Schienbeins. Entfernung abgestorbener Knochenteilchen. Wegen Vereiterung des Sprunggelenks mit Epiphysenlösung wurde der Körper des Sprunggelenks und der innere Knöchel entfernt. Durchschneidung der Achillessehne. Drainage nach hinten. Langsame Heilung. Entfernung des äußeren Knöchels zur besseren Stellung des Fußes. Geringe Beweglichkeit im Sprunggelenk. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 520 | Straßburg i. E., P., Pionier. | Knochenmarkvereiterung am linken Wadenbein. Fall auf das Knie. — 24. August 1903. — Hohes Fieber. | 27. August 1903. Aufmeißelung der Markhöhle des Wadenbeins in der oberen Hälfte. Weichteileiterung. Ausgiebige Einschnitte. Vorübergehende Entzündung des linken Hand- und Schultergelenks. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |

2. Gelenkaussägungen.

Schultergelenk.

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 521 | Trier, L., Musketier. | Tuberkulose des linken Schultergelenks. Angeblich durch Anstrengung im Dienst. — Anfang Januar 1903. — Lebensgefahr durch andauernde Eiterung. | 8. Mai 1903. Typischer Schnitt zur Aussägung des Schultergelenks. Absägung des tuberkulös zerstörten Oberarmkopfes, Aussägung der ebenfalls zerstörten Gelenkpfanne. Heilung mit gering eiternder Fistel und verhältnismäßig guter Gebrauchsfähigkeit. | Geheilt. Invalide. |
| 522 | Graudenz, M., Musketier. | Eiterige Entzündung des linken Schultergelenks. Ursache unbekannt. Fistelbildung. Rückgang des Ernährungszustandes. Fistel am 8. April 1903 Heilung. Leidliche | 7. Januar 1903. Schnitt zur Schulteraussägung nach v. Langenbeck. Absägung des Oberarmkopfes und Aufmeißelung der eiternden Markhöhle bis zur Mitte des Oberarmbeins, wo sich 3 abgestorbene Knochenstückchen in einem walnufgroßen Eiterherd fanden. Jodoformmull-Schiene. Lange Eiterung und Ausstofsung von Knochenstückchen. Fistelbildung. Nach Spaltung und Auskratzung der Beweglichkeit im Schultergelenk durch Übungen und Elektrisieren. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 523 | Metz, R., Musketier. | Eiterfieber nach Knochenfraks am linken Schulterblatt und Schlüsselbein. Angeblich Erkältung. — 11. Juli 1903. — Andauerndes Fieber und Kräfteverfall. | 19. Juli 1903. Aussägung der in dem schon früher eröffneten Gelenk zusammenstosenden Teile des Schlüsselbeins und Schulterblattes. Jodoformmullausstofsung. Eiterfieber. Herzbeutelentzündung. Tod. befund: Im Herzbeutel 350 ccm dünnflüssiger Eiter. Eiterherde in beiden Nieren. | Gestorben am 30. Juli 1903. Leichen- |

Ellenbogengelenk.

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|---|--------------------|
| 524 | Graudenz, J., Kanonier. | Tuberkulose des rechten Ellenbogengelenks. Ursache unbekannt. — 12. Juni 1903. — Wunsch des Kranken. | 25. August 1903. Längsschnitt über den Ellenbogenknorren. Entfernung der schwammig entarteten Gelenkkapsel. Weite Absägung der drei beteiligten Knochen. Tamponade, teilweise Naht. Nach Heilung: Schlottergelenk. Massage, Elektrisieren. Bewegung des rechten Armes im Ellenbogengelenk fast gleich wie links; Kraft ausgiebig. Schreiben mit der rechten Hand möglich. | Geheilt. Invalide. |
|-----|-------------------------|--|---|--------------------|

Handgelenk.

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--------------------|
| 525 | Jena, S., Musketier. | Eiterige Entzündung des rechten Handgelenks. Quetschung. — 14. Januar 1903. — Fieber und Gelenkschmerzen. | 28. Januar 1903. Längsschnitt über das Gelenk dem Verlaufe des 4. Mittelhandknochens entsprechend. Entfernung des Kahn-, Mond- und Pyramidenbeins. Ausstofsung mit Jodoformgaze. Abfall des Fiebers. Langsame Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 526 | Graudenz, D., Gefreiter. | Tuberkulose des linken Handgelenks. Ursache unbekannt. — 27. Juli 1902. — Aussichtslosigkeit abwartender Behandlung. | 27. Oktober 1902. Aussägung des Handgelenks mit Entfernung der Gelenkkapsel, der Handwurzelknochen und der mit ihnen durch Knochenwucherungen zusammenhängenden Köpfchen der Mittelhandknochen. Ausstofsung, Schienenverband, Suspension. Starke Knochenneubildung der Elle. In den Fingergelenken gute, im Handgelenk mäßige Beweglichkeit. | Geheilt. Invalide. |
| 527 | Mainz, M., Kanonier. | Vereiterung des linken Handgelenks nach Hautabschürfungen an der Hand. — 5. Dezember 1902. — Eiterfieber, Kräfteverfall. | 5. Januar 1903. Aussägung des linken Handgelenks. Auslösung beider Reihen der Handwurzelknochen und der hinteren Hälfte vom 2. und 5. Mittelhandknochen. Drainage, Gipsverband. Geringe Beweglichkeit der Reste der Hand gegen den Vorderarm. Finger hakenförmig gekrümmt, steif. Daumen beweglich, so daß Gegenstände ergriffen und gehalten werden können. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|--------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Hüftgelenk. | | | | |
| 528 | Deutsch-Eylan, L., Invalide. | Alter Schenkelhalsbruch. Fall. — 26. August 1899. — Ausbleiben der knöchernen Vereinigung. Unbrauchbarkeit des Beines. | 15. April 1902. Aussägung des rechten Hüftgelenks nach v. Volkmann. Verband in Auswärtsstellung. Fieber und Abszefsbildung an der Außenseite des Oberschenkels. Allmähliche Heilung. Gehfähig nur mit Hilfe eines Stützapparats. | Geheilt. |
| 529 | Berlin, F., Grenadier. | Tuberkulöse Entzündung des rechten Hüftgelenks. Ursache unbekannt. — 6. Februar 1903. — Andauerndes Fieber und Steifheit des Hüftgelenks. | 4. Mai 1903. Aussägung nach v. Langenbeck unterhalb des Rollhügels. Reinigung der mit Wucherungen angefüllten Pfanne. Mehrere Einschnitte in die Oberschenkelmuskulatur zur Entleerung von Senkungseiterungen. Drainage, Tamponade. Feststellender Schienenverband. Nach 14 Tagen Streckverband. Ungestörte Heilung. Beweglichkeit in der Hüfte auch aktiv erhalten. Gang in einem Stiefel mit 7 cm hohem Absatz und Stützapparat nach König sehr zufriedenstellend. | Geheilt. Invalide. |
| 530 | Karlsruhe, M., Ökonomiehandwerker. | Eiterige Entzündung des rechten Hüftgelenks. Erkältung. — 7. Oktober 1902. — Eiterfieber. | 4. November 1902. Schnitt zur Aussägung des Hüftgelenks nach v. Langenbeck. Eröffnung mehrerer Eiterherde in der Gesäßmuskulatur und eines Eiterherdes in der Beckenschaukel. Fortbestehen der Eiterung. — 23. Januar 1903. Aussägung des Oberschenkelkopfes unterhalb vom großen Rollhügel. Langsame Heilung mit steifem Hüftgelenk und Verkürzung um 8 cm. Deckung einer großen Wundliegestelle durch Hautüberpflanzung. | Geheilt. Invalide. |
| 531 | Posen, S., Musketier. | Eiterige Entzündung des linken Hüftgelenks (Septikämie). — Ursache unbekannt. — 5. Dezember 1902. — Streptokokken im Eiter. | 15. Dezember 1902. Eröffnung des Gelenks durch v. Langenbeck'schen Schnitt. Eiterentleerung. Abmeißelung des Oberschenkelkopfes. Tamponade, Streckverband. Abszefsbildung am 7. Halswirbel. Trotz Kochsalzinfusionen starb der Kranke unter hohem Fieber und Kräfteverfall. | Gestorben am 3. Januar 1903. Leichenöffnung verweigert. |
| Kniegelenk. | | | | |
| 532 | Saargemünd, B., Invalide. | Tuberkulose des rechten Kniegelenks. Ursache unbekannt. — 3. November 1902. — Eiterherd im Gelenk. | 10. November 1902. Schnitt nach v. Volkmann. Ausschälen der kranken Kniescheibe. Entfernung der Gelenkkapsel. Absägen der Gelenkenden. Drainage, teilweise Naht. Nach 4 Wochen Gipsverband. Heilung. Mit Lederhülse entlassen. | Geheilt. |
| 533 | Minden, S., Musketier. | Tuberkulose des rechten Kniegelenks. Ursache unbekannt. — 1. Dezember 1902. — Aussichtslosigkeit anderer Behandlung. Mehrfache Gelenkeiterungen. | 2. Juni 1903. Aussägung des rechten Kniegelenks. — 13. Juni 1903. Entfernung der Granulationen auf den Knochenenden. Knochen-naht. Anfangs feste Verwachsung, dann Fistelbildung und Lockerung der Knochen. — 14. Dezember 1903. Absägung größerer Teile des Oberschenkels und Schienbeins, Wadennerv frei in der Wunde. Langsame Heilung, Lähmung des erwähnten Nerven. Später Wundrose von einer Knochenfistel in der Kniekehle. Schluß der Fistel. | Geheilt. Invalide. |
| Fußgelenk. | | | | |
| 534 | Schwerin, G., Füsilier. | Tuberkulose des linken Kniegelenks und Lungentuberkulose. — Anfang Juli 1902. — Eiterung im linken Kniegelenk. | 21. April 1903. Aussägung des linken Kniegelenks nach v. Volkmann. Eröffnung eines Senkungsabszesses in der Wade mit Gegenöffnung. Tamponade, Naht und Drainage. Fieber und Eiterung. — 12. August 1903. Absägen eines weiteren Knochenstückes vom Oberschenkel und Schienbein. Fixierender Verband, Suspension. In der Leistengegend und am Hoden Brand. Blutvergiftung. | Gestorben am 18. August 1903. |
| 535 | Stralsund, R., Kasernenwärter. | Offener Bruch des rechten Unterschenkels oberhalb der Knöchel. Fall beim Kohlenabladen. — 6. Juni 1902. — Starke Eiterung. | 7. Juli 1902. Atypische Aussägung des rechten Fußgelenks und Entfernung der zersplitterten Enden der Unterschenkelknochen. Heilung wurde durch nachträgliche Abstofsung von kleinen Knochen-splittern verzögert. Feste Vernarbung bei rechtwinkliger Stellung des Fußes. Eine Verkürzung von 7 cm wurde durch einen geeigneten Stiefel ausgeglichen, so daß R. als Kasernenwärter im Dienst verbleiben konnte. | Geheilt. |
| 536 | Colmar i. E., H., Unteroffizier. | Offener Bruch des linken Unterschenkels. Sturz mit dem Pferde. — 14. Mai 1902. — Eiterfieber. | 24. Mai 1902. Ausschneidung des Fußgelenks nach König. Tamponade. Aseptischer Verband. Eiterung; langsame Heilung. Gut brauchbares Bein | Geheilt. Invalide. |
| 537 | Graudenz, A., Musketier. | Tuberkulose des linken Fußgelenks. Angeblich infolge alter Verstauchung. — Tag der Erkrankung unbekannt. — Wunsch des Kranken. | 26. Februar 1903. Aussägung des Fußgelenks nach v. Langenbeck. Schienenverband. Glatte Heilung. Beugung und Streckung beschränkt möglich. Kann im Schnürschuh mit seitlichen Stahlschienen ohne Beschwerden mit einem Stock gehen. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|---|---|--|---|---|
| 3. Gliedabsetzungen (Amputationen).¹⁾ | | | | |
| Oberarm. | | | | |
| 538 | Berlin, L., Pionier. | Beiderseitige tuberkulöse Ellenbogengelenkentzündung. Ursache unbekannt. — 11. August 1902. — Abendliche Temperatursteigerungen. | 15. Oktober 1902. Rechtes Ellenbogengelenk: Schnitt über die Mitte des Gelenks, Abpräparieren der erkrankten Gelenkkapsel und Abmeißeln der tuberkulösen Knochenteile. Auskratzen. Gipsverband in rechtwinkliger Stellung. Heilung nach mehrfacher Abszessbildung. Der steife Arm war für leichte Arbeit gebrauchsfähig. — Linkes Ellenbogengelenk: Nach vergeblicher Auskratzung und Aussägung 14. Februar 1903 Absetzung des linken Oberarms in der Mitte. Glatte Heilung. Gut passender künstlicher Arm. | Geheilt. Invalide. |
| 539 | Neumünster, v. C., Musketier. | Tuberkulose des rechten Ellenbogengelenks. Ursache unbekannt. — 10. April 1902. — Schmerzhaftes Schwellen und Fistelbildung. | 21. Januar 1903. Aussägung des Ellenbogengelenks. Gelenkkapsel und Bänder gänzlich, Muskeln teilweise tuberkulös. — 21. Mai 1903. Wegen fortschreitender Erkrankung Absetzung des Armes oberhalb des Ellenbogengelenks. | Geheilt. Invalide. |
| 540 | Freiburg i. Baden, F., Musketier. | Tuberkulöse Entzündung des linken Ellenbogengelenks. Ursache unbekannt. — 14. November 1902. — Mehrfache Auskratzung erfolglos; eingetretene Lungenblutung. | 1. Mai 1903. Absetzung des Oberarms an der Grenze des mittleren und oberen Drittels durch zweizeitigen Zirkelschnitt. Glatte Heilung, künstlicher Arm. | Geheilt. Invalide. |
| 541 | Hildesheim, W., Invalide. | Knocheneiterung am rechten Oberarm und Steifigkeit des Ellenbogengelenks. Ohne bekannte Ursache im Dezember 1902 entstandene Entzündung einer alten Schußverletzung aus der Schlacht bei Spichern. Lazarettaufnahme 17. Februar 1903 nach vorheriger Behandlung in einem Krankenhaus, wo Einschnitte gemacht und die Speichenarterie wegen Blutung in der Nähe der Ellenbeuge unterbunden war. Blutvergiftung. | 20. Februar 1903. Absetzung des rechten Oberarms im oberen Drittel. Geschosssplitter in der Knochenhaut und in den Sehnenansätzen. Ellenbogengelenk nicht krank. Schnelle Besserung. Heilung. Guter Stumpf. | Geheilt. |
| 542 | Berlin, B., Grenadier. | Zellgewebsentzündung am rechten Unterarm nach Schnitt in den Daumen. — 17. August 1903. — Fortschreitende Eiterung bis zum Ellenbogen, beginnender Brand zweier Finger, Blutvergiftung. | 26. August 1903. Absetzung des rechten Oberarms handbreit unter der Achselhöhle. Auslöftung der Markhöhle. Tamponade, trockener Verband. Fieber. Hautabszesse in der Nähe des Stumpfes, an der rechten Schulter, am Kreuzbein und am rechten Oberschenkel. Heilung. Stumpf gut beweglich, künstlicher Arm. | Geheilt. Invalide. |
| 543 | Cosel, H., Musketier. | Zellgewebsentzündung am linken Arm infolge einer Verletzung am Zeigefinger beim Bajonettieren. — 22. Januar 1903. — Fortschreiten der Entzündung. Lebensgefahr. | 13. Februar 1903. Absetzung des linken Oberarms 10 cm oberhalb vom Ellenbogen. 2 zeitiger Zirkelschnitt. Keimfreier Verband. Glatte Heilungsverlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 544 und 545 | Auch in Darmstadt und Metz mußte bei einem Dragoner bzw. Kanonier die Absetzung des Oberarms (1 mal rechts, 1 mal links) nach einem Panaritium bzw. einer Sehnenscheidenphlegmone an der Hand vorgenommen werden. Beide Leute wurden nach der Heilung invalide. | | | 2 geheilt. 2 invalide. |
| Finger. | | | | |
| 546 | Frankfurt a. M., B., Musketier. | Knochenerkrankung am Grundgliede des rechten Zeigefingers und am 2. Mittelhandknochen. Schnittwunde im November 1902. Aussichtslosigkeit anderer Behandlung. | 23. April 1903. Auslösung des Zeigefingers im Grundgelenk durch Ovalärschnitt. Absägung der vorderen Hälfte des 2. Mittelhandknochens. Teilweise Naht. Glatte Heilungsverlauf. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 547 bis 549 | Dieselbe Operation wurde in Münster wegen Steifheit des rechten Zeigefingers, in Frankfurt a. O. am rechten und in Potsdam am linken Zeigefinger wegen Zerschmetterung durch Platzpatronenschuß ausgeführt. Alle 3 Leute wurden geheilt, der in Frankfurt a. O. wurde dienstunbrauchbar, die beiden anderen invalide. | | | 3 geheilt. 1 dienstunbrauchbar. 2 invalide. |
| 550 | Münster, B., Musketier. | Zellgewebsentzündung am linken Mittelfinger nach einer vernachlässigten Schnittwunde. — 22. Oktober 1902. — Ausgedehnte Eiterung. Gefahr des Fortschreitens der Entzündung. | 12. November 1902. Auslösung des Mittelfingers nach v. Adelman. Heilung durch Fleischwärzchenbildung. | Geheilt. Invalide. |

¹⁾ Siehe auch unter D. Geschwulstoperationen.

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|----------------------------|---|---|---|
| 551 und 552 | | 2 Absetzungen des Mittelfingers hinter dem Köpfchen des Mittelhandknochens wurden außerdem in Graudenz nach Platzpatronenverletzung, in Berlin wegen einer Sehnenscheidenentzündung ausgeführt. Beide Leute wurden geheilt und zeigten gute Beweglichkeit der Hand. Der erste wurde dienstunbrauchbar, der zweite invalide. | | 2 geheilt. 1 dienstunbrauchbar. 1 invalide. |
| 553 | Münster, R., Kürassier. | Quetschwunde am rechten Ringfinger mit Eröffnung des Gelenks zwischen dem 2. und dem Grundgliede. Hufschlag. — 12. April 1903. — Fortschreitende Entzündung. Absterben der Sehnen. | 5. Juni 1903. Auslösung des Fingers nach v. Adelmann. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Invalide. |
| 554 bis 557 | | Absetzung des 4. Fingers im Mittelhandknochen wurde außerdem nach Panaritien bzw. Zellgewebsentzündungen noch 2 mal an der rechten Hand (Braunschweig, Minden) und 2 mal an der linken Hand (Potsdam, Posen) ausgeführt. In den beiden ersten Fällen wurde nach v. Adelmann operiert. Über die Gebrauchsfähigkeit ist nur aus Braunschweig berichtet, daß die Beweglichkeit der übrigen Finger behindert war. Alle 4 Leute wurden geheilt und invalide. | | 4 geheilt. 4 invalide. |
| 558 | Berlin, O., Dragoner. | Zertrümmerung des rechten Zeigefingers durch Platzpatronenschuß. — 17. Mai 1903. — Regelung der Wundverhältnisse. | 18. Mai 1903. Absägung des Knochens nahe dem Grundgelenk. Naht. Eiterung und Sehnenscheidenentzündung, Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 559 | | Dieselbe Operation wurde aus demselben Grunde und mit demselben Erfolge auch in Bruchsal ausgeführt. | | Geheilt. Invalide. |
| 560 | Stallupönen, P., Ulan. | Zerschmetterung des 2. Gelenks vom linken Mittelfinger durch Platzpatronenschuß. — 21. November 1902. — Ausbleiben der Heilung. | 2. Dezember 1902. Absetzung des Fingers dicht unterhalb des Grundgelenks. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Invalide. |
| 561 | Berlin, B., Kürassier. | Fistel am rechten Ringfinger nach Panaritium. — 23. Juni 1903. | 7. September 1903. Absetzung des Ringfingers in der Mitte des Mittelfingergliedes. Trockener Verband. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |

Oberschenkel.

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 562 | Danzig, K., Ökonomic-handwerker. | Tuberkulose des rechten Kniegelenks. Ursache unbekannt. — 24. April 1902. — Eiterbildung im rechten Kniegelenk. | 30. Mai 1902. Drainage, 26. Juni 1902 breite Eröffnung des Gelenks durch Seitenschnitte. 3. Juli 1902. Aufklappen des Gelenks durch Querschnitt unterhalb der Kniescheibe. Starke Eiterung. Fistelbildung. 20. September 1902. Absetzung in der Mitte des rechten Oberschenkels. Glatte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 563 | Graudenz, L., Musketier. | Weichteiltuberkulose am linken Unterschenkel. Ursache unbekannt. — Herbst 1901. — Fisteln und Abszesse bis in die Nähe des Kniegelenks. Erfolglosigkeit anderer Behandlung. | 11. Dezember 1902. Absetzung des Oberschenkels an der Grenze des mittleren und unteren Drittels mit vorderem größeren und hinterem kleineren Hautlappen. Regelrechter Verlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 564 | Magdeburg, S., Unteroffizier. | Eiterige Knochenmarkentzündung am rechten Schienbein. Ursache unbekannt. — 18. Dezember 1902. — Eiterfieber und fortschreitender Kräfteverfall. | 28. Dezember 1902. Aufmeißelung der oberen Schienbeinhälfte, Auslöfflung. Ausstopfung mit Jodoformgaze. Anhaltendes Fieber, Vereiterung des rechten Kniegelenks. 3. Januar 1903. Eröffnung des rechten Kniegelenks durch zwei seitliche Schnitte. Drainage. Fortbestehen des Fiebers. Epiphysenlösung am oberen Schienbeinende. 14. Januar 1903. Absetzung des Oberschenkels in der Mitte. Schnitt nach Beyer. Keine Naht. Heilung nach 6 Wochen. Fieberloser Verlauf. Guter Stumpf. | Geheilt. Invalide. |
| 565 | Mülhausen i. E., G., Musketier. | Akute Kniegelenkentzündung rechts. Ursache unbekannt. — 27. Juli 1903. — Fortschreitende Blutvergiftung. | 24. Juli 1903. Breite Eröffnung des schon vorher mehrmals eröffneten Kniegelenks. 4. August 1903. Eröffnung des Gelenks von vorn durch querverlaufenden Bogenschnitt. Andauerndes Fieber und Kräfteverfall. 6. August 1903. Absetzung des Oberschenkels, Zirkelschnitt, schichtweise Durchtrennung der Muskeln, Periostlappen. Tod unter zunehmendem Kräfteverfall. | Gestorben am 23. August 1903. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-----------------------|--|---|---|---|
| 566 | Halberstadt, H., Musketier. | Fast völlige Abreißung des rechten Oberschenkels im unteren Drittel durch Explosion eines blindgegangenen Artilleriegeschosses. — 26. Mai 1903. — Erschöpfung durch den Blutverlust aus der rechten Oberschenkelarterie und aus mehreren großen Weichteilwunden am linken Bein. Blutstillung und Regelung der Wundverhältnisse. | 26. Mai 1903. Absetzung des rechten Oberschenkels im oberen Drittel. Tod an Erschöpfung 8 Stunden nach der Verletzung. 26. Mai 1903. — Erschöpfung durch den Blutverlust aus der rechten Oberschenkelarterie und aus mehreren großen Weichteilwunden am linken Bein. Blutstillung und Regelung der Wundverhältnisse. | Gestorben am 27. Mai 1903. |
| 567 | Ulm, R., Wachtmeister. | Brand am unteren Drittel des rechten Unterschenkels (Zuckerruhr). — 18. September 1902. — Störung des Allgemeinbefindens, Fieber. | 6. Dezember 1902. Absetzung des rechten Oberschenkels handbreit über dem Knie. Zweizeitiger Zirkelschnitt, Hautmanschette mit 2 Längsschnitten. Naht. Drainage. Tod nach der Operation durch Herzschwäche. | Gestorben am 6. Dezember 1902. |
| 568 | Fraustadt, N., Musketier. | Erfrieren beider Füße und Unterschenkel. Fahnenflucht. — 11. Dezember 1902. — Brand beider Füße und Unterschenkel bis zur Mitte der letzteren. | 20. Dezember 1902. Absetzen beider Unterschenkel im Kniegelenk unter Bildung eines vorderen und hinteren Lappens. Hautlappen zum Teil brandig. — 2. Februar 1903. Absetzung beider Oberschenkel 5 cm über den Knieen, Bildung eines vorderen und hinteren Lappens. Heilung unter mäfsiger Eiterung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 569 | Deutsch-Eylau, S., Gefreiter. | Brand am linken Unterschenkel und Fufs. Venenverstopfung bei Typhus. — 18. Juli 1903. — Entfernung der brandigen Teile. | 14. August 1903. Absetzung des linken Beines am Oberschenkel. Heilung, Stelzfufs. | Geheilt. Invalide. |
| 570 | Potsdam, F., Kasernenwärter. | Brand des rechten Unterschenkels nach Verstopfung der Kniekehlen-Blutader und der Kniekehlen-Schlagader. — 14. Februar 1903. — Herzmuskelschwäche und Entartung. Seit Anfang Februar Atemnot. Jauchiger Zerfall. | 10. März 1903. Absetzung des rechten Oberschenkels in der Mitte durch Zirkelschnitt. Nekrose der Weichteile, stinkende Eiterung. Trotzdem Schluß der Wunde Ende Mai fast vollendet. Plötzlicher Tod durch Herzschwäche. | Gestorben am 28. Mai 1903. |
| Unterschenkel. | | | | |
| 571 | Diedenhofen, B., Kanonier. | Tuberkulose des linken Fußgelenks. Verschlimmerung des bis dahin verborgenen Leidens durch Zellgewebsentzündung am linken Knöchel nach Wundscheuern. — 25. November 1902. — Anhaltendes hohes Eiterfieber. Tuberkelbazillen im Eiter. | 30. Dezember 1902. Absetzung des linken Unterschenkels 13 cm unter dem Knie. Größerer vorderer, hinterer kleiner, ovaler Lappen und vorderer Hautperiostlappen, Knochenfläche vorn schräg abgesägt. Teilweise Naht, Drainage. Abfall des Fiebers. Gewichtszunahme. Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 572 | Cassel, A., Invalide. | Tuberkulose des linken Sprunggelenkes, tuberkulöser Abszefs am rechten Schienbein, Caries der Rippen. — Ursache und Beginn unbekannt. — Ständiges Fieber, Kräfteverfall. | 20. Juni 1903. Absetzung des linken Unterschenkels in der Mitte. Teilweise Naht. Eröffnung und Auskratzung des Abszesses am rechten Schienbein. Entfernung eines Sequesters. Auskratzung der Fistelgänge an der Brust. Glatte Heilung am rechten und linken Unterschenkel. Langwieriger Verlauf an den Fisteln. Kein Fieber. Gewichtszunahme. | Gebessert. |
| 573 bis 578 | Außerdem sind noch 5 Absetzungen des linken, 1 des rechten Unterschenkels wegen Tuberkulose der Fußwurzelknochen gemacht, 3 davon in Güstrow, Strafsburg i. E. und Hannover nach dem vergeblichen Versuch, das Glied durch Aussägung des Fußgelenks zu erhalten. Bei den 3 anderen Kranken in Goldap, Hirschberg und Güstrow fand die Absetzung sofort statt. — Der Kranke in Hannover litt gleichzeitig an tuberkulösen Drüsenvereiterungen. In 3 Fällen war keine Ursache für die Entstehung der Knochentuberkulose bekannt, in Goldap, Güstrow und Strafsburg i. E. trat sie nach Verstauchungen auf, die im ersteren Falle beim Kastensprung entstanden war. In Hannover und Goldap wurde handbreit unter dem Knie bzw. dem Schienbeinhöcker abgesetzt, in letzterem Falle nach Bierscher Methode. Die übrigen Absetzungen waren im unteren Drittel bzw. an der unteren Grenze des mittleren Drittels vorgenommen. 5 Kranke wurden nach beendeter Heilung invalide, der 6. (Strafsburg i. E.) starb an Lungentuberkulose bei gut fortschreitender Wundheilung. | | | 5 geheilt. 1 gestorben. 5 invalide. |
| 579 | Fürstenwalde, R., Ulan. | Eiterige (metastatische) Entzündung der rechten Fußwurzelknochen nach Zellgewebsentzündung an der Oberlippe. — 5. Februar 1903. — Fortschreitende Eiterung. | 5. März 1903. Absetzung des rechten Unterschenkels. Zirkelschnitt an der Grenze des mittleren und unteren Drittels; Muskelnaht nach Neuber. Hautnaht. — Heilung durch erste Verklebung. Feste Narbe, guter Stumpf. Entlassung durch Furunkulose des Unterschenkels verzögert, im Eiter der Furunkel Staphylococcus pyogenes citreus. | Geheilt. Invalide. |
| 580 | Berlin, L., Gefreiter d. Res. | Vereiterung des linken Fußgelenks nach Furunkel an der linken Halsseite. — 16. April 1903. — Hohes Fieber, Schüttelfröste, Sepsis. | 10. Mai 1903. Absetzung des linken Unterschenkels zwischen oberem und mittlerem Drittel. Tamponade, aufsaugender Verband. — Eiterung im Stumpfe und Vereiterung des rechten Kniegelenks verzögerten die Heilung. Guter Stumpf. Künstliches Bein. | Geheilt. Invalide. ¶ |

| Lfde. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|--|--|---|---|
| 581 | Gumbinnen, S., Füsilier. | Tiefliegende Zellgewebsentzündung des linken Fußgelenks. Ursache unbekannt. — 23. Februar 1903. — Fortschreitende Entzündung; Beginn allgemeiner Blutvergiftung. | 25. März 1903. Absetzung des linken Unterschenkels zwischen oberem und mittlerem Drittel. Tamponade, trockener Verband. — Langsame Heilung, metastatischer Abszess an der linken Hüfte. Künstliches Bein. | Geheilt. Invalide. |
| 582 | Berlin, W., Gefreiter. | Zellgewebsentzündung am linken Fuß und Unterschenkel nach Wundschuern. — Anfang Oktober 1902. — Vereiterung des Fersenbeins, fortschreitende Eiterung. | 21. Oktober 1902. Herausnahme des Fersenbeins. Fortschreiten der Entzündung, beginnender Brand der Fußsohle. — 25. Oktober 1902. Absetzung des linken Unterschenkels handbreit unter dem Knie. Offene Wundbehandlung. Unter Wiederanstieg des Fiebers erlag der Kranke an allgemeiner Blutvergiftung. | Gestorben am 3. November 1902. |
| 583 und 584 | Außerdem mußten wegen fortschreitender Zellgewebsentzündung nach Wundlaufen noch 2 Absetzungen des (rechten) Unterschenkels im oberen Drittel in Halberstadt und Metz gemacht werden. Diese beiden Leute wurden nach beendeter Heilung invalide. | | | 2 geheilt. 2 invalide. |
| 585 | Bromberg, V., Musketier. | Quetschung der linken kleinen Zehe. Fall beim Exerzieren. — 1. März 1903. — Brand am linken Fuß und Unterschenkel. | 9. März 1903. Absetzung des Unterschenkels unterhalb des Knies. — Brand im Amputationsstumpf, Pyämie. Rascher Verfall. Leichenbefund: Eiterige Herde in der linken Lunge, Blutaustritte in Darm und Blase, Nierenentzündung, braune Atrophie des Herzens, Leberschrumpfung. | Gestorben am 19. April 1903. |
| 586 | Bautzen, S., Soldat. | Zermalmung des rechten Unterschenkels. Überfahren mit der Eisenbahn. — 5. März 1903. — Unmöglichkeit, das Glied zu erhalten. | 5. März 1903. Absetzung des rechten Unterschenkels im mittleren Drittel durch zweizeitigen Zirkelschnitt. Verzögerung der Heilung durch Abstosung eines Knochenstückes. Guter Stumpf. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 587 | Rawitsch, M., Musketier. | Brand des linken Fußes durch Erfrieren. (Fahnenflucht.) — 8. März 1903. — Unmöglichkeit, das Glied zu erhalten. | 28. März 1903. Absetzung des linken Unterschenkels zwischen mittlerem und unterem Drittel. Zweizeitiger Zirkelschnitt. Glatte Verlauf. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 588 | Torgau, M., Musketier. | Erfrierung beider Füße. (Fahnenflucht.) — 20. November 1902. — Brand der erfrorenen Teile. | 27. November 1902. Absetzung beider Unterschenkel in der Mitte durch Zirkelschnitt. Langsame Heilung unter Eiterung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 589 | Mülhausen i. E., B., Musketier. | Erfrierung beider Füße. (10 Tage fahnenflüchtig.) — 9. Februar 1903. — Blutvergiftung infolge von Frostbrand. | 15. Februar 1903. Absetzung beider Unterschenkel handbreit oberhalb der Knöchel. Zirkelschnitt, Knochenhautlappen. Offene Wundbehandlung. Fortschreiten der allgemeinen Blutvergiftung. Hinzutreten einer Verstopfung von Lungengefäßen. befund: Verstopfung der größeren Venen an beiden Beinen. Verstopfung der rechten Lungenarterie. Schwere Entzündung der Nieren. Leber- und Milzschwellung. | Gestorben am 16. Februar 1903. Leichen- |
| 590 | Darmstadt, F., Kanonier. | Erfrierung beider Füße und Unterschenkel. (7 Tage fahnenflüchtig.) — 9. April 1903. — Brand beider Füße und Unterschenkel. Blutvergiftung (Septikämie). | 21. April 1903. Absetzung beider Unterschenkel nach Bier. Doppelseitige Lungenentzündung. | Gestorben am 30. April 1903. |
| 591 | Leipzig, M., Invalide. | Neuralgie am Amputationsstumpf des linken Unterschenkels. — 2. November 1866. — Beseitigung der Schmerzen. | 20. Mai 1903. Höhere Absetzung des linken Unterschenkels unterhalb der Raubigkeit des Schienbeins. Heilung durch erste Verklebung. Die anfangs noch heftigen neuralgischen Schmerzen nahmen ab. | Geheilt. |
| 592 | Wesel, H., Musketier. | Zerschmetterung des linken Fersen-, Sprung- und Kahnbeins durch Manöverkartusche mit Feldartillerie-Exerziergeschofs. — 25. August 1902. | 25. August 1902. Operation nach Mikulicz-Wladimirow. Entzündung. 27. August 1902. Absetzung des Unterschenkels im unteren Drittel. Eiterung. Wiederauftreten der Entzündung. 31. Oktober 1902. Absetzung des Unterschenkels im oberen Drittel. | Geheilt. Invalide. |
| 593 | Spandau, K., Grenadier. | Eiterige Zerstörung einiger Mittelfuß- und Fußwurzelknochen links nach einem Furunkel an der Achillessehne. — 1. November 1902. — Fortschreitende Eiterung. | 5. Dezember 1902. Absetzung des Fußes nach Pirogoff. Glatte Heilung. Gute Gehfähigkeit im Pirogoffschen Schnürstiefel. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|--------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Fußs. | | | | |
| 594 | Tilsit, G., Musketier. | Frostbrand beider Füße. Erfrierung. Fahnenflucht. — 30. November 1902. — Brandige Abstofsung der Zehen. | 3. Januar 1903. Abtragung der Zehen des rechten Fußes in den Grundgelenken. Absägung der Hälfte des 1. und der Köpfchen vom 2. und 4. Mittelfußknochen. Abtragung des Knorpels vom 5. Mittelfußknochen. 5. Januar 1903. Abtragung der Zehen des linken Fußes in den Grundgelenken. Absägung der Hälfte des 1., des Köpfchens des 2. und des Knorpels vom 3. Mittelfußknochen. Heilung mit Eiterung. Guter Gang. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 595 | Grandenz, P., Füsilier. | Knochtuberkulose an der rechten 2. und linken großen Zehe sowie am rechten Daumen. Ursache unbekannt. — 20. April 1903. — Erfolglosigkeit anderer Behandlung. | 1. August 1903. Auslösung der rechten 2. und der linken großen Zehe sowie des rechten Daumens durch Ovalärschnitt. An Daumen und großer Zehe Entfernung des Köpfchens des entsprechenden Mittelhand- bzw. Mittelfußknochens. Teilweise Naht. Ausstopfung. Wundrose von 2 Nahtstellen am Daumenballen und in leichter Form an der rechten 2. Zehe. Später glatte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 596 | Osnabrück, R., Unteroffizier. | Knochtuberkulose am rechten Fußs. ^{3/4} Jahr vorher Quetschung des Fußes durch Gewehrkolben. — 19. Juni 1903. — Zerstörung des Knochens. | 22. Juni 1903. Abnahme der rechten großen Zehe. Ovalärschnitt, Absägung des Köpfchens vom Mittelfußknochen. Feste Narbe. | Geheilt. Invalide. |

4. Gliedauslösungen (Exartikulationen).¹⁾

An der Schulter.

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| 597 | Braunschweig, P., Musketier. | Fortschreitende Zellgewebsentzündung am rechten Oberarm, nachdem infolge eines Sehnscheiden-Panaritiums am rechten Ringfinger (21. Oktober 1902) am 5. November 1902 die Auslösung des Ringfingers und am 15. November 1902 die Absetzung des rechten Oberarms im unteren Drittel vorgenommen war, ohne daß die Entzündung aufgehalten wurde. | 18. November 1902. Auslösung des Oberarmknochens im Schultergelenk nach vorheriger hoher Absetzung und Unterbindung der großen Gefäße. Fortschreiten der Blutvergiftung und schneller Kräfteverfall. | Gestorben am 22. November 1902. |
|-----|---------------------------------|---|--|---------------------------------|

An Hand und Fingern.

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 598 | Jüterbog, J., Kanonier. | Handverletzungen durch Explosion eines in der Hand gehaltenen Fußartilleriezünders. (Gleichzeitige Verletzungen des linken Auges und am Bauch. Schußliste Nr. 73.) — 4. Februar 1903. — Erzielung günstigerer Wundverhältnisse. | 7. Februar 1903. 1. Auslösung des Stumpfes der linken Hand im Handgelenk. Unregelmäßiger Lappen. 2. Auslösung des Daumens und Zeigefingers der rechten Hand je aus ihren Grundgelenken und des Mittelfingers aus dem 2. Gelenk. Eiterung. Langsame Abstofsung der durch die Explosion geschädigten Gewebe. Heilung. Vermag mit der rechten Hand zu schreiben. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 599 | Hannover, K., Füsilier. | Panaritium am rechten Daumen. — 13. April 1903. — Knocheiterung. | 21. April 1903. Auslösung des Endgliedes des rechten Daumens. Tamponade. Ungestörte Heilung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 600 | Münster, R., Kürassier. | Offener Bruch des Grundgliedes des linken Daumens und Verrenkung im Nagelgliedgelenk durch Hufschlag. — 17. November 1902. — Schwere der Verletzung. | 9. Dezember 1902. Auslösung des Daumens im Grundgelenk. Naht. Heilung durch Abstofsung von Unterbindungsnähten verzögert. | Geheilt. Invalide. |
| 601 | Neu-Ruppin, D., Gefreiter. | Zerreißungen und Knochenbrüche am Daumen, 4. und 5. Finger der linken Hand durch Explosion eines Zünders. — 8. August 1903. — (Wegen gleichzeitiger schwerer Bauchverletzungen usw. s. Schußliste Nr. 74.) | Gelenkauslösung des Nagelgliedes vom linken Daumen, des Mittel- und Nagelgliedes vom 4. und des ganzen 5. Fingers. Tod durch die Bauchverletzungen. | Gestorben am 9. August 1903. |
| 602 | Zabern, M., Unteroffizier. | Scharfer Schuß durch das Mittelglied des rechten Zeigefingers. Selbstverstümmelung. — 30. März 1903. | 30. März 1903. Auslösung des Fingers im 2. Gelenk. Heilung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 603 | Hamburg, B., Musketier. | Schufsverletzung mit Flobertgeschofs am rechten Zeigefinger. — 23. Februar 1903. — Fortschreitende Eiterung. | 19. April 1903. Auslösung des rechten Zeigefingers im Grundgelenk. Sekundärnaht. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |

¹⁾ Siehe auch unter D. Geschwulstoperationen.

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 604 bis 608 | | Wegen Zerschmetterungen durch Platzpatronenschufs wurden 2 weitere Auslösungen des Zeigefingers im Grundgelenk in Stettin und Stallupönen sofort nach der Verletzung ausgeführt. — 2 weitere Auslösungen des rechten und 1 des linken Zeigefingers wurden nach Panaritien gemacht, die infolge von Fall (Hamburg), nach einer Rißwunde (Insterburg) bzw. aus unbekannter Ursache (Halberstadt) entstanden waren. Diese 5 Leute wurden invalide. | | 5 geheilt. 5 invalide |
| 609 | Wesel, St., Unteroffizier. | Zellgewebsentzündung am linken Mittelfinger durch Stofs. — 9. Oktober 1902. — Vereiterung des Nagelgliedes, hohes Fieber mit schlechtem Allgemeinbefinden. | 15. November 1902. Auslösung des Nagelgliedes. Heilung durch Wundrose verzögert. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 610 | Düsseldorf, J., Ulan. | Zellgewebsentzündung am rechten Mittelfinger. — 18. Dezember 1902. — Vereiterung des Mittelgelenks. | 19. Januar 1903. Auslösung des Fingers im Mittelhand-Fingergelenk. Tamponade. Heilung unter Eiterung. | Geheilt. Invalide. |
| 611 bis 614 | | Die Auslösung des rechten Mittelfingers wurde außerdem noch 4 mal wegen Panaritium bzw. Zellgewebsentzündung in Frankfurt a. O., Posen, Neifse und Metz mit gleichem Erfolge ausgeführt. | | 4 geheilt. 4 invalide. |
| 615 | Oppeln, A., Musketier. | Zellgewebsentzündung am rechten Ringfinger nach Verletzung einer alten Narbe. — 25. Oktober 1902. — Teilweises Absterben des Grundgliedknochens, Zerstörung der Beuge- und Strecksehnen. | 15. Januar 1903. Auslösung des Fingers im Grundgelenk. Naht. Glatte Heilung. | Geheilt. Invalide. |
| 616 | | Aus gleicher Ursache und mit demselben Erfolge wurde die gleiche Operation in Offenburg ausgeführt. | | 1 geheilt. 1 invalide. |
| 617 | Ludwigslust, G., Dragoner. | Eiterige Sehnscheidenentzündung am rechten kleinen Finger. Stichwunde. — 17. Januar 1903. — Fortschreitende Entzündung. | 9. Februar 1903. Auslösung des Fingers im Mittelhandgelenk. Offene Wundbehandlung. Nach anfänglicher Eiterung regelrechter Wundverlauf. | Geheilt. Invalide. |
| 618 und 619 | | 2 weitere Auslösungen des kleinen Fingers im Grundgelenke nach Panaritien wurden in Berlin und Inowrazlaw gemacht. Beide Leute wurden nach der Heilung invalide. | | 2 geheilt. 2 invalide. |
| Am Hüftgelenk. | | | | |
| 620 | Torgau, E., Kanonier. | Knochenmarkentzündung im äußeren Gelenkknorren des linken Oberschenkels. Eiterige Kniegelenkentzündung. (Einige Zeit vorher Furunkel an der linken Hinterbacke.) — 28. April 1902. — Schüttelfröste. Lebensgefahr. | 11. Mai 1902. Breite Eröffnung des linken Kniegelenks auf beiden Seiten. — 19. Juni 1902. Aussägung der Gelenkenden vom Ober- und Unterschenkel. Eiterherd im äußeren Gelenkknorren des Oberschenkelbeins. — 3. Juli 1902. Hohe Absetzung des Oberschenkels. Vereiterung der Muskulatur. Auslösung des Beins im Hüftgelenk. Langsame Reinigung der Wunde. 2 mal Wundrose (die sonst weder im Lazarett noch in der Garnison vorgekommen war). Heilung. Künstliches Bein. | Geheilt. Invalide. |
| An Mittelfuß- und Zehengelenken. | | | | |
| 621 | Naumburg a. S., H., Musketier. | Frostbrand der Zehen. — 10. November 1902. — Vom 27. November 1902 ab Wundstarrkrampf. Drohende Lebensgefahr. | 29. November 1902. Gelenkauslösung nach Lisfranc. Einspritzung von 2 mal 100 Antitoxin-Einheiten des Starrkrampf-Serums. Keine Besserung. | Gestorben am 29. November 1902. |
| 622 | Insterburg, D., Musketier. | Erfrierung beider Füße. Nächtigen im Freien. — Anfang Januar 1903. — Brand des vorderen Teils des rechten Fußes. | 26. Januar 1903. Auslösung des Mittelfußes aus seiner Verbindung mit dem Fußwurzelknochen und Entfernung des 1. und 2. Keilbeins, um eine genügende Hautbedeckung am inneren Fußrande zu erhalten. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 623 | Cüstrin, E., Musketier. | Eiterige Entzündung beider Fußgelenke nach dienstlichen Anstrengungen. — November 1902. — Eiterige Zerstörung der Fußwurzelknochen. Frankfurt a. O., wo nacheinander aufgetretene Ergüsse in beide Kniegelenke und im rechten Fußgelenk teils mit Bierscher Staunung, teils mit Glycerineinspritzungen behandelt wurden. Heilung. Starke Bewegungsbehinderung in beiden Fußgelenken. Gang nur mit zwei Krücken. | 23. Dezember 1902. Schnitt an der Innenseite des linken Fußes vom Knöchel bis zum Großzehenrand; 8 cm lange Gegenöffnung am äußeren Fußrande; Entfernung der eiterig zerstörten Keilbeine und des Kahnbeins. Auskratzen der Wunde und Ausstopfung mit Gaze. — 25. Dezember 1902. Verlegung in das Garnisonlazarett | Geheilt. Invalide. |
| 624 | Danzig, G., Husar. | Offener Bruch des linken Sprungbeins. Sturz mit dem Pferde. — 27. Mai 1902. — Eiterfieber. anfänglicher Fistelbildung. Stiefel. | 10. Juni 1902. Entfernung des Sprungbeins. Der zum Kahnbein gehende und der mit dem Fersenbein in Verbindung stehende Fortsatz des Sprungbeins waren abgebrochen. Heilung unter allmählichem Fieberabfall. Langsamer Schluß der Wunden nach Geringe Beweglichkeit im Fußgelenk (10° Ausschlag). Schienent- | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|--|---|--|--------------------------|
| 625 | Stuttgart, R., Musketier. | Tuberkulöse Entzündung des linken Fersen- und Würfelbeins. Angeblich Marschieren. — 14. November 1902. — Fistelbildung. | 7. Januar 1903. Ablösung der Fersenkappe. Entfernung des Fersen- und Würfelbeins. Auskratzen der Granulationen. Tamponade. Naht der Fersenkappe. Guter Verlauf. Gang mit Schienenstiefel sehr langsam und stark hinkend. | Geheilt. Invalide. |
| 626 | Brandenburg a. H., K., Kürassier. | Hammerzehe der linken zweiten Zehe; seit früher Jugend. Behinderung der Dienstfähigkeit wegen Stiefeldrucks. | 29. Oktober 1902. Auslösung der Zehe im Grundgelenk. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 627 | Dieselbe Operation wurde in Brandenburg a. H. aus derselben Ursache und mit demselben Erfolge ein zweites Mal ausgeführt. | | | Geheilt. Dienstfähig. |
| 628 | Worms, M., Musketier. | Krümmung der zweiten rechten Zehe (Hammerzehe) nach Quetschung am 7. Februar 1903. — Wunsch des Kranken. | 9. Februar 1903. Auslösung der rechten zweiten Zehe aus dem Mittelfuß-Zehengelenk. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 629 | Die Auslösung der durch Gelenkentzündung verkrüppelten und beim Marschieren hinderlichen zweiten rechten Zehe wurde mit gleichem Erfolge in Treptow a. R. vorgenommen. | | | Geheilt. Dienstfähig. |

5. Anderweitige Operationen an den Gliedmaßen.

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|--|--------------------------|
| 630 | Mülhausen i. E., B., Musketier. | Zerreißen der langen Beugesehne am linken Daumen infolge Trommels (Trommlerlähmung) am 8. Februar 1903. — Unbeweglichkeit des Daumens. | 11. Februar 1903. Die Sehnenenden wurden unterhalb der durchtrennten Bänder der Handfläche durch Naht vereinigt. Heilung durch erste Verklebung. Massage, Elektrisieren. Anfangs gute Beweglichkeit des Daumens. Nach 6 Wochen Gebrauchsunfähigkeit, die durch Massage und Elektrisieren nicht zu heben war. Zweite Operation abgelehnt. | Ungeheilt. Invalide. |
| 631 | Mainz, S., Invalide. | Narbenschumpfung am rechten Daumen infolge eines im Jahre 1901 erhaltenen Lanzenstichs. — Hinderliche Stellung des Daumens. | 30. Juli 1903. Lösung der Beugesehnen aus dem Narbengewebe. Deckung des Gewebsverlustes am Daumenballen durch einen Hautlappen aus der Rückenfläche des linken Unterarms. — 10. August 1903. Durchschneidung des Lappenstücks nach erfolgtem Anwachsen. Glatte Heilung, nach welcher der Daumen abgespreizt und zum Greifen gebraucht werden kann. | Geheilt. |
| 632 | Stettin, B., Grenadier. | Durchschneidung beider Beugesehnen des linken 4. Fingers im Handteller durch Glas. — 20. März 1903. — Mißerfolg eines früheren Nahtversuchs. | 5. Mai 1903. Spaltung der alten Narbe im Handteller, mit welcher die Sehnenenden fest verwachsen waren. Plastische Vereinigung der weit auseinanderliegenden Sehnenenden. Eiterung. Lösung der Sehnennähte. | Ungeheilt. Invalide. |
| 633 | Darmstadt, V., Vizewachtmeister. | Dupuytrense Kontraktur der Hohlhandbinde am linken 4. Finger. Alte Verletzung. — Seit etwa 1/2 Jahr Verschlimmerung. — Starke Behinderung der Hand. | 3. September 1903. Ausschneidung der narbig veränderten Weichteile am linken 4. Finger. Deckung der Hautlücke mittels Krause'schem Hautlappens aus dem linken Unterarm. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 634 | Karlsruhe, B., Sergeant. | Schufswunde am Grundglied des rechten Zeigefingers durch Zielmunition. — 20. Februar 1903. — Entfernung des Geschosses | 22. Februar 1903. Einschnitt auf das mit Röntgenstrahlen nachgewiesene Geschofs. Heilung mit Verwachsungen der zerschossenen Beugesehnen. | Geheilt. Invalide. |
| 635 | Karlsruhe, K., Grenadier. | Schufsverletzung der linken Mittelhand mit Taschenpistole. — 23. August 1903. — Entfernung des Geschosses. | 28. August 1903. Entfernung des fest in den Knochen eingekleiteten Geschosses durch Schnitt von der Streckseite. Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 636 | Düsseldorf, L., Invalide. | Muskel- und Sehnenzerreißen am linken Vorderarm. Durch Platzpatronenexplosion. — 3. Januar 1903. — Regelung der Wundverhältnisse. | 31. August 1903. Herausnahme eines Patronenhülsenstückes durch Einschnitt am Ellenrand des Fingerbeugers. Glatte Heilung. | Geheilt. |
| 637 | Ludwigsburg, R., Gefreiter. | Revolverschufsverletzung an der linken Hinterbacke. — 26. Dezember 1902. — Schmerzen beim Reiten durch das eingeheilte Geschofs. | 23. Januar 1903. Entfernung des Geschosses. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|--|--|---|------------------------|
| 638 | Danzig, S., Hilfstrompeter. | Muskelbruch am linken Oberschenkel. — Beim Reiten am 7. Januar 1903 entstanden. — Wunsch des Kranken. | 13. Januar 1903. Abtragung fast der ganzen, gänseeigroßen Muskelgeschwulst, um die Vernähung der Faszie zu ermöglichen. Hautnaht. Glatter Verlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 639 | Spandau, B., Oberleutnant. | Einwärtsstellung der linken großen Zehe und Knochenauswuchs an ihrer Basis nach 2 Jahre vorher erfolgter Hinwegnahme der durch Schrotschuß zerschmetterten 2. bis 4. Zehe. | 6. Januar 1903. Ausschälung der Narbe. Abmeißelung des haselnußgroßen Knochenvorsprunges. Geradestellung der Zehe durch Verband. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 640 | Berlin, D., Kanonier. | Splitterbruch der rechten Kniescheibe. — Hufschlag. — 25. April 1903. — Unmöglichkeit, die Bruchstücke zusammen zu bringen. | 4. Mai 1903. Schnitt in der Mittellinie, Anräumung des Blutergusses. Naht der Kniescheibe durch Draht. Heilung der gut aneinanderliegenden Bruchstücke durch erste Verklebung. Während der Nachbehandlung rissen die Bruchstücke durch einen Fall wieder auseinander. Nochmalige Naht am 15. Juli 1903. Glatte Heilung. Streckung vollständig, Beugung bis 75°. | Geheilt. Invalide. |
| 641 | Auch bei 1 Kanonier in Schwerin brach die durch Naht mit Silberdraht völlig geheilte Kniescheibe (beim Stiefelanziehen) zum zweiten Male. Heilung. Bewegungshinderung. | | | Geheilt. Invalide. |
| 642 | Dresden, T., Jäger. | Kniescheibenbruch rechts. — Anschlagen beim Sprung über den Kasten. — 13. Mai 1903. — Auseinanderweichen der Bruchenden. | 16. Mai 1903. Unterer Bogenschnitt. Anräumung des Blutergusses, Knochennaht mit Silberdraht. Schienenverband. Heilung durch erste Verklebung. Massage vom 5. Tage, Bewegung vom 30. Tage ab. Beugung im rechten Knie gleich der im linken. | Geheilt. Invalide. |
| 643 und 644 | Ein aus gleicher Veranlassung bei 1 Musketier in Arolsen entstandener Kniescheibenbruch wurde im Garnisonlazarett Cassel ebenfalls mit Silberdraht, 1 bei 1 Grenadier in Danzig durch Fall auf der Treppe verursachter mit Zelluloidzwirn genäht. Beide Male trat knöcherne Vereinigung ein. | | | 2 geheilt. 2 invalide. |
| 645 | Mainz, E., Husar. | Offener Bruch beider Unterarmknochen. — Hufschlag. — 1. Juni 1902. — Unmöglichkeit die Knochenenden zusammen zu bringen. | 17. Juni 1902. Längsschnitt über der Bruchstelle. Naht der Bruchenden der Elle mit Silberdraht. Einrenkung der Speichenenden. Gipsverband. Teilweise Lähmung der Hand wurde durch eine Badekur in Wiesbaden beseitigt. Knöcherne Vereinigung. | Geheilt. Invalide. |
| 646 | Darmstadt, M., Kanonier. | Offener Bruch des rechten Unterschenkels. — Überfahren. — 27. August 1902. — Starke Verschiebung der Bruchenden. | 28. August 1902. In Narkose Einrichtung des stark verschobenen oberen Bruchendes. Naht mit Silberdraht. Verkleinerung der Hautwunde durch Seidennähte. Gefensterter Gipsverband. Heilung in guter Stellung ohne Störung. | Geheilt. Invalide. |
| 647 | Weißenfels, F., Kanonier. | Offener Bruch beider Knochen des rechten Unterschenkels. — Sturz vom Geschütz. — 8. September 1903. — Starke Neigung der Bruchstücke zur Verschiebung. | 8. September 1903. Naht des Schienbeins mit 2 Silberdrahtnähten. 11. September 1903 wegen Bruches der Drähte und Verschiebung der Bruchenden Wiederholung der Operation. Heilung mit geringer Verschiebung. | Geheilt. Invalide. |
| 648 | Halle a. S., K., Unteroffizier. | Offener Bruch des linken Unterschenkels. — Fall von einer Treppe. — 28. Januar 1903. — Schlechte Stellung der Knochenenden. | 28. Februar 1903. Schnitt über der Bruchstelle. Durchmeißelung des Schienbeins. Beseitigung vorspringender Knochensplitter. Knochennaht mit Silberdraht. Jodoformgazestreifen. Lagerung auf Volkmannscher Schiene. Verlauf fieberlos. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 649 | Dresden, R., Kanonier. | Bruch der linken Speiche. — Hufschlag. — 17. April 1903. — Ausbleibende knöcherne Vereinigung. | 19. Mai 1903. Entfernung der Callusmassen, Naht mit Silberdraht. Schienenverband. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Invalide. |
| 650 | Mainz, H., Musketier. | Bruch des rechten Schenkelhalses. — Fall auf die rechte Seite. — 16. November 1901. — Ausbleiben der knöchernen Vereinigung. | 15. Februar 1902. Längsschnitt über der Bruchstelle. Eintreiben von 2 vernickelten Stahlnägeln durch die Bruchenden. Der Verlauf wurde durch Abszessbildung am Oberschenkel und Becken gestört. Knöcherne Vereinigung. Verkürzung des Beins um 8 cm. Trägt Stiefel mit hoher Sohle. | Geheilt. Invalide. |
| 651 | Dresden, K., Invalide. | Nicht verheilte Speichenbruch mit Muskelbruch durch Hufschlag im Jahre 1897. Verdacht auf bösartige Geschwulst. | 12. Mai 1903. Blutige Einrichtung ohne Knochennaht. Gipsverband. Verknöcherung bleibt aus. 10. Juni 1903. Anfrischen der Knochenenden. Zwischenschalten eines Knochenstücks. Silberdrahtnaht. Gipsverband. Schaltstück heilt nicht ein. 29. Juli 1903. Entfernung des Schaltstücks, Bildung eines Knochenhaut-Knochenlappens, Übernähen der Bruchstelle mit demselben. Gipsverband. Massage. Keine Verknöcherung. | Ungeheilt. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|---|--|--|---------------------------------------|
| 652 | Dresden, Ö., Grenadier. | Unterschenkelbruch rechts durch Gegenfallen eines Kohlenkastens beim Fall auf der Treppe. — 24. Dezember 1902. — Ungenügende Verknöcherung wegen starker Übereinanderschlebung der Knochenenden. | 7. Februar 1903. Freilegung der Bruchstelle durch Ablösung eines Lappens auf der Innenseite des Unterschenkels mit der Basis an der Schienbeinkante. Teilweise Abtragung des Callus. Auseinanderziehen der Bruchenden durch eine Lorenzsche schraubenähnliche Vorrichtung. Knochennaht mit Silberdraht. Gipsverband. Heilung durch erste Verklebung. Leichte Rückwärtsbiegung an der Bruchstelle. Gang etwas hinkend, wegen Behinderung im Fußgelenk. Baderkur im Teplitz. | Geheilt. Invalide. |
| 653 | Wiesbaden, B., Unteroffizier. | Bruch beider Knochen des rechten Unterarms. — Hufschlag. — 15. Oktober 1902. Winkelige Verheilung. | 4. Februar 1903. Durchmeißelung der Bruchstellen an Elle und Speiche. Naht der Speiche, Einrichtung der Elle. Wegen Verschiebung der Bruchenden der Elle nachträgliche Naht auch dieses Knochens. Schienenverbände. Guter Heilungsverlauf und gute Stellung. Vor- und Rückwärtsdrehung des Vorderarms ziemlich frei. | Geheilt. Invalide. |
| 654 | Freiburg i. Baden, W., Zögling der Unteroffizier-Vorschule. | In ungünstiger Stellung geheilter Bruch des linken Vorderarms. — Sturz beim Sprung über den Kasten. — 22. März 1903. — Beeinträchtigung der Drehfähigkeit. | 25. Mai 1903. Blutige Durchtrennung beider Vorderarmknochen an der alten Bruchstelle. Schienenverband in äußerster Auswärtsdrehung des Unterarms. Verlauf ohne Störung. Drehung wesentlich erleichtert. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 655 | Wandsbek, J., Husar. | Schlecht geheilter Oberschenkelbruch. — Sturz vom Pferde. — 29. Oktober 1902. — Starke Verkürzung und Verkrümmung des Oberschenkels. | 12. Februar 1903. — Schnitt an der Außenseite über dem Callus. Durchmeißelung des letzteren und Durchbrechen des Knochens. Gipsverband. Ungestörter Verlauf. Verbesserte Stellung der Bruchenden. | Geheilt. Invalide. |
| 656 | Graudenz, B., Musketier. | Knochenmarkentzündung des linken Fersenbeins. Ursache unbekannt. — Seit 31. Oktober 1902 wegen Gelenkrheumatismus im linken Fußgelenk in Behandlung. — Vereiterung des Knochens. | 23. Januar 1903. — Bogenschnitt an der Innenseite, Spaltung einer Fistel und Entfernung eines an ihrem Ende, an der Unterfläche des Fersenbeins gelegenen, erbsengroßen, toten Knochenstücks. Jodoformgazeausstopfung. Fieberlose aber langsame Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 657 | Danzig, S., Gefreiter. | Weichteiltuberkulose am rechten Unterschenkel. Verstauchung des rechten Fußes. — Anfang Januar 1903. — Aussichtslosigkeit anderer Behandlung. | 16. März 1903. Ausgiebiger Schnitt an der Innenseite der rechten Achillessehne. Entfernung der tuberkulösen Massen zwischen den Beugesehnen. Heilung ohne Rückfall. | Geheilt. Invalide. |
| 658 | Brandenburg a. H., S., Kanonier. | Fremdkörper im rechten Ellenbogengelenk nach chronischer Gelenkentzündung. — 24. November 1902. — Bewegungsstörungen. | 25. November 1902. Eröffnung des Gelenks. Entfernung der Gelenkmaus. Schluß der Wunde durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 659 und 660 | | Mit demselben Erfolge wurden in Straßburg i. E. 3 bohnengroße, in Stettin eine mit Knorpel überzogene, haselnußgroße Gelenkmaus aus dem rechten Ellenbogengelenk entfernt. In beiden Fällen war keine Entstehungsursache bekannt. In Straßburg i. E. waren die auch bei dem anderen Falle vorhandenen Beschwerden (bei Drehbewegungen) durch das Gewehrstrecken verschlimmert. | | 2 geheilt. 2 dienstfähig. |
| 661 | Kulm, J., Jäger. | Gelenkmaus im rechten Kniegelenk. Umknicken beim Bajonettieren. — 30. Juli 1902. — Schmerzen im Gelenk. | 30. Oktober 1902. Eröffnung des Kniegelenks. Herauslösung einer kleinen Knorpelgeschwulst, welche vom inneren Zwischenknorpel stammte und mit der Kapsel verwachsen war. Schluß der Wunde durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 662 bis 667 | | Bei 6 weiteren Kranken wurden freie Knochen- bezw. Knorpelstückchen durch Einschnitt (soweit angegeben) am Außenrande der Kniescheibe entfernt. Die Entstehung der Gelenkmäuse wurde zurückgeführt: Insterburg, Sturz mit dem Pferde, 2,6 : 1 cm großes überknorpeltes Knochenstück. Schwerin, Sturz 1 Monat vorher. Leipzig, Sturz 5 Jahre vorher, 10 pfennigstückgroßes. Osnabrück, Fall 6 Jahre vorher. Prenzlau, Fall von der Treppe, Knorpelstückchen vom äußeren Gelenkknorren. Münster, Umknicken beim Exerzieren, 2,5 : 2 cm. — In letzterem Falle machte ein trotz mehrerer Punktionen wiederkehrender Gelenkerguß, in Osnabrück Schmerzen, in Prenzlau Schwäche des Gelenks die Invalidisierung trotz glatter Heilung nötig. Die 3 übrigen wurden dienstfähig. Bei der Operation waren Gelenkergüsse in Prenzlau, Schwerin und Leipzig gefunden. | | 6 geheilt. 3 dienstfähig. 3 invalide. |
| 668 | Wiesbaden, H. II., Füsilier. | Schleimbeutelentzündung am rechten Ellenbogengelenk. — Älteres Leiden. Verschlimmerung Ende März 1903. — Erfolglosigkeit anderer Behandlung. | 1. April 1903. 5 cm langer Hautschnitt über die Höhe der Geschwulst am Außenrande des Hakenfortsatzes der Elle. Auslösung des stark verdickten, mit dem Gelenk zusammenhängenden Schleimbeutels nach Beiseiteziehen des Ellenervs. Lähmungserscheinungen. Bei der Entlassung war das Ellenbogengelenk frei beweglich, die rohe Kraft im Arm und in der Hand jedoch herabgesetzt. | Geheilt. Dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|--|--|--|---------------------------|
| 669 | Cassel, S., Kanonier. | Chronische Schleimbeutelentzündung vor der linken Kniescheibe. Ursache und Erkrankungstag unbekannt. — Schmerzen im Knie. | 22. Juli 1903. Ausschälung des Schleimbeutels. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 670 und 671 | In Perleberg und Giefßen wurden 2 ähnlich erkrankte Schleimbeutel am rechten Knie mit demselben Erfolge ausgeschält. | | | 2 geheilt. 2 dienstfähig. |
| 672 | Mülhausen i. E., G., Musketier. | Chronische Schleimbeutelentzündung bei Schiefstellung der rechten großen Zehe. Angeblich durch Stiefeldruck entstanden. — 3. März 1903. — Beschwerden beim Gehen. | 7. März 1903. Entfernung des Schleimbeutels; Abmeißelung eines Knochenauswuchses am Köpfchen des 1. Mittelfußknochens; Gradstellung der großen Zehe. Glatte Heilung. Gute Gebrauchsfähigkeit der großen Zehe. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 673 | Colmar i. E., E., Musketier. | Sehnenscheidenhygrom an der Kuppe des rechten Ringfingers. — Seit einem Jahre allmählich entstanden. — Hinderung im Gebrauch der Waffen. | 1. August 1903. Auslösung der haselnußgroßen mit der Beugesehne verwachsenen Geschwulst. Naht. Ungestörte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 674 | Giefßen, B., Musketier. | Überbein am linken Handrücken. Sehnenzerrung beim Turnen. — 30. April 1903. — Schmerzen und Gebrauchsstörung. | 8. Mai 1903. Ausschälung der Geschwulst, welche durch einen Gang mit dem Gelenk in Verbindung stand. Naht. Glatter Wundverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 675 bis 677 | 3 ähnliche Geschwülste wurden in Cassel, Giefßen und Ludwigsburg, erstere vom rechten, die beiden anderen vom linken Handrücken entfernt. Die beiden ersten waren mit den Weichteilen bzw. der Gelenkkapsel fest verwachsen, die dritte gehörte der Sehnen Scheide des 3. Fingers an. Bestimmte Angaben über die Ursache konnten nicht gemacht werden. | | | 3 geheilt. 3 dienstfähig. |
| 678 | Danzig, W., Musketier. | Überbein (Ganglion) in der rechten Kniekehle nach Anstrengung beim Exerzieren. — 20. Februar 1903. — Wunsch des Kranken. | 7. März 1903. Ausschälung der hühnereigroßen, zwischen den Köpfen der oberflächlichen Wadenmuskulatur befindlichen Geschwulst, welche in der Gegend des inneren Gelenkknorrens mit dem Gelenk in Verbindung stand. Glatte Heilung. Später wegen einer Kniegelenkverstauchung rechts invalide. | Geheilt. Invalide. |
| 679 und 680 | Zwei ähnliche Geschwülste wurden mit gleichem Erfolge bei einem Füsilier in Treptow a. R. und einem Kanonier in Danzig aus der rechten Kniekehle entfernt. Die Ursache war in diesen Fällen unbekannt. | | | 2 geheilt. 2 dienstfähig. |
| 681 | Altona, A., Ökonomie-Handwerker. | Blutadergeschwulst in der Hohlhand (Kleinfingerballen), seit dem 10. Lebensjahre bestehend. — Wachsen in den letzten Jahren. | 31. März 1903. Ausschälen der daumendicken und etwa 3 cm langen Geschwulst. Naht. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 682 | Magdeburg, M., Musketier. | Apfelgroße Pulsadergeschwulst in der linken Kniekehle seit 14. April 1903 und Brand des Fußes seit 20. März 1903. Entstehungsursache unbekannt. Keine Syphilis. Seit Januar 1903 stechende Schmerzen im linken Fuß und Stauungserscheinungen, die nach Aufnahme in das Lazarett eine Zeitlang gebessert waren. | 18. April 1903. Blutleere. Linke Kniekehle: 17 cm langer Längsschnitt. Ausschälung und Abbindung der sackförmigen Adergeschwulst, welche von der hinteren Wand der Kniekehlen Schlagader ausging. Teilweise Naht und Ausstopfung mit Jodoformgaze. — Absetzung des linken Fußes nach Pirogoff-Günther, 1—2 cm über der Abgrenzungslinie der brandigen Haut. Ausfüllung mit Jodoformgaze. Sekundärnaht, die später wegen geringen Fiebers entfernt wurde. Heftpflaster- und Gipsverbände zur Stütze der Hacke. Vom 29. Mai 1903 ab Gehversuche im Gipsverbande. Anfang Juni geheilt. Sehr guter Stumpf mit künstlichem Fuß. Gang ohne Hinken und Möglichkeit zu tanzen. | Geheilt. Invalide. |

D. Geschwulstoperationen.

| | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|-----------------------|
| 683 | Giefßen, S., Musketier. | Taubeneigroßer Knochenauswuchs an der Außenseite des linken Oberarms. Bajonettstoß. — 5. Juni 1903. — Bewegungshinderung. Wunsch des Kranken. | 14. Juli 1903. Abmeißelung des Knochenauswuchses. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 684 | Posen, S., Kanonier. | Knochenauswuchs am unteren Ende des rechten Oberschenkels. Ursache unbekannt. — 9. Mai 1903. — Beschwerden beim Gehen. | 22. Mai 1903. Abmeißelung der mit Knorpel überzogenen Knochengeschwulst vom inneren Oberschenkelknorren. Naht. Eiterung, langsame Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 685 | Stendal, B., Husar. | Haselnußgroßer Knochenauswuchs am inneren Knorren des linken Schienbeins. Bald nach der Einstellung allmählich entstanden. — 4. November 1902. — Schmerzen. | 7. Dezember 1902. Abmeißelung der Geschwulst. Heilung. Schmerzen bei Wiedergebrauch des Beins. | Geheilt. Invalide. |
| 686 | Berlin, S., Unteroffizier. | Knochenauswuchs an der Innenseite des rechten Unterschenkels nahe dem Knie. Hufschlag. — Mitte Oktober 1902. | 16. Januar 1903. 6 cm langer Schnitt an der Wade. Durchtrennung der Wadenmuskulatur. Spaltung eines prallgefüllten, dicht vor der Geschwulst liegenden Schleimbeutels. Abmeißelung der Geschwulst nach Zurückschieben eines auf ihr liegenden größeren Nerven. — Spongiöse Knochengeschwulst mit Knorpelkapsel. Teilweise Naht, Drainage, Jodoformmullausstopfung. Heilung unter Eiterung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 687 | Berlin, R., Grenadier. | Knochenauswuchs am linken Wadenbein. — Fall im Juli 1902. — Behinderte Beweglichkeit. | 5. März 1903. 15 cm langer Einschnitt von der Wade her. Abmeißeln der Geschwulst vom Wadenbein und Auslösung derselben. Teilweise Naht und Jodoformmullausstopfung. Heilung der Wunde nach anfänglicher Fistelbildung. | Geheilt. Invalide. |
| 688 | Giefßen, F., Invalide. | Verknöcherung des rechten äußeren Kaumuskels. (M. Masseter). Hufschlag. — 12. Juni 1902. — Behinderung des Kauens. | 17. März 1903. 6 cm langer Schnitt. Auslösung der Knochenneubildung aus den umgebenden Geweben. Abmeißeln vom Unterkiefer und Jochbein. Jodoformmullausstopfung, teilweise Wundnaht. Heilung teils durch erste Verklebung. Methodische Übungen mit dem Mundsperrer. Bei der Entlassung konnten die Zahnreihen 1,5 cm weit voneinander bewegt werden. | Gebessert. |
| 689 | Lübeck, K., Musketier. | Exerzierknochen in den inneren Faserbündeln des linken Deltamuskels. Einschleiben des Gewehrs. — Seit 10. Februar 1903 Schmerzen, seit 15. Februar eine Geschwulst bemerkt. — Bewegungsstörung. | 20. Februar 1903. Ausschälung der Geschwulst unter Schleichscher Hautbetäubung. Die spindelförmige, 5,5 cm lange Geschwulst bestand aus Knochengewebe mit knorpeliger Umhüllung. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 690 | Mülhausen i. E., O., Musketier. | Knochengeschwulst im rechten, zweiköpfigen Oberarmmuskel. Ursache unbekannt. — 13. Februar 1903. — Zunahme der Geschwulst und der Bewegungshinderung. | 14. Februar 1903. Ausschälung der 8 cm langen, walzenförmigen Geschwulst, die aus von Knochen durchwachsenem Muskelgewebe bestand und mit dem Oberarmknochen nicht zusammenhing. Die an ihrem Ursprung mit der Geschwulst verwachsene, vom Muskel abgetrennte, lange Sehne wurde mit Catgut angenäht. Heilung ohne Bewegungsstörungen. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 691 | Bautzen, R., Gefreiter. | Verknöcherung im linken zweiköpfigen Oberarmmuskel. Verstauchung des Ellenbogengelenks. — 27. April 1903. — Fast völlige Steifheit des Gelenks. | 3. August 1903. Unter Schleichscher Anästhesie Ausschälung der taubeneigroßen Geschwulst, welche eine Furche für den mittleren Armnerv und die Gefäße und einen langen Fortsatz nach dem Gelenk hin zeigte, aus dem zweiköpfigen Oberarmmuskel. Fieberlose Heilung. Der mittlere Armnerv eine Zeitlang gelähmt. Verbesserung der Bewegung im Ellenbogengelenk dauerte nur kurze Zeit an. Die Geschwulst enthielt eine mit Endothel ausgekleidete Höhle. | Geheilt. Invalide. |
| 692 | Minden, J., Musketier. | Knochenneubildung im äußeren Kopf des dreiköpfigen Oberarmmuskels. Bajonettstoß. — Mitte Juli 1903. — Wunsch des Kranken. | 3. August 1903. Schnitt vom Ansatz des Deltamuskels abwärts. Stumpfe Auslösung einer Knorpelgeschwulst mit mehreren Knochenkernen von der Größe einer kleinen Pflaume. Naht. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 693 | Darmstadt, B., Vizewachtmeister. | Verknöcherung des rechten inneren Armmuskels. Hufschlag. — 13. März 1903. Lazarettaufnahme 27. Juli 1903. — Starke Bewegungshinderung. | 28. Juli 1903. Längsschnitt über die Geschwulst. Abmeißelung einer Knochenleiste, welche die Geschwulst mit dem Oberarmbein verband, wodurch die Beweglichkeit des Ellenbogengelenks freier wurde. Herauspräparieren und Hebeln der fast den ganzen inneren Oberarmmuskel einnehmenden Geschwulst, welche die Sehne des zweiköpfigen Oberarmmuskels, den mittleren Armnerv und die Gefäße umgriff. Ausstopfung der Wundhöhle mit Jodoformmull. Heilung. Passive Bewegungen schon vor Schluß der Wunde vom 31. August ab. Anfangs gute Beweglichkeit erzielt. Später Rückfall. | Rückfall. Invalide. |
| 694 bis 696 | | Außerdem wurde bei 1 Ulan in Gleiwitz eine nach Sturz mit dem Pferde entstandene spongiöse Knochengeschwulst, welche eine erbsengroße, mit gelbem Schleim gefüllte Zyste enthielt, durch Loshebelung mit dem Periost entfernt, und in Metz eine ähnliche, mit dem Knochen verwachsene Geschwulst ausgelöst. Beide Leute wurden dienstfähig. Dagegen wurde 1 Mann in Magdeburg, bei welchem eine pflaumengroße, nach Verstauchung im inneren Oberarmmuskel und in der Gelenkkapsel entstandene Geschwulst ausgelöst war, nach anfänglicher Besserung der Bewegungsfähigkeit durch allmählich zunehmende vollkommene Versteifung des Gelenks invalide. | | 3 geheilt. 2 dienstfähig. 1 invalide. |
| 697 | Stettin, F., Kürassier. | Knochengeschwulst im rechten inneren Oberarmmuskel. Hufschlag. — 27. November 1902. — Starke Bewegungshinderung. | 24. Januar 1903. 12 cm langer Einschnitt auf die Geschwulst. Abmeißelung der Geschwulst vom Schaft des Oberarmbeins. Auslösung aus dem Muskel und aus den Weichteilen. Ein starker Fortsatz der Geschwulst ging hart neben den Gefäßen bis in die Ellenbeuge. Hautnaht. Heilung durch erste Verklebung. Bewegungshinderung blieb zum großen Teil bestehen. Geringe Verdickung am Knochen. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|--|---|---|---------------------------|
| 698 | Minden, D., Unteroffizier. | Knochenneubildung im inneren Oberarmmuskel. Fall auf den linken Ellenbogen. — 2. September 1903. — Wunsch des Kranken. | 26. September 1903. 7 cm langer Schnitt in der linken Ellenbeuge. Stumpfe Anslösung des pflaumengroßen Körpers aus dem Muskelfleisch. Die Geschwulst bestand aus Knochen und Bindegewebe und schloß einen kleinen, glattwandigen Hohlraum ein. Naht, Jodoformdocht. Glatte Heilung. Anfängliche Steifigkeit durch Übungen beseitigt. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 699 | Bromberg, L., Musketier. | Knochengeschwulst an der Innenseite des linken Oberarms, Bajonettstofs. — 10. Juli 1903. — Schmerzhaftigkeit, Bewegungshinderung. | 21. Juli 1903. Schnitt in der Furche zwischen zweiköpfigem und innerem Oberarmmuskel. Stumpfe Abhebelung der Geschwulst. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 700 | St. Averd, F., Kanonier. | Knochenneubildung im zweiköpfigen Muskel des rechten Oberschenkels. — 8. Oktober 1902 beim Pferdeputzen bemerkt. — Ursache nicht bekannt. Lazarettaufnahme 16. Oktober 1902. Bewegungshinderung und Druckempfindlichkeit. | 27. Oktober 1902. Unter Schleischer Hautbetäubung Einschnitt über die Geschwulst, welche nach Durchtrennung der Beinbinde stumpf aus dem Muskelfleisch des zweiköpfigen Oberschenkelmuskels ausgelöst wurde. (Knochen mit knorpliger Umbüllung 4 : 3 : 2 cm.) Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 701 | In ähnlicher Weise wurde bei 1 Musketier in Stettin eine rundliche, nach Fall auf das Gesäß entstandene Knochengeschwulst aus der Gesäßsmuskulatur ausgeschnitten. | | | 1 geheilt. 1 dienstfähig. |
| 702 | Brandenburg a. H., M., Kürassier. | Knochenneubildung in der rechten Oberschenkelstreckmuskulatur. Hufschlag. — 27. Juli 1903. — Behinderung der Beweglichkeit des Beins. nach einigen Tagen wegen Entzündung entfernt werden mußten. Später Hautüberpflanzung auf die große Granulationsfläche. Mediko-mechanische Übungen. Beweglichkeit gegen früher gebessert. | 2. September 1903. Großer Einschnitt über die Geschwulst. In zerfallenem, blutigem Gewebe 3 flache, nach außen konvexe Knochen-schalen und auf dem Knochen Knochenwucherungen. Verknöcherungen in der oberen Ausstülpung des Kniegelenks. Entfernung aller Knochenneubildungen. Tiefe und oberflächliche Nähte, die | Geheilt. Invalide. |
| 703 | Danzig, H., Husar. | Knochenneubildung und Schwielen im rechten Oberschenkel. Hufschlag. — Anfang März 1903. — Schmerzen. Fast völlige Steifheit des rechten Kniegelenks. | 2. April 1903. Schnitt über die etwa faustgroße, außen und vorn am unteren Teil des Oberschenkels gelegene Geschwulst. Die schwieligen, zum Teil verknöcherten Massen in den Muskeln sowie die Knochenauflagerungen auf dem Oberschenkelknochen werden entfernt. Glatter Heilungsverlauf. Beugung im Knie bis zum rechten Winkel. | Geheilt. Invalide. |
| 704 | Wiesbaden, V., Füsilier. | Narbengeschwulst nach einer alten Schnittverletzung an der Beugeseite des linken Handgelenks. — Aufnahme: 26. Februar 1903. — Schnelles Wachsen der Geschwulst. | 27. Februar 1903. Entfernung der Geschwulst, die innig mit der Sehne des langen Hohlhandmuskels verwachsen ist, von dem ein mit der Geschwulst zusammenhängendes Sehnenstück entfernt werden mußte. Sehnennaht. Verband in Beugstellung. Wundverlauf glatt. Die Gefühls lähmung an den drei ersten Fingern blieb noch einige Zeit bestehen. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 705 | Ludwigslust, A., Dragoner. | Enteneigroße Fettgeschwulst auf der linken Schulter. — 1. August 1903. — Beschwerden durch Scheuern der Kleidung. | 1. August 1903. Ausschälung der Geschwulst. Drainage. Naht. Fieberlose Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 706 | Mülhausen i. E., K., Leutnant. | Zahllose Fettgeschwülste am ganzen Körper (Lipomatose). — 6. Januar 1903. — Beschwerden durch Druck der Kleider und beim Liegen. | 7., 13. und 19. Januar 1903. Entfernung von 24 Fettgeschwülsten bis zur Größe eines Fünfmarkstückes. Glatte Heilung unter Kollodiumverbänden. Im ganzen sind bisher 60 Lipome entfernt worden. (Vergl. Sanitätsbericht 1900/01, S. 117/118.) | Geheilt. Dienstfähig. |
| 707 | Marienerwerder, W., Unteroffizier. | Taubeneigroßes Fibrolipom am rechten Kieferwinkel. — Im Laufe von 2 Jahren allmählich entstanden. — Hinderte das Anlegen der Schuppenkette. | 12. März 1903. Ausschälen der Geschwulst. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 708 | Lübeck, B., Musketier. | Fasergeschwulst (Fibrom) auf der linken Schulter. — 31. Oktober 1902. — Entzündung der Haut durch scheuernde Hosenträger. | 1. November 1902. Ausschälung der mit der Haut und der Fascie des Trapezmuskels verwachsenen Geschwulst. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 709 | Düsseldorf, S., Sanitätsgefreiter. | Bindegewebsgeschwulst am rechten Nebenhoden, angeblich entstanden durch schweres Heben. — Tag der Erkrankung unbekannt. — Schmerzen beim Gehen. | 15. September 1903. Ausschälen der Geschwulst, Abtragen der Kapsel. Naht. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|-------------------------------------|--|---|--|
| 710 | Altona, C., Musketier. | Quergestreifte Muskelgeschwulst (Rhabdomyom) am linken Zungenrande, angeblich nach Zungenbiß entstanden. — Zugang 29. Oktober 1902. — Wachsen der Geschwulst. | 21. November 1902. Entfernung der reichlich erbsengroßen Geschwulst durch Keilschnitt. Vier Nähte. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 711 | Straßburg i. E., M., Soldat. | Gutartige Geschwulst in der linken Oberschlüsselbeingrube (brachio-gene Zyste mit atheromatösem Inhalt). — Seit $\frac{3}{4}$ Jahren allmählich gewachsen. — Wachsen der Geschwulst und Schmerzen. | 19. August 1903. Ausschälen der vereiterten, faustgroßen Geschwulst, die, mit den Blutadern fest verwachsen, sich hinter dem Schlüsselbein noch 5—6 cm nach abwärts fortsetzte. Langsame Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 712 | Brandenburg a. H., W., Kanonier. | Walnußgroße Zystengeschwulst an der rechten Halsseite. — Allmählich vor der Einstellung entstanden. — Kragendruck. | 8. November 1902. Ausschneiden der Geschwulst. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 713 | Metz, K., Musketier. | Adenom an der rechten Brustseite. Ursache unbekannt. — 29. Mai 1903. — Schnelles Wachsen der Geschwulst. | 5. Juni 1903. Ausschälen der apfelgroßen Geschwulst, die nachher krebsartigen Charakter zeigte. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 714 | Berlin, Z., Unteroffizier. | Bösartige Geschwulst (Endotheliom) des linken Oberkiefers. Ursache und Tag der Erkrankung unbekannt. — Schnelles Wachsen der Geschwulst. | 6. Juni 1903. Luftröhrenschnitt, Tamponkanüle. Auslösung des linken Oberkiefers nach Dieffenbach mit Entfernung der unteren Augenhöhlenplatte. Feste Tamponade. Naht. Hautwunde durch erste Verklebung geheilt. 40 Tage später Anbringung einer Prothese. Das linke Auge stand gut, kein Doppelsehen, Sprache deutlich. | Geheilt. Invalide. |
| 715 | Straßburg i. E., F., Musketier. | Rückfall eines $1\frac{1}{2}$ Jahr vorher (vor der Einstellung zum Militärdienst) operierten Sarkoms am linken Oberkiefer. — Schnelles Wachsen der bösartigen Geschwulst. | 14. März 1903. Entfernung der Geschwulst nach Ausmeißelung eines keilförmigen Stückes vom linken Oberkiefer. Ausschälung der geschwollenen Unterkieferdrüsen. Verlauf ungestört. | Geheilt. Dienst-unbrauchbar. |
| 716 | Münster, H., Unteroffizier. | Bösartige Geschwulst in der linken Achselhöhle (Lymphom). Nach Bronchialkatarrh und doppelseitiger Brustfellentzündung. — Im Februar 1903 entstanden. — Wachsen der Geschwulst, Schmerzen. | 4. März 1903. Ausschälung der Geschwulst. Naht. Drainage. Heilungsverlauf ohne Störung. In Anbetracht des nach der Operation festgestellten bösartigen Charakters der Geschwulst, wurde von der Beseitigung einer gleichen Geschwulst in der rechten Achselhöhle Abstand genommen. | Ungeheilt. Invalide. |
| 717 | Trier, K., Musketier. | Bösartige Geschwulst im Mittelfellraum. Ursache unbekannt, angeblich Erkältung. — Anfang November 1902. — Schnelles Wachsen, Stauungserscheinungen, Atemnot, Schluckbeschwerden. | 1. Dezember 1902. Ausschneiden des Knorpels der 2. und 3. Rippe nach Bildung eines Hautmuskellappens. Abbruch der Operation wegen Aussichtslosigkeit die Geschwulst zu entfernen. Weiterwachsen der Geschwulst und der Stauungserscheinungen. Herzschwäche. | Gestorben am 22. Dezember 1902. |
| 718 | Berlin, F., Oberfeuerwerker. | Mischgeschwulst an der linken Halsseite und am linken Hoden. Angeblich $1\frac{1}{2}$ Jahr vorher Stofs mit dem Säbel gegen den Hoden. — Tag der Erkrankung unbekannt. — Bösartiger Charakter der Geschwulste. | 5. September 1903. Ausschälung der Geschwulst am Halse. 11. September 1903. Entfernung des stark geschwundenen linken Hodens und einer großen, prall-elastischen Geschwulst. Glatte Wundverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 719 | Frankfurt a. O., R., Pionier. | Fibrosarkom am Rücken. Angeblich durch Tornistertragen verursacht. — Ende Juni 1903. — Schnelles Wachsen der Geschwulst. | 17. Juli 1903. Auslösung der von der 4. zur 9. Rippe reichenden, brotlaibförmigen Geschwulst, Mitentfernung angrenzender Sehnen- und Muskelteile im Gesunden. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Invalide. |
| 720 | Ludwigsburg, R., Musketier. | Fibrosarkom in der Bauchhöhle, wahrscheinlich vom Schambogen ausgehend. — 17. März 1903 zuerst bemerkt. — Bösartiger Charakter der Geschwulst. | 14. Mai 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie. Geschwulst nicht entfernbar, da sie mit den Bauchdecken, dem Schambein, Dünndarm und der Blase verwachsen war. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Ungeheilt. Invalide. |
| 721 | Mainz, W., Unteroffizier. | Sarkom des Magens. Ursache unbekannt. — Kräfteverfall. Wunsch der Angehörigen. | 8. November 1902. Bauchschnitt in der Magengegend. Die freigelegte Geschwulst erwies sich als nicht operierbar. Heilung der Operationswunde. Starker Kräfteverfall. | Gestorben am 10. No- vember 1902. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|--------------------------------------|--|---|---|
| 722 | Neifse, K., Sergeant. | Melanosarkom am linken Oberschenkel. Ausgehend von einem Muttermal, angeblich durch Scheuern mit dem Seitengewehr beim Marschieren. — Tag der Erkrankung unbekannt. — Schnelles Wachsen der Geschwulst, Anschwellen der Leistendrüsen, Gefahr der Allgemeinerkrankung. | 10. Oktober 1902. Umschneiden der geschwülig zerfallenen Geschwulst 4 cm von ihrem Rande. Auslösen derselben von der noch nicht durchwachsenen Faszie. Hauttransplantation nach Thiersch. Kompressen. Glatte Heilung der Hautwunde. Im weiteren Verlauf stärkeres Anschwellen der Leistendrüsen, Auftreibung des Leibes mit Erguß. Unter Atembeschwerden, Leberschwellung, dauerndem Brechreiz, Herzschwäche und Lungenödem erlag der Kranke. | Gestorben am 27. Oktober 1902. Leichenöffnung nicht gestattet. |
| 723 | Karlsruhe, B., Invalide. | Sarkom am rechten Schienbein. Hufschlag. — Dezember 1900. — Schnelle Zunahme der Geschwulst. | 21. Februar 1903. Ausräumung der miterkrankten Leistendrüsen. Absetzung des Oberschenkels oberhalb der Mitte mit zweizeitigem Zirkelschnitt. Naht. Drainage. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. |
| 724 | Riesa, K., Sergeant. | Magenkrebs am Pförtner. Ursache unbekannt. — 18. Mai 1903. — Ungenügender Ernährungszustand. | 19. Juni 1903. Bauchschnitt in der Mittellinie. Pförtner verdickt, mehrere Drüsen stark geschwollen. Gastroenterostomie. (Verbindung zwischen Magen und Darm.) Nach der Operation Eingießung von 1000 g physiologischer Kochsalzlösung, 3 Tage lang Ernährung vom After aus. Fieberlose Heilung. Besserung des Allgemeinbefindens, sodafs K. zeitweilig aufser Bett sein konnte. Von Mitte August ab zunehmende Schwäche. | Gestorben am 31. August 1903. Leichenbefund: Krebsgeschwülste am Pförtner, in der Leber und den mediastinalen Drüsen. |
| 725 | Hannover, H., Gefreiter. | Darmkrebs. Ursache unbekannt. — 16. September 1902 bemerkt. — Darmverschluss. | 9. Oktober 1902. Eröffnung der Bauchhöhle. Entfernung von 5 1/2 l Flüssigkeit. Anlegung eines künstlichen Afters. Tamponade. Fortschreitender Kräfteverfall. | Gestorben am 12. Oktober 1902. |
| 726 | Frankfurt a. O., R., Sergeant. | Hochsitzender ringförmiger Mastdarmkrebs. Zuerst bemerkt durch Verdauungsstörungen nach Erkältung im Manöver 1902. — Stuhlbeschwerden. Abnahme des Körpergewichts. | 1. Dezember 1902. Ausschneidung eines 20 cm langen Mastdarstückes nach Abtragung des Steifsbeins. Erhaltung des Afterschließmuskels. Naht, Drainage und Tamponade. Ungestörte Heilung der Operationswunde bis auf eine kleine Granulationsfläche; bedeutende Besserung des Allgemeinbefindens. | Als gebessert am 25. Januar 1903 in die Garnison |
| | | Schwedt a. O. übergeführt. Erneute Beschwerden von Mitte März 1903 ab, ohne dafs ein Wiederauftreten der Geschwulst bis Mitte Juli nachweisbar war. Gestorben am 18. August 1903 an Rezidiv. | | |
| 727 | Königsberg i. Pr., S., Fußgendarman. | Mastdarmkrebs. Ursache unbekannt. — Erscheinungen von Darmverschluss. | 15. September 1902. Bauchschnitt. Wegen Verwachsung der Geschwulst mit der hinteren Blasenwand und dem Kreuzbein Anlegung eines künstlichen Afters. Anfänglich Besserung. 4. Oktober 1902. Durchbruch der Geschwulst nach der Blase. Rasch fortschreitender Kräfteverfall. | Gestorben am 11. Januar 1903. |
| 728 | Berlin, St., Grenadier. | Kankroid an der Vorderseite des linken Oberschenkels, mit mehreren Hautknötchen in der Umgebung. Vergrößerte Leistendrüsen. 1/4 Jahr vorher bemerkt. Gefahr der Weiterausbreitung. | 11. November 1902. Abtragung bzw. Ausschälung der erkrankten Hautteile mit dem Fettgewebe und den vergrößerten Leistendrüsen. Naht. Heilung durch erste Verklebung. | Geheilt. Dienstunbrauchbar. |
| 729 | Altona, St., (ehemaliger Grenadier). | Strahlenpilzerkrankung mehrerer Schädelknochen. Ursache und Tag der Erkrankung unbekannt. — Schnelles Wachsen der Geschwulst. | 11. Juni 1903. Unterbindung der äußeren Halsschlagader. Entfernung der Ohrspeicheldrüse, Abmeißelung des rechten Jochbogens, Absägen und Auslösen des rechten aufsteigenden Unterkieferastes. Abmeißelung erkrankter Knochenteile vom rechten Scheitelbein. Prothese für den entfernten Unterkieferast. Guter Heilungsverlauf, geringgradige Lähmung des rechten Gesichtsnerven. Nach größtenteils beendeter Heilung Tod an eiteriger Entzündung der Rückenmarkshäute (Trauben- und Kettenkokken). | Gestorben am 21. November 1903. |
| 730 | Düsseldorf, G., Kanonier. | Hühnersigroße Strahlenpilzgeschwulst am linken Oberarm nach Pferdebiß. — 26. März 1902. — Dauernde Verschlechterung des Allgemeinbefindens. | 28. Mai 1902. Eröffnung einer zystenartigen Geschwulst am Oberarm und Entleerung einer leimartigen, gelblich-grünen Flüssigkeit. Nach Heilung der Wunde Schwund der Oberarm- und Schultermuskeln, Versteifung des Schultergelenks, Anschwellungen an der Schulterhöhe in der Achselhöhle und am Rande des breiten Rückenmuskels. 18. November 1902. Schnitt über die Schulterhöhe. Eröffnung einer großen Abszefshöhle mit vielen Buchten. Im Eiter Strahlenpilzdrüsen. Tamponade mit Jodoformgaze. Vielfache Fistelspaltungen und Nachoperationen. Im Eiter später nur Staphylokokken gefunden. | Ungeheilt. Fistelbildung. Invalide. |
| 731 | Mülhausen i. E., P., Hoboist. | Kropf bei Basedowscher Krankheit, angeblich infolge von anstrengendem Blasen entstanden. — 20. August 1903. — Atembeschwerden. | 21. August 1903. Kragenschnitt. Rechter Lappen reicht vom Schlüsselbein bis zum Zungenbein, linker vom Zungenbein bis unter das Schlüsselbein und umgreift Kehlkopf und Luftröhre. Nach Unterbindung beider oberer Schildknorpelschlagadern ein 10:6:3 cm großer Lappen entfernt, beiderseits etwa 1/3 zurückgelassen. Wundfläche mit Katgut übernäht. Zu beiden Seiten je 1 Drainrohr. Schluß der Wunde. Am 2. Tage Entfernung der Drainröhren. | Geheilt. Invalide. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|-------------|---------------------------------|--|---|--------------------------|
| 732 | Mülhausen i. E., R., Musketier. | Kropf. Ursache unbekannt. — 20. April 1903. — Atembeschwerden. | 27. April 1903. Kragenschnitt. Rechter, stark vergrößerter Lappen, der den Kehlkopf und die Luftröhre umfasste, größtenteils entfernt. Naht. Glatte Heilung. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 733 bis 738 | | Die Kropfoperation wurde bei 6 weiteren Kropfleidenden in Mülhausen i. E. (3), Strafsburg i. E. (2) und Karlsruhe mit demselben Erfolge ausgeführt. 3mal handelte es sich dabei hauptsächlich um Entfernung von Zysten: Karlsruhe apfelgroß, Mülhausen i. E. 1mal hühnereigroß, 1mal 2 Zysten von 6 und 3 cm Durchmesser, 1mal 4 kirsch- und 1 apfelgroße Zyste. | | 6 geheilt. 6 dienstfähig |
| 739 | Breslau, R., Musketier. | Kropf. Ursache unbekannt. — 7. Juni 1903. — Wunsch des Kranken. | 11. August 1903. Schnitt am Kopfnicker, Ausschälung des vergrößerten, rechten Schilddrüsenlappens. Drain. Guter Wundverlauf. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 740 | Rastatt, R., Musketier. | Kropf. Seit einigen Jahren entstanden. — 7. April 1903. — Rasches Wachstum und beginnende Atembeschwerden. | 27. Mai 1903. Kragenschnitt. Vordere Halsseite. Ausschälung der zystischen Kropfgeschwulst. Schilddrüsenreste durch zahlreiche Katgutnähte vernäht. Seidenähte. Am 2. Tage nach der Operation heftige Lungenentzündung, langsames Erholen. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 741 | Kehl, B., Pionier. | Kropf. Ursache unbekannt. — 2. Februar 1903. — Starke Atemnot bei körperlicher Anstrengung. | 13. Februar 1903. Schleimsche Hautbetäubung. Schnitt nach Kocher. Geschwulst reicht sehr weit nach unten. Bei der Ausschälung des unteren Poles rutschte der Unterbindungsfaden der unteren Kehlkopfblutader ab, und es wurde Luft angesogen. Starke Blausucht bei kleinem Pulse, die nach sofortiger Tamponade nachlief. Nach neuer Unterbindung völlige Entfernung der Geschwulst. Keine Nachblutung. Sekundäre Naht. | Geheilt. Dienstfähig. |
| 742 | Braunschweig, B., Musketier. | Vereiterte Kropfzyste. Ursache unbekannt. — 19. Februar 1903. — Erstickungsgefahr durch Druck auf die Luftröhre. | 20. Februar 1903. Oberer Luftröhrenschnitt. Einführung einer Kanüle. Aufhören der Atemnot. Hohes Fieber. 21. Februar 1903. Ausschälung einer etwa apfelgroßen, vereiterten Zyste aus dem linken Schilddrüsenlappen. Drain. Heilung. | Geheilt. Invalide. |

Zinnröhre 3,9 ‰. 3 unter 5 Nickelschalen, die angeblich aus reinem Nickelblech hergestellt sein sollten, enthielten nur 15,66, 17,76 und 20,86 ‰ Nickel; 1 Nickelpinzette bestand zu 99,2 ‰ aus Eisen. 1 silberner Katheter war aus Neusilber angefertigt. 1 Portepeee hatte nicht den vorgeschriebenen Silbergehalt. Die schärfere Kontrolle der zu Desinfektionszwecken gelieferten rohen Karbolsäure ergab, daß von 120 im Laufe des Berichtsjahres untersuchten Proben 5 den gestellten Anforderungen nicht

genüigten, während im Jahre 1901 von 55 Proben 16 beanstandet wurden. Pressions-Brillantine, zum Reinigen von Bierleitungen empfohlen, bestand aus Natriumhydroxyd, ebenso das Putzmittel Jlovit. Kalzidium, eine Masse, die das Gefrieren von Wasser, das für Feuerlöschzwecke aufbewahrt wird, verhindern soll, war rohes Chlorkalzium. Die Untersuchung von in Deutschland hergestellten Konserven führte zu folgenden Ergebnissen:

| | E s e n t h i e l t e n | | | | | Stickstofffreie Substanz |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-------|-------|----------|-----------------------------|
| | Wasser | Eiweiß | Fett | Asche | Rohfaser | |
| | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| Rinderpökelfleisch: | 65,80 | 24,60 | 6,23 | 2,28 | — | 1,09 |
| Hammelfleisch mit Weißkohl: | 80,10 | 7,36 | 5,91 | 1,23 | 3,67 | 1,70 |
| Rindfleisch mit Erbsen: | 66,65 | 10,86 | 3,89 | 1,45 | 1,79 | 15,36 |
| Schweinefleisch mit Dämpfkohl: | 75,22 | 5,02 | 12,54 | 1,10 | 3,53 | 2,59 |

H. Zusammenstellung der wichtigeren, in der Zeit vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903 erlassenen, hygienische Maßnahmen betreffenden Verfügungen.

Anlage 1.

Kriegsministerium.

No. 1435/1. 03 MA. Berlin W. 66, den 30. Januar 1903.
Leipzigerstr. 5.

Im Anschluß an die diesseitige Verfügung vom 21. 9. 02 No. 440/9. 02 MA. teilt das Kriegsministerium ergebenst mit, daß die Herren Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten und des Innern in Ausführung der Vorschriften unter A 1 und B 3 der vom Bundesrat beschlossenen Bestimmungen, betreffend die wechselseitige Benachrichtigung der Militär- und Polizei-

behörden über das Auftreten übertragbarer Krankheiten vom 22. 7. 1902, die Ortspolizeibehörden als diejenigen Behörden bezeichnet haben, welche die vorgeschriebenen Mitteilungen den Militärbehörden zu machen und von diesen zu erhalten haben.

Es darf ergebenst anheimgestellt werden, das Weitere dementsprechend veranlassen zu wollen.

Die zur weiteren Mitteilung erforderliche Zahl von Abdrücken ist beigelegt.

v. Gofslor.

Anlage 2.

Kriegsministerium.

Medizinal-Abteilung. Berlin W. 66, den 17. März 1903.
No. 1355/1. 03 MA. Leipzigerstr. 5.

In Berücksichtigung der hohen Bedeutung sorgfältiger und sachgemäßer Mund- und Zahnpflege für den allgemeinen Gesundheitszustand erscheint es geboten, die dahin zielenden Bestrebungen innerhalb der Armee möglichst gleichmäßig zu gestalten, und werden daher für diesen Zweig der Gesundheitspflege folgende allgemeine Grundsätze aufgestellt, ohne daß jedoch von dem bisher eingenommenen Standpunkte in dieser Frage (§ 120 der F. S. O., kriegsministerielle Verfügung vom 3. 7. 94 No. 49/7. 94 MA.) grundsätzlich abgewichen wird.

1. Die Unteroffiziere sind alljährlich vor dem Rekruteneinstellungstermin durch einen Sanitätsoffizier über Bedeutung und zweckmäßige Ausübung der Zahn- und Mundpflege zu unterweisen.

2. Die Gemeinen u. s. w. sind in gleicher Richtung kompagnie- u. s. w. weise alljährlich bald nach dem Rekruteneinstellungstermin durch einen Sanitätsunteroffizier, welcher zuvor von dem zuständigen Truppenarzt eingehende Anweisung erhalten hat, in Gegenwart der Korporalschaftsführer gründlich zu unterrichten.

3. Seitens der Truppe ist in geeigneter Weise auf die praktische Durchführung der Mund- und Zahnpflege der Mannschaften, insbesondere auch auf abendliche Ausspülung des Mundes und Reinigung der Zähne mittels Zahnbürste nach Möglichkeit hinzuwirken.

4. In den Unterweisungen ist besonders zu betonen, daß bei Erkrankungen der Mundhöhle und der Zähne, ebenso wie bei anderen Krankheiten, baldige Vorführung der Erkrankten beim Revierdienst erforderlich ist, und daß die vielfach geübte Nachsuchung der Hilfe von Kurpfuschern, von Barbieren, von nicht wissenschaftlich ausgebildeten Technikern u. s. w. häufig schwere Gefahren für die Gesundheit mit sich bringt.

5. Die Sanitätsoffiziere haben bei der Einstellung aller Mannschaften sowie in angemessenen Zwischenräumen bei den regelmäßigen Gesundheitsbesichtigungen dem Zustande der Kauwerkzeuge besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Bei der ersten Untersuchung der sich zum freiwilligen Eintritt Meldenden und der Kapitulanten ist die Beschaffenheit der Mundhöhle eingehend zu untersuchen, geeignetenfalls den Leuten zahnärztliche Behandlung noch vor dem Dienst Eintritt anzuraten.

6. Die spezialistisch zahnärztliche Behandlung, soweit sie nach dem Ermessen des zuständigen Obermilitärarztes erforderlich und nach den bestehenden Bestimmungen (§ 120 der F. S. O., kriegsministerielle Verfügung vom 3. 7. 94 No. 49/7. 94 MA.) auf Staatskosten zulässig ist, hat in erster Linie durch etwa vorhandene Sanitätsoffiziere, welche die zahnärztliche Prüfung abgelegt haben, zu erfolgen, in Ermangelung solcher durch einen vertraglich zu verpflichtenden Zahnarzt.

7. Die Sanitätsämter haben — zunächst versuchsweise — tunlichst für jede Garnison zur Ausführung der

militärärztlicherseits angeordneten spezialistisch-zahnärztlichen Behandlung einen zuverlässigen im Gebiete des Deutschen Reichs approbierten Zahnarzt vertraglich zu verpflichten und dessen Namen durch das Garnisonkommando den Truppen u. s. w. bekannt zu geben.

8. Übt ein Sanitätsoffizier die zahnärztliche Behandlung der Soldaten aus, so ist ihm hierfür ein geeignetes Zimmer im Garnisonlazarett zur Verfügung zu stellen.

Die Beschaffung der erforderlichen Verbrauchsmaterialien ist auf den Militär-Medizinalfonds zu übernehmen, diejenige von Instrumenten u. s. w. unterliegt der Genehmigung der Abteilung.

9. Die infolge der genannten Maßnahmen entstehenden Kosten sind bis auf weiteres bei Kapitel 29 Titel 13, Abschnitt c (Kosten für künstliche Glieder), zu verrechnen.

10. Den den Zahnärzten zur Behandlung überwiesenen Mannschaften ist seitens der zuständigen Obermilitärärzte dauernd — auch während der Behandlung — besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

11. Mit Genehmigung des Sanitätsamtes dürfen zahnkranke Unteroffiziere und Gemeine u. s. w. zur Ausführung

militärärztlicherseits angeordneter spezialistisch-zahnärztlicher Operationen aus Garnisonen, in denen die vertragliche Verpflichtung eines geeigneten Zahnarztes nicht zugänglich oder untunlich ist, in die nächstgelegene Garnison, in der ein vertraglich verpflichteter Zahnarzt vorhanden ist, übergeführt werden.

Die durch derartige Überführungen entstehenden Kosten sind bei Kapitel 29 Titel 12 zu verrechnen (vergl. § 130 und 252 der F. S. O.).

12. Die Vereinbarungen, welche in einzelnen Garnisonen zwischen Truppenteilen und zahnärztlichen Polikliniken einer Universität bestehen, werden durch diese Verfügung nicht berührt.

13. Zum 1. 5. 1905 ist seitens der Sanitätsämter auf Grund der gemachten Erfahrungen ein Entwurf für Vertragsabschlüsse mit Zahnärzten sowie ein Bericht hierher vorzulegen, ob die erforderliche Mund- und Zahnpflege in der Armee durch die bestehenden Bestimmungen genügend gewährleistet ist, bezw. in welcher Richtung Abänderungen erwünscht erscheinen.

v. Leuthold.

Anlage 3.

Kriegsministerium.

Medizinal-Abteilung. Berlin W. 66, den 24. Juli 1903.

No. 173/7. 03 MA. Leipzigerstr. 5.

Die gemäß Verfügung vom 30. 5. 02 J. No. 462/3. 02 MA. angestellten Versuche mit der Desinfektion von Badewannen mittels Aqua cresolica haben insofern ein günstiges Ergebnis gehabt, als durch das Verfahren eine sichere Desinfektion des Badewassers, bessere Auflösung der im Wasser vorhandenen Bröckel und Schonung der Bleiröhren herbeigeführt wird. Durch den Geruch des Mittels tritt aber leicht eine Belästigung der Kranken und Wärter ein;

auch kann die Einleitung des Mittels in die Abwässerkanäle bei ungünstigen Vorflutverhältnissen zu Bedenken Veranlassung geben. Es wird deshalb davon Abstand genommen, die Desinfektion der Badewässer durch Aqua cresolica allgemein von hier aus anzuordnen, und bleibt es dem Königlichen Sanitätsamt überlassen, hinsichtlich der Desinfektionsfrage der Badewanne für die Lazarette unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse Entscheidung zu treffen.

I. V.
Schjerning.

II. Teil.

Tabellen zu dem Bericht.

A. Truppen-Krankenrapporte.

Erste Abteilung: Bewegung im Kranken-Zu- und Abgang bei den Mannschaften (Unteroffiziere und Gemeine).

Zweite Abteilung: Dienstunbrauchbarkeit der Mannschaften und ihre Ursachen.

Dritte Abteilung: Halbinvalidität der Mannschaften und ihre Ursachen.

Vierte Abteilung: Ganzinvalidität der Mannschaften und ihre Ursachen.

Fünfte Abteilung: Die Todesfälle unter den Mannschaften und ihre Ursachen.

Sechste Abteilung: Bewegung im Kranken-Zu- und Abgang bei den Mannschaften (Unteroffiziere und Gemeine) der Spezialanstalten.

B. Garnison-Krankenrapporte.*)

*) In diesen Rapporten sind alle Mannschaften (einschließlich derjenigen der Schloßgarde-Kompagnie, Invaliden, Kadetten und Unteroffizierschüler) verrechnet, welche tatsächlich in derjenigen Garnison, über welche der Rapport ausgefertigt ist, behandelt worden sind.

A. Truppen-Krankenrapporte.

Erste Abteilung: Bewegung im Kranken-Zu- und Abgang.

1. Krankenbewegung bei den einzelnen Armeekorps.

Anmerkung: In diesen Tabellen sind sämtliche Kranken der Truppen, soweit sie in ärztlicher Behandlung gestanden haben, aufgeführt, demgemäß auch die in Behandlung gewesenen Verunglückten und Selbstmörder.

Krankenrapport des Gardekorps.

Iststärke des Armeekorps: 41 355.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 21618 | 200 | 59 | 259 | 3653 | 10809 | 1494 | 15956 | 3848 | 10858 | 1509 | 16215 | 14973 | 31 | 903 | 15907 | 230 | 78 | 308 | 151209 | 81541 | 232750 |
| Kavallerie | 5704 | 73 | 15 | 88 | 1198 | 2507 | 344 | 4049 | 1267 | 2522 | 348 | 4137 | 3862 | 10 | 176 | 4048 | 65 | 24 | 89 | 43376 | 18242 | 61618 |
| Feldartillerie | 4338 | 54 | 15 | 69 | 856 | 1869 | 279 | 3004 | 908 | 1883 | 282 | 3073 | 2869 | 9 | 125 | 3003 | 56 | 14 | 70 | 32536 | 14781 | 47317 |
| Fußartillerie | 1649 | 15 | 5 | 20 | 364 | 533 | 84 | 981 | 379 | 538 | 84 | 1001 | 935 | 2 | 40 | 977 | 20 | 4 | 24 | 11933 | 3287 | 15220 |
| Pioniere | 638 | 15 | — | 15 | 197 | 288 | 56 | 541 | 212 | 288 | 56 | 556 | 512 | 2 | 26 | 540 | 13 | 3 | 16 | 6630 | 2197 | 8827 |
| Verkehrstruppen | 5161 | 40 | 7 | 47 | 866 | 1955 | 239 | 3060 | 905 | 1962 | 240 | 3107 | 2896 | 6 | 162 | 3064 | 37 | 6 | 43 | 29701 | 14181 | 43882 |
| Train | 458 | 2 | — | 2 | 126 | 346 | 28 | 500 | 128 | 346 | 28 | 502 | 476 | 1 | 19 | 496 | 6 | — | 6 | 4321 | 3291 | 7612 |
| Maschinengewehr-Abteilung | 135 | 1 | — | 1 | 26 | 80 | 9 | 115 | 27 | 80 | 9 | 116 | 113 | 1 | — | 114 | 2 | — | 2 | 946 | 533 | 1479 |
| Militärkrankenwärter | 77 | 1 | — | 1 | 39 | 13 | 4 | 56 | 39 | 13 | 5 | 57 | 50 | 3 | 2 | 55 | 2 | — | 2 | 730 | 116 | 846 |
| Landwehrstämme | 58 | — | — | — | 6 | 3 | — | 9 | 6 | 3 | — | 9 | 9 | — | — | 9 | — | — | — | 115 | 43 | 158 |
| Bekleidungsamt | 390 | 5 | 2 | 7 | 54 | 206 | 20 | 280 | 59 | 207 | 21 | 287 | 266 | 2 | 14 | 282 | 4 | 1 | 5 | 1799 | 1250 | 3049 |
| Oberfeuerwerkerschule | 5 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 | 3 | — | 3 | — | 1 | 1 | — | — | 12 | 12 |
| Artillerie-Prüfungs-Kommission | 256 | — | 1 | 1 | 46 | 58 | 6 | 110 | 46 | 59 | 6 | 111 | 104 | — | 6 | 110 | 1 | — | 1 | 1266 | 239 | 1505 |
| Unteroffizierschule | 575 | 9 | 6 | 15 | 78 | 228 | 28 | 334 | 87 | 234 | 28 | 349 | 331 | 1 | 9 | 341 | 6 | 2 | 8 | 2315 | 1763 | 4078 |
| Disziplinar-Abteilung | 53 | — | — | — | 12 | 18 | 6 | 36 | 12 | 18 | 6 | 36 | 35 | — | 1 | 36 | — | — | — | 282 | 197 | 479 |
| Kadettenanstalten | 42 | — | — | — | 4 | 7 | — | 11 | 4 | 7 | — | 11 | 10 | — | 10 | — | 1 | 1 | — | 38 | 88 | 126 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 51 | — | — | — | 8 | 17 | 6 | 31 | 8 | 17 | 6 | 31 | 30 | — | — | 30 | 1 | — | 1 | 212 | 129 | 341 |
| Militär-Veterinär-Akademie | 141 | — | — | — | 12 | 3 | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 16 | 15 | — | 1 | 16 | — | — | — | 240 | 18 | 258 |
| Sonstige | 6 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 19 | 22 | 41 |
| Summe | 41355 | 415 | 110 | 525 | 7545 | 18944 | 2606 | 29095* | 7947 | 19042 | 2631 | 29620 | 27491 | 68† | 1484 | 29043 | 443 | 134 | 577 | 287668 | 141930 | 429598 |
| Inaktive Mannschaften | — | 3 | — | 3 | 47 | — | — | 47 | 50 | — | — | 50 | 22 | — | 25 | 47 | 3 | — | 3 | 1158 | — | 1158 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 29095 Kranken waren 16731 unausgebildete und 12364 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 2 Verunglückte und 1 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 65.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

- a) gestorben durch Krankheit 3, Unglücksfall 1, Selbstmord 10, Summe 14;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 235, halbinvalide 356, ganzinvalide 360, Summe 951.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 82; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 1556.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|---|-------------|
| In die Heimat beurlaubt | 21 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 283 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 171 |
| Als halbinvalide entlassen | 40 |
| Als ganzinvalide entlassen | 394 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 508 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 59 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 8 |
| Summe | 1484 |

Krankenreport des I. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 31 644.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungs- tage | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 19611 | 262 | 71 | 333 | 4282 | 6933 | 1012 | 12227 | 4518 | 6991 | 1051 | 12560 | 11775 | 26 | 491 | 12292 | 237 | 31 | 268 | 129245 | 47732 | 176977 |
| Kavallerie | 4273 | 42 | 7 | 49 | 1006 | 2200 | 253 | 3459 | 1026 | 2204 | 278 | 3508 | 3328 | 5 | 98 | 3431 | 64 | 13 | 77 | 30928 | 14805 | 45733 |
| Feldartillerie | 3784 | 52 | 10 | 62 | 904 | 1936 | 318 | 3158 | 954 | 1943 | 323 | 3220 | 3036 | 9 | 117 | 3162 | 50 | 8 | 58 | 29606 | 13318 | 42924 |
| Fufsartillerie | 1437 | 9 | 2 | 11 | 298 | 517 | 89 | 904 | 294 | 512 | 109 | 915 | 871 | 3 | 24 | 898 | 14 | 3 | 17 | 9206 | 3325 | 12531 |
| Pioniere | 1263 | 31 | 4 | 35 | 353 | 976 | 142 | 1471 | 384 | 980 | 142 | 506 | 1442 | 3 | 31 | 1476 | 25 | 5 | 30 | 12076 | 7579 | 19655 |
| Train | 351 | 7 | 1 | 8 | 109 | 205 | 15 | 329 | 116 | 206 | 15 | 337 | 314 | 2 | 14 | 330 | 7 | — | 7 | 2777 | 1400 | 4177 |
| Maschinengewehr- Abteilung | 208 | — | — | — | 27 | 80 | 3 | 110 | 27 | 80 | 3 | 110 | 108 | — | 1 | 109 | — | 1 | 1 | 665 | 433 | 1098 |
| Militärkrankenwärter . | 81 | 1 | — | 1 | 25 | 6 | 2 | 33 | 26 | 6 | 2 | 34 | 31 | — | 1 | 32 | 2 | — | 2 | 603 | 61 | 664 |
| Landwehrstämme . . . | 339 | 6 | 1 | 7 | 18 | 33 | 3 | 54 | 24 | 34 | 3 | 61 | 58 | — | 2 | 60 | 1 | — | 1 | 681 | 317 | 998 |
| Bekleidungsamt | 130 | 8 | — | 8 | 43 | 27 | 6 | 76 | 51 | 27 | 6 | 84 | 72 | — | 6 | 78 | 6 | — | 6 | 1130 | 142 | 1272 |
| Arbeiter-Abteilung . . | 77 | 2 | — | 2 | 37 | 44 | 5 | 86 | 39 | 44 | 5 | 88 | 82 | — | 4 | 86 | 2 | — | 2 | 930 | 180 | 1110 |
| Unteroffiziersvorschule . | 31 | — | — | — | — | 12 | — | 12 | — | 12 | — | 12 | 12 | — | — | 12 | — | — | — | — | 64 | 64 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 59 | — | — | — | 12 | 8 | 1 | 21 | 12 | 8 | 1 | 21 | 19 | — | 1 | 20 | 1 | — | 1 | 404 | 84 | 488 |
| Summe | 31644 | 420 | 96 | 516 | 7114 | 12977 | 1849 | 21940* | 7471 | 13047 | 1938 | 22456 | 21148 | 48† | 790 | 21986 | 409 | 61 | 470 | 218251 | 89440 | 307691 |
| Inaktive Mannschaften | — | 2 | — | 2 | 69 | — | — | 69 | 71 | — | — | 71 | 5 | 1 | 63 | 69 | 2 | — | 2 | 1237 | — | 1237 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 21940 Kranken waren 12360 unausgebildete und 9580 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 3 Verunglückte und 3 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 42.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

a) gestorben durch Krankheit 2, Unglücksfall 8, Selbstmord 11, Summe 21;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 198, halbinvalide 257, ganzinvalide 181, Summe 636.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 69; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 1035.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|---|------------|
| In die Heimat beurlaubt | 7 |
| In Kurorte bzw. Genesungsheime entsendet | 13 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 131 |
| Als halbinvalide entlassen | 29 |
| Als ganzinvalide entlassen | 239 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditäts- verfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 300 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 65 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 6 |
| Summe | 790 |

Krankenrapport des II. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 25 839.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 16471 | 15 ¹⁾ 243 | 21 ¹⁾ 28 | 36 ¹⁾ 271 | 3723 | 6078 | 1154 | 10955 | 3956 ¹⁾ | 16 ¹⁾ 6101 | 9 ¹⁾ 11169 | 36 ¹⁾ 11226 | 10373 | 23 | 547 | 10943 | 23 ¹⁾ 249 | 10 ¹⁾ 37 | 33 ¹⁾ 286 | 123605 | 51320 | 174925 |
| Kavallerie | 2779 | 22 | 8 | 30 | 601 | 1238 | 169 | 2008 | 621 | 1246 | 171 | 2038 | 1937 | 5 | 56 | 1998 | 31 | 9 | 40 | 15991 | 7130 | 23121 |
| Feldartillerie | 2701 | 52 | 6 | 58 | 630 | 1129 | 174 | 1933 | 679 | 1134 | 178 | 1991 | 1878 | 2 | 65 | 1945 | 40 | 6 | 46 | 17848 | 7382 | 25230 |
| Fufsartillerie | 1790 | 7 | 2 | 9 | 306 | 928 | 167 | 1401 | 313 | 930 | 167 | 1410 | 1350 | 1 | 41 | 1392 | 14 | 4 | 18 | 12559 | 7154 | 19713 |
| Pioniere | 637 | 9 | 1 | 10 | 122 | 425 | 55 | 602 | 130 | 426 | 56 | 612 | 584 | 1 | 14 | 599 | 9 | 4 | 13 | 4717 | 4262 | 8979 |
| Train | 367 | 3 | 2 | 5 | 53 | 243 | 14 | 310 | 56 | 245 | 14 | 315 | 288 | 1 | 16 | 305 | 3 | 7 | 10 | 2161 | 2241 | 4402 |
| Militärkrankenwärter | 72 | 1 | — | 1 | 21 | 9 | 3 | 33 | 22 | 9 | 3 | 34 | 31 | — | 1 | 32 | 2 | — | 2 | 360 | 78 | 438 |
| Landwehrstämme | 269 | 1 | — | 1 | 18 | 42 | 3 | 63 | 19 | 42 | 3 | 64 | 59 | 1 | 4 | 64 | — | — | — | 377 | 371 | 748 |
| Bekleidungsamt | 113 | 4 | — | 4 | 21 | 28 | 1 | 50 | 25 | 28 | 1 | 54 | 48 | — | 4 | 52 | 2 | — | 2 | 485 | 160 | 645 |
| Unteroffizierschule | 576 | 6 | 1 | 7 | 143 | 133 | 14 | 290 | 149 | 134 | 14 | 297 | 281 | — | 13 | 294 | 1 | 2 | 3 | 3062 | 929 | 3991 |
| Kriegsschule | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unteroffiziersvorschule | 30 | 1 | — | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 12 | 11 | — | 1 | 12 | — | — | — | 125 | 94 | 219 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 33 | — | — | — | 3 | 4 | — | 7 | 3 | 4 | — | 7 | 7 | — | — | 7 | — | — | — | 91 | 32 | 123 |
| Summe | 25839 | 15¹⁾ 349 | 21¹⁾ 48 | 36¹⁾ 397 | 5642 | 10266 | 1755 | 17663* | 5975 | 16¹⁾ 10308 | 9¹⁾ 1777 | 36¹⁾ 18060 | 16847 | 34† | 762 | 17643 | 23¹⁾ 351 | 10¹⁾ 69 | 33¹⁾ 420 | 181381 | 81153 | 262534 |
| Inaktive Mannschaften | — | 2 | — | 2 | 57 | — | — | 57 | 59 | — | — | 59 | 5 | 1 | 52 | 58 | 1 | — | 1 | 1308 | — | 1308 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 17663 Kranken waren 10639 unausgebildete und 7024 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 3 Verunglückte enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 31.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

a) gestorben durch Krankheit 1, Unglücksfall 7, Selbstmord 12, Summe 20;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 194, halbinvalide 150, ganzinvalide 197, Summe 541.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 54; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 925.

1) Diese Zahlen bezeichnen diejenigen Kranken, die infolge Formationsänderungen mit ihren Truppenteilen von einem anderen Armeekorps übernommen bzw. an ein anderes Armeekorps abgegeben wurden, sind in den darunter stehenden Zahlen nicht mit enthalten und kommen nur bei den bezüglichen Armeekorps, nicht aber bei der Armee, in Betracht.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|------------|
| In die Heimat beurlaubt | 14 |
| In Kurorte bzw. Genesungsheime entsendet | 75 |
| Den Zivilbehörden überwiesen | 1 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 143 |
| Als halbinvalide entlassen | 37 |
| Als ganzinvalide entlassen | 204 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 238 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 46 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 4 |
| Summe | 762 |

Krankenrapport des III. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 23 519.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungs- tage | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 14951 | 160 | 31 | 191 | 2813 | 4052 | 550 | 7415 | 2964 | 4082 | 560 | 7606 | 6984 | 13 | 385 | 7382 | 165 | 59 | 224 | 85488 | 31640 | 117128 |
| Kavallerie | 2800 | 22 | 7 | 29 | 504 | 972 | 159 | 1635 | 526 | 979 | 159 | 1664 | 1577 | 6 | 48 | 1631 | 22 | 11 | 33 | 14411 | 6634 | 21045 |
| Feldartillerie | 3027 | 42 | 6 | 48 | 564 | 1197 | 147 | 1908 | 606 | 1203 | 147 | 1956 | 1849 | 4 | 60 | 1913 | 29 | 14 | 43 | 17921 | 8760 | 26681 |
| Pioniere | 618 | 6 | 2 | 8 | 181 | 152 | 18 | 351 | 187 | 154 | 18 | 359 | 337 | — | 15 | 352 | 6 | 1 | 7 | 5572 | 1321 | 6893 |
| Verkehrstruppen | 477 | 2 | — | 2 | 54 | 99 | 16 | 169 | 56 | 99 | 16 | 171 | 158 | 1 | 8 | 167 | 3 | 1 | 4 | 2076 | 552 | 2628 |
| Train | 416 | 2 | — | 2 | 110 | 148 | 17 | 275 | 112 | 148 | 17 | 277 | 251 | — | 14 | 265 | 7 | 5 | 12 | 3979 | 1046 | 5025 |
| Militärkrankenwärter | 75 | — | — | — | 16 | 9 | — | 25 | 16 | 9 | — | 25 | 24 | — | — | 24 | 1 | — | 1 | 294 | 45 | 339 |
| Landwehrstämme | 631 | 9 | 1 | 10 | 72 | 113 | 15 | 200 | 81 | 114 | 15 | 210 | 196 | 1 | 8 | 205 | 4 | 1 | 5 | 2387 | 1072 | 3459 |
| Bekleidungsamt | 122 | 3 | — | 3 | 49 | 36 | 8 | 93 | 52 | 36 | 8 | 96 | 86 | — | 8 | 94 | 2 | — | 2 | 1506 | 282 | 1788 |
| Festungsgefängnis | 295 | 5 | 7 | 12 | 120 | 136 | 22 | 278 | 125 | 143 | 22 | 290 | 260 | 2 | 14 | 276 | 11 | 3 | 14 | 3415 | 996 | 4411 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 41 | — | — | — | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 12 | — | 1 | 13 | 1 | — | 1 | 177 | 31 | 208 |
| Sonstige | 66 | — | — | — | 8 | 15 | 2 | 25 | 8 | 15 | 2 | 25 | 23 | — | 2 | 25 | — | — | — | 306 | 130 | 436 |
| Summe | 23519 | 251 | 54 | 305 | 4498 | 6935 | 955 | 12388* | 4740 | 6988 | 965 | 12693 | 11757 | 27† | 563 | 12347 | 251 | 95 | 346 | 137532 | 52509 | 190041 |
| Inaktive Mannschaften | — | 3 | — | 3 | 53 | — | — | 53 | 56 | — | — | 56 | 6 | — | 47 | 53 | 3 | — | 3 | 1120 | — | 1120 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 12388 Kranken waren 7000 unausgebildete und 5388 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 4 Verunglückte und 2 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 21.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind
a) gestorben durch Krankheit 1, Unglücksfall 8, Selbstmord 17, Summe 26;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 143, halbinvalide 149, ganzinvalide 101, Summe 393.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 53; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 757.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|------------|
| In die Heimat beurlaubt | 8 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 43 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 132 |
| Als halbinvalide entlassen | 24 |
| Als ganzinvalide entlassen | 208 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditäts- verfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 109 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 36 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 3 |
| Summe | 563 |

Krankenrapport des IV. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 22 365.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungs- tage | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 13260 | 129 | 12 | 141 | 2851 | 3240 | 417 | 6508 | 2980 | 3249 | 420 | 6649 | 6060 | 15 | 438 | 6513 | 121 | 15 | 136 | 77103 | 21924 | 99027 |
| Kavallerie | 2746 | 21 | 4 | 25 | 838 | 758 | 99 | 1695 | 859 | 761 | 100 | 1720 | 1575 | 6 | 91 | 1672 | 39 | 9 | 48 | 18635 | 4606 | 23241 |
| Feldartillerie | 2742 | 28 | 4 | 32 | 528 | 1009 | 101 | 1638 | 553 | 1013 | 104 | 1670 | 1575 | 4 | 64 | 1643 | 19 | 8 | 27 | 15112 | 6542 | 21654 |
| Fufsartillerie | 1214 | 12 | 1 | 13 | 340 | 527 | 72 | 939 | 352 | 528 | 72 | 952 | 882 | 1 | 60 | 943 | 8 | 1 | 9 | 9428 | 3640 | 13068 |
| Pioniere | 612 | 8 | — | 8 | 155 | 155 | 34 | 344 | 163 | 155 | 34 | 352 | 305 | 1 | 33 | 339 | 12 | 1 | 13 | 5887 | 1195 | 7082 |
| Train | 388 | 4 | — | 4 | 131 | 135 | 19 | 285 | 135 | 135 | 19 | 289 | 270 | 1 | 14 | 285 | 4 | — | 4 | 2945 | 725 | 3670 |
| Militärkrankenwärter | 67 | — | — | — | 15 | 11 | 1 | 27 | 15 | 11 | 1 | 27 | 27 | — | — | 27 | — | — | — | 264 | 105 | 369 |
| Landwehrstämme | 334 | 1 | — | 1 | 27 | 77 | 8 | 112 | 28 | 77 | 8 | 113 | 104 | — | 8 | 112 | 1 | — | 1 | 765 | 990 | 1755 |
| Bekleidungsamt | 113 | 1 | — | 1 | 18 | 30 | 5 | 53 | 19 | 30 | 5 | 54 | 51 | — | 2 | 53 | 1 | — | 1 | 491 | 135 | 626 |
| Unteroffizierschule | 596 | 3 | — | 3 | 121 | 303 | 31 | 455 | 124 | 303 | 31 | 458 | 441 | 1 | 13 | 455 | 2 | 1 | 3 | 3024 | 1490 | 4514 |
| Festungsgefängnis | 126 | 9 | 1 | 10 | 52 | 149 | 17 | 218 | 61 | 150 | 17 | 228 | 212 | — | 12 | 224 | 1 | 3 | 4 | 2514 | 798 | 3312 |
| Arbeiter-Abteilung | 79 | 11 | — | 11 | 70 | 54 | 10 | 134 | 81 | 54 | 10 | 145 | 121 | — | 15 | 136 | 9 | — | 9 | 3173 | 219 | 3392 |
| Unteroffiziersvorschule | 30 | — | — | — | 15 | 1 | 16 | — | 15 | 1 | 16 | 16 | — | — | 16 | — | — | — | — | 12 | 59 | 71 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 45 | 1 | — | 1 | 16 | 2 | 18 | 17 | 2 | — | 19 | 17 | — | 1 | 18 | 1 | — | 1 | 301 | 2 | 303 | |
| Sonstige | 13 | — | — | — | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | — | 1 | 8 | 1 | — | 1 | 110 | 26 | 136 |
| Summe | 22365 | 228 | 22 | 250 | 5163 | 6469 | 819 | 12451* | 5388 | 6487 | 826 | 12701 | 11663 | 29† | 752 | 12444 | 219 | 38 | 257 | 139764 | 42456 | 182220 |
| Inaktive Mannschaften | — | 5 | — | 5 | 63 | — | — | 63 | 68 | — | — | 68 | 3 | — | 58 | 61 | 7 | — | 7 | 1105 | — | 1105 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 12451 Kranken waren 7289 unausgebildete und 5162 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 4 Verunglückte und 1 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 24.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

a) gestorben durch Krankheit 1, Unglücksfall 3, Selbstmord 17, Summe 21;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 145, halbinvalide 188, ganzinvalide 103, Summe 436.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 50; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 794.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 5 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 159 |
| Den Zivilbehörden überwiesen | 1 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 155 |
| Als halbinvalide entlassen | 50 |
| Als ganzinvalide entlassen | 153 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditäts- verfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 157 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 60 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 12 |

Summe 752

Krankenreport des V. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 25 615.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungs- tage | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|--------|-------|----------|--------|------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------------|--------|-------|----------------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 17119 | 131 | 36 | 167 | 2950 | 5721 | 633 | 9304 | 3079 | 5753 | 639 | 9471 | 8851 | 27 | 427 | 9305 | 116 | 50 | 166 | 86747 | 41113 | 127860 |
| Kavallerie | 2782 | 18 | 7 | 25 | 437 | 1161 | 118 | 1716 | 454 | 1166 | 121 | 1741 | 1641 | 2 | 55 | 1698 | 33 | 10 | 43 | 13584 | 9685 | 23269 |
| Feldartillerie | 2958 | 27 | 5 | 32 | 602 | 783 | 113 | 1498 | 628 | 787 | 115 | 1530 | 1435 | 4 | 58 | 1497 | 30 | 3 | 33 | 16080 | 5725 | 21805 |
| Fufsartillerie | 1225 | 7 | — | 7 | 205 | 569 | 66 | 840 | 212 | 569 | 66 | 847 | 796 | 1 | 36 | 833 | 14 | — | 14 | 7732 | 4112 | 11844 |
| Pioniere | 621 | 3 | — | 3 | 119 | 233 | 34 | 386 | 122 | 233 | 34 | 389 | 368 | — | 17 | 385 | 4 | — | 4 | 3142 | 1438 | 4580 |
| Train | 386 | 7 | — | 7 | 104 | 180 | 22 | 306 | 111 | 180 | 22 | 313 | 297 | 1 | 10 | 308 | 5 | — | 5 | 2878 | 1247 | 4125 |
| Militärkrankenwärter | 73 | — | — | — | 18 | 20 | — | 38 | 18 | 20 | — | 38 | 37 | 1 | — | 38 | — | — | — | 262 | 150 | 412 |
| Landwehrstämme | 289 | 2 | 1 | 3 | 27 | 68 | 5 | 100 | 28 | 69 | 6 | 103 | 96 | — | 5 | 101 | 2 | — | 2 | 735 | 903 | 1638 |
| Bekleidungsamt | 115 | — | — | — | 14 | 31 | 6 | 51 | 14 | 31 | 6 | 51 | 47 | — | 2 | 49 | 2 | — | 2 | 260 | 187 | 447 |
| Kriegsschule | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | 27 | 27 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 46 | 1 | — | 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 13 | 11 | — | 2 | 13 | — | — | — | 79 | 70 | 149 |
| Summe | 25615 | 196 | 49 | 245 | 4479 | 8776 | 998 | 14253* | 4670 | 8818 | 1010 | 14498 | 13581 | 36† | 612 | 14229 | 206 | 63 | 269 | 131499 | 64657 | 196156 |
| Inaktive Mannschaften | — | 4 | — | 4 | 73 | — | — | 73 | 77 | — | — | 77 | 9 | 2 | 64 | 75 | 2 | — | 2 | 1327 | — | 1327 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 14253 Kranken waren 8339 unausgebildete und 5914 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 4 Verunglückte enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 32.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

- a) gestorben durch Unglücksfall 3, Selbstmord 13, Summe 16;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 168, halbinvalide 112, ganzinvalide 111, Summe 391.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 52; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 685.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 26 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 52 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 161 |
| Als halbinvalide entlassen | 13 |
| Als ganzinvalide entlassen | 120 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditäts- verfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 180 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 58 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 2 |

Summe 612

Krankenreport des VI. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 25 815.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------|-------|----------|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 16841 | 262 | 57 | 319 | 3478 | 3945 | 875 | 8298 | 3718 | 3998 | 901 | 8617 | 7750 | 30 | 587 | 8367 | 224 | 26 | 250 | 120910 | 30481 | 151391 |
| Kavallerie | 3394 | 41 | 10 | 51 | 761 | 1203 | 212 | 2176 | 793 | 1212 | 222 | 2227 | 2035 | 3 | 131 | 2169 | 37 | 21 | 58 | 23940 | 11072 | 35012 |
| Feldartillerie | 2664 | 35 | 9 | 44 | 503 | 961 | 240 | 1704 | 530 | 965 | 253 | 1748 | 1617 | 3 | 78 | 1698 | 38 | 12 | 50 | 18938 | 9288 | 28226 |
| Fufsartillerie | 1185 | 18 | 1 | 19 | 281 | 272 | 56 | 609 | 299 | 273 | 56 | 628 | 569 | 2 | 41 | 612 | 15 | 1 | 16 | 8567 | 2180 | 10747 |
| Pioniere | 602 | 16 | 2 | 18 | 148 | 183 | 36 | 367 | 163 | 185 | 37 | 385 | 355 | 1 | 22 | 378 | 7 | — | 7 | 4751 | 1389 | 6140 |
| Train | 366 | 4 | — | 4 | 92 | 172 | 47 | 311 | 96 | 172 | 47 | 315 | 290 | — | 22 | 312 | 2 | 1 | 3 | 3798 | 1253 | 5051 |
| Maschinengewehr- Abteilung | 67 | — | — | — | 9 | 8 | 1 | 18 | 9 | 8 | 1 | 18 | 17 | — | 1 | 18 | — | — | — | 124 | 58 | 182 |
| Militärkrankenwärter | 67 | 1 | — | 1 | 12 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 19 | — | — | — | 191 | 39 | 230 |
| Landwehrstämme | 408 | 6 | 2 | 8 | 42 | 77 | 8 | 127 | 47 | 77 | 11 | 135 | 121 | — | 10 | 131 | 2 | 2 | 4 | 1903 | 1346 | 3249 |
| Bekleidungsamt | 17 | 1 | — | 1 | — | 12 | — | 12 | 1 | 12 | — | 13 | 13 | — | — | 13 | — | — | — | 35 | 136 | 171 |
| Kriegsschule | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Festungsgefängnis | 141 | 3 | — | 3 | 46 | 61 | 11 | 118 | 49 | 61 | 11 | 121 | 109 | 1 | 6 | 116 | 5 | — | 5 | 2121 | 263 | 2384 |
| Unteroffiziersvorschule | 28 | — | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 11 | — | — | 11 | — | 1 | 1 | 21 | 88 | 109 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 31 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | 4 | 2 | 3 | — | 5 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | 82 | 14 | 96 |
| Sonstige | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summe | 25815 | 388 | 83 | 471 | 5374 | 6910 | 1488 | 13772* | 5721 | 6981 | 1541 | 14243 | 12909 | 41† | 899 | 13849 | 330 | 64 | 394 | 185381 | 57607 | 242988 |
| Inaktive Mannschaften | — | 13 | — | 13 | 112 | — | — | 112 | 125 | — | — | 125 | 22 | 2 | 94 | 118 | 7 | — | 7 | 4367 | — | 4367 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 13772 Kranken waren 7783 unausgebildete und 5989 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 1 Verunglückter und 4 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 36.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind
a) gestorben durch Krankheit 1, Unglücksfall 6, Selbstmord 14, Summe 21;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 177, halbinvalide 171, ganzinvalide 219, Summe 567.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 62; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 842.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 4 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 256 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 123 |
| Als halbinvalide entlassen | 17 |
| Als ganzinvalide entlassen | 135 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 253 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 68 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 43 |
| Summe | 899 |

Krankenrapport des VII. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 26 955.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 17849 | 224 | 56 | 280 | 3153 | 6801 | 1026 | 10980 | 3364 | 6859 | 1037 | 11260 | 10329 | 19 | 653 | 11001 | 204 | 55 | 259 | 108099 | 49264 | 157363 |
| Kavallerie | 2929 | 43 | 3 | 46 | 743 | 1050 | 192 | 1985 | 782 | 1052 | 197 | 2031 | 1828 | 10 | 121 | 1959 | 60 | 12 | 72 | 25485 | 8049 | 33534 |
| Feldartillerie | 2854 | 28 | 6 | 34 | 518 | 797 | 122 | 1437 | 540 | 800 | 131 | 1471 | 1334 | 3 | 92 | 1429 | 40 | 2 | 42 | 18692 | 6789 | 25481 |
| Fufsartillerie | 1196 | 9 | 1 | 10 | 191 | 491 | 63 | 745 | 199 | 492 | 64 | 755 | 716 | 1 | 27 | 744 | 8 | 3 | 11 | 7081 | 3009 | 10090 |
| Pioniere | 628 | 9 | 6 | 15 | 205 | 463 | 45 | 713 | 214 | 468 | 46 | 728 | 686 | 1 | 25 | 712 | 12 | 4 | 16 | 6350 | 3042 | 9392 |
| Train | 391 | 4 | 2 | 6 | 121 | 127 | 22 | 270 | 125 | 129 | 22 | 276 | 260 | 1 | 13 | 274 | 2 | — | 2 | 3596 | 1200 | 4796 |
| Militärkrankenwärter | 66 | — | — | — | 19 | 12 | 4 | 35 | 19 | 12 | 4 | 35 | 34 | — | 1 | 35 | — | — | — | 375 | 85 | 460 |
| Landwehrstämme | 523 | 2 | 4 | 6 | 40 | 167 | 14 | 221 | 42 | 171 | 14 | 227 | 211 | 2 | 6 | 219 | 4 | 4 | 8 | 982 | 2435 | 3417 |
| Bekleidungsamt | 246 | 4 | — | 4 | 64 | 25 | 2 | 91 | 68 | 24 | 3 | 95 | 77 | 1 | 9 | 87 | 8 | — | 8 | 1656 | 144 | 1800 |
| Festungsgefängnis | 240 | 2 | 1 | 3 | 58 | 171 | 19 | 248 | 60 | 172 | 19 | 251 | 235 | 1 | 7 | 243 | 7 | 1 | 8 | 1729 | 814 | 2543 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 33 | — | — | — | 5 | — | 2 | 7 | 5 | — | 2 | 7 | 5 | — | 1 | 6 | 1 | — | 1 | 324 | 27 | 351 |
| Summe | 26955 | 325 | 79 | 404 | 5117 | 10104 | 1511 | 16732* | 5418 | 10179 | 1539 | 17136 | 15715 | 39† | 955 | 16709 | 346 | 81 | 427 | 174369 | 74858 | 249227 |
| Inaktive Mannschaften | — | 2 | — | 2 | 86 | — | — | 86 | 88 | — | — | 88 | 15 | 1 | 68 | 84 | 4 | — | 4 | 1548 | — | 1548 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 16732 Kranken waren 9070 unausgebildete und 7662 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 4 Verunglückte und 1 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 34.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind
a) gestorben durch Unglücksfall 6, Selbstmord 4, Summe 10;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 203, halbinvalide 182, ganzinvalide 167, Summe 552.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 49; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 942.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|---|------------|
| In die Heimat beurlaubt | 20 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 218 |
| Den Zivilbehörden überwiesen | 1 |
| An Irrenanstalten überwiesen | 3 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 127 |
| Als halbinvalide entlassen | 37 |
| Als ganzinvalide entlassen | 226 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 273 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 46 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 4 |
| Summe | 955 |

Krankenrapport des VIII. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 26 874.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungs- tage | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|--------|-------|----------|--------|------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------------|--------|-------|----------------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 16698 | 173 | 33 | 206 | 3138 | 6900 | 1133 | 11171 | 3297 | 6931 | 1149 | 11377 | 10459 | 33 | 634 | 11126 | 191 | 60 | 251 | 110213 | 47317 | 157530 |
| Kavallerie | 2751 | 39 | 11 | 50 | 712 | 948 | 203 | 1863 | 747 | 959 | 207 | 1913 | 1760 | 2 | 105 | 1867 | 39 | 7 | 46 | 20933 | 6752 | 27685 |
| Feldartillerie | 3029 | 41 | 6 | 47 | 781 | 1356 | 305 | 2442 | 821 | 1362 | 306 | 2489 | 2323 | 4 | 123 | 2450 | 32 | 7 | 39 | 26027 | 10377 | 36404 |
| Fufsartillerie | 1323 | 8 | 1 | 9 | 305 | 644 | 113 | 1062 | 313 | 645 | 113 | 1071 | 997 | 3 | 53 | 1053 | 16 | 2 | 18 | 11127 | 3914 | 15041 |
| Pioniere | 641 | 6 | — | 6 | 164 | 379 | 44 | 587 | 170 | 379 | 44 | 593 | 554 | 1 | 24 | 579 | 12 | 2 | 14 | 5260 | 2572 | 7832 |
| Verkehrstruppen | 496 | 3 | 2 | 5 | 80 | 190 | 18 | 288 | 83 | 192 | 18 | 293 | 274 | — | 17 | 291 | 2 | — | 2 | 2422 | 1078 | 3500 |
| Train | 398 | 5 | 4 | 9 | 79 | 214 | 26 | 319 | 84 | 218 | 26 | 328 | 310 | — | 15 | 325 | 2 | 1 | 3 | 2573 | 1510 | 4083 |
| Militärkrankenwärter | 70 | 1 | — | 1 | 28 | 14 | 4 | 46 | 29 | 14 | 4 | 47 | 42 | — | 4 | 46 | 1 | — | 1 | 622 | 115 | 737 |
| Landwehrstämme | 409 | 3 | — | 3 | 30 | 79 | 14 | 123 | 33 | 79 | 14 | 126 | 111 | — | 7 | 118 | 6 | 2 | 8 | 1006 | 943 | 1949 |
| Bekleidungsamt | 113 | 1 | — | 1 | 10 | 25 | 4 | 39 | 11 | 25 | 4 | 40 | 37 | — | 1 | 38 | 2 | — | 2 | 322 | 136 | 458 |
| Unteroffizierschule | 416 | 2 | 4 | 6 | 74 | 304 | 40 | 418 | 76 | 308 | 40 | 424 | 401 | — | 7 | 408 | 7 | 9 | 16 | 2434 | 1701 | 4135 |
| Festungsgefängnis | 364 | 12 | 15 | 27 | 87 | 236 | 77 | 400 | 99 | 251 | 77 | 427 | 364 | — | 46 | 410 | 4 | 13 | 17 | 5414 | 4816 | 10230 |
| Arbeiter-Abteilung | 71 | 5 | 3 | 8 | 51 | 143 | 14 | 208 | 56 | 146 | 14 | 216 | 184 | — | 23 | 207 | 8 | 1 | 9 | 2002 | 910 | 2912 |
| Kadettenanstalt | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unteroffiziersvorschule | 26 | — | — | — | 1 | 7 | — | 8 | 1 | 7 | — | 8 | 8 | — | — | 8 | — | — | — | 49 | 73 | 122 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 60 | — | — | — | 19 | 17 | — | 36 | 19 | 17 | — | 36 | 33 | — | 1 | 34 | 2 | — | 2 | 740 | 140 | 880 |
| Sonstige | 7 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 6 | — | 6 |
| Summe | 26874 | 299 | 79 | 378 | 5560 | 11456 | 1995 | 19011* | 5840 | 11533 | 2016 | 19389 | 17857 | 43† | 1060 | 18960 | 325 | 104 | 429 | 191150 | 82354 | 273504 |
| Inaktive Mannschaften | — | 2 | — | 2 | 54 | — | — | 54 | 56 | — | — | 56 | 14 | — | 42 | 56 | — | — | — | 1374 | — | 1374 |

*) Unter den von den Truppenteilen u. s. w. in Zugang gekommenen 19011 Kranken waren 10320 unausgebildete und 8691 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 1 Verunglückter und 2 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 40.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

a) gestorben durch Krankheit 2, Unglücksfall 3, Selbstmord 9, Summe 14;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 277, halbinvalide 132, ganzinvalide 119, Summe 528.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 57; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 1108

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 22 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 144 |
| Den Zivilbehörden überwiesen | 1 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 237 |
| Als halbinvalide entlassen | 57 |
| Als ganzinvalide entlassen | 286 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditäts- verfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 208 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 105 |

Summe 1060

Krankenreport des IX. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 24951.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 17732 | 212 | 45 | 257 | 3766 | 5132 | 919 | 9817 | 3976 | 5173 | 925 | 10074 | 9364 | 10 | 489 | 9863 | 169 | 42 | 211 | 109430 | 40380 | 149810 |
| Kavallerie | 2766 | 24 | 6 | 30 | 531 | 1018 | 93 | 1642 | 555 | 1024 | 93 | 1672 | 1578 | 3 | 56 | 1637 | 26 | 9 | 35 | 16923 | 8194 | 25117 |
| Feldartillerie | 2815 | 22 | 8 | 30 | 514 | 423 | 102 | 1039 | 535 | 431 | 103 | 1069 | 990 | 2 | 48 | 1040 | 24 | 5 | 29 | 13845 | 3778 | 17623 |
| Pioniere | 613 | 4 | 3 | 7 | 132 | 171 | 26 | 329 | 136 | 174 | 26 | 336 | 309 | 2 | 19 | 330 | 2 | 4 | 6 | 4893 | 1663 | 6556 |
| Train | 381 | 2 | 1 | 3 | 66 | 72 | 8 | 146 | 67 | 73 | 9 | 149 | 134 | — | 14 | 148 | 1 | — | 1 | 1785 | 784 | 2569 |
| Militärkrankenwärter | 74 | — | — | — | 17 | 15 | 4 | 36 | 17 | 15 | 4 | 36 | 32 | — | 1 | 33 | 3 | — | 3 | 344 | 94 | 438 |
| Landwehrstämme | 418 | 1 | — | 1 | 34 | 61 | 9 | 104 | 35 | 61 | 9 | 105 | 99 | — | 4 | 103 | — | 2 | 2 | 716 | 691 | 1407 |
| Bekleidungsamt | 111 | — | — | — | 39 | 16 | 1 | 56 | 39 | 16 | 1 | 56 | 52 | — | 3 | 55 | 1 | — | 1 | 729 | 72 | 801 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 41 | — | — | — | 3 | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | 46 | — | 46 |
| Summe | 24951 | 265 | 63 | 328 | 5102 | 6908 | 1162 | 13172* | 5363 | 6967 | 1170 | 13500 | 12561 | 17† | 634 | 13212 | 226 | 62 | 288 | 148711 | 55656 | 204367 |
| Inaktive Mannschaften | — | 4 | — | 4 | 44 | — | — | 44 | 48 | — | — | 48 | 3 | — | 40 | 43 | 5 | — | 5 | 1295 | — | 1295 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 13172 Kranken waren 7924 unausgebildete und 5248 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind keine Verunglückten und Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mit hin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 17.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

- a) gestorben durch Krankheit 1, Unglücksfall 2, Selbstmord 9, Summe 12;
 b) entlassen als dienstunbrauchbar 359, halbinvalide 187, ganzinvalide 262, Summe 808.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 29; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 876.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|---|------------|
| In die Heimat beurlaubt | 14 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 24 |
| An Irrenanstalten überwiesen | 1 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 34 |
| Als halbinvalide entlassen | 1 |
| Als ganzinvalide entlassen | 33 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 473 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 32 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 22 |
| Summe | 634 |

Krankenrapport des X. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 21 914.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungs- tage | | |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 14345 | 163 | 41 | 204 | 2740 | 3674 | 946 | 7360 | 2886 | 3712 | 966 | 7564 | 6891 | 31 | 408 | 7330 | 202 | 32 | 234 | 88878 | 32125 | 121003 |
| Kavallerie | 2801 | 26 | 8 | 34 | 749 | 793 | 147 | 1689 | 775 | 800 | 148 | 1723 | 1601 | 4 | 81 | 1686 | 31 | 6 | 37 | 19442 | 6738 | 26180 |
| Feldartillerie | 3063 | 38 | 3 | 41 | 725 | 1078 | 240 | 2043 | 748 | 1081 | 255 | 2084 | 1888 | 7 | 132 | 2027 | 50 | 7 | 57 | 22881 | 9991 | 32872 |
| Pioniere | 615 | 10 | 4 | 14 | 158 | 380 | 76 | 614 | 168 | 384 | 76 | 628 | 591 | 2 | 24 | 617 | 11 | — | 11 | 4944 | 2676 | 7620 |
| Train | 388 | 2 | 4 | 6 | 62 | 160 | 64 | 286 | 64 | 164 | 64 | 292 | 276 | 1 | 11 | 288 | — | 4 | 4 | 2932 | 2004 | 4936 |
| Militärkrankenwärter . | 58 | 1 | — | 1 | 16 | 4 | 1 | 21 | 17 | 4 | 1 | 22 | 19 | — | 3 | 22 | — | — | — | 428 | 21 | 449 |
| Landwehrstämme . . . | 328 | 2 | 1 | 3 | 32 | 33 | 4 | 69 | 34 | 34 | 4 | 72 | 62 | 1 | 7 | 70 | 1 | 1 | 2 | 844 | 433 | 1277 |
| Bekleidungsamt | 107 | — | — | — | 28 | 17 | 5 | 50 | 28 | 17 | 5 | 50 | 39 | — | 8 | 47 | 3 | — | 3 | 634 | 159 | 793 |
| Kriegsschule | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 14 | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 | 2 | 2 | — | 4 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | 25 | 6 | 31 |
| Sonstige | 194 | 4 | — | 4 | 34 | 55 | 16 | 105 | 38 | 55 | 16 | 109 | 103 | — | 2 | 105 | 1 | 3 | 4 | 1038 | 530 | 1568 |
| Summe | 21914 | 246 | 61 | 307 | 4546 | 6196 | 1499 | 12241* | 4760 | 6253 | 1535 | 12548 | 11474 | 46† | 676 | 12196 | 299 | 53 | 352 | 142046 | 54683 | 196729 |
| Inaktive Mannschaften | — | 6 | — | 6 | 22 | — | — | 22 | 28 | — | — | 28 | 4 | 1 | 22 | 27 | 1 | — | 1 | 842 | — | 842 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 12241 Kranken waren 7176 unausgebildete und 5065 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 1 Verunglückter und 4 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 41.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind
a) gestorben durch Unglücksfall 3, Selbstmord 16, Summe 19;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 145, halbinvalide 183, ganzinvalide 205, Summe 533.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 65; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 744.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|------------|
| In die Heimat beurlaubt | 14 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 140 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 104 |
| Als halbinvalide entlassen | 7 |
| Als ganzinvalide entlassen | 100 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 260 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 46 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 5 |
| Summe | 676 |

Krankenrapport des XI. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 20 787.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Z u g a n g | | | | I m g a n z e n s i n d b e h a n d e l t | | | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungs- tage | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|--------|-------|-------------|--------|------------------------|--------|--|--------|------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------------|--------|-------|----------------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 14624 | 141 | 60 | 201 | 3046 | 6179 | 776 | 10001 | 3170 | 6227 | 805 | 10202 | 9555 | 23 | 482 | 10060 | 109 | 33 | 142 | 88474 | 49645 | 138119 |
| Kavallerie | 1682 | 24 | 8 | 32 | 281 | 914 | 83 | 1278 | 305 | 922 | 83 | 1310 | 1256 | 4 | 27 | 1287 | 18 | 5 | 23 | 8326 | 7056 | 15382 |
| Feldartillerie | 2992 | 26 | 9 | 35 | 635 | 1922 | 290 | 2847 | 632 | 1910 | 340 | 2882 | 2725 | 3 | 109 | 2837 | 28 | 17 | 45 | 22499 | 15378 | 37877 |
| Pioniere | 588 | 4 | 4 | 8 | 56 | 296 | 35 | 387 | 59 | 300 | 36 | 395 | 371 | — | 21 | 392 | 2 | 1 | 3 | 2384 | 3686 | 6070 |
| Train | 398 | 6 | — | 6 | 85 | 263 | 29 | 377 | 91 | 263 | 29 | 383 | 369 | — | 8 | 377 | 6 | — | 6 | 2438 | 1775 | 4213 |
| Militärkrankenwärter | 59 | — | — | — | 7 | 10 | — | 17 | 7 | 10 | — | 17 | 15 | — | 2 | 17 | — | — | — | 213 | 82 | 295 |
| Landwehrstämme | 250 | 3 | — | 3 | 14 | 33 | 3 | 50 | 17 | 33 | 3 | 53 | 47 | — | 5 | 52 | — | 1 | 1 | 299 | 439 | 738 |
| Bekleidungsamt | 143 | 1 | 3 | 4 | 42 | 75 | 10 | 127 | 43 | 78 | 10 | 131 | 117 | — | 11 | 128 | 1 | 2 | 3 | 1532 | 570 | 2102 |
| Kriegsschule | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 29 | 2 | — | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | — | — | 10 | — | — | — | 107 | 21 | 128 |
| Summe | 20767 | 207 | 84 | 291 | 4169 | 9696 | 1227 | 15092* | 4329 | 9747 | 1307 | 15383 | 14465 | 30† | 665 | 15160 | 164 | 59 | 223 | 126272 | 78652 | 204924 |
| Inaktive Mannschaften | — | 3 | — | 3 | 75 | — | — | 75 | 78 | — | — | 78 | 17 | — | 60 | 77 | 1 | — | 1 | 1508 | — | 1508 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 15092 Kranken waren 8948 unausgebildete und 6144 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 3 Verunglückte und 1 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 26.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

- a) gestorben durch Krankheit 1, Unglücksfall 5, Selbstmord 15, Summe 21;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 207, halbinvalide 124, ganzinvalide 136, Summe 467.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 61; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 812.

Erläuterung der Längspalte 14.

| | |
|--|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 12 |
| In Kurorte bzw. Genesungsheime entsendet | 54 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 150 |
| Als halbinvalide entlassen | 25 |
| Als ganzinvalide entlassen | 170 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 190 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 52 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 12 |
| Summe | 665 |

Krankenrapport des XII. (1. K. S.) Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 19 988.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|--------|-------|----------|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 12500 | 121 | 25 | 146 | 2569 | 3931 | 562 | 7062 | 2681 | 3953 | 574 | 7208 | 6651 | 25 | 379 | 7055 | 135 | 18 | 153 | 80387 | 26743 | 107130 |
| Kavallerie | 2855 | 26 | 10 | 36 | 493 | 612 | 100 | 1205 | 517 | 620 | 104 | 1241 | 1137 | 3 | 54 | 1194 | 32 | 15 | 47 | 18391 | 6897 | 25288 |
| Feldartillerie | 2953 | 30 | 10 | 40 | 445 | 1003 | 165 | 1613 | 474 | 1013 | 166 | 1653 | 1533 | 5 | 70 | 1608 | 34 | 11 | 45 | 18656 | 9027 | 27683 |
| Pioniere | 596 | 8 | 2 | 10 | 94 | 90 | 25 | 209 | 102 | 92 | 25 | 219 | 190 | — | 18 | 208 | 9 | 2 | 11 | 3789 | 1018 | 4807 |
| Train | 385 | 1 | — | 1 | 60 | 255 | 37 | 352 | 61 | 255 | 37 | 353 | 327 | — | 21 | 348 | 4 | 1 | 5 | 2547 | 1882 | 4429 |
| Militärkrankenwärter | 58 | 1 | — | 1 | 15 | 2 | — | 17 | 16 | 2 | — | 18 | 15 | — | 2 | 17 | 1 | — | 1 | 446 | 29 | 475 |
| Landwehrstämme | 181 | — | 2 | 2 | 9 | 16 | 5 | 30 | 9 | 18 | 5 | 32 | 31 | — | — | 31 | — | 1 | 1 | 300 | 190 | 490 |
| Bekleidungsamt | 249 | 3 | — | 3 | 34 | 100 | 18 | 152 | 36 | 100 | 19 | 155 | 142 | — | 9 | 151 | 4 | — | 4 | 1959 | 669 | 2628 |
| Festungsgefängnis | 96 | 1 | 2 | 3 | 23 | 101 | 8 | 132 | 23 | 103 | 9 | 135 | 127 | 1 | 4 | 132 | 3 | — | 3 | 1158 | 453 | 1611 |
| Arbeiter-Abteilung | 43 | 2 | — | 2 | 17 | 46 | 7 | 70 | 19 | 46 | 7 | 72 | 68 | — | 2 | 70 | 2 | — | 2 | 741 | 215 | 956 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 42 | 1 | — | 1 | 8 | 5 | 2 | 15 | 9 | 5 | 2 | 16 | 15 | — | 1 | 16 | — | — | — | 275 | 50 | 325 |
| Sonstige | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summe | 19968 | 194 | 51 | 245 | 3767 | 6161 | 929 | 10857* | 3947 | 6207 | 948 | 11102 | 10236 | 34† | 560 | 10830 | 224 | 48 | 272 | 128649 | 47173 | 175822 |
| Inaktive Mannschaften | — | 1 | — | 1 | 25 | — | — | 25 | 26 | — | — | 26 | 2 | — | 22 | 24 | 2 | — | 2 | 465 | — | 465 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 10857 Kranken waren 6394 unausgebildete und 4463 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl ist 1 Verunglückter enthalten, welcher in militärärztlicher Behandlung gestorben ist. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 33.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind
a) gestorben durch Krankheit 3, Unglücksfall 6, Selbstmord 7, Summe 16;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 74, halbinvalide 73, ganzinvalide 32, Summe 179.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 50; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 499.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 5 |
| In Kurorte bzw. Genesungsheime entsendet | 172 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 128 |
| Als halbinvalide entlassen | 26 |
| Als ganzinvalide entlassen | 166 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 30 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 27 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 6 |
| Summe | 560 |

Krankenrapport des XIII. (K. W.) Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 22 123.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | |
|--------------------------|-----------|---------------|--------|-------|----------|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie . . . | 15070 | 155 | 27 | 182 | 2635 | 7756 | 1062 | 11453 | 2789 | 7781 | 1065 | 11635 | 10726 | 21 | 693 | 11440 | 173 | 22 | 195 | 104741 | 43618 | 148359 |
| Kavallerie | 2737 | 33 | 4 | 37 | 632 | 1492 | 201 | 2325 | 665 | 1496 | 201 | 2362 | 2177 | 5 | 128 | 2310 | 46 | 6 | 52 | 24869 | 9708 | 34577 |
| Feldartillerie . . . | 2742 | 19 | 7 | 26 | 536 | 1420 | 188 | 2144 | 554 | 1425 | 191 | 2170 | 2003 | 8 | 120 | 2131 | 34 | 5 | 39 | 21163 | 8969 | 30132 |
| Pioniere | 512 | 9 | — | 9 | 161 | 255 | 59 | 475 | 170 | 255 | 59 | 484 | 439 | 2 | 31 | 472 | 10 | 2 | 12 | 5096 | 1732 | 6828 |
| Train | 340 | 2 | — | 2 | 78 | 159 | 19 | 256 | 80 | 159 | 19 | 258 | 243 | — | 11 | 254 | 3 | 1 | 4 | 1947 | 972 | 2919 |
| Militärkrankenwärter . | 71 | — | — | — | 21 | 24 | 3 | 48 | 21 | 24 | 3 | 48 | 44 | — | 4 | 48 | — | — | — | 429 | 143 | 572 |
| Landwehrstämme . . . | 348 | — | — | — | 26 | 92 | 5 | 123 | 26 | 92 | 5 | 123 | 109 | 1 | 9 | 119 | 2 | 2 | 4 | 678 | 1410 | 2088 |
| Bekleidungsamt . . . | 195 | 3 | — | 3 | 49 | 89 | 10 | 148 | 52 | 89 | 10 | 151 | 136 | 1 | 9 | 146 | 4 | 1 | 5 | 1375 | 393 | 1768 |
| Festungsgefängnis . . | 50 | — | — | — | 19 | 14 | 3 | 36 | 19 | 14 | 3 | 36 | 28 | — | 7 | 35 | 1 | — | 1 | 613 | 116 | 729 |
| Arbeiter-Abteilung . . | 12 | — | — | — | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | — | 2 | 6 | 1 | — | 1 | 153 | 10 | 163 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 46 | — | — | — | 11 | 6 | 2 | 19 | 11 | 6 | 2 | 19 | 18 | — | 1 | 19 | — | — | — | 334 | 43 | 377 |
| Summe | 22123 | 221 | 38 | 259 | 4172 | 11308 | 1554 | 17034* | 4391 | 11342 | 1560 | 17293 | 15927 | 38† | 1015 | 16980 | 274 | 39 | 313 | 161398 | 67114 | 228512 |
| Inaktive Mannschaften | — | 2 | — | 2 | 48 | — | — | 48 | 50 | — | — | 50 | 11 | — | 37 | 48 | 2 | — | 2 | 588 | — | 588 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 17034 Kranken waren 10208 unausgebildete und 6826 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 7 Verunglückte und 3 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 28.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

a) gestorben durch Krankheit 1, Unglücksfall 2, Selbstmord 10, Summe 13;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 208, halbinvalide 126, ganzinvalide 154, Summe 488.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 51; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 899.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|---|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 19 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 198 |
| Den Zivilbehörden überwiesen | 1 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 258 |
| Als halbinvalide entlassen | 18 |
| Als ganzinvalide entlassen | 135 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 276 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 87 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 23 |

Summe 1015

Krankenrapport des XIV. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 31 827.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------|-------|----------|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 21456 | 180 | 68 | 248 | 4073 | 7590 | 991 | 12654 | 4252 | 7650 | 1000 | 12902 | 12037 | 32 | 554 | 12623 | 222 | 57 | 279 | 130545 | 54523 | 185068 |
| Kavallerie | 3001 | 46 | 12 | 58 | 725 | 1010 | 101 | 1836 | 771 | 1021 | 102 | 1894 | 1777 | 6 | 71 | 1854 | 33 | 7 | 40 | 21146 | 8052 | 29198 |
| Feldartillerie | 3632 | 32 | 7 | 39 | 724 | 1359 | 177 | 2260 | 756 | 1366 | 177 | 2299 | 2185 | 4 | 69 | 2258 | 37 | 4 | 41 | 23851 | 10548 | 34399 |
| Fufsartillerie | 1174 | 13 | 2 | 15 | 283 | 202 | 41 | 526 | 295 | 204 | 42 | 541 | 494 | — | 36 | 530 | 9 | 2 | 11 | 8537 | 1801 | 10338 |
| Pioniere | 634 | 10 | 2 | 12 | 165 | 244 | 24 | 433 | 175 | 246 | 24 | 445 | 414 | — | 29 | 443 | 2 | — | 2 | 5757 | 1761 | 7518 |
| Train | 401 | — | 3 | 3 | 51 | 303 | 35 | 389 | 51 | 306 | 35 | 392 | 369 | 1 | 17 | 387 | 3 | 2 | 5 | 2620 | 2637 | 5257 |
| Maschinengewehr- Abteilung | 137 | 1 | — | 1 | 43 | 72 | 6 | 121 | 44 | 72 | 6 | 122 | 115 | 1 | 3 | 119 | 1 | 2 | 3 | 1035 | 460 | 1495 |
| Militärkrankenwärter . | 76 | 1 | — | 1 | 22 | 9 | 5 | 36 | 23 | 9 | 5 | 37 | 31 | — | 4 | 35 | 2 | — | 2 | 748 | 101 | 849 |
| Landwehrstämme . . . | 295 | 1 | — | 1 | 28 | 48 | 4 | 80 | 29 | 48 | 4 | 81 | 76 | — | 5 | 81 | — | — | — | 814 | 623 | 1437 |
| Bekleidungsamt . . . | 148 | 2 | — | 2 | 44 | 38 | 8 | 90 | 46 | 38 | 8 | 92 | 84 | — | 2 | 86 | 6 | — | 6 | 1743 | 226 | 1969 |
| Unteroffizierschule . . | 645 | 9 | 2 | 11 | 90 | 284 | 71 | 445 | 98 | 286 | 72 | 456 | 416 | 1 | 16 | 433 | 15 | 8 | 23 | 4070 | 2625 | 6695 |
| Festungsgefängnis . . | 142 | 2 | — | 2 | 26 | 130 | 12 | 168 | 28 | 130 | 12 | 170 | 163 | — | 2 | 165 | 5 | — | 5 | 1011 | 601 | 1612 |
| Unteroffiziersvorschule . | 32 | — | — | — | 2 | 20 | 1 | 23 | 2 | 20 | 1 | 23 | 22 | — | 1 | 23 | — | — | — | 68 | 168 | 236 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 54 | 1 | — | 1 | 10 | 10 | — | 20 | 11 | 10 | — | 21 | 21 | — | — | 21 | — | — | — | 262 | 31 | 293 |
| Summe | 31827 | 298 | 96 | 394 | 6286 | 11319 | 1476 | 19081* | 6581 | 11406 | 1488 | 19475 | 18204 | 45† | 809 | 19058 | 335 | 82 | 417 | 202207 | 84157 | 286364 |
| Inaktive Mannschaften | — | 1 | — | 1 | 45 | — | — | 45 | 46 | — | — | 46 | 7 | — | 37 | 44 | 2 | — | 2 | 767 | — | 767 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 19081 Kranken waren 11064 unausgebildete und 8017 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 2 Verunglückte und 3 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 40.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

a) gestorben durch Krankheit 3, Unglücksfall 4, Selbstmord 10, Summe 17;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 230, halbinvalide 176, ganzinvalide 132, Summe 538.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 62; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 974.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 11 |
| In Kurorte bzw. Genesungsheime entsendet | 96 |
| Den Zivilbehörden überwiesen | 1 |
| An Irrenanstalten überwiesen | 1 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 195 |
| Als halbinvalide entlassen | 30 |
| Als ganzinvalide entlassen | 211 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 211 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 47 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 6 |
| Summe | 809 |

Krankenreport des XV. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 31228.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------|-------|----------|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 20385 | 233 | 40 | 273 | 3672 | 7465 | 943 | 12080 | 3903 | 7502 | 948 | 12353 | 11460 | 9 | 631 | 12100 | 209 | 44 | 253 | 131620 | 45085 | 176705 |
| Kavallerie | 3040 | 43 | 8 | 51 | 704 | 769 | 140 | 1613 | 747 | 776 | 141 | 1664 | 1510 | 5 | 106 | 1621 | 36 | 7 | 43 | 25281 | 5526 | 30807 |
| Feldartillerie | 3075 | 33 | 4 | 37 | 577 | 1125 | 197 | 1899 | 606 | 1127 | 203 | 1936 | 1809 | 7 | 91 | 1907 | 21 | 8 | 29 | 21873 | 7566 | 29439 |
| Fußartillerie | 2352 | 22 | 4 | 26 | 573 | 817 | 131 | 1521 | 593 | 821 | 133 | 1547 | 1421 | 8 | 90 | 1519 | 27 | 1 | 28 | 21351 | 5044 | 26395 |
| Pioniere | 1188 | 24 | 4 | 28 | 441 | 552 | 118 | 1111 | 465 | 556 | 118 | 1139 | 1050 | 1 | 70 | 1121 | 17 | 1 | 18 | 15895 | 2970 | 18865 |
| Train | 379 | 9 | — | 9 | 206 | 112 | 13 | 331 | 215 | 112 | 13 | 340 | 323 | 1 | 12 | 336 | 4 | — | 4 | 5330 | 675 | 6005 |
| Maschinengewehr- Abteilung | 134 | — | — | — | 22 | 24 | 2 | 48 | 22 | 24 | 2 | 48 | 47 | — | 1 | 48 | — | — | — | 564 | 168 | 732 |
| Militärkrankenwärter . | 79 | — | — | — | 27 | 6 | 3 | 36 | 27 | 6 | 3 | 36 | 35 | — | — | 35 | 1 | — | 1 | 804 | 49 | 853 |
| Landwehrstämme. . . . | 156 | 2 | — | 2 | 11 | 17 | 3 | 31 | 13 | 17 | 3 | 33 | 31 | 1 | 1 | 33 | — | — | — | 237 | 179 | 416 |
| Bekleidungsamt | 252 | 2 | — | 2 | 68 | 96 | 20 | 184 | 70 | 96 | 20 | 186 | 175 | — | 7 | 182 | 4 | — | 4 | 2354 | 538 | 2892 |
| Festungsgefängnis . . . | 138 | 12 | 3 | 15 | 87 | 91 | 35 | 213 | 99 | 94 | 35 | 228 | 206 | — | 8 | 214 | 12 | 2 | 14 | 4364 | 576 | 4940 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 50 | — | — | — | 12 | 5 | — | 17 | 12 | 5 | — | 17 | 16 | — | 1 | 17 | — | — | — | 404 | 26 | 430 |
| Summe | 31228 | 380 | 63 | 443 | 6400 | 11079 | 1605 | 19084* | 6772 | 11136 | 1619 | 19527 | 18083 | 32† | 1018 | 19133 | 331 | 63 | 394 | 230077 | 68402 | 298479 |
| Inaktive Mannschaften | — | 1 | — | 1 | 19 | — | — | 19 | 20 | — | — | 20 | 4 | — | 15 | 19 | 1 | — | 1 | 764 | — | 764 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 19084 Kranken waren 11082 unausgebildete und 8002 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 4 Verunglückte enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 28.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

- a) gestorben durch Krankheit —, Unglücksfall 5, Selbstmord 9, Summe 14;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 309, halbinvalide 201, ganzinvalide 179, Summe 689.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 46; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 1048.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 22 |
| In Kurorte bzw. Genesungsheime entsendet | 182 |
| Den Zivilbehörden überwiesen | 1 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 189 |
| Als halbinvalide entlassen | 14 |
| Als ganzinvalide entlassen | 156 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 383 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 71 |

Summe 1018

Krankenrapport des XVI. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 27308.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungs- tage | | |
|--------------------------|-----------|------------------|--------|-------|----------|--------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------------|--------|-------|----------------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 18171 | 167 | 84 | 251 | 3744 | 6718 | 1023 | 11485 | 3901 | 6795 | 1040 | 11736 | 10853 | 19 | 623 | 11495 | 183 | 58 | 241 | 107663 | 49557 | 157220 |
| Kavallerie | 2910 | 52 | 7 | 59 | 725 | 1235 | 149 | 2109 | 772 | 1238 | 158 | 2168 | 1994 | 8 | 113 | 2115 | 37 | 16 | 53 | 21120 | 9066 | 30186 |
| Feldartillerie | 2795 | 37 | 9 | 46 | 646 | 1488 | 179 | 2313 | 682 | 1497 | 180 | 2359 | 2183 | 6 | 124 | 2313 | 35 | 11 | 46 | 21184 | 12036 | 33220 |
| Fußartillerie | 1429 | 7 | 3 | 10 | 329 | 799 | 160 | 1288 | 336 | 802 | 160 | 1298 | 1199 | 2 | 78 | 1279 | 15 | 4 | 19 | 11381 | 6332 | 17713 |
| Pioniere | 1229 | 30 | 7 | 37 | 367 | 668 | 114 | 1149 | 394 | 675 | 117 | 1186 | 1128 | 3 | 41 | 1172 | 11 | 3 | 14 | 10076 | 4533 | 14609 |
| Train | 389 | 3 | — | 3 | 26 | 277 | 20 | 323 | 29 | 277 | 20 | 326 | 318 | — | 6 | 324 | 2 | — | 2 | 1540 | 2460 | 4000 |
| Militärkrankenwärter . | 84 | 1 | — | 1 | 31 | 17 | 5 | 53 | 32 | 17 | 5 | 54 | 50 | — | 4 | 54 | — | — | — | 609 | 151 | 760 |
| Landwehrstämme . . . | 134 | 1 | — | 1 | 7 | 16 | 2 | 25 | 8 | 16 | 2 | 26 | 25 | — | — | 25 | 1 | — | 1 | 103 | 333 | 436 |
| Bekleidungsamt . . . | 115 | 5 | — | 5 | 19 | 45 | 9 | 73 | 23 | 45 | 10 | 78 | 68 | — | 9 | 77 | 1 | — | 1 | 831 | 266 | 1097 |
| Kriegsschule | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 51 | — | — | — | 10 | 9 | — | 19 | 10 | 9 | — | 19 | 19 | — | — | 19 | — | — | — | 247 | 67 | 314 |
| Summe | 27308 | 303 | 110 | 413 | 5904 | 11272 | 1661 | 18837* | 6187 | 11371 | 1692 | 19250 | 17837 | 38† | 998 | 18873 | 285 | 92 | 377 | 174754 | 84801 | 259555 |
| Inaktive Mannschaften | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 97 | — | 97 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 18837 Kranken waren 10736 unausgebildete und 8101 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 3 Verunglückte und 2 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 33.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

- a) gestorben durch Krankheit 2, Unglücksfall 4, Selbstmord 15, Summe 21;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 252, halbinvalide 170, ganzinvalide 142, Summe 564.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 59; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 1000.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 5 |
| In Kurorte bzw. Genesungsheime entsendet | 142 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 192 |
| Als halbinvalide entlassen | 30 |
| Als ganzinvalide entlassen | 214 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 349 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 61 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 5 |
| Summe | 998 |

Krankenrapport des XVII. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 29609.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungs- tage | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 18182 | 231 ¹⁾ | 10 ¹⁾ | 331 ¹⁾ | 2941 | 5596 | 1028 | 9565 | 3084 | 5621 | 1132 | 9837 | 9119 | 25 | 417 | 9561 | 151 ¹⁾ | 21 ¹⁾ | 361 ¹⁾ | 111398 | 50053 | 161451 |
| Kavallerie | 3499 | 38 | 6 | 44 | 572 | 994 | 243 | 1809 | 597 | 998 | 258 | 1853 | 1703 | 5 | 81 | 1789 | 47 | 17 | 64 | 23833 | 10788 | 34621 |
| Feldartillerie | 3001 | 49 | 5 | 54 | 689 | 943 | 172 | 1804 | 730 | 948 | 180 | 1858 | 1716 | 5 | 96 | 1817 | 34 | 7 | 41 | 22345 | 7931 | 30276 |
| Fufsartillerie | 2603 | 9 | 5 | 14 | 403 | 619 | 127 | 1149 | 402 | 622 | 139 | 1163 | 1104 | 1 | 36 | 1141 | 19 | 3 | 22 | 16216 | 6539 | 22755 |
| Pioniere | 587 | 8 | 1 | 9 | 77 | 131 | 34 | 242 | 81 | 131 | 39 | 251 | 224 | — | 13 | 237 | 9 | 5 | 14 | 3283 | 1448 | 4731 |
| Train | 342 | 5 | 2 | 7 | 62 | 98 | 19 | 179 | 67 | 100 | 19 | 186 | 171 | — | 9 | 180 | 6 | — | 6 | 2355 | 983 | 3338 |
| Maschinengewehr- Abteilung | 65 | — | — | — | 17 | 21 | 4 | 42 | 17 | 21 | 4 | 42 | 40 | — | 1 | 41 | 1 | — | 1 | 459 | 233 | 692 |
| Militärkrankenwärter . | 72 | 3 | — | 3 | 17 | 11 | 8 | 36 | 20 | 11 | 8 | 39 | 31 | — | 4 | 35 | 4 | — | 4 | 1128 | 293 | 1421 |
| Landwehrstämme . . . | 238 | 2 | — | 2 | 21 | 20 | 2 | 43 | 23 | 20 | 2 | 45 | 42 | 1 | 1 | 44 | — | 1 | 1 | 623 | 207 | 830 |
| Bekleidungsamt . . . | 107 | 4 | — | 4 | 27 | 40 | 7 | 74 | 31 | 40 | 7 | 78 | 71 | 1 | 3 | 75 | 3 | — | 3 | 706 | 291 | 997 |
| Unteroffizierschule . . | 670 | 6 | 1 | 7 | 113 | 73 | 15 | 201 | 119 | 74 | 15 | 208 | 187 | 1 | 11 | 199 | 9 | — | 9 | 2761 | 649 | 3410 |
| Festungsgefängnisse . . | 197 | 9 | 2 | 11 | 76 | 65 | 6 | 147 | 79 | 67 | 12 | 158 | 143 | — | 10 | 153 | 2 | 3 | 5 | 2005 | 747 | 2752 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 46 | — | — | — | 6 | 3 | — | 9 | 6 | 3 | — | 9 | 8 | — | 8 | 1 | — | 1 | 195 | 43 | 238 | |
| Summe | 29609 | 231 ¹⁾ | 10 ¹⁾ | 331 ¹⁾ | 5021 | 8614 | 1665 | 15300* | 5256 | 8656 | 1815 | 15727 | 14559 | 39† | 682 | 15280 | 363 | 81 | 444 | 187307 | 80205 | 267512 |
| Inaktive Mannschaften | — | 7 | — | 7 | 86 | — | — | 86 | 93 | — | — | 93 | 14 | 2 | 73 | 89 | 4 | — | 4 | 2004 | — | 2004 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 15300 Kranken waren 8657 unausgebildete und 6643 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 3 Verunglückte und 2 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 34.

Aufserhalb der militärärztlichen Behandlung sind

a) gestorben durch Krankheit 6, Unglücksfall 2, Selbstmord 15, Summe 23;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 190, halbinvalide 191, ganzinvalide 193, Summe 574.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und aufserhalb militärärztlicher Behandlung) 62; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und aufserhalb militärärztlicher Behandlung) 889.

1) Siehe Anmerkung 1) auf Seite 4*.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|--|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 3 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 36 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 120 |
| Als halbinvalide entlassen | 11 |
| Als ganzinvalide entlassen | 184 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditäts- verfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 298 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 31 |
| Summe | 682 |

Krankenrapport des XVIII. Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 26286.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im g a n z e n sind behandelt | | | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungs- tage | | |
|---------------------------|-----------|------------------|--------|-------|----------|--------|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------------|--------|-------|----------------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 17372 | 150 | 35 | 185 | 3479 | 5977 | 889 | 10345 | 3619 | 6011 | 900 | 10530 | 9677 | 27 | 619 | 10323 | 166 | 41 | 207 | 101744 | 40524 | 142268 |
| Kavallerie | 2803 | 26 | 11 | 37 | 584 | 842 | 156 | 1582 | 606 | 852 | 161 | 1619 | 1476 | 5 | 95 | 1576 | 30 | 13 | 43 | 16408 | 6450 | 22858 |
| Feldartillerie | 2779 | 21 | 5 | 26 | 692 | 1283 | 169 | 2144 | 712 | 1287 | 171 | 2170 | 2042 | 6 | 90 | 2138 | 24 | 8 | 32 | 19014 | 7718 | 26732 |
| Fufsartillerie | 1187 | 11 | — | 11 | 323 | 326 | 30 | 679 | 334 | 326 | 30 | 690 | 625 | 1 | 55 | 681 | 9 | — | 9 | 9214 | 2359 | 11573 |
| Pioniere | 600 | 6 | 1 | 7 | 197 | 386 | 51 | 634 | 203 | 387 | 51 | 641 | 611 | — | 23 | 634 | 7 | — | 7 | 5781 | 2621 | 8402 |
| Train | 397 | 3 | — | 3 | 106 | 274 | 31 | 411 | 109 | 274 | 31 | 414 | 403 | — | 6 | 409 | 5 | — | 5 | 2387 | 1880 | 4267 |
| Militärkrankenwärter . | 74 | — | — | — | 29 | 14 | — | 43 | 29 | 14 | — | 43 | 38 | — | 4 | 42 | 1 | — | 1 | 520 | 79 | 599 |
| Landwehrstämme. . . | 332 | 3 | — | 3 | 36 | 48 | 9 | 93 | 39 | 48 | 9 | 96 | 84 | 1 | 9 | 94 | 2 | — | 2 | 1195 | 547 | 1742 |
| Unteroffizierschule . . | 587 | 4 | 1 | 5 | 108 | 254 | 28 | 390 | 112 | 255 | 28 | 395 | 372 | 2 | 18 | 392 | 2 | 1 | 3 | 3129 | 2081 | 5210 |
| Arbeiter-Abteilung . . | 84 | 1 | 2 | 3 | 84 | 38 | 14 | 136 | 85 | 40 | 14 | 139 | 121 | — | 9 | 130 | 8 | 1 | 9 | 1911 | 262 | 2173 |
| Unteroffiziersvorschule . | 28 | — | — | — | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | — | — | 7 | — | — | — | 41 | 21 | 62 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 43 | — | — | — | 16 | 9 | 1 | 26 | 16 | 9 | 1 | 26 | 25 | — | 1 | 26 | — | — | — | 459 | 95 | 554 |
| Summe | 26286 | 225 | 55 | 280 | 5657 | 9454 | 1379 | 16490* | 5867 | 9506 | 1397 | 16770 | 15481 | 42† | 929 | 16452 | 254 | 64 | 318 | 161803 | 64637 | 226440 |
| Inaktive Mannschaften | — | 1 | — | 1 | 53 | — | — | 53 | 54 | — | — | 54 | 5 | — | 44 | 49 | 5 | — | 5 | 687 | — | 687 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 16490 Kranken waren 9395 unausgebildete und 7095 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 2 Verunglückte und 2 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 38.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

- a) gestorben durch Krankheit 1, Unglücksfall 4, Selbstmord 11, Summe 16;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 258, halbinvalide 204, ganzinvalide 137, Summe 599.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 58; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 980.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|---|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 23 |
| In Kurorte bzw. Genesungsheime entsendet | 164 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 204 |
| Als halbinvalide entlassen | 30 |
| Als ganzinvalide entlassen | 147 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bzw. Invaliditäts- verfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 262 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 77 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 22 |
| Summe | 929 |

Krankenrapport des XIX. (2. K. S.) Armeekorps.

Iststärke des Armeekorps: 20592.

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | |
|---------------------------|-----------|---------------|--------|-------|----------|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|--------|
| | | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | Lazarett | Revier | Lazarett und Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | Lazarett | Revier | Summe | Lazarett | Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Infanterie | 13266 | 113 | 27 | 140 | 2586 | 4536 | 666 | 7788 | 2696 | 4562 | 670 | 7928 | 7307 | 12 | 405 | 7724 | 176 | 28 | 204 | 83861 | 29694 | 113555 |
| Kavallerie | 1540 | 16 | 5 | 21 | 357 | 483 | 109 | 949 | 371 | 488 | 111 | 970 | 893 | 3 | 43 | 939 | 24 | 7 | 31 | 9776 | 4879 | 14655 |
| Feldartillerie | 2571 | 25 | 4 | 29 | 593 | 574 | 90 | 1257 | 617 | 578 | 91 | 1286 | 1165 | 2 | 85 | 1252 | 30 | 4 | 34 | 17138 | 5314 | 22452 |
| Fufsartillerie | 1289 | 11 | 2 | 13 | 311 | 659 | 138 | 1108 | 322 | 661 | 138 | 1121 | 1059 | — | 47 | 1106 | 13 | 2 | 15 | 9129 | 4468 | 13597 |
| Pioniere | 578 | 6 | — | 6 | 125 | 157 | 49 | 331 | 129 | 157 | 51 | 337 | 315 | 1 | 15 | 331 | 5 | 1 | 6 | 4107 | 2281 | 6388 |
| Train | 374 | 5 | 1 | 6 | 63 | 79 | 15 | 157 | 68 | 80 | 15 | 163 | 143 | — | 17 | 160 | 3 | — | 3 | 2058 | 714 | 2772 |
| Militärkrankenwärter . | 61 | — | — | — | 20 | 2 | 2 | 24 | 20 | 2 | 2 | 24 | 23 | — | 1 | 24 | — | — | — | 346 | 26 | 372 |
| Landwehrstämme. . . | 277 | 2 | — | 2 | 29 | 22 | 2 | 53 | 31 | 22 | 2 | 55 | 48 | 1 | 4 | 53 | 2 | — | 2 | 830 | 231 | 1061 |
| Bekleidungsamt . . . | 270 | 2 | 1 | 3 | 51 | 33 | 4 | 88 | 53 | 34 | 4 | 91 | 76 | — | 10 | 86 | 4 | 1 | 5 | 1725 | 228 | 1953 |
| Unteroffizierschule . . | 287 | 2 | 1 | 3 | 36 | 99 | 3 | 138 | 38 | 100 | 3 | 141 | 134 | — | 4 | 138 | 2 | 1 | 3 | 539 | 783 | 1322 |
| Unteroffiziersvorschule . | 39 | 1 | — | 1 | 1 | 5 | — | 6 | 2 | 5 | — | 7 | 6 | — | 1 | 7 | — | — | — | 82 | 41 | 123 |
| Militär-Bäcker-Abteilung | 40 | — | — | — | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | — | 6 | 6 | 1 | — | 1 | 142 | 15 | 157 |
| Summe | 20592 | 183 | 41 | 224 | 4177 | 6650 | 1079 | 11906* | 4352 | 6690 | 1088 | 12130 | 11175 | 19† | 632 | 11826 | 260 | 44 | 304 | 129733 | 48674 | 178407 |
| Inaktive Mannschaften | — | — | — | — | 31 | — | — | 31 | 31 | — | — | 31 | 2 | 1 | 25 | 28 | 3 | — | 3 | 557 | — | 557 |

*) Unter den von den Truppenteilen u.s.w. in Zugang gekommenen 11906 Kranken waren 7328 unausgebildete und 4578 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 1 Verunglückter und 1 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 17.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

a) gestorben durch Krankheit —, Unglücksfall 4, Selbstmord 7, Summe 11;
b) entlassen als dienstunbrauchbar 147, halbinvalide 89, ganzinvalide 106, Summe 342.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 30; Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 536.

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|---|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 4 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 161 |
| An Irrenanstalten überwiesen | 3 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 90 |
| Als halbinvalide entlassen | 7 |
| Als ganzinvalide entlassen | 97 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 208 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 60 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 2 |
| Summe | 632 |

2. Krankenreport der ganzen Armee für das

Gesamt-Iststärke

| Truppengattungen | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | im Lazarett | im Revier | Summe | im Lazarett | im Revier | im Lazarett und Revier | Summe | im Lazarett | im Revier | im Lazarett und Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Infanterie | 337521 | 3652 | 874 | 4526 | 65292 | 119033 | 18099 | 202424 | 68681 | 119809 | 18460 | 206950 |
| Kavallerie | 59792 | 675 | 157 | 832 | 13153 | 22199 | 3271 | 38623 | 13756 | 22336 | 3363 | 39455 |
| Feldartillerie | 60515 | 691 | 138 | 829 | 12662 | 23655 | 3768 | 40085 | 13265 | 23753 | 3896 | 40914 |
| Fufsartillerie | 21053 | 158 | 29 | 187 | 4512 | 7903 | 1337 | 13752 | 4643 | 7923 | 1373 | 13939 |
| Pioniere | 14000 | 222 | 43 | 265 | 3617 | 6584 | 1075 | 11276 | 3827 | 6625 | 1089 | 11541 |
| Verkehrstruppen | 6134 | 45 | 9 | 54 | 1000 | 2244 | 273 | 3517 | 1044 | 2253 | 274 | 3571 |
| Train | 7695 | 76 | 20 | 96 | 1790 | 3822 | 500 | 6112 | 1865 | 3842 | 501 | 6208 |
| Maschinengewehr- Abteilungen | 746 | 2 | — | 2 | 144 | 285 | 25 | 454 | 146 | 285 | 25 | 456 |
| Militärkrankenwärter . . | 1414 | 12 | — | 12 | 415 | 213 | 50 | 678 | 426 | 213 | 51 | 690 |
| Landwehrstämme | 6217 | 47 | 12 | 59 | 527 | 1065 | 118 | 1710 | 572 | 1075 | 122 | 1769 |
| Bekleidungsämter | 3056 | 49 | 6 | 55 | 674 | 969 | 144 | 1787 | 721 | 973 | 148 | 1842 |
| Oberfeuerwerkerschule . . | 5 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| Artillerie-Prüfungs- Kommission | 256 | — | 1 | 1 | 46 | 58 | 6 | 110 | 46 | 59 | 6 | 111 |
| Unteroffizierschulen . . . | 4352 | 41 | 16 | 57 | 763 | 1678 | 230 | 2671 | 803 | 1694 | 231 | 2728 |
| Kriegsschulen | 7 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Festungsgefängnisse . . . | 1789 | 55 | 31 | 86 | 594 | 1154 | 210 | 1958 | 642 | 1185 | 217 | 2044 |
| Arbeiter-Abteilungen bz. Disziplinar-Abteilung | 419 | 21 | 5 | 26 | 275 | 344 | 58 | 677 | 296 | 349 | 58 | 703 |
| Kadettenanstalten | 44 | — | — | — | 4 | 7 | — | 11 | 4 | 7 | — | 11 |
| Unteroffiziersvorschulen | 244 | 2 | 2 | 4 | 9 | 79 | 5 | 93 | 11 | 81 | 5 | 97 |
| Militär-Bäcker- Abteilungen | 855 | 7 | — | 7 | 160 | 119 | 18 | 297 | 167 | 119 | 18 | 304 |
| Militär-Veterinär- Akademie | 141 | — | — | — | 12 | 3 | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 16 |
| Sonstige | 299 | 4 | — | 4 | 44 | 74 | 24 | 142 | 48 | 74 | 24 | 146 |
| Summe | 526554 | 5759 | 1343 | 7102 | 105693 | 191494 | 29212 | 326399* | 110975 | 192664 | 29862 | 333501 |
| Inaktive Mannschaften | — | 62 | — | 62 | 1065 | — | — | 1065 | 1127 | — | — | 1127 |

*) Unter den von den Truppenteilen u. s. w. in Zugang gekommenen 326 399 Kranken waren 188 443 unausgebildete und 137 956 ausgebildete Mannschaften.

†) In dieser Zahl sind 53 Verunglückte und 32 Selbstmörder enthalten, welche in militärärztlicher Behandlung gestorben sind. Mithin beträgt die Zahl der in der militärärztlichen Behandlung infolge von Krankheiten eingetretenen Todesfälle 660.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

a) gestorben durch Krankheit 29, Unglücksfall 86, Selbstmord 231, Summe 346;

b) entlassen als dienstunbrauchbar 4119, halbinvalide 3421, ganzinvalide 3236, Summe 10 776.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 1091.

Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 17 901.

Berichtsjahr vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903.

der Armee: 526554.

| Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | | Truppengattungen |
|-------------|-----------|-------------|--------|-----------------|-----------|-------|-----------------|-----------|---------|--|
| dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | im Lazarett | im Revier | Summe | im Lazarett | im Revier | Summe | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 191194 | 451 | 10765 | 202410 | 3709 | 831 | 4540 | 2131360 | 864279 | 2995639 | |
| 36645 | 100 | 1736 | 38481 | 750 | 224 | 974 | 412798 | 170329 | 583127 | Kavallerie |
| 38155 | 97 | 1816 | 40068 | 685 | 161 | 846 | 417209 | 181218 | 598427 | Feldartillerie |
| 13018 | 26 | 664 | 13708 | 201 | 30 | 231 | 153461 | 57164 | 210625 | Fußartillerie |
| 10785 | 21 | 511 | 11317 | 185 | 39 | 224 | 120390 | 51384 | 171774 | Pioniere |
| 3328 | 7 | 187 | 3522 | 42 | 7 | 49 | 34199 | 15811 | 50010 | Verkehrstruppen |
| 5832 | 10 | 269 | 6111 | 75 | 22 | 97 | 56967 | 30679 | 87646 | Train |
| 440 | 2 | 7 | 449 | 4 | 3 | 7 | 3793 | 1885 | 5678 | Maschinengewehr-Abteilungen |
| 626 | 5 | 39 | 670 | 20 | — | 20 | 9716 | 1862 | 11578 | Militärkrankenwärter |
| 1619 | 10 | 95 | 1724 | 28 | 17 | 45 | 15590 | 13703 | 29293 | Landwehrstämme |
| 1657 | 5 | 117 | 1779 | 58 | 5 | 63 | 21272 | 5984 | 27256 | Bekleidungsämter |
| 3 | — | — | 3 | — | 1 | 1 | — | 12 | 12 | Oberfeuerwerkerschule |
| 104 | — | 6 | 110 | 1 | — | 1 | 1266 | 239 | 1505 | Artillerie-Prüfungs-Kommission |
| 2563 | 6 | 91 | 2660 | 44 | 24 | 68 | 21334 | 12021 | 33355 | Unteroffizierschulen |
| 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | 27 | 27 | Kriegsschulen |
| 1847 | 5 | 116 | 1968 | 51 | 25 | 76 | 24344 | 10180 | 34524 | Festungsgefängnisse |
| 615 | — | 56 | 671 | 30 | 2 | 32 | 9192 | 1993 | 11185 | Arbeiter-Abteilungen bz. Disziplinar-Abteilung |
| 10 | — | — | 10 | — | 1 | 1 | 38 | 88 | 126 | Kadettenanstalten |
| 93 | — | 3 | 96 | — | 1 | 1 | 398 | 608 | 1006 | Unteroffiziersvorschulen |
| 284 | — | 11 | 295 | 9 | — | 9 | 4906 | 926 | 5832 | Militär-Bäcker-Abteilungen |
| 15 | — | 1 | 16 | — | — | — | 240 | 18 | 258 | Militär-Veterinär-Akademie |
| 135 | — | 5 | 140 | 3 | 3 | 6 | 1479 | 708 | 2187 | Sonstige |
| 308970 | 745† | 16495 | 326210 | 5895 | 1396 | 7291 | 3439952 | 1421118 | 4861070 | Summe |
| 170 | 11 | 890 | 1071 | 56 | — | 56 | 24118 | — | 24118 | Inaktive Mannschaften |

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|---|--------------|
| In die Heimat beurlaubt | 259 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 2611 |
| Den Zivilbehörden überwiesen | 7 |
| An Irrenanstalten überwiesen | 8 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 3044 |
| Als halbinvalide entlassen | 503 |
| Als ganzinvalide entlassen | 3578 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 5166 |
| Bei der Einstellung in den Militärdienst als dienstunbrauchbar erkannt und entlassen | 998 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 321 |
| Summe | 16495 |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang beim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage |
|--|--------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | dienstfähig | | |
| noch I. Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen. | 25 | Epidemische Genickstarre | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | 23 | 1 | 36 | 19 | 7 | 10 | 36 | — | 1359 | | |
| | 26 | Starrkrampf (Trismus, Tetanus) | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | — | 244 | | | |
| | 27 | Akuter Gelenkrheumatismus | 175 | 391 | 247 | 150 | 141 | 149 | 185 | 151 | 201 | 183 | 215 | 151 | 229 | 252 | 232 | 308 | 236 | 156 | 160 | 277 | 217 | 4281 | 3351 | 13 | 868 | 4232 | 224 | 182127 | | |
| | 28 | Chronischer Gelenkrheumatismus | 24 | 22 | 32 | 20 | 17 | 3 | 14 | 7 | 12 | 7 | 15 | 9 | 12 | 13 | 4 | 17 | 8 | 18 | 16 | 10 | 13 | 269 | 85 | — | 198 | 283 | 10 | 14901 | | |
| | 29 | Gicht | 2 | 3 | 5 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | 39 | 32 | — | 7 | 39 | 2 | 1053 | | |
| | 30 | Blutarmut . . | 12 | 58 | 25 | 20 | 21 | 15 | 26 | 25 | 35 | 39 | 13 | 27 | 16 | 9 | 16 | 23 | 43 | 33 | 20 | 38 | 16 | 518 | 358 | 1 | 156 | 515 | 15 | 13573 | | |
| | 31 und 32 | Purpura, Skorbut | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | — | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 60 | 50 | 1 | 11 | 62 | 1 | 2108 | | |
| | 33 | Zuckerruhr | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | 3 | 10 | 23 | 36 | — | 1345 | | |
| | 34 | Vergiftung durch (Alkohol (akut u. chronisch) Gase . . . andere Gifte | — | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 43 | 38 | — | 5 | 43 | — | 432 | | |
| | 35 | | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 7 | 6 | — | 1 | 7 | — | 242 | | |
| | 36 | | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 19 | — | 3 | 22 | 1 | 520 | | |
| | 37 | Trichinose . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 38 | Hitzschlag . . | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | — | 2 | — | 6 | 1 | — | 5 | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 74 | 70 | 6 | 2 | 78 | 2 | 683 | | |
| | 39 | Bösartige Geschwülste | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | — | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 6 | 14 | 18 | 38 | 2 | 2965 | | |
| 40 | Andere allgemeine Erkrankungen | 3 | 10 | 6 | 3 | — | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 12 | — | 32 | 126 | 79 | — | 20 | 99 | 30 | 2428 | | | |
| | Summe | 539 | 1260 | 1277 | 909 | 759 | 427 | 597 | 347 | 895 | 669 | 1019 | 572 | 882 | 856 | 977 | 791 | 777 | 655 | 593 | 727 | 524 | 15513 | 12686 | 297 | 2455 | 15438 | 614 | 433597 | | | |
| II. Krankheiten des Nervensystems. | 41 | Geisteskrankheiten | 43 | 18 | 28 | 20 | 13 | 27 | 16 | 12 | 15 | 46 | 18 | 20 | 20 | 18 | 30 | 30 | 28 | 12 | 30 | 25 | 18 | 444 | 12 | 4 | 439 | 455 | 32 | 26510 | | |
| | 42 | Fallsucht . . | 18 | 24 | 36 | 31 | 12 | 24 | 23 | 19 | 31 | 27 | 18 | 18 | 18 | 13 | 15 | 24 | 27 | 17 | 26 | 14 | 29 | 446 | 5 | 1 | 444 | 450 | 14 | 14466 | | |
| | 43 | Erkrankungen im Gebiete einzelner Nervenbahnen | 55 | 110 | 54 | 70 | 31 | 29 | 59 | 60 | 61 | 46 | 46 | 36 | 59 | 45 | 54 | 53 | 69 | 63 | 46 | 67 | 53 | 1111 | 946 | — | 174 | 1120 | 46 | 26080 | | |
| | 44 | Hirnhautentzündung | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 55 | 16 | 21 | 18 | 55 | 4 | 2324 | | |
| | 45 | Krankheiten des Gehirns | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 73 | 24 | 15 | 39 | 78 | 3 | 3349 | | |
| | 46 | Gehirn-(Rückenmark-) Erschütterung | 7 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 15 | 22 | 9 | 13 | 10 | 5 | 7 | 11 | 16 | 14 | 7 | 7 | 5 | 13 | 9 | 206 | 172 | 2 | 29 | 203 | 10 | 5644 | | |
| 47 | Tabes dorsalis | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 10 | 2 | — | 9 | 11 | 2 | 601 | | | |
| 48 | Andere Rückenmarkskrankheiten | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | 2 | — | 2 | 4 | 3 | — | — | — | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 3 | 32 | 37 | 1 | 2214 | | | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang beim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage |
|---|--------------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| noch II. Krankheiten des Nervensystems. | 49 | Progressive Muskelatrophie | — | — | 4 | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 14 | 4 | — | 9 | 13 | 1 | 565 |
| | 50 | Neurasthenie | 14 | 21 | 12 | 12 | 10 | 7 | 13 | 12 | 12 | 23 | 18 | 10 | 24 | 38 | 12 | 22 | 21 | 4 | 11 | 22 | 20 | 324 | 185 | — | 138 | 323 | 15 | 9600 |
| | 51 | Hysterie . . . | 17 | 27 | 14 | 9 | 10 | 15 | 1 | 10 | 5 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 25 | 17 | 13 | 16 | 13 | 285 | 109 | — | 179 | 288 | 14 | 12349 |
| | 52 | Andere Krankheiten des Nervensystems | 8 | 6 | 6 | 11 | 15 | 6 | 6 | 9 | 3 | 13 | 9 | 2 | 7 | 3 | 16 | 3 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 146 | 60 | 1 | 92 | 153 | 1 | 5022 |
| | | Summe | 186 | 238 | 176 | 175 | 103 | 119 | 150 | 147 | 145 | 201 | 143 | 110 | 154 | 147 | 158 | 183 | 193 | 128 | 145 | 179 | 149 | 3143 | 1537 | 47 | 1602 | 3186 | 143 | 108724 |
| III. Krankheiten der Atmungsorgane. | 53 | Krankheiten der Nase und Nebenhöhlen | 9 | 58 | 36 | 23 | 25 | 25 | 37 | 23 | 38 | 37 | 27 | 13 | 22 | 32 | 19 | 29 | 55 | 56 | 45 | 47 | 20 | 667 | 570 | — | 97 | 667 | 9 | 11385 |
| | 54 | Akuter Kehlkopf- und Luftröhrenkatarrh | 26 | 979 | 558 | 549 | 364 | 283 | 594 | 535 | 615 | 638 | 306 | 255 | 426 | 451 | 356 | 637 | 474 | 568 | 385 | 493 | 444 | 9910 | 9868 | — | 35 | 9903 | 33 | 76080 |
| | 55 | Andere Krankheiten der ersten Luftwege und Stimmwerkzeuge | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 49 | 17 | — | 31 | 48 | 6 | 2513 |
| | 56 | Akuter Bronchialkatarrh | 184 | 2391 | 1898 | 1146 | 848 | 899 | 1276 | 1198 | 1197 | 1510 | 1045 | 980 | 1124 | 819 | 1423 | 1669 | 1541 | 1413 | 1308 | 1414 | 833 | 25932 | 25597 | 1 | 285 | 25883 | 233 | 268877 |
| | 57 | Chronischer Katarrh der Luftwege | 83 | 92 | 69 | 66 | 39 | 47 | 55 | 52 | 61 | 104 | 54 | 43 | 47 | 25 | 57 | 102 | 79 | 133 | 67 | 70 | 19 | 1281 | 210 | 1 | 1096 | 1307 | 57 | 55661 |
| | 58 | Akute Lungenentzündung | 108 | 220 | 248 | 219 | 144 | 147 | 183 | 165 | 159 | 150 | 169 | 163 | 91 | 189 | 84 | 122 | 149 | 144 | 228 | 105 | 161 | 3240 | 2460 | 136 | 638 | 3234 | 114 | 122094 |
| | 59 | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes | 13 | 17 | 18 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | 12 | 9 | 159 | 12 | 2 | 139 | 153 | 19 | 7806 |
| | 60 | Brustfellentzündung und Ausgänge | 207 | 312 | 140 | 106 | 95 | 52 | 97 | 68 | 104 | 83 | 91 | 88 | 100 | 75 | 70 | 121 | 55 | 90 | 105 | 86 | 42 | 1980 | 1134 | 28 | 830 | 1992 | 195 | 102377 |
| | 61 | Lungenvergrößerung | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 5 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | — | 80 | 18 | — | 66 | 84 | — | 2115 |
| | 62 | Asthma . . . | 2 | 7 | 4 | — | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 49 | 19 | — | 29 | 48 | 3 | 919 |
| 63 | Andere Krankheiten der Atmungsorgane | — | 1 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1 | 430 | |
| | Summe | 641 | 4084 | 2986 | 2120 | 1525 | 1464 | 2263 | 2056 | 2196 | 2538 | 1705 | 1557 | 1825 | 1595 | 2027 | 2699 | 2372 | 2421 | 2155 | 2242 | 1531 | 43361 | 39906 | 172 | 3254 | 43332 | 670 | 650257 | |
| IV. Krankheiten d. Kreislaufs- und blutbereitenden Organe | 64 | Entzündung des Herzbeutels | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 36 | 4 | 4 | 24 | 32 | 6 | 2066 |
| | 65 | Idiopathische Herzvergrößerung | 6 | 5 | — | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 17 | 3 | 14 | 8 | 6 | 6 | — | 11 | 1 | 124 | 20 | 1 | 98 | 119 | 11 | 3474 |
| | 66 | Erkrankung der Herzklappen | 36 | 40 | 18 | 7 | 21 | 29 | 24 | 34 | 23 | 38 | 8 | 22 | 21 | 28 | 26 | 32 | 50 | 29 | 27 | 47 | 37 | 561 | 16 | 11 | 551 | 578 | 19 | 20669 |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang beim | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------|
| | | | | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | Summe | dienstfähig | | | gestorben | anderweitig | Summe |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| noch IV. Krankheiten der Kreislaufs- und blutbereitenden Organe. | 67 | Nervöse Störung der Herztätigkeit | 39 | 60 | 18 | 27 | 15 | 21 | 15 | 42 | 53 | 53 | 18 | 37 | 47 | 13 | 53 | 36 | 33 | 24 | 31 | 59 | 21 | 676 | 209 | — | 491 | 700 | 15 | 18997 |
| | 68 | Andere Herzkrankheiten | 5 | 17 | 7 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 16 | — | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 125 | 28 | 5 | 86 | 119 | 11 | 3991 |
| | 69 | Pulsadergeschwulst | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 1 | — | 3 | 4 | — | 304 |
| | 70 | Hämorrhoiden | 11 | 28 | 17 | 17 | 19 | 14 | 11 | 19 | 18 | 30 | 15 | 13 | 14 | 18 | 21 | 28 | 27 | 29 | 18 | 36 | 19 | 411 | 405 | — | 9 | 414 | 8 | 5849 |
| | 71 | Krampfadern | 11 | 54 | 24 | 23 | 20 | 9 | 18 | 5 | 22 | 41 | 15 | 25 | 13 | 10 | 18 | 17 | 26 | 41 | 28 | 10 | 9 | 428 | 311 | — | 119 | 430 | 9 | 4836 |
| | 72 | Venenentzündung | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | — | — | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | — | 1 | — | 3 | 1 | 43 | 34 | — | 11 | 45 | 2 | 1705 |
| | 73 bis 75 | Erkrankung der Lymphgefäße und Lymphdrüsen | 100 | 366 | 214 | 201 | 132 | 160 | 133 | 162 | 205 | 348 | 151 | 171 | 191 | 136 | 212 | 264 | 282 | 295 | 185 | 232 | 132 | 4172 | 4049 | 2 | 127 | 4178 | 94 | 77755 |
| | 76 | Kropf | 5 | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 65 | 39 | — | 24 | 63 | 7 | 2132 |
| | 77 | Leukämie . . | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 6 | — | 3 | 4 | 7 | — | 556 |
| | 78 | Perniziöse Anämie | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 163 |
| 79 | Andere Krankheiten der Gruppe IV. | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 10 | 3 | — | 6 | 9 | 2 | 401 | |
| | Summe | 223 | 578 | 303 | 305 | 219 | 240 | 216 | 277 | 333 | 528 | 233 | 285 | 321 | 227 | 377 | 406 | 437 | 433 | 303 | 413 | 230 | 6664 | 5119 | 28 | 1555 | 6702 | 185 | 142898 | |
| V. Krankheiten der Ernährungsorgane. | 80 | Krankheiten der Kiefer und Zähne | 31 | 417 | 204 | 170 | 98 | 99 | 211 | 189 | 181 | 272 | 120 | 142 | 135 | 111 | 464 | 288 | 241 | 245 | 133 | 269 | 189 | 4178 | 4155 | — | 19 | 4174 | 35 | 23170 |
| | 81 | Zungenentzündung | — | 3 | 4 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | 4 | 37 | 37 | — | — | 37 | — | 320 |
| | 82 | Mandelentzündung | 68 | 2455 | 1251 | 1014 | 807 | 784 | 934 | 515 | 1232 | 1638 | 1084 | 898 | 916 | 880 | 1428 | 1485 | 1355 | 1226 | 968 | 1563 | 669 | 23102 | 23060 | 2 | 16 | 23078 | 92 | 134845 |
| | 83 | Andere Mund- und Rachenkrankheiten | 7 | 17 | 4 | 16 | 5 | 3 | 9 | 44 | 6 | 25 | 6 | 12 | 27 | 16 | 17 | 40 | 23 | 13 | 5 | 29 | 5 | 322 | 322 | 1 | 3 | 326 | 3 | 2809 |
| | 84 | Krankheiten der Speicheldrüsen | 2 | 12 | 4 | 17 | 9 | 4 | 8 | 8 | 13 | 5 | 13 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 160 | 156 | — | 1 | 157 | 5 | 2067 |
| | 85 | Krankheiten der Speiseröhre | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 13 | 12 | — | 1 | 13 | — | 205 |
| | 86 | Akuter Magenkatarrh | 69 | 858 | 364 | 482 | 387 | 302 | 432 | 513 | 518 | 515 | 292 | 306 | 362 | 159 | 334 | 540 | 467 | 50 | 385 | 465 | 239 | 8570 | 8495 | — | 35 | 8530 | 109 | 60573 |
| | 87 | Chronischer Magenkatarrh | 10 | 21 | 16 | 18 | 16 | 4 | 2 | 9 | 10 | 23 | 6 | 8 | 13 | 2 | 20 | 17 | 9 | 11 | 12 | 14 | 8 | 239 | 109 | 1 | 124 | 234 | 15 | 8679 |
| | 88 | Magenblutung bzw. Magengeschwür | 8 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 | 31 | 1 | 48 | 80 | 8 | 5192 |
| | 89 | Akuter Darmkatarrh | 46 | 570 | 475 | 323 | 164 | 263 | 328 | 336 | 227 | 525 | 160 | 179 | 279 | 277 | 528 | 405 | 449 | 437 | 278 | 334 | 316 | 6853 | 6768 | — | 25 | 6793 | 106 | 46805 |
| 90 | Chronischer Darmkatarrh | 12 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | — | 85 | 51 | 1 | 37 | 89 | 8 | 3934 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang beim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|---|-------------------|--|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (I.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| noch V. Krankheiten der Ernährungsorgane. | 91 | Brechdurchfall | — | — | 42 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | — | 1 | 3 | 2 | 85 | 83 | 2 | — | 85 | — | 740 | | | |
| | 92 | Unterleibsbrüche | 9 | 91 | 54 | 33 | 31 | 86 | 102 | 22 | 77 | 73 | 56 | 38 | 59 | 27 | 17 | 50 | 50 | 41 | 27 | 46 | 48 | 1028 | 226 | — | 805 | 1031 | 6 | 7172 |
| | 93 | Eingeklemmter Bruch | 1 | — | 3 | — | 1 | — | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 23 | 12 | 1 | 10 | 23 | 1 | 699 | |
| | 94 | Innerer Darmverschluss | 1 | — | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 17 | 5 | 8 | 3 | 16 | 2 | 494 |
| | 95 | Darm-, Blinddarmzündung | 61 | 123 | 46 | 62 | 49 | 53 | 35 | 40 | 55 | 36 | 61 | 42 | 77 | 37 | 31 | 41 | 63 | 44 | 44 | 43 | 44 | 1026 | 778 | 27 | 203 | 1008 | 79 | 41230 |
| | 96 | Bauchfellentzündung und Ausgänge | 4 | 5 | 1 | 3 | — | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | — | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | — | 2 | 58 | 14 | 25 | 21 | 60 | 2 | 2413 |
| | 97 | Katarrhalsische Gelbsucht | 22 | 41 | 19 | 21 | 10 | 12 | 25 | 22 | 19 | 26 | 16 | 22 | 10 | 9 | 21 | 61 | 45 | 30 | 25 | 14 | 10 | 458 | 435 | 1 | 18 | 454 | 26 | 12100 |
| | 98 | Krankheiten der Leber u. deren Ausführungsgänge | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | — | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | 3 | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 48 | 34 | 3 | 11 | 48 | 2 | 1504 |
| | 99 | Krankheiten d. Mastdarms | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 82 | 65 | — | 13 | 78 | 11 | 3566 |
| | 100 | Eingeweidewürmer | 2 | 44 | 44 | 16 | 8 | 22 | 27 | 26 | 22 | 24 | 31 | 14 | 47 | 23 | 15 | 33 | 60 | 25 | 3 | 25 | 26 | 535 | 534 | — | 2 | 536 | 1 | 2755 |
| | 101 | Andere Krankheiten der Ernährungsorgane | 4 | 14 | — | 3 | 7 | — | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | — | 79 | 56 | 2 | 19 | 77 | 6 | 2403 |
| | Summe | 366 | 4696 | 2512 | 2234 | 1614 | 1649 | 2140 | 1756 | 2391 | 3191 | 1873 | 1690 | 1958 | 1567 | 2900 | 3017 | 2795 | 2760 | 1909 | 2841 | 1585 | 47078 | 45438 | 75 | 1414 | 46927 | 517 | 363675 | |
| VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ausschließlich der venesischen. | 102 und 103 | Krankheiten der Nieren, Nebennieren u. Harnleiter | 33 | 38 | 26 | 27 | 23 | 16 | 27 | 19 | 26 | 20 | 27 | 31 | 23 | 18 | 32 | 24 | 24 | 14 | 27 | 29 | 6 | 477 | 194 | 25 | 242 | 461 | 49 | 24680 |
| | 104 und 105 | Blasenkatarrh und andere Blasenkrankheiten | 27 | 56 | 58 | 17 | 16 | 26 | 30 | 36 | 29 | 43 | 23 | 20 | 35 | 30 | 71 | 41 | 50 | 25 | 40 | 41 | 23 | 710 | 535 | — | 193 | 728 | 9 | 18485 |
| | 106 bis 108 | Krankheiten d. Vorstehdrüse, Eichel, Vorhaut und Harnröhre | 18 | 93 | 69 | 53 | 35 | 33 | 41 | 50 | 49 | 64 | 57 | 44 | 43 | 32 | 22 | 64 | 80 | 82 | 46 | 63 | 51 | 1071 | 1065 | — | 13 | 1078 | 11 | 13171 |
| | 109 | Wasserbruch | 9 | 12 | 10 | 15 | 7 | 15 | 13 | 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 17 | 11 | 9 | 3 | 192 | 160 | — | 34 | 194 | 7 | 4784 |
| | 110 | Krampfaderbruch | 2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | — | 3 | 4 | 5 | — | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 11 | 1 | 104 | 88 | — | 18 | 106 | — | 1234 |
| | 111 | Andere Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane | 5 | 5 | 18 | 7 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 13 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 14 | 10 | 148 | 124 | — | 23 | 147 | 6 | 2245 |
| | Summe | 94 | 219 | 187 | 124 | 89 | 108 | 122 | 120 | 126 | 145 | 124 | 106 | 122 | 89 | 144 | 146 | 177 | 153 | 140 | 167 | 94 | 2702 | 2166 | 25 | 523 | 2714 | 82 | 64599 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang beim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Venereische Krankheiten. | 112 | Tripper . . . | 265 | 595 | 427 | 279 | 307 | 237 | 264 | 338 | 259 | 298 | 334 | 200 | 205 | 459 | 111 | 248 | 428 | 261 | 373 | 201 | 353 | 6177 | 5854 | — | 296 | 6150 | 292 | 243926 |
| | 113 | Hoden- und Nebenhodenentzündung | 16 | 41 | 28 | 19 | 21 | 24 | 8 | 19 | 15 | 14 | 29 | 14 | 14 | 26 | 12 | 16 | 23 | 11 | 21 | 17 | 15 | 387 | 376 | — | 14 | 390 | 13 | 8465 |
| | 114 | Spitze Feigwarzen | 2 | 10 | 15 | 11 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 183 | 182 | — | 1 | 183 | 2 | 2706 |
| | 115 | Weicher Schanker | 56 | 156 | 71 | 50 | 53 | 27 | 39 | 60 | 66 | 50 | 44 | 60 | 22 | 43 | 24 | 34 | 148 | 53 | 79 | 31 | 47 | 1157 | 1124 | — | 9 | 1133 | 80 | 34831 |
| | 116 | Bubo | 8 | 23 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 3 | 7 | 133 | 124 | — | 4 | 128 | 13 | 5571 |
| | 117 | Konstitutionelle Syphilis | 153 | 196 | 166 | 115 | 111 | 64 | 136 | 142 | 110 | 98 | 101 | 94 | 66 | 138 | 35 | 56 | 104 | 96 | 138 | 62 | 151 | 2179 | 2130 | — | 75 | 2205 | 127 | 89771 |
| | | Summe | 500 | 1021 | 721 | 477 | 504 | 359 | 459 | 577 | 464 | 474 | 525 | 378 | 315 | 679 | 196 | 365 | 726 | 432 | 630 | 316 | 598 | 10216 | 9790 | — | 399 | 10189 | 527 | 385270 |
| VIII. Augenkrankheiten. | 118 | a. Ansteckende. Granulöse Augenkrankheit (Granulöser (follikulärer) Bindehautkatarrh) | 14 | 2 | 32 | 20 | 17 | 5 | 13 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | 6 | 25 | 53 | 1 | 3 | 202 | 165 | — | 47 | 212 | 4 | 6732 |
| | 119 | Granulöse (follikuläre) Bindehauterkrankungen u. Folgezustände | 1 | — | 16 | 4 | 5 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 11 | 1 | — | 42 | 28 | — | 10 | 38 | 5 | 2149 |
| | 120 | Akute Blennorrhoe | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 4 | 3 | — | 1 | 4 | — | 290 |
| | 121 | Chronische Blennorrhoe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 22 |
| | 122 | Tripper-Blennorrhoe | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 4 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 222 |
| | | Summe a | 15 | 3 | 49 | 24 | 22 | 6 | 13 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | 8 | 25 | 67 | 2 | 4 | 253 | 198 | — | 60 | 258 | 10 | 9415 |
| | | b. Nicht ansteckende. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Krankheiten der Lider | 3 | 100 | 84 | 65 | 33 | 36 | 36 | 36 | 50 | 55 | 36 | 43 | 53 | 21 | 49 | 52 | 85 | 67 | 58 | 66 | 44 | 1069 | 1056 | — | 9 | 1065 | 7 | 6455 | |
| 124 | Krankheiten der Bindehaut | 55 | 366 | 423 | 266 | 182 | 175 | 233 | 272 | 278 | 309 | 220 | 202 | 201 | 76 | 184 | 267 | 243 | 318 | 271 | 265 | 161 | 4912 | 4846 | — | 54 | 4900 | 67 | 47321 | |
| 125 | Krankheiten der Tränenorgane | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | — | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | 87 | 61 | — | 33 | 94 | 1 | 2041 | |
| 126 | Krankheiten der Augenmuskeln | — | 4 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | — | — | 22 | 16 | — | 5 | 21 | 1 | 425 | |
| 127 | Krankheiten der Hornhaut | 47 | 85 | 67 | 50 | 61 | 43 | 50 | 48 | 51 | 51 | 33 | 28 | 38 | 30 | 29 | 39 | 76 | 44 | 61 | 43 | 37 | 964 | 939 | — | 37 | 976 | 35 | 22056 | |
| 128 | Krankheiten der Regenbogenhaut | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 92 | 78 | — | 13 | 91 | 5 | 3721 | |
| 129 | Krankheiten der Linse | 4 | — | 1 | — | 1 | — | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | 20 | 6 | — | 17 | 23 | 1 | 958 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang beim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage |
|---|--|---|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| | | | | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (I.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | | | |
| noch VIII. Augenkrankheiten. | 130 | Krankheiten der Aderhaut | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 3 | 3 | — | 2 | 1 | — | 27 | 15 | — | 17 | 32 | — | 1591 | | |
| | 131 | Krankheiten des Sehnerven und der Netzhaut | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 67 | 24 | — | 42 | 66 | 6 | 3139 | | |
| | 132 | Krankheiten u. Fehler des Brechungs- u. Einstellungsvermögens | 2 | 7 | 7 | 12 | 4 | 4 | 9 | 23 | 8 | — | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 29 | 3 | 18 | 24 | 11 | 193 | 86 | — | 107 | 193 | 2 | 3273 | | |
| | 133 | Nachtblindheit | — | — | 5 | — | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 9 | — | 1 | 10 | — | 155 | | |
| | 134 | Andere Augenkrankheiten | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 13 | 13 | 8 | 8 | 4 | 15 | 12 | 26 | 21 | 8 | 6 | 3 | 207 | 176 | — | 34 | 210 | 7 | 4942 | | |
| | Gesamtsumme (a. u. b.) | 158 | 595 | 663 | 445 | 323 | 288 | 372 | 419 | 426 | 448 | 323 | 303 | 320 | 136 | 296 | 397 | 491 | 490 | 499 | 420 | 269 | 7923 | 7510 | — | 429 | 7939 | 142 | 105492 | | | |
| IX. Ohrenkrankheiten. | 135 | Krankheiten der Ohrmuschel | — | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 16 | 3 | 6 | 3 | — | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 4 | 113 | 112 | — | — | 112 | 1 | 1780 | | |
| | 136 | Krankheiten des äußeren Gehörganges | 15 | 100 | 98 | 51 | 48 | 70 | 55 | 55 | 81 | 76 | 46 | 73 | 42 | 22 | 39 | 63 | 64 | 81 | 70 | 122 | 33 | 1289 | 1282 | — | 5 | 1287 | 17 | 13687 | | |
| | 137 | Krankheiten des mittleren und inneren Ohrs | 145 | 363 | 395 | 232 | 254 | 234 | 177 | 205 | 216 | 271 | 215 | 171 | 191 | 141 | 212 | 259 | 267 | 363 | 259 | 289 | 221 | 4935 | 4000 | 5 | 909 | 4914 | 166 | 126879 | | |
| | 138 | Schwerhörigkeit | 5 | 9 | 9 | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 24 | 11 | 8 | 160 | 85 | — | 74 | 159 | 6 | 3051 | | |
| | 139 | Andere Ohrenkrankheiten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 3 | — | 10 | 10 | — | — | 10 | — | 181 | | |
| | Summe | 165 | 479 | 510 | 303 | 313 | 317 | 237 | 275 | 303 | 372 | 271 | 260 | 239 | 170 | 263 | 331 | 348 | 463 | 358 | 429 | 266 | 6507 | 5489 | 5 | 988 | 6482 | 190 | 145578 | | | |
| X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen. | 140 | Krätze | 3 | 100 | 476 | 78 | 40 | 57 | 30 | 36 | 63 | 126 | 52 | 44 | 32 | 15 | 12 | 50 | 32 | 51 | 45 | 32 | 27 | 1398 | 1395 | — | — | 1395 | 6 | 6938 | | |
| | 141 | Akute Hautkrankheiten | 85 | 410 | 341 | 254 | 180 | 222 | 249 | 188 | 284 | 296 | 185 | 209 | 232 | 118 | 162 | 237 | 343 | 426 | 203 | 292 | 196 | 5027 | 4956 | — | 41 | 4997 | 115 | 81594 | | |
| | 142 | Chronische Hautkrankheiten | 26 | 15 | 19 | 6 | 23 | 20 | 25 | 29 | 36 | 21 | 19 | 21 | 18 | 40 | 14 | 37 | 34 | 14 | 20 | 21 | 52 | 484 | 397 | — | 98 | 495 | 15 | 16447 | | |
| | 143 | Chronisches Unterschenkelgeschwür | 8 | 29 | 52 | 20 | 15 | 13 | 6 | 16 | 28 | 28 | 33 | 12 | 17 | 8 | 26 | 15 | 26 | 21 | 35 | 7 | 1 | 408 | 377 | — | 28 | 405 | 11 | 11507 | | |
| | 144 | Panaritium | 85 | 310 | 335 | 304 | 285 | 252 | 216 | 234 | 309 | 330 | 274 | 240 | 172 | 287 | 367 | 302 | 295 | 337 | 288 | 332 | 201 | 5670 | 5500 | 2 | 145 | 5647 | 108 | 120586 | | |
| | 145 | Zellgewebsentzündung und Ausgänge | 906 | 3043 | 2264 | 1822 | 1031 | 1502 | 1512 | 1642 | 1758 | 2158 | 1282 | 1600 | 1564 | 836 | 1489 | 2101 | 2443 | 2737 | 1549 | 1739 | 1284 | 35356 | 35113 | 9 | 266 | 35388 | 874 | 470167 | | |
| 146 | Furunkel . . | 375 | 2774 | 2060 | 1780 | 961 | 963 | 1093 | 1071 | 1318 | 1378 | 986 | 1084 | 1488 | 729 | 1364 | 1683 | 1487 | 1611 | 1252 | 1261 | 919 | 27262 | 27288 | — | 22 | 27310 | 327 | 255374 | | | |
| 147 | Gutartige Geschwülste | 15 | 71 | 39 | 37 | 20 | 32 | 33 | 37 | 28 | 29 | 34 | 34 | 29 | 19 | 49 | 39 | 50 | 31 | 43 | 48 | 21 | 723 | 701 | — | 20 | 721 | 17 | 11770 | | | |
| 148 | Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 99 | 83 | — | 16 | 99 | 3 | 2215 | | | |
| | Summe | 1506 | 6757 | 5595 | 4304 | 2560 | 3066 | 3165 | 3258 | 3825 | 4372 | 2867 | 3246 | 3561 | 2054 | 3496 | 4472 | 4717 | 5229 | 3440 | 3736 | 2707 | 76427 | 75810 | 11 | 636 | 76457 | 1476 | 976598 | | | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang beim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | | | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (I.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | S u m m e | dienstfähig | gestorben | | | anderweitig | S u m m e |
| XI. Krankheiten der Bewegungsorgane. | 149 und 150 | Entzündung der Knochenhaut und Knochen | 132 | 406 | 189 | 259 | 342 | 465 | 225 | 218 | 295 | 223 | 233 | 197 | 290 | 171 | 190 | 219 | 285 | 289 | 314 | 194 | 195 | 5199 | 4916 | 3 | 297 | 5216 | 115 | 98412 |
| | 151 | Mißbildung der Knochen | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | — | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 73 | 52 | — | 24 | 76 | — | 1450 |
| | 152 | Akute Gelenkentzündung | 63 | 224 | 114 | 97 | 115 | 90 | 124 | 95 | 130 | 98 | 149 | 96 | 127 | 58 | 132 | 131 | 149 | 160 | 68 | 96 | 98 | 2351 | 2174 | 1 | 165 | 2340 | 74 | 51791 |
| | 153 | Chronische Gelenkentzündung | 32 | 21 | 27 | 43 | 29 | 14 | 16 | 14 | 22 | 25 | 22 | 25 | 13 | 10 | 15 | 19 | 11 | 66 | 30 | 41 | 22 | 485 | 141 | 1 | 359 | 501 | 16 | 20223 |
| | 154 | Mißbildung der Gelenke | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | — | 6 | — | 33 | 15 | — | 17 | 32 | 1 | 892 |
| | 155 | Fußgeschwulst | 607 | 1091 | 911 | 998 | 606 | 244 | 624 | 429 | 839 | 513 | 576 | 412 | 772 | 675 | 586 | 804 | 758 | 611 | 691 | 422 | 682 | 13244 | 13140 | — | 93 | 13233 | 618 | 167241 |
| | 156 | Plattfüßigkeit u. Folgezustände | 10 | 40 | 32 | 26 | 41 | 39 | 13 | 17 | 27 | 41 | 42 | 28 | 62 | 57 | 129 | 23 | 31 | 18 | 32 | 42 | 38 | 778 | 620 | — | 165 | 785 | 3 | 10997 |
| | 157 | Anderer Verformungen des Fußes und Folgezustände | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | — | 2 | 4 | 3 | — | — | 2 | 3 | 1 | — | 4 | — | 25 | 11 | — | 14 | 25 | — | 490 |
| | 158 | Muskelnrheumatismus | 40 | 658 | 421 | 325 | 227 | 219 | 297 | 238 | 365 | 366 | 221 | 212 | 324 | 257 | 402 | 536 | 353 | 315 | 266 | 446 | 249 | 6697 | 6647 | — | 28 | 6675 | 62 | 49517 |
| | 159 | Exerzier- und Reitknochen | 1 | — | — | 2 | — | 3 | 3 | — | — | — | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | — | 42 | 34 | — | 6 | 40 | 3 | 1281 |
| 160 | Anderer Krankheiten der Muskeln | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | 20 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 8 | 11 | 44 | 193 | 135 | — | 61 | 196 | 5 | 5205 | |
| 161 und 162 | Krankheiten der Schleimbeutel und Sehnen | 127 | 657 | 396 | 453 | 322 | 255 | 264 | 253 | 260 | 359 | 321 | 255 | 339 | 216 | 305 | 394 | 265 | 252 | 257 | 311 | 191 | 6325 | 6222 | — | 129 | 6351 | 101 | 78844 | |
| | Summe | 1023 | 3118 | 2103 | 2219 | 1692 | 1335 | 1572 | 1278 | 1963 | 1630 | 1579 | 1243 | 1955 | 1455 | 1773 | 2145 | 1873 | 1735 | 1675 | 1580 | 1522 | 35445 | 34107 | 5 | 1358 | 35470 | 998 | 486343 | |
| XII. Mechanische Verletzungen. | 163 | Wundlaufen | 30 | 333 | 494 | 345 | 156 | 68 | 167 | 123 | 319 | 376 | 224 | 103 | 235 | 249 | 223 | 256 | 178 | 199 | 236 | 229 | 363 | 4876 | 4876 | — | 5 | 4881 | 25 | 30984 |
| | 164 | Wundreiten | 3 | 20 | 80 | 22 | 11 | 26 | 26 | 39 | 19 | 15 | 3 | 18 | 60 | 33 | 27 | 27 | 18 | 31 | 16 | 26 | 11 | 528 | 527 | 1 | 1 | 529 | 2 | 4644 |
| | 165 | Quetschung der Weichteile ohne äußere Wunde | 290 | 1855 | 1267 | 1203 | 803 | 731 | 871 | 944 | 947 | 1132 | 599 | 690 | 885 | 439 | 1023 | 1010 | 1141 | 1030 | 956 | 896 | 495 | 18917 | 18583 | 2 | 291 | 18876 | 331 | 223733 |
| | 166 | Quetschung innerer Organe | 6 | 9 | 4 | — | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | — | — | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 67 | 53 | 3 | 13 | 69 | 4 | 2339 |
| | 167 | Zerreißen innerer Organe | 4 | — | — | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 17 | 4 | 10 | 6 | 20 | 1 | 662 |
| | 168 | des Oberarms | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 79 | 48 | — | 33 | 81 | 9 | 4574 |
| | 169 | des Unterarms | 36 | 28 | 9 | 13 | 8 | 11 | 17 | 12 | 17 | 17 | 9 | 19 | 17 | 15 | 25 | 28 | 21 | 18 | 15 | 18 | 14 | 331 | 260 | — | 63 | 323 | 44 | 15871 |
| | 170 | der Hand | 19 | 50 | 24 | 23 | 16 | 25 | 13 | 14 | 23 | 25 | 22 | 18 | 23 | 13 | 17 | 20 | 30 | 26 | 27 | 34 | 19 | 462 | 418 | — | 42 | 460 | 21 | 15626 |
| | 171 | des Ober-schenkels | 14 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 92 | 13 | — | 79 | 92 | 14 | 8597 |
| | 172 | des Unter-schenkels | 95 | 53 | 24 | 25 | 25 | 36 | 33 | 46 | 28 | 34 | 28 | 21 | 31 | 23 | 36 | 48 | 33 | 37 | 45 | 42 | 18 | 666 | 384 | 1 | 273 | 658 | 103 | 43170 |
| 173 | des Fußes | 333 | 306 | 95 | 20 | 74 | 154 | 35 | 53 | 106 | 72 | 141 | 98 | 96 | 59 | 18 | 30 | 53 | 112 | 90 | 120 | 71 | 1803 | 1798 | — | 96 | 1894 | 242 | 57179 | |
| 174 | des Kopfes | 24 | 14 | 12 | 10 | 10 | 19 | 7 | 12 | 13 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 11 | 7 | 13 | 19 | 16 | 6 | 221 | 159 | 15 | 50 | 224 | 21 | 9220 | |
| 175 | des Schlüsselbeins | 14 | 13 | 12 | 9 | 11 | 6 | 13 | 10 | 14 | 18 | 10 | 14 | 5 | 16 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 3 | 227 | 208 | — | 11 | 219 | 22 | 8133 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang beim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------|---|-------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------|------|
| | | | | Gardekorps | I. Armeekorps II. Armeekorps III. Armeekorps IV. Armeekorps V. Armeekorps VI. Armeekorps VII. Armeekorps VIII. Armeekorps IX. Armeekorps X. Armeekorps XI. Armeekorps XII. (1. K.S.) Armeekorps XIII. (K.W.) Armeekorps XIV. Armeekorps XV. Armeekorps XVI. Armeekorps XVII. Armeekorps XVIII. Armeekorps XIX. (2. K.S.) Armeekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe | |
| | | | | | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| noch XII. Mechanische Verletzungen. | 176 | des Schulterblatts | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | 3 | — | — | 15 | 12 | — | 3 | 15 | 2 | 657 | |
| | 177 | der Rippen | 6 | 4 | 6 | 12 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | 3 | 112 | 108 | — | 4 | 112 | 6 | 2789 | |
| | 178 | der Wirbelsäule | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 1 | 6 | 7 | 2 | 658 |
| | 179 | des Beckens | 2 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 14 | 5 | — | 8 | 13 | 3 | 705 |
| | 180 und 181 | Verstauchung der Gelenke | 277 | 1238 | 1174 | 1001 | 707 | 934 | 603 | 754 | 880 | 1238 | 656 | 509 | 1024 | 387 | 1495 | 1192 | 1207 | 998 | 892 | 876 | 594 | 18359 | 17963 | — | 414 | 18377 | 259 | 230261 | |
| | 182 | der Gelenke der oberen Gliedmaßen | 35 | 37 | 13 | 24 | 20 | 14 | 35 | 32 | 26 | 20 | 23 | 22 | 35 | 7 | 27 | 26 | 23 | 22 | 40 | 26 | 16 | 488 | 419 | — | 67 | 486 | 37 | 15045 | |
| | 183 | der Gelenke der unteren Gliedmaßen | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 69 | 61 | — | 14 | 75 | 6 | 2687 | |
| | 184 | anderer Gelenke | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | — | 1 | 5 | — | 175 | |
| | 185 | Schufs- | 44 | 20 | 26 | 14 | 19 | 11 | 13 | 11 | 12 | 23 | 8 | 11 | 9 | 4 | 17 | 18 | 21 | 16 | 14 | 11 | 13 | 291 | 217 | 10 | 62 | 289 | 46 | 11807 | |
| | 186 | Hieb- und Schnitt- | 65 | 309 | 214 | 175 | 103 | 97 | 129 | 131 | 186 | 201 | 131 | 105 | 122 | 85 | 123 | 175 | 213 | 205 | 131 | 149 | 119 | 3103 | 3027 | — | 68 | 3095 | 73 | 40252 | |
| | 187 | Stich- | 23 | 102 | 84 | 66 | 39 | 34 | 35 | 48 | 65 | 63 | 37 | 56 | 42 | 24 | 53 | 49 | 66 | 72 | 61 | 57 | 24 | 1077 | 1061 | 2 | 8 | 1071 | 29 | 12803 | |
| | 188 | Rifs- und Quetsch- | 211 | 1077 | 801 | 632 | 354 | 516 | 490 | 499 | 550 | 636 | 377 | 416 | 464 | 320 | 566 | 668 | 615 | 776 | 445 | 506 | 388 | 11096 | 11030 | 3 | 86 | 11119 | 188 | 136259 | |
| | 189 | Bifs- . . . | 6 | 26 | 17 | 13 | 14 | 20 | 19 | 15 | 16 | 18 | 11 | 6 | 17 | 10 | 30 | 25 | 10 | 26 | 13 | 10 | 14 | 330 | 330 | — | 2 | 332 | 4 | 4426 | |
| | 190 | Verbrennung | 15 | 161 | 103 | 89 | 56 | 55 | 80 | 56 | 69 | 105 | 71 | 70 | 58 | 33 | 72 | 71 | 78 | 89 | 84 | 56 | 55 | 1511 | 1495 | 1 | 6 | 1502 | 24 | 19793 | |
| | 191 | Erfrierung (Frostschäden) | — | 36 | 99 | 46 | 41 | 42 | 79 | 76 | 27 | 28 | 19 | 34 | 53 | 20 | 71 | 64 | 94 | 50 | 64 | 37 | 18 | 998 | 980 | 4 | 13 | 997 | 1 | 11328 | |
| | 192 | Andere Wunden und Verletzungen | 10 | 36 | 34 | 76 | 32 | 35 | 3 | 71 | 4 | 68 | 28 | 38 | 3 | 7 | 301 | 59 | 53 | 2 | 39 | 3 | 1 | 893 | 854 | — | 32 | 886 | 17 | 11210 | |
| | | Summe | 1588 | 5746 | 4610 | 3831 | 2512 | 2866 | 2693 | 2970 | 3344 | 4130 | 2417 | 2280 | 3207 | 1771 | 4173 | 3818 | 3894 | 3755 | 3227 | 3148 | 2263 | 66655 | 64897 | 53 | 1757 | 66707 | 1536 | 925587 | |
| | XIII. Andere Krankheiten. | 193 | Selbstver- stümmelung | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | — | 2 | 5 | — | 305 | |
| | | 194 | Selbstmord- versuch | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 104 | 50 | 27 | 26 | 103 | 7 | 3603 |
| 195 | | Vorgetäuschte Krankheiten | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 42 | |
| 196 | | Allgemeine Körperschwäche | 2 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | — | 4 | 15 | 6 | 113 | 22 | — | 91 | 113 | 2 | 2339 | |
| 197 | | Altersschwäche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | Summe | 9 | 18 | 10 | 11 | 10 | 17 | 5 | 11 | 15 | 11 | 9 | 14 | 8 | 5 | 16 | 15 | 6 | 2 | 10 | 19 | 10 | 222 | 76 | 27 | 119 | 222 | 9 | 6289 | | |
| XIV. | 198 | Zur Beobachtung | 104 | 286 | 287 | 206 | 165 | 196 | 262 | 281 | 306 | 302 | 84 | 197 | 225 | 106 | 238 | 296 | 278 | 181 | 216 | 273 | 158 | 4543 | 4439 | — | 1)6 | 4445 | 202 | 66163 | |
| | | Gesamtsumme | 7102 | 29095 | 21940 | 17663 | 12368 | 12451 | 14253 | 13772 | 16732 | 19011 | 13172 | 12241 | 15,92 | 10857 | 17034 | 19081 | 19084 | 18837 | 15300 | 16490 | 11906 | 328399 | 308970 | 745 | 16493 | 326210 | 7291 | 4861076 | |
| | | Davon kamen in Lazarett- (einschließlich Lazarett- und Revier-) Behandlung | — | 10151 | 8963 | 7397 | 5453 | 5982 | 5477 | 6862 | 6628 | 7555 | 6264 | 6045 | 5396 | 4696 | 5726 | 7762 | 8005 | 7565 | 6686 | 7036 | 5256 | 134905 | — | — | — | — | — | — | |

1) Davon vor abgeschlossener Beobachtung: 1 Mann auf eigenen Wunsch in die Heimat entlassen, 2 Mann aus dem Lazarett entwichen, 1 Mann den Zivilbehörden überwiesen, 2 Mann wegen eines anderen Leidens dem Genesungsheim überwiesen bzw. als dienstunbrauchbar entlassen.

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| noch I. Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen. | 26 | Starrkrampf (Trismus, Tetanus) | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | — | 244 | |
| | 27 | Akuter Gelenkrheumatismus | 175 | 134 | 251 | 304 | 494 | 478 | 568 | 531 | 471 | 344 | 334 | 197 | 175 | 4281 | 3351 | 13 | 868 | 4232 | 224 | 182127 | |
| | 28 | Chronischer Gelenkrheumatismus | 24 | 26 | 29 | 24 | 19 | 29 | 27 | 13 | 31 | 25 | 17 | 15 | 14 | 269 | 85 | — | 198 | 283 | 10 | 14901 | |
| | 29 | Gicht | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 39 | 32 | — | 7 | 39 | 2 | 1053 | |
| | 30 | Blutarmut | 12 | 55 | 54 | 39 | 57 | 44 | 46 | 28 | 33 | 42 | 50 | 44 | 26 | 518 | 358 | 1 | 156 | 515 | 15 | 13573 | |
| | 31 und 32 | Purpura, Skorbut | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 60 | 50 | 1 | 11 | 62 | 1 | 2108 | |
| | 33 | Zuckerruhr | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 33 | 3 | 10 | 23 | 36 | — | 1345 | |
| | 34 | Vergiftung durch Alkohol (akut und chronisch) | — | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 43 | 38 | — | 5 | 43 | — | 432 | |
| | 35 | | Gase | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 7 | 6 | — | 1 | 7 | — | 242 |
| | 36 | | andere Gifte . . . | — | 4 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 3 | 3 | 5 | 2 | 23 | 19 | — | 3 | 22 | 1 | 520 |
| | 37 | Trichinose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 38 | Hitzschlag | 6 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 9 | 4 | 12 | 15 | 33 | 74 | 70 | 6 | 2 | 78 | 2 | 683 |
| | 39 | Bösartige Geschwülste | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | — | — | 30 | 6 | 14 | 18 | 38 | 2 | 2965 | |
| | 40 | Andere allgemeine Erkrankungen | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 17 | 15 | 50 | 126 | 79 | — | 20 | 99 | 30 | 2428 | |
| | Summe | 539 | 575 | 912 | 1347 | 4015 | 2035 | 1507 | 1158 | 1036 | 852 | 850 | 611 | 615 | 15513 | 12686 | 297 | 2455 | 15438 | 614 | 433597 | | |
| II. Krankheiten des Nervensystems. | 41 | Geisteskrankheiten | 43 | 37 | 57 | 41 | 59 | 44 | 49 | 32 | 37 | 29 | 23 | 20 | 16 | 444 | 12 | 4 | 439 | 455 | 32 | 26510 | |
| | 42 | Fallsucht | 18 | 77 | 88 | 44 | 45 | 34 | 28 | 31 | 29 | 25 | 24 | 12 | 9 | 446 | 5 | 1 | 444 | 450 | 14 | 14466 | |
| | 43 | Erkrankungen im Gebiete einzelner Nervenbahnen | 55 | 70 | 89 | 81 | 141 | 102 | 95 | 92 | 95 | 89 | 112 | 82 | 63 | 1111 | 946 | — | 174 | 1120 | 46 | 26080 | |
| | 44 | Hirnhautentzündung | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 55 | 16 | 21 | 18 | 55 | 4 | 2324 | |
| | 45 | Krankheiten des Gehirns | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 73 | 24 | 15 | 39 | 78 | 3 | 3349 | |
| | 46 | Gehirn- (Rückenmark-) Erschütterung | 7 | 17 | 25 | 9 | 16 | 12 | 18 | 9 | 28 | 15 | 30 | 14 | 13 | 206 | 172 | 2 | 29 | 203 | 10 | 5644 | |
| | 47 | Tabes dorsualis | 3 | — | — | — | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 10 | 2 | — | 9 | 11 | 2 | 601 | |
| | 48 | Andere Rückenmarkskrankheiten | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 29 | 2 | 3 | 32 | 37 | 1 | 2214 | |
| | 49 | Progressive Muskelatrophie | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 2 | 2 | — | 1 | 14 | 4 | — | 9 | 13 | 1 | 565 | |
| | 50 | Neurasthenie . . . | 14 | 28 | 29 | 30 | 43 | 33 | 28 | 17 | 29 | 21 | 26 | 26 | 14 | 324 | 185 | — | 138 | 323 | 15 | 9600 | |
| 51 | Hysterie | 17 | 30 | 41 | 25 | 31 | 24 | 26 | 14 | 18 | 28 | 16 | 18 | 14 | 285 | 109 | — | 179 | 288 | 14 | 12349 | | |
| 52 | Andere Krankheiten des Nervensystems | 8 | 16 | 21 | 7 | 18 | 5 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9 | 146 | 60 | 1 | 92 | 153 | 1 | 5022 | | |
| | Summe | 186 | 292 | 369 | 252 | 367 | 274 | 273 | 222 | 255 | 232 | 261 | 196 | 150 | 3143 | 1537 | 47 | 1602 | 3186 | 143 | 108724 | | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage |
|---|---------------------------------------|--|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Krankheiten der Atmungsorgane. | 53 | Krankheiten der Nase und Nebenhöhlen | 9 | 76 | 76 | 60 | 71 | 51 | 67 | 48 | 57 | 56 | 50 | 32 | 23 | 667 | 570 | — | 97 | 667 | 9 | 11385 |
| | 54 | Akuter Kehlkopf- und Luftröhrenkatarrh | 26 | 340 | 626 | 1205 | 2099 | 1882 | 1402 | 763 | 511 | 307 | 361 | 247 | 162 | 9910 | 9868 | — | 35 | 9903 | 33 | 76080 |
| | 55 | Anderen Krankheiten der ersten Luftwege und Stimmwerkzeuge | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 49 | 17 | — | 31 | 48 | 6 | 2513 |
| | 56 | Akuter Bronchialkatarrh | 184 | 1124 | 2071 | 3183 | 5260 | 3309 | 2614 | 1694 | 1636 | 1298 | 1687 | 1227 | 829 | 25932 | 25597 | 1 | 285 | 25883 | 233 | 268877 |
| | 57 | Chronischer Katarrh der Luftwege | 83 | 270 | 182 | 127 | 100 | 104 | 103 | 66 | 78 | 76 | 78 | 61 | 36 | 1281 | 210 | 1 | 1096 | 1307 | 57 | 55661 |
| | 58 | Akute Lungenentzündung | 108 | 141 | 241 | 349 | 451 | 484 | 332 | 306 | 382 | 179 | 156 | 109 | 110 | 3240 | 2460 | 136 | 638 | 3234 | 114 | 122094 |
| | 59 | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes | 13 | 17 | 17 | 16 | 13 | 16 | 9 | 12 | 10 | 8 | 20 | 14 | 7 | 159 | 12 | 2 | 139 | 153 | 19 | 7806 |
| | 60 | Brustfellentzündung und Ausgänge | 207 | 120 | 130 | 137 | 218 | 195 | 168 | 177 | 216 | 181 | 182 | 138 | 118 | 1980 | 1134 | 28 | 830 | 1992 | 195 | 102377 |
| | 61 | Lungenerweiterung | 4 | 20 | 8 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 80 | 18 | — | 66 | 84 | — | 2115 |
| | 62 | Asthma | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 49 | 19 | — | 29 | 48 | 3 | 919 |
| 63 | Anderen Krankheiten der Atmungsorgane | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1 | 430 | |
| | Summe | 641 | 2128 | 3360 | 5089 | 8232 | 6057 | 4713 | 3087 | 2897 | 2114 | 2547 | 1843 | 1294 | 43361 | 39906 | 172 | 3254 | 43332 | 670 | 650257 | |
| IV. Krankheiten der Kreislaufs- und blutbereitenden Organe. | 64 | Entzündung des Herzbeutels | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | — | 2 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 24 | 32 | 6 | 2066 |
| | 65 | Idiopathische Herzvergrößerung | 6 | 15 | 30 | 9 | 16 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 14 | 7 | 8 | 124 | 20 | 1 | 98 | 119 | 11 | 3474 |
| | 66 | Erkrankung der Herzklappen | 36 | 122 | 94 | 45 | 47 | 45 | 47 | 26 | 28 | 33 | 36 | 28 | 10 | 561 | 16 | 11 | 551 | 578 | 19 | 20669 |
| | 67 | Nervöse Störung der Herzthätigkeit | 39 | 130 | 99 | 71 | 59 | 41 | 70 | 34 | 27 | 26 | 47 | 42 | 30 | 676 | 209 | — | 491 | 700 | 15 | 18997 |
| | 68 | Anderen Herzkrankheiten | 5 | 20 | 21 | 4 | 13 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 12 | 125 | 28 | 5 | 86 | 119 | 11 | 3991 |
| | 69 | Pulsadergeschwulst | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 3 | 4 | — | 304 |
| | 70 | Hämorrhoiden . . | 11 | 27 | 28 | 32 | 42 | 26 | 32 | 37 | 33 | 17 | 57 | 54 | 26 | 411 | 405 | — | 9 | 414 | 8 | 5849 |
| | 71 | Krampfadern . . | 11 | 18 | 28 | 20 | 48 | 40 | 51 | 31 | 31 | 37 | 46 | 41 | 37 | 428 | 311 | — | 119 | 430 | 9 | 4836 |
| 72 | Venenentzündung | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | — | 43 | 34 | — | 11 | 45 | 2 | 1705 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage |
|---|--|--|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| noch IV. Krankheiten der Kreislauf- und ableitenden Organe. | 73 bis 75 | Erkrankung der Lymphgefäße und Lymphdrüsen | 100 | 215 | 359 | 310 | 374 | 378 | 460 | 398 | 349 | 359 | 419 | 330 | 221 | 4172 | 4049 | 2 | 127 | 4178 | 94 | 77755 |
| | 76 | Kropf | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 65 | 39 | — | 24 | 63 | 7 | 2132 |
| | 77 | Leukämie | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 3 | 4 | 7 | — | 556 |
| | 78 | Perniziöse Anämie | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 4 | — | 2 | 2 | 4 | 1 | 163 |
| | 79 | Andere Krankheiten der Gruppe IV | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 10 | 3 | — | 6 | 9 | 2 | 401 |
| | Summe | | 223 | 563 | 668 | 503 | 620 | 560 | 685 | 556 | 501 | 496 | 638 | 522 | 352 | 6664 | 5119 | 28 | 1555 | 6702 | 185 | 142898 |
| V. Krankheiten der Ernährungsorgane. | 80 | Krankheiten der Kiefer u. Zähne | 31 | 331 | 451 | 361 | 400 | 400 | 397 | 343 | 322 | 317 | 332 | 323 | 201 | 4178 | 4155 | — | 19 | 4174 | 35 | 23170 |
| | 81 | Zungenentzündung | — | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 37 | 37 | — | — | 37 | — | 320 |
| | 82 | Mandelentzündung | 68 | 921 | 2178 | 2792 | 3560 | 3347 | 2862 | 1799 | 1583 | 1178 | 1317 | 994 | 571 | 23102 | 28060 | 2 | 16 | 23078 | 92 | 134845 |
| | 83 | Andere Mund- und Rachenkrankheiten | 7 | 16 | 24 | 26 | 42 | 47 | 32 | 27 | 23 | 22 | 21 | 28 | 14 | 322 | 322 | 1 | 3 | 326 | 3 | 2809 |
| | 84 | Krankheiten der Speicheldrüsen | 2 | 6 | 11 | 15 | 11 | 26 | 26 | 11 | 9 | 14 | 11 | 10 | 10 | 160 | 156 | — | 1 | 157 | 5 | 2067 |
| | 85 | Krankheiten der Speiseröhre | — | 1 | — | 2 | 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | — | 1 | 13 | — | 205 |
| | 86 | Akuter Magenkatarrh | 69 | 484 | 688 | 585 | 801 | 624 | 673 | 553 | 672 | 641 | 1082 | 1045 | 722 | 8570 | 8495 | — | 35 | 8530 | 109 | 60573 |
| | 87 | Chronischer Magenkatarrh | 10 | 29 | 31 | 16 | 21 | 17 | 19 | 17 | 16 | 13 | 24 | 18 | 18 | 239 | 109 | 1 | 124 | 234 | 15 | 8679 |
| | 88 | Magenblutung bzw. Magengeschwür | 8 | 6 | 11 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 80 | 31 | 1 | 48 | 80 | 8 | 5192 |
| | 89 | Akuter Darmkatarrh | 46 | 327 | 434 | 492 | 542 | 448 | 464 | 443 | 495 | 423 | 1042 | 1140 | 603 | 6853 | 6768 | — | 25 | 6793 | 106 | 46805 |
| | 90 | Chronischer Darmkatarrh | 12 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 6 | 85 | 51 | 1 | 37 | 89 | 8 | 3934 |
| | 91 | Brechdurchfall . . | — | — | 4 | — | — | 2 | — | 3 | 42 | 4 | 9 | 11 | 10 | 85 | 83 | 2 | — | 85 | — | 740 |
| | 92 | Unterleibsbrüche | 9 | 117 | 117 | 65 | 120 | 80 | 83 | 61 | 69 | 98 | 73 | 78 | 67 | 1028 | 226 | — | 805 | 1031 | 6 | 7172 |
| | 93 | Eingeklemmter Bruch | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 12 | 1 | 10 | 23 | 1 | 699 |
| 94 | Innerer Darmverschluss | 1 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 8 | 3 | 16 | 2 | 494 | |
| 95 | Darm-, Blinddarm-entzündung | 61 | 56 | 74 | 70 | 107 | 90 | 87 | 82 | 94 | 94 | 102 | 109 | 61 | 1026 | 778 | 27 | 203 | 1008 | 79 | 41230 | |
| 96 | Bauchfellentzündung u. Ausgänge | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 58 | 14 | 25 | 21 | 60 | 2 | 2413 | |
| 97 | Katarrhalische Gelbsucht | 22 | 48 | 43 | 39 | 33 | 43 | 35 | 40 | 24 | 34 | 37 | 38 | 44 | 458 | 435 | 1 | 18 | 454 | 26 | 12100 | |
| 98 | Krankheiten der Leber und deren Ausführungsgänge | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 48 | 34 | 3 | 11 | 48 | 2 | 1504 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|--|-------------------|---|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| noch V. Krankheiten der Ernährungsorgane. | 99 | Krankheiten des Mastdarms | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | 11 | 11 | 8 | 82 | 65 | — | 13 | 78 | 11 | 3566 |
| | 100 | Eingeweidewürmer | 2 | 35 | 43 | 44 | 62 | 53 | 46 | 40 | 43 | 42 | 53 | 52 | 22 | 535 | 534 | — | 2 | 536 | 1 | 2755 |
| | 101 | Andere Krankheiten der Ernährungsorgane | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 79 | 56 | 2 | 19 | 77 | 6 | 2403 |
| | | Summe | 366 | 2410 | 4145 | 4550 | 5761 | 5212 | 4772 | 3459 | 3428 | 2918 | 4147 | 3897 | 2379 | 47078 | 45438 | 75 | 1414 | 46927 | 517 | 363675 |
| VI Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ausschließlich der venerischen. | 102 und 103 | Krankheiten der Nieren, Nebennieren und Harnleiter | 33 | 64 | 39 | 37 | 40 | 40 | 48 | 39 | 45 | 34 | 28 | 32 | 31 | 477 | 194 | 25 | 242 | 461 | 49 | 24680 |
| | 104 und 105 | Blasenkatarrh u. andere Blasenkrankheiten | 27 | 57 | 112 | 84 | 81 | 81 | 66 | 51 | 36 | 36 | 40 | 42 | 24 | 710 | 535 | — | 193 | 728 | 9 | 18485 |
| | 106 bis 108 | Krankheiten der Vorsteherdrüse, Eichel, Vorhaut und Harnröhre | 18 | 135 | 118 | 67 | 105 | 99 | 79 | 76 | 77 | 74 | 108 | 90 | 43 | 1071 | 1065 | — | 13 | 1078 | 11 | 13171 |
| | 109 | Wasserbruch . . . | 9 | 19 | 22 | 15 | 14 | 21 | 21 | 8 | 5 | 14 | 29 | 13 | 11 | 192 | 160 | — | 34 | 194 | 7 | 4784 |
| | 110 | Krampfaderbruch | 2 | 4 | 12 | 4 | 16 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 8 | 6 | 104 | 88 | — | 18 | 106 | — | 1234 |
| | 111 | Andere Krankheiten der Harn und Geschlechtsorgane | 5 | 13 | 20 | 5 | 11 | 17 | 9 | 9 | 9 | 12 | 21 | 8 | 14 | 148 | 124 | — | 23 | 147 | 6 | 2245 |
| | Summe | 94 | 292 | 323 | 212 | 267 | 266 | 232 | 188 | 181 | 179 | 240 | 193 | 129 | 2702 | 2166 | 25 | 523 | 2714 | 82 | 64599 | |
| VII. Venerische Krankheiten. | 112 | Tripper | 265 | 1367 | 528 | 303 | 559 | 453 | 381 | 407 | 365 | 498 | 471 | 512 | 333 | 6177 | 5854 | — | 296 | 6150 | 292 | 243926 |
| | 113 | Hoden- und Nebenhodenentzündung | 16 | 25 | 29 | 26 | 41 | 42 | 36 | 30 | 27 | 28 | 48 | 33 | 22 | 387 | 376 | — | 14 | 390 | 13 | 8465 |
| | 114 | Spitze Feigwarzen | 2 | 29 | 18 | 13 | 12 | 16 | 21 | 12 | 11 | 10 | 25 | 9 | 7 | 183 | 182 | — | 1 | 183 | 2 | 2706 |
| | 115 | Weicher Schanker | 56 | 165 | 142 | 87 | 117 | 107 | 80 | 47 | 70 | 81 | 76 | 102 | 83 | 1157 | 1124 | — | 9 | 1133 | 80 | 34831 |
| | 116 | Bubo | 8 | 13 | 17 | 15 | 8 | 13 | 15 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 133 | 124 | — | 4 | 128 | 13 | 5571 |
| | 117 | Konstitutionelle Syphilis | 153 | 287 | 165 | 120 | 182 | 198 | 193 | 182 | 129 | 178 | 233 | 197 | 115 | 2179 | 2130 | — | 75 | 2205 | 127 | 89771 |
| | Summe | 500 | 1886 | 899 | 564 | 919 | 829 | 726 | 688 | 611 | 803 | 859 | 862 | 570 | 10216 | 9790 | — | 399 | 10189 | 527 | 385270 | |
| VIII. Augenkrankheiten. | 118 | a. Ansteckende. Die kontagöse Augenkrankheit | 14 | 73 | 24 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 15 | 5 | 8 | 3 | 202 | 165 | — | 47 | 212 | 4 | 6732 |
| | 119 | (Granulöser (follikulärer) Bindehautkatarrh Granulöse (follikuläre) Bindehauterkrankungen und Folgezustände) | 1 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 42 | 28 | — | 10 | 38 | 5 | 2149 |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|------------------------------|---|--|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | | |
| noch VIII. Augenkrankheiten. | 120 | Akute Blennorrhoe | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | — | 1 | 4 | — | 290 | |
| | 121 | Chronische Blennorrhoe | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 22 | |
| | 122 | Tripper-Blennorrhoe | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 222 | |
| | | Summe a | 15 | 96 | 27 | 15 | 17 | 14 | 19 | 14 | 13 | 16 | 5 | 9 | 8 | 253 | 198 | — | 60 | 258 | 10 | 9415 | |
| | | b. Nicht ansteckende. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123 | Krankheiten der Lider | 3 | 75 | 125 | 117 | 86 | 106 | 122 | 69 | 74 | 73 | 99 | 73 | 50 | 1069 | 1056 | — | 9 | 1065 | 7 | 6455 | |
| | 124 | Krankheiten der Bindehaut | 55 | 475 | 436 | 296 | 513 | 474 | 443 | 413 | 445 | 450 | 417 | 302 | 248 | 4912 | 4846 | — | 54 | 4900 | 67 | 47321 | |
| | 125 | Krankheiten der Tränenorgane | 8 | 19 | 14 | 8 | 9 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 87 | 61 | — | 33 | 94 | 1 | 2041 | |
| | 126 | Krankheiten der Augenmuskeln | — | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 22 | 16 | — | 5 | 21 | 1 | 425 | |
| | 127 | Krankheiten der Hornhaut | 47 | 73 | 84 | 71 | 80 | 80 | 88 | 80 | 81 | 82 | 104 | 82 | 59 | 964 | 939 | — | 37 | 976 | 35 | 22056 | |
| | 128 | Krankheiten der Regenbogenhaut | 4 | 10 | 9 | 6 | 12 | 7 | 17 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 92 | 78 | — | 13 | 91 | 5 | 3721 | |
| | 129 | Krankheiten der Linse | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | 3 | 1 | — | — | 20 | 6 | — | 17 | 23 | 1 | 958 | |
| | 130 | Krankheiten der Aderhaut | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 15 | — | 17 | 32 | — | 1591 | |
| | 131 | Krankheiten des Sehnerven und der Netzhaut | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 67 | 24 | — | 42 | 66 | 6 | 3139 | |
| 132 | Krankheiten und Fehler des Brechungs- und Einstellungsvermögens | 2 | 41 | 46 | 25 | 19 | 13 | 16 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 193 | 86 | — | 107 | 193 | 2 | 3273 | | |
| 133 | Nachtblindheit . . | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 1 | 10 | 9 | — | 1 | 10 | — | 155 | | |
| 134 | Andere Augenkrankheiten | 10 | 18 | 15 | 12 | 27 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | 207 | 176 | — | 34 | 210 | 7 | 4942 | | |
| | Gesamtsumme (a und b) | 158 | 821 | 771 | 565 | 774 | 731 | 752 | 619 | 652 | 666 | 670 | 512 | 390 | 7923 | 7510 | — | 429 | 7939 | 142 | 105492 | | |
| IX. Ohrenkrankheiten. | 135 | Krankheiten der Ohrmuschel | — | 7 | 9 | 8 | 12 | 13 | 17 | 8 | 15 | 8 | 7 | 9 | — | 113 | 112 | — | — | 112 | 1 | 1780 | |
| | 136 | Krankheiten des äußeren Gehörgangs | 15 | 100 | 122 | 75 | 137 | 121 | 136 | 87 | 98 | 113 | 143 | 106 | 51 | 1289 | 1282 | — | 5 | 1287 | 17 | 13687 | |
| | 137 | Krankheiten des mittleren und inneren Ohrs | 145 | 632 | 475 | 341 | 598 | 522 | 425 | 269 | 294 | 361 | 485 | 352 | 181 | 4935 | 4000 | 5 | 909 | 4914 | 166 | 126879 | |
| | 138 | Schwerhörigkeit . | 5 | 32 | 24 | 9 | 22 | 15 | 13 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 10 | 160 | 85 | — | 74 | 159 | 6 | 3051 | |
| | 139 | Andere Ohrenkrankheiten | — | 2 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | — | — | 10 | — | 181 | |
| | Summe | 165 | 773 | 630 | 433 | 771 | 671 | 592 | 374 | 414 | 492 | 643 | 471 | 243 | 6507 | 5489 | 5 | 988 | 6482 | 190 | 145578 | | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage |
|---|--|---|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen. | 140 | Krätze | 3 | 229 | 141 | 134 | 227 | 146 | 134 | 127 | 62 | 52 | 54 | 46 | 46 | 1398 | 1395 | — | — | 1395 | 6 | 6938 |
| | 141 | Akute Hautkrankheiten | 85 | 482 | 471 | 348 | 516 | 495 | 422 | 434 | 420 | 381 | 406 | 366 | 286 | 5027 | 4956 | — | 41 | 4997 | 115 | 81594 |
| | 142 | Chronische Hautkrankheiten | 26 | 77 | 56 | 31 | 54 | 54 | 41 | 29 | 33 | 38 | 26 | 27 | 18 | 484 | 397 | — | 98 | 495 | 15 | 16447 |
| | 143 | Chronisches Unterschenkelgeschwür | 8 | 37 | 36 | 26 | 45 | 50 | 36 | 36 | 40 | 39 | 29 | 18 | 16 | 408 | 377 | — | 28 | 405 | 11 | 11507 |
| | 144 | Panaritium | 85 | 379 | 694 | 809 | 604 | 572 | 638 | 485 | 419 | 310 | 308 | 253 | 199 | 5670 | 5500 | 2 | 145 | 5647 | 108 | 120586 |
| | 145 | Zellgewebsentzündung u. Ausgänge | 906 | 2016 | 3362 | 3163 | 3404 | 3226 | 3730 | 2918 | 2828 | 2565 | 3036 | 2578 | 2530 | 35356 | 35113 | 9 | 266 | 35388 | 874 | 470167 |
| | 146 | Furunkel | 375 | 1672 | 2818 | 2456 | 2666 | 2574 | 2669 | 2139 | 2235 | 2111 | 2323 | 2160 | 1439 | 27262 | 27288 | — | 22 | 27310 | 327 | 255374 |
| | 147 | Gutartige Geschwülste | 15 | 48 | 58 | 39 | 59 | 66 | 68 | 49 | 67 | 89 | 70 | 73 | 37 | 723 | 701 | — | 20 | 721 | 17 | 11770 |
| | 148 | Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen | 3 | 9 | 11 | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | 7 | 7 | 11 | 12 | 5 | 99 | 83 | — | 16 | 99 | 3 | 2215 |
| | Summe | 1506 | 4949 | 7647 | 7013 | 7584 | 7188 | 7752 | 6219 | 6111 | 5592 | 6263 | 5533 | 4576 | 76427 | 75810 | 11 | 636 | 76457 | 1476 | 976598 | |
| XI. Krankheiten der Bewegungsorgane. | 149 und 150 | Entzündung der Knochenhaut und Knochen | 132 | 137 | 405 | 380 | 611 | 535 | 616 | 497 | 450 | 410 | 455 | 346 | 357 | 5199 | 4916 | 3 | 297 | 5216 | 115 | 98412 |
| | 151 | Mißbildung der Knochen | 3 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 73 | 52 | — | 24 | 76 | — | 1450 |
| | 152 | Akute Gelenkentzündung | 63 | 100 | 253 | 182 | 303 | 226 | 259 | 182 | 164 | 194 | 204 | 149 | 135 | 2351 | 2174 | 1 | 165 | 2340 | 74 | 51791 |
| | 153 | Chronische Gelenkentzündung | 32 | 58 | 56 | 38 | 56 | 45 | 53 | 26 | 45 | 33 | 37 | 23 | 15 | 485 | 141 | 1 | 359 | 501 | 16 | 20223 |
| | 154 | Mißbildung der Gelenke | — | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 33 | 15 | — | 17 | 32 | 1 | 892 |
| | 155 | Fußgeschwulst . | 607 | 464 | 959 | 501 | 614 | 631 | 1263 | 1139 | 1261 | 1273 | 1663 | 1262 | 2214 | 13244 | 13140 | — | 93 | 13233 | 618 | 167241 |
| | 156 | Plattfüßigkeit und Folgezustände | 10 | 30 | 110 | 59 | 86 | 109 | 93 | 69 | 62 | 46 | 40 | 39 | 35 | 778 | 620 | — | 165 | 785 | 3 | 10997 |
| | 157 | Andere Verbindungen des Fußes u Folgezustände | — | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 25 | 11 | — | 14 | 25 | — | 490 |
| | 158 | Muskelrheumatismus | 40 | 348 | 550 | 490 | 730 | 724 | 693 | 545 | 515 | 476 | 635 | 562 | 429 | 6697 | 6647 | — | 28 | 6675 | 62 | 49517 |
| | 159 | Exerzier- und Reitknochen | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 42 | 34 | — | 6 | 40 | 3 | 1281 |
| | 160 | Andere Krankheiten der Muskeln | 8 | 18 | 38 | 20 | 22 | 18 | 16 | 9 | 7 | 16 | 14 | 7 | 8 | 193 | 135 | — | 61 | 196 | 5 | 5205 |
| 161 und 162 | Krankheiten der Schleimbeutel und Sehnen | 127 | 295 | 624 | 368 | 573 | 534 | 824 | 528 | 457 | 474 | 607 | 503 | 538 | 6325 | 6222 | — | 129 | 6351 | 101 | 78844 | |
| | Summe | 1023 | 1468 | 3016 | 2051 | 3011 | 2842 | 3832 | 3005 | 2970 | 2934 | 3674 | 2904 | 3738 | 35445 | 34107 | 5 | 1358 | 35470 | 998 | 486343 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage |
|--------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII. Mechanische Verletzungen. | 163 | Wundlaufen . . . | 30 | 149 | 237 | 206 | 340 | 320 | 531 | 339 | 470 | 487 | 644 | 477 | 676 | 4876 | 4876 | — | 5 | 4881 | 25 | 30984 |
| | 164 | Wundreiten . . . | 3 | 45 | 60 | 91 | 79 | 61 | 78 | 23 | 31 | 17 | 21 | 13 | 9 | 528 | 527 | 1 | 1 | 529 | 2 | 4644 |
| | 165 | Quetschung { der Weichteile ohne äußere Wunde | 290 | 1187 | 1714 | 1298 | 1771 | 1802 | 1840 | 1450 | 1622 | 1711 | 2083 | 1550 | 889 | 18917 | 18583 | 2 | 291 | 18876 | 331 | 223733 |
| | 166 | | innerer Organe | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 67 | 53 | 3 | 13 | 69 | 4 |
| | 167 | Zerreiſung innerer Organe | 4 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 3 | 3 | 17 | 4 | 10 | 6 | 20 | 1 | 662 |
| | 168 | Knochenbruch { des Oberarms | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 79 | 48 | — | 33 | 81 | 9 | 4574 |
| | 169 | | des Unterarms | 36 | 33 | 42 | 28 | 24 | 29 | 26 | 22 | 23 | 18 | 28 | 26 | 32 | 331 | 260 | — | 63 | 323 | 44 |
| | 170 | der Hand . . . | 19 | 29 | 37 | 35 | 39 | 34 | 38 | 34 | 54 | 39 | 56 | 50 | 17 | 462 | 418 | — | 42 | 460 | 21 | 15626 |
| | 171 | Knochenbruch { des Ober- schenkels | 14 | 10 | 6 | 13 | 11 | 3 | 10 | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 92 | 13 | — | 79 | 92 | 14 | 8597 |
| | 172 | | des Unter- schenkels | 95 | 44 | 58 | 45 | 66 | 50 | 65 | 65 | 63 | 44 | 52 | 49 | 65 | 666 | 384 | 1 | 273 | 658 | 103 |
| | 173 | des Fußes . . | 333 | 62 | 56 | 46 | 54 | 63 | 122 | 152 | 199 | 183 | 289 | 209 | 368 | 1803 | 1798 | — | 96 | 1894 | 242 | 57179 |
| | 174 | des Kopfes . . | 24 | 17 | 21 | 19 | 26 | 15 | 16 | 19 | 22 | 20 | 17 | 17 | 12 | 221 | 159 | 15 | 50 | 224 | 21 | 9220 |
| | 175 | des Schlüssel- beins | 14 | 24 | 16 | 12 | 20 | 18 | 20 | 8 | 17 | 26 | 27 | 17 | 22 | 227 | 208 | — | 11 | 219 | 22 | 8133 |
| | 176 | des Schulter- blatts | 2 | — | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | 15 | 12 | — | 3 | 15 | 2 | 657 |
| | 177 | der Rippen . . | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 12 | 18 | 18 | 7 | 8 | 112 | 108 | — | 4 | 112 | 6 | 2789 |
| | 178 | der Wirbelsäule | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | — | 1 | 6 | 7 | 2 | 658 |
| | 179 | des Beckens . | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | — | 8 | 13 | 3 | 705 |
| | 180 und 181 | Verstauchung der Gelenke | 277 | 974 | 2036 | 1252 | 1785 | 1708 | 1852 | 1405 | 1506 | 1471 | 1853 | 1563 | 954 | 18359 | 17963 | — | 414 | 18377 | 259 | 230261 |
| | 182 | Verrenkung { der Gelenke der oberen Glied- maßen | 35 | 44 | 33 | 33 | 41 | 32 | 39 | 27 | 34 | 57 | 67 | 53 | 28 | 488 | 419 | — | 67 | 486 | 37 | 15045 |
| 183 | der Gelenke der unteren Glied- maßen | | 12 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 69 | 61 | — | 14 | 75 | 6 | 2687 |
| 184 | anderer Gelenke | | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | — | 1 | 5 | — | 175 |
| 185 | Wunden { Schufs- | 44 | 11 | 9 | 22 | 15 | 27 | 19 | 18 | 26 | 28 | 42 | 38 | 36 | 291 | 217 | 10 | 62 | 289 | 46 | 11807 | |
| 186 | | Hieb- u. Schnitt- | 65 | 288 | 260 | 209 | 293 | 240 | 222 | 252 | 254 | 307 | 308 | 251 | 219 | 3103 | 3027 | — | 68 | 3095 | 73 | 40252 |
| 187 | | Stich- | 23 | 73 | 75 | 63 | 101 | 88 | 109 | 91 | 92 | 106 | 107 | 92 | 80 | 1077 | 1061 | 2 | 8 | 1071 | 29 | 12803 |
| 188 | | Rifs- u. Quetsch- | 211 | 795 | 958 | 914 | 998 | 909 | 985 | 948 | 933 | 1007 | 1196 | 864 | 589 | 11096 | 11030 | 3 | 86 | 11119 | 188 | 136259 |
| 189 | Bifs- | 6 | 30 | 39 | 35 | 35 | 34 | 32 | 24 | 25 | 22 | 22 | 19 | 13 | 330 | 330 | — | 2 | 332 | 4 | 4426 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|-------------------------------------|-------------------|--|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| noch XII. Mechanische Verletzungen. | 190 | Verbrennung . . . | 15 | 137 | 164 | 165 | 158 | 150 | 130 | 122 | 101 | 98 | 119 | 97 | 70 | 1511 | 1495 | 1 | 6 | 1502 | 24 | 19793 |
| | 191 | Erfrierung (Frostschäden) | — | 14 | 122 | 375 | 134 | 120 | 126 | 87 | 18 | 1 | — | 1 | — | 998 | 980 | 4 | 13 | 997 | 1 | 11328 |
| | 192 | Andere Wunden u. Verletzungen | 10 | 97 | 149 | 75 | 80 | 78 | 78 | 65 | 48 | 53 | 80 | 52 | 38 | 893 | 854 | — | 32 | 886 | 17 | 11210 |
| | | Summe | 1588 | 4089 | 6125 | 4963 | 6104 | 5819 | 6369 | 5188 | 5573 | 5744 | 7055 | 5476 | 4150 | 66655 | 64897 | 53 | 1757 | 66707 | 1536 | 925587 |
| XIII. Andere Krankheiten. | 193 | Selbstverstümmelung | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 5 | 3 | — | 2 | 5 | — | 305 |
| | 194 | Selbstmordversuch | 6 | 7 | 11 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 11 | 8 | 13 | 5 | 3 | 104 | 50 | 27 | 26 | 103 | 7 | 3603 |
| | 195 | Vorgetäuschte Krankheiten | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 42 |
| | 196 | Allgemeine Körperschwäche | 2 | 18 | 24 | 10 | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 113 | 22 | — | 91 | 113 | 2 | 2339 |
| | 197 | Altersschwäche | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Summe | 9 | 26 | 35 | 18 | 25 | 19 | 13 | 11 | 17 | 15 | 21 | 14 | 8 | 222 | 76 | 27 | 119 | 222 | 9 | 6289 | |
| XIV. | 198 | Zur Beobachtung | 104 | 784 | 613 | 319 | 408 | 323 | 379 | 211 | 218 | 243 | 337 | 286 | 422 | 4543 | 4439 | — | 1) 6 | 4445 | 202 | 66163 |
| | | Gesamtsumme | 7102 | 21056 | 29513 | 27879 | 38858 | 32826 | 32597 | 24985 | 24864 | 23280 | 28205 | 23320 | 19016 | 326399 | 308970 | 745 | 16495 | 326210 | 7291 | 4861070 |
| | | Davon kamen in Lazarett- (einschließlich Lazarett- und Revier-) Behandlung | — | 11277 | 12229 | 10866 | 14898 | 12593 | 12308 | 10027 | 10282 | 9695 | 11155 | 9485 | 10090 | 134905 | — | — | — | — | — | — |

1) Siehe Anmerkung 1) auf Seite 32*.

4. Die durchschnittliche Iststärke der Armeekorps in den einzelnen Monaten.

| Armeekorps | Ok- tober | No- vember | De- zember | Januar | Februar | März | im Durch- schnitt während des Winter- halbjahres | April | Mai | Juni | Juli | August | Sep- tember | im Durch- schnitt während des Sommer- halbjahres | durch- schnittlich während des Berichts- jahres |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|---|--|
| Gardekorps | 33460 | 42496 | 42335 | 42241 | 42104 | 42270 | 40818 | 42933 | 43359 | 41747 | 42923 | 42417 | 37975 | 41892 | 41355 |
| I. Armeekorps | 26482 | 32527 | 32380 | 32321 | 32190 | 32319 | 31370 | 32062 | 33670 | 32507 | 31844 | 32403 | 29017 | 31917 | 31644 |
| II. Armeekorps | 21162 | 26790 | 26581 | 26431 | 26763 | 26593 | 25720 | 26092 | 26108 | 25952 | 27486 | 26598 | 23511 | 25958 | 25839 |
| III. Armeekorps | 19247 | 24129 | 23913 | 23940 | 23977 | 23923 | 23188 | 24711 | 24788 | 24248 | 24055 | 23967 | 21327 | 23849 | 23519 |
| IV. Armeekorps | 18099 | 22814 | 22565 | 22604 | 22985 | 22290 | 21893 | 22479 | 23047 | 22934 | 24972 | 24483 | 19105 | 22837 | 22365 |
| V. Armeekorps | 21146 | 26485 | 26269 | 26196 | 26117 | 26501 | 25452 | 25963 | 26820 | 26245 | 26869 | 26194 | 22572 | 25777 | 25615 |
| VI. Armeekorps | 20651 | 26630 | 26344 | 26207 | 26210 | 26277 | 25387 | 26193 | 26648 | 26094 | 28322 | 26505 | 23693 | 26243 | 25815 |
| VII. Armeekorps | 23481 | 27628 | 27393 | 27314 | 27193 | 27297 | 26718 | 27362 | 27160 | 26972 | 28912 | 26688 | 26060 | 27192 | 26955 |
| VIII. Armeekorps | 22940 | 27411 | 27060 | 27029 | 26843 | 27787 | 26510 | 28446 | 28851 | 26600 | 26559 | 26961 | 26007 | 27237 | 26874 |
| IX. Armeekorps | 20564 | 25620 | 25402 | 25338 | 25233 | 25274 | 24572 | 25861 | 25670 | 26460 | 26200 | 25279 | 22507 | 25330 | 24951 |
| X. Armeekorps | 17775 | 22215 | 22118 | 22052 | 22010 | 22037 | 21368 | 21947 | 23377 | 23097 | 22791 | 22073 | 21471 | 22459 | 21914 |
| XI. Armeekorps | 17256 | 21399 | 21194 | 21056 | 20992 | 20933 | 20472 | 20940 | 22266 | 21041 | 22507 | 22220 | 17395 | 21062 | 20767 |
| XII. (1.K.S.)A.-K. | 14285 | 20925 | 20591 | 20529 | 20546 | 20612 | 19581 | 20486 | 20230 | 20359 | 21352 | 21820 | 17875 | 20354 | 19968 |
| XIII. (K.W.)A.-K. | 19020 | 22433 | 22246 | 22162 | 22084 | 22070 | 21669 | 22121 | 24491 | 22376 | 22879 | 21713 | 21883 | 22577 | 22123 |
| XIV. Armeekorps | 25591 | 32570 | 32197 | 32219 | 32135 | 32172 | 31147 | 33803 | 33394 | 31852 | 32370 | 31844 | 31775 | 32506 | 31827 |
| XV. Armeekorps | 25227 | 32613 | 32279 | 32175 | 31975 | 31971 | 31040 | 32058 | 32569 | 31641 | 32373 | 31760 | 28095 | 31416 | 31228 |
| XVI. Armeekorps | 22639 | 28498 | 28264 | 28030 | 27845 | 27890 | 27194 | 27820 | 27723 | 27563 | 29274 | 27621 | 24523 | 27421 | 27308 |
| XVII. Armeekorps | 24619 | 30827 | 30552 | 30509 | 30255 | 30533 | 29549 | 30625 | 30176 | 30471 | 30734 | 30515 | 25494 | 29669 | 29609 |
| XVIII. Armeekorps | 21566 | 26800 | 26624 | 26495 | 26309 | 26220 | 25669 | 27322 | 27608 | 26825 | 27893 | 26402 | 25368 | 26903 | 26286 |
| XIX. (2.K.S.)A.-K. | 14227 | 21431 | 21213 | 21038 | 20996 | 21040 | 19991 | 21337 | 21381 | 21186 | 22205 | 22640 | 18408 | 21193 | 20592 |
| Armee | 429437 | 542241 | 537520 | 535886 | 534753 | 536009 | 519308 | 540561 | 549336 | 536170 | 552520 | 540103 | 484061 | 533792 | 526554 |

5. Die Häufigkeit der Krankheitsgruppen und wichtigeren Krankheitsformen in den einzelnen Monaten, im Winterhalbjahre 1902/03 und Sommerhalbjahre 1903 nach Armeekorps.

In absoluten Zahlen und in $\frac{0}{00}$ zur bezüglichen monatigen und halbjährigen Iststärke.

Vorbemerkung. Die unter den Bezeichnungen der Krankheitsgruppen u.s.w. im Kopfe der Tabelle befindlichen Zahlen geben die laufenden Nummern der Krankheiten in den vorangegangenen Rapporten an.

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. | | Gruppe III. | | | | Gruppe IV. | |
|-------------------------------|---------|---------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|--|--------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|------------|---|--|------------------|---|--|-------------|------------|-------------|---|--------------------------|---|
| | | | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krank- ungen | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | 2. Akuter Gelenkrheumatis- mus | 3. Chronischer Gelenkrheumatis- mus | 4. Hitzschlag | Krank- heiten des Nerven- systems | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reiten- den Organe | davon Herzkrankheiten | |
| | | | | überhaupt | Pocken (auschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | 1. | 2. | | | | | | 3. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-40 | 1-26 | | | 1 |
| Gardekorps | Oktober | 33460 1,3 | 45 0,78 | 26 0,78 | — | 4 0,12 | — | — | 1 0,03 | 4 0,12 | — | 1 0,03 | — | 6 0,18 | — | — | 9 0,27 | 2 0,06 | — | 15 0,45 | 157 4,7 | 136 4,1 | 3 0,09 | 16 0,48 | 61 1,8 | 28 0,84 | | | |
| I. Armeekorps | Oktober | 26482 1,4 | 37 0,76 | 20 0,76 | — | 1 0,04 | — | — | 3 0,11 | 2 0,08 | — | 2 0,08 | — | 8 0,30 | — | — | 13 0,49 | 1 0,04 | — | 19 0,72 | 181 6,8 | 161 6,1 | 9 0,34 | 6 0,23 | 23 0,87 | 3 0,11 | | | |
| II. Armeekorps | Oktober | 21132 2,1 | 45 2,1 | 33 1,6 | — | 1 0,05 | — | 1 0,05 | 2 0,09 | 1 0,05 | — | 7 0,33 | 2 0,09 | 4 0,19 | — | — | 7 0,33 | 1 0,05 | — | 15 0,71 | 96 4,5 | 79 3,7 | 9 0,43 | 6 0,28 | 17 0,80 | 3 0,14 | | | |
| III. Armeekorps | Oktober | 19247 0,99 | 19 0,99 | 7 0,36 | — | 1 0,05 | — | — | — | — | — | 1 0,05 | — | 5 0,26 | — | — | 7 0,36 | 2 0,10 | — | 7 0,36 | 80 4,2 | 64 3,3 | 12 0,62 | 4 0,21 | 22 1,1 | 7 0,36 | | | |
| IV. Armeekorps | Oktober | 18099 1,0 | 19 1,0 | 10 0,55 | — | 1 0,06 | 1 0,06 | 1 0,06 | — | 1 0,06 | — | 1 0,06 | 1 0,06 | 2 0,11 | — | — | 5 0,28 | 2 0,11 | — | 8 0,44 | 68 3,8 | 57 3,1 | 4 0,22 | 5 0,28 | 23 1,3 | 12 0,66 | | | |
| V. Armeekorps | Oktober | 21146 0,80 | 17 0,80 | 7 0,33 | — | — | 2 0,09 | — | — | 1 0,05 | — | 1 0,05 | — | 3 0,14 | — | — | 5 0,24 | 2 0,09 | — | 18 0,85 | 91 4,3 | 66 3,1 | 13 0,61 | 7 0,33 | 15 0,71 | 11 0,52 | | | |
| VI. Armeekorps | Oktober | 20651 0,97 | 20 0,97 | 10 0,48 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | — | 1 0,05 | 5 0,24 | — | 1 0,05 | — | 1 0,05 | — | — | 5 0,24 | 2 0,10 | — | 18 0,83 | 88 4,3 | 75 3,6 | 8 0,39 | 3 0,15 | 40 1,9 | 27 1,3 | | | |
| VII. Armeekorps | Oktober | 23481 1,8 | 42 1,8 | 24 1,0 | — | 3 0,13 | 1 0,04 | — | — | 2 0,09 | — | 4 0,17 | — | 6 0,26 | — | — | 10 0,43 | 1 0,04 | — | 18 0,77 | 132 5,6 | 120 5,1 | 4 0,17 | 5 0,21 | 26 1,1 | 17 0,72 | | | |
| VIII. Armeekorps | Oktober | 22940 3,0 | 69 3,0 | 58 2,5 | — | — | 2 0,09 | 7 0,31 | 1 0,04 | — | — | 32 1,4 | 1 0,04 | 13 0,57 | — | — | 7 0,31 | 1 0,04 | — | 17 0,74 | 155 6,8 | 140 6,1 | 6 0,26 | 5 0,22 | 37 1,6 | 26 1,1 | | | |
| IX. Armeekorps | Oktober | 20564 1,3 | 27 1,3 | 14 0,68 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | — | 1 0,05 | 2 0,10 | — | — | — | 1 0,05 | 1 0,05 | — | 7 0,34 | 2 0,10 | — | 11 0,53 | 82 4,0 | 66 3,2 | 5 0,24 | 8 0,39 | 14 0,68 | 5 0,21 | | | |
| X. Armeekorps | Oktober | 17775 1,1 | 19 1,1 | 9 0,51 | — | 1 0,06 | 1 0,06 | 1 0,06 | 3 0,17 | — | — | 1 0,06 | — | 2 0,11 | — | — | 5 0,28 | 1 0,06 | — | 13 0,73 | 80 4,5 | 61 3,4 | 11 0,62 | 6 0,34 | 19 1,1 | 8 0,45 | | | |
| XI. Armeekorps | Oktober | 17256 1,3 | 23 1,3 | 15 0,87 | — | 1 0,06 | — | — | — | — | — | 3 0,17 | — | 5 0,29 | — | — | 5 0,29 | 2 0,12 | — | 7 0,41 | 98 5,7 | 83 4,8 | 5 0,29 | 9 0,52 | 16 0,93 | 7 0,41 | | | |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | Oktober | 14285 1,2 | 17 1,2 | 7 0,49 | — | 2 0,14 | — | — | — | 2 0,14 | — | — | — | 2 0,14 | — | — | 8 0,56 | — | — | 8 0,56 | 49 3,4 | 42 2,9 | 5 0,35 | 2 0,14 | 10 0,70 | 1 0,07 | | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | Oktober | 19020 0,79 | 15 0,79 | 9 0,47 | — | — | — | — | — | 2 0,11 | — | — | — | 5 0,26 | — | — | 4 0,21 | 1 0,05 | — | 17 0,99 | 143 7,5 | 134 7,0 | 3 0,16 | 5 0,26 | 55 2,9 | 42 2,2 | | | |
| XIV. Armeekorps | Oktober | 25591 0,70 | 18 0,70 | 9 0,35 | — | — | — | 1 0,04 | — | 1 0,04 | — | 1 0,04 | — | 5 0,20 | — | — | 4 0,16 | 2 0,08 | — | 20 0,78 | 102 4,0 | 89 3,5 | 5 0,20 | 7 0,27 | 36 1,4 | 19 0,74 | | | |
| XV. Armeekorps | Oktober | 25227 1,2 | 30 1,2 | 15 0,59 | — | — | 2 0,08 | 1 0,04 | — | 1 0,04 | — | 3 0,12 | 1 0,04 | 7 0,28 | — | — | 5 0,20 | 1 0,04 | — | 24 0,95 | 137 5,4 | 121 4,8 | 7 0,28 | 6 0,24 | 33 1,3 | 10 0,40 | | | |
| XVI. Armeekorps | Oktober | 22639 0,93 | 21 0,93 | 8 0,35 | — | — | — | — | — | 1 0,04 | — | 2 0,09 | — | 3 0,13 | — | — | 8 0,35 | — | — | 9 0,40 | 128 5,7 | 108 4,8 | 9 0,40 | 9 0,40 | 25 1,1 | 12 0,53 | | | |
| XVII. Armeekorps | Oktober | 24619 1,4 | 34 1,4 | 26 1,1 | — | 3 0,12 | 2 0,08 | — | — | 8 0,32 | — | 3 0,12 | — | 8 0,32 | — | — | 6 0,24 | 1 0,04 | — | 14 0,57 | 106 4,3 | 92 3,7 | 12 0,49 | 2 0,08 | 25 1,0 | 10 0,41 | | | |
| XVIII. Armeekorps | Oktober | 21566 1,9 | 40 1,9 | 22 1,0 | — | 1 0,05 | — | — | 1 0,05 | 5 0,23 | — | 1 0,05 | — | 10 0,46 | — | — | 7 0,32 | 1 0,05 | — | 22 1,0 | 118 5,5 | 96 4,5 | 6 0,28 | 8 0,37 | 49 2,3 | 37 1,7 | | | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Oktober | 14227 1,3 | 18 1,3 | 8 0,56 | — | — | — | — | — | — | — | 2 0,14 | — | 4 0,28 | — | — | 7 0,49 | 1 0,07 | — | 12 0,84 | 36 2,5 | 28 2,0 | 5 0,35 | 1 0,07 | 17 1,2 | 5 0,35 | | | |
| Armee | Oktober | 429437 1,3 | 575 1,3 | 337 0,78 | — | 21 0,05 | 13 0,03 | 12 0,03 | 13 0,03 | 38 0,09 | — | 66 0,15 | 6 0,01 | 100 0,23 | — | — | 134 0,31 | 26 0,06 | — | 292 0,68 | 2128 5,0 | 1818 4,2 | 141 0,33 | 120 0,28 | 563 1,3 | 290 0,68 | | | |

| Krankheiten der Ernährungsorgane | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ausschl. der venesischen | Gruppe VII. Venereische Krankheiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohrenkrankheiten | Gruppe X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen | Gruppe XI. Krankheiten der Bewegungsorgane | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krankheiten | Gruppe XIV. Zur Beobachtung | Summe des Zugangs | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--|--|--------------|------------|--------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | davon | davon | davon | davon | davon | davon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. | | | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-198 | | | | | | | | |
| 222 6,6 | 80 2,4 | 50 1,5 | 21 0,63 | 5 0,15 | 20 0,60 | 161 4,8 | 25 0,75 | 55 1,6 | — | 42 1,3 | 424 12,7 | 372 11,1 | 109 3,3 | 376 11,2 | 129 3,9 | 26 0,78 | 77 2,3 | 3 0,09 | 1 0,03 | 108 3,2 | 4 0,12 | 3 0,09 | — | 63 1,9 | 1753 52,4 | | | | | | | | |
| 109 4,1 | 54 2,0 | 15 0,57 | 15 0,57 | 3 0,11 | 28 1,1 | 232 8,8 | 29 1,1 | 80 3,0 | 10 0,38 | 62 2,3 | 434 16,4 | 279 10,5 | 86 3,2 | 245 9,3 | 63 2,4 | 11 0,42 | 59 2,2 | 3 0,11 | — | 84 3,2 | — | — | — | 38 1,4 | 1574 59,4 | | | | | | | | |
| 95 4,5 | 42 2,0 | 17 0,80 | 7 0,33 | 3 0,14 | 11 0,52 | 109 5,2 | 11 0,52 | 54 2,6 | 13 0,61 | 36 1,7 | 295 13,9 | 253 12,0 | 99 4,7 | 225 10,6 | 63 3,0 | 9 0,43 | 58 2,7 | 3 0,14 | 1 0,05 | 62 2,9 | 9 0,43 | 2 0,09 | 1 0,05 | 37 1,7 | 1136 53,7 | | | | | | | | |
| 87 4,5 | 36 1,9 | 22 1,1 | 9 0,47 | 2 0,10 | 6 0,31 | 112 5,8 | 23 1,2 | 38 2,0 | 16 0,83 | 47 2,4 | 174 9,0 | 137 7,1 | 45 2,3 | 146 7,6 | 47 2,4 | 5 0,26 | 35 1,8 | 3 0,16 | 1 0,05 | 43 2,2 | 4 0,21 | — | — | 30 1,6 | 813 42,2 | | | | | | | | |
| 113 6,0 | 37 2,0 | 21 1,2 | 17 0,94 | 4 0,22 | 14 0,77 | 98 5,4 | 13 0,72 | 33 1,8 | 2 0,11 | 58 3,2 | 244 13,5 | 198 10,9 | 46 2,5 | 194 10,7 | 61 3,4 | 14 0,77 | 54 3,0 | 4 0,22 | — | 44 2,4 | 6 0,33 | 1 0,06 | — | 37 2,0 | 956 52,8 | | | | | | | | |
| 124 5,9 | 39 1,8 | 27 1,3 | 11 0,52 | 2 0,09 | 20 0,95 | 105 5,0 | 19 0,90 | 38 1,8 | 4 0,19 | 37 1,7 | 255 12,1 | 220 10,4 | 66 3,1 | 195 9,2 | 63 3,0 | 12 0,57 | 33 1,6 | 3 0,14 | 1 0,05 | 60 2,8 | — | — | — | 59 2,8 | 1040 49,2 | | | | | | | | |
| 90 4,4 | 24 1,2 | 24 1,2 | 12 0,58 | 1 0,05 | 18 0,87 | 94 4,6 | 18 0,87 | 56 2,7 | 11 0,53 | 33 1,6 | 205 9,9 | 166 8,0 | 55 2,7 | 165 8,0 | 46 2,3 | 7 0,34 | 43 2,1 | — | 3 0,15 | 47 2,3 | 6 0,29 | 3 0,15 | — | 47 2,3 | 932 45,1 | | | | | | | | |
| 126 5,4 | 50 2,1 | 35 1,5 | 11 0,47 | 1 0,04 | 12 0,51 | 49 2,1 | 11 0,47 | 38 1,6 | 5 0,21 | 36 1,5 | 240 10,2 | 197 8,4 | 104 4,4 | 183 7,8 | 65 2,8 | 7 0,30 | 29 1,2 | 1 0,04 | — | 59 2,5 | 2 0,09 | — | — | 41 1,7 | 1047 44,6 | | | | | | | | |
| 171 7,5 | 63 2,7 | 32 1,4 | 30 1,3 | 3 0,13 | 11 0,48 | 66 2,9 | 11 0,48 | 42 1,8 | 1 0,04 | 37 1,6 | 269 11,7 | 219 9,5 | 77 3,4 | 269 11,7 | 70 3,1 | 18 0,78 | 67 2,9 | 1 0,04 | 1 0,04 | 73 3,2 | 7 0,31 | — | — | 54 2,4 | 1274 55,5 | | | | | | | | |
| 112 5,4 | 58 2,8 | 18 0,88 | 13 0,63 | 1 0,05 | 14 0,68 | 100 4,9 | 13 0,63 | 25 1,2 | 1 0,05 | 26 1,3 | 199 9,7 | 161 7,8 | 68 3,3 | 135 6,6 | 33 1,6 | 9 0,44 | 23 1,1 | 2 0,10 | — | 53 2,6 | 3 0,15 | — | — | 17 0,83 | 830 40,4 | | | | | | | | |
| 99 5,6 | 51 2,9 | 18 1,0 | 9 0,51 | — | 16 0,90 | 54 3,0 | 11 0,62 | 28 1,6 | — | 27 1,5 | 213 12,0 | 180 10,1 | 62 3,5 | 172 9,7 | 58 3,3 | 17 0,96 | 35 1,9 | 3 0,17 | — | 44 2,5 | 2 0,11 | 2 0,11 | — | 25 1,4 | 829 46,6 | | | | | | | | |
| 123 7,1 | 49 2,8 | 28 1,6 | 17 0,99 | 1 0,06 | 8 0,46 | 54 3,1 | 8 0,46 | 33 1,9 | — | 22 1,3 | 216 12,5 | 183 10,6 | 75 4,3 | 214 12,4 | 63 3,7 | 12 0,70 | 63 3,7 | 2 0,12 | 1 0,06 | 46 2,7 | — | — | — | 46 2,7 | 935 54,2 | | | | | | | | |
| 71 5,0 | 18 1,3 | 13 0,91 | 19 1,3 | 1 0,07 | 3 0,21 | 108 7,6 | 14 0,98 | 12 0,84 | — | 11 0,77 | 121 8,5 | 101 7,1 | 57 4,0 | 87 6,1 | 22 1,5 | 7 0,49 | 17 1,2 | 1 0,07 | — | 26 1,8 | — | — | — | 8 0,56 | 562 39,3 | | | | | | | | |
| 148 7,8 | 49 2,6 | 21 1,1 | 34 1,8 | 2 0,11 | 22 1,2 | 44 2,3 | 7 0,37 | 27 1,4 | — | 28 1,5 | 245 12,9 | 211 11,2 | 71 3,7 | 280 14,7 | 72 3,8 | 14 0,74 | 97 5,1 | 4 0,21 | — | 43 2,3 | 37 1,9 | 2 0,11 | 1 0,05 | 55 2,9 | 1152 60,6 | | | | | | | | |
| 133 5,2 | 38 1,5 | 25 0,98 | 24 0,94 | 5 0,20 | 14 0,55 | 55 2,1 | 9 0,35 | 31 1,2 | — | 31 1,2 | 243 9,5 | 205 8,0 | 82 3,2 | 205 8,0 | 55 2,1 | 10 0,39 | 52 2,0 | 3 0,12 | — | 68 2,7 | 7 0,27 | 2 0,08 | 1 0,04 | 55 2,1 | 1028 40,2 | | | | | | | | |
| 136 5,4 | 53 2,1 | 28 1,1 | 14 0,56 | 6 0,24 | 19 0,75 | 126 5,0 | 12 0,48 | 41 1,6 | 5 0,20 | 53 2,1 | 268 10,6 | 217 8,6 | 68 2,6 | 260 10,3 | 80 3,2 | 18 0,71 | 52 2,1 | — | 2 0,08 | 87 3,4 | 7 0,28 | 1 0,04 | 1 0,04 | 41 1,6 | 1237 49,0 | | | | | | | | |
| 144 6,4 | 54 2,4 | 39 1,7 | 17 0,75 | 3 0,13 | 16 0,71 | 84 3,7 | 21 0,93 | 64 2,8 | 10 0,44 | 63 2,8 | 301 13,3 | 253 11,2 | 113 5,0 | 230 10,2 | 55 2,4 | 10 0,44 | 53 2,3 | 4 0,18 | — | 88 3,9 | — | — | — | 25 1,1 | 1223 54,0 | | | | | | | | |
| 102 4,1 | 49 2,0 | 19 0,77 | 13 0,53 | 1 0,04 | 12 0,49 | 104 4,2 | 13 0,53 | 61 2,5 | 15 0,61 | 40 1,6 | 239 9,7 | 204 8,3 | 69 2,8 | 215 8,7 | 73 3,0 | 8 0,32 | 46 1,9 | 3 0,12 | — | 61 2,5 | 3 0,12 | 2 0,08 | — | 23 0,93 | 1046 42,5 | | | | | | | | |
| 141 6,5 | 52 2,4 | 26 1,2 | 20 0,93 | 2 0,09 | 23 1,1 | 47 2,2 | 6 0,28 | 47 2,2 | 2 0,09 | 69 3,2 | 259 12,0 | 224 10,4 | 78 3,6 | 200 9,3 | 57 2,6 | 16 0,74 | 54 2,5 | 4 0,19 | — | 54 2,5 | — | 8 0,37 | 1 0,05 | 68 3,2 | 1169 54,2 | | | | | | | | |
| 64 4,5 | 25 1,8 | 6 0,42 | 14 0,98 | 2 0,14 | 5 0,35 | 84 5,9 | 13 0,91 | 18 1,3 | 1 0,07 | 15 1,1 | 105 7,4 | 87 6,1 | 38 2,7 | 93 6,5 | 18 1,8 | 6 0,42 | 27 1,9 | — | — | 36 2,5 | — | — | — | 15 1,1 | 520 36,6 | | | | | | | | |
| 2410 5,6 | 921 2,1 | 484 1,1 | 327 0,76 | 48 0,11 | 292 0,68 | 1886 4,4 | 287 0,67 | 821 1,9 | 96 0,22 | 773 1,8 | 4949 11,5 | 4067 9,5 | 1468 3,4 | 4089 9,5 | 1193 2,8 | 236 0,55 | 974 2,3 | 47 0,11 | 11 0,03 | 1186 2,8 | 97 0,23 | 26 0,06 | 7 0,02 | 784 1,8 | 21056 49,0 | | | | | | | | |

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krank- ungen | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. | | | Gruppe III. | | | | Gruppe IV. | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|--|--------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|----------------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--|---|------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | 2. Akuter Gelenkrheumatismus | 3. Chronischer Gelenkrheumatismus | 4. Hitzschlag | Krank- heiten des Nerven- systems | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reiten- den Organe | davon Herzkrankheiten |
| | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Kata- rhe der Schleim- häute der Luftwege | 2. Akute Lungenentzündung | 3. Brustfellentzündung und Ausgänge auschl. No. 19 | | |
| | | | | überhaupt | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | 18- 21 | 22 | | | | | | | | | | |
| 1-40 | 1-20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18- 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 38 | 41-52 | 53-63 | 53- 57 | 58 | 60 | 64-79 | 64- 68 | | | | | |
| Gardekorps | November | 42496 0/0 | 88 2,1 | 55 1,3 | — | 1 0,02 | — | 2 0,05 | 1 0,02 | 2 0,05 | — | — | — | 1 0,02 | 6 0,14 | — | — | 23 0,54 | 3 0,07 | — | 26 0,61 | 306 7,2 | 265 6,2 | 16 0,38 | 24 0,56 | 41 0,96 | 13 0,31 | |
| I. Armee- korps | November | 32527 0/0 | 48 1,5 | 26 0,80 | — | 3 0,09 | 2 0,06 | 1 0,03 | 1 0,03 | 2 0,06 | — | — | — | — | 4 0,12 | — | — | 11 0,34 | 7 0,22 | — | 17 0,52 | 217 6,7 | 181 5,6 | 27 0,83 | 6 0,18 | 32 0,98 | 10 0,31 | |
| II. Armee- korps | November | 26790 0/0 | 37 1,4 | 24 0,90 | — | — | 2 0,07 | 3 0,11 | — | 5 0,19 | — | — | 2 0,07 | — | 2 0,07 | — | — | 8 0,30 | 1 0,01 | — | 18 0,67 | 116 4,3 | 97 3,6 | 13 0,49 | 5 0,19 | 30 1,1 | 9 0,34 | |
| III. Armee- korps | November | 24129 0/0 | 27 1,1 | 11 0,46 | — | 5 0,21 | 1 0,01 | — | — | 1 0,04 | — | — | — | — | 4 0,17 | — | — | 11 0,46 | 2 0,08 | — | 5 0,21 | 116 4,8 | 94 3,9 | 12 0,50 | 10 0,41 | 18 0,75 | 4 0,17 | |
| IV. Armee- korps | November | 22814 0/0 | 26 1,1 | 8 0,35 | — | — | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | — | — | 1 0,04 | — | 2 0,09 | — | — | 14 0,61 | — | — | 15 0,66 | 92 4,0 | 78 3,4 | 10 0,44 | 4 0,18 | 20 0,88 | 7 0,31 | |
| V. Armee- korps | November | 26485 0/0 | 28 1,1 | 15 0,57 | — | 1 0,04 | 1 0,01 | — | 1 0,04 | 6 0,23 | — | — | 2 0,08 | — | 3 0,11 | — | — | 7 0,26 | 1 0,04 | — | 18 0,68 | 113 4,3 | 98 3,7 | 11 0,42 | 2 0,08 | 18 0,68 | 10 0,38 | |
| VI. Armee- korps | November | 26630 0/0 | 25 0,94 | 14 0,53 | — | — | 4 0,15 | — | — | 2 0,08 | — | — | 2 0,08 | 1 0,04 | 5 0,19 | — | — | 5 0,19 | — | — | 18 0,68 | 139 5,2 | 120 4,5 | 14 0,53 | 4 0,15 | 28 1,1 | 12 0,45 | |
| VII. Armee- korps | November | 27628 0/0 | 30 1,1 | 14 0,51 | — | 1 0,04 | — | — | — | 4 0,14 | — | — | 2 0,07 | — | 5 0,18 | — | — | 13 0,47 | 1 0,04 | — | 19 0,69 | 162 5,9 | 134 4,9 | 16 0,58 | 8 0,29 | 43 1,6 | 19 0,69 | |
| VIII. Armee- korps | November | 27411 0/0 | 55 2,0 | 39 1,4 | — | 2 0,07 | — | 1 0,04 | — | 7 0,26 | — | — | 3 0,11 | 1 0,04 | 1 0,04 | — | — | 8 0,39 | 1 0,04 | — | 20 0,73 | 252 9,2 | 233 8,5 | 13 0,47 | 6 0,22 | 65 2,4 | 15 0,54 | |
| IX. Armee- korps | November | 25620 0/0 | 54 2,1 | 40 1,6 | — | — | 6 0,23 | 4 0,16 | 2 0,08 | 8 0,31 | — | — | — | — | 5 0,20 | — | — | 9 0,35 | 2 0,08 | — | 11 0,43 | 178 6,9 | 148 5,8 | 19 0,74 | 9 0,35 | 25 0,98 | 9 0,35 | |
| X. Armee- korps | November | 22215 0/0 | 34 1,5 | 19 0,86 | — | 3 0,14 | — | — | 2 0,09 | 2 0,09 | — | — | — | — | 5 0,23 | — | — | 11 0,50 | 2 0,09 | — | 16 0,72 | 87 3,9 | 74 3,3 | 8 0,36 | 4 0,18 | 31 1,4 | 18 0,81 | |
| XI. Armee- korps | November | 21399 0/0 | 40 1,9 | 18 0,84 | — | 2 0,09 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | — | — | — | — | — | 3 0,14 | — | — | 19 0,89 | 1 0,05 | — | 22 1,0 | 129 6,0 | 115 5,4 | 2 0,09 | 10 0,47 | 36 1,7 | 13 0,61 | |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | November | 20925 0/0 | 33 1,6 | 13 0,62 | — | — | — | — | 1 0,05 | 2 0,10 | — | — | — | — | 6 0,29 | — | — | 16 0,76 | 1 0,05 | — | 20 0,96 | 125 6,0 | 107 5,1 | 13 0,62 | 5 0,24 | 30 1,4 | 7 0,39 | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | November | 22433 0/0 | 129 5,8 | 114 5,1 | — | 1 0,04 | — | 3 0,13 | — | 2 0,09 | — | — | 3 0,13 | — | 4 0,18 | — | — | 15 0,67 | — | — | 21 0,94 | 310 13,8 | 299 13,3 | 3 0,13 | 7 0,31 | 44 2,0 | 23 1,0 | |
| XIV. Armee- korps | November | 32570 0/0 | 57 1,8 | 33 1,0 | — | 2 0,06 | — | 1 0,03 | — | 4 0,12 | — | — | — | — | 12 0,37 | — | — | 17 0,52 | 1 0,03 | — | 24 0,74 | 176 5,4 | 162 5,0 | 6 0,18 | 6 0,18 | 32 0,98 | 10 0,31 | |
| XV. Armee- korps | November | 32613 0/0 | 64 2,0 | 36 1,1 | — | 2 0,06 | 5 0,15 | 3 0,09 | 2 0,06 | 2 0,06 | — | — | 1 0,03 | — | 7 0,21 | — | — | 20 0,61 | 2 0,06 | — | 25 0,77 | 219 6,7 | 202 6,2 | 12 0,37 | 2 0,06 | 40 1,2 | 15 0,46 | |
| XVI. Armee- korps | November | 28498 0/0 | 31 1,1 | 17 0,60 | — | 2 0,07 | — | — | — | 2 0,07 | — | — | 1 0,04 | — | 4 0,14 | — | — | 8 0,28 | 1 0,01 | — | 16 0,56 | 178 6,2 | 156 5,5 | 16 0,56 | 5 0,18 | 44 1,5 | 10 0,35 | |
| XVII. Armee- korps | November | 30827 0/0 | 28 0,91 | 22 0,71 | — | 2 0,06 | 3 0,10 | 4 0,13 | — | 6 0,19 | — | — | 2 0,06 | — | 2 0,06 | — | — | 1 0,03 | 1 0,03 | — | 21 0,68 | 201 6,5 | 172 5,8 | 17 0,55 | 3 0,10 | 23 0,75 | 6 0,19 | |
| XVIII. Armeekorps | November | 26800 0/0 | 46 1,7 | 22 0,82 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 2 0,07 | 2 0,07 | — | — | — | — | 5 0,19 | — | — | 18 0,67 | 1 0,04 | — | 14 0,52 | 155 5,8 | 143 5,3 | 3 0,11 | 6 0,22 | 41 1,5 | 21 0,78 | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | November | 21431 0/0 | 32 1,5 | 13 0,61 | — | 1 0,05 | — | — | — | 2 0,09 | — | — | 2 0,09 | — | 5 0,23 | — | — | 17 0,79 | 1 0,05 | — | 23 1,1 | 89 4,2 | 74 3,5 | 10 0,47 | 4 0,19 | 27 1,3 | 15 0,70 | |
| Armee | November | 542241 0/0 | 912 1,7 | 553 1,0 | — | 29 0,05 | 25 0,05 | 24 0,04 | 14 0,03 | 61 0,11 | — | — | 21 0,04 | 3 0,01 | 90 0,17 | — | — | 251 0,46 | 29 0,05 | — | 369 0,68 | 3360 6,2 | 2958 5,5 | 241 0,44 | 130 0,24 | 668 1,2 | 246 0,45 | |

| Krank- heiten der Ernäh- rungs- organe | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krank- heiten der Harn- und Ge- schlechts- organe ausschl. der vene- rischen | Gruppe VII. Vene- rische Krank- heiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohren- krank- heiten | Gruppe X. Krank- heiten der äußeren Be- deckun- gen | Gruppe XI. Krank- heiten der Bewe- gungs- organe | Me- cha- nische Ver- letzun- gen | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krank- heiten | Gruppe XIV. Zur Be- obach- tung | Summe des Zu- gangs | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|------------------|--|--|--|---|------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---|---|------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | | Krank- heiten | davon | davon | | | | | | | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | | 6. | 7. | |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 122 | 135-139 | 140-148 | 146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-198 |
| | Mandelenzündung | Akuter Magenkatarrh | Akuter Darmkatarrh | Katarrhalische Gelbsucht | | | Konstitutionelle Syphilis | Augenkrankheiten | ansteckende | | | Zellgewebsentzündung | | | Quetschungen, Zerreißungen | Knochenbrüche | Verstauchungen | Verrenkungen | Schulfwunden | Heb-, Schnitt-, Stich-, Riß-, Quetsch- und Bisswunden | Andere Wunden und Verletzungen | | Selbstmordversuche | | |
| 383 9,0 | 199 4,7 | 71 1,7 | 42 0,99 | 3 0,07 | 22 0,52 | 99 2,9 | 18 0,42 | 48 1,1 | — | 47 1,1 | 632 14,9 | 578 13,6 | 243 5,7 | 463 10,9 | 142 3,3 | 28 0,66 | 121 2,8 | 1 0,02 | — | 119 2,8 | 3 0,07 | 3 0,07 | 2 0,05 | 43 1,0 | 2444 57,5 |
| 218 6,7 | 124 3,8 | 27 0,83 | 25 0,77 | 2 0,06 | 28 0,86 | 60 1,8 | 8 0,25 | 50 1,5 | 2 0,06 | 44 1,4 | 557 17,1 | 487 15,0 | 175 5,4 | 391 12,0 | 93 2,9 | 12 0,37 | 141 4,3 | 1 0,03 | 1 0,03 | 95 2,9 | 5 0,15 | 1 0,03 | 1 0,03 | 32 0,98 | 1870 57,5 |
| 153 5,7 | 72 2,7 | 34 1,3 | 16 0,60 | 2 0,07 | 12 0,45 | 36 1,3 | 12 0,45 | 44 1,6 | 1 0,04 | 26 0,97 | 402 15,0 | 360 13,4 | 190 7,1 | 342 12,8 | 104 3,9 | 9 0,34 | 114 4,3 | 3 0,11 | — | 68 2,5 | 10 0,37 | 1 0,04 | — | 20 0,75 | 1427 53,3 |
| 128 5,3 | 69 2,9 | 29 1,2 | 3 0,12 | 1 0,04 | 9 0,37 | 43 1,8 | 10 0,41 | 34 1,4 | 4 0,17 | 14 0,58 | 218 9,0 | 183 7,6 | 119 4,9 | 220 9,1 | 71 2,9 | 18 0,75 | 81 3,4 | — | 2 0,08 | 35 1,5 | 3 0,12 | 2 0,08 | 1 0,04 | 24 0,99 | 977 40,5 |
| 150 6,6 | 79 3,5 | 26 1,1 | 13 0,57 | 1 0,04 | 10 0,44 | 24 1,1 | 2 0,09 | 28 1,2 | 2 0,09 | 42 1,8 | 288 12,6 | 254 11,1 | 125 5,5 | 257 11,3 | 67 2,9 | 10 0,44 | 98 4,3 | 1 0,04 | — | 63 2,8 | 6 0,26 | 5 0,22 | 2 0,09 | 40 1,8 | 1122 49,3 |
| 202 7,6 | 90 3,4 | 41 1,5 | 17 0,64 | 2 0,08 | 17 0,64 | 28 1,1 | 8 0,30 | 32 1,2 | 5 0,19 | 24 0,91 | 308 11,6 | 280 10,6 | 156 5,9 | 256 9,7 | 91 3,4 | 6 0,23 | 57 2,2 | — | — | 71 2,7 | — | — | — | 25 0,94 | 1225 46,3 |
| 182 6,8 | 63 2,4 | 53 2,0 | 26 0,98 | 5 0,19 | 21 0,79 | 50 1,9 | 10 0,38 | 46 1,7 | 1 0,04 | 27 1,0 | 317 11,9 | 291 10,9 | 111 4,2 | 276 10,4 | 85 3,2 | 15 0,56 | 72 2,7 | 2 0,08 | — | 66 2,5 | 10 0,38 | 1 0,04 | — | 47 1,8 | 1288 48,4 |
| 180 6,5 | 98 3,5 | 32 1,2 | 6 0,22 | 1 0,04 | 9 0,33 | 30 1,1 | 6 0,22 | 31 1,1 | — | 29 1,0 | 391 14,2 | 342 12,4 | 171 6,2 | 260 9,4 | 78 2,8 | 8 0,29 | 97 3,5 | 3 0,11 | 2 0,07 | 56 2,0 | — | 3 0,11 | 1 0,04 | 31 1,1 | 1389 50,3 |
| 273 10,0 | 162 5,9 | 40 1,5 | 30 1,1 | 2 0,07 | 19 0,69 | 44 1,6 | 7 0,26 | 49 1,8 | — | 44 1,6 | 447 16,3 | 406 14,8 | 127 4,6 | 332 12,1 | 96 3,5 | 16 0,58 | 123 4,5 | 2 0,07 | — | 59 2,2 | 6 0,22 | 1 0,04 | 1 0,04 | 46 1,7 | 1774 64,7 |
| 182 7,1 | 105 4,1 | 26 1,0 | 15 0,59 | 3 0,12 | 17 0,66 | 37 1,4 | 10 0,39 | 34 1,3 | — | 24 0,94 | 259 10,1 | 235 9,2 | 137 5,3 | 201 7,8 | 51 2,0 | 7 0,27 | 71 2,8 | 1 0,04 | — | 45 1,8 | 5 0,20 | — | — | 14 0,55 | 1173 45,8 |
| 154 6,9 | 89 4,0 | 25 1,1 | 15 0,68 | 2 0,09 | 7 0,32 | 34 1,5 | 7 0,32 | 36 1,6 | — | 25 1,1 | 357 16,1 | 322 14,5 | 111 5,0 | 204 9,2 | 78 3,5 | 11 0,50 | 53 2,4 | 1 0,05 | — | 38 1,7 | 5 0,23 | 1 0,05 | — | 32 1,4 | 1129 50,8 |
| 201 9,4 | 98 4,6 | 34 1,6 | 25 1,2 | 1 0,05 | 18 0,84 | 25 1,2 | 5 0,23 | 36 1,7 | 1 0,05 | 29 1,4 | 412 19,3 | 372 17,4 | 180 8,4 | 357 16,7 | 82 3,8 | 10 0,47 | 136 6,4 | 3 0,14 | — | 77 3,6 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 33 1,5 | 1519 71,0 |
| 181 8,6 | 107 5,1 | 15 0,72 | 25 1,2 | — | 13 0,62 | 61 2,9 | 6 0,29 | 20 0,96 | — | 18 0,86 | 289 13,8 | 263 12,6 | 129 6,2 | 251 12,0 | 85 4,1 | 7 0,33 | 66 3,2 | — | — | 64 3,1 | — | 3 0,14 | — | 17 0,81 | 1190 56,9 |
| 308 13,7 | 164 7,3 | 35 1,6 | 42 1,9 | 2 0,09 | 28 1,2 | 15 0,67 | 6 0,27 | 23 1,0 | — | 24 1,1 | 382 17,0 | 349 15,6 | 170 7,6 | 477 21,3 | 90 4,0 | 22 0,98 | 181 8,1 | 6 0,27 | — | 68 3,0 | 67 3,0 | 3 0,13 | — | 34 1,5 | 1968 87,7 |
| 213 6,5 | 92 2,8 | 36 1,1 | 33 1,0 | 3 0,09 | 24 0,74 | 24 0,74 | 4 0,12 | 40 1,2 | — | 34 1,0 | 472 14,5 | 435 13,4 | 190 5,8 | 340 10,4 | 82 2,5 | 16 0,49 | 109 3,3 | 4 0,12 | 3 0,09 | 84 2,6 | 11 0,34 | 1 0,03 | — | 27 0,83 | 1654 50,8 |
| 241 7,4 | 130 4,0 | 38 1,2 | 26 0,80 | 5 0,15 | 19 0,58 | 83 2,5 | 5 0,15 | 41 1,3 | 1 0,03 | 29 0,89 | 419 12,8 | 376 11,5 | 181 5,5 | 335 10,3 | 101 3,1 | 7 0,21 | 120 3,7 | 2 0,06 | — | 65 2,0 | 12 0,37 | 1 0,03 | 1 0,03 | 29 0,89 | 1726 52,9 |
| 239 8,4 | 121 4,2 | 49 1,7 | 19 0,67 | 4 0,14 | 8 0,28 | 26 0,91 | 7 0,25 | 43 1,5 | 5 0,18 | 31 1,1 | 473 16,6 | 429 15,1 | 121 4,2 | 324 11,4 | 89 3,1 | 8 0,28 | 117 4,1 | 4 0,14 | — | 76 2,7 | — | — | — | 24 0,84 | 1558 54,7 |
| 196 6,4 | 132 4,3 | 29 0,94 | 13 0,42 | 3 0,10 | 18 0,58 | 60 1,9 | 12 0,39 | 63 2,0 | 4 0,13 | 28 0,91 | 321 10,4 | 287 9,3 | 130 4,2 | 293 9,5 | 92 3,0 | 23 0,75 | 91 3,0 | 3 0,10 | 1 0,03 | 44 1,4 | 6 0,19 | — | — | 23 0,75 | 1405 45,6 |
| 220 8,2 | 122 4,6 | 27 1,0 | 22 0,82 | 1 0,01 | 15 0,56 | 36 1,3 | 3 0,11 | 40 1,5 | — | 30 1,1 | 372 13,9 | 330 12,3 | 150 5,6 | 329 12,3 | 96 3,6 | 14 0,52 | 109 4,1 | 1 0,04 | — | 79 2,9 | — | 5 0,19 | — | 30 1,1 | 1483 55,9 |
| 141 6,6 | 62 2,9 | 21 0,98 | 21 0,98 | — | 9 0,42 | 84 3,9 | 19 0,89 | 33 1,5 | 1 0,05 | 61 2,8 | 331 15,4 | 295 13,8 | 100 4,7 | 217 10,1 | 51 2,4 | 6 0,28 | 79 3,7 | 1 0,05 | — | 60 2,8 | — | 3 0,14 | 1 0,05 | 42 2,0 | 1192 55,6 |
| 4145 7,6 | 2178 4,0 | 688 1,3 | 434 0,80 | 43 0,08 | 323 0,60 | 899 1,7 | 165 0,30 | 771 1,4 | 27 0,05 | 630 1,2 | 7647 14,1 | 6874 12,7 | 3016 5,6 | 6125 11,3 | 1724 3,2 | 253 0,47 | 2036 3,8 | 39 0,07 | 9 0,02 | 1332 2,5 | 149 0,27 | 35 0,06 | 11 0,02 | 613 1,1 | 29513 54,4 |

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krankungen | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. Krank- heiten des Nerven- systems | Gruppe III. | | | Gruppe IV. | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|--|--------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe | da- von Herzkrankheiten | | | | | | | | |
| | | | | überhaupt | davon | | | | | | | | | | | | | | 2. Akuter Gelenkrheumatismus | 3. Chronischer Gelenkrheumatismus | | | 4. Hitzschlag | 1. Katarhe der Schleim- häute der Luftwege | 2. Akute Lungentzündung | | | 3. Brustfellentzündung und Ausgänge auschl. No. 19 | | | | | | | |
| | | | | | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | 1—40 | 1—26 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| Gardekorps | Dezember | 42335 ‰ 3,9 | 168 3,1 | 131 3,1 | — | 5 0,12 | — | — | 6 0,14 | 4 0,09 | — | 1 0,02 | — | 1 0,02 | — | — | 30 0,71 | 1 0,02 | — | 15 0,35 | 634 15,0 | 550 13,0 | 49 1,2 | 30 0,71 | 37 0,87 | 9 0,21 | | | | | | | | | |
| I. Armeekorps | Dezember | 32380 ‰ 2,8 | 90 2,1 | 68 2,1 | — | 2 0,06 | 4 0,12 | 3 0,09 | — | 9 0,28 | — | — | — | 1 0,03 | 1 0,03 | — | 15 0,46 | 3 0,09 | — | 19 0,59 | 334 10,3 | 299 9,2 | 26 0,80 | 6 0,19 | 28 0,86 | 6 0,19 | | | | | | | | | |
| II. Armeekorps | Dezember | 26581 ‰ 3,2 | 86 3,2 | 64 2,4 | — | — | 2 0,08 | 5 0,19 | 1 0,04 | 3 0,11 | — | — | — | 1 0,04 | 3 0,11 | — | 17 0,64 | 3 0,11 | — | 13 0,49 | 271 10,2 | 250 9,4 | 15 0,56 | 5 0,19 | 21 0,79 | 6 0,23 | | | | | | | | | |
| III. Armeekorps | Dezember | 23913 ‰ 1,0 | 25 1,0 | 13 0,54 | — | 3 0,13 | — | 3 0,13 | — | 1 0,04 | — | — | — | — | 3 0,13 | — | 10 0,42 | 1 0,04 | — | 8 0,33 | 144 6,0 | 118 4,9 | 18 0,75 | 7 0,29 | 19 0,79 | 6 0,25 | | | | | | | | | |
| IV. Armeekorps | Dezember | 22565 ‰ 0,97 | 22 0,97 | 11 0,49 | — | — | — | 2 0,09 | — | 1 0,04 | — | — | — | 1 0,04 | 3 0,13 | — | 10 0,44 | — | — | 8 0,35 | 120 5,3 | 111 4,9 | 6 0,27 | 3 0,13 | 24 1,1 | 6 0,27 | | | | | | | | | |
| V. Armeekorps | Dezember | 26269 ‰ 1,2 | 31 1,2 | 14 0,53 | — | 1 0,04 | 5 0,19 | — | — | 4 0,15 | — | — | — | — | — | — | 9 0,34 | — | — | 14 0,53 | 208 7,9 | 182 6,9 | 22 0,84 | 3 0,11 | 9 0,34 | 1 0,04 | | | | | | | | | |
| VI. Armeekorps | Dezember | 26344 ‰ 1,2 | 31 1,2 | 14 0,53 | — | — | 7 0,27 | — | 2 0,08 | 1 0,04 | — | 2 0,08 | — | 1 0,04 | — | — | 16 0,61 | — | — | 9 0,34 | 151 5,7 | 132 5,0 | 15 0,57 | 4 0,15 | 20 0,76 | 5 0,19 | | | | | | | | | |
| VII. Armeekorps | Dezember | 27393 ‰ 1,7 | 47 1,7 | 33 1,2 | — | — | 1 0,04 | — | — | 5 0,18 | — | — | — | — | 1 0,04 | — | 13 0,47 | — | — | 10 0,37 | 236 8,6 | 209 7,6 | 17 0,62 | 8 0,29 | 29 1,1 | 6 0,22 | | | | | | | | | |
| VIII. Armeekorps | Dezember | 27060 ‰ 4,4 | 120 4,4 | 99 3,7 | — | 6 0,32 | 1 0,04 | 2 0,07 | 2 0,07 | — | — | — | 1 0,04 | 4 0,15 | 5 0,18 | — | 15 0,55 | 1 0,04 | — | 15 0,55 | 314 11,6 | 287 10,6 | 21 0,78 | 5 0,18 | 42 1,6 | 9 0,33 | | | | | | | | | |
| IX. Armeekorps | Dezember | 25402 ‰ 2,3 | 58 2,3 | 38 1,5 | — | — | 9 0,35 | 5 0,20 | 1 0,04 | 8 0,31 | — | — | — | — | — | — | 19 0,75 | — | — | 14 0,55 | 189 7,4 | 168 6,6 | 19 0,75 | 2 0,08 | 16 0,63 | 4 0,16 | | | | | | | | | |
| X. Armeekorps | Dezember | 22118 ‰ 1,4 | 32 1,4 | 13 0,59 | — | 2 0,09 | — | — | 2 0,09 | 1 0,05 | — | — | — | 1 0,05 | 2 0,09 | 1 0,05 | 13 0,59 | 3 0,14 | — | 9 0,41 | 109 4,9 | 88 4,0 | 14 0,63 | 7 0,32 | 24 1,1 | 7 0,32 | | | | | | | | | |
| XI. Armeekorps | Dezember | 21194 ‰ 5,1 | 108 5,1 | 87 4,1 | — | 1 0,05 | 8 0,38 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | — | — | — | — | — | — | 13 0,61 | 4 0,19 | — | 9 0,42 | 224 10,6 | 195 9,2 | 11 0,52 | 16 0,75 | 15 0,71 | 6 0,28 | | | | | | | | | |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | Dezember | 20591 ‰ 2,1 | 43 2,1 | 19 0,92 | — | 4 0,19 | 1 0,05 | — | — | 1 0,05 | — | — | — | 1 0,05 | 2 0,10 | — | 19 0,92 | 2 0,10 | — | 13 0,63 | 117 5,4 | 98 4,8 | 13 0,63 | 6 0,29 | 21 1,0 | 5 0,24 | | | | | | | | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | Dezember | 22246 ‰ 5,4 | 121 5,4 | 102 4,5 | — | 2 0,09 | — | 2 0,09 | — | — | — | — | — | — | 4 0,18 | — | 14 0,63 | — | — | 11 0,49 | 198 8,9 | 188 8,5 | 6 0,27 | 3 0,13 | 26 1,2 | 8 0,36 | | | | | | | | | |
| XIV. Armeekorps | Dezember | 32197 ‰ 2,8 | 91 2,8 | 68 2,1 | — | 1 0,03 | 1 0,03 | 1 0,03 | 2 0,06 | 2 0,06 | — | — | 1 0,03 | — | 5 0,16 | — | 22 0,68 | — | — | 14 0,43 | 327 10,2 | 308 9,6 | 11 0,34 | 6 0,19 | 29 0,90 | 3 0,09 | | | | | | | | | |
| XV. Armeekorps | Dezember | 32279 ‰ 1,6 | 52 1,6 | 31 0,96 | — | 1 0,03 | — | 3 0,09 | 1 0,03 | 3 0,09 | — | — | — | — | 2 0,06 | — | 17 0,53 | 1 0,03 | — | 18 0,56 | 301 9,3 | 283 8,8 | 13 0,40 | 5 0,15 | 40 1,2 | 14 0,43 | | | | | | | | | |
| XVI. Armeekorps | Dezember | 28264 ‰ 1,7 | 49 1,7 | 28 0,99 | — | 5 0,18 | — | — | 1 0,04 | 8 0,28 | — | — | — | — | 2 0,07 | — | 12 0,42 | 2 0,07 | — | 12 0,42 | 269 9,5 | 247 8,7 | 15 0,53 | 4 0,14 | 38 1,3 | 8 0,28 | | | | | | | | | |
| XVII. Armeekorps | Dezember | 30552 ‰ 2,3 | 70 2,3 | 51 1,7 | — | 4 0,13 | 2 0,06 | 4 0,13 | — | 5 0,16 | — | — | 1 0,03 | — | 5 0,16 | — | 13 0,43 | 2 0,06 | — | 15 0,49 | 391 12,8 | 353 11,6 | 34 1,1 | 3 0,10 | 20 0,65 | 5 0,16 | | | | | | | | | |
| XVIII. Armeekorps | Dezember | 26624 ‰ 2,9 | 77 2,9 | 57 2,1 | — | 1 0,04 | 2 0,08 | — | 2 0,08 | 4 0,15 | — | — | 1 0,04 | — | 3 0,11 | — | 16 0,60 | — | — | 13 0,49 | 391 14,7 | 369 13,9 | 11 0,41 | 9 0,34 | 29 1,1 | 11 0,41 | | | | | | | | | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Dezember | 21213 ‰ 1,3 | 26 1,3 | 14 0,66 | — | 2 0,09 | 3 0,14 | — | — | 6 0,28 | — | — | — | — | 3 0,14 | — | 11 0,52 | 1 0,05 | — | 13 0,61 | 161 7,6 | 142 6,7 | 13 0,61 | 5 0,24 | 16 0,75 | 7 0,39 | | | | | | | | | |
| Armee | Dezember | 537520 ‰ 2,5 | 1347 2,5 | 955 1,8 | — | 40 0,07 | 46 0,09 | 30 0,06 | 21 0,04 | 67 0,12 | — | 9 0,02 | 9 0,02 | 45 0,08 | — | — | 304 0,57 | 24 0,04 | — | 252 0,47 | 5089 9,5 | 4577 8,5 | 349 0,65 | 137 0,25 | 503 0,94 | 132 0,25 | | | | | | | | | |

| Krankheiten der Ernährungsorgane | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ausschl. der venesischen | Gruppe VII. Venerische Krankheiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohrenkrankheiten | Gruppe X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen | Gruppe XI. Krankheiten der Bewegungsorgane | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krankheiten | Gruppe XIV. Zur Beobachtung | Summe des Zugangs | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--|---------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | Krankheiten der Venen | Krankheiten der Augenkrankheiten | Krankheiten der äußeren Bedeckungen | Krankheiten der Bewegungsorgane | davon | | | | | | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | | | | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 80—101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102—111 | 112—117 | 117 | 118—134 | 118—122 | 135—139 | 140—148 | 144—146 | 149—162 | 163—192 | 165—167 | 168—179 | 180 u. 181 | 182—184 | 185 | 186—189 | 192 | 193—197 | 194 | 198 | 1—198 |
| 382 9,0 | 228 5,4 | 57 1,3 | 40 0,94 | 3 0,07 | 10 0,24 | 53 1,3 | 9 0,21 | 41 0,97 | — | 37 0,87 | 640 15,1 | 593 14,0 | 185 4,4 | 374 8,8 | 110 2,6 | 20 0,47 | 81 1,9 | 5 0,12 | 2 0,05 | 115 2,7 | 2 0,05 | — | — | 17 0,40 | 2593 61,2 |
| 237 7,3 | 156 4,8 | 22 0,68 | 35 1,1 | 1 0,03 | 14 0,43 | 31 0,96 | 6 0,19 | 55 1,7 | 4 0,12 | 21 0,65 | 459 14,2 | 362 11,2 | 117 3,6 | 371 11,5 | 86 2,7 | 12 0,37 | 100 3,1 | 1 0,03 | — | 90 2,8 | 3 0,09 | 1 0,03 | 1 0,03 | 26 0,80 | 1803 55,7 |
| 205 7,7 | 130 4,9 | 32 1,2 | 19 0,71 | 1 0,04 | 6 0,23 | 21 0,79 | 6 0,23 | 18 0,68 | — | 23 0,87 | 369 13,9 | 348 13,1 | 122 4,6 | 283 10,6 | 73 2,7 | 6 0,23 | 78 2,9 | 1 0,04 | 1 0,04 | 78 2,9 | 4 0,15 | 2 0,09 | 2 0,04 | 18 0,68 | 1458 54,9 |
| 150 6,3 | 97 4,1 | 22 0,92 | 8 0,33 | 3 0,13 | 8 0,33 | 30 1,3 | 7 0,29 | 17 0,71 | — | 15 0,63 | 213 8,9 | 194 8,1 | 81 3,4 | 189 7,9 | 59 2,5 | 11 0,46 | 51 2,1 | — | — | 29 1,2 | 2 0,08 | 1 0,04 | 1 0,04 | 12 0,50 | 912 38,1 |
| 152 6,7 | 86 3,8 | 33 1,5 | 16 0,71 | 1 0,04 | 9 0,40 | 27 1,2 | 9 0,40 | 22 0,97 | 1 0,04 | 15 0,66 | 256 11,3 | 237 10,5 | 85 3,8 | 232 10,3 | 58 2,6 | 12 0,53 | 60 2,7 | — | 2 0,09 | 57 2,5 | 7 0,31 | 1 0,04 | — | 15 0,66 | 988 43,8 |
| 219 8,3 | 134 5,1 | 24 0,91 | 15 0,57 | 3 0,11 | 8 0,30 | 26 0,99 | 10 0,38 | 24 0,91 | 1 0,04 | 14 0,53 | 353 13,4 | 321 12,2 | 103 3,9 | 224 8,5 | 60 2,3 | 5 0,19 | 41 1,6 | 4 0,15 | — | 58 2,2 | — | 1 0,04 | — | 16 0,61 | 1250 47,6 |
| 170 6,5 | 52 2,0 | 42 1,6 | 46 1,7 | 1 0,04 | 13 0,49 | 27 1,0 | 5 0,19 | 25 0,95 | — | 11 0,42 | 253 9,6 | 234 8,9 | 76 2,9 | 251 9,5 | 67 2,5 | 11 0,42 | 64 2,4 | 1 0,04 | 2 0,08 | 48 1,8 | 8 0,30 | 1 0,04 | 1 0,04 | 16 0,61 | 1054 40,0 |
| 209 7,6 | 144 5,3 | 33 1,2 | 9 0,33 | 1 0,04 | 15 0,55 | 25 0,91 | 2 0,07 | 31 1,1 | 1 0,04 | 28 1,0 | 324 11,8 | 304 11,1 | 115 4,2 | 195 7,1 | 69 2,5 | 12 0,44 | 41 1,5 | 2 0,07 | — | 49 1,8 | — | — | — | 15 0,55 | 1279 46,7 |
| 328 12,1 | 227 8,4 | 27 1,0 | 35 1,3 | — | 10 0,37 | 28 1,0 | 5 0,18 | 34 1,3 | — | 22 0,81 | 396 14,6 | 350 12,9 | 98 3,6 | 272 10,1 | 75 2,8 | 8 0,30 | 70 2,6 | 1 0,04 | 1 0,04 | 73 2,7 | 3 0,11 | 1 0,04 | — | 17 0,63 | 1697 62,7 |
| 169 6,7 | 117 4,6 | 15 0,59 | 11 0,43 | — | 5 0,20 | 20 0,79 | 5 0,20 | 25 0,98 | — | 34 1,3 | 252 9,9 | 236 9,3 | 82 3,2 | 169 6,7 | 46 1,8 | 6 0,24 | 40 1,6 | 2 0,08 | — | 48 1,8 | 3 0,12 | 1 0,04 | — | 4 0,16 | 1038 40,9 |
| 156 7,1 | 95 4,3 | 18 0,81 | 11 0,49 | 2 0,09 | 6 0,27 | 24 1,1 | 7 0,32 | 28 1,3 | — | 21 0,95 | 355 16,1 | 331 15,0 | 78 3,5 | 178 8,1 | 42 1,9 | 16 0,72 | 30 1,4 | 5 0,23 | 1 0,05 | 53 2,4 | 1 0,05 | — | — | 9 0,41 | 1029 46,5 |
| 179 8,4 | 98 4,6 | 21 0,99 | 22 1,0 | 1 0,05 | 12 0,57 | 16 0,75 | 5 0,24 | 23 1,1 | — | 15 0,71 | 305 14,4 | 288 13,6 | 99 4,7 | 214 10,1 | 49 2,3 | 7 0,33 | 64 3,0 | 3 0,14 | 1 0,05 | 49 2,3 | 1 0,05 | 2 0,09 | 1 0,05 | 12 0,57 | 1233 58,2 |
| 196 9,5 | 137 6,7 | 16 0,78 | 19 0,92 | 1 0,05 | 7 0,34 | 33 1,6 | 6 0,29 | 12 0,58 | — | 8 0,39 | 258 12,5 | 234 11,4 | 77 3,7 | 153 7,4 | 44 2,1 | 12 0,58 | 29 1,4 | 2 0,10 | — | 37 1,8 | — | — | — | 8 0,39 | 946 45,9 |
| 243 10,9 | 138 6,2 | 22 0,99 | 35 1,6 | 1 0,04 | 16 0,72 | 10 0,45 | 2 0,09 | 22 0,99 | — | 20 0,90 | 299 13,4 | 279 12,5 | 92 4,1 | 318 14,3 | 77 3,5 | 5 0,22 | 100 4,5 | 1 0,04 | 2 0,09 | 65 2,9 | 28 1,3 | 1 0,04 | — | 15 0,67 | 1392 62,6 |
| 292 9,1 | 155 4,8 | 42 1,3 | 48 1,5 | 7 0,22 | 8 0,25 | 23 0,71 | 2 0,06 | 20 0,62 | — | 22 0,68 | 441 13,7 | 414 12,9 | 109 3,4 | 278 8,6 | 71 2,2 | 5 0,16 | 75 2,3 | 3 0,09 | 1 0,03 | 71 2,2 | 3 0,09 | 2 0,06 | 1 0,03 | 29 0,90 | 1685 52,3 |
| 278 8,6 | 158 4,8 | 38 1,2 | 34 1,0 | 4 0,12 | 19 0,59 | 51 1,6 | 4 0,12 | 55 1,7 | 1 0,03 | 26 0,81 | 493 15,3 | 459 14,2 | 141 4,4 | 325 10,0 | 90 2,8 | 11 0,34 | 85 2,6 | 5 0,15 | 1 0,03 | 58 1,8 | 5 0,15 | — | — | 25 0,77 | 1824 56,5 |
| 255 9,0 | 160 5,7 | 39 1,4 | 28 0,99 | 2 0,07 | 11 0,39 | 30 1,1 | 5 0,18 | 32 1,1 | 1 0,04 | 29 1,0 | 475 16,8 | 438 15,5 | 121 4,3 | 295 10,4 | 82 2,9 | 10 0,35 | 87 3,1 | 1 0,04 | 3 0,11 | 82 2,9 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 15 0,53 | 1632 57,7 |
| 228 7,5 | 164 5,4 | 20 0,85 | 12 0,39 | 4 0,13 | 10 0,33 | 36 1,2 | 13 0,43 | 38 1,2 | 6 0,20 | 33 1,1 | 297 9,7 | 276 9,0 | 91 3,0 | 237 7,8 | 61 2,0 | 17 0,56 | 47 1,5 | 3 0,10 | 1 0,03 | 56 1,8 | 4 0,13 | 1 0,03 | 1 0,03 | 15 0,49 | 1482 48,5 |
| 369 13,9 | 232 8,7 | 49 1,8 | 35 1,3 | 3 0,11 | 9 0,34 | 23 0,86 | 5 0,19 | 25 0,94 | — | 29 1,1 | 312 11,7 | 281 10,6 | 106 4,0 | 218 8,2 | 55 2,1 | 14 0,53 | 57 2,1 | 2 0,08 | 1 0,04 | 46 1,7 | 1 0,04 | 2 0,08 | — | 21 0,79 | 1624 61,0 |
| 133 6,3 | 84 4,0 | 13 0,61 | 14 0,66 | — | 16 0,75 | 30 1,4 | 7 0,33 | 18 0,85 | — | 10 0,47 | 263 12,4 | 249 11,7 | 73 3,4 | 187 8,8 | 30 1,4 | 10 0,47 | 52 2,5 | — | 3 0,14 | 59 2,8 | — | — | — | 14 0,66 | 960 45,3 |
| 4550 8,5 | 2792 5,2 | 585 1,1 | 492 0,92 | 39 0,07 | 212 0,39 | 564 1,9 | 120 0,22 | 565 1,1 | 15 0,03 | 433 0,81 | 7013 13,0 | 6428 12,0 | 2051 3,8 | 4963 9,2 | 1304 2,4 | 210 0,39 | 1252 2,3 | 42 0,08 | 22 0,04 | 1221 2,3 | 75 0,14 | 18 0,03 | 8 0,01 | 319 0,59 | 27879 51,9 |

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- kran- kungen | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. Krank- heiten des Nerven- systems | Gruppe III. | | | Gruppe IV. | | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------|--|--------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|---|--|------------------------|---|--|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | 2. Akuter Gelenkrheumatismus | 3. Chronischer Gelenkrheumatismus | 4. Hitzschlag | Krank- heiten der At- mungs- organe | | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe | davon Herzkrankheiten | | | | |
| | | | | überhaupt | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Katarhe der Schleim- häute der Luftwege | Akute Lungenentzündung | Brustfellentzündung und Ausgänge ausschl. No. 19 | | | | | | |
| | | | | | 1-40 | 1-28 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18- 21 | 22 | 25 | | | | | | | | | | | 27 | 28 | 38 | 41-52 |
| Gardekorps | Januar | 42241 ‰ | 154 3,6 | 95 2,2 | — | 4 0,09 | 2 0,05 | 2 0,05 | 3 0,07 | 7 0,17 | — | — | 4 0,09 | — | 1 0,02 | 48 1,1 | — | — | 28 0,66 | 587 13,9 | 517 12,2 | 23 0,54 | 44 1,0 | 59 1,4 | 14 0,38 | | | | | | | |
| I. Armeekorps | Januar | 32321 ‰ | 495 15,3 | 452 14,0 | — | 1 0,03 | 12 0,37 | 3 0,09 | 1 0,03 | 5 0,15 | — | 1 0,03 | 1 0,03 | 9 0,28 | — | 34 1,1 | 3 0,09 | — | 22 0,68 | 624 19,3 | 568 17,6 | 36 1,1 | 16 0,50 | 28 0,87 | 4 0,12 | | | | | | | |
| II. Armeekorps | Januar | 26431 ‰ | 241 9,1 | 217 8,2 | — | — | 4 0,15 | 16 0,61 | 1 0,04 | 4 0,15 | — | — | 1 0,04 | 4 0,15 | — | 20 0,76 | — | — | 18 0,68 | 429 16,2 | 380 14,4 | 38 1,4 | 10 0,38 | 24 0,91 | 9 0,34 | | | | | | | |
| III. Armeekorps | Januar | 23940 ‰ | 325 13,6 | 300 12,5 | — | — | 3 0,13 | 1 0,04 | — | — | — | — | 1 0,04 | — | 5 0,21 | — | — | 17 0,71 | 2 0,08 | 10 0,42 | 309 12,9 | 285 11,9 | 12 0,50 | 10 0,42 | 15 0,63 | 4 0,17 | | | | | | |
| IV. Armeekorps | Januar | 22604 ‰ | 108 4,8 | 97 4,3 | — | 2 0,09 | 1 0,04 | — | — | 2 0,09 | — | — | — | — | 2 0,09 | — | — | 7 0,31 | — | 12 0,53 | 414 18,3 | 384 17,0 | 24 1,1 | 4 0,18 | 17 0,75 | 4 0,18 | | | | | | |
| V. Armeekorps | Januar | 26196 ‰ | 234 8,9 | 204 7,8 | — | 1 0,04 | 6 0,23 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | — | — | — | 6 0,23 | — | 1 0,04 | 25 0,95 | — | 14 0,53 | 656 25,0 | 621 23,7 | 26 0,90 | 9 0,34 | 19 0,73 | 6 0,23 | | | | | | |
| VI. Armeekorps | Januar | 26207 ‰ | 54 2,1 | 31 1,2 | — | 2 0,08 | 3 0,11 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | — | — | 2 0,08 | — | 8 0,31 | — | — | 19 0,72 | — | 7 0,27 | 523 20,0 | 484 18,5 | 27 1,0 | 12 0,46 | 28 1,1 | 5 0,19 | | | | | | |
| VII. Armeekorps | Januar | 27314 ‰ | 323 11,8 | 296 10,8 | — | 8 0,29 | 2 0,07 | — | 2 0,07 | 2 0,07 | — | — | — | — | 10 0,37 | — | — | 23 0,84 | — | 18 0,66 | 354 13,0 | 322 11,8 | 19 0,70 | 12 0,44 | 29 1,1 | 7 0,26 | | | | | | |
| VIII. Armeekorps | Januar | 27029 ‰ | 83 3,1 | 55 2,0 | — | 4 0,15 | 1 0,04 | 3 0,11 | 3 0,11 | 6 0,22 | — | — | — | — | 1 0,04 | 9 0,33 | — | — | 24 0,89 | — | 23 0,85 | 381 14,1 | 358 13,2 | 16 0,59 | 6 0,22 | 47 1,7 | 10 0,37 | | | | | |
| IX. Armeekorps | Januar | 25338 ‰ | 437 17,2 | 411 16,2 | — | — | 16 0,63 | 5 0,20 | — | 1 0,04 | — | — | — | — | 1 0,04 | 3 0,12 | — | — | 24 0,95 | 1 0,04 | 16 0,63 | 289 11,4 | 257 10,1 | 22 0,87 | 8 0,32 | 18 0,71 | 2 0,08 | | | | | |
| X. Armeekorps | Januar | 22052 ‰ | 170 7,7 | 160 7,9 | — | 3 0,14 | 1 0,05 | 1 0,05 | 1 0,05 | — | — | — | — | — | 6 0,27 | — | — | — | 8 0,36 | — | 13 0,59 | 342 15,5 | 304 13,8 | 30 1,4 | 7 0,32 | 21 0,95 | 4 0,18 | | | | | |
| XI. Armeekorps | Januar | 21056 ‰ | 290 13,8 | 265 12,6 | — | — | 1 0,05 | 2 0,09 | — | 3 0,14 | — | — | — | — | 1 0,05 | — | — | — | 23 1,1 | 1 0,05 | 28 1,3 | 370 17,6 | 344 16,3 | 17 0,81 | 6 0,28 | 28 1,3 | 10 0,47 | | | | | |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | Januar | 20529 ‰ | 302 14,7 | 259 12,6 | — | 6 0,29 | 4 0,19 | 6 0,29 | 1 0,05 | 6 0,29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 2,0 | 1 0,05 | 14 0,68 | 523 25,5 | 495 24,1 | 20 0,97 | 8 0,39 | 15 0,73 | 7 0,34 | | | | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | Januar | 22162 ‰ | 132 6,0 | 87 3,9 | — | — | 1 0,05 | 2 0,09 | — | 2 0,09 | — | — | — | — | — | 5 0,23 | — | — | 37 1,7 | 1 0,05 | 13 0,59 | 228 10,3 | 208 9,4 | 9 0,41 | 10 0,45 | 48 2,2 | 13 0,59 | | | | | |
| XIV. Armeekorps | Januar | 32219 ‰ | 96 3,0 | 69 2,1 | — | 2 0,06 | 2 0,06 | 2 0,06 | — | 3 0,09 | — | — | — | — | — | 8 0,26 | — | — | 21 0,65 | 3 0,09 | 20 0,62 | 489 15,2 | 448 13,9 | 23 0,71 | 17 0,53 | 45 1,4 | 5 0,16 | | | | | |
| XV. Armeekorps | Januar | 32175 ‰ | 197 6,1 | 164 5,1 | — | 2 0,06 | 2 0,06 | 9 0,28 | 2 0,06 | 5 0,16 | — | — | — | — | — | 14 0,44 | — | — | 22 0,88 | 1 0,03 | 26 0,81 | 301 9,4 | 281 8,7 | 14 0,44 | 4 0,12 | 41 1,3 | 12 0,37 | | | | | |
| XVI. Armeekorps | Januar | 28030 ‰ | 98 3,5 | 73 2,6 | — | 3 0,11 | — | — | 2 0,07 | 4 0,14 | — | — | — | — | — | 5 0,18 | — | — | 21 0,75 | 3 0,11 | 20 0,71 | 373 13,3 | 342 12,2 | 20 0,71 | 11 0,39 | 46 1,6 | 4 0,14 | | | | | |
| XVII. Armeekorps | Januar | 30509 ‰ | 62 2,0 | 34 1,1 | — | 3 0,10 | 4 0,13 | 1 0,03 | — | 2 0,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 0,79 | 2 0,07 | 21 0,69 | 300 9,8 | 259 8,5 | 29 0,95 | 10 0,33 | 35 1,1 | 10 0,33 | | | | | |
| XVIII. Armeekorps | Januar | 26415 ‰ | 96 3,6 | 66 2,5 | — | — | 4 0,15 | 1 0,04 | 1 0,04 | 5 0,19 | — | — | — | — | — | 1 0,04 | 11 0,42 | — | — | 25 0,94 | 1 0,04 | 19 0,72 | 319 12,0 | 300 11,3 | 11 0,42 | 8 0,30 | 36 1,4 | 9 0,34 | | | | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Januar | 21038 ‰ | 118 5,6 | 88 4,2 | — | 1 0,05 | 5 0,24 | — | — | 3 0,14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 1,4 | — | 25 1,2 | 421 20,0 | 378 18,0 | 35 1,7 | 6 0,29 | 21 1,0 | 2 0,10 | | | | | |
| Armee | Januar | 535886 ‰ | 4015 7,5 | 3423 6,4 | — | 42 0,08 | 74 0,14 | 55 0,10 | 19 0,04 | 62 0,12 | — | — | — | — | — | 26 0,05 | 6 0,01 | 120 0,22 | — | — | 2 — | 494 0,92 | 19 0,04 | — | — | 367 0,68 | 8232 15,4 | 7535 14,1 | 451 0,84 | 218 0,41 | 620 1,2 | 141 0,26 |

| Krankheiten der Ernährungsorgane | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ausschl. der venereischen | Gruppe VII. Venereische Krankheiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohrenkrankheiten | Gruppe X. | | Gruppe XI. Krankheiten der Bewegungsorgane | Me-cha-nische Ver-letzun-gen | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krankheiten | Gruppe XIV. Zur Beobachtung | Summe des Zu-gangs | | |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---|--|--------------|------------|--------------------------------|------------|--------------|---|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | davon | davon | | | davon | | | | | | | | | | davon | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | | | | 1. |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 118-122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-199 |
| 462 10,9 | 274 6,5 | 75 1,8 | 42 0,99 | 1 0,02 | 24 0,57 | 83 2,0 | 13 0,31 | 34 0,80 | — | 44 1,0 | 644 15,2 | 565 13,4 | 289 6,8 | 473 11,2 | 160 3,8 | 24 0,57 | 111 2,6 | 3 0,07 | 1 0,02 | 141 3,3 | 1 0,02 | 4 0,09 | 1 0,02 | 28 0,66 | 2913 69,0 |
| 305 9,1 | 217 6,7 | 23 0,71 | 31 0,96 | 2 0,06 | 7 0,22 | 55 1,7 | 19 0,59 | 54 1,7 | 4 0,12 | 52 1,6 | 532 16,5 | 408 12,6 | 135 4,2 | 455 14,1 | 136 4,2 | 16 0,50 | 107 3,3 | 1 0,03 | 1 0,03 | 104 3,2 | 6 0,19 | 2 0,06 | 2 0,06 | 24 0,74 | 2790 86,3 |
| 287 10,9 | 179 6,8 | 48 1,8 | 27 1,0 | — | 13 0,49 | 39 1,5 | 9 0,34 | 54 2,0 | 2 0,08 | 36 1,4 | 402 15,2 | 367 13,9 | 196 7,4 | 346 13,1 | 104 3,9 | 8 0,30 | 101 3,8 | 1 0,04 | 2 0,08 | 87 3,3 | 4 0,15 | — | — | 14 0,53 | 2099 79,4 |
| 206 8,6 | 129 5,4 | 42 1,8 | 8 0,33 | 1 0,04 | 11 0,46 | 38 1,6 | 9 0,33 | 30 1,3 | — | 53 2,2 | 207 8,6 | 176 7,4 | 103 4,3 | 189 7,9 | 53 2,2 | 10 0,42 | 58 2,4 | — | 1 0,04 | 44 1,8 | 5 0,21 | — | — | 14 0,58 | 1510 63,1 |
| 249 11,0 | 155 6,9 | 34 1,5 | 32 1,4 | 1 0,04 | 12 0,53 | 27 1,2 | 5 0,22 | 30 1,3 | — | 49 2,2 | 289 12,8 | 248 11,0 | 119 5,3 | 249 11,0 | 85 3,8 | 19 0,84 | 75 3,3 | 1 0,04 | — | 46 2,0 | 2 0,09 | 2 0,09 | 2 0,09 | 21 0,93 | 1598 70,7 |
| 317 12,1 | 180 6,9 | 55 2,1 | 39 1,5 | 1 0,04 | 7 0,27 | 48 1,8 | 10 0,38 | 38 1,5 | 1 0,04 | 23 0,88 | 346 13,2 | 299 11,4 | 118 4,5 | 221 8,4 | 67 2,6 | 10 0,38 | 57 2,2 | 5 0,19 | — | 51 1,9 | — | — | — | 21 0,80 | 2062 78,7 |
| 218 8,3 | 82 3,1 | 66 2,5 | 24 0,92 | 3 0,11 | 6 0,23 | 52 2,0 | 11 0,42 | 41 1,6 | — | 30 1,1 | 297 11,3 | 262 10,0 | 112 4,3 | 279 10,6 | 78 3,0 | 8 0,31 | 79 3,0 | 5 0,19 | — | 58 2,2 | 7 0,27 | 1 0,04 | — | 25 0,95 | 1673 63,8 |
| 303 11,1 | 209 7,7 | 36 1,3 | 10 0,37 | 1 0,04 | 11 0,40 | 50 1,8 | 9 0,29 | 55 2,0 | — | 28 1,0 | 358 13,1 | 316 11,6 | 164 6,0 | 285 10,4 | 87 3,2 | 14 0,51 | 69 2,5 | 4 0,15 | 1 0,04 | 79 2,9 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 28 1,0 | 2007 73,5 |
| 406 15,0 | 263 9,7 | 45 1,7 | 35 1,3 | 2 0,07 | 7 0,26 | 47 1,7 | 8 0,30 | 50 1,8 | 1 0,04 | 42 1,6 | 485 17,9 | 427 15,8 | 137 5,1 | 386 14,3 | 111 4,1 | 20 0,74 | 111 4,1 | 5 0,18 | — | 88 3,3 | 11 0,41 | 1 0,04 | — | 24 0,89 | 2119 78,4 |
| 248 9,8 | 153 6,0 | 29 1,1 | 23 0,91 | 2 0,08 | 11 0,43 | 47 1,9 | 6 0,24 | 29 1,1 | — | 34 1,3 | 281 11,1 | 240 9,5 | 139 5,5 | 228 9,0 | 66 2,6 | 11 0,43 | 62 2,4 | — | 2 0,08 | 62 2,4 | 1 0,04 | 4 0,16 | 2 0,08 | 6 0,24 | 1787 70,5 |
| 192 8,7 | 130 5,9 | 26 1,2 | 12 0,54 | 1 0,05 | 10 0,45 | 30 1,4 | 7 0,32 | 23 1,0 | — | 27 1,2 | 326 14,8 | 295 13,4 | 106 4,8 | 208 9,4 | 68 3,1 | 6 0,27 | 46 2,1 | 1 0,05 | — | 58 2,6 | 4 0,18 | — | — | 17 0,77 | 1485 67,3 |
| 243 11,5 | 141 6,7 | 26 1,2 | — | — | 15 0,71 | 18 0,85 | 4 0,19 | 30 1,4 | — | 27 1,3 | 341 16,2 | 307 14,6 | 149 7,1 | 345 16,4 | 108 5,1 | 13 0,62 | 116 5,5 | 6 0,28 | — | 65 3,1 | 1 0,05 | 1 0,05 | — | 16 0,76 | 1901 90,3 |
| 268 13,1 | 166 8,1 | 20 0,97 | 50 2,4 | 3 0,15 | 11 0,54 | 60 2,9 | 12 0,58 | 18 0,88 | — | 29 1,4 | 212 10,3 | 189 9,2 | 111 5,3 | 167 8,1 | 50 2,4 | 8 0,39 | 39 1,9 | 1 0,05 | — | 43 2,1 | 1 0,05 | — | — | 12 0,58 | 1743 84,9 |
| 291 13,1 | 166 7,5 | 29 1,3 | 38 1,7 | 2 0,09 | 18 0,81 | 18 0,81 | 3 0,14 | 19 0,86 | — | 34 1,5 | 362 16,4 | 341 15,4 | 176 7,9 | 428 19,3 | 115 5,2 | 12 0,54 | 168 7,6 | 3 0,14 | 3 0,14 | 72 3,2 | 16 0,72 | 1 0,05 | 1 0,05 | 33 1,5 | 1801 81,3 |
| 323 10,0 | 198 6,1 | 45 1,4 | 27 0,84 | 5 0,16 | 16 0,50 | 32 0,99 | 5 0,16 | 45 1,4 | — | 40 1,2 | 441 13,7 | 399 12,4 | 212 6,6 | 372 11,5 | 82 2,5 | 10 0,31 | 130 4,0 | 3 0,09 | — | 97 3,0 | 4 0,12 | 2 0,06 | 1 0,03 | 22 0,68 | 2155 66,9 |
| 326 10,1 | 207 6,4 | 38 1,2 | 34 1,1 | 5 0,16 | 22 0,68 | 77 2,4 | 12 0,37 | 50 1,5 | — | 34 1,1 | 497 15,4 | 454 14,1 | 166 5,1 | 359 11,2 | 93 2,9 | 13 0,40 | 132 4,1 | 1 0,03 | 1 0,03 | 79 2,5 | 6 0,19 | 1 0,03 | — | 33 1,0 | 2130 66,2 |
| 366 13,1 | 240 8,6 | 67 2,4 | 22 0,78 | 2 0,07 | 17 0,61 | 56 2,0 | 11 0,39 | 39 1,4 | 1 0,04 | 58 2,1 | 578 20,6 | 518 18,5 | 148 5,3 | 326 11,6 | 94 3,4 | 16 0,57 | 80 2,9 | 3 0,11 | — | 94 3,4 | 1 0,04 | — | — | 15 0,54 | 2140 76,3 |
| 195 6,4 | 141 4,6 | 28 0,92 | 10 0,33 | — | 9 0,30 | 60 2,0 | 13 0,43 | 46 1,5 | 7 0,23 | 45 1,5 | 285 9,3 | 251 8,2 | 123 4,0 | 306 10,0 | 95 3,1 | 16 0,53 | 86 2,8 | 4 0,13 | — | 52 1,7 | 7 0,23 | 1 0,03 | 1 0,03 | 16 0,53 | 1504 49,2 |
| 333 12,6 | 220 8,3 | 38 1,4 | 28 1,1 | — | 25 0,94 | 23 0,87 | 4 0,15 | 53 2,0 | — | 57 2,2 | 404 15,2 | 357 13,5 | 178 6,7 | 272 10,3 | 73 2,8 | 16 0,60 | 95 3,6 | — | 1 0,04 | 58 2,2 | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 19 0,72 | 1835 69,3 |
| 222 10,6 | 110 5,2 | 31 1,5 | 28 1,3 | 1 0,05 | 15 0,71 | 59 2,8 | 12 0,57 | 36 1,7 | 1 0,05 | 29 1,4 | 297 14,1 | 255 12,1 | 130 6,2 | 210 10,0 | 56 2,7 | 6 0,29 | 63 3,0 | 2 0,10 | 2 0,10 | 49 2,3 | 1 0,05 | 3 0,14 | 1 0,05 | 20 0,95 | 1606 76,3 |
| 5761 10,8 | 3560 6,6 | 801 1,5 | 542 1,0 | 33 0,06 | 267 0,50 | 919 1,7 | 182 0,34 | 774 1,4 | 17 0,03 | 771 1,4 | 7584 14,2 | 6674 12,5 | 3011 5,6 | 6104 11,4 | 1781 3,3 | 256 0,48 | 1785 3,3 | 49 0,09 | 15 0,03 | 1427 2,7 | 80 0,15 | 25 0,05 | 12 0,02 | 408 0,76 | 38858 72,5 |

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krank- ungen | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. Krank- heiten des Nerven- systems | Gruppe III. | | | Gruppe IV. | |
|-------------------------------|---------|---------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|--|--------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|------|----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|---|--|------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | | | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | 2. Akuter Gelenkrheumatismus | 3. Chronischer Gelenkrheumatismus | 4. Hitzschlag | Krank- heiten der At- mungs- organe | | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe | davon Herzkrankheiten |
| | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Katarhe der Schleim- häute der Luftwege | 2. Akute Lungenentzündung | 3. Brustfellentzündung und Ausgänge auschl. No. 19 | | |
| | | | | überhaupt | Pocken (auschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | 18- 21 | | | | | | | | | | |
| Gardekorps | Februar | 42104 ‰ | 148 3,5 | 100 2,4 | — | 7 0,17 | 2 0,05 | 3 0,07 | 4 0,10 | 3 0,07 | — | — | — | 5 0,12 | — | — | 41 0,97 | 2 0,05 | — | 26 0,62 | 564 13,4 | 506 12,0 | 34 0,81 | 19 0,45 | 47 1,1 | 14 0,33 | |
| I. Armee- korps | Februar | 32190 ‰ | 213 6,6 | 174 5,4 | — | 1 0,03 | 1 0,03 | 6 0,19 | — | 4 0,12 | — | — | — | 7 0,22 | — | 1 0,03 | 30 0,93 | 4 0,12 | — | 10 0,31 | 381 11,8 | 327 10,2 | 36 1,1 | 17 0,53 | 20 0,62 | 3 0,09 | |
| II. Armee- korps | Februar | 26763 ‰ | 121 4,5 | 100 3,7 | — | — | 2 0,07 | 8 0,30 | 4 0,15 | 2 0,07 | — | 17 0,64 | — | 3 0,11 | — | — | 16 0,60 | — | — | 17 0,64 | 298 11,1 | 249 9,3 | 29 1,1 | 18 0,67 | 33 1,2 | 7 0,26 | |
| III. Armee- korps | Februar | 23977 ‰ | 106 4,4 | 90 3,8 | — | — | 5 0,21 | 2 0,08 | — | — | — | — | — | 10 0,42 | — | — | 11 0,46 | 3 0,13 | — | 8 0,33 | 206 8,6 | 182 7,6 | 12 0,50 | 11 0,46 | 8 0,33 | 1 0,04 | |
| IV. Armee- korps | Februar | 22985 ‰ | 45 2,6 | 29 1,3 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 3 0,13 | — | 2 0,09 | — | — | — | 1 0,04 | — | — | 14 0,61 | — | — | 14 0,61 | 226 9,8 | 196 8,5 | 23 1,0 | 6 0,26 | 20 0,87 | 6 0,26 | |
| V. Armee- korps | Februar | 26117 ‰ | 59 2,3 | 42 1,6 | — | 2 0,08 | 13 0,50 | 1 0,04 | — | 4 0,15 | — | 1 0,04 | — | 7 0,27 | — | 2 0,08 | 16 0,61 | 1 0,04 | — | 11 0,42 | 397 15,2 | 363 13,9 | 27 1,0 | 6 0,23 | 19 0,73 | 2 0,08 | |
| VI. Armee- korps | Februar | 26210 ‰ | 45 1,7 | 23 0,88 | — | 1 0,04 | 6 0,23 | 4 0,15 | — | 1 0,04 | — | 2 0,08 | — | 5 0,19 | — | — | 21 0,80 | 1 0,04 | — | 12 0,46 | 298 11,4 | 259 9,9 | 30 1,1 | 8 0,31 | 27 1,0 | 6 0,23 | |
| VII. Armee- korps | Februar | 27193 ‰ | 167 6,1 | 140 5,1 | — | 4 0,15 | 1 0,04 | — | 2 0,07 | 6 0,22 | — | 1 0,04 | — | 8 0,29 | — | — | 22 0,81 | 2 0,07 | — | 18 0,66 | 359 13,2 | 322 11,8 | 29 1,1 | 7 0,26 | 21 0,77 | 1 0,04 | |
| VIII. Armee- korps | Februar | 26834 ‰ | 65 2,4 | 40 1,4 | — | 3 0,11 | 1 0,04 | 3 0,11 | 1 0,04 | 3 0,11 | — | 3 0,11 | 3 0,11 | 4 0,15 | — | — | 21 0,78 | — | — | 21 0,78 | 299 11,1 | 268 10,0 | 18 0,67 | 11 0,41 | 43 1,6 | 2 0,07 | |
| IX. Armee- korps | Februar | 25233 ‰ | 127 5,0 | 89 3,5 | — | 4 0,16 | 38 1,5 | 6 0,24 | — | 4 0,16 | — | — | — | 4 0,16 | — | — | 32 1,3 | 2 0,08 | — | 10 0,40 | 237 9,4 | 193 7,8 | 29 1,1 | 9 0,36 | 21 0,83 | 1 0,04 | |
| X. Armee- korps | Februar | 22010 ‰ | 52 2,4 | 30 1,4 | — | 4 0,18 | 1 0,05 | 3 0,14 | 4 0,18 | 2 0,09 | — | — | — | 1 0,05 | — | — | 17 0,77 | — | — | 6 0,27 | 195 8,9 | 171 7,8 | 16 0,73 | 7 0,32 | 23 1,0 | 3 0,14 | |
| XI. Armee- korps | Februar | 20992 ‰ | 125 6,0 | 86 4,1 | — | — | 3 0,14 | — | 2 0,10 | 2 0,10 | — | 3 0,14 | — | 3 0,14 | — | — | 31 1,5 | 2 0,10 | — | 17 0,81 | 324 15,4 | 296 14,1 | 13 0,62 | 12 0,57 | 23 1,1 | 8 0,38 | |
| XII. (I. K. S.) Armeekorps | Februar | 20546 ‰ | 152 7,4 | 119 5,8 | — | 13 0,63 | 9 0,44 | 10 0,49 | 4 0,19 | 2 0,10 | — | — | — | 5 0,24 | — | — | 27 1,3 | 2 0,10 | — | 19 0,92 | 240 11,7 | 189 9,2 | 40 1,9 | 11 0,54 | 17 0,83 | 4 0,19 | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | Februar | 22084 ‰ | 89 4,0 | 60 2,7 | — | — | 1 0,05 | 1 0,05 | — | 3 0,14 | — | — | — | 3 0,14 | — | — | 26 1,2 | — | — | 12 0,54 | 193 8,7 | 177 8,0 | 10 0,45 | 6 0,27 | 26 1,2 | 6 0,27 | |
| XIV. Armee- korps | Februar | 32135 ‰ | 120 3,7 | 82 2,6 | — | — | — | 5 0,16 | — | 5 0,16 | — | — | — | 6 0,19 | — | — | 34 1,1 | 1 0,03 | — | 19 0,59 | 361 11,2 | 336 10,5 | 12 0,37 | 10 0,31 | 47 1,5 | 11 0,34 | |
| XV. Armee- korps | Februar | 31975 ‰ | 85 2,6 | 51 1,6 | — | 1 0,03 | — | 9 0,28 | 1 0,03 | 2 0,06 | — | — | — | 2 0,06 | — | — | 29 0,91 | 1 0,03 | — | 12 0,38 | 312 9,8 | 279 8,7 | 25 0,78 | 8 0,25 | 42 1,3 | 6 0,19 | |
| XVI. Armee- korps | Februar | 27845 ‰ | 109 3,9 | 81 2,9 | — | 3 0,11 | — | — | — | 3 0,11 | — | 1 0,04 | — | 3 0,11 | — | — | 21 0,75 | 4 0,14 | — | 8 0,29 | 310 11,1 | 278 10,0 | 22 0,79 | 10 0,36 | 37 1,3 | 5 0,18 | |
| XVII. Armee- korps | Februar | 30255 ‰ | 58 1,9 | 38 1,3 | — | 4 0,13 | 6 0,20 | — | — | 1 0,03 | — | 2 0,07 | — | 8 0,26 | — | — | 14 0,46 | 2 0,07 | — | 8 0,26 | 287 9,5 | 230 7,6 | 45 1,5 | 12 0,40 | 27 0,89 | 1 0,03 | |
| XVIII. Armeekorps | Februar | 26309 ‰ | 96 3,6 | 61 2,3 | — | — | 15 0,57 | 2 0,08 | 1 0,04 | 5 0,19 | — | — | 1 0,04 | 3 0,11 | — | 5 0,19 | 31 1,2 | — | — | 16 0,61 | 319 12,1 | 300 11,4 | 13 0,49 | 6 0,23 | 36 1,4 | 9 0,34 | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Februar | 20996 ‰ | 53 2,5 | 19 0,90 | — | — | 3 0,14 | 2 0,10 | 1 0,05 | 4 0,19 | — | — | — | — | — | — | 24 1,1 | 2 0,10 | — | 10 0,48 | 251 12,0 | 228 10,9 | 21 1,0 | 1 0,05 | 23 1,1 | 7 0,33 | |
| Armee | Februar | 534753 ‰ | 2035 3,8 | 1454 2,7 | — | 48 0,09 | 108 0,20 | 68 0,13 | 24 0,04 | 58 0,11 | — | 30 0,06 | 4 0,01 | 88 0,16 | — | 8 0,01 | 478 0,89 | 29 0,05 | — | 274 0,51 | 6057 11,3 | 5354 10,0 | 484 0,91 | 195 0,36 | 560 1,0 | 103 0,19 | |

| Krank- heiten der Ernäh- rungs- organe | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krank- heiten der Harn- und Ge- schlechts- organe ausschl. der vene- rischen | Gruppe VII. Vene- rische Krank- heiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohren- krank- heiten | Gruppe X. Krank- heiten der äußeren Be- deckun- gen | Gruppe XI. Krank- heiten der Bewe- gungs- organe | Me- cha- nische Ver- letzun- gen | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krank- heiten | Gruppe XIV. Zur Be- obach- tung | Summe des Zu- gangs | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|--|--|--------------|------------|--|--|--|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|---|------------------------------|------------|-------------|---------------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | | davon | | | | | | | | | | davon | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | | | | | |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-198 |
| 560 13,3 | 388 9,2 | 68 1,6 | 23 0,55 | 4 0,10 | 27 0,64 | 83 2,0 | 20 0,48 | 52 1,2 | 1 0,02 | 54 1,3 | 603 14,3 | 528 12,5 | 286 6,8 | 476 11,3 | 155 3,7 | 32 0,76 | 116 2,8 | 1 0,02 | 5 0,12 | 123 2,9 | 3 0,07 | 1 0,02 | 1 0,02 | 21 0,50 | 2948 70,0 |
| 276 8,6 | 184 5,7 | 30 0,93 | 31 0,96 | — | 10 0,31 | 52 1,6 | 18 0,56 | 55 1,7 | 5 0,16 | 48 1,5 | 495 15,4 | 423 13,1 | 119 3,7 | 436 13,5 | 145 4,5 | 13 0,40 | 116 3,6 | 3 0,09 | 1 0,03 | 96 3,0 | 1 0,03 | 2 0,06 | — | 23 0,71 | 2140 66,5 |
| 278 10,4 | 183 6,8 | 35 1,3 | 18 0,67 | — | 9 0,34 | 53 2,0 | 17 0,64 | 44 1,6 | 1 0,04 | 34 1,3 | 382 14,3 | 337 12,6 | 186 6,9 | 344 12,9 | 115 4,3 | 10 0,37 | 94 3,5 | 3 0,11 | 3 0,11 | 75 2,8 | 7 0,26 | — | — | 14 0,52 | 1813 67,7 |
| 143 6,0 | 95 4,0 | 18 0,75 | 10 0,42 | — | 8 0,33 | 29 1,2 | 5 0,21 | 28 1,2 | — | 18 0,75 | 221 9,2 | 194 8,1 | 95 4,0 | 211 8,8 | 73 3,0 | 5 0,21 | 67 2,8 | 4 0,17 | 3 0,13 | 41 1,7 | 4 0,17 | — | — | 5 0,21 | 1086 45,3 |
| 210 9,1 | 139 6,0 | 23 1,0 | 17 0,74 | 1 0,04 | 14 0,61 | 30 1,3 | 7 0,30 | 25 1,1 | — | 26 1,1 | 269 11,7 | 226 9,8 | 120 5,2 | 283 12,3 | 92 4,0 | 11 0,48 | 104 4,5 | — | 1 0,04 | 54 2,3 | 1 0,04 | 2 0,09 | 2 0,09 | 15 0,65 | 1299 56,5 |
| 245 9,4 | 153 5,9 | 31 1,2 | 19 0,73 | 2 0,08 | 12 0,46 | 39 1,5 | 15 0,57 | 25 0,96 | — | 26 1,0 | 284 10,9 | 248 9,5 | 130 5,0 | 242 9,3 | 77 2,9 | 6 0,23 | 75 2,9 | 5 0,19 | — | 66 2,5 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 20 0,77 | 1510 57,8 |
| 167 6,4 | 61 2,3 | 51 1,9 | 24 0,92 | 1 0,04 | 12 0,46 | 52 2,0 | 13 0,50 | 44 1,7 | — | 34 1,3 | 289 11,0 | 265 10,1 | 95 3,6 | 285 10,9 | 95 3,6 | 9 0,34 | 79 3,0 | 3 0,11 | 2 0,08 | 62 2,4 | 6 0,23 | — | — | 18 0,69 | 1378 52,6 |
| 286 10,5 | 192 7,1 | 49 1,8 | 9 0,33 | 2 0,07 | 10 0,37 | 42 1,5 | 15 0,55 | 47 1,7 | — | 32 1,2 | 331 12,2 | 289 10,6 | 163 6,0 | 285 10,5 | 87 3,2 | 12 0,44 | 84 3,1 | 2 0,07 | — | 63 2,3 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 28 1,0 | 1790 65,8 |
| 285 10,6 | 186 6,9 | 29 1,1 | 26 0,97 | 3 0,11 | 17 0,63 | 33 1,2 | 7 0,26 | 45 1,7 | — | 49 1,8 | 436 16,2 | 380 14,2 | 118 4,4 | 356 13,3 | 113 4,2 | 7 0,26 | 106 4,0 | 2 0,07 | 3 0,11 | 84 3,1 | 8 0,30 | 2 0,07 | — | 17 0,63 | 1786 66,6 |
| 236 9,4 | 177 7,0 | 20 0,79 | 12 0,48 | 3 0,12 | 10 0,40 | 45 1,8 | 9 0,36 | 28 1,1 | — | 33 1,3 | 255 10,1 | 227 9,0 | 107 4,2 | 218 8,6 | 69 2,7 | 17 0,67 | 62 2,5 | 2 0,08 | 2 0,08 | 4 1,6 | 3 0,12 | — | — | 6 0,24 | 1333 52,8 |
| 185 8,4 | 118 5,4 | 27 1,2 | 17 0,77 | 2 0,09 | 9 0,41 | 25 1,1 | 5 0,23 | 31 1,4 | — | 25 1,1 | 301 13,7 | 273 12,4 | 85 3,9 | 201 9,1 | 60 2,7 | 9 0,41 | 39 1,8 | 1 0,05 | — | 62 2,8 | 2 0,09 | 3 0,14 | 2 0,09 | 16 0,73 | 1157 52,6 |
| 253 12,1 | 164 7,8 | 19 0,91 | 26 1,2 | — | 9 0,43 | 29 1,4 | 9 0,43 | 33 1,6 | — | 27 1,3 | 350 16,7 | 314 15,0 | 154 7,3 | 279 13,3 | 89 4,2 | 14 0,67 | 95 4,5 | 3 0,14 | 2 0,10 | 38 1,8 | — | — | — | 10 0,48 | 1633 77,8 |
| 202 9,8 | 142 6,9 | 13 0,63 | 20 0,97 | 2 0,10 | 5 0,24 | 53 2,6 | 11 0,54 | 12 0,58 | — | 23 1,1 | 185 9,0 | 164 8,0 | 136 6,6 | 145 7,1 | 44 2,1 | 9 0,44 | 37 1,8 | 1 0,05 | — | 43 2,1 | 1 0,05 | 1 0,05 | — | 4 0,19 | 1194 58,1 |
| 321 14,6 | 194 8,8 | 25 1,1 | 53 2,4 | 2 0,09 | 16 0,72 | 6 0,27 | — | 23 1,0 | — | 26 1,2 | 311 14,1 | 291 13,2 | 132 5,9 | 334 15,2 | 93 4,2 | 8 0,36 | 107 4,8 | 2 0,09 | 1 0,05 | 61 2,8 | 31 1,4 | 2 0,09 | 1 0,05 | 19 0,86 | 1510 68,4 |
| 316 9,8 | 172 5,4 | 51 1,6 | 36 1,1 | 9 0,28 | 15 0,47 | 30 0,93 | 6 0,19 | 39 1,2 | — | 34 1,1 | 434 13,5 | 407 12,7 | 220 6,8 | 365 11,4 | 107 3,3 | 12 0,37 | 119 3,7 | 1 0,03 | 3 0,09 | 70 2,2 | 7 0,22 | 1 0,03 | — | 19 0,59 | 2020 62,9 |
| 279 8,7 | 176 5,5 | 24 0,75 | 28 0,98 | 5 0,16 | 11 0,34 | 78 2,4 | 13 0,41 | 44 1,4 | — | 35 1,1 | 510 15,9 | 445 13,9 | 153 4,8 | 339 10,6 | 84 2,6 | 8 0,25 | 103 3,2 | 1 0,03 | — | 73 2,3 | 1 0,03 | 1 0,03 | — | 17 0,53 | 1918 60,1 |
| 254 9,1 | 165 5,9 | 32 1,1 | 13 0,47 | 2 0,07 | 22 0,79 | 34 1,2 | 5 0,18 | 35 1,3 | — | 43 1,5 | 582 20,9 | 519 18,6 | 158 5,7 | 330 11,9 | 91 3,3 | 23 0,83 | 97 3,5 | 2 0,07 | — | 81 2,9 | — | — | — | 17 0,61 | 1939 69,6 |
| 200 6,6 | 126 4,2 | 36 1,2 | 12 0,40 | 1 0,03 | 18 0,59 | 53 1,8 | 10 0,33 | 40 1,3 | 7 0,23 | 34 1,1 | 330 10,9 | 894 9,7 | 118 3,9 | 235 7,8 | 76 2,5 | 13 0,43 | 77 2,5 | 2 0,07 | — | 40 1,3 | 3 0,10 | — | — | 20 0,66 | 1428 47,2 |
| 348 13,2 | 250 9,5 | 21 0,80 | 30 1,1 | 2 0,08 | 23 0,87 | 19 0,72 | 3 0,11 | 48 1,8 | — | 46 1,7 | 338 12,8 | 305 11,6 | 147 5,6 | 251 9,5 | 85 3,2 | 11 0,42 | 72 2,7 | 1 0,04 | — | 53 2,0 | — | — | — | 20 0,76 | 1707 64,9 |
| 168 8,0 | 82 3,9 | 22 1,0 | 24 1,1 | 2 0,10 | 9 0,43 | 44 2,1 | 10 0,46 | 33 1,6 | — | 24 1,1 | 282 13,4 | 243 11,6 | 120 5,7 | 204 9,7 | 59 2,8 | 6 0,29 | 59 2,8 | 1 0,05 | 1 0,05 | 46 2,2 | — | 2 0,10 | 1 0,05 | 14 0,67 | 1237 58,9 |
| 5212 9,7 | 3347 6,3 | 624 1,2 | 448 0,84 | 43 0,08 | 266 0,50 | 829 1,6 | 198 0,37 | 731 1,4 | 14 0,03 | 671 1,3 | 7188 13,4 | 6372 11,9 | 2842 5,3 | 5819 10,9 | 1809 3,4 | 235 0,44 | 1708 3,2 | 40 0,07 | 27 0,05 | 1271 2,4 | 78 0,15 | 19 0,04 | 10 0,02 | 323 0,60 | 32826 61,4 |

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krank- ungen | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. Krank- heiten des Nerven- systems | Gruppe III. | | | Gruppe IV. | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|--|--------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|--|--|--|---------------------------|---|---|--------------------------|-------------|
| | | | | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reiten- den Organe | davon Herzkrankheiten | |
| | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Katak- rie der Schleim- häute der Luftwege | Akute Lungenentzündung | Brustentzündung und Ausgänge ausschl. No. 19 | | | |
| | | | | überhaupt | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | Akuter Gelenkrheumatismus | Chronischer Gelenkrheumatismus | Hitzschlag | 1. | | | | | | | | 2. |
| 1-40 | 1-26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18-21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 38 | 41-52 | 53-63 | 53-57 | 58 | 60 | 64-79 | 64-68 | 69 | | | | |
| Gardekorps | März . . | 42270 0/0 | 130 3,1 | 77 1,8 | — | 10 0,24 | — | 3 0,07 | 3 0,07 | 5 0,12 | — | — | — | — | — | — | — | 43 1,0 | 4 0,09 | — | 12 0,28 | 554 13,1 | 501 11,9 | 23 0,54 | 27 0,64 | 57 1,3 | 14 0,33 | |
| I. Armeekorps | März . . | 32319 0/0 | 88 2,7 | 56 1,7 | — | 1 0,03 | — | 3 0,09 | 1 0,03 | 6 0,19 | — | — | — | — | — | — | — | 26 0,80 | 1 0,03 | — | 15 0,46 | 323 10,0 | 280 8,7 | 24 0,74 | 14 0,43 | 30 0,93 | 3 0,09 | |
| II. Armeekorps | März . . | 26593 0/0 | 88 3,3 | 60 2,3 | — | — | 6 0,23 | 4 0,15 | 1 0,04 | 2 0,08 | — | 6 0,23 | — | — | — | — | — | 7 0,26 | — | — | 23 0,86 | 196 7,4 | 170 6,4 | 20 0,75 | 6 0,23 | 26 0,98 | — | |
| III. Armeekorps | März . . | 23923 0/0 | 87 3,6 | 65 2,7 | — | — | 6 0,25 | 4 0,17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 0,21 | — | 1 0,04 | 14 0,59 | 171 7,1 | 151 6,3 | 12 0,50 | 7 0,29 | 22 0,92 | 4 0,17 | |
| IV. Armeekorps | März . . | 22290 0/0 | 39 1,7 | 23 1,0 | — | 1 0,04 | 4 0,18 | 1 0,04 | — | 5 0,22 | — | 2 0,09 | — | — | — | — | — | 3 0,13 | — | — | 15 0,67 | 130 5,8 | 104 4,7 | 21 0,94 | 5 0,22 | 28 1,3 | 7 0,31 | |
| V. Armeekorps | März . . | 26501 0/0 | 63 2,4 | 26 0,98 | — | — | 11 0,42 | — | — | 4 0,15 | — | — | — | — | — | — | — | 5 0,19 | — | — | 33 1,2 | 255 9,6 | 222 8,4 | 20 0,75 | 11 0,42 | 31 1,2 | 4 0,15 | |
| VI. Armeekorps | März . . | 26277 0/0 | 36 1,4 | 13 0,49 | — | 1 0,04 | — | 1 0,04 | — | 5 0,19 | — | — | — | — | — | — | — | 5 0,19 | — | — | 18 0,69 | 233 8,9 | 208 8,0 | 13 0,49 | 11 0,42 | 19 0,76 | 3 0,11 | |
| VII. Armeekorps | März . . | 27297 0/0 | 53 1,9 | 27 0,99 | — | 4 0,15 | — | — | — | 5 0,18 | — | — | — | — | — | — | — | 1 0,04 | 2 0,07 | — | 21 0,77 | 236 8,6 | 208 7,6 | 13 0,48 | 14 0,51 | 37 1,4 | 12 0,44 | |
| VIII. Armeekorps | März . . | 27787 0/0 | 61 2,2 | 34 1,2 | — | — | 12 0,43 | 6 0,22 | — | 3 0,11 | — | — | — | — | — | — | — | 3 0,11 | — | — | 21 0,76 | 228 8,2 | 214 7,7 | 12 0,43 | 2 0,07 | 56 2,0 | 6 0,22 | |
| IX. Armeekorps | März . . | 25274 0/0 | 94 3,7 | 55 2,2 | — | 2 0,08 | 25 0,99 | 3 0,12 | 2 0,08 | 3 0,12 | — | — | — | — | — | — | — | 1 0,04 | 5 0,20 | — | 34 1,3 | 190 7,5 | 165 6,5 | 16 0,63 | 9 0,36 | 19 0,75 | 7 0,28 | |
| X. Armeekorps | März . . | 22037 0/0 | 57 2,6 | 35 1,6 | — | 4 0,18 | 5 0,23 | 4 0,18 | 11 0,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 0,23 | 1 0,05 | — | 20 0,91 | 181 8,2 | 163 7,4 | 11 0,50 | 4 0,18 | 30 1,4 | 5 0,23 | |
| XI. Armeekorps | März . . | 20933 0/0 | 63 3,0 | 27 1,3 | — | 2 0,10 | 4 0,19 | 1 0,05 | 1 0,05 | 2 0,10 | — | — | — | — | — | — | — | 1 0,05 | 4 0,19 | — | 32 1,5 | 200 9,6 | 179 8,6 | 14 0,67 | 6 0,29 | 46 2,2 | 15 0,72 | |
| XII. (I. K. S.) Armeekorps | März . . | 20612 0/0 | 85 4,1 | 43 2,1 | — | 3 0,15 | 15 0,73 | 3 0,15 | 4 0,19 | 3 0,15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 1,8 | 152 7,4 | 117 5,7 | 30 1,5 | 5 0,24 | 12 0,58 | 3 0,15 | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | März . . | 22070 0/0 | 110 4,9 | 51 2,3 | — | — | 2 0,09 | 2 0,09 | — | 8 0,36 | — | — | — | — | — | — | — | 3 0,14 | 1 0,05 | — | 54 2,4 | 235 10,6 | 219 9,9 | 11 0,50 | 4 0,18 | 41 1,9 | 5 0,23 | |
| XIV. Armeekorps | März . . | 32172 0/0 | 84 2,6 | 42 1,3 | — | — | 1 0,03 | 3 0,09 | — | 4 0,12 | — | — | — | — | — | — | — | 1 0,03 | 8 0,25 | — | 37 1,2 | 327 10,2 | 308 9,4 | 10 0,31 | 14 0,44 | 40 1,2 | 8 0,25 | |
| XV. Armeekorps | März . . | 31971 0/0 | 95 3,0 | 62 1,9 | — | 1 0,03 | 1 0,03 | 4 0,13 | — | 4 0,13 | — | — | — | — | — | — | — | 2 0,06 | 7 0,22 | — | 25 0,78 | 230 7,2 | 205 6,4 | 15 0,47 | 9 0,28 | 48 1,5 | 11 0,34 | |
| XVI. Armeekorps | März . . | 27890 0/0 | 68 2,4 | 38 1,4 | — | — | — | — | — | 3 0,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 0,07 | — | 27 0,97 | 230 8,2 | 216 7,7 | 8 0,29 | 4 0,14 | 50 1,8 | 5 0,18 | |
| XVII. Armeekorps | März . . | 30533 0/0 | 55 1,8 | 34 1,1 | — | 1 0,03 | 2 0,07 | 1 0,03 | — | 6 0,20 | — | 2 0,07 | — | — | — | — | — | — | 13 0,42 | — | 19 0,62 | 189 6,2 | 158 5,2 | 19 0,62 | 11 0,36 | 30 0,98 | 8 0,26 | |
| XVIII. Armeekorps | März . . | 26220 0/0 | 96 3,7 | 58 2,2 | — | 1 0,04 | 4 0,15 | — | 2 0,08 | 7 0,27 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 7 0,27 | — | — | — | — | 15 0,57 | 37 1,4 | — | 16 0,61 | 281 10,6 | 261 10,0 | 16 0,61 | 3 0,11 | 42 1,6 | 7 0,27 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | März . . | 21040 0/0 | 55 2,6 | 20 0,95 | — | — | 2 0,10 | 2 0,10 | — | 11 0,52 | — | 1 0,05 | — | — | — | — | — | — | 2 0,10 | — | 31 1,5 | 172 8,2 | 146 6,9 | 24 1,1 | 2 0,10 | 21 1,0 | 4 0,19 | |
| Armee | März . . | 536069 0/0 | 1507 2,8 | 846 1,6 | — | 31 0,06 | 100 0,19 | 45 0,08 | 25 0,05 | 86 0,16 | — | 12 0,02 | 7 0,01 | 105 0,20 | 2 0,03 | 17 0,03 | — | — | 568 1,1 | 27 0,05 | 1 — | 273 0,51 | 4713 8,8 | 4191 7,8 | 332 0,62 | 168 0,31 | 685 1,3 | 131 0,24 |

| Krankheiten der Ernährungsorgane | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane aussch. der venereischen | Gruppe VII. Venereische Krankheiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohrenkrankheiten | Gruppe X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen | Gruppe XI. Krankheiten der Zellgewebsentzündung | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krankheiten | Gruppe XIV. Selbstmordversuche | Zur Beobachtung | Summe des Zugangs | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--|--|--------------|------------|--------------------------------|--|--|--------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | Krankheiten | Krankheiten | Me-cha-nische Ver-letzun-gen | davon | | | | | | | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | 5. | 6. | 7. |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 118-122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-198 |
| 535 12,7 | 354 8,4 | 79 1,9 | 26 0,62 | 2 0,05 | 26 0,62 | 73 1,7 | 19 0,45 | 54 1,3 | — | 43 1,0 | 631 14,9 | 575 13,6 | 352 8,3 | 555 13,1 | 178 4,2 | 37 0,88 | 115 2,7 | 5 0,12 | — | 150 3,5 | 6 0,14 | 2 0,05 | — | 24 0,57 | 3048 72,1 |
| 256 7,9 | 141 4,4 | 31 0,96 | 28 0,87 | 2 0,06 | 12 0,37 | 34 1,1 | 15 0,46 | 56 1,7 | 4 0,12 | 56 1,7 | 577 17,9 | 510 15,8 | 209 6,5 | 478 14,8 | 131 4,1 | 7 0,22 | 126 3,9 | 2 0,06 | 1 0,03 | 105 3,2 | 6 0,19 | 1 0,03 | — | 28 0,87 | 2163 66,9 |
| 199 7,5 | 110 4,1 | 28 1,1 | 29 1,1 | 2 0,08 | 9 0,34 | 31 1,2 | 10 0,38 | 32 1,2 | — | 35 1,3 | 426 16,0 | 400 15,0 | 270 10,2 | 395 14,9 | 113 4,2 | 9 0,34 | 117 4,4 | 1 0,04 | 1 0,04 | 77 2,9 | 6 0,23 | 2 0,08 | — | 15 0,56 | 1739 65,4 |
| 147 6,1 | 99 4,1 | 17 0,71 | 12 0,50 | — | 5 0,21 | 20 0,94 | 4 0,17 | 21 0,88 | — | 23 0,97 | 222 9,3 | 194 8,1 | 157 6,6 | 219 9,2 | 81 3,4 | 4 0,17 | 66 2,8 | 4 0,17 | — | 40 1,7 | 3 0,13 | — | — | 16 0,67 | 1115 46,6 |
| 136 6,1 | 66 3,0 | 30 1,5 | 11 0,49 | — | 10 0,45 | 24 1,1 | 5 0,22 | 23 1,0 | — | 24 1,1 | 278 12,5 | 242 10,9 | 121 5,4 | 287 12,9 | 81 3,6 | 20 0,90 | 89 4,0 | 2 0,09 | — | 71 3,2 | 3 0,13 | 1 0,04 | 1 0,04 | 15 0,67 | 1133 50,8 |
| 180 6,8 | 83 3,1 | 40 1,5 | 19 0,72 | 5 0,19 | 10 0,38 | 36 1,4 | 15 0,57 | 47 1,8 | — | 22 0,83 | 336 12,7 | 305 11,5 | 207 7,8 | 283 10,7 | 92 3,5 | 12 0,45 | 69 2,6 | 4 0,15 | 2 0,08 | 50 1,9 | 1 0,04 | — | — | 17 0,64 | 1503 56,7 |
| 147 5,6 | 54 2,1 | 42 1,6 | 16 0,60 | 1 0,04 | 14 0,53 | 54 2,1 | 20 0,76 | 37 1,4 | — | 21 0,80 | 361 13,7 | 332 12,6 | 115 4,4 | 283 10,8 | 103 3,9 | 15 0,57 | 71 2,7 | 1 0,04 | 1 0,04 | 58 2,2 | 6 0,23 | — | — | 29 1,1 | 1358 51,7 |
| 256 9,4 | 166 6,1 | 36 1,3 | 17 0,62 | 3 0,11 | 8 0,29 | 47 1,7 | 14 0,51 | 50 1,8 | — | 31 1,1 | 378 13,8 | 344 12,6 | 224 8,2 | 285 10,4 | 93 3,4 | 11 0,40 | 84 3,1 | 3 0,11 | 1 0,04 | 56 2,1 | — | — | — | 20 0,73 | 1639 60,0 |
| 285 10,3 | 182 6,5 | 32 1,2 | 34 1,2 | 2 0,07 | 10 0,36 | 43 1,5 | 10 0,36 | 37 1,3 | — | 34 1,2 | 424 15,3 | 378 13,6 | 198 7,1 | 371 13,4 | 112 4,0 | 15 0,55 | 110 4,0 | 1 0,04 | 2 0,07 | 65 2,3 | 6 0,22 | 1 0,04 | 1 0,04 | 20 0,72 | 1785 64,2 |
| 178 7,0 | 104 4,1 | 24 0,95 | 15 0,59 | — | 9 0,36 | 34 1,3 | 4 0,16 | 31 1,2 | 1 0,04 | 24 0,95 | 279 11,0 | 246 9,7 | 157 6,2 | 224 8,9 | 50 2,0 | 17 0,67 | 77 3,0 | 1 0,04 | 1 0,04 | 42 1,7 | 2 0,08 | 1 0,04 | 1 0,04 | 8 0,32 | 1267 50,1 |
| 183 8,3 | 116 5,3 | 19 0,86 | 16 0,73 | 1 0,05 | 8 0,36 | 27 1,2 | 3 0,14 | 35 1,6 | — | 32 1,5 | 367 16,7 | 326 14,8 | 150 6,8 | 199 9,0 | 51 2,3 | 12 0,54 | 52 2,4 | 3 0,14 | 1 0,05 | 56 2,5 | 6 0,27 | — | — | 21 0,95 | 1305 59,2 |
| 196 9,4 | 113 5,4 | 32 1,5 | 16 0,76 | 1 0,05 | 9 0,43 | 16 0,76 | 3 0,14 | 33 1,6 | — | 20 0,96 | 429 20,5 | 397 19,0 | 203 9,7 | 341 16,3 | 95 4,5 | 15 0,72 | 117 5,6 | 1 0,05 | — | 80 3,9 | 1 0,05 | — | — | 20 0,96 | 1585 75,7 |
| 131 6,4 | 82 4,0 | 10 0,49 | 19 0,92 | — | 7 0,34 | 49 2,4 | 16 0,78 | 11 0,53 | — | 18 0,87 | 183 8,9 | 164 8,0 | 88 4,3 | 125 6,1 | 27 1,3 | 12 0,58 | 32 1,6 | — | 1 0,05 | 31 1,5 | 1 0,05 | — | — | 9 0,44 | 882 42,7 |
| 377 17,1 | 251 11,4 | 35 1,6 | 35 1,6 | 2 0,09 | 12 0,54 | 14 0,64 | 2 0,09 | 21 0,95 | — | 32 1,4 | 367 16,6 | 343 15,5 | 220 10,1 | 448 20,3 | 116 5,3 | 7 0,32 | 166 7,5 | 4 0,18 | 3 0,14 | 72 3,3 | 23 1,0 | 1 0,05 | 1 0,05 | 11 0,50 | 1902 86,2 |
| 377 11,7 | 231 7,2 | 54 1,7 | 40 1,2 | 5 0,16 | 17 0,53 | 32 0,99 | 2 0,06 | 41 1,3 | — | 35 1,1 | 501 15,6 | 462 14,3 | 292 9,1 | 374 11,6 | 104 3,2 | 14 0,44 | 122 3,8 | 2 0,06 | — | 73 2,9 | 6 0,19 | 1 0,03 | — | 29 0,90 | 2170 67,4 |
| 290 9,1 | 181 5,7 | 32 1,0 | 30 0,94 | 2 0,06 | 15 0,47 | 56 1,7 | 14 0,44 | 51 1,6 | — | 31 0,97 | 479 15,0 | 441 13,8 | 215 6,7 | 340 10,6 | 97 3,0 | 18 0,56 | 119 3,7 | 2 0,06 | 1 0,03 | 69 2,2 | 2 0,06 | 1 0,03 | — | 25 0,78 | 1897 59,3 |
| 228 8,2 | 100 3,6 | 61 2,2 | 30 1,1 | 3 0,11 | 13 0,47 | 29 1,0 | 5 0,18 | 56 2,0 | 2 0,07 | 36 1,3 | 544 19,5 | 503 18,0 | 156 5,6 | 399 14,3 | 111 4,0 | 31 1,1 | 110 3,9 | 2 0,07 | 1 0,04 | 99 3,5 | — | — | — | 20 0,72 | 1837 65,9 |
| 166 5,4 | 103 3,4 | 21 0,69 | 17 0,56 | 2 0,07 | 12 0,39 | 46 1,5 | 13 0,43 | 60 2,0 | 12 0,39 | 25 0,82 | 325 10,6 | 298 9,8 | 202 6,7 | 300 9,8 | 99 3,2 | 27 0,88 | 74 2,4 | 4 0,13 | 1 0,03 | 46 1,5 | — | 1 0,03 | 1 0,03 | 23 0,75 | 1442 47,2 |
| 342 13,0 | 341 9,2 | 29 1,1 | 32 1,2 | 1 0,04 | 17 0,65 | 21 0,80 | 7 0,27 | 32 1,2 | — | 32 1,2 | 378 14,4 | 239 12,9 | 169 6,4 | 261 10,0 | 61 2,3 | 24 0,92 | 87 3,3 | 1 0,04 | 2 0,08 | 55 2,1 | — | — | — | 18 0,69 | 1705 65,0 |
| 163 7,7 | 85 4,0 | 21 1,0 | 22 1,0 | 1 0,05 | 9 0,43 | 40 1,9 | 12 0,57 | 24 1,1 | — | 18 0,86 | 267 12,7 | 238 11,3 | 127 6,0 | 202 9,6 | 51 2,4 | 10 0,48 | 49 2,3 | 1 0,05 | — | 53 2,5 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 11 0,52 | 1122 53,3 |
| 772 8,9 | 2862 5,3 | 673 1,3 | 464 0,87 | 35 0,07 | 232 0,43 | 726 1,4 | 193 0,36 | 752 1,4 | 19 0,04 | 592 1,1 | 7752 14,5 | 7037 13,1 | 3832 7,1 | 6369 11,9 | 1846 3,4 | 317 0,59 | 1852 3,5 | 44 0,08 | 19 0,04 | 1348 2,5 | 78 0,15 | 13 0,02 | 6 0,01 | 379 0,71 | 32597 60,8 |

| Armee- korps | Ist- stärke des Winter- halb- jahres | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krankungen | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. | | Gruppe III. | | | | Gruppe IV. | |
|----------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|--|---|--|-------------|------|------|--|--------------------------|------|
| | | | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | Krank- heiten des Nerven- systems | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe | davon Herzkrankheiten | |
| | | | überhaupt | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | Akuter Gelenkrheumatismus | Chronischer Gelenkrheumatismus | Hitzschlag | Krank- heiten der At- mungs- organe | | | 1. | 2. | 3. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-40 |
| Gardekorps | Summe des Winterhalbjahres | 40818 | 733 | 484 | — | 31 | 4 | 10 | 18 | 25 | — | 2 | 1 | 32 | — | 1 | 194 | 12 | — | 122 | 2802 | 2475 | 148 | 160 | 302 | 92 | |
| | ‰ | 18,0 | 11,9 | — | 0,76 | 0,10 | 0,24 | 0,44 | 0,61 | — | 0,05 | 0,02 | 0,78 | — | 0,02 | 4,8 | 0,29 | — | 3,0 | 68,6 | 60,6 | 3,6 | 3,9 | 7,4 | 2,3 | | |
| I. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 31370 | 971 | 796 | — | 9 | 19 | 16 | 6 | 28 | — | 3 | 2 | 38 | — | 1 | 129 | 19 | — | 102 | 2060 | 1816 | 158 | 65 | 161 | 29 | |
| | ‰ | 31,0 | 25,4 | — | 0,29 | 0,61 | 0,51 | 0,19 | 0,89 | — | 0,10 | 0,06 | 1,2 | — | 0,03 | 4,1 | 0,61 | — | 3,3 | 65,7 | 57,9 | 5,0 | 2,1 | 5,1 | 0,92 | | |
| II. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 25720 | 618 | 498 | — | 1 | 16 | 37 | 9 | 17 | — | 32 | 4 | 23 | — | — | 91 | 6 | — | 96 | 1406 | 1225 | 124 | 50 | 151 | 34 | |
| | ‰ | 24,0 | 19,4 | — | 0,04 | 0,62 | 1,4 | 0,35 | 0,66 | — | 1,2 | 0,16 | 0,89 | — | — | 3,5 | 0,23 | — | 3,7 | 54,7 | 47,6 | 4,8 | 1,9 | 5,9 | 1,3 | | |
| III. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 23188 | 589 | 486 | — | 9 | 15 | 10 | — | 2 | — | 2 | — | 32 | — | 1 | 70 | 13 | — | 43 | 1026 | 894 | 78 | 49 | 104 | 26 | |
| | ‰ | 25,4 | 21,0 | — | 0,39 | 0,65 | 0,43 | — | 0,09 | — | 0,09 | — | 1,4 | — | 0,04 | 3,0 | 0,56 | — | 1,9 | 44,2 | 38,6 | 3,4 | 2,1 | 4,5 | 1,1 | | |
| IV. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 21893 | 259 | 178 | — | 5 | 7 | 8 | 1 | 11 | — | 5 | 1 | 13 | — | — | 65 | 2 | — | 74 | 1050 | 930 | 88 | 27 | 132 | 42 | |
| | ‰ | 11,8 | 8,1 | — | 0,23 | 0,32 | 0,37 | 0,05 | 0,50 | — | 0,23 | 0,05 | 0,59 | — | — | 3,0 | 0,09 | — | 3,4 | 48,0 | 42,5 | 4,0 | 1,2 | 6,0 | 1,9 | | |
| V. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 25452 | 432 | 308 | — | 5 | 38 | 1 | 2 | 20 | — | 4 | — | 24 | — | 3 | 95 | 6 | — | 91 | 1720 | 1552 | 119 | 38 | 111 | 34 | |
| | ‰ | 17,0 | 12,1 | — | 0,20 | 1,5 | 0,04 | 0,08 | 0,79 | — | 0,16 | — | 0,94 | — | 0,12 | 3,7 | 0,24 | — | 3,6 | 67,6 | 61,0 | 4,7 | 1,5 | 4,4 | 1,3 | | |
| VI. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 25387 | 211 | 105 | — | 5 | 21 | 6 | 4 | 15 | — | 9 | 1 | 25 | — | — | 84 | 4 | — | 73 | 1432 | 1279 | 107 | 42 | 162 | 58 | |
| | ‰ | 8,3 | 4,5 | — | 0,20 | 0,83 | 0,24 | 0,16 | 0,59 | — | 0,35 | 0,04 | 0,98 | — | — | 3,3 | 0,16 | — | 2,9 | 56,4 | 50,4 | 4,2 | 1,7 | 6,4 | 2,3 | | |
| VII. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 26718 | 662 | 534 | — | 20 | 5 | — | 4 | 24 | — | 7 | 1 | 32 | — | — | 102 | 4 | — | 97 | 1479 | 1315 | 98 | 54 | 185 | 62 | |
| | ‰ | 24,8 | 20,0 | — | 0,75 | 0,19 | — | 0,15 | 0,90 | — | 0,26 | 0,04 | 1,2 | — | — | 3,8 | 0,15 | — | 3,6 | 55,4 | 49,2 | 3,7 | 2,0 | 6,9 | 2,3 | | |
| VIII. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 26510 | 453 | 325 | — | 15 | 17 | 22 | 7 | 19 | — | 39 | 10 | 35 | — | — | 96 | 4 | — | 113 | 1629 | 1500 | 86 | 35 | 290 | 68 | |
| | ‰ | 17,1 | 12,3 | — | 0,57 | 0,64 | 0,83 | 0,26 | 0,72 | — | 1,5 | 0,38 | 1,3 | — | — | 3,6 | 0,15 | — | 4,3 | 61,4 | 56,6 | 3,2 | 1,3 | 10,9 | 2,6 | | |
| IX. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 24572 | 797 | 647 | — | 7 | 95 | 23 | 6 | 26 | — | — | 3 | 18 | — | — | 125 | 10 | — | 81 | 1165 | 1002 | 110 | 45 | 113 | 28 | |
| | ‰ | 32,4 | 26,3 | — | 0,28 | 3,9 | 0,94 | 0,24 | 1,1 | — | — | 0,12 | 0,73 | — | — | 5,1 | 0,41 | — | 3,3 | 47,4 | 40,8 | 4,5 | 1,8 | 4,6 | 1,1 | | |
| X. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 21368 | 364 | 266 | — | 17 | 8 | 9 | 23 | 5 | — | 8 | 2 | 18 | — | — | 74 | 6 | — | 72 | 994 | 861 | 90 | 35 | 148 | 45 | |
| | ‰ | 17,0 | 12,4 | — | 0,80 | 0,37 | 0,42 | 1,1 | 0,23 | — | 0,37 | 0,09 | 0,84 | 0,05 | — | 3,5 | 0,28 | — | 3,4 | 46,5 | 40,3 | 4,2 | 1,6 | 6,9 | 2,1 | | |
| XI. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 20472 | 649 | 498 | — | 6 | 16 | 4 | 5 | 8 | — | 7 | 1 | 16 | — | — | 123 | 12 | — | 92 | 1345 | 1212 | 62 | 59 | 164 | 59 | |
| | ‰ | 31,7 | 24,3 | — | 0,29 | 0,78 | 0,20 | 0,24 | 0,39 | — | 0,34 | 0,05 | 0,78 | — | 0,05 | 6,0 | 0,59 | — | 4,5 | 65,7 | 59,2 | 3,0 | 2,9 | 8,0 | 2,9 | | |
| XII. (I. K. S.) Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 19581 | 632 | 460 | — | 28 | 29 | 19 | 10 | 16 | — | — | 1 | 16 | — | — | 150 | 8 | — | 86 | 1206 | 1048 | 121 | 37 | 105 | 27 | |
| | ‰ | 32,3 | 23,5 | — | 1,4 | 1,5 | 0,97 | 0,51 | 0,82 | — | — | 0,05 | 0,82 | — | — | 7,7 | 0,41 | — | 4,4 | 61,6 | 53,5 | 6,2 | 1,9 | 5,4 | 1,4 | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 21669 | 596 | 423 | — | 3 | 4 | 10 | — | 17 | — | 3 | — | 24 | — | — | 150 | 3 | — | 87 | 1307 | 1225 | 42 | 35 | 240 | 97 | |
| | ‰ | 27,5 | 19,5 | — | 0,14 | 0,18 | 0,46 | — | 0,78 | — | 0,14 | — | 1,1 | 0,05 | — | 6,9 | 0,14 | — | 4,0 | 60,3 | 56,5 | 1,9 | 1,8 | 11,1 | 4,5 | | |
| XIV. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 31147 | 466 | 303 | — | 5 | 4 | 13 | 2 | 19 | — | 3 | 1 | 44 | — | — | 135 | 9 | — | 117 | 1783 | 1646 | 67 | 60 | 229 | 56 | |
| | ‰ | 15,0 | 9,7 | — | 0,16 | 0,13 | 0,42 | 0,06 | 0,61 | — | 0,10 | 0,03 | 1,4 | — | — | 4,3 | 0,29 | — | 3,8 | 57,2 | 52,8 | 2,2 | 1,9 | 7,4 | 1,8 | | |
| XV. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 31040 | 523 | 359 | — | 7 | 10 | 29 | 6 | 17 | — | 5 | 3 | 39 | — | — | 118 | 6 | — | 126 | 1500 | 1371 | 86 | 34 | 244 | 68 | |
| | ‰ | 16,8 | 11,6 | — | 0,23 | 0,32 | 0,93 | 0,19 | 0,55 | — | 0,16 | 0,10 | 1,3 | — | — | 3,8 | 0,19 | — | 4,1 | 48,9 | 44,2 | 2,8 | 1,1 | 7,9 | 2,2 | | |
| XVI. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 27194 | 376 | 245 | — | 13 | — | — | 3 | 21 | — | 4 | — | 19 | — | — | 97 | 12 | — | 73 | 1488 | 1347 | 90 | 43 | 240 | 44 | |
| | ‰ | 13,8 | 9,0 | — | 0,48 | — | — | 0,11 | 0,77 | — | 0,15 | — | 0,70 | — | 0,04 | 3,6 | 0,44 | — | 2,7 | 54,7 | 49,5 | 3,3 | 1,6 | 8,8 | 1,6 | | |
| XVII. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 29549 | 307 | 205 | — | 17 | 19 | 10 | — | 28 | — | 22 | 1 | 41 | — | — | 77 | 9 | 1 | 87 | 1474 | 1270 | 156 | 41 | 160 | 40 | |
| | ‰ | 10,4 | 6,9 | — | 0,58 | 0,64 | 0,34 | — | 0,95 | — | 0,74 | 0,03 | 1,4 | — | — | 2,6 | 0,30 | 0,03 | 2,9 | 50,0 | 43,0 | 5,3 | 1,4 | 5,4 | 1,4 | | |
| XVIII. Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 25669 | 451 | 286 | — | 4 | 26 | 3 | 9 | 28 | — | 3 | 3 | 39 | — | — | 134 | 3 | — | 100 | 1583 | 1469 | 60 | 40 | 233 | 94 | |
| | ‰ | 17,6 | 11,1 | — | 0,16 | 1,0 | 0,12 | 0,35 | 1,1 | — | 0,12 | 0,12 | 1,5 | — | 0,78 | 5,2 | 0,12 | — | 3,9 | 61,7 | 57,2 | 2,3 | 1,6 | 9,1 | 3,7 | | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Summe des Winterhalbjahres | 19991 | 302 | 162 | — | 4 | 13 | 4 | 1 | 26 | — | 6 | — | 20 | — | — | 120 | 6 | — | 95 | 1130 | 996 | 108 | 19 | 125 | 40 | |
| | ‰ | 15,1 | 8,1 | — | 0,20 | 0,65 | 0,20 | 0,05 | 1,3 | — | 0,30 | — | 1,0 | — | — | 6,0 | 0,30 | — | 4,8 | 56,5 | 49,8 | 5,4 | 0,95 | 6,3 | 2,0 | | |
| Armee | Summe des Winterhalbjahres | 519308 | 10391 | 7568 | — | 211 | 366 | 234 | 116 | 372 | — | 164 | 35 | 548 | — | 2 | 2229 | 154 | 1 | 1827 | 29579 | 26433 | 1998 | 968 | 3599 | 1043 | |
| | ‰ | 20,0 | 14,6 | — | 0,41 | 0,70 | 0,45 | 0,22 | 0,72 | — | 0,32 | 0,07 | 1,1 | — | 0,05 | 4,3 | 0,30 | — | 3,5 | 57,0 | 50,9 | 3,8 | 1,9 | 6,9 | 2,0 | | |

| Krankheiten der Ernährungsorgane | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane aussch. der venesischen | Gruppe VII. Venerische Krankheiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohrenkrankheiten | Gruppe X. Krankheiten der äußeren Be- deckungen | Gruppe XI. Krankheiten der Bewegungsorgane | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krankheiten | Gruppe XIV. Selbstmordversuche | Zur Beobachtung | Summe des Zu- gangs | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------|-----------------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | Krankheiten | Krankheiten | Krankheiten | davon | | | | | | | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | 5. | 6. | 7. |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 118-122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-198 |
| 2544 62,3 | 1523 37,3 | 400 9,8 | 194 4,8 | 18 0,44 | 129 3,2 | 552 13,5 | 104 2,5 | 284 7,0 | 1 0,02 | 267 6,5 | 3574 87,6 | 3211 78,7 | 1464 35,9 | 2717 66,6 | 874 21,4 | 167 4,1 | 621 15,2 | 18 0,44 | 9 0,22 | 756 18,5 | 19 0,47 | 13 0,32 | 4 0,10 | 196 4,8 | 15699 384,6 |
| 1401 44,7 | 876 27,9 | 148 4,7 | 165 5,3 | 10 0,32 | 99 3,2 | 464 14,8 | 95 3,0 | 350 11,2 | 29 0,92 | 283 9,0 | 3054 97,4 | 2469 78,7 | 841 26,8 | 2376 75,7 | 654 20,8 | 71 2,3 | 649 20,7 | 11 0,35 | 4 0,13 | 574 18,3 | 21 0,67 | 7 0,22 | 4 0,13 | 171 5,5 | 12340 393,4 |
| 1217 47,3 | 716 27,8 | 194 7,5 | 116 4,5 | 8 0,31 | 60 2,3 | 289 11,2 | 65 2,5 | 246 9,6 | 17 0,66 | 190 7,4 | 2276 88,5 | 2065 80,3 | 1063 41,3 | 1935 75,2 | 572 22,2 | 51 2,0 | 562 21,9 | 12 0,47 | 8 0,31 | 447 17,4 | 40 1,6 | 7 0,27 | 2 0,08 | 118 4,6 | 9672 376,0 |
| 861 37,1 | 525 22,6 | 150 6,5 | 50 2,2 | 7 0,30 | 47 2,0 | 272 11,7 | 58 2,5 | 168 7,2 | 20 0,86 | 170 7,3 | 1255 54,1 | 1078 46,5 | 600 25,9 | 1174 50,6 | 384 16,6 | 53 2,3 | 358 15,4 | 11 0,47 | 7 0,30 | 232 10,0 | 21 0,91 | 3 0,13 | 2 0,09 | 101 4,4 | 6413 276,6 |
| 1010 46,1 | 562 25,7 | 167 7,6 | 106 4,8 | 8 0,37 | 69 3,2 | 230 10,6 | 41 1,9 | 161 7,4 | 5 0,23 | 214 9,8 | 1624 74,2 | 1405 64,2 | 616 28,1 | 1502 68,6 | 444 20,3 | 86 3,9 | 480 21,9 | 8 0,37 | 3 0,11 | 335 15,3 | 25 1,1 | 12 0,55 | 7 0,32 | 143 6,5 | 7096 324,1 |
| 1287 50,6 | 679 26,7 | 218 8,6 | 120 4,7 | 15 0,59 | 74 2,9 | 282 11,1 | 77 3,0 | 204 8,0 | 11 0,43 | 146 5,7 | 1882 73,9 | 1673 65,7 | 780 30,6 | 1421 55,8 | 450 17,7 | 51 2,0 | 332 13,0 | 21 0,83 | 3 0,12 | 356 14,0 | 1 0,04 | 2 0,08 | 1 0,01 | 158 6,2 | 8590 337,5 |
| 974 38,4 | 336 13,2 | 278 11,0 | 148 5,8 | 12 0,47 | 84 3,3 | 329 13,0 | 77 3,0 | 249 9,8 | 12 0,47 | 156 6,1 | 1722 67,8 | 1550 61,1 | 564 22,2 | 1539 60,6 | 474 18,7 | 65 2,6 | 408 16,1 | 12 0,47 | 8 0,32 | 339 13,4 | 43 1,7 | 6 0,24 | 1 0,01 | 182 7,2 | 7683 302,6 |
| 1360 50,9 | 859 32,2 | 221 8,3 | 62 2,3 | 9 0,34 | 65 2,4 | 243 9,1 | 57 2,1 | 252 9,4 | 6 0,22 | 184 6,9 | 2022 75,7 | 1792 67,1 | 941 35,2 | 1493 55,9 | 479 17,9 | 64 2,4 | 404 15,1 | 15 0,56 | 4 0,15 | 362 13,5 | 3 0,11 | 5 0,19 | 3 0,11 | 163 6,1 | 9151 342,5 |
| 1748 65,9 | 1083 40,9 | 205 7,7 | 190 7,2 | 12 0,45 | 74 2,8 | 261 9,8 | 48 1,8 | 257 9,7 | 2 0,08 | 228 8,6 | 2457 92,7 | 2160 81,5 | 755 28,5 | 1986 74,9 | 577 21,8 | 84 3,2 | 587 22,1 | 12 0,45 | 7 0,26 | 442 16,7 | 41 1,5 | 6 0,23 | 2 0,08 | 178 6,7 | 10435 393,6 |
| 1125 45,8 | 714 29,1 | 132 5,4 | 89 3,6 | 9 0,37 | 66 2,7 | 283 11,5 | 47 1,9 | 172 7,0 | 2 0,08 | 175 7,1 | 1525 62,1 | 1345 54,7 | 690 28,1 | 1175 47,8 | 315 12,8 | 67 2,7 | 335 13,6 | 8 0,33 | 5 0,30 | 290 11,8 | 17 0,69 | 6 0,24 | 3 0,12 | 55 2,2 | 7428 302,3 |
| 969 45,3 | 599 28,0 | 133 6,2 | 80 3,7 | 8 0,37 | 56 2,6 | 194 9,1 | 40 1,9 | 181 8,5 | — | 157 7,3 | 1919 89,8 | 1727 80,8 | 592 27,7 | 1162 54,4 | 357 16,7 | 71 3,3 | 255 11,9 | 14 0,66 | 2 0,09 | 311 14,6 | 20 0,94 | 6 0,28 | 4 0,19 | 190 5,6 | 6934 324,5 |
| 1195 58,4 | 663 32,4 | 160 7,8 | 128 6,3 | 4 0,20 | 71 3,5 | 158 7,7 | 34 1,7 | 188 9,2 | 1 0,05 | 140 6,8 | 2053 100,3 | 1861 90,9 | 860 42,0 | 1750 85,5 | 486 23,7 | 71 3,5 | 591 28,9 | 18 0,88 | 4 0,30 | 355 17,3 | 3 0,15 | 4 0,20 | 2 0,10 | 137 6,7 | 8806 430,1 |
| 1050 53,6 | 652 33,3 | 87 4,4 | 152 7,8 | 7 0,36 | 46 2,3 | 364 18,6 | 65 3,3 | 85 4,3 | — | 107 5,5 | 1248 63,7 | 1115 56,9 | 598 30,5 | 928 47,4 | 272 13,9 | 55 2,8 | 220 11,2 | 5 0,26 | 1 0,05 | 244 12,5 | 3 0,15 | 4 0,20 | — | 58 3,0 | 6516 332,8 |
| 1688 77,9 | 962 44,4 | 167 7,7 | 237 10,9 | 11 0,51 | 112 5,2 | 107 4,9 | 20 0,93 | 135 6,2 | — | 164 7,6 | 1966 90,7 | 1814 83,7 | 861 39,7 | 2285 105,5 | 563 26,0 | 68 3,1 | 819 37,8 | 20 0,92 | 9 0,42 | 381 17,6 | 202 9,3 | 10 0,46 | 4 0,10 | 167 7,7 | 9725 448,8 |
| 1654 53,1 | 886 28,4 | 253 8,1 | 208 6,7 | 34 1,1 | 94 3,0 | 196 6,3 | 28 0,90 | 216 6,9 | — | 196 6,3 | 2532 81,3 | 2322 74,5 | 1105 35,5 | 1934 62,1 | 501 16,1 | 67 2,2 | 607 19,5 | 16 0,51 | 7 0,22 | 463 14,9 | 38 1,2 | 9 0,29 | 3 0,10 | 181 5,8 | 10712 343,9 |
| 1550 49,9 | 905 29,2 | 198 6,4 | 166 5,3 | 27 0,87 | 105 3,4 | 471 15,2 | 60 1,9 | 282 9,0 | 7 0,23 | 208 6,7 | 2666 85,9 | 2392 77,1 | 924 29,8 | 1958 63,1 | 545 17,6 | 75 2,4 | 611 19,7 | 11 0,35 | 5 0,16 | 431 13,9 | 33 1,1 | 5 0,16 | 3 0,10 | 170 5,5 | 10732 345,7 |
| 1486 54,6 | 840 30,9 | 287 10,6 | 129 4,7 | 16 0,59 | 87 3,2 | 259 9,5 | 54 2,0 | 269 9,9 | 19 0,70 | 260 9,6 | 2953 108,6 | 2660 97,8 | 817 30,0 | 1904 70,0 | 522 19,2 | 98 3,6 | 544 20,0 | 16 0,59 | 4 0,15 | 520 19,1 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 116 4,3 | 10329 379,8 |
| 1087 36,8 | 715 24,2 | 153 5,1 | 77 2,6 | 11 0,37 | 79 2,6 | 359 12,1 | 74 2,5 | 308 10,4 | 51 1,7 | 205 6,9 | 1797 60,8 | 1610 54,5 | 733 24,8 | 1586 53,7 | 496 16,8 | 104 3,5 | 421 14,2 | 19 0,64 | 3 0,10 | 299 10,1 | 23 0,78 | 5 0,17 | 3 0,10 | 120 4,0 | 8307 281,1 |
| 1753 68,3 | 1117 43,5 | 190 7,4 | 167 6,5 | 9 0,35 | 112 4,4 | 169 6,6 | 28 1,1 | 245 9,5 | 2 0,08 | 263 10,2 | 2063 80,4 | 1836 71,5 | 828 32,3 | 1531 59,6 | 427 16,6 | 95 3,7 | 474 18,5 | 9 0,35 | 4 0,16 | 345 13,4 | 2 0,08 | 16 0,62 | 1 0,04 | 176 6,9 | 9523 371,0 |
| 891 44,6 | 448 22,4 | 114 5,7 | 123 6,2 | 6 0,30 | 63 3,2 | 341 17,1 | 73 3,7 | 162 8,1 | 3 0,15 | 157 7,9 | 1545 77,3 | 1367 68,4 | 588 29,4 | 1113 55,7 | 265 13,3 | 44 2,8 | 329 16,5 | 5 0,25 | 6 0,30 | 303 15,2 | 1 0,05 | 9 0,45 | 4 0,20 | 116 5,8 | 6637 332,0 |
| 26850 51,7 | 15680 30,2 | 3855 7,4 | 2707 5,2 | 241 0,46 | 1592 3,1 | 5823 11,2 | 1145 2,2 | 4414 8,5 | 188 0,36 | 3870 7,5 | 42133 81,1 | 37452 72,1 | 16220 31,2 | 33469 64,4 | 9657 18,6 | 1507 2,9 | 9607 18,5 | 261 0,50 | 103 0,20 | 7785 15,0 | 557 1,1 | 136 0,26 | 54 0,10 | 2826 5,4 | 182728 351,9 |

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. | | | Gruppe III. | | | Gruppe IV. | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|--|--------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|--|------------------------|---|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|------------------|---|--|-------|--|-------------|--|--------------------------|------------|--|
| | | | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- kran- kungen | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Akuter Gelenk- rheuma- tismus | 3. Chro- nischer Gelenk- rheuma- tismus | 4. Hitzschlag | Krank- heiten des Nerven- systems | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe | davon Herzkrankheiten | | |
| | | | | davon | | | | | | | | | | Katarhe der Schleim- häute der Luftwege | Akute Lungenentzündung | Brustfellentzündung und Ausgänge ausschl. No. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | überhaupt | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | | | | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | 1. | 2. | 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 1-40 | 1-26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18- 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 38 | 41-52 | 53 63 | 53- 57 | 58 | 60 | 64-79 | 64- 68 | | | | | | | | | | | | |
| Gardekorps | April . . | 42933 ‰ 3,0 | 129 3,0 | 74 1,7 | — | 11 0,26 | 1 0,02 | 1 0,02 | 1 0,21 | 9 — | — | — | 1 0,02 | 13 0,30 | — | — | 47 1,1 | — | — | 25 0,58 | 280 7,0 | 231 5,4 | 14 0,33 | 34 0,79 | 41 0,95 | 5 0,12 | | | | | | | | | |
| I. Armee- korps | April . . | 32062 ‰ 1,8 | 58 1,8 | 29 0,90 | — | 2 0,06 | 3 0,09 | 3 0,09 | 1 0,03 | 3 0,09 | — | 1 0,03 | — | 7 0,22 | — | — | 26 0,81 | — | — | 16 0,50 | 182 5,7 | 147 4,6 | 20 0,62 | 14 0,44 | 25 0,18 | 1 0,03 | | | | | | | | | |
| II. Armee- korps | April . . | 26092 ‰ 2,0 | 53 2,0 | 30 1,1 | — | — | 4 0,16 | 1 0,04 | 4 0,15 | — | 4 0,15 | — | 3 0,11 | — | — | 16 0,61 | 2 0,08 | — | 8 0,31 | 169 6,5 | 132 5,1 | 22 0,81 | 13 0,50 | 19 0,73 | 1 0,01 | | | | | | | | | | |
| III. Armee- korps | April . . | 24711 ‰ 1,2 | 29 1,2 | 12 0,49 | — | 3 0,12 | — | — | 1 0,04 | — | — | — | 5 0,20 | — | — | 15 0,61 | 1 0,04 | — | 7 0,28 | 95 3,8 | 77 3,1 | 12 0,49 | 6 0,24 | 17 0,69 | 5 0,20 | | | | | | | | | | |
| IV. Armee- korps | April . . | 22479 ‰ 1,7 | 39 1,7 | 19 0,85 | — | 2 0,09 | — | — | 3 0,13 | — | — | — | 4 0,18 | — | — | 20 0,89 | — | — | 6 0,27 | 99 4,4 | 81 3,6 | 15 0,67 | 2 0,09 | 15 0,67 | 2 0,09 | | | | | | | | | | |
| V. Armee- korps | April . . | 25963 ‰ 1,3 | 33 1,3 | 10 0,39 | — | 2 0,08 | 3 0,12 | — | 2 0,08 | — | — | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 20 0,77 | — | — | 17 0,65 | 127 4,9 | 88 3,4 | 19 0,73 | 19 0,73 | 22 0,85 | 2 0,08 | | | | | | | | | | |
| VI. Armee- korps | April . . | 26193 ‰ 0,76 | 20 0,76 | 6 0,23 | — | — | 1 0,04 | — | 2 0,08 | — | 1 0,04 | — | 2 0,08 | — | — | 14 0,53 | — | — | 14 0,53 | 155 5,9 | 135 5,2 | 16 0,61 | 4 0,15 | 27 1,0 | 4 0,15 | | | | | | | | | | |
| VII. Armee- korps | April . . | 27362 ‰ 1,8 | 50 1,8 | 25 0,91 | — | 2 0,07 | 1 0,04 | 2 0,07 | — | 3 0,11 | — | — | 1 0,04 | 8 0,29 | — | 21 0,77 | — | — | 6 0,22 | 159 5,8 | 132 4,8 | 18 0,66 | 7 0,26 | 15 0,55 | 1 0,04 | | | | | | | | | | |
| VIII. Armee- korps | April . . | 28446 ‰ 1,7 | 47 1,7 | 20 0,70 | — | 3 0,11 | 2 0,07 | — | 1 0,04 | — | — | — | 1 0,04 | 4 0,14 | — | 1 0,04 | 23 0,81 | 1 0,04 | — | 19 0,67 | 198 7,0 | 177 6,2 | 15 0,53 | 3 0,11 | 36 1,3 | 8 0,28 | | | | | | | | | |
| IX. Armee- korps | April . . | 25861 ‰ 2,0 | 52 2,0 | 27 1,0 | — | 9 0,35 | — | 3 0,12 | 2 0,08 | — | 1 0,04 | — | 6 0,23 | — | — | 23 0,89 | 2 0,08 | — | 7 0,27 | 113 4,4 | 95 3,7 | 10 0,39 | 6 0,23 | 31 1,2 | 2 0,08 | | | | | | | | | | |
| X. Armee- korps | April . . | 21947 ‰ 2,2 | 48 2,2 | 23 1,0 | — | 6 0,27 | 3 0,14 | 1 0,05 | 3 0,14 | 2 0,09 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 1 0,05 | — | 22 1,0 | — | — | 5 0,23 | 125 5,7 | 102 4,6 | 18 0,82 | 5 0,23 | 17 0,77 | 4 0,18 | | | | | | | | | | |
| XI. Armee- korps | April . . | 20940 ‰ 2,7 | 56 2,7 | 31 1,5 | — | 3 0,14 | — | 1 0,05 | 2 0,10 | — | — | — | 2 0,10 | 7 0,33 | — | 2 0,10 | 24 1,1 | — | 9 0,43 | 109 5,2 | 94 4,5 | 7 0,33 | 7 0,33 | 29 1,4 | 6 0,29 | | | | | | | | | | |
| XII. (I. K. S.) Armeekorps | April . . | 20486 ‰ 2,4 | 49 2,4 | 24 1,2 | — | 4 0,20 | 4 0,20 | 5 0,24 | — | 2 0,10 | — | — | — | 2 0,10 | — | — | 23 1,1 | — | — | 11 0,54 | 97 4,7 | 76 3,7 | 17 0,83 | 4 0,20 | 20 0,98 | 6 0,29 | | | | | | | | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | April . . | 22121 ‰ 4,9 | 108 4,9 | 59 2,6 | — | 1 0,05 | 2 0,09 | 2 0,09 | 1 0,05 | 6 0,27 | — | — | — | 6 0,27 | — | — | 45 2,0 | — | — | 188 8,5 | 161 7,3 | 14 0,63 | 9 0,41 | 31 1,4 | 5 0,23 | | | | | | | | | | |
| XIV. Armee- korps | April . . | 33803 ‰ 2,7 | 91 2,7 | 37 1,1 | — | 5 0,15 | — | 3 0,09 | 2 0,06 | 5 0,15 | — | — | — | 7 0,21 | — | 1 0,03 | 50 1,5 | 1 0,03 | — | 12 0,35 | 241 7,1 | 214 6,3 | 17 0,50 | 9 0,27 | 48 1,4 | 1 0,03 | | | | | | | | | |
| XV. Armee- korps | April . . | 32058 ‰ 1,7 | 54 1,7 | 25 0,78 | — | — | 2 0,06 | — | — | 5 0,16 | — | — | — | 7 0,22 | — | — | 27 0,84 | — | — | 8 0,25 | 182 5,7 | 170 5,3 | 10 0,31 | 2 0,06 | 43 1,3 | 6 0,19 | | | | | | | | | |
| XVI. Armee- korps | April . . | 27820 ‰ 2,3 | 65 2,3 | 47 1,7 | — | 2 0,07 | 1 0,04 | — | — | 2 0,07 | — | — | — | 5 0,18 | — | — | 14 0,50 | 2 0,07 | — | 6 0,22 | 186 6,7 | 166 6,0 | 14 0,50 | 5 0,18 | 39 1,4 | — | | | | | | | | | |
| XVII. Armee- korps | April . . | 30625 ‰ 1,6 | 50 1,6 | 21 0,69 | — | 1 0,03 | — | 1 0,03 | — | 4 0,13 | — | 2 0,06 | — | 9 0,29 | — | — | 21 0,69 | — | — | 6 0,20 | 113 3,7 | 83 2,7 | 19 0,62 | 10 0,39 | 23 0,75 | 4 0,13 | | | | | | | | | |
| XVIII. Armeekorps | April . . | 27322 ‰ 2,9 | 78 2,9 | 21 0,77 | — | — | 4 0,15 | 1 0,04 | — | 4 0,15 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 3 0,11 | — | 1 0,04 | 53 1,9 | 2 0,07 | — | 20 0,73 | 164 6,0 | 133 4,9 | 16 0,59 | 13 0,48 | 34 1,2 | 4 0,15 | | | | | | | | | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | April . . | 21337 ‰ 2,3 | 49 2,3 | 15 0,70 | — | — | 1 0,05 | 2 0,09 | 1 0,05 | 5 0,23 | — | — | — | 3 0,14 | — | — | 27 1,3 | 2 0,09 | — | 11 0,52 | 105 4,9 | 86 4,0 | 13 0,61 | 5 0,23 | 24 1,1 | 10 0,47 | | | | | | | | | |
| Armee | April . . | 540561 ‰ 2,1 | 1158 2,1 | 555 1,0 | — | 36 0,07 | 46 0,09 | 27 0,05 | 14 0,03 | 67 0,12 | — | 11 0,02 | 8 0,01 | 103 0,19 | — | 5 0,01 | 531 0,98 | 13 0,02 | — | 222 0,41 | 3087 5,7 | 2580 4,8 | 306 0,57 | 177 0,33 | 556 1,0 | 77 0,14 | | | | | | | | | |

| Krank- heiten der Ernäh- rungs- organe | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krank- heiten der Harn- und Ge- schlechts- organe ausschl. der vene- rischen | Gruppe VII. Vene- rische Krank- heiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohren- krank- heiten | Gruppe X. Krank- heiten der äußeren Be- deckun- gen | Gruppe XI. Krank- heiten der Bewe- gungs- organe | Me- cha- nische Ver- letzun- gen | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krank- heiten | Gruppe XIV. Zur Be- obach- tung | Summe des Zu- gangs | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--|--|---------------------------|------------------|--|--|--|---|-------------|---------|----------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--|---|------------------------------|--------------------|------|-------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | | davon | davon | davon | | | | | | | | davon | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | | | 6. | 7. |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 118-122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-196 |
| | Mandelenzündung | Akuter Magenkatarrh | Akuter Darmkatarrh | Katarrhale Gelbsucht | | | Konstitutionelle Syphilis | Augenkrankheiten | | | | Zellgewebezündung | | | Quetschungen, Zerreißungen | Knochenbrüche | Verstauchungen | Verrenkungen | Schufswunden | Hieb-, Schnitt-, Stich-, Riß-, Quetsch- und Bisswunden | Andere Wunden und Verletzungen | | Selbstmordversuche | | |
| 393 | 209 | 73 | 36 | 4 | 19 | 68 | 14 | 43 | 1 | 30 | 489 | 438 | 236 | 474 | 149 | 42 | 100 | 1 | 1 | 142 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2235 |
| 9,2 | 4,9 | 1,7 | 0,84 | 0,09 | 0,44 | 1,6 | 0,33 | 1,0 | 0,02 | 0,70 | 11,4 | 10,2 | 5,5 | 11,0 | 3,5 | 0,98 | 2,3 | 0,02 | 0,02 | 3,3 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 52,1 |
| 141 | 65 | 20 | 18 | 2 | 16 | 50 | 10 | 55 | 4 | 30 | 442 | 331 | 150 | 354 | 104 | 14 | 99 | 1 | 3 | 90 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1536 |
| 4,4 | 2,0 | 0,62 | 0,56 | 0,06 | 0,50 | 1,6 | 0,31 | 1,7 | 0,12 | 0,94 | 13,8 | 10,3 | 4,7 | 11,0 | 3,2 | 0,44 | 3,1 | 0,03 | 0,09 | 2,8 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,50 | 47,9 |
| 141 | 67 | 26 | 24 | 1 | 3 | 30 | 8 | 45 | 1 | 13 | 379 | 351 | 202 | 282 | 106 | 10 | 64 | 1 | 1 | 71 | 5 | — | — | 6 | 1350 |
| 5,4 | 2,6 | 1,0 | 0,92 | 0,04 | 0,11 | 1,1 | 0,31 | 1,7 | 0,04 | 0,50 | 14,5 | 13,5 | 7,7 | 10,8 | 4,1 | 0,38 | 2,5 | 0,04 | 0,04 | 2,7 | 0,19 | — | — | 0,23 | 51,7 |
| 104 | 58 | 18 | 14 | 1 | 7 | 30 | 11 | 32 | — | 17 | 199 | 181 | 117 | 171 | 61 | 8 | 54 | 1 | — | 32 | 4 | — | — | 2 | 827 |
| 4,2 | 2,3 | 0,73 | 0,57 | 0,04 | 0,28 | 1,2 | 0,45 | 1,3 | — | 0,69 | 8,1 | 7,3 | 4,7 | 6,9 | 2,5 | 0,32 | 2,2 | 0,04 | — | 1,3 | 0,16 | — | — | 0,08 | 33,5 |
| 120 | 67 | 23 | 18 | — | 3 | 20 | 2 | 22 | 1 | 10 | 247 | 227 | 108 | 235 | 48 | 23 | 93 | 1 | 1 | 59 | 2 | — | — | 10 | 934 |
| 5,3 | 3,0 | 1,0 | 0,80 | — | 0,13 | 0,89 | 0,09 | 0,98 | 0,04 | 0,44 | 11,0 | 10,1 | 4,8 | 10,5 | 2,1 | 1,0 | 4,1 | 0,04 | 0,04 | 2,6 | 0,09 | — | — | 0,44 | 41,5 |
| 141 | 65 | 25 | 17 | — | 5 | 32 | 14 | 37 | — | 14 | 237 | 217 | 141 | 212 | 57 | 8 | 51 | 2 | 2 | 57 | — | — | — | 4 | 1022 |
| 5,4 | 2,5 | 0,96 | 0,65 | — | 0,19 | 1,2 | 0,54 | 1,4 | — | 0,54 | 9,1 | 8,4 | 5,4 | 8,2 | 2,2 | 0,31 | 2,0 | 0,08 | 0,08 | 2,2 | — | — | — | 0,15 | 39,4 |
| 133 | 43 | 36 | 22 | 1 | 7 | 36 | 13 | 25 | — | 13 | 320 | 295 | 111 | 237 | 73 | 9 | 56 | 2 | — | 65 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1107 |
| 5,1 | 1,6 | 1,4 | 0,84 | 0,04 | 0,27 | 1,4 | 0,50 | 0,95 | — | 0,50 | 12,2 | 11,3 | 4,2 | 9,0 | 2,8 | 0,34 | 2,1 | 0,08 | — | 2,5 | 0,27 | 0,08 | 0,08 | 0,27 | 42,3 |
| 147 | 77 | 25 | 11 | 2 | 11 | 27 | 7 | 30 | — | 22 | 304 | 277 | 178 | 249 | 61 | 25 | 61 | 3 | — | 67 | — | 2 | 1 | 14 | 1214 |
| 5,4 | 2,8 | 0,91 | 0,40 | 0,07 | 0,40 | 0,99 | 0,26 | 1,1 | — | 0,80 | 11,1 | 10,1 | 6,5 | 9,1 | 2,2 | 0,91 | 2,2 | 0,11 | — | 2,4 | — | 0,07 | 0,04 | 0,51 | 44,4 |
| 205 | 121 | 31 | 20 | 3 | 10 | 26 | 13 | 32 | — | 27 | 384 | 340 | 157 | 319 | 74 | 19 | 77 | 2 | 1 | 82 | 6 | 1 | 1 | 26 | 1487 |
| 7,2 | 4,3 | 1,1 | 0,70 | 0,11 | 0,35 | 0,91 | 0,46 | 1,1 | — | 0,95 | 13,5 | 12,0 | 5,5 | 11,2 | 2,6 | 0,67 | 2,7 | 0,07 | 0,04 | 2,9 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,91 | 52,3 |
| 128 | 72 | 18 | 8 | 4 | 13 | 44 | 9 | 21 | — | 14 | 221 | 194 | 121 | 157 | 42 | 8 | 50 | 1 | — | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 924 |
| 4,9 | 2,8 | 0,70 | 0,31 | 0,15 | 0,50 | 1,7 | 0,35 | 0,81 | — | 0,54 | 8,5 | 7,5 | 4,7 | 6,1 | 1,6 | 0,31 | 1,9 | 0,04 | — | 1,5 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 35,7 |
| 158 | 83 | 28 | 18 | 3 | 5 | 29 | 7 | 24 | — | 14 | 255 | 229 | 147 | 212 | 68 | 12 | 54 | 2 | 1 | 47 | 4 | — | — | 7 | 1046 |
| 7,2 | 3,8 | 1,3 | 0,82 | 0,14 | 0,23 | 1,3 | 0,32 | 1,1 | — | 0,64 | 11,6 | 10,4 | 6,7 | 9,7 | 3,1 | 0,55 | 2,5 | 0,09 | 0,05 | 2,1 | 0,18 | — | — | 0,32 | 47,7 |
| 140 | 66 | 26 | 16 | — | 9 | 22 | 4 | 25 | — | 14 | 281 | 253 | 158 | 264 | 93 | 21 | 70 | 2 | — | 61 | — | 1 | 1 | 17 | 1134 |
| 6,7 | 3,2 | 1,2 | 0,76 | — | 0,43 | 1,1 | 0,19 | 1,2 | — | 0,67 | 13,4 | 12,1 | 7,5 | 12,6 | 4,4 | 1,0 | 3,3 | 0,10 | — | 2,9 | — | 0,05 | 0,05 | 0,81 | 54,2 |
| 82 | 47 | 10 | 15 | — | 7 | 50 | 10 | 8 | — | 13 | 171 | 155 | 106 | 109 | 23 | 8 | 26 | — | — | 30 | — | 1 | 1 | 3 | 727 |
| 4,0 | 2,3 | 0,49 | 0,73 | — | 0,34 | 2,4 | 0,49 | 0,39 | — | 0,63 | 8,3 | 7,6 | 5,2 | 5,3 | 1,1 | 0,39 | 1,3 | — | — | 1,5 | — | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 35,5 |
| 246 | 131 | 15 | 48 | 2 | 7 | 17 | 4 | 16 | — | 10 | 312 | 288 | 161 | 291 | 69 | 10 | 103 | 2 | 1 | 64 | 16 | — | — | 14 | 1410 |
| 11,1 | 5,9 | 0,69 | 2,2 | 0,09 | 0,32 | 0,77 | 0,18 | 0,72 | — | 0,45 | 14,1 | 13,0 | 7,3 | 13,2 | 3,1 | 0,45 | 4,7 | 0,09 | 0,05 | 2,9 | 0,72 | — | — | 0,63 | 65,1 |
| 323 | 189 | 39 | 33 | 5 | 6 | 30 | 1 | 37 | — | 18 | 366 | 341 | 233 | 317 | 87 | 17 | 96 | 4 | 1 | 74 | 8 | — | — | 25 | 1747 |
| 9,6 | 5,6 | 1,2 | 0,98 | 0,15 | 0,18 | 0,89 | 0,03 | 1,1 | — | 0,53 | 10,8 | 10,1 | 6,9 | 9,4 | 2,8 | 0,50 | 2,8 | 0,12 | 0,03 | 2,2 | 0,24 | — | — | 0,74 | 51,7 |
| 208 | 128 | 27 | 18 | 3 | 15 | 51 | 14 | 42 | — | 14 | 392 | 342 | 168 | 307 | 84 | 9 | 95 | 3 | 2 | 82 | 3 | — | — | 11 | 1495 |
| 6,5 | 4,0 | 0,84 | 0,56 | 0,09 | 0,47 | 1,6 | 0,44 | 1,3 | — | 0,44 | 12,2 | 10,7 | 5,2 | 9,6 | 2,6 | 0,28 | 3,0 | 0,09 | 0,06 | 2,6 | 0,09 | — | — | 0,34 | 46,6 |
| 215 | 85 | 47 | 38 | 2 | 12 | 31 | 9 | 43 | 1 | 32 | 444 | 379 | 170 | 329 | 74 | 28 | 70 | — | 2 | 100 | — | — | — | 17 | 1589 |
| 7,7 | 3,1 | 1,7 | 1,4 | 0,07 | 0,43 | 1,1 | 0,32 | 1,5 | 0,04 | 1,2 | 16,0 | 13,6 | 6,1 | 11,8 | 2,7 | 1,0 | 2,5 | — | 0,07 | 3,6 | — | — | — | 0,61 | 57,1 |
| 113 | 50 | 22 | 22 | 4 | 15 | 23 | 7 | 28 | 6 | 21 | 309 | 282 | 126 | 272 | 75 | 14 | 87 | 6 | 2 | 52 | 4 | — | — | 8 | 1107 |
| 3,7 | 1,6 | 0,72 | 0,72 | 0,13 | 0,49 | 0,75 | 0,23 | 0,91 | 0,20 | 0,69 | 10,1 | 9,2 | 4,1 | 8,9 | 2,4 | 0,46 | 2,8 | 0,20 | 0,06 | 1,6 | 0,13 | — | — | 0,26 | 36,1 |
| 202 | 126 | 25 | 20 | 3 | 10 | 25 | 7 | 31 | — | 28 | 246 | 223 | 118 | 242 | 70 | 29 | 57 | 1 | — | 56 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1208 |
| 7,4 | 4,6 | 0,92 | 0,73 | 0,11 | 0,37 | 0,92 | 0,26 | 1,1 | — | 1,0 | 9,0 | 8,2 | 4,3 | 8,9 | 2,6 | 1,1 | 2,1 | 0,04 | — | 2,0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | 44,2 |
| 119 | 50 | 19 | 27 | — | 8 | 47 | 18 | 23 | — | 20 | 221 | 199 | 97 | 155 | 39 | 7 | 42 | 1 | — | 45 | — | — | — | 7 | 886 |
| 5,6 | 2,3 | 0,89 | 1,3 | — | 0,37 | 2,2 | 0,84 | 1,1 | — | 0,94 | 10,4 | 9,3 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 0,33 | 2,0 | 0,05 | — | 2,1 | — | — | — | 0,33 | 41,5 |
| 3459 | 1799 | 553 | 443 | 40 | 188 | 688 | 182 | 619 | 14 | 374 | 6219 | 5542 | 3005 | 5188 | 1457 | 321 | 1405 | 36 | 18 | 1315 | 65 | 11 | 10 | 211 | 24985 |
| 6,4 | 3,3 | 1,0 | 0,82 | 0,07 | 0,35 | 1,3 | 0,34 | 1,1 | 0,03 | 0,69 | 11,5 | 10,3 | 5,6 | 9,6 | 2,7 | 0,59 | 2,6 | 0,07 | 0,03 | 2,4 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 46,2 |

| Armee- korps | Monat | Jahres- Ist- stärke | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. Krank- heiten des Nerven- systems | Gruppe III. | | | | Gruppe IV. | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|--|--------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|----------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|--|--|------------------------------|--|---|--------------------------|------------|
| | | | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krankungen | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | 2. Akuter Gelenkrheumatismus | 3. Chronischer Gelenkrheumatismus | | 4. Hitzschlag | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- relten- den Organe | davon Herzkrankheiten | |
| | | | | überhaupt | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Katarhe der Schleim- häute der Luftwege | 2. Akute Lungenentzündung | 3. Brustfellentzündung und Ausgänge auschl. No. 19 | | | |
| | | | | | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | 18- 21 | | | | | | | | | | | 22 |
| 1-40 | 1-28 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18- 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 38 | 41-52 | 53-63 | 57 | 58 | 60 | 64-79 | 64- 68 | | | | | |
| Gardekorps | Mai . . . | 43359 ‰ | 106 2,4 | 61 1,4 | — | 12 0,28 | 2 0,05 | 3 0,07 | 7 0,16 | 10 0,23 | — | — | — | 10 0,23 | — | — | 37 0,85 | 3 0,07 | — | 25 0,58 | 285 6,5 | 216 5,0 | 24 0,55 | 40 0,92 | 41 0,95 | 1 0,02 | | |
| I. Armeekorps | Mai . . . | 33670 ‰ | 65 1,9 | 22 0,65 | — | 1 0,03 | 3 0,09 | 1 0,03 | 2 0,06 | — | — | — | 3 0,09 | 1 0,03 | 5 0,15 | — | — | 33 0,98 | 7 0,21 | 1 0,03 | 14 0,42 | 173 5,1 | 124 3,7 | 25 0,71 | 21 0,62 | 31 0,92 | 5 0,15 | |
| II. Armeekorps | Mai . . . | 26108 ‰ | 50 1,9 | 29 1,1 | — | 3 0,11 | 2 0,08 | 5 0,19 | 2 0,08 | 5 0,19 | — | — | — | 4 0,15 | — | — | 14 0,54 | 4 0,15 | — | 19 0,73 | 125 4,8 | 86 3,4 | 25 0,96 | 14 0,54 | 28 1,1 | 7 0,27 | | |
| III. Armeekorps | Mai . . . | 24788 ‰ | 42 1,7 | 22 0,89 | — | 3 0,12 | 4 0,16 | 1 0,04 | 1 0,04 | 2 0,08 | — | — | 1 0,04 | — | 7 0,28 | — | — | 14 0,56 | 1 0,04 | — | 9 0,36 | 111 4,5 | 74 3,0 | 25 1,0 | 12 0,48 | 15 0,61 | 2 0,08 | |
| IV. Armeekorps | Mai . . . | 23047 ‰ | 42 1,8 | 15 0,65 | — | — | 1 0,04 | — | 2 0,09 | — | — | — | 1 0,04 | — | 4 0,17 | — | — | 24 1,0 | — | — | 12 0,52 | 70 3,0 | 48 2,1 | 16 0,69 | 6 0,26 | 21 0,91 | 5 0,22 | |
| V. Armeekorps | Mai . . . | 26820 ‰ | 41 1,5 | 10 0,37 | — | 1 0,04 | — | — | — | 4 0,15 | — | — | — | 1 0,04 | 2 0,07 | — | — | 25 0,93 | 3 0,11 | — | 8 0,30 | 147 5,5 | 102 3,8 | 28 1,0 | 17 0,63 | 20 0,75 | 2 0,07 | |
| VI. Armeekorps | Mai . . . | 26648 ‰ | 32 1,2 | 10 0,38 | — | — | 1 0,04 | 3 0,11 | — | — | — | — | 1 0,04 | — | 5 0,19 | — | — | 13 0,49 | 1 0,04 | 1 0,04 | 20 0,75 | 142 5,3 | 118 4,4 | 15 0,56 | 7 0,26 | 14 0,53 | 8 0,30 | |
| VII. Armeekorps | Mai . . . | 27160 ‰ | 41 1,5 | 17 0,63 | — | 1 0,04 | 5 0,18 | 1 0,04 | 1 0,04 | 3 0,11 | — | — | 1 0,04 | — | 2 0,07 | — | — | 19 0,70 | 2 0,07 | — | 8 0,29 | 159 5,9 | 126 4,6 | 25 0,92 | 7 0,26 | 20 0,74 | 3 0,11 | |
| VIII. Armeekorps | Mai . . . | 28851 ‰ | 38 1,3 | 16 0,55 | — | 2 0,07 | — | — | — | 2 0,07 | — | — | 2 0,07 | — | 2 0,07 | — | — | 17 0,59 | 1 0,03 | 2 0,07 | 15 0,52 | 194 6,7 | 161 5,6 | 22 0,76 | 11 0,38 | 33 1,1 | 1 0,03 | |
| IX. Armeekorps | Mai . . . | 25670 ‰ | 45 1,8 | 18 0,70 | — | — | 4 0,16 | 1 0,04 | 2 0,08 | 1 0,04 | — | — | — | — | 1 0,04 | — | — | 23 0,90 | — | — | 11 0,43 | 112 4,4 | 90 3,5 | 15 0,58 | 7 0,27 | 21 0,82 | 4 0,16 | |
| X. Armeekorps | Mai . . . | 23377 ‰ | 38 1,6 | 15 0,64 | — | 2 0,09 | 3 0,13 | 3 0,13 | 2 0,09 | 2 0,09 | — | — | — | 1 0,04 | 2 0,09 | — | — | 20 0,86 | 1 0,04 | — | 2 0,09 | 125 5,3 | 93 3,9 | 22 0,94 | 10 0,43 | 22 0,94 | 2 0,09 | |
| XI. Armeekorps | Mai . . . | 22266 ‰ | 54 2,4 | 17 0,76 | — | 1 0,05 | 2 0,09 | — | — | 1 0,05 | — | — | — | — | 4 0,18 | — | — | 30 1,3 | — | 3 0,13 | 17 0,76 | 105 4,7 | 89 4,0 | 8 0,36 | 8 0,36 | 19 0,85 | 8 0,36 | |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | Mai . . . | 20230 ‰ | 44 2,2 | 25 1,2 | — | 4 0,20 | 1 0,05 | 4 0,20 | 3 0,15 | 4 0,20 | — | — | — | 3 0,15 | — | — | 18 0,89 | 1 0,05 | — | 10 0,49 | 73 3,6 | 45 2,2 | 22 1,1 | 6 0,30 | 22 1,1 | 3 0,15 | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | Mai . . . | 24491 ‰ | 86 3,5 | 51 2,1 | — | 4 0,16 | — | 2 0,08 | — | 1 0,04 | — | — | — | 5 0,20 | — | — | 32 1,3 | — | — | 17 0,69 | 200 8,2 | 183 7,5 | 12 0,49 | 5 0,20 | 25 1,0 | — | | |
| XIV. Armeekorps | Mai . . . | 33394 ‰ | 73 2,2 | 17 0,51 | — | 2 0,06 | — | 1 0,03 | — | 4 0,12 | — | — | — | 1 0,03 | 6 0,18 | — | — | 50 1,5 | — | — | 12 0,36 | 197 5,9 | 162 4,9 | 23 0,69 | 12 0,36 | 41 1,2 | 6 0,18 | |
| XV. Armeekorps | Mai . . . | 32569 ‰ | 56 1,7 | 19 0,58 | — | 2 0,06 | — | 1 0,03 | — | 3 0,09 | — | — | — | — | 3 0,09 | — | — | 31 0,95 | 1 0,03 | 2 0,06 | 9 0,28 | 190 5,8 | 167 5,1 | 19 0,58 | 3 0,09 | 37 1,1 | 5 0,15 | |
| XVI. Armeekorps | Mai . . . | 27723 ‰ | 69 2,5 | 48 1,7 | — | 2 0,07 | 4 0,14 | 1 0,04 | — | 4 0,14 | — | — | — | 5 0,18 | — | — | — | 14 0,50 | 2 0,07 | — | 6 0,22 | 174 6,3 | 147 5,3 | 18 0,65 | 9 0,32 | 31 1,1 | 1 0,04 | |
| XVII. Armeekorps | Mai . . . | 30176 ‰ | 28 0,93 | 13 0,43 | — | — | — | 1 0,03 | — | 3 0,10 | — | — | 2 0,07 | 2 0,07 | 2 0,07 | — | — | 12 0,40 | — | — | 15 0,50 | 118 3,9 | 94 3,1 | 13 0,43 | 11 0,36 | 18 0,60 | 3 0,10 | |
| XVIII. Armeekorps | Mai . . . | 27608 ‰ | 55 2,0 | 26 0,91 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 2 0,07 | 1 0,04 | 7 0,25 | — | — | 1 0,04 | — | 8 0,29 | — | — | 1 0,04 | 24 0,87 | 3 0,11 | — | 13 0,47 | 118 4,3 | 102 3,7 | 8 0,29 | 7 0,25 | 21 0,76 | 2 0,07 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Mai . . . | 21381 ‰ | 31 1,4 | 8 0,37 | — | — | — | 2 0,09 | — | 2 0,09 | — | — | — | — | — | — | — | 21 0,98 | 1 0,05 | — | 13 0,61 | 79 3,7 | 59 2,8 | 17 0,80 | 3 0,14 | 21 0,98 | 4 0,19 | |
| Armee | Mai . . . | 549336 ‰ | 1036 1,9 | 459 0,81 | — | 41 0,07 | 33 0,06 | 32 0,06 | 23 0,04 | 58 0,11 | — | — | 12 0,02 | 6 0,01 | 80 0,15 | — | — | 1 0,86 | 471 0,06 | 31 0,02 | 9 0,02 | 255 0,46 | 2897 5,3 | 2286 4,2 | 382 0,70 | 216 0,39 | 501 0,91 | 72 0,13 |

| Krankheiten der Ernährungsorgane | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ausschl. der venereischen | Gruppe VII. Venereische Krankheiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohrenkrankheiten | Gruppe X. Krankheiten der Kiefer- und Bedeckungen | Gruppe XI. Krankheiten der Bewegungsorgane | Gruppe XII. Mechanische Verletzungen | davon | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krankheiten | Gruppe XIV. Zur Beobachtung | Summe des Zugangs | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---|--|--------------|------------|--------------------------------|--|---|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|-------------|---------------|----|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | | Krankheiten | Krankheiten | Krankheiten | Krankheiten | Krankheiten | Krankheiten | davon | | | | | | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | | | | | | | Konstitutionelle Syphilis | | | | Augenkrankheiten | ansteckende | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 118-122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-182 | 163-192 | 167 | 185-187 | 188-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-198 | | |
| 383 8,8 | 185 4,3 | 72 1,7 | 57 1,3 | 5 0,12 | 15 0,35 | 57 1,3 | 14 0,32 | 70 1,6 | — | 34 0,78 | 582 13,4 | 542 12,5 | 298 6,9 | 541 12,5 | 172 4,0 | 69 1,6 | 125 2,9 | 1 0,02 | 2 0,05 | 107 2,5 | 2 0,05 | 2 0,05 | 2 0,05 | 2 0,05 | 1 0,02 | 13 0,30 | 2452 56,6 | |
| 208 6,2 | 81 2,4 | 33 0,98 | 54 1,6 | — | 18 0,53 | 35 1,0 | 8 0,24 | 56 1,7 | 4 0,12 | 33 0,98 | 421 12,5 | 374 11,1 | 209 6,2 | 480 14,3 | 145 4,3 | 20 0,59 | 122 3,6 | — | 3 0,09 | 113 3,4 | 1 0,03 | — | — | — | — | 18 0,53 | 1761 52,3 | |
| 190 7,3 | 56 2,1 | 39 1,5 | 18 0,69 | 2 0,08 | 5 0,19 | 17 0,65 | 4 0,15 | 31 1,2 | — | 17 0,65 | 345 13,2 | 311 11,9 | 203 7,8 | 313 12,0 | 104 4,0 | 9 0,34 | 73 2,8 | 2 0,08 | — | 71 2,7 | 8 0,31 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 7 0,27 | 1351 51,7 | |
| 128 5,2 | 61 2,5 | 35 1,4 | 10 0,40 | — | 7 0,28 | 32 1,3 | 5 0,20 | 26 1,0 | — | 28 1,1 | 212 8,6 | 191 7,7 | 160 6,5 | 218 8,8 | 78 3,1 | 15 0,61 | 59 2,4 | 2 0,08 | 1 0,04 | 52 2,1 | 2 0,08 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 12 0,48 | 1001 40,4 | |
| 84 3,6 | 37 1,6 | 13 0,56 | 14 0,61 | — | 12 0,52 | 19 0,82 | 5 0,22 | 24 1,0 | — | 22 0,95 | 275 11,9 | 252 10,9 | 117 5,1 | 254 11,0 | 52 2,3 | 34 1,6 | 85 3,7 | 2 0,09 | 3 0,13 | 57 2,5 | 5 0,22 | 2 0,09 | 2 0,09 | 2 0,09 | 2 0,09 | 3 0,13 | 957 41,5 | |
| 145 5,4 | 50 1,9 | 45 1,7 | 16 0,60 | 2 0,07 | 13 0,48 | 26 0,97 | 13 0,48 | 25 0,93 | — | 12 0,45 | 266 9,9 | 231 8,6 | 138 5,1 | 199 7,4 | 75 2,8 | 14 0,52 | 45 1,7 | 2 0,07 | — | 40 1,5 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 21 0,78 | 1062 39,6 | |
| 117 4,4 | 32 1,2 | 40 1,5 | 22 0,83 | 1 0,04 | 1 0,04 | 38 1,4 | 7 0,26 | 31 1,2 | 1 0,04 | 15 0,56 | 263 9,9 | 236 8,9 | 103 3,9 | 259 9,7 | 82 3,1 | 21 0,79 | 67 2,5 | 6 0,23 | — | 64 2,4 | 5 0,19 | — | — | — | — | 15 0,56 | 1050 39,4 | |
| 136 5,0 | 57 2,1 | 32 1,2 | 18 0,66 | — | 9 0,33 | 43 1,6 | 8 0,29 | 25 0,92 | — | 21 0,77 | 305 11,2 | 268 9,9 | 154 5,7 | 285 10,5 | 62 2,3 | 15 0,55 | 87 3,2 | — | 1 0,04 | 81 3,0 | — | 2 0,07 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 19 0,70 | 1227 45,2 | |
| 253 8,8 | 137 4,7 | 37 1,3 | 37 1,3 | 3 0,10 | 10 0,35 | 39 1,4 | 3 0,10 | 36 1,2 | — | 26 0,90 | 350 12,1 | 308 10,7 | 118 4,1 | 340 11,8 | 100 3,5 | 16 0,55 | 104 3,6 | 2 0,07 | 2 0,07 | 79 2,7 | 1 0,03 | — | — | — | — | 17 0,59 | 1469 50,9 | |
| 124 4,8 | 70 2,7 | 25 0,97 | 4 0,16 | — | 10 0,39 | 25 0,97 | 4 0,16 | 28 1,1 | — | 15 0,58 | 195 7,6 | 168 6,5 | 114 4,4 | 180 7,0 | 45 1,8 | 21 0,82 | 54 2,1 | 1 0,04 | — | 40 1,6 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 4 0,16 | 885 34,5 | |
| 103 4,4 | 59 2,5 | 16 0,68 | 7 0,30 | — | 10 0,43 | 28 1,2 | 8 0,34 | 17 0,73 | — | 13 0,56 | 227 9,7 | 204 8,7 | 90 3,8 | 201 8,6 | 57 2,4 | 13 0,56 | 53 2,3 | 3 0,13 | 5 0,21 | 54 2,3 | — | 3 0,13 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 9 0,38 | 888 38,0 | |
| 144 6,5 | 59 2,6 | 36 1,6 | 28 1,3 | — | 8 0,36 | 22 0,99 | 4 0,18 | 27 1,2 | — | 15 0,67 | 255 11,5 | 228 10,2 | 126 5,7 | 260 11,7 | 77 3,5 | 20 0,90 | 77 3,5 | 2 0,09 | 1 0,05 | 55 2,5 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 1 0,05 | 1 0,05 | 8 0,36 | 1061 47,7 | |
| 89 4,4 | 52 2,6 | 9 0,44 | 14 0,69 | — | 7 0,35 | 36 1,8 | 8 0,40 | 10 0,49 | — | 12 0,59 | 105 5,2 | 95 4,7 | 74 3,7 | 111 5,5 | 29 1,4 | 15 0,74 | 23 1,1 | — | — | 31 1,5 | — | — | — | — | — | 9 0,44 | 602 29,8 | |
| 252 10,3 | 125 5,1 | 28 1,1 | 38 1,6 | 1 0,04 | 9 0,37 | 9 0,37 | — | 27 1,1 | — | 22 0,90 | 316 12,9 | 297 12,1 | 155 6,3 | 327 13,4 | 91 3,7 | 12 0,49 | 103 4,2 | 2 0,08 | 1 0,04 | 62 2,5 | 16 0,65 | 1 0,04 | — | — | — | 7 0,29 | 1453 59,3 | |
| 295 8,8 | 169 5,1 | 46 1,4 | 28 0,84 | 6 0,18 | 9 0,74 | 24 0,72 | 6 0,18 | 41 1,2 | — | 26 0,78 | 337 10,1 | 299 9,0 | 164 4,9 | 290 8,7 | 82 2,5 | 18 0,54 | 83 2,5 | 3 0,09 | 1 0,03 | 76 2,3 | 1 0,03 | — | — | — | — | 20 0,60 | 1529 45,3 | |
| 188 5,7 | 96 2,9 | 31 0,95 | 29 0,89 | — | 11 0,34 | 41 1,3 | 4 0,12 | 40 1,2 | 1 0,03 | 12 0,37 | 351 10,8 | 315 9,7 | 169 5,2 | 269 8,3 | 85 2,6 | 17 0,52 | 83 2,5 | — | 1 0,03 | 66 2,0 | 3 0,09 | — | — | — | — | 9 0,28 | 1382 42,4 | |
| 178 6,4 | 67 2,4 | 47 1,7 | 38 1,4 | 3 0,11 | 10 0,36 | 27 0,97 | 8 0,29 | 45 1,6 | 1 0,04 | 35 1,3 | 459 16,6 | 413 14,9 | 174 6,3 | 331 11,9 | 93 3,4 | 23 0,83 | 80 2,9 | 1 0,04 | 1 0,04 | 89 3,2 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 5 0,18 | 1545 55,7 | |
| 125 4,1 | 50 1,7 | 33 1,1 | 20 0,66 | — | 7 0,23 | 45 1,5 | 5 0,17 | 38 1,3 | 6 0,20 | 17 0,56 | 298 9,9 | 265 8,8 | 168 5,6 | 274 9,1 | 75 2,5 | 18 0,60 | 80 2,7 | 2 0,07 | 4 0,13 | 67 2,2 | 2 0,07 | 1 0,03 | 1 0,03 | 1 0,03 | 1 0,03 | 12 0,40 | 1164 38,6 | |
| 167 6,0 | 84 3,0 | 37 1,3 | 25 0,91 | 1 0,04 | 9 0,33 | 21 0,76 | 4 0,14 | 35 1,3 | — | 28 1,0 | 334 12,1 | 294 10,6 | 101 3,7 | 247 8,9 | 79 2,9 | 24 0,87 | 55 2,0 | 3 0,11 | — | 61 2,2 | — | — | — | — | — | 7 0,25 | 1156 41,9 | |
| 119 5,6 | 56 2,6 | 18 0,81 | 18 0,84 | — | 1 0,05 | 27 1,3 | 11 0,51 | 20 0,94 | — | 11 0,51 | 215 10,1 | 191 8,9 | 135 6,3 | 194 9,1 | 45 2,1 | 9 0,42 | 48 2,2 | 4 0,19 | — | 39 1,8 | — | — | — | — | — | 3 0,14 | 869 40,6 | |
| 3428 6,2 | 1583 2,9 | 672 1,2 | 495 0,90 | 24 0,04 | 181 0,33 | 611 1,1 | 129 0,23 | 652 1,2 | 13 0,02 | 414 0,75 | 6111 11,1 | 5482 10,0 | 2970 5,4 | 5573 10,1 | 1628 3,0 | 403 0,73 | 1506 2,7 | 38 0,07 | 26 0,05 | 1304 2,4 | 48 0,09 | 17 0,03 | 11 0,02 | 11 0,02 | 11 0,02 | 218 0,40 | 24864 45,3 | |

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krank- ungen | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. | Gruppe III. | | | Gruppe IV. | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|--|--------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|------------|-----------|--|------------------------------|---|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------|--|-------|----|------------|--|--------------------------|
| | | | | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Akuter Gelenkrheumatismus | 3. Chronischer Gelenkrheumatismus | 4. Hitzschlag | Krank- heiten des Nerven- systems | | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe | davon Herzkrankheiten |
| | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Katarhe der Schleim- häute der Luftwege | 2. Akute Lungenentzündung | 3. Brustfellentzündung und Ausgänge ausschl. No. 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | überhaupt | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | 18— 21 | 22 | 25 | | | | 27 | | | | | | | 28 | 38 | 41—52 | | |
| 1—40 | 1—26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18— 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 38 | 41—52 | 53— 57 | 58 | 60 | 64—79 | 64— 68 | | | | | | | | | | | | |
| Gardekorps | Juni . . . | 41747 0/0 | 101 2,4 | 51 1,2 | — | 7 0,17 | 2 0,05 | 2 0,05 | 3 0,07 | 5 0,12 | — | 2 0,05 | 1 0,02 | 12 0,29 | — | — | 35 0,84 | 3 0,07 | 1 0,02 | 18 0,43 | 214 5,1 | 170 4,1 | 14 0,34 | 29 0,69 | 44 1,1 | 6 0,14 | | | | | | | | |
| I. Armeekorps | Juni . . . | 32507 0/0 | 58 1,8 | 27 0,83 | — | 1 0,03 | — | 2 0,06 | — | 2 0,06 | — | 8 0,25 | 1 0,03 | 6 0,18 | — | — | 27 0,83 | 1 0,03 | — | 16 0,49 | 154 4,7 | 129 4,0 | 13 0,40 | 9 0,28 | 23 0,71 | 3 0,09 | | | | | | | | |
| II. Armeekorps | Juni . . . | 25952 0/0 | 44 1,7 | 27 1,0 | — | — | 2 0,08 | 4 0,15 | — | 1 0,04 | — | 1 0,04 | — | 2 0,08 | 1 0,04 | — | 10 0,39 | 4 0,15 | 1 0,04 | 15 0,58 | 116 4,5 | 91 3,5 | 16 0,62 | 8 0,31 | 30 1,2 | 3 0,12 | | | | | | | | |
| III. Armeekorps | Juni . . . | 24248 0/0 | 42 1,7 | 18 0,74 | — | — | 2 0,08 | 2 0,08 | — | 2 0,08 | — | — | 1 0,04 | 8 0,33 | — | — | 20 0,82 | 1 0,04 | — | 14 0,58 | 86 3,5 | 69 2,8 | 10 0,41 | 7 0,29 | 13 0,54 | 2 0,08 | | | | | | | | |
| IV. Armeekorps | Juni . . . | 22934 0/0 | 21 0,92 | 9 0,39 | — | — | — | 1 0,04 | — | — | — | — | — | 3 0,13 | — | — | 9 0,39 | — | — | 7 0,31 | 57 2,5 | 41 1,8 | 7 0,31 | 7 0,31 | 26 1,1 | 1 0,04 | | | | | | | | |
| V. Armeekorps | Juni . . . | 26245 0/0 | 33 1,3 | 9 0,34 | — | 2 0,08 | — | 1 0,04 | — | 3 0,11 | — | — | — | 3 0,11 | — | — | 18 0,69 | 4 0,15 | — | 9 0,34 | 88 3,4 | 71 2,7 | 7 0,27 | 9 0,31 | 16 0,61 | 4 0,15 | | | | | | | | |
| VI. Armeekorps | Juni . . . | 26094 0/0 | 22 0,84 | 7 0,27 | — | — | — | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | — | — | 5 0,19 | — | — | 12 0,46 | — | — | 11 0,42 | 70 2,7 | 59 2,3 | 6 0,23 | 4 0,15 | 14 0,54 | 5 0,19 | | | | | | | | |
| VII. Armeekorps | Juni . . . | 26972 0/0 | 36 1,3 | 12 0,44 | — | — | 1 0,04 | — | — | 4 0,15 | — | 1 0,01 | — | 4 0,15 | — | — | 18 0,67 | 2 0,07 | — | 11 0,41 | 102 3,8 | 87 3,2 | 4 0,15 | 7 0,26 | 27 1,0 | 1 0,04 | | | | | | | | |
| VIII. Armeekorps | Juni . . . | 26600 0/0 | 38 1,4 | 19 0,71 | — | 1 0,04 | 2 0,08 | — | — | 1 0,04 | — | 2 0,08 | 2 0,08 | 5 0,19 | — | — | 14 0,53 | — | — | 16 0,60 | 120 4,5 | 100 3,8 | 11 0,41 | 9 0,34 | 38 1,4 | 5 0,19 | | | | | | | | |
| IX. Armeekorps | Juni . . . | 26460 0/0 | 32 1,2 | 17 0,64 | — | 1 0,04 | 5 0,19 | 2 0,08 | — | 1 0,04 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 5 0,19 | — | — | 11 0,42 | 1 0,04 | — | 6 0,23 | 83 3,1 | 58 2,2 | 11 0,42 | 14 0,53 | 16 0,60 | 4 0,15 | | | | | | | | |
| X. Armeekorps | Juni . . . | 23097 0/0 | 31 1,3 | 14 0,61 | — | — | 3 0,13 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 1 0,04 | — | 5 0,22 | — | — | 14 0,61 | — | — | 4 0,17 | 71 3,1 | 50 2,2 | 10 0,43 | 11 0,48 | 27 1,2 | 3 0,13 | | | | | | | | |
| XI. Armeekorps | Juni . . . | 21041 0/0 | 44 2,1 | 22 1,0 | — | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 2 0,10 | 3 0,14 | — | 2 0,10 | — | 6 0,29 | — | — | 19 0,90 | — | — | 10 0,48 | 86 4,1 | 75 3,6 | 5 0,24 | 6 0,29 | 32 1,5 | 5 0,24 | | | | | | | | |
| XII. (I. K. S.) Armeekorps | Juni . . . | 20359 0/0 | 34 1,7 | 11 0,54 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 3 0,15 | 1 0,05 | — | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 1 0,05 | — | — | 21 1,0 | 1 0,05 | — | 8 0,39 | 57 2,8 | 41 2,0 | 8 0,39 | 8 0,39 | 16 0,79 | 3 0,15 | | | | | | | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | Juni . . . | 22376 0/0 | 52 2,3 | 31 1,4 | — | — | 3 0,13 | 2 0,09 | — | 6 0,27 | — | — | — | 5 0,22 | 1 0,04 | — | 17 0,76 | — | 1 0,04 | 13 0,58 | 98 4,4 | 87 3,9 | 5 0,22 | 6 0,27 | 15 0,67 | 1 0,04 | | | | | | | | |
| XIV. Armeekorps | Juni . . . | 31882 0/0 | 57 1,8 | 29 0,91 | — | 2 0,06 | 1 0,03 | 1 0,03 | — | 3 0,09 | — | 13 0,41 | 1 0,03 | 7 0,22 | — | — | 24 0,75 | 4 0,13 | — | 11 0,35 | 116 3,6 | 103 3,2 | 4 0,13 | 9 0,28 | 20 0,63 | 1 0,03 | | | | | | | | |
| XV. Armeekorps | Juni . . . | 31641 0/0 | 42 1,3 | 22 0,70 | — | 2 0,06 | — | — | — | 1 0,03 | — | 2 0,06 | 3 0,09 | 7 0,22 | — | — | 14 0,44 | — | — | 16 0,51 | 153 4,8 | 140 4,4 | 7 0,22 | 5 0,16 | 34 1,1 | 6 0,19 | | | | | | | | |
| XVI. Armeekorps | Juni . . . | 27563 0/0 | 43 1,6 | 26 0,94 | — | 1 0,04 | 3 0,11 | 1 0,04 | — | 1 0,04 | — | — | — | 2 0,07 | — | — | 10 0,36 | 1 0,04 | — | 14 0,51 | 162 5,9 | 145 5,3 | 7 0,25 | 9 0,33 | 40 1,5 | 4 0,15 | | | | | | | | |
| XVII. Armeekorps | Juni . . . | 30471 0/0 | 48 1,6 | 22 0,72 | — | 1 0,03 | 2 0,07 | 1 0,03 | 1 0,03 | 3 0,10 | — | 2 0,07 | 1 0,03 | 7 0,23 | — | — | 21 0,69 | 2 0,07 | — | 11 0,36 | 131 4,3 | 96 3,1 | 18 0,59 | 17 0,56 | 27 0,89 | 4 0,13 | | | | | | | | |
| XVIII. Armeekorps | Juni . . . | 26825 0/0 | 38 1,4 | 21 0,78 | — | 3 0,11 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 4 0,15 | — | — | — | 5 0,19 | — | 1 0,04 | 12 0,45 | — | — | 14 0,52 | 89 3,3 | 79 2,9 | 5 0,19 | 5 0,19 | 27 1,0 | 6 0,22 | | | | | | | | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Juni . . . | 21186 0/0 | 36 1,7 | 14 0,66 | — | — | 3 0,14 | 1 0,05 | — | 1 0,05 | — | 1 0,05 | — | 4 0,19 | — | — | 18 0,85 | 1 0,05 | 1 0,05 | 8 0,38 | 61 2,9 | 48 2,3 | 11 0,52 | 2 0,09 | 11 0,52 | 4 0,19 | | | | | | | | |
| Armee | Juni . . . | 536170 0/0 | 852 1,6 | 408 0,76 | — | 22 0,04 | 31 0,06 | 25 0,05 | 10 0,02 | 43 0,08 | — | 37 0,07 | 12 0,02 | 102 0,19 | 2 | 1 | 344 0,64 | 25 0,05 | 4 0,01 | 232 0,43 | 2114 3,9 | 1739 3,2 | 179 0,33 | 181 0,34 | 496 0,93 | 71 0,13 | | | | | | | | |

| Krankheiten der Ernährungsorgane | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane aussch. der venereischen | Gruppe VII. Venereische Krankheiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohrenkrankheiten | Gruppe X. | | Gruppe XI. Krankheiten der Bewegungsorgane | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krankheiten | Gruppe XIV. Zur Beobachtung | Summe des Zugangs | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | Krankheiten der äußeren Bedeckungen | Krankheiten der Zellgewebsentzündung | | Mechanische Verletzungen | davon | | | | | | | | | | | |
| | 1. Mandelenzündung | 2. Akuter Magenkatarrh | 3. Akuter Darmkatarrh | 4. Katarthalische Gelbsucht | | | | | | | | | | Konstitutionelle Syphilis | Augenkrankheiten | 1. Quetschungen, Zerreißen | 2. Knochenbrüche | 3. Verstauchungen | 4. Verrenkungen | | | | 5. Schulswunden | 6. Hieb-, Schnitt-, Stich-, Riß-, Quetsch- und Bisswunden | 7. Andere Wunden und Verletzungen |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 118-122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-198 |
| 335 8,0 | 155 3,7 | 63 1,5 | 45 1,1 | 2 0,05 | 14 0,34 | 90 2,2 | 13 0,31 | 55 1,3 | — | 39 0,93 | 548 13,1 | 500 12,0 | 279 6,7 | 567 13,6 | 189 4,5 | 44 1,1 | 112 2,7 | 8 0,19 | 2 0,05 | 149 3,6 | 7 0,17 | 1 0,02 | — | 10 0,24 | 2315 55,5 |
| 167 5,1 | 62 1,5 | 34 1,0 | 34 1,0 | 1 0,03 | 11 0,34 | 57 1,8 | 18 0,55 | 59 1,8 | 4 0,12 | 47 1,4 | 404 12,4 | 359 11,0 | 217 6,7 | 416 12,8 | 124 3,8 | 16 0,49 | 96 3,0 | 1 0,03 | 1 0,03 | 96 3,0 | 4 0,12 | 1 0,03 | 1 0,03 | 11 0,34 | 1641 50,5 |
| 131 5,0 | 43 1,7 | 34 1,3 | 13 0,50 | 5 0,19 | 16 0,62 | 41 1,6 | 10 0,39 | 39 1,5 | 2 0,08 | 22 0,85 | 375 14,4 | 339 13,1 | 206 7,9 | 400 15,4 | 140 5,4 | 9 0,35 | 94 3,6 | 5 0,19 | — | 97 3,7 | 4 0,15 | 2 0,08 | — | 20 0,77 | 1457 56,1 |
| 94 3,9 | 41 1,7 | 27 1,1 | 10 0,41 | — | 6 0,25 | 44 1,8 | 8 0,33 | 21 0,87 | 1 0,04 | 25 1,0 | 181 7,5 | 165 6,8 | 153 6,3 | 224 9,9 | 67 2,8 | 15 0,62 | 61 2,5 | 2 0,08 | 2 0,08 | 51 2,1 | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 10 0,41 | 914 37,7 |
| 99 4,3 | 33 1,4 | 21 0,92 | 29 1,3 | — | 7 0,31 | 20 0,87 | 2 0,09 | 31 1,4 | — | 17 0,74 | 256 11,2 | 230 10,0 | 148 6,5 | 257 11,2 | 65 2,8 | 27 1,2 | 93 4,1 | 1 0,04 | 2 0,09 | 51 2,2 | 1 0,04 | — | — | 4 0,17 | 950 41,4 |
| 124 4,7 | 48 1,8 | 25 0,95 | 22 0,84 | 2 0,08 | 8 0,30 | 29 1,1 | 6 0,23 | 35 1,3 | — | 20 0,76 | 217 8,3 | 192 7,3 | 140 5,3 | 216 8,3 | 80 3,0 | 14 0,53 | 36 1,4 | 3 0,11 | 4 0,15 | 55 2,1 | — | 1 0,04 | — | 17 0,65 | 953 36,3 |
| 101 3,9 | 25 0,96 | 27 1,0 | 15 0,57 | 2 0,08 | 8 0,31 | 50 1,9 | 8 0,31 | 27 1,0 | 1 0,04 | 16 0,61 | 249 9,5 | 225 8,6 | 101 3,9 | 208 8,0 | 70 2,7 | 16 0,61 | 47 1,8 | 4 0,15 | 1 0,04 | 55 2,1 | 2 0,08 | — | — | 16 0,61 | 893 34,2 |
| 146 5,4 | 62 2,3 | 41 1,5 | 13 0,48 | — | 9 0,33 | 43 1,6 | 15 0,56 | 26 0,96 | — | 25 0,93 | 308 11,4 | 267 9,9 | 161 6,0 | 277 10,3 | 69 2,6 | 22 0,82 | 71 2,6 | 3 0,11 | 1 0,04 | 76 2,8 | — | 2 0,07 | 2 0,07 | 19 0,70 | 1192 44,2 |
| 172 6,5 | 71 2,7 | 29 1,1 | 26 0,98 | 1 0,04 | 5 0,19 | 37 1,4 | 11 0,41 | 26 0,98 | — | 24 0,90 | 288 10,8 | 252 9,5 | 102 3,8 | 330 12,4 | 95 3,6 | 14 0,53 | 97 3,6 | 2 0,08 | 4 0,15 | 78 2,9 | 2 0,08 | — | — | 11 0,41 | 1207 45,4 |
| 127 4,8 | 69 2,6 | 25 0,94 | 3 0,11 | 1 0,04 | 10 0,38 | 56 2,1 | 13 0,49 | 37 1,4 | — | 20 0,76 | 205 7,7 | 185 7,0 | 134 5,1 | 204 7,7 | 54 2,0 | 20 0,76 | 48 1,8 | 3 0,11 | 1 0,04 | 53 2,0 | 3 0,11 | — | — | 7 0,26 | 937 35,4 |
| 110 4,8 | 47 2,0 | 27 1,2 | 7 0,30 | 2 0,09 | 7 0,20 | 23 0,99 | 9 0,39 | 24 1,0 | 1 0,04 | 25 1,1 | 207 9,0 | 182 7,9 | 96 4,2 | 162 7,0 | 51 2,2 | 18 0,78 | 33 1,4 | 2 0,09 | — | 46 1,9 | 3 0,13 | 1 0,04 | 1 0,04 | 11 0,48 | 799 34,6 |
| 119 5,7 | 48 2,3 | 26 1,2 | 19 0,90 | 2 0,10 | 7 0,33 | 23 1,1 | 6 0,29 | 26 1,2 | 2 0,10 | 20 0,95 | 235 11,2 | 205 9,7 | 152 7,2 | 270 12,8 | 66 3,1 | 22 1,0 | 75 3,6 | 4 0,19 | — | 61 2,9 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 9 0,43 | 1034 49,1 |
| 71 3,5 | 32 1,6 | 7 0,34 | 12 0,59 | — | 9 0,44 | 50 2,5 | 6 0,29 | 8 0,39 | — | 8 0,39 | 127 6,2 | 112 5,5 | 101 5,0 | 117 5,7 | 25 1,2 | 9 0,44 | 26 1,3 | 1 0,05 | 1 0,05 | 40 2,0 | 1 0,05 | — | — | 6 0,29 | 612 30,1 |
| 151 6,7 | 63 2,8 | 27 1,2 | 28 1,3 | 3 0,13 | 6 0,27 | 8 0,36 | 2 0,09 | 38 1,7 | — | 19 0,85 | 218 9,7 | 207 9,3 | 149 6,7 | 264 11,8 | 68 3,0 | 14 0,63 | 93 4,2 | 2 0,09 | 2 0,09 | 59 2,6 | 16 0,72 | 2 0,09 | 1 0,04 | 12 0,54 | 1045 46,7 |
| 186 5,8 | 81 2,5 | 46 1,4 | 18 0,57 | 3 0,09 | 9 0,28 | 33 1,0 | 9 0,28 | 31 0,97 | — | 25 0,78 | 294 9,2 | 267 8,4 | 132 4,1 | 339 10,6 | 105 3,3 | 18 0,57 | 106 3,3 | 2 0,06 | — | 84 2,6 | 1 0,03 | 1 0,03 | 1 0,03 | 17 0,53 | 1271 39,9 |
| 202 6,4 | 80 2,5 | 49 1,5 | 26 0,82 | 5 0,16 | 16 0,51 | 52 1,6 | 6 0,19 | 37 1,2 | — | 24 0,76 | 343 10,8 | 295 9,3 | 153 4,8 | 422 13,3 | 138 4,4 | 17 0,54 | 125 4,0 | 7 0,22 | 4 0,13 | 99 3,1 | 8 0,25 | — | — | 13 0,41 | 1507 47,6 |
| 177 6,4 | 75 2,7 | 42 1,5 | 27 0,98 | 1 0,04 | 7 0,25 | 23 0,83 | 6 0,22 | 45 1,6 | 2 0,07 | 38 1,4 | 390 14,1 | 345 12,5 | 124 4,5 | 304 11,0 | 89 3,2 | 15 0,54 | 75 2,7 | 1 0,04 | 1 0,04 | 107 3,9 | — | — | — | 10 0,36 | 1377 50,0 |
| 132 4,3 | 41 1,3 | 42 1,4 | 24 0,79 | 2 0,07 | 9 0,30 | 42 1,4 | 9 0,30 | 41 1,3 | 2 0,07 | 29 0,95 | 294 9,6 | 261 8,6 | 145 4,8 | 298 9,8 | 104 3,4 | 20 0,66 | 66 2,2 | 4 0,13 | 1 0,09 | 67 2,2 | — | — | — | 16 0,53 | 1223 40,1 |
| 170 6,3 | 71 2,6 | 34 1,3 | 23 0,86 | — | 8 0,30 | 34 1,3 | 7 0,26 | 41 1,5 | — | 27 1,0 | 281 10,5 | 249 9,3 | 106 4,0 | 292 10,9 | 79 2,9 | 32 1,2 | 75 2,8 | 5 0,19 | — | 72 2,7 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 19 0,71 | 1147 42,8 |
| 104 4,9 | 31 1,5 | 15 0,71 | 29 1,4 | 2 0,09 | 7 0,33 | 48 2,3 | 14 0,66 | 19 0,90 | 1 0,05 | 22 1,0 | 172 8,1 | 149 7,0 | 135 6,4 | 177 8,4 | 38 1,8 | 6 0,28 | 42 2,0 | 3 0,14 | 1 0,05 | 46 2,2 | — | 1 0,05 | — | 5 0,24 | 806 38,0 |
| 2918 5,4 | 1178 2,2 | 641 1,2 | 423 0,79 | 34 0,06 | 179 0,33 | 803 1,5 | 178 0,33 | 666 1,2 | 16 0,03 | 492 0,92 | 5592 10,4 | 4986 9,3 | 2934 5,5 | 5744 10,7 | 1716 3,2 | 368 0,69 | 1471 2,7 | 63 0,12 | 28 0,05 | 1442 2,7 | 53 0,10 | 15 0,03 | 8 0,01 | 243 0,45 | 23280 43,4 |

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. | Gruppe III. | | | Gruppe IV. | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------|---|--------------------------|-------|-----------------------------------|------------|-----------------|---|--------------------|------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|-------|-------------|------------|---|--|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------|-------------|
| | | | Infektions- krank- heiten und allge- meine Er- krank- ungen | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | Krank- heiten des Nerven- systems | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe | davon Herzkrankheiten | |
| | | | | überhaupt | davon | | | | | | | | | | 2. | 3. | 4. | | | | 1. | 2. | 3. | | | |
| | | | | | 1-40 | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrenschel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | | | | | | | | | | | | Tuberkulose |
| 1-26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18- 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 38 | 41-52 | 53-63 | 53- 57 | 58 | 60 | 64-79 | 64- 68 | | | | |
| Gardekorps | Juli . . . | 42923 0% | 91 2,1 | 47 1,1 | — | 1 0,02 | — | 2 0,05 | 2 0,05 | 3 0,07 | — | 3 0,07 | — | 14 0,33 | — | — | 35 0,82 | 2 0,5 | — | 28 0,65 | 221 5,1 | 197 4,6 | 5 0,12 | 17 0,40 | 67 1,6 | 9 0,21 |
| I. Armee- korps | Juli . . . | 31844 0% | 41 1,3 | 20 0,63 | — | — | 2 0,06 | 2 0,06 | 1 0,03 | 3 0,09 | — | 8 0,25 | — | 2 0,06 | — | — | 17 0,53 | 1 0,03 | — | 11 0,35 | 191 6,0 | 159 5,0 | 13 0,41 | 16 0,50 | 30 0,94 | 1 0,03 |
| II. Armee- korps | Juli . . . | 27486 0% | 36 1,3 | 25 0,91 | — | — | 1 0,04 | 2 0,07 | — | 2 0,07 | — | 1 0,04 | — | 7 0,25 | — | — | 9 0,33 | 1 0,04 | — | 18 0,65 | 151 5,5 | 131 4,8 | 13 0,47 | 7 0,25 | 41 1,5 | 6 0,22 |
| III. Armee- korps | Juli . . . | 24055 0% | 27 1,1 | 11 0,46 | — | — | — | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 2 0,08 | — | 5 0,21 | — | — | 14 0,58 | — | 1 0,04 | 6 0,25 | 97 4,0 | 78 3,2 | 11 0,46 | 7 0,29 | 26 1,1 | 4 0,11 |
| IV. Armee- korps | Juli . . . | 24972 0% | 23 0,92 | 8 0,32 | — | — | — | 1 0,04 | — | 1 0,04 | — | 2 0,08 | — | 2 0,08 | — | — | 13 0,52 | — | — | 10 0,40 | 101 4,0 | 88 3,5 | 6 0,24 | 6 0,24 | 25 1,0 | 3 0,12 |
| V. Armee- korps | Juli . . . | 26869 0% | 18 0,67 | 5 0,19 | — | — | — | — | — | 1 0,04 | — | — | — | 1 0,04 | — | — | 8 0,30 | 1 0,04 | — | 13 0,48 | 75 2,8 | 67 2,5 | 1 0,01 | 6 0,22 | 16 0,60 | 3 0,11 |
| VI. Armee- korps | Juli . . . | 28322 0% | 32 1,1 | 10 0,35 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | — | — | — | 2 0,07 | — | 5 0,18 | — | — | 16 0,56 | 1 0,04 | — | 13 0,46 | 135 4,8 | 120 4,2 | 10 0,35 | 3 0,11 | 35 1,2 | 9 0,32 |
| VII. Armee- korps | Juli . . . | 28912 0% | 40 1,4 | 17 0,59 | — | — | — | — | — | 2 0,07 | — | 3 0,10 | — | 7 0,24 | — | — | 18 0,62 | 2 0,07 | — | 9 0,31 | 131 4,5 | 114 3,9 | 4 0,14 | 13 0,45 | 31 1,1 | 6 0,21 |
| VIII. Armee- korps | Juli . . . | 26559 0% | 43 1,6 | 12 0,45 | — | — | — | — | — | 1 0,04 | — | 2 0,08 | 1 0,04 | 3 0,11 | — | — | 19 0,72 | — | 1 0,04 | 15 0,56 | 148 5,6 | 128 4,8 | 9 0,34 | 8 0,31 | 46 1,7 | 5 0,19 |
| IX. Armee- korps | Juli . . . | 26200 0% | 48 1,8 | 25 0,95 | — | — | 4 0,15 | 2 0,08 | 1 0,04 | — | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 5 0,19 | — | — | 20 0,76 | — | — | 15 0,57 | 105 4,0 | 91 3,5 | 5 0,19 | 9 0,34 | 22 0,84 | 3 0,11 |
| X. Armee- korps | Juli . . . | 22791 0% | 39 1,7 | 25 1,1 | — | — | 2 0,09 | 1 0,04 | 1 0,04 | 5 0,22 | — | 5 0,22 | 1 0,04 | 6 0,36 | — | — | 5 0,22 | 1 0,04 | — | 6 0,26 | 114 5,0 | 90 3,9 | 11 0,48 | 12 0,53 | 28 1,2 | 6 0,26 |
| XI. Armee- korps | Juli . . . | 22507 0% | 41 1,8 | 19 0,84 | — | — | 1 0,04 | — | — | — | — | 1 0,04 | — | 5 0,22 | 2 0,09 | — | 19 0,34 | — | — | 18 0,80 | 108 4,8 | 90 4,0 | 7 0,31 | 11 0,49 | 45 2,0 | 9 0,40 |
| XII. (I. K. S.) Armeekorps | Juli . . . | 21352 0% | 32 1,5 | 12 0,56 | — | — | — | — | 2 0,09 | — | — | — | — | 6 0,28 | 1 0,05 | — | 13 0,61 | 1 0,05 | 1 0,05 | 16 0,75 | 64 3,0 | 44 2,1 | 12 0,56 | 7 0,33 | 20 0,94 | 6 0,28 |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | Juli . . . | 22879 0% | 69 3,0 | 49 2,1 | — | 1 0,04 | — | 2 0,09 | — | 4 0,17 | — | 15 0,66 | — | 7 0,31 | 1 0,04 | — | 17 0,74 | — | 2 0,09 | 13 0,57 | 95 4,2 | 81 3,5 | 5 0,22 | 6 0,26 | 22 0,96 | 2 0,09 |
| XIV. Armee- korps | Juli . . . | 32370 0% | 54 1,7 | 23 0,71 | — | — | 2 0,06 | 1 0,03 | 2 0,06 | 1 0,03 | — | 9 0,28 | — | 4 0,12 | — | — | 24 0,74 | 2 0,06 | 1 0,03 | 10 0,31 | 140 4,3 | 125 3,9 | 2 0,06 | 11 0,31 | 37 1,1 | 8 0,25 |
| XV. Armee- korps | Juli . . . | 32373 0% | 47 1,5 | 24 0,74 | — | 1 0,03 | 2 0,06 | — | 2 0,06 | — | — | 10 0,31 | 3 0,09 | 2 0,06 | — | — | 16 0,49 | — | 2 0,06 | 14 0,43 | 147 4,5 | 126 3,9 | 17 0,53 | 2 0,06 | 26 0,80 | 3 0,09 |
| XVI. Armee- korps | Juli . . . | 29274 0% | 47 1,6 | 27 0,92 | — | — | — | 1 0,03 | — | 2 0,07 | — | 3 0,10 | — | 3 0,10 | — | — | 11 0,38 | 1 0,03 | — | 13 0,44 | 174 5,9 | 160 5,5 | 5 0,17 | 7 0,24 | 33 1,1 | 6 0,20 |
| XVII. Armee- korps | Juli . . . | 30734 0% | 36 1,1 | 18 0,59 | — | 1 0,03 | 2 0,07 | — | — | 2 0,07 | — | 6 0,20 | — | 5 0,16 | — | — | 14 0,46 | 3 0,10 | — | 12 0,39 | 162 5,3 | 131 4,3 | 11 0,36 | 15 0,49 | 28 0,91 | 6 0,20 |
| XVIII. Armeekorps | Juli . . . | 27893 0% | 52 1,9 | 11 0,39 | — | — | — | — | — | 2 0,07 | — | — | — | 3 0,11 | — | — | 31 1,1 | — | 4 0,14 | 12 0,43 | 121 4,3 | 102 3,7 | 5 0,18 | 12 0,43 | 44 1,6 | 11 0,39 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Juli . . . | 22205 0% | 34 1,5 | 15 0,68 | — | 1 0,05 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 3 0,14 | — | 3 0,14 | — | 2 0,09 | — | — | 15 0,68 | 1 0,05 | — | 9 0,41 | 67 3,0 | 56 2,5 | 4 0,18 | 7 0,32 | 16 0,72 | 1 0,05 |
| Armee | Juli . . . | 552520 0% | 850 1,5 | 403 0,73 | — | 6 0,01 | 17 0,03 | 15 0,03 | 13 0,2 | 33 0,06 | — | 76 0,14 | 7 0,01 | 95 0,17 | 4 0,01 | — | 334 0,60 | 17 0,03 | 12 0,02 | 261 0,47 | 2547 4,6 | 2178 3,9 | 156 0,28 | 182 0,33 | 638 1,2 | 107 0,19 |

| Krankheiten der Ernährungsorgane | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane auschl. der venereischen | Gruppe VII. Venereische Krankheiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohrenkrankheiten | Gruppe X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen | Gruppe XI. Krankheiten der Zellgewebsentzündung | Gruppe XII. Mechanische Verletzungen | Gruppe XIII. | | | | | | | Gruppe XIV. Zur Beobachtung | Summe des Zugangs | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|--------------|---------|--------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|-------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | | davon | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Mandelenzündung | 2. Akuter Magenkatarrh | 3. Akuter Darmkatarrh | 4. Katarrhische Gelbsucht | | | | | | | | | 1. Quetschungen, Zerreißungen | 2. Knochenbrüche | 3. Verstauchungen | 4. Verrenkungen | 5. Schufswunden | 6. Hieb-, Schmitt-, Stich-, Rife-, Quetsch- und Bisswunden | 7. Andere Wunden und Verletzungen | | | Andere Krankheiten | Selbstmordversuche | | |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 118-122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-168 |
| 408 | 186 | 83 | 71 | 3 | 22 | 94 | 25 | 59 | — | 59 | 612 | 556 | 341 | 624 | 211 | 64 | 123 | 4 | 4 | 156 | 5 | 1 | — | 17 | 2644 |
| 9,5 | 4,3 | 1,9 | 1,7 | 0,07 | 0,51 | 2,2 | 0,58 | 1,4 | — | 1,4 | 14,3 | 13,0 | 7,9 | 14,5 | 4,9 | 1,5 | 2,9 | 0,09 | 0,09 | 3,6 | 0,12 | 0,02 | — | 0,40 | 61,6 |
| 251 | 80 | 57 | 79 | 3 | 19 | 43 | 11 | 45 | 1 | 51 | 485 | 424 | 271 | 442 | 114 | 28 | 83 | 2 | 3 | 119 | 3 | — | — | 27 | 1907 |
| 7,9 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 0,09 | 0,60 | 1,4 | 0,35 | 1,4 | 0,03 | 1,6 | 15,2 | 13,3 | 8,5 | 13,9 | 3,6 | 0,38 | 2,6 | 0,06 | 0,09 | 3,7 | 0,09 | — | — | 0,85 | 59,9 |
| 242 | 60 | 78 | 71 | 3 | 16 | 46 | 17 | 32 | — | 33 | 394 | 359 | 237 | 446 | 149 | 14 | 98 | 3 | 3 | 93 | 10 | 1 | — | 12 | 1705 |
| 8,8 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 0,11 | 0,58 | 1,7 | 0,62 | 1,2 | — | 1,2 | 14,3 | 13,0 | 8,6 | 16,2 | 5,4 | 0,51 | 3,6 | 0,11 | 0,11 | 3,4 | 0,36 | 0,04 | — | 0,44 | 62,0 |
| 150 | 54 | 56 | 19 | 1 | 9 | 44 | 9 | 30 | — | 33 | 238 | 218 | 203 | 278 | 98 | 17 | 63 | 1 | 2 | 61 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1152 |
| 6,2 | 2,2 | 2,3 | 0,79 | 0,04 | 0,37 | 1,8 | 0,37 | 1,2 | — | 1,4 | 9,9 | 9,1 | 8,4 | 11,6 | 4,1 | 0,71 | 2,6 | 0,04 | 0,08 | 2,5 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,42 | 47,9 |
| 136 | 39 | 28 | 38 | 1 | 7 | 28 | 7 | 28 | — | 28 | 260 | 242 | 154 | 259 | 55 | 33 | 88 | 4 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1070 |
| 5,4 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 0,04 | 0,23 | 1,1 | 0,28 | 1,1 | — | 1,1 | 10,4 | 9,7 | 6,2 | 10,4 | 2,2 | 1,3 | 3,5 | 0,16 | 0,08 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 42,3 |
| 190 | 43 | 59 | 56 | 2 | 10 | 28 | 12 | 31 | — | 20 | 222 | 202 | 154 | 289 | 111 | 18 | 60 | 2 | 1 | 70 | 1 | 1 | — | 19 | 1086 |
| 7,1 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 0,07 | 0,37 | 1,0 | 0,45 | 1,2 | — | 0,74 | 8,3 | 7,5 | 5,7 | 10,8 | 4,1 | 0,67 | 2,2 | 0,07 | 0,04 | 2,6 | 0,04 | 0,04 | — | 0,71 | 40,4 |
| 162 | 24 | 58 | 45 | — | 9 | 54 | 14 | 42 | — | 27 | 257 | 231 | 138 | 350 | 138 | 14 | 86 | 5 | — | 72 | 8 | 3 | 3 | 21 | 1278 |
| 5,7 | 0,85 | 2,0 | 1,6 | — | 0,32 | 1,9 | 0,49 | 1,5 | — | 0,95 | 9,1 | 8,2 | 4,9 | 12,4 | 4,9 | 0,49 | 3,0 | 0,18 | — | 2,5 | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 0,74 | 45,1 |
| 236 | 85 | 82 | 31 | 4 | 15 | 46 | 14 | 41 | — | 22 | 350 | 313 | 174 | 437 | 116 | 39 | 111 | 4 | 2 | 98 | — | 2 | 2 | 29 | 1563 |
| 8,2 | 2,9 | 2,8 | 1,1 | 0,14 | 0,52 | 1,6 | 0,48 | 1,4 | — | 0,76 | 12,1 | 10,8 | 6,0 | 15,1 | 4,0 | 1,3 | 3,8 | 0,14 | 0,07 | 3,4 | — | 0,07 | 0,07 | 1,0 | 54,1 |
| 287 | 95 | 60 | 85 | 2 | 27 | 31 | 13 | 37 | — | 27 | 352 | 322 | 183 | 456 | 118 | 32 | 140 | 6 | 4 | 104 | 2 | 3 | — | 15 | 1670 |
| 10,8 | 3,6 | 2,3 | 3,2 | 0,08 | 1,0 | 1,2 | 0,49 | 1,4 | — | 1,0 | 13,3 | 12,1 | 6,9 | 17,2 | 4,4 | 1,2 | 5,3 | 0,23 | 0,15 | 3,9 | 0,08 | 0,11 | — | 0,56 | 62,9 |
| 157 | 83 | 34 | 20 | 1 | 12 | 46 | 9 | 21 | — | 22 | 256 | 226 | 221 | 299 | 67 | 41 | 73 | 5 | — | 61 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1232 |
| 6,0 | 3,2 | 1,3 | 0,76 | 0,04 | 0,46 | 1,8 | 0,34 | 0,80 | — | 0,84 | 9,8 | 8,6 | 8,4 | 11,4 | 2,6 | 1,6 | 2,8 | 0,19 | — | 2,3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | 47,0 |
| 126 | 45 | 36 | 21 | 1 | 11 | 45 | 13 | 31 | 1 | 22 | 210 | 190 | 94 | 218 | 75 | 25 | 46 | 3 | — | 51 | 2 | 1 | 1 | 19 | 964 |
| 5,5 | 1,9 | 1,6 | 0,92 | 0,04 | 0,48 | 2,0 | 0,57 | 1,4 | 0,04 | 0,37 | 9,2 | 8,3 | 4,1 | 9,6 | 3,3 | 1,1 | 2,0 | 0,13 | — | 2,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,83 | 42,3 |
| 185 | 48 | 56 | 40 | 2 | 11 | 36 | 11 | 25 | — | 33 | 328 | 303 | 208 | 318 | 89 | 14 | 106 | 5 | 3 | 53 | — | — | — | 26 | 1382 |
| 8,2 | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 0,09 | 0,49 | 1,6 | 0,49 | 1,1 | — | 1,5 | 14,6 | 13,5 | 9,2 | 14,1 | 4,0 | 0,62 | 4,7 | 0,22 | 0,13 | 2,4 | — | — | — | 1,2 | 61,4 |
| 104 | 39 | 10 | 38 | — | 10 | 56 | 15 | 12 | — | 11 | 118 | 110 | 127 | 145 | 26 | 21 | 40 | 1 | — | 33 | 2 | — | — | 9 | 724 |
| 4,9 | 1,8 | 0,47 | 1,8 | — | 0,47 | 2,6 | 0,70 | 0,56 | — | 0,52 | 5,5 | 5,2 | 5,9 | 6,8 | 1,2 | 0,98 | 1,9 | 0,05 | — | 1,5 | 0,09 | — | — | 0,42 | 33,9 |
| 226 | 58 | 34 | 84 | 1 | 2 | 19 | 3 | 37 | — | 20 | 245 | 224 | 190 | 428 | 107 | 12 | 152 | 5 | 2 | 94 | 24 | 2 | — | 11 | 1379 |
| 9,9 | 2,5 | 1,5 | 3,7 | 0,04 | 0,09 | 0,88 | 0,13 | 1,6 | — | 0,87 | 10,7 | 9,8 | 8,3 | 18,7 | 4,7 | 0,53 | 6,6 | 0,22 | 0,09 | 4,1 | 1,0 | 0,09 | — | 0,48 | 60,3 |
| 214 | 69 | 56 | 47 | 2 | 12 | 28 | 4 | 37 | — | 34 | 380 | 341 | 167 | 390 | 109 | 21 | 121 | 3 | 4 | 82 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1521 |
| 6,6 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 0,06 | 0,37 | 0,86 | 0,12 | 1,1 | — | 1,1 | 11,7 | 10,5 | 5,2 | 12,0 | 3,4 | 0,65 | 3,7 | 0,09 | 0,12 | 2,5 | 0,28 | 0,03 | 0,03 | 0,53 | 47,0 |
| 255 | 76 | 64 | 71 | 4 | 6 | 52 | 12 | 38 | — | 45 | 393 | 371 | 163 | 417 | 148 | 16 | 114 | 3 | 2 | 103 | 4 | — | — | 24 | 1627 |
| 7,9 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 0,12 | 0,19 | 1,6 | 0,37 | 1,2 | — | 1,4 | 12,1 | 11,5 | 5,0 | 12,9 | 4,5 | 0,49 | 3,5 | 0,09 | 0,06 | 3,2 | 0,12 | — | — | 0,74 | 50,3 |
| 274 | 69 | 93 | 68 | 3 | 12 | 28 | 8 | 33 | 2 | 52 | 378 | 345 | 161 | 364 | 107 | 20 | 90 | 2 | 1 | 122 | — | — | — | 12 | 1581 |
| 9,4 | 2,4 | 3,2 | 2,3 | 0,10 | 0,41 | 0,96 | 0,27 | 1,1 | 0,07 | 1,8 | 12,9 | 11,8 | 5,5 | 12,4 | 3,7 | 0,68 | 3,1 | 0,07 | 0,03 | 4,2 | — | — | — | 0,41 | 54,0 |
| 170 | 50 | 44 | 55 | 3 | 14 | 69 | 23 | 34 | 1 | 33 | 282 | 246 | 174 | 351 | 104 | 21 | 118 | 6 | 3 | 66 | 5 | 2 | 2 | 20 | 1387 |
| 5,6 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 0,10 | 0,46 | 2,2 | 0,75 | 1,1 | 0,03 | 1,1 | 9,2 | 8,0 | 5,7 | 11,4 | 3,4 | 0,68 | 3,8 | 0,20 | 0,10 | 2,2 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,65 | 45,1 |
| 214 | 72 | 65 | 41 | 1 | 10 | 25 | 4 | 32 | — | 41 | 306 | 270 | 152 | 348 | 105 | 39 | 90 | 5 | 2 | 77 | — | 1 | 1 | 21 | 1379 |
| 7,7 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 0,04 | 0,36 | 0,90 | 0,14 | 1,1 | — | 1,5 | 11,0 | 9,7 | 5,4 | 12,5 | 3,8 | 1,4 | 3,2 | 0,18 | 0,07 | 2,8 | — | 0,04 | 0,04 | 0,75 | 49,4 |
| 160 | 42 | 29 | 62 | — | 6 | 41 | 9 | 25 | — | 30 | 197 | 174 | 162 | 196 | 44 | 12 | 51 | 2 | 4 | 57 | — | — | — | 11 | 954 |
| 7,2 | 1,9 | 1,3 | 2,8 | — | 0,27 | 1,8 | 0,41 | 1,1 | — | 1,4 | 8,9 | 7,9 | 7,3 | 8,8 | 2,0 | 0,54 | 2,3 | 0,09 | 0,18 | 2,6 | — | — | — | 0,50 | 43,0 |
| 4147 | 1317 | 1082 | 1042 | 37 | 240 | 850 | 233 | 670 | 5 | 643 | 6263 | 5667 | 3674 | 7055 | 2091 | 501 | 1853 | 71 | 42 | 1633 | 80 | 21 | 13 | 337 | 28205 |
| 7,5 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 0,07 | 0,43 | 1,6 | 0,42 | 1,2 | 0,01 | 1,2 | 11,3 | 10,3 | 6,6 | 12,8 | 3,8 | 0,91 | 3,4 | 0,13 | 0,08 | 3,0 | 0,14 | 0,04 | 0,02 | 0,61 | 51,0 |

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. Krank- heiten des Nerven- systems 41-52 | Gruppe III. | | | Gruppe IV. | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------|--|--------------------------|--|----------------|----------------------|---|-------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|---|---|--|------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| | | | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- kran- kungen 1-40 | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | Krank- heiten der At- mungs- organe 53-63 | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe 64-79 | davon Herzkrankheiten 64-68 | | | |
| | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | Katarhe der Schleim- häute der Luftwege 53-57 | | Akute Lungenentzündung 58 | | | Brustfellentzündung und Ausgänge ausschl. No. 19 60 | | |
| | | | | überhaupt 1-26 | Pocken (ausschl. Wind- pocken) 1 | Scharlach 3 | Masern (Röteln) 4 | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung 5 | Diphtherie (Krupp) 6 | Rose 7 | Gastrisches Fieber 12 | Unterleibstypus 13 | Wechselfieber 16 | Tuberkulose 18-21 | Ruhr 22 | Epidem. Genickstarre 25 | Akuter Gelenkrheumatismus 27 | | | | | | | | Chronischer Gelenkrheumatismus 28 | Hitzschlag 38 |
| Gardekorps | August | 42417 ‰ | 61 1,4 | 29 0,68 | — | 4 0,09 | 1 0,02 | 3 0,07 | — | 1 0,02 | — | — | — | 5 0,11 | — | — | 23 0,54 | 2 0,05 | — | 11 0,26 | 179 4,2 | 150 3,5 | 8 0,19 | 21 0,50 | 50 1,2 | 5 0,12 |
| I. Armee- korps | August | 32403 ‰ | 42 1,3 | 26 0,80 | — | — | 1 0,03 | 1 0,03 | — | — | — | 6 0,19 | — | 4 0,12 | 1 0,03 | — | 11 0,34 | 1 0,03 | — | 10 0,31 | 120 3,7 | 103 3,2 | 7 0,22 | 7 0,22 | 22 0,68 | 4 0,12 |
| II. Armee- korps | August | 26598 ‰ | 28 1,1 | 18 0,68 | — | 1 0,04 | 2 0,08 | — | — | 1 0,04 | — | 1 0,04 | — | 2 0,08 | 4 0,15 | — | 5 0,19 | 2 0,08 | — | 6 0,23 | 95 3,6 | 75 2,8 | 10 0,38 | 10 0,38 | 23 0,86 | 2 0,08 |
| III. Armee- korps | August | 23967 ‰ | 16 0,67 | 12 0,50 | — | — | — | — | — | — | — | 1 0,04 | 3 0,13 | 5 0,21 | — | — | 3 0,13 | 1 0,04 | — | 9 0,38 | 64 2,7 | 50 2,1 | 5 0,21 | 7 0,29 | 19 0,79 | 2 0,08 |
| IV. Armee- korps | August | 24483 ‰ | 17 0,69 | 5 0,20 | — | — | — | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 3 0,12 | — | — | — | — | 9 0,37 | 1 0,04 | — | 4 0,16 | 53 2,2 | 42 1,7 | 8 0,33 | 2 0,08 | 14 0,57 | 2 0,08 |
| V. Armee- korps | August | 26194 ‰ | 21 0,80 | 10 0,38 | — | 1 0,04 | 2 0,08 | — | — | — | — | — | — | 2 0,08 | 3 0,11 | 1 0,04 | 9 0,34 | — | — | 7 0,27 | 65 2,5 | 53 2,0 | 4 0,15 | 6 0,23 | 15 0,57 | 3 0,11 |
| VI. Armee- korps | August | 26505 ‰ | 20 0,75 | 6 0,23 | — | — | — | — | 1 0,04 | — | — | 2 0,08 | — | 2 0,08 | — | — | 7 0,26 | 1 0,04 | 1 0,04 | 10 0,38 | 80 3,0 | 68 2,6 | 5 0,19 | 4 0,15 | 13 0,49 | 3 0,11 |
| VII. Armee- korps | August | 26688 ‰ | 36 1,3 | 17 0,64 | — | — | — | — | — | 1 0,04 | — | 6 0,22 | — | 4 0,15 | — | — | 11 0,41 | 2 0,07 | — | 8 0,30 | 101 3,8 | 90 3,4 | 2 0,07 | 9 0,34 | 31 1,2 | 6 0,22 |
| VIII. Armee- korps | August | 26961 ‰ | 24 0,89 | 11 0,41 | — | — | 1 0,04 | — | — | — | — | 3 0,11 | — | 3 0,11 | — | — | 9 0,33 | — | — | 12 0,45 | 139 5,2 | 127 4,7 | 2 0,07 | 10 0,37 | 54 2,0 | 7 0,26 |
| IX. Armee- korps | August | 25279 ‰ | 25 0,99 | 18 0,71 | — | 1 0,04 | 4 0,16 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 2 0,09 | — | 4 0,16 | 1 0,04 | — | 4 0,16 | 1 0,04 | — | 16 0,63 | 88 3,5 | 66 2,6 | 14 0,55 | 7 0,28 | 20 0,79 | 3 0,12 |
| X. Armee- korps | August | 22073 ‰ | 30 1,4 | 18 0,82 | — | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 1 0,05 | 2 0,09 | — | 2 0,09 | 2 0,09 | 7 0,32 | — | — | 6 0,27 | 1 0,05 | — | 9 0,41 | 73 3,3 | 59 2,7 | 7 0,32 | 6 0,27 | 22 1,0 | 6 0,37 |
| XI. Armee- korps | August | 22220 ‰ | 20 0,90 | 9 0,41 | — | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 1 0,05 | 1 0,05 | — | 1 0,05 | — | 2 0,09 | — | — | 9 0,41 | — | — | 6 0,27 | 39 1,8 | 34 1,5 | 1 0,05 | 4 0,18 | 14 0,63 | 1 0,05 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | August | 21820 ‰ | 37 1,7 | 11 0,50 | — | — | — | — | — | 3 0,14 | — | — | — | 7 0,32 | — | — | 17 0,78 | — | 4 0,18 | 10 0,46 | 53 2,4 | 41 1,9 | 4 0,18 | 5 0,23 | 25 1,1 | 4 0,18 |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | August | 21713 ‰ | 41 1,9 | 18 0,83 | — | 1 0,05 | — | — | — | 2 0,09 | — | 1 0,05 | — | 4 0,18 | — | — | 12 0,55 | — | 9 0,41 | 10 0,46 | 62 2,9 | 53 2,4 | 3 0,14 | 5 0,23 | 31 1,4 | 4 0,14 |
| XIV. Armee- korps | August | 31844 ‰ | 28 0,88 | 10 0,31 | — | 1 0,03 | — | 2 0,06 | — | 1 0,03 | — | 2 0,06 | 1 0,03 | 3 0,09 | — | — | 14 0,44 | — | — | 13 0,41 | 121 3,8 | 105 3,3 | 6 0,19 | 8 0,25 | 22 0,69 | 5 0,16 |
| XV. Armee- korps | August | 31760 ‰ | 32 1,0 | 8 0,25 | — | 1 0,03 | — | — | — | 2 0,06 | — | 3 0,09 | — | — | — | — | 19 0,60 | 1 0,03 | — | 16 0,50 | 132 4,0 | 118 3,7 | 9 0,28 | 5 0,16 | 33 1,0 | 5 0,16 |
| XVI. Armee- korps | August | 27621 ‰ | 35 1,3 | 24 0,87 | — | — | 1 0,04 | — | — | 3 0,11 | — | 3 0,11 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 5 0,18 | — | 1 0,04 | 9 0,33 | 163 5,9 | 147 5,3 | 5 0,18 | 11 0,40 | 34 1,2 | 5 0,18 |
| XVII. Armee- korps | August | 30515 ‰ | 49 1,6 | 37 1,3 | — | — | — | — | — | 1 0,03 | — | 8 0,26 | 1 0,03 | 2 0,07 | 23 0,75 | — | 5 0,16 | 1 0,03 | — | 10 0,33 | 85 2,8 | 79 2,6 | 3 0,10 | 3 0,10 | 27 0,88 | 8 0,26 |
| XVIII. Armeekorps | August | 26402 ‰ | 27 1,0 | 11 0,42 | — | — | — | — | — | 1 0,04 | — | — | — | 2 0,08 | — | — | 12 0,45 | — | — | 12 0,45 | 87 3,3 | 75 2,8 | 3 0,11 | 6 0,23 | 33 1,2 | 8 0,30 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | August | 22640 ‰ | 22 0,97 | 12 0,53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 0,27 | — | 1 0,04 | 7 0,31 | 1 0,04 | — | 8 0,35 | 44 1,9 | 37 1,6 | 3 0,13 | 2 0,09 | 20 0,88 | 6 0,27 |
| Armee | August | 540103 ‰ | 611 1,1 | 310 0,57 | — | 10 0,02 | 14 0,03 | 9 0,02 | 5 0,01 | 21 0,04 | — | 43 0,08 | 9 0,02 | 66 0,12 | 31 0,06 | 1 | 197 0,36 | 15 0,03 | 15 0,03 | 196 0,36 | 1843 3,4 | 1572 2,9 | 109 0,20 | 138 0,26 | 522 0,97 | 89 0,16 |

| Krank- heiten der Ernäh- rungs- organe | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krank- heiten der Harn- und Ge- schlechts- organe ausschl. der vene- rischen | Gruppe VII. Vene- rische Krank- heiten | Gruppe VIII. | | | Gruppe IX. Ohren- krank- heiten | Gruppe X. | | Gruppe XI. Krank- heiten der Bewe- gungs- organe | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krank- heiten Selbstnordversuche | Gruppe XIV. Zur Be- obach- tung | Summe des Zu- gangs | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|--|--|--------------|---------|---------|--|-----------|---------|--|-------------|---------|---------|---------------|---------|------|---------|--|---|------------------------------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| | davon | | | | | | davon | davon | davon | | davon | davon | | davon | davon | | | | | | | | | davon | | | | | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | | | | 7. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 118-122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-198 | | | | | | | |
| 425 | 119 | 107 | 130 | 5 | 17 | 102 | 17 | 50 | — | 34 | 519 | 479 | 276 | 516 | 175 | 45 | 109 | 5 | 2 | 132 | 1 | — | — | 12 | 2252 | | | | | | | |
| 10,0 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 0,12 | 0,40 | 2,4 | 0,40 | 1,2 | — | 0,80 | 12,2 | 11,3 | 6,5 | 12,2 | 4,1 | 1,1 | 2,6 | 0,12 | 0,05 | 3,1 | 0,02 | — | — | 0,28 | 53,1 | | | | | | | |
| 223 | 57 | 46 | 84 | — | 12 | 46 | 16 | 53 | 3 | 39 | 479 | 430 | 246 | 317 | 82 | 21 | 76 | 2 | 3 | 71 | 4 | 1 | — | 17 | 1627 | | | | | | | |
| 6,9 | 1,8 | 1,4 | 2,6 | — | 0,37 | 1,4 | 4,9 | 1,6 | 0,09 | 1,2 | 14,8 | 13,3 | 7,6 | 9,8 | 2,5 | 0,65 | 2,3 | 0,06 | 0,09 | 2,2 | 0,12 | 0,03 | — | 0,52 | 50,2 | | | | | | | |
| 217 | 48 | 75 | 58 | 1 | 14 | 40 | 9 | 19 | 2 | 19 | 330 | 302 | 150 | 254 | 77 | 18 | 55 | 2 | — | 57 | 4 | — | — | 19 | 1214 | | | | | | | |
| 8,2 | 1,8 | 2,8 | 2,2 | 0,04 | 0,53 | 1,5 | 0,34 | 0,71 | 0,08 | 0,71 | 12,4 | 11,4 | 5,6 | 9,5 | 2,9 | 0,68 | 2,1 | 0,08 | — | 2,1 | 0,15 | — | — | 0,71 | 45,6 | | | | | | | |
| 171 | 43 | 67 | 38 | — | 9 | 55 | 11 | 25 | 1 | 23 | 241 | 222 | 140 | 228 | 73 | 20 | 54 | 2 | 4 | 48 | — | 1 | — | 7 | 1008 | | | | | | | |
| 7,1 | 1,8 | 2,8 | 1,6 | — | 0,38 | 2,3 | 0,46 | 1,0 | 0,04 | 0,96 | 10,1 | 9,3 | 5,8 | 9,5 | 3,0 | 0,83 | 2,3 | 0,08 | 0,17 | 2,0 | — | 0,04 | — | 0,29 | 42,1 | | | | | | | |
| 118 | 29 | 24 | 39 | 3 | 7 | 27 | 4 | 14 | — | 19 | 213 | 185 | 93 | 198 | 40 | 22 | 57 | 1 | — | 68 | 1 | 1 | 1 | 11 | 789 | | | | | | | |
| 4,8 | 1,2 | 0,98 | 1,6 | 0,12 | 0,29 | 1,1 | 0,16 | 0,57 | — | 0,78 | 8,7 | 7,6 | 3,8 | 8,1 | 1,6 | 0,90 | 2,3 | 0,01 | — | 2,8 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,45 | 32,2 | | | | | | | |
| 180 | 25 | 41 | 85 | 3 | 8 | 33 | 10 | 23 | 2 | 14 | 196 | 170 | 113 | 223 | 70 | 17 | 56 | 5 | 1 | 54 | — | — | — | 13 | 911 | | | | | | | |
| 6,9 | 0,95 | 1,6 | 3,2 | 0,11 | 0,31 | 1,3 | 0,38 | 0,88 | 0,08 | 0,53 | 7,5 | 6,5 | 4,3 | 8,5 | 2,7 | 0,65 | 2,1 | 0,19 | 0,04 | 2,1 | — | — | — | 0,50 | 34,8 | | | | | | | |
| 176 | 39 | 51 | 50 | 4 | 7 | 40 | 10 | 29 | — | 33 | 238 | 216 | 117 | 224 | 79 | 17 | 56 | 3 | 1 | 55 | 2 | — | — | 17 | 1004 | | | | | | | |
| 6,6 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 0,15 | 0,26 | 1,5 | 0,38 | 1,1 | — | 1,2 | 9,0 | 8,1 | 4,4 | 8,5 | 3,0 | 0,61 | 2,1 | 0,11 | 0,04 | 2,1 | 0,08 | — | — | 0,64 | 37,9 | | | | | | | |
| 208 | 61 | 61 | 47 | 1 | 10 | 30 | 3 | 38 | — | 15 | 271 | 239 | 129 | 333 | 103 | 25 | 105 | 4 | 2 | 64 | — | 2 | 1 | 34 | 1246 | | | | | | | |
| 7,8 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 0,04 | 0,37 | 1,1 | 0,11 | 1,4 | — | 0,56 | 10,2 | 9,0 | 4,8 | 12,5 | 3,9 | 0,94 | 3,9 | 0,15 | 0,07 | 2,4 | — | 0,07 | 0,04 | 1,3 | 46,7 | | | | | | | |
| 311 | 95 | 74 | 105 | 1 | 7 | 37 | 5 | 31 | — | 24 | 261 | 241 | 135 | 368 | 103 | 8 | 141 | — | 3 | 70 | 3 | 1 | — | 20 | 1424 | | | | | | | |
| 11,5 | 3,5 | 2,7 | 3,9 | 0,04 | 0,26 | 1,4 | 0,19 | 1,1 | — | 0,89 | 9,7 | 8,9 | 5,0 | 13,6 | 3,8 | 0,39 | 5,2 | — | 0,11 | 2,6 | 0,11 | 0,04 | — | 0,74 | 52,8 | | | | | | | |
| 147 | 51 | 41 | 25 | — | 5 | 47 | 13 | 32 | 1 | 17 | 257 | 234 | 158 | 253 | 58 | 32 | 65 | 5 | 2 | 43 | 3 | — | — | 4 | 1069 | | | | | | | |
| 5,8 | 2,0 | 1,6 | 0,99 | — | 0,20 | 1,9 | 0,51 | 1,3 | 0,04 | 0,67 | 10,2 | 9,3 | 6,3 | 10,0 | 2,3 | 1,3 | 2,6 | 0,20 | 0,08 | 1,7 | 0,12 | — | — | 0,16 | 42,3 | | | | | | | |
| 137 | 39 | 42 | 25 | 4 | 13 | 29 | 10 | 14 | — | 16 | 212 | 190 | 92 | 165 | 50 | 19 | 38 | 1 | 3 | 39 | 7 | 2 | 2 | 16 | 830 | | | | | | | |
| 6,2 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 0,18 | 0,59 | 1,3 | 0,45 | 0,63 | — | 0,72 | 9,6 | 8,6 | 4,2 | 7,5 | 2,3 | 0,86 | 1,7 | 0,05 | 0,14 | 1,8 | 0,32 | 0,09 | 0,09 | 0,72 | 37,6 | | | | | | | |
| 91 | 19 | 32 | 21 | 1 | 8 | 34 | 2 | 13 | — | 16 | 200 | 184 | 145 | 189 | 45 | 17 | 66 | 5 | — | 37 | — | 1 | — | 15 | 791 | | | | | | | |
| 4,1 | 0,86 | 1,4 | 0,95 | 0,05 | 0,36 | 1,5 | 0,09 | 0,59 | — | 0,72 | 9,0 | 8,3 | 6,5 | 8,5 | 2,0 | 0,77 | 3,0 | 0,23 | — | 1,7 | — | 0,05 | — | 0,68 | 35,6 | | | | | | | |
| 90 | 32 | 18 | 24 | — | 6 | 68 | 22 | 1 | — | 13 | 162 | 152 | 175 | 181 | 36 | 19 | 31 | 1 | 1 | 29 | — | — | — | 1 | 822 | | | | | | | |
| 4,1 | 1,5 | 0,82 | 1,1 | — | 0,27 | 3,1 | 1,0 | 0,05 | — | 0,60 | 7,4 | 7,0 | 8,0 | 8,3 | 1,6 | 0,87 | 1,4 | 0,05 | 0,05 | 1,3 | — | — | — | 0,05 | 37,7 | | | | | | | |
| 204 | 55 | 37 | 62 | 2 | 5 | 21 | 5 | 25 | — | 19 | 253 | 220 | 126 | 377 | 94 | 12 | 146 | 2 | 1 | 76 | 18 | 1 | — | 12 | 1187 | | | | | | | |
| 9,4 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | 0,09 | 0,23 | 0,97 | 0,23 | 1,2 | — | 0,88 | 11,7 | 10,2 | 5,8 | 17,4 | 4,3 | 0,55 | 6,7 | 0,09 | 0,05 | 3,5 | 0,83 | 0,05 | — | 0,55 | 54,7 | | | | | | | |
| 211 | 62 | 49 | 47 | 4 | 8 | 30 | 6 | 20 | — | 20 | 295 | 272 | 138 | 308 | 75 | 10 | 111 | 4 | 2 | 67 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1230 | | | | | | | |
| 6,6 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 0,13 | 0,25 | 0,94 | 0,19 | 0,63 | — | 0,63 | 9,3 | 8,5 | 4,3 | 9,7 | 2,4 | 0,31 | 3,5 | 0,13 | 0,06 | 2,1 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,41 | 38,6 | | | | | | | |
| 224 | 40 | 49 | 89 | 5 | 18 | 34 | 6 | 39 | — | 36 | 314 | 276 | 131 | 333 | 94 | 16 | 116 | 2 | 3 | 80 | 2 | — | — | 27 | 1369 | | | | | | | |
| 7,1 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | 0,16 | 0,57 | 1,1 | 0,19 | 1,2 | — | 1,1 | 9,9 | 8,7 | 4,1 | 10,5 | 3,0 | 0,50 | 3,7 | 0,06 | 0,09 | 2,5 | 0,06 | — | — | 0,85 | 43,1 | | | | | | | |
| 269 | 56 | 79 | 90 | 2 | 14 | 40 | 9 | 31 | — | 36 | 389 | 346 | 154 | 324 | 97 | 21 | 93 | 3 | 5 | 90 | — | — | — | 9 | 1507 | | | | | | | |
| 9,7 | 2,0 | 2,9 | 3,3 | 0,07 | 0,51 | 1,4 | 0,38 | 1,1 | — | 1,3 | 14,1 | 12,5 | 5,6 | 11,7 | 3,5 | 0,76 | 3,4 | 0,11 | 0,18 | 3,3 | — | — | — | 0,33 | 54,6 | | | | | | | |
| 177 | 39 | 59 | 50 | 1 | 8 | 59 | 15 | 27 | — | 37 | 259 | 237 | 130 | 256 | 74 | 23 | 82 | 3 | 1 | 51 | 5 | 1 | — | 17 | 1142 | | | | | | | |
| 5,8 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 0,03 | 0,26 | 1,9 | 0,49 | 0,88 | — | 1,2 | 8,5 | 7,8 | 4,3 | 8,4 | 2,4 | 0,75 | 2,7 | 0,10 | 0,03 | 1,7 | 0,16 | 0,03 | — | 0,56 | 37,4 | | | | | | | |
| 206 | 66 | 70 | 32 | — | 9 | 24 | 8 | 21 | — | 26 | 268 | 239 | 135 | 270 | 95 | 19 | 63 | 4 | 2 | 63 | — | — | — | 15 | 1133 | | | | | | | |
| 7,8 | 2,5 | 2,7 | 1,2 | — | 0,34 | 0,91 | 0,30 | 0,80 | — | 0,98 | 10,2 | 9,1 | 5,1 | 10,2 | 3,8 | 0,72 | 2,4 | 0,15 | 0,08 | 2,4 | — | — | — | 0,57 | 42,9 | | | | | | | |
| 112 | 19 | 23 | 39 | 1 | 8 | 66 | 16 | 7 | — | 15 | 176 | 157 | 121 | 159 | 37 | 14 | 43 | 3 | 2 | 32 | — | — | — | 7 | 765 | | | | | | | |
| 4,9 | 0,84 | 1,0 | 1,7 | 0,04 | 0,35 | 2,9 | 0,71 | 0,31 | — | 0,66 | 7,8 | 6,9 | 5,3 | 7,0 | 1,6 | 0,82 | 1,9 | 0,13 | 0,09 | 1,4 | — | — | — | 0,31 | 33,8 | | | | | | | |
| 3897 | 994 | 1045 | 1140 | 38 | 193 | 862 | 197 | 512 | 9 | 471 | 5533 | 4991 | 2904 | 5476 | 1557 | 395 | 1563 | 57 | 38 | 1226 | 52 | 14 | 5 | 286 | 23320 | | | | | | | |
| 7,2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 0,07 | 0,36 | 1,6 | 0,36 | 0,95 | 0,02 | 0,87 | 10,2 | 9,2 | 5,4 | 10,1 | 2,9 | 0,73 | 2,9 | 0,11 | 0,07 | 2,3 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,53 | 43,2 | | | | | | | |

| Armee- korps | Monat | Monats- Ist- stärke | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. | Gruppe III. | | | Gruppe IV. | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krank- ungen | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Krank- heiten des Nerven- systems | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reiten- den Organe | da- von Herzkrankheiten |
| | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Katarhe der Schleim- häute der Luftwege | Akute Lungenentzündung | Brustfellentzündung und Ausgänge auschl. No. 19 | | |
| | | | | überhaupt | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | Akuter Gelenkrheumatismus | Chronischer Gelenkrheumatismus | Hitzschlag | 1. | 2. | 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 1-40 | 1-26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18- 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 38 | 41-52 | 53-63 | 53- 57 | 58 | 60 | 64-79 | 64- 68 | | | | | | | | | | | | |
| Gardekorps | September | 37975 ‰ | 39 1,0 | 15 0,39 | — | 1 0,03 | — | — | 1 0,03 | 2 0,06 | — | — | — | — | — | — | 2 0,05 | — | — | 20 0,53 | — | — | — | 9 0,24 | 103 2,7 | 84 2,2 | 7 0,18 | 11 0,29 | 33 0,89 | 6 0,16 | | | | | |
| I. Armee- korps | September | 29017 ‰ | 42 1,4 | 27 0,93 | — | — | 2 0,07 | — | 1 0,03 | — | — | 15 0,52 | — | 2 0,07 | — | — | — | — | — | 4 0,14 | 3 0,10 | 2 0,07 | — | 7 0,24 | 106 3,7 | 85 2,9 | 12 0,41 | 8 0,28 | 11 0,38 | 3 0,10 | | | | | |
| II. Armee- korps | September | 23511 ‰ | 80 3,4 | 71 3,0 | — | — | 2 0,09 | — | 3 0,13 | 2 0,09 | — | 55 2,3 | 1 0,04 | 3 0,13 | — | — | — | — | — | 5 0,21 | 1 0,04 | — | — | 13 0,55 | 58 2,5 | 45 1,9 | 9 0,38 | 4 0,17 | 13 0,55 | 3 0,13 | | | | | |
| III. Armee- korps | September | 21327 ‰ | 14 0,66 | 6 0,28 | — | 1 0,05 | — | 1 0,05 | — | 1 0,05 | — | — | — | — | — | — | 2 0,09 | 1 0,05 | — | 5 0,23 | — | 3 0,14 | — | 15 0,70 | 46 2,2 | 35 1,6 | 3 0,14 | 7 0,33 | 25 1,2 | 5 0,23 | | | | | |
| IV. Armee- korps | September | 19105 ‰ | 26 1,4 | 12 0,65 | — | — | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 4 0,21 | — | 4 0,21 | — | — | — | — | — | — | — | 9 0,47 | — | 5 0,26 | — | 6 0,31 | 34 1,8 | 24 1,3 | 7 0,37 | 2 0,10 | 7 0,37 | 1 0,05 | | | | | |
| V. Armee- korps | September | 22572 ‰ | 19 0,84 | 5 0,22 | — | — | — | — | — | 2 0,09 | — | 1 0,04 | — | — | — | — | — | — | — | 10 0,44 | — | — | — | 5 0,22 | 41 1,8 | 34 1,5 | 5 0,22 | 2 0,09 | 16 0,71 | 2 0,09 | | | | | |
| VI. Armee- korps | September | 23693 ‰ | 10 0,42 | 3 0,13 | — | 1 0,04 | — | — | — | — | — | 1 0,04 | — | 1 0,04 | — | — | — | — | — | 5 0,21 | — | — | — | 6 0,25 | 42 1,8 | 31 1,3 | 6 0,25 | 4 0,17 | 12 0,51 | — | | | | | |
| VII. Armee- korps | September | 26060 ‰ | 30 1,2 | 13 0,50 | — | — | 1 0,04 | — | — | 2 0,08 | — | 4 0,15 | — | — | — | — | — | — | — | 12 0,46 | — | — | — | 6 0,23 | 65 2,5 | 50 1,9 | 8 0,31 | 7 0,27 | 24 0,92 | 5 0,19 | | | | | |
| VIII. Armee- korps | September | 26007 ‰ | 26 1,0 | 11 0,42 | — | — | — | — | — | — | — | 1 0,04 | 1 0,04 | 4 0,15 | 2 0,08 | — | — | — | — | 5 0,19 | 1 0,04 | 3 0,12 | — | 11 0,42 | 110 4,2 | 98 3,8 | 5 0,19 | 7 0,27 | 31 1,2 | 7 0,27 | | | | | |
| IX. Armee- korps | September | 22507 ‰ | 20 0,89 | 8 0,36 | — | 2 0,09 | 2 0,09 | — | 3 0,13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 0,40 | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 7 0,31 | 39 1,7 | 31 1,4 | 4 0,18 | 3 0,13 | 10 0,44 | 2 0,09 | | | | | |
| X. Armee- korps | September | 21471 ‰ | 22 1,0 | 8 0,37 | — | — | — | — | — | 1 0,05 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 3 0,14 | — | — | — | — | — | 10 0,47 | — | — | — | 12 0,56 | 55 2,6 | 39 1,8 | 5 0,23 | 9 0,42 | 21 0,98 | 6 0,28 | | | | | |
| XI. Armee- korps | September | 17395 ‰ | 18 1,0 | 11 0,63 | — | — | 2 0,11 | 1 0,06 | — | — | — | 4 0,23 | — | 4 0,23 | — | — | — | — | — | 5 0,29 | — | 2 0,11 | — | 2 0,11 | 33 1,9 | 27 1,6 | 1 0,06 | 5 0,29 | 18 1,0 | 5 0,29 | | | | | |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | September | 17875 ‰ | 28 1,6 | 4 0,22 | — | — | 1 0,06 | — | — | 2 0,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 0,56 | 2 0,11 | 8 0,45 | — | 6 0,34 | 45 2,5 | 32 1,8 | 5 0,28 | 8 0,45 | 19 1,1 | 4 0,23 | | | | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | September | 21883 ‰ | 25 1,1 | 9 0,41 | — | 1 0,05 | — | — | — | 3 0,14 | — | — | — | 2 0,09 | — | — | — | — | — | 9 0,41 | 1 0,05 | 6 0,27 | — | 9 0,41 | 77 3,5 | 69 3,2 | 3 0,14 | 4 0,18 | 13 0,59 | — | | | | | |
| XIV. Armee- korps | September | 31775 ‰ | 22 0,69 | 6 0,19 | — | 1 0,03 | — | — | — | — | — | 2 0,06 | — | 1 0,03 | — | — | — | — | — | 11 0,35 | 1 0,03 | 1 0,03 | — | 8 0,25 | 101 3,2 | 86 2,7 | 3 0,09 | 12 0,38 | 9 0,28 | — | | | | | |
| XV. Armee- korps | September | 28095 ‰ | 23 0,82 | 10 0,36 | — | — | — | 1 0,04 | — | — | — | 6 0,21 | — | 1 0,04 | — | — | — | — | — | 11 0,39 | — | — | — | 4 0,14 | 68 2,4 | 62 2,2 | 1 0,04 | 4 0,14 | 20 0,71 | 2 0,07 | | | | | |
| XVI. Armee- korps | September | 24523 ‰ | 20 0,82 | 15 0,61 | — | — | — | — | — | 2 0,08 | — | 4 0,16 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | — | — | — | — | 5 0,20 | — | — | — | 7 0,29 | 74 3,0 | 61 2,5 | 5 0,20 | 6 0,24 | 16 0,73 | 3 0,12 | | | | | |
| XVII. Armee- korps | September | 25494 ‰ | 75 2,9 | 55 2,2 | — | — | — | — | — | 1 0,04 | — | 4 0,16 | — | 1 0,04 | 47 1,8 | — | — | — | — | 10 0,39 | 1 0,04 | — | — | 4 0,16 | 72 2,8 | 54 2,1 | 8 0,31 | 8 0,31 | 20 0,79 | 4 0,16 | | | | | |
| XVIII. Armeekorps | September | 25368 ‰ | 26 1,0 | 12 0,47 | — | — | — | — | 2 0,08 | 2 0,08 | — | — | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | — | — | — | 11 0,43 | 2 0,08 | — | — | 8 0,32 | 80 3,2 | 69 2,7 | 8 0,32 | 3 0,12 | 21 0,83 | 2 0,08 | | | | | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | September | 18408 ‰ | 50 2,7 | 6 0,33 | — | — | — | — | — | 1 0,05 | — | 1 0,05 | — | 1 0,05 | — | — | — | — | — | 9 0,49 | 1 0,05 | 2 0,11 | — | 5 0,27 | 45 2,4 | 35 1,9 | 5 0,27 | 4 0,22 | 13 0,71 | 3 0,16 | | | | | |
| Armee | September | 484061 ‰ | 615 1,3 | 307 0,63 | — | 7 0,01 | 10 0,02 | 4 0,01 | 11 0,02 | 25 0,05 | — | 103 0,21 | 5 0,01 | 29 0,06 | 51 0,11 | — | — | — | — | 175 0,36 | 14 0,03 | 33 0,07 | — | 150 0,31 | 1294 2,7 | 1051 2,2 | 110 0,23 | 118 0,24 | 352 0,73 | 63 0,13 | | | | | |

| Krank- heiten der Ernäh- rungs- organe | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krank- heiten der Harn- und Ge- schlechts- organe ausschl. der vene- rischen | Gruppe VII. Vene- rische Krank- heiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohren- krank- heiten | Gruppe X. Krank- heiten der äußeren Be- deckun- gen | Gruppe XI. Krank- heiten der Bewe- gungs- organe | Gruppe XII. Me- cha- nische Ver- letzun- gen | davon | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krank- heiten | Gruppe XIV. Zur Be- obach- tung | Summe des Zu- gangs | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--------------|-------------|--|--|--|--|-------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--|---|------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|---------------------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | | davon | davon | davon | davon | davon | davon | davon | | | | davon | davon | | |
| | 1. Mandelerzündung | 2. Akuter Magenkatarrh | 3. Akuter Darmkatarrh | 4. Katarrhalische Gelbsucht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Quetschungen, Zerreißungen | 2. Knochenbrüche |
| 80—101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102—111 | 112—117 | 117 | 118—134 | 118—122 | 135—139 | 140—148 | 144—146 | 149—162 | 163—192 | 165—167 | 168—179 | 180 u. 181 | 182—184 | 185 | 186—189 | 192 | 193—197 | 194 | 198 | 1—198 | |
| 208 5,5 | 78 2,1 | 60 1,6 | 37 0,97 | 4 0,11 | 3 0,08 | 58 1,5 | 9 0,24 | 34 0,90 | 1 0,03 | 16 0,42 | 433 11,4 | 401 10,6 | 224 5,9 | 307 8,1 | 94 2,5 | 53 1,4 | 48 1,3 | 3 0,08 | — | 72 1,9 | — | — | — | — | 31 0,82 | 1498 39,4 |
| 121 4,2 | 30 1,0 | 26 0,90 | 41 1,4 | 3 0,10 | 12 0,41 | 26 0,90 | 8 0,23 | 45 1,6 | 4 0,11 | 27 0,93 | 310 10,7 | 272 9,4 | 169 5,8 | 225 7,8 | 48 1,7 | 23 0,79 | 49 1,7 | 3 0,10 | 9 0,31 | 53 1,8 | — | — | — | — | 27 0,93 | 1128 38,9 |
| 96 4,1 | 24 1,0 | 36 1,5 | 23 0,98 | 1 0,04 | 10 0,43 | 14 0,60 | 2 0,09 | 33 1,4 | 2 0,09 | 9 0,38 | 205 8,7 | 179 7,6 | 158 6,7 | 201 8,5 | 55 2,3 | 10 0,43 | 55 2,3 | 3 0,13 | 2 0,09 | 50 2,1 | 5 0,21 | — | — | — | 24 1,0 | 914 38,9 |
| 106 5,0 | 25 1,2 | 34 1,6 | 23 1,1 | 1 0,05 | 4 0,19 | 27 1,3 | 9 0,42 | 21 0,98 | — | 17 0,80 | 234 11,0 | 222 10,4 | 319 15,0 | 219 10,3 | 43 2,0 | 26 1,2 | 58 2,7 | 3 0,14 | 3 0,14 | 34 1,6 | 1 0,05 | 3 0,14 | 1 0,05 | 23 1,1 | 1073 50,3 | |
| 82 4,3 | 17 0,89 | 26 1,4 | 19 0,99 | — | 3 0,16 | 15 0,79 | 3 0,16 | 8 0,42 | — | 7 0,37 | 191 10,0 | 176 9,2 | 99 5,2 | 161 8,4 | 33 1,7 | 48 2,5 | 38 2,0 | 1 0,05 | — | 36 1,9 | — | 1 0,05 | 1 0,05 | 15 0,79 | 655 34,3 | |
| 73 3,2 | 24 1,1 | 19 0,84 | 12 0,53 | 1 0,04 | 4 0,18 | 29 1,3 | 4 0,13 | 17 0,75 | — | 11 0,49 | 145 6,4 | 136 6,0 | 106 4,7 | 133 5,9 | 32 1,4 | 14 0,62 | 23 1,0 | 3 0,13 | 2 0,09 | 41 1,8 | 1 0,04 | — | — | — | 30 1,3 | 629 27,9 |
| 93 3,9 | 16 0,68 | 23 0,97 | 34 1,4 | 2 0,08 | 4 0,13 | 30 1,3 | 13 0,55 | 16 0,68 | — | 15 0,63 | 209 8,8 | 194 8,2 | 144 6,1 | 153 6,5 | 35 1,5 | 20 0,84 | 34 1,4 | 2 0,08 | 1 0,04 | 43 1,8 | 4 0,17 | — | — | — | 23 0,97 | 757 32,0 |
| 158 6,1 | 31 1,2 | 56 2,1 | 45 1,7 | 3 0,12 | 7 0,27 | 32 1,2 | 6 0,23 | 14 0,34 | — | 14 0,54 | 265 10,2 | 229 8,8 | 226 8,7 | 270 10,4 | 58 2,2 | 27 1,0 | 41 1,6 | 3 0,12 | 2 0,08 | 69 2,6 | 1 0,04 | — | — | — | 28 1,1 | 1139 43,7 |
| 215 8,3 | 36 1,4 | 79 3,0 | 62 2,4 | 4 0,15 | 12 0,46 | 43 1,7 | 5 0,19 | 29 1,1 | — | 16 0,62 | 280 10,8 | 243 9,3 | 180 6,9 | 331 12,7 | 73 2,8 | 21 0,81 | 92 3,5 | 1 0,04 | 2 0,08 | 63 2,4 | 13 0,50 | — | — | — | 35 1,3 | 1319 50,7 |
| 65 2,9 | 25 1,1 | 17 0,76 | 11 0,49 | 1 0,04 | 8 0,36 | 24 1,1 | 6 0,27 | 12 0,53 | — | 8 0,36 | 208 9,2 | 190 0,84 | 141 6,3 | 149 6,6 | 21 0,93 | 37 1,6 | 31 1,4 | 1 0,04 | — | 30 1,3 | 1 0,04 | — | — | — | 6 0,27 | 697 31,0 |
| 87 4,1 | 26 1,2 | 24 1,1 | 21 0,98 | 4 0,19 | 4 0,19 | 30 1,4 | 7 0,33 | 12 0,56 | — | 13 0,61 | 216 10,1 | 202 9,4 | 132 6,1 | 160 7,5 | 40 1,9 | 33 1,5 | 30 1,4 | — | — | 35 1,6 | 2 0,09 | 1 0,05 | — | — | 15 0,70 | 780 36,3 |
| 84 4,8 | 13 0,75 | 26 1,5 | 27 1,6 | 1 0,06 | 8 0,46 | 20 1,1 | 5 0,29 | 16 0,92 | — | 1 0,06 | 209 12,0 | 190 10,9 | 306 17,6 | 156 9,0 | 29 1,7 | 30 1,7 | 39 2,2 | 4 0,23 | 1 0,06 | 23 1,3 | — | — | — | — | 13 0,75 | 884 50,8 |
| 81 4,5 | 26 1,5 | 18 1,0 | 22 1,2 | 2 0,11 | 4 0,22 | 55 3,1 | 12 0,67 | 12 0,67 | — | 6 0,34 | 123 6,9 | 113 6,3 | 274 15,3 | 180 10,1 | 29 1,6 | 23 1,3 | 21 1,2 | 1 0,06 | 1 0,06 | 32 1,8 | 1 0,06 | — | — | — | 20 1,1 | 853 47,7 |
| 133 6,1 | 34 1,6 | 26 1,2 | 31 1,4 | 1 0,05 | 3 0,14 | 15 0,69 | 1 0,05 | 18 0,82 | — | 9 0,41 | 186 8,5 | 170 7,8 | 131 5,9 | 201 9,2 | 39 1,8 | 2 0,09 | 79 3,6 | 1 0,05 | 1 0,05 | 36 1,6 | 9 0,41 | — | — | — | 15 0,69 | 835 38,2 |
| 134 4,2 | 29 0,91 | 51 1,6 | 24 0,76 | 7 0,22 | 8 0,25 | 24 0,76 | 2 0,06 | 15 0,47 | — | 12 0,38 | 268 8,4 | 244 7,7 | 206 6,5 | 240 7,6 | 55 1,7 | 16 0,50 | 68 2,1 | 1 0,03 | 3 0,09 | 71 2,2 | — | 1 0,03 | — | — | 23 0,72 | 1071 33,7 |
| 168 5,8 | 30 1,1 | 49 1,7 | 50 1,9 | 1 0,04 | 6 0,21 | 25 0,89 | 2 0,07 | 13 0,46 | — | 9 0,32 | 258 9,2 | 234 8,3 | 165 5,9 | 188 6,7 | 52 1,9 | 19 0,68 | 63 2,2 | — | 4 0,14 | 43 1,5 | — | 1 0,04 | 1 0,04 | — | 24 0,85 | 972 34,6 |
| 161 6,6 | 34 1,4 | 55 2,2 | 47 1,9 | 3 0,12 | 11 0,45 | 24 0,98 | 2 0,08 | 24 0,98 | — | 10 0,41 | 216 8,8 | 197 8,0 | 135 5,5 | 199 8,1 | 51 2,1 | 29 1,2 | 46 1,9 | 1 0,04 | 2 0,08 | 51 2,1 | — | — | — | — | 12 0,49 | 909 37,1 |
| 105 4,1 | 23 0,90 | 32 1,3 | 30 1,2 | 4 0,16 | 8 0,31 | 33 1,3 | 5 0,20 | 23 0,90 | 1 0,04 | 16 0,63 | 201 7,9 | 188 7,3 | 199 7,8 | 190 7,5 | 31 1,2 | 31 1,2 | 38 1,5 | 2 0,08 | — | 48 1,8 | — | 1 0,04 | — | — | 23 0,90 | 970 38,0 |
| 129 5,1 | 27 1,1 | 44 1,7 | 26 1,0 | — | 9 0,35 | 18 0,71 | 4 0,16 | 15 0,59 | — | 16 0,63 | 238 9,4 | 221 8,7 | 140 5,5 | 218 8,6 | 45 1,8 | 22 0,87 | 62 2,4 | 1 0,04 | 3 0,12 | 48 1,9 | — | — | — | — | 26 1,0 | 944 37,2 |
| 80 4,3 | 23 1,2 | 21 1,1 | 18 0,98 | 1 0,05 | 1 0,05 | 28 1,5 | 10 0,54 | 13 0,71 | — | 11 0,60 | 181 9,8 | 167 9,1 | 284 15,4 | 269 14,6 | 32 1,7 | 51 2,8 | 39 2,1 | 2 0,11 | — | 23 1,2 | — | — | — | — | 9 0,49 | 989 53,7 |
| 2379 4,9 | 571 1,2 | 722 1,5 | 603 1,2 | 44 0,09 | 129 0,27 | 570 1,2 | 115 0,24 | 390 0,81 | 8 0,02 | 243 0,50 | 4576 9,5 | 4168 8,6 | 3738 7,7 | 4150 8,6 | 895 1,8 | 535 1,1 | 954 2,0 | 36 0,07 | 36 0,07 | 901 1,9 | 38 0,08 | 8 0,02 | 3 0,01 | — | 422 0,87 | 19016 39,3 |

| Armee- korps | Ist- stärke des Sommer- halb- jahres | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krank- ungen | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. | | | Gruppe III. | | | | Gruppe IV. | |
|------------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|--|---|--|--|--|------------|--|-------------------------------|------------------------|---|
| | | | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | Krank- heiten des Nerven- systems | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe | da- von Herzkrankheiten | | |
| | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Krank- heiten der At- mungs- organe | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe | da- von | | | | |
| | | | überhaupt | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Genickstarre | Akuter Gelenkrheumatismus | Chronischer Gelenkrheumatismus | Hitzschlag | Katarhe der Schleim- häute der Luftwege | | | | | | | | Akute Lungenentzündung | Brustfellentzündung und Ausgänge ausschl. No. 19 |
| 1—40 | 1—26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18— 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 38 | 41—52 | 53—63 | 53— 57 | 58 | 60 | 64—79 | 64— 68 | | | | | |
| Gardekorps | Summe des Sommer- halbjahres | 41892 | 527 | 277 | — | 36 | 6 | 11 | 14 | 30 | — | 5 | 2 | 56 | — | — | 197 | 10 | 1 | 116 | 1282 | 1048 | 72 | 152 | 276 | 32 | | |
| | ‰ | 12,6 | 6,6 | — | 0,86 | 0,14 | 0,26 | 0,33 | 0,72 | — | 0,12 | 0,05 | 1,3 | — | — | 4,7 | 0,24 | 0,02 | 2,8 | 30,6 | 25,0 | 1,7 | 3,6 | 6,6 | 0,76 | | | |
| I. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 31917 | 306 | 151 | — | 4 | 11 | 9 | 5 | 8 | — | 41 | 2 | 26 | 1 | — | 118 | 13 | 3 | 74 | 926 | 747 | 90 | 75 | 142 | 17 | | |
| | ‰ | 9,6 | 4,7 | — | 0,13 | 0,34 | 0,28 | 0,16 | 0,25 | — | 1,3 | 0,06 | 0,81 | 0,03 | — | 3,7 | 0,41 | 0,09 | 2,3 | 29,0 | 23,4 | 2,8 | 2,3 | 4,4 | 0,53 | | | |
| II. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 25958 | 291 | 200 | — | 4 | 9 | 15 | 6 | 15 | — | 62 | 1 | 21 | 5 | — | 59 | 14 | 1 | 79 | 714 | 560 | 95 | 56 | 154 | 22 | | |
| | ‰ | 11,2 | 7,7 | — | 0,15 | 0,35 | 0,58 | 0,23 | 0,58 | — | 2,4 | 0,04 | 0,81 | 0,19 | — | 2,3 | 0,54 | 0,04 | 3,0 | 27,5 | 21,6 | 3,7 | 2,2 | 5,9 | 0,85 | | | |
| III. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 23849 | 170 | 81 | — | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | — | 4 | 4 | 32 | 1 | — | 71 | 4 | 4 | 60 | 499 | 383 | 66 | 46 | 115 | 20 | | |
| | ‰ | 7,1 | 3,4 | — | 0,17 | 0,38 | 0,17 | 0,08 | 0,29 | — | 0,17 | 0,17 | 1,3 | 0,04 | — | 3,0 | 0,17 | 0,17 | 2,5 | 20,9 | 16,1 | 2,8 | 1,9 | 4,8 | 0,81 | | | |
| IV. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 22837 | 168 | 68 | — | — | 3 | 3 | 4 | 9 | — | 10 | — | 13 | — | — | 84 | 1 | 5 | 45 | 414 | 324 | 59 | 25 | 108 | 14 | | |
| | ‰ | 7,4 | 3,0 | — | — | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,39 | — | 0,44 | — | 0,57 | — | — | 3,7 | 0,04 | 0,22 | 2,0 | 18,1 | 14,2 | 2,6 | 1,1 | 4,7 | 0,61 | | | |
| V. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 25777 | 165 | 49 | — | 6 | 5 | 1 | — | 12 | — | 1 | 5 | 11 | 1 | — | 90 | 8 | — | 59 | 543 | 415 | 64 | 59 | 105 | 16 | | |
| | ‰ | 6,4 | 1,9 | — | 0,23 | 0,19 | 0,04 | — | 0,47 | — | 0,04 | 0,19 | 0,43 | 0,04 | — | 3,5 | 0,31 | — | 2,3 | 21,1 | 16,1 | 2,5 | 2,3 | 4,1 | 0,62 | | | |
| VI. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 26243 | 136 | 42 | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | 7 | — | 20 | — | — | 67 | 3 | 2 | 74 | 624 | 531 | 58 | 26 | 115 | 29 | | |
| | ‰ | 5,2 | 1,6 | — | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | — | 0,27 | — | 0,76 | — | — | 2,6 | 0,11 | 0,08 | 2,3 | 23,8 | 20,2 | 2,2 | 0,99 | 4,4 | 1,1 | | | |
| VII. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 27192 | 233 | 101 | — | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | — | 15 | 1 | 25 | — | — | 99 | 8 | — | 48 | 717 | 599 | 61 | 50 | 148 | 22 | | |
| | ‰ | 8,6 | 3,7 | — | 0,11 | 0,29 | 0,11 | 0,04 | 0,55 | — | 0,55 | 0,04 | 0,92 | — | — | 3,6 | 0,29 | — | 1,8 | 26,4 | 22,0 | 2,2 | 1,8 | 5,4 | 0,81 | | | |
| VIII. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 27237 | 216 | 89 | — | 3 | 6 | 2 | — | 5 | — | 10 | 5 | 21 | 2 | 1 | 87 | 3 | 6 | 88 | 909 | 791 | 64 | 48 | 238 | 33 | | |
| | ‰ | 7,9 | 3,3 | — | 0,11 | 0,22 | 0,07 | — | 0,18 | — | 0,37 | 0,18 | 0,77 | 0,07 | 0,04 | 3,2 | 0,11 | 0,22 | 3,2 | 33,4 | 29,0 | 2,3 | 1,8 | 8,7 | 1,2 | | | |
| IX. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 25330 | 222 | 113 | — | 4 | 28 | 6 | 10 | 5 | — | 4 | 2 | 21 | 1 | — | 90 | 5 | 1 | 62 | 540 | 431 | 59 | 46 | 120 | 18 | | |
| | ‰ | 8,8 | 4,5 | — | 0,16 | 1,1 | 0,24 | 0,39 | 0,20 | — | 0,16 | 0,08 | 0,83 | 0,04 | — | 3,6 | 0,20 | 0,04 | 2,4 | 21,3 | 17,0 | 2,3 | 1,8 | 4,7 | 0,71 | | | |
| X. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 22459 | 208 | 103 | — | 8 | 12 | 6 | 8 | 13 | — | 10 | 6 | 24 | — | — | 77 | 3 | — | 38 | 563 | 433 | 73 | 53 | 137 | 27 | | |
| | ‰ | 9,3 | 4,6 | — | 0,36 | 0,53 | 0,27 | 0,36 | 0,58 | — | 0,45 | 0,27 | 1,1 | — | — | 3,4 | 0,13 | — | 1,7 | 25,1 | 19,3 | 3,3 | 2,4 | 6,1 | 1,2 | | | |
| XI. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 21062 | 233 | 109 | — | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | — | 8 | 2 | 28 | 2 | 2 | 106 | — | 5 | 62 | 480 | 409 | 29 | 41 | 157 | 34 | | |
| | ‰ | 11,1 | 5,2 | — | 0,05 | 0,47 | 0,14 | 0,19 | 0,33 | — | 0,38 | 0,09 | 1,3 | 0,09 | 0,09 | 5,0 | — | 0,24 | 2,9 | 22,8 | 19,4 | 1,4 | 1,9 | 7,5 | 1,6 | | | |
| XII. (1. K.S.) Armeekorps | Summe des Sommer- halbjahres | 20354 | 224 | 87 | — | 9 | 7 | 12 | 6 | 11 | — | 1 | 1 | 19 | 1 | — | 102 | 5 | 13 | 61 | 389 | 279 | 68 | 38 | 122 | 26 | | |
| | ‰ | 11,0 | 4,3 | — | 0,44 | 0,34 | 0,59 | 0,29 | 0,54 | — | 0,05 | 0,05 | 0,93 | 0,05 | — | 5,0 | 0,25 | 0,64 | 3,0 | 19,1 | 13,7 | 3,3 | 1,9 | 6,0 | 1,3 | | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | Summe des Sommer- halbjahres | 22577 | 381 | 217 | — | 8 | 5 | 8 | 1 | 22 | — | 16 | — | 29 | 2 | — | 132 | 1 | 18 | 71 | 720 | 634 | 42 | 35 | 137 | 12 | | |
| | ‰ | 16,9 | 9,6 | — | 0,35 | 0,22 | 0,35 | 0,04 | 0,37 | — | 0,71 | — | 1,3 | 0,09 | — | 5,8 | 0,04 | 0,80 | 3,1 | 31,9 | 28,1 | 1,8 | 1,6 | 6,1 | 0,53 | | | |
| XIV. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 32506 | 325 | 122 | — | 11 | 3 | 8 | 4 | 14 | — | 26 | 3 | 28 | — | 1 | 173 | 8 | 2 | 66 | 916 | 795 | 55 | 61 | 1771 | 21 | | |
| | ‰ | 10,0 | 3,8 | — | 0,34 | 0,09 | 0,25 | 0,12 | 0,43 | — | 0,80 | 0,09 | 0,86 | — | 0,03 | 5,3 | 0,25 | 0,06 | 2,0 | 28,2 | 24,5 | 1,7 | 1,9 | 5,4 | 0,65 | | | |
| XV. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 31416 | 254 | 108 | — | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | — | 21 | 6 | 20 | — | — | 118 | 2 | 4 | 67 | 872 | 783 | 63 | 21 | 193 | 27 | | |
| | ‰ | 8,1 | 3,4 | — | 0,19 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,35 | — | 0,67 | 0,19 | 0,64 | — | — | 3,8 | 0,06 | 0,13 | 2,1 | 27,4 | 24,9 | 2,0 | 0,67 | 6,1 | 0,86 | | | |
| XVI. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 27421 | 279 | 187 | — | 5 | 9 | 3 | — | 14 | — | 10 | 1 | 17 | 2 | — | 59 | 6 | 1 | 55 | 933 | 826 | 54 | 47 | 193 | 19 | | |
| | ‰ | 10,2 | 6,8 | — | 0,18 | 0,33 | 0,11 | — | 0,51 | — | 0,36 | 0,04 | 0,62 | 0,07 | — | 2,2 | 0,22 | 0,04 | 2,0 | 34,0 | 30,1 | 2,0 | 1,7 | 7,0 | 0,69 | | | |
| XVII. Armee- korps | Summe des Sommer- halbjahres | 29669 | 286 | 166 | — | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | — | 24 | 4 | 26 | 70 | — | 83 | 7 | — | 58 | 681 | 537 | 72 | 64 | 143 | 29 | | |
| | ‰ | 9,6 | 5,6 | — | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,47 | — | 0,81 | 0,13 | 0,88 | 2,4 | — | 2,8 | 0,24 | — | 1,9 | 23,0 | 18,1 | 2,4 | 2,2 | 4,9 | 0,98 | | | |
| XVIII. Armeekorps | Summe des Sommer- halbjahres | 26903 | 276 | 102 | — | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 | — | 2 | 2 | 22 | — | 3 | 143 | 7 | 4 | 79 | 659 | 560 | 45 | 46 | 180 | 33 | | |
| | ‰ | 10,2 | 3,8 | — | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,74 | — | 0,07 | 0,07 | 0,82 | — | 0,11 | 5,3 | 0,36 | 0,15 | 2,9 | 24,5 | 20,8 | 1,7 | 1,7 | 6,7 | 1,2 | | | |
| XIX. (2. K.S.) Armeekorps | Summe des Sommer- halbjahres | 21193 | 222 | 70 | — | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | — | 5 | — | 16 | — | 1 | 97 | 7 | 3 | 54 | 401 | 321 | 53 | 23 | 105 | 28 | | |
| | ‰ | 10,5 | 3,3 | — | 0,05 | 0,19 | 0,28 | 0,09 | 0,57 | — | 0,24 | — | 0,75 | — | 0,05 | 4,6 | 0,33 | 0,14 | 2,5 | 18,9 | 15,1 | 2,5 | 1,1 | 5,0 | 1,3 | | | |
| Armee | Summe des Sommer- halbjahres | 533792 | 5122 | 2442 | — | 122 | 151 | 112 | 76 | 247 | — | 282 | 47 | 475 | 88 | 8 | 2052 | 115 | 73 | 1316 | 13782 | 11406 | 1242 | 1012 | 3065 | 479 | | |
| | ‰ | 9,6 | 4,6 | — | 0,23 | 0,28 | 0,21 | 0,14 | 0,46 | — | 0,53 | 0,09 | 0,89 | 0,16 | 0,01 | 3,8 | 0,22 | 0,14 | 2,5 | 25,8 | 21,4 | 2,3 | 1,9 | 5,7 | 0,90 | | | |

| Krank- heiten der Ernäh- rungs- organe | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krank- heiten der Harn- und Ge- schlechts- organe ausschl. der vene- rischen | Gruppe VII. Vene- rische Krank- heiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohren- krank- heiten | Gruppe X. Krank- heiten der äußeren Be- deckun- gen | Gruppe XI. Krank- heiten der Bewe- gungs- organe | Me- cha- nische Ver- letzun- gen | Gruppe XII. | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krank- heiten | Gruppe XIV. Zur Be- obach- tung | Summe des Zu- gangs | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|--|--|--|---|---------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | | davon | | | | | | | | | | davon | | |
| | 1. Mandelenzündung | 2. Akuter Magenkatarrh | 3. Akuter Darmkatarrh | 4. Katarthale Gelbsucht | | | Konstitutionelle Syphilis | Augen- krank- heiten | | | | | ansteckende | 1. Quetschungen, Zerreißungen | 2. Knochenbrüche | 3. Verstauchungen | 4. Verrenkungen | 5. Schufswunden | 6. Hieb-, Schmitt-, Stich-, Riß-, Quesch- und Bisswunden | | | | 7. Andere Wunden und Verletzungen | Selbstmordversuche | |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 122 | 135-139 | 140-148 | 144- 146 | 149-162 | 163-192 | 165- 167 | 168- 179 | 180 u. 181 | 182- 184 | 185 | 186- 189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-188 |
| 2152 51,4 | 932 22,2 | 458 10,9 | 376 9,0 | 23 0,55 | 90 2,1 | 469 11,2 | 92 2,2 | 311 7,4 | 2 0,05 | 212 5,1 | 3183 76,0 | 2916 69,6 | 1654 39,5 | 3029 72,3 | 990 23,6 | 317 7,6 | 617 14,7 | 22 0,53 | 11 0,26 | 758 18,1 | 17 0,41 | 5 0,12 | 2 0,05 | 90 2,1 | 13396 319,8 |
| 1111 34,8 | 375 11,7 | 216 6,8 | 310 9,7 | 9 0,28 | 88 2,8 | 257 8,1 | 71 2,2 | 313 9,8 | 20 0,63 | 227 7,1 | 2541 79,6 | 2190 68,6 | 1262 39,5 | 2234 70,0 | 617 19,3 | 122 3,8 | 525 16,4 | 9 0,28 | 22 0,69 | 542 17,0 | 13 0,41 | 3 0,09 | 2 0,06 | 116 3,6 | 9600 300,8 |
| 1017 39,2 | 298 11,5 | 288 11,1 | 207 8,0 | 13 0,50 | 64 2,5 | 188 7,2 | 50 1,9 | 199 7,7 | 7 0,27 | 113 4,4 | 2028 78,1 | 1841 70,9 | 1156 44,5 | 1896 73,0 | 631 24,3 | 70 2,7 | 439 16,9 | 16 0,62 | 6 0,23 | 439 16,9 | 36 1,4 | 4 0,15 | 1 0,04 | 88 3,4 | 7991 307,8 |
| 753 31,6 | 282 11,8 | 237 9,9 | 114 4,8 | 3 0,13 | 42 1,8 | 232 9,7 | 53 2,2 | 155 6,5 | 2 0,08 | 143 6,0 | 1305 54,7 | 1199 50,3 | 1092 45,8 | 1338 56,1 | 420 17,6 | 101 4,2 | 349 14,6 | 11 0,46 | 12 0,50 | 278 11,7 | 11 0,46 | 7 0,29 | 3 0,13 | 64 2,7 | 5975 250,5 |
| 639 28,0 | 222 9,7 | 135 5,9 | 157 6,3 | 4 0,18 | 39 1,7 | 129 5,6 | 23 1,0 | 127 5,6 | 1 0,04 | 103 4,5 | 1442 63,1 | 1312 57,5 | 719 31,5 | 1364 59,7 | 293 12,8 | 187 8,2 | 454 19,9 | 10 0,44 | 8 0,35 | 332 14,5 | 10 0,44 | 5 0,22 | 5 0,22 | 53 2,3 | 5355 234,5 |
| 853 33,1 | 255 9,9 | 214 8,3 | 208 8,1 | 10 0,39 | 48 1,9 | 177 6,9 | 59 2,3 | 168 6,5 | 2 0,08 | 91 3,5 | 1283 49,8 | 1148 44,5 | 792 30,7 | 1272 49,3 | 425 16,5 | 85 3,3 | 271 10,5 | 17 0,66 | 10 0,39 | 317 12,3 | 2 0,08 | 3 0,12 | 1 0,04 | 104 4,0 | 5663 219,7 |
| 782 29,8 | 179 6,8 | 235 9,0 | 188 7,2 | 10 0,38 | 36 1,4 | 248 9,5 | 65 2,5 | 170 6,5 | 2 0,08 | 119 4,5 | 1536 58,5 | 1397 53,2 | 714 27,2 | 1431 54,5 | 477 18,2 | 97 3,7 | 346 13,2 | 22 0,84 | 3 0,11 | 354 13,5 | 28 1,1 | 5 0,19 | 5 0,19 | 99 3,8 | 6089 232,0 |
| 1031 37,9 | 373 13,7 | 297 10,9 | 165 6,1 | 10 0,37 | 61 2,2 | 221 8,1 | 53 1,9 | 174 6,4 | — | 119 4,4 | 1803 66,3 | 1593 58,6 | 1022 37,6 | 1851 68,1 | 469 17,2 | 153 5,6 | 476 17,5 | 17 0,63 | 8 0,29 | 455 16,7 | 1 0,04 | 10 0,37 | 7 0,26 | 143 5,3 | 7581 278,8 |
| 1443 53,0 | 555 20,4 | 310 11,4 | 335 12,3 | 14 0,51 | 71 2,6 | 213 7,8 | 50 1,8 | 191 7,0 | — | 144 5,3 | 1915 70,3 | 1706 62,6 | 875 32,1 | 2144 78,7 | 563 20,7 | 110 4,0 | 651 23,9 | 13 0,48 | 16 0,59 | 476 17,5 | 27 0,99 | 5 0,18 | 1 0,04 | 124 4,6 | 8576 314,9 |
| 748 29,5 | 370 14,6 | 160 6,3 | 71 2,8 | 7 0,28 | 58 2,3 | 242 9,6 | 54 2,1 | 151 6,0 | 1 0,04 | 96 3,8 | 1342 53,0 | 1197 47,3 | 889 35,1 | 1242 49,0 | 287 11,3 | 159 6,3 | 321 12,7 | 16 0,63 | 3 0,12 | 266 10,5 | 11 0,43 | 3 0,12 | 2 0,08 | 29 1,1 | 5744 226,8 |
| 721 32,1 | 299 13,3 | 173 7,7 | 99 4,4 | 14 0,62 | 50 2,2 | 184 8,2 | 54 2,4 | 122 5,4 | 2 0,09 | 103 4,6 | 1327 59,1 | 1197 53,3 | 651 29,0 | 1118 49,8 | 341 15,2 | 120 5,3 | 254 11,3 | 11 0,49 | 9 0,40 | 272 12,1 | 18 0,80 | 8 0,36 | 5 0,22 | 77 3,4 | 5307 236,3 |
| 763 36,2 | 253 12,0 | 202 9,6 | 151 7,2 | 6 0,28 | 51 2,4 | 157 7,5 | 32 1,5 | 132 6,3 | 2 0,09 | 99 4,7 | 1508 71,6 | 1363 64,7 | 1095 52,0 | 1457 69,2 | 399 18,9 | 124 5,9 | 433 20,6 | 22 1,0 | 5 0,24 | 290 13,8 | — | 4 0,19 | 3 0,14 | 88 4,2 | 6286 298,5 |
| 517 25,4 | 228 11,2 | 72 3,5 | 125 6,1 | 2 0,10 | 43 2,1 | 315 15,5 | 73 3,6 | 51 2,5 | — | 63 3,1 | 806 39,6 | 737 36,2 | 857 42,1 | 843 41,4 | 168 8,3 | 95 4,7 | 167 8,2 | 4 0,20 | 3 0,15 | 195 9,6 | 4 0,20 | 1 0,05 | 1 0,05 | 48 2,4 | 4341 213,3 |
| 1212 53,7 | 466 20,6 | 167 7,4 | 291 12,9 | 10 0,44 | 32 1,4 | 89 3,9 | 15 0,66 | 161 7,1 | — | 99 4,4 | 1530 67,8 | 1406 62,3 | 912 40,4 | 1888 83,6 | 468 20,7 | 62 2,7 | 676 29,9 | 14 0,62 | 8 0,35 | 391 17,3 | 99 4,4 | 6 0,27 | 1 0,04 | 71 3,1 | 7309 323,7 |
| 1363 41,9 | 593 18,4 | 287 8,8 | 197 6,1 | 27 0,83 | 52 1,6 | 169 5,2 | 28 0,86 | 181 5,6 | — | 135 4,2 | 1940 59,7 | 1764 54,3 | 1040 32,0 | 1884 58,0 | 513 15,8 | 100 3,1 | 585 18,0 | 17 0,52 | 11 0,34 | 454 14,0 | 21 0,65 | 6 0,18 | 3 0,09 | 115 3,5 | 8369 257,5 |
| 1245 39,6 | 450 14,3 | 269 8,5 | 283 9,0 | 18 0,57 | 72 2,3 | 255 8,1 | 44 1,4 | 209 6,7 | 1 0,03 | 140 4,5 | 2051 65,3 | 1833 58,3 | 949 30,2 | 1936 61,6 | 601 19,1 | 94 3,0 | 596 19,0 | 15 0,48 | 16 0,51 | 473 15,1 | 20 0,64 | 1 0,03 | 1 0,03 | 108 3,2 | 8352 265,9 |
| 1274 46,5 | 386 14,1 | 363 13,2 | 308 11,2 | 14 0,51 | 66 2,4 | 173 6,3 | 42 1,5 | 221 8,1 | 6 0,22 | 203 7,4 | 2276 83,0 | 2025 73,8 | 918 33,5 | 1851 67,5 | 511 18,6 | 136 5,0 | 454 16,6 | 8 0,29 | 12 4,4 | 559 20,4 | 1 0,04 | 1 0,04 | 1 0,04 | 65 2,4 | 8508 310,3 |
| 822 27,7 | 253 8,5 | 232 7,8 | 201 6,8 | 14 0,47 | 61 2,1 | 271 9,1 | 64 2,2 | 191 6,4 | 16 0,54 | 153 5,2 | 1643 55,4 | 1479 49,8 | 992 31,8 | 1641 55,3 | 463 15,6 | 127 4,3 | 471 15,9 | 23 0,78 | 11 0,37 | 351 11,8 | 16 0,54 | 5 0,17 | 3 0,10 | 96 3,2 | 6993 235,7 |
| 1088 40,4 | 446 16,6 | 275 10,2 | 167 6,2 | 5 0,19 | 55 2,0 | 147 5,5 | 34 1,3 | 175 6,5 | — | 166 6,2 | 1673 62,2 | 1496 55,6 | 752 28,0 | 1617 60,1 | 473 17,6 | 165 6,1 | 402 14,9 | 19 0,71 | 7 0,26 | 377 14,0 | 1 0,04 | 3 0,11 | 3 0,11 | 97 3,6 | 6967 259,0 |
| 694 32,7 | 221 10,4 | 125 5,9 | 193 9,1 | 4 0,19 | 31 1,5 | 257 12,1 | 78 3,7 | 107 5,0 | 1 0,05 | 109 5,1 | 1162 54,8 | 1037 48,9 | 934 44,1 | 1150 54,3 | 235 11,1 | 99 4,7 | 265 12,5 | 15 0,71 | 7 0,33 | 242 11,4 | — | 1 0,05 | — | 42 2,0 | 5269 248,6 |
| 20228 37,9 | 7442 13,9 | 4715 8,8 | 4146 7,8 | 217 0,41 | 1110 2,1 | 4393 8,2 | 1034 1,9 | 3509 6,6 | 65 0,12 | 2637 4,9 | 34294 64,2 | 30836 57,8 | 19225 36,0 | 33186 62,2 | 9344 17,5 | 2523 4,7 | 8752 16,4 | 301 0,50 | 188 0,35 | 7821 14,7 | 336 0,63 | 86 0,16 | 50 0,09 | 1717 3,2 | 143671 269,2 |

6. Die Krankheitsgruppen u. s. w. in ihrem Ver-

| Armee- korps | Jahres- Ist- stärke | Infek- tions- krank- heiten und allge- meine Er- krank- ungen | Gruppe I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gruppe II. Krank- heiten des Nerven- systems | Gruppe III. | | | | Gruppe IV. | |
|------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|--|--|--|------------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | 1. Infektionskrankheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Krank- heiten der At- mungs- organe | davon | | | Krank- heiten der Kreis- laufs- und blut- be- reitenden Organe | davon Herzkrankheiten |
| | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Katarhe der Schleim- häute der Luftwege | 2. Akute Lungenentzündung | 3. Brustfellentzündung und Ausgänge a. No. 19 | | |
| | | | überhaupt | Pocken (ausschl. Wind- pocken) | Scharlach | Masern (Röteln) | Epidem. Ohrspeichel- drüsenentzündung | Diphtherie (Krupp) | Rose | Gastrisches Fieber | Unterleibstypus | Wechselfieber | Tuberkulose | Ruhr | Epidem. Gemickstarre | Akuter Gelenkheumatismus | Chronischer Gelenkheumatismus | Hitzschlag | 53- 57 | 58 | 60 | 64-79 | | | | | | | |
| 1-40 | 1-26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 18- 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 38 | 41-52 | 53-63 | 58 | 60 | 64-79 | 64- 68 | | | | | | | |
| Gardekorps | Jahres- summe | 41355 ‰ | 1260 30,5 | 761 18,4 | — | 67 1,6 | 10 0,24 | 21 0,51 | 32 0,77 | 55 1,3 | — | 17 0,17 | 3 0,07 | 88 2,1 | — | 1 0,02 | 391 9,5 | 22 0,53 | 1 0,02 | 238 5,8 | 4084 98,8 | 3523 85,2 | 220 5,3 | 312 7,5 | 578 14,0 | 124 3,0 | | | |
| I. Armeekorps | Jahres- summe | 31644 ‰ | 1277 40,4 | 947 30,0 | — | 13 0,41 | 30 0,95 | 25 0,79 | 11 0,35 | 36 1,1 | — | 44 1,4 | 4 0,13 | 64 2,0 | 1 0,03 | 1 0,03 | 247 7,8 | 32 1,0 | 3 0,09 | 176 5,6 | 2986 94,4 | 2563 81,0 | 248 7,8 | 140 4,4 | 303 9,6 | 46 1,5 | | | |
| II. Armeekorps | Jahres- summe | 25839 ‰ | 909 35,2 | 698 27,0 | — | 5 0,19 | 25 0,97 | 52 2,0 | 15 0,58 | 32 1,2 | — | 94 3,6 | 5 0,19 | 44 1,7 | 5 0,19 | — | 150 5,8 | 20 0,77 | 1 0,04 | 175 6,8 | 2120 82,0 | 1785 69,1 | 219 8,5 | 106 4,1 | 305 11,8 | 56 2,2 | | | |
| III. Armeekorps | Jahres- summe | 23519 ‰ | 759 32,3 | 567 24,1 | — | 13 0,55 | 24 1,0 | 14 0,60 | 2 0,09 | 9 0,39 | — | 6 0,26 | 4 0,17 | 64 2,7 | 1 0,04 | 1 0,04 | 141 6,0 | 17 0,72 | 4 0,17 | 103 4,4 | 1525 64,9 | 1277 54,3 | 144 6,1 | 95 4,0 | 219 9,3 | 46 2,0 | | | |
| IV. Armeekorps | Jahres- summe | 22365 ‰ | 427 19,1 | 246 11,0 | — | 5 0,22 | 10 0,45 | 11 0,49 | 5 0,22 | 20 0,89 | — | 15 0,67 | 1 0,04 | 26 1,2 | — | — | 149 6,7 | 3 0,13 | 5 0,22 | 119 5,3 | 1464 65,5 | 1254 56,1 | 147 6,6 | 52 2,3 | 240 10,7 | 56 2,5 | | | |
| V. Armeekorps | Jahres- summe | 25615 ‰ | 597 23,3 | 357 13,9 | — | 11 0,43 | 43 1,7 | 2 0,08 | 2 0,08 | 32 1,2 | — | 5 0,20 | 5 0,20 | 35 1,4 | 1 0,04 | 3 0,12 | 185 7,2 | 14 0,55 | — | 150 5,9 | 2263 88,3 | 1967 76,8 | 183 7,1 | 97 3,8 | 216 8,4 | 50 2,0 | | | |
| VI. Armeekorps | Jahres- summe | 25815 ‰ | 347 13,4 | 147 5,7 | — | 7 0,27 | 24 0,93 | 9 0,35 | 6 0,23 | 18 0,70 | — | 16 0,62 | 1 0,04 | 45 1,7 | — | — | 151 5,8 | 7 0,27 | 2 0,08 | 147 5,7 | 2056 79,6 | 1810 70,1 | 165 6,4 | 68 2,6 | 277 10,7 | 87 3,4 | | | |
| VII. Armeekorps | Jahres- summe | 26955 ‰ | 895 33,2 | 635 23,6 | — | 23 0,85 | 13 0,48 | 3 0,11 | 5 0,19 | 39 1,4 | — | 22 0,82 | 2 0,07 | 57 2,1 | — | — | 201 7,5 | 12 0,45 | — | 145 5,4 | 2196 81,5 | 1914 71,0 | 159 5,9 | 104 3,9 | 333 12,4 | 84 3,1 | | | |
| VIII. Armeekorps | Jahres- summe | 26874 ‰ | 669 24,9 | 414 15,4 | — | 18 0,67 | 23 0,86 | 24 0,89 | 7 0,26 | 24 0,89 | — | 49 1,8 | 15 0,56 | 56 2,1 | 2 0,07 | 1 0,04 | 183 6,8 | 7 0,26 | 6 0,22 | 201 7,5 | 2538 94,4 | 2291 85,2 | 150 5,6 | 83 3,1 | 528 19,6 | 101 3,8 | | | |
| IX. Armeekorps | Jahres- summe | 24951 ‰ | 1019 40,8 | 760 30,5 | — | 11 0,44 | 123 4,9 | 29 1,2 | 16 0,64 | 31 1,2 | — | 4 0,16 | 5 0,20 | 39 1,6 | 1 0,04 | — | 215 8,6 | 15 0,60 | 1 0,04 | 143 5,7 | 1705 68,3 | 1433 57,4 | 169 6,8 | 91 3,6 | 233 9,3 | 46 1,8 | | | |
| X. Armeekorps | Jahres- summe | 21914 ‰ | 572 26,1 | 369 16,8 | — | 25 1,1 | 20 0,91 | 15 0,68 | 31 1,4 | 18 0,82 | — | 18 0,82 | 8 0,37 | 42 1,9 | 1 0,05 | — | 151 6,9 | 9 0,41 | — | 110 5,0 | 1557 71,1 | 1294 59,0 | 163 7,4 | 88 4,0 | 285 13,0 | 72 3,3 | | | |
| XI. Armeekorps | Jahres- summe | 20767 ‰ | 882 42,5 | 607 29,2 | — | 7 0,34 | 26 1,3 | 7 0,34 | 9 0,43 | 15 0,72 | — | 15 0,72 | 3 0,14 | 44 2,1 | 2 0,10 | 3 0,14 | 229 11,0 | 12 0,58 | 5 0,24 | 154 7,4 | 1825 87,9 | 1621 78,1 | 91 4,4 | 100 4,8 | 321 15,5 | 93 4,5 | | | |
| XII. (1. K.S.) Armeekorps | Jahres- summe | 19968 ‰ | 856 42,9 | 547 27,4 | — | 37 1,9 | 36 1,8 | 31 1,6 | 16 0,80 | 27 1,4 | — | 1 0,05 | 2 0,10 | 35 1,8 | 1 0,05 | — | 252 12,6 | 13 0,65 | 13 0,65 | 147 7,4 | 1595 79,9 | 1327 66,5 | 189 9,5 | 75 3,8 | 227 11,4 | 53 2,7 | | | |
| XIII. (K.W.) Armeekorps | Jahres- summe | 22123 ‰ | 977 44,2 | 640 28,9 | — | 11 0,49 | 9 0,41 | 18 0,81 | 1 0,05 | 39 1,8 | — | 19 0,86 | — | 53 2,4 | 3 0,14 | — | 282 12,7 | 4 0,18 | 18 0,82 | 158 7,1 | 2027 91,6 | 1859 84,0 | 84 3,8 | 70 3,2 | 377 17,0 | 109 4,9 | | | |
| XIV. Armeekorps | Jahres- summe | 31827 ‰ | 791 24,9 | 425 13,4 | — | 16 0,50 | 7 0,22 | 21 0,66 | 6 0,19 | 33 1,0 | — | 29 0,91 | 4 0,13 | 72 2,3 | — | 1 0,03 | 308 9,7 | 17 0,53 | 2 0,06 | 183 5,7 | 2699 84,8 | 2441 76,7 | 122 3,8 | 121 3,8 | 406 12,8 | 77 2,4 | | | |
| XV. Armeekorps | Jahres- summe | 31228 ‰ | 777 24,9 | 467 15,0 | — | 13 0,42 | 14 0,45 | 31 0,99 | 8 0,26 | 28 0,90 | — | 26 0,83 | 9 0,29 | 59 1,9 | — | — | 236 7,6 | 8 0,26 | 4 0,13 | 193 6,2 | 2372 76,0 | 2154 69,0 | 149 4,8 | 55 1,8 | 437 14,0 | 95 3,0 | | | |
| XVI. Armeekorps | Jahres- summe | 27308 ‰ | 655 24,0 | 432 15,8 | — | 18 0,66 | 9 0,33 | 3 0,11 | 3 0,11 | 35 1,3 | — | 14 0,51 | 1 0,04 | 36 1,3 | 2 0,07 | 1 0,04 | 156 5,7 | 18 0,66 | 1 0,04 | 128 4,7 | 2421 88,7 | 2173 79,6 | 144 5,3 | 90 3,3 | 433 15,9 | 63 2,3 | | | |
| XVII. Armeekorps | Jahres- summe | 29609 ‰ | 593 20,0 | 371 12,5 | — | 20 0,68 | 23 0,78 | 13 0,44 | 1 0,03 | 42 1,4 | — | 46 1,6 | 5 0,16 | 67 2,3 | 70 2,4 | — | 160 5,4 | 16 0,54 | 1 0,03 | 145 4,9 | 2155 72,8 | 1807 61,0 | 228 7,7 | 105 3,5 | 303 10,2 | 69 2,3 | | | |
| XVIII. Armeekorps | Jahres- summe | 26286 ‰ | 727 27,7 | 388 14,8 | — | 8 0,30 | 31 1,2 | 7 0,27 | 13 0,49 | 48 1,8 | — | 5 0,19 | 5 0,19 | 61 2,3 | — | 23 0,87 | 277 10,5 | 10 0,38 | 4 0,15 | 179 6,8 | 2242 85,3 | 2029 77,2 | 105 4,0 | 86 3,3 | 413 15,7 | 127 4,8 | | | |
| XIX. (2. K.S.) Armeekorps | Jahres- summe | 20592 ‰ | 524 25,4 | 232 11,3 | — | 5 0,24 | 17 0,83 | 10 0,49 | 3 0,15 | 38 1,8 | — | 11 0,53 | — | 36 1,7 | — | 1 0,05 | 217 10,5 | 13 0,63 | 3 0,15 | 149 7,2 | 1531 74,3 | 1317 64,0 | 161 7,8 | 42 2,0 | 230 11,2 | 68 3,3 | | | |
| Armee | Jahres- summe | 526554 ‰ | 15513 29,5 | 10010 19,0 | — | 333 0,63 | 517 0,98 | 346 0,66 | 192 0,36 | 619 1,2 | — | 446 0,85 | 82 0,16 | 1023 1,9 | 90 0,17 | 36 0,07 | 4281 8,1 | 269 0,51 | 74 0,14 | 3143 6,0 | 43361 82,3 | 37839 71,9 | 3240 6,2 | 1980 3,8 | 6664 12,7 | 1522 2,9 | | | |

hältnis zur Iststärke der einzelnen Armeekorps.

| Krank- heiten der Ernäh- rungs- organe | Gruppe V. | | | | Gruppe VI. Krank- heiten der Harn- und Ge- schlechts- organe ausschl. der vene- rischen | Gruppe VII. Vene- rische Krank- heiten | Gruppe VIII. | | Gruppe IX. Ohren- krank- heiten | Gruppe X. Krank- heiten der äußeren Be- deckun- gen | Gruppe XI. Krank- heiten der Bewe- gungs- organe | Gruppe XII. Me- cha- nische Ver- letzun- gen | davon | | | | | | | Gruppe XIII. Andere Krank- heiten | Gruppe XIV. Selbstmordversuche | Zur Be- obach- tung | Summe des Zu- gangs | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | davon | | | | | | davon | davon | | | | | Krank- heiten | Krank- heiten | Krank- heiten | Krank- heiten | Krank- heiten | Krank- heiten | Krank- heiten | | | | | Krank- heiten | Krank- heiten | Krank- heiten | Krank- heiten | Krank- heiten | Krank- heiten |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80-101 | 82 | 86 | 89 | 97 | 102-111 | 112-117 | 117 | 118-134 | 118-122 | 135-139 | 140-148 | 144-146 | 149-162 | 163-192 | 165-167 | 168-179 | 180 u. 181 | 182-184 | 185 | 186-189 | 192 | 193-197 | 194 | 198 | 1-198 | | | | |
| 4696 113,6 | 2455 59,4 | 858 20,7 | 570 13,8 | 41 0,99 | 219 5,3 | 1021 24,7 | 196 4,7 | 595 14,4 | 3 0,07 | 479 11,6 | 6757 163,4 | 6127 148,2 | 3118 75,4 | 5746 138,9 | 1864 45,1 | 484 11,7 | 1238 29,9 | 40 0,97 | 20 0,48 | 1514 36,6 | 36 0,87 | 18 0,44 | 6 0,15 | 286 6,9 | 29095 703,5 | | | | |
| 2512 79,4 | 1251 39,6 | 364 11,5 | 475 15,0 | 19 0,60 | 187 5,9 | 721 22,8 | 166 5,2 | 663 21,0 | 49 1,5 | 510 16,1 | 5595 176,8 | 4659 147,2 | 2103 66,5 | 4610 145,7 | 1271 40,2 | 193 6,1 | 1174 37,1 | 20 0,63 | 26 0,82 | 1116 35,3 | 34 1,1 | 10 0,32 | 6 0,19 | 287 9,1 | 21940 693,3 | | | | |
| 2234 86,5 | 1014 39,2 | 482 18,7 | 323 12,5 | 21 0,81 | 124 4,8 | 477 18,5 | 115 4,5 | 445 17,2 | 24 0,93 | 308 11,7 | 4304 166,6 | 3906 151,2 | 2219 85,9 | 3831 148,3 | 1203 46,6 | 121 4,7 | 1001 38,7 | 28 1,1 | 14 0,54 | 886 34,3 | 76 2,9 | 11 0,43 | 3 0,12 | 206 8,0 | 17663 683,6 | | | | |
| 1614 68,6 | 807 34,3 | 387 16,5 | 164 7,0 | 10 0,43 | 89 3,8 | 504 21,4 | 111 4,7 | 323 13,7 | 22 0,94 | 313 13,3 | 2560 108,8 | 2277 96,8 | 1692 71,9 | 2512 105,8 | 804 34,2 | 154 6,5 | 707 30,1 | 22 0,94 | 19 0,81 | 510 21,7 | 32 1,4 | 10 0,43 | 5 0,21 | 165 7,0 | 12388 526,7 | | | | |
| 1649 73,7 | 784 35,1 | 302 13,5 | 263 11,8 | 12 0,54 | 108 4,8 | 359 16,1 | 64 2,9 | 288 12,9 | 6 0,27 | 317 14,2 | 3066 137,1 | 2717 121,5 | 1335 59,7 | 2866 128,1 | 737 33,0 | 273 12,2 | 934 41,8 | 18 0,80 | 11 0,49 | 667 28,9 | 35 1,6 | 17 0,76 | 12 0,54 | 196 8,8 | 12451 556,7 | | | | |
| 2140 83,5 | 934 36,5 | 432 16,9 | 328 12,8 | 25 0,98 | 122 4,8 | 459 17,9 | 136 5,3 | 372 14,5 | 13 0,51 | 237 9,3 | 3165 123,6 | 2821 110,1 | 1572 61,4 | 2693 105,1 | 875 34,2 | 136 5,3 | 603 23,5 | 38 1,5 | 13 0,51 | 673 26,3 | 3 0,12 | 5 0,20 | 2 0,08 | 262 10,2 | 14253 556,4 | | | | |
| 1756 68,0 | 515 19,9 | 513 19,9 | 336 13,0 | 22 0,85 | 120 4,6 | 577 22,4 | 142 5,5 | 419 16,2 | 14 0,54 | 275 10,7 | 3258 126,2 | 2947 114,2 | 1278 49,5 | 2970 115,0 | 951 36,8 | 162 6,3 | 754 29,2 | 34 1,3 | 11 0,43 | 693 26,8 | 71 2,8 | 11 0,43 | 6 0,23 | 281 10,9 | 13772 533,5 | | | | |
| 2391 88,7 | 1232 45,7 | 518 19,2 | 227 8,4 | 19 0,70 | 126 4,7 | 464 17,2 | 110 4,1 | 426 15,8 | 6 0,22 | 303 11,2 | 3825 141,9 | 3385 125,6 | 1963 72,8 | 3344 124,1 | 948 35,2 | 217 8,1 | 880 32,6 | 32 1,2 | 12 0,45 | 817 30,3 | 4 0,15 | 15 0,56 | 10 0,37 | 306 11,4 | 16732 620,7 | | | | |
| 3191 118,7 | 1638 61,0 | 515 19,2 | 525 19,5 | 26 0,97 | 145 5,4 | 474 17,6 | 98 3,6 | 448 16,7 | 2 0,07 | 372 13,8 | 4372 162,7 | 3866 143,9 | 1630 60,7 | 4130 153,7 | 1140 42,4 | 194 7,2 | 1238 46,1 | 25 0,93 | 23 0,86 | 918 34,2 | 68 2,5 | 11 0,41 | 3 0,11 | 302 10,2 | 19011 707,4 | | | | |
| 1873 75,1 | 1084 43,4 | 292 11,7 | 160 6,4 | 16 0,64 | 124 5,0 | 525 21,0 | 101 4,0 | 323 12,9 | 3 0,12 | 271 10,9 | 2867 114,9 | 2542 101,9 | 1579 63,3 | 2417 96,9 | 602 24,1 | 226 9,1 | 656 26,3 | 24 0,96 | 8 0,32 | 556 22,3 | 28 1,1 | 9 0,36 | 5 0,20 | 84 3,4 | 13172 527,9 | | | | |
| 1690 77,1 | 898 41,0 | 306 14,0 | 179 8,2 | 22 1,0 | 106 4,8 | 378 17,2 | 94 4,3 | 303 13,8 | 2 0,09 | 260 11,9 | 3246 148,1 | 2924 133,4 | 1243 56,7 | 2280 104,0 | 698 31,9 | 191 8,7 | 509 23,2 | 25 1,1 | 11 0,50 | 583 26,6 | 38 1,7 | 14 0,64 | 9 0,41 | 197 9,0 | 12241 558,6 | | | | |
| 1958 94,3 | 916 44,1 | 362 17,4 | 279 13,4 | 10 0,46 | 122 5,9 | 315 15,2 | 66 3,2 | 320 15,4 | 3 0,14 | 239 11,5 | 3561 171,5 | 3224 155,2 | 1955 94,1 | 3207 154,4 | 885 42,6 | 195 9,4 | 1024 49,3 | 40 1,9 | 9 0,43 | 645 31,1 | 3 0,14 | 8 0,39 | 5 0,24 | 225 10,8 | 15092 726,7 | | | | |
| 1567 78,5 | 880 44,1 | 159 8,0 | 277 13,9 | 9 0,45 | 89 4,5 | 679 34,0 | 138 6,9 | 136 6,8 | — | 170 8,5 | 2054 102,9 | 1852 92,7 | 1455 72,9 | 1771 88,7 | 440 22,0 | 150 7,5 | 387 19,4 | 9 0,45 | 4 0,20 | 439 22,0 | 7 0,35 | 5 0,25 | 1 0,05 | 106 5,3 | 10857 543,7 | | | | |
| 2900 131,1 | 1428 64,5 | 334 15,1 | 528 23,9 | 21 0,95 | 144 6,5 | 196 8,9 | 35 1,6 | 296 13,4 | — | 263 11,9 | 3496 158,0 | 3220 145,5 | 1773 80,1 | 4173 188,6 | 1031 46,6 | 130 5,8 | 1495 67,5 | 34 1,5 | 17 0,77 | 772 34,9 | 301 13,6 | 16 0,72 | 5 0,23 | 238 10,8 | 17034 770,0 | | | | |
| 3017 94,8 | 1485 46,7 | 540 17,0 | 405 12,7 | 61 1,9 | 146 4,6 | 365 11,5 | 56 1,8 | 397 12,5 | — | 331 10,4 | 4472 140,5 | 4086 128,4 | 2145 67,4 | 3818 120,0 | 1014 31,9 | 167 5,2 | 1192 37,5 | 33 1,0 | 18 0,57 | 917 28,8 | 59 1,9 | 15 0,47 | 6 0,19 | 296 9,3 | 19081 599,5 | | | | |
| 2795 89,5 | 1355 43,4 | 467 15,0 | 449 14,4 | 45 1,4 | 177 5,7 | 726 23,2 | 104 3,3 | 491 15,7 | 8 0,26 | 348 11,1 | 4717 150,1 | 4225 135,3 | 1873 60,0 | 3894 124,7 | 1146 36,7 | 169 5,4 | 1207 38,7 | 26 0,83 | 21 0,67 | 904 28,9 | 53 1,7 | 6 0,19 | 4 0,13 | 278 8,9 | 19084 611,1 | | | | |
| 2760 101,1 | 1226 44,9 | 650 23,8 | 437 16,0 | 30 1,1 | 153 5,6 | 432 15,8 | 96 3,5 | 490 17,9 | 25 0,92 | 463 17,0 | 5229 191,5 | 4685 171,6 | 1735 63,5 | 3755 137,5 | 1033 37,8 | 234 8,6 | 998 36,5 | 24 0,88 | 16 0,59 | 1079 39,3 | 2 0,07 | 2 0,07 | 2 0,07 | 181 6,6 | 18837 689,8 | | | | |
| 1909 64,5 | 968 32,7 | 385 13,0 | 278 9,4 | 25 0,94 | 140 4,7 | 630 21,3 | 138 4,7 | 499 16,9 | 67 2,3 | 358 12,1 | 3440 116,2 | 3089 104,3 | 1675 56,6 | 3227 109,0 | 959 32,4 | 231 7,8 | 892 30,1 | 42 1,4 | 14 0,47 | 650 22,0 | 39 1,3 | 10 0,34 | 6 0,20 | 216 7,3 | 15300 516,7 | | | | |
| 2841 108,1 | 1563 59,5 | 465 17,7 | 334 12,7 | 14 0,53 | 167 6,4 | 316 12,0 | 62 2,4 | 420 16,0 | 2 0,08 | 429 16,3 | 3736 142,1 | 3332 126,8 | 1580 60,1 | 3148 119,8 | 900 34,2 | 260 9,9 | 876 33,8 | 28 1,1 | 11 0,42 | 722 27,5 | 3 0,11 | 19 0,72 | 4 0,15 | 273 10,4 | 16490 627,3 | | | | |
| 1585 77,0 | 669 32,5 | 239 11,6 | 316 15,3 | 10 0,49 | 94 4,6 | 598 29,0 | 151 7,3 | 269 13,1 | 4 0,19 | 266 12,9 | 2707 131,5 | 2404 116,7 | 1522 73,9 | 2263 109,9 | 500 24,3 | 143 6,9 | 594 28,8 | 20 0,97 | 13 0,63 | 545 26,5 | 1 0,05 | 10 0,49 | 4 0,19 | 158 7,7 | 11906 578,2 | | | | |
| 47078 89,4 | 23102 43,9 | 8570 16,3 | 6853 13,0 | 458 0,87 | 2702 5,1 | 10216 19,4 | 2179 4,1 | 7923 15,0 | 253 0,48 | 6507 12,4 | 76427 145,1 | 68258 129,7 | 35445 67,3 | 66655 126,6 | 19001 36,1 | 4030 7,7 | 18359 34,9 | 562 1,1 | 291 0,55 | 15606 29,6 | 893 1,7 | 222 0,42 | 104 0,20 | 4543 8,6 | 326399 619,9 | | | | |

7. Die im Lazarett und Revier vorgekommenen Erkrankungen in ihrem Verhältnis zur Jahres-Iststärke und den Diensttagen.

a. Ohne Unterscheidung in Lazarett- und Revierkranke.

| Armeekorps | Iststärke | Diensttage | Zugang | | Im ganzen sind behandelt einschl. des gewesenen Bestandes | Behandlungstage | | Täglich waren krank Mann | Auf jeden Mann der Iststärke kommen Krankheitstage | Von 1000 Mann der Iststärke waren täglich krank | Auf einen Krankheitstag kommen Dienstage |
|-----------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--|---|--|
| | | | in absoluten Zahlen | auf Tausend der Iststärke | | im ganzen | durchschnittlich für jeden Kranken | | | | |
| Gardekorps | 41355 | 15094575 | 29095 | 703,5 | 29620 | 429598 | 14,5 | 1177,0 | 10,4 | 28,5 | 35,1 |
| I. Armeekorps | 31644 | 11550060 | 21940 | 693,3 | 22456 | 307691 | 13,7 | 843,0 | 9,7 | 26,6 | 37,5 |
| II. Armeekorps | 25839 | 9431235 | 17663 | 683,6 | 18060 | 262534 | 14,5 | 719,3 | 10,2 | 27,8 | 35,9 |
| III. Armeekorps | 23519 | 8584435 | 12388 | 526,7 | 12693 | 190041 | 15,0 | 520,7 | 8,1 | 22,1 | 45,2 |
| IV. Armeekorps | 22365 | 8163225 | 12451 | 556,7 | 12701 | 182220 | 14,3 | 499,2 | 8,1 | 22,3 | 44,8 |
| V. Armeekorps | 25615 | 9349475 | 14253 | 556,4 | 14498 | 196156 | 13,5 | 537,4 | 7,7 | 21,0 | 47,7 |
| VI. Armeekorps | 25815 | 9422475 | 13772 | 533,5 | 14243 | 242988 | 17,1 | 665,7 | 9,4 | 25,7 | 38,8 |
| VII. Armeekorps | 26955 | 9838575 | 16732 | 620,7 | 17136 | 249227 | 14,5 | 682,8 | 9,3 | 25,3 | 39,5 |
| VIII. Armeekorps | 26874 | 9809010 | 19011 | 707,4 | 19389 | 273504 | 14,1 | 749,3 | 10,2 | 27,9 | 35,9 |
| IX. Armeekorps | 24951 | 9107115 | 13172 | 527,9 | 13500 | 204367 | 15,1 | 559,9 | 8,2 | 22,4 | 44,6 |
| X. Armeekorps | 21914 | 7998610 | 12241 | 558,6 | 12548 | 196729 | 15,7 | 539,0 | 9,0 | 24,6 | 40,7 |
| XI. Armeekorps | 20767 | 7579955 | 15092 | 726,7 | 15383 | 204924 | 13,3 | 561,4 | 9,9 | 27,0 | 37,0 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 19968 | 7288320 | 10857 | 543,7 | 11102 | 175822 | 15,8 | 481,7 | 8,8 | 24,0 | 41,5 |
| XIII. (K. W.) Armeekorps . | 22123 | 8074895 | 17034 | 770,0 | 17293 | 228512 | 13,2 | 626,1 | 10,3 | 28,3 | 35,3 |
| XIV. Armeekorps | 31827 | 11616855 | 19081 | 594,2 | 19475 | 286364 | 14,7 | 784,6 | 9,0 | 24,7 | 40,6 |
| XV. Armeekorps | 31228 | 11398220 | 19084 | 611,1 | 19527 | 298479 | 15,3 | 817,8 | 9,6 | 26,2 | 39,0 |
| XVI. Armeekorps | 27308 | 9967420 | 18837 | 689,8 | 19250 | 259555 | 13,5 | 711,1 | 9,5 | 26,0 | 38,4 |
| XVII. Armeekorps | 29609 | 10807285 | 15300 | 516,7 | 15727 | 267512 | 17,0 | 732,9 | 9,0 | 24,8 | 40,4 |
| XVIII. Armeekorps | 26286 | 9594390 | 16490 | 627,3 | 16770 | 226440 | 13,5 | 620,4 | 8,6 | 23,6 | 42,4 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 20592 | 7516080 | 11906 | 578,2 | 12130 | 178407 | 14,7 | 488,8 | 8,7 | 23,7 | 42,1 |
| Armee . . . | 526554 | 192192210 | 326399 | 619,9 | 333501 | 4861070 | 14,6 | 13318,0 | 9,2 | 25,3 | 39,5 |

1) Siehe Anmerkung 1) auf Seite 4*.

b. Mit Unterscheidung in Lazarettkranke, Revierkranke und Lazarett- und Revierkranke.

| Armeekorps | Ort der Behandlung | Zugang | | Im ganzen sind behandelt einschl. des gewesen Bestandes | Ort der Behandlung | Behandlungstage | | Täglich waren krank Mann ¹⁾ | Auf jeden Mann der Iststärke kommen Krankheitstage ¹⁾ | Von 1000 Mann der Iststärke waren täglich krank ¹⁾ | Auf einen Krankheitstag kommen Dienstage ¹⁾ |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| | | in absoluten Zahlen | auf Tausend der Iststärke | | | im ganzen | für jeden Kranken ¹⁾ | | | | |
| Gardekorps | Lazarett | 7545 | 182,4 | 7947 | Lazarett . | 287668 | 27,2 | 788,1 | 7,1 | 19,1 | 52,5 |
| | Revier | 18944 | 458,1 | 19042 | Revier . . | 141930 | 7,5 | 388,8 | 3,4 | 9,4 | 106,4 |
| | Lazarett und Revier . | 2606 | 63,0 | 2631 | | | | | | | |
| I. Armeekorps | Lazarett | 7114 | 224,8 | 7471 | Lazarett . | 218251 | 23,2 | 597,9 | 6,9 | 18,9 | 52,9 |
| | Revier | 12977 | 410,1 | 13047 | Revier . . | 89440 | 6,9 | 245,0 | 2,8 | 7,7 | 129,1 |
| | Lazarett und Revier . | 1849 | 58,4 | 1938 | | | | | | | |
| II. Armeekorps | Lazarett | 5642 | 218,4 | 11 ²⁾ 5975 | Lazarett . | 181381 | 23,3 | 496,9 | 7,0 | 19,3 | 52,0 |
| | Revier | 10266 | 398,1 | 16 ²⁾ 10308 | Revier . . | 81153 | 7,9 | 222,3 | 3,1 | 8,6 | 116,2 |
| | Lazarett und Revier . | 1755 | 67,9 | 9 ²⁾ 1777 | | | | | | | |
| III. Armeekorps | Lazarett | 4498 | 191,2 | 4740 | Lazarett . | 137532 | 24,1 | 376,8 | 5,8 | 16,0 | 62,4 |
| | Revier | 6985 | 294,9 | 6988 | Revier . . | 52509 | 5,4 | 143,9 | 2,2 | 6,1 | 163,5 |
| | Lazarett und Revier . | 955 | 40,6 | 965 | | | | | | | |
| IV. Armeekorps | Lazarett | 5163 | 230,9 | 5388 | Lazarett . | 139764 | 22,5 | 382,9 | 6,2 | 17,1 | 58,4 |
| | Revier | 6469 | 289,2 | 6487 | Revier . . | 42456 | 6,5 | 116,3 | 1,9 | 5,2 | 192,3 |
| | Lazarett und Revier . | 819 | 36,6 | 826 | | | | | | | |
| V. Armeekorps | Lazarett | 4479 | 174,9 | 4670 | Lazarett . | 131499 | 23,2 | 360,3 | 5,1 | 14,1 | 71,1 |
| | Revier | 8776 | 342,6 | 8818 | Revier . . | 64657 | 7,3 | 177,1 | 2,5 | 6,9 | 144,6 |
| | Lazarett und Revier . | 998 | 39,0 | 1010 | | | | | | | |
| VI. Armeekorps | Lazarett | 5374 | 208,2 | 5721 | Lazarett . | 185381 | 25,5 | 507,9 | 7,1 | 19,7 | 50,8 |
| | Revier | 6910 | 267,7 | 6981 | Revier . . | 57607 | 8,3 | 157,8 | 2,2 | 6,1 | 163,6 |
| | Lazarett und Revier . | 1488 | 57,8 | 1541 | | | | | | | |
| VII. Armeekorps | Lazarett | 5117 | 189,8 | 5418 | Lazarett . | 174369 | 25,1 | 477,7 | 6,5 | 17,7 | 56,4 |
| | Revier | 10104 | 374,8 | 10179 | Revier . . | 74858 | 7,4 | 205,1 | 2,8 | 7,6 | 131,4 |
| | Lazarett und Revier . | 1511 | 56,1 | 1539 | | | | | | | |
| VIII. Armeekorps | Lazarett | 5560 | 206,9 | 5840 | Lazarett . | 191150 | 24,3 | 523,7 | 7,1 | 19,5 | 51,3 |
| | Revier | 11456 | 426,3 | 11533 | Revier . . | 82354 | 7,1 | 225,6 | 3,1 | 8,4 | 119,1 |
| | Lazarett und Revier . | 1995 | 74,2 | 2016 | | | | | | | |
| IX. Armeekorps | Lazarett | 5102 | 204,5 | 5363 | Lazarett . | 148711 | 22,8 | 407,4 | 6,0 | 16,3 | 61,2 |
| | Revier | 6908 | 276,9 | 6967 | Revier . . | 55656 | 8,0 | 152,5 | 2,2 | 6,1 | 163,6 |
| | Lazarett und Revier . | 1162 | 46,6 | 1170 | | | | | | | |

1) Die im Lazarett und Revier Behandelten sind hier als Lazarettkranke verrechnet.

2) Siehe Anmerkung 1) auf Seite 4*.

| Armeekorps | Ort der Behandlung | Zugang | | Im ganzen sind behandelt einschl. des gewesenen Bestandes | Ort der Behandlung | Behandlungstage | | Täglich waren krank Mann ¹⁾ | Auf jeden Mann der Iststärke kommen Krankheitstage ¹⁾ | Von 1000 Mann der Iststärke waren täglich krank ¹⁾ | Auf einen Krankheitstag kommen Dienstage ¹⁾ |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| | | in absoluten Zahlen | auf Tausend der Iststärke | | | im ganzen | für jeden Kranken ¹⁾ | | | | |
| X. Armeekorps | Lazarett | 4546 | 207,4 | 4760 | Lazarett . | 142046 | 22,6 | 389,2 | 6,5 | 17,8 | 56,3 |
| | Revier | 6196 | 282,7 | 6253 | Revier . . | 54683 | 8,7 | 149,8 | 2,5 | 6,8 | 146,3 |
| | Lazarett und Revier . | 1499 | 68,4 | 1535 | | | | | | | |
| XI. Armeekorps | Lazarett | 4169 | 200,8 | 4329 | Lazarett . | 126272 | 22,4 | 346,0 | 6,1 | 16,7 | 60,0 |
| | Revier | 9696 | 466,9 | 9747 | Revier . . | 78652 | 8,1 | 215,5 | 3,8 | 10,4 | 96,4 |
| | Lazarett und Revier . | 1227 | 59,1 | 1307 | | | | | | | |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | Lazarett | 3767 | 188,7 | 3947 | Lazarett . | 128649 | 26,3 | 352,5 | 6,4 | 17,7 | 56,7 |
| | Revier | 6161 | 308,5 | 6207 | Revier . . | 47173 | 7,6 | 129,2 | 2,4 | 6,5 | 154,5 |
| | Lazarett und Revier . | 929 | 46,5 | 948 | | | | | | | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | Lazarett | 4172 | 189,2 | 4391 | Lazarett . | 161398 | 27,1 | 442,1 | 7,3 | 20,0 | 50,0 |
| | Revier | 11308 | 511,1 | 11342 | Revier . . | 67114 | 5,9 | 183,9 | 3,0 | 8,3 | 120,3 |
| | Lazarett und Revier . | 1554 | 70,2 | 1560 | | | | | | | |
| XIV. Armeekorps | Lazarett | 6286 | 197,5 | 6581 | Lazarett . | 202207 | 25,1 | 553,7 | 6,3 | 17,4 | 57,5 |
| | Revier | 11319 | 355,7 | 11406 | Revier . . | 84157 | 7,4 | 230,6 | 2,6 | 7,2 | 138,0 |
| | Lazarett und Revier . | 1476 | 46,4 | 1488 | | | | | | | |
| XV. Armeekorps | Lazarett | 6400 | 204,9 | 6772 | Lazarett . | 230077 | 27,4 | 630,3 | 7,4 | 20,2 | 49,5 |
| | Revier | 11079 | 354,8 | 11136 | Revier . . | 68402 | 6,1 | 187,4 | 2,2 | 6,0 | 166,6 |
| | Lazarett und Revier . | 1605 | 51,8 | 1619 | | | | | | | |
| XVI. Armeekorps | Lazarett | 5904 | 216,2 | 6187 | Lazarett . | 174754 | 22,2 | 478,8 | 6,4 | 17,5 | 57,0 |
| | Revier | 11272 | 412,8 | 11371 | Revier . . | 84801 | 7,5 | 232,3 | 3,1 | 8,5 | 117,5 |
| | Lazarett und Revier . | 1661 | 60,8 | 1692 | | | | | | | |
| XVII. Armeekorps | Lazarett | 5021 | 170,6 | 21 ²⁾ 5256 | Lazarett . | 187307 | 26,3 | 513,2 | 6,3 | 17,3 | 57,7 |
| | Revier | 8614 | 290,9 | 9 ²⁾ 8656 | Revier . . | 80205 | 9,1 | 219,7 | 2,7 | 7,4 | 134,7 |
| | Lazarett und Revier . | 1665 | 56,2 | 3 ²⁾ 1815 | | | | | | | |
| XVIII. Armeekorps | Lazarett | 5657 | 215,2 | 5867 | Lazarett . | 161803 | 22,3 | 443,3 | 6,2 | 15,3 | 65,5 |
| | Revier | 9454 | 359,7 | 9506 | Revier . . | 64637 | 6,8 | 177,1 | 2,5 | 6,1 | 163,9 |
| | Lazarett und Revier . | 1379 | 52,5 | 1397 | | | | | | | |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Lazarett | 4177 | 202,8 | 4352 | Lazarett . | 129733 | 23,8 | 355,4 | 6,3 | 17,3 | 57,9 |
| | Revier | 6650 | 322,9 | 6690 | Revier . . | 48674 | 7,3 | 133,4 | 2,4 | 6,5 | 154,4 |
| | Lazarett und Revier . | 1079 | 52,5 | 1088 | | | | | | | |
| Armee | Lazarett | 105693 | 200,7 | 110975 | Lazarett . | 3439952 | 24,4 | 9424,5 | 6,5 | 17,9 | 55,9 |
| | Revier | 191494 | 363,7 | 192664 | Revier . . | 1421118 | 7,4 | 3893,5 | 2,7 | 7,4 | 135,2 |
| | Lazarett und Revier . | 29212 | 55,5 | 29862 | | | | | | | |

¹⁾ Die im Lazarett und Revier Behandelten sind hier als Lazarettkranke verrechnet.

²⁾ Siehe Anmerkung ¹⁾ auf Seite 4*.

8. Die Lazarett- und Revierkranken, geschieden nach Truppengattungen in ihrem Verhältnis zur Häufigkeit der Erkrankungen, zur Behandlungsdauer und zur Art des Abganges.

| Truppengattungen | Ist- stärke | Von den Erkrankten gingen zu | | | | | | | | Es sind behandelt (Bestand und Zugang) | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|--|--|------------------------|--|---------------------------|--|------------------------|--|
| | | dem Lazarett | | dem Revier | | dem Lazarett und Revier | | S u m m e | | im Lazarett | | im Revier | | im Lazarett und Revier | | S u m m e | |
| | | in absoluten Zahlen | in % ⁰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in % ⁰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in % ⁰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in % ⁰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in % ⁰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in % ⁰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in % ⁰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in % ⁰ zur Iststärke der Truppengattung |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infanterie | 337521 | 65292 | 193,4 | 119033 | 352,7 | 18099 | 53,6 | 202424 | 599,7 | 68681 | 203,5 | 119809 | 355,0 | 18460 | 54,7 | 206950 | 613,1 |
| Kavallerie | 59792 | 13153 | 220,0 | 22199 | 371,3 | 3271 | 54,7 | 38623 | 646,7 | 13756 | 230,1 | 22336 | 373,6 | 3363 | 56,2 | 39455 | 659,9 |
| Feldartillerie | 60515 | 12662 | 209,2 | 23655 | 390,9 | 3768 | 62,3 | 40085 | 662,4 | 13265 | 219,2 | 23753 | 392,5 | 3896 | 64,4 | 40914 | 676,1 |
| Fufsartillerie | 21053 | 4512 | 214,3 | 7903 | 375,4 | 1337 | 63,5 | 13752 | 653,2 | 4643 | 220,5 | 7923 | 376,3 | 1373 | 65,2 | 13939 | 662,1 |
| Pioniere | 14000 | 3617 | 258,4 | 6584 | 470,3 | 1075 | 76,8 | 11276 | 805,4 | 3827 | 273,4 | 6625 | 473,2 | 1089 | 77,8 | 11541 | 824,4 |
| Verkehrstruppen | 6134 | 1000 | 163,0 | 2244 | 365,8 | 273 | 44,5 | 3517 | 573,4 | 1044 | 170,2 | 2253 | 367,3 | 274 | 44,7 | 3571 | 582,2 |
| Train | 7695 | 1790 | 232,6 | 3822 | 496,7 | 500 | 65,0 | 6112 | 794,3 | 1865 | 242,4 | 3842 | 499,3 | 501 | 65,1 | 6208 | 806,8 |
| Maschinengewehr- Abteilungen | 746 | 144 | 193,0 | 285 | 382,0 | 25 | 33,5 | 454 | 608,6 | 146 | 195,7 | 285 | 382,0 | 25 | 33,5 | 456 | 611,3 |
| Militärkrankenwärter | 1414 | 415 | 293,5 | 213 | 150,6 | 50 | 35,4 | 678 | 479,5 | 426 | 301,3 | 213 | 150,6 | 51 | 36,1 | 690 | 488,0 |
| Landwehrstämme | 6217 | 527 | 84,8 | 1065 | 171,3 | 118 | 19,0 | 1710 | 275,1 | 572 | 92,0 | 1075 | 172,9 | 122 | 19,6 | 1769 | 284,5 |
| Bekleidungsämter | 3056 | 674 | 220,5 | 969 | 317,1 | 144 | 47,1 | 1787 | 584,8 | 721 | 235,9 | 973 | 318,4 | 148 | 48,4 | 1842 | 602,7 |
| Oberfeuerwerkerschule | 5 | — | — | 4 | 800,0 | — | — | 4 | 800,0 | — | — | 4 | 800,0 | — | — | 4 | 800,0 |
| Artillerie-Prüfungs- Kommission | 256 | 46 | 179,7 | 58 | 226,6 | 6 | 23,4 | 110 | 429,7 | 46 | 179,7 | 59 | 230,5 | 6 | 23,4 | 111 | 433,6 |
| Unteroffizierschulen | 4352 | 763 | 175,3 | 1678 | 385,6 | 230 | 52,8 | 2671 | 613,7 | 803 | 184,5 | 1694 | 389,2 | 231 | 53,1 | 2728 | 626,8 |
| Kriegsschulen | 7 | — | — | 2 | 285,7 | — | — | 2 | 285,7 | — | — | 2 | 285,7 | — | — | 2 | 285,7 |
| Festungsgefängnisse | 1789 | 594 | 332,0 | 1154 | 645,1 | 210 | 117,4 | 1958 | 1094,5 | 642 | 358,9 | 1185 | 662,4 | 217 | 121,3 | 2044 | 1142,5 |
| Arbeiter-Abteilungen bzw. Disziplinar-Abteilung | 419 | 275 | 656,3 | 344 | 821,0 | 58 | 138,4 | 677 | 1615,7 | 296 | 706,4 | 349 | 832,9 | 58 | 138,4 | 703 | 1677,8 |
| Kadettenanstalten | 44 | 4 | 90,9 | 7 | 159,1 | — | — | 11 | 250,0 | 4 | 90,9 | 7 | 159,1 | — | — | 11 | 250,0 |
| Unteroffiziersvorschulen | 244 | 9 | 36,9 | 79 | 323,8 | 5 | 20,5 | 93 | 381,1 | 11 | 45,1 | 81 | 332,0 | 5 | 20,5 | 97 | 397,5 |
| Militär-Bäcker-Abtei- lungen | 855 | 160 | 187,1 | 119 | 139,2 | 18 | 21,1 | 297 | 347,4 | 167 | 195,3 | 119 | 139,2 | 18 | 21,1 | 304 | 355,6 |
| Militär-Veterinär- Akademie | 141 | 12 | 85,1 | 3 | 21,3 | 1 | 7,1 | 16 | 113,5 | 12 | 85,1 | 3 | 21,3 | 1 | 7,1 | 16 | 113,5 |
| Sonstige | 299 | 44 | 147,2 | 74 | 247,5 | 24 | 80,3 | 142 | 474,9 | 48 | 160,5 | 74 | 247,5 | 24 | 80,3 | 146 | 488,3 |
| Summe | 526554 | 105693 | 200,7 | 191494 | 363,7 | 29212 | 55,5 | 326399 | 619,9 | 110975 | 210,8 | 192664 | 365,9 | 29862 | 56,7 | 333501 | 633,4 |

Zweite Abteilung: Dienstunbrauchbarkeit der Mannschaften und ihre Ursachen.

I. Die Dienstunbrauchbaren der ganzen Armee,

geordnet nach Armeekorps, Truppengattung, Dienstgrad, Lebensalter, Dienstalter und nach der Art des Dienst Eintrittes.

| Armeekorps | Zahl der Dienstunbrauchbaren | Truppengattung | | | | | | | | | | | | | | Dienstgrad | Lebensalter | | | | | | Dienstalter | | | | | | Art des Dienst eintrittes | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | Infanterie | Kavallerie | Feldartillerie | Fußartillerie | Pioniere | Verkehrstruppen | Train | Maschinengewehr-Abteilungen | Bekleidungsämter | Landwehrstämme | Unteroffizierschulen | Festungsgefängnisse | Arbeiter-Abteil. b. z. w. Disziplinar-Abteil. | Alle anderen Truppengattungen | | Unteroffiziere | Mannschaften | bis zum vollendeten 20. Lebensjahre | im 21. und 22. Lebensjahre | im 23. und 24. Lebensjahre | im 25.—30. Lebensjahre | nach dem 30. Lebensjahre | im 1. Dienstjahre | | | im 2. Dienstjahre | im 3. Dienstjahre | im 4. Dienstjahre | im 5.—8. Dienstj. | im 9.—12. Dienstj. | ausgehoben | eingetreten als | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | im 1. Monat | im 2.—6. Monat | im 7.—12. Monat | | | | | | | insgesamt | 2., 3.-bezw. 4. jährl. Freiwillige | Einjährig-Freiwillige |
| Gardekorps . . | 406 | 275 | 31 | 20 | 13 | 10 | 44 | 4 | — | 1 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 | 401 | 40 | 207 | 130 | 29 | — | 36 | 273 | 59 | 368 | 30 | 4 | — | 4 | — | 276 | 87 | 43 | 171 |
| I. Armeekorps . | 329 | 228 | 22 | 42 | 9 | 17 | — | 9 | — | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 324 | 14 | 153 | 144 | 18 | — | 23 | 193 | 64 | 280 | 39 | 5 | 2 | 3 | — | 298 | 22 | 9 | 131 |
| II. Armeekorps | 337 | 256 | 23 | 20 | 13 | 5 | — | 10 | — | 2 | 1 | 7 | — | — | — | 2 | 335 | 19 | 125 | 180 | 13 | — | 38 | 197 | 67 | 302 | 29 | 3 | 2 | 1 | — | 304 | 25 | 8 | 143 |
| III. Armeekorps | 275 | 199 | 16 | 31 | — | 11 | — | 6 | 1 | 1 | 3 | — | 7 | — | — | 3 | 272 | 14 | 124 | 114 | 21 | 2 | 25 | 173 | 48 | 246 | 25 | 1 | 3 | — | 228 | 35 | 12 | 132 | |
| IV. Armeekorps | 300 | 197 | 23 | 23 | 23 | 5 | — | 6 | — | — | 1 | 3 | 9 | 10 | — | 1 | 299 | 16 | 139 | 119 | 25 | 1 | 42 | 181 | 41 | 264 | 25 | 7 | 2 | — | 251 | 36 | 13 | 155 | |
| V. Armeekorps | 329 | 224 | 34 | 28 | 27 | 10 | — | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 328 | 12 | 148 | 151 | 15 | 3 | 24 | 178 | 71 | 273 | 44 | 10 | 1 | 1 | — | 294 | 31 | 4 | 161 |
| VI. Armeekorps | 300 | 235 | 18 | 15 | 18 | 5 | — | 3 | — | — | 1 | — | 5 | — | — | 2 | 298 | 14 | 119 | 151 | 16 | — | 35 | 178 | 48 | 261 | 29 | 9 | 1 | — | 258 | 29 | 13 | 123 | |
| VII. Armeekorps | 330 | 259 | 23 | 19 | 10 | 11 | — | 2 | — | 3 | — | — | — | — | 3 | 7 | 323 | 20 | 147 | 126 | 33 | 4 | 21 | 200 | 53 | 274 | 42 | 8 | 4 | 2 | — | 220 | 76 | 34 | 127 |
| VIII. Armeekorps | 514 | 345 | 38 | 55 | 12 | 15 | 5 | 1 | — | 1 | 1 | — | 27 | 12 | 2 | 3 | 511 | 22 | 220 | 200 | 66 | 6 | 63 | 300 | 76 | 439 | 51 | 15 | 6 | 3 | — | 439 | 49 | 26 | 237 |
| IX. Armeekorps | 393 | 338 | 16 | 17 | — | 9 | — | 7 | — | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 4 | 389 | 20 | 164 | 186 | 23 | — | 49 | 224 | 67 | 340 | 46 | 4 | — | 2 | 1 | 325 | 38 | 30 | 34 |
| X. Armeekorps | 249 | 179 | 14 | 43 | — | 1 | — | 7 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | 2 | 247 | 16 | 108 | 110 | 14 | 1 | 46 | 149 | 28 | 223 | 21 | 3 | 1 | 1 | — | 185 | 45 | 19 | 104 |
| XI. Armeekorps | 357 | 276 | 8 | 46 | — | 18 | — | 1 | — | 8 | — | — | — | — | — | 4 | 353 | 12 | 168 | 151 | 26 | — | 27 | 241 | 49 | 317 | 31 | 6 | 2 | 1 | — | 298 | 30 | 29 | 150 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 202 | 161 | 11 | 14 | — | 3 | — | 7 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | 202 | 10 | 119 | 64 | 9 | — | 9 | 146 | 23 | 178 | 19 | 4 | 1 | — | 181 | 15 | 6 | 128 | |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | 466 | 336 | 59 | 43 | — | 14 | — | 3 | — | 3 | 3 | — | 2 | — | 3 | 3 | 463 | 23 | 318 | 107 | 17 | 1 | 57 | 277 | 89 | 423 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 416 | 26 | 24 | 258 |
| XIV. Armeekorps | 425 | 299 | 38 | 38 | 25 | 12 | — | 1 | — | — | 9 | 1 | — | — | 2 | 1 | 424 | 22 | 209 | 174 | 18 | 2 | 36 | 268 | 81 | 385 | 36 | 3 | 1 | — | 360 | 37 | 28 | 195 | |
| XV. Armeekorps | 498 | 359 | 39 | 33 | 35 | 14 | — | 5 | — | 5 | — | 7 | — | — | 1 | 1 | 497 | 5 | 231 | 238 | 18 | 6 | 15 | 354 | 79 | 448 | 39 | 9 | — | 2 | — | 462 | 23 | 13 | 189 |
| XVI. Armeekorps | 444 | 322 | 34 | 40 | 28 | 13 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 443 | 5 | 183 | 237 | 18 | 1 | 5 | 303 | 95 | 403 | 32 | 6 | 1 | 2 | — | 430 | 13 | 1 | 192 |
| XVII. Armeekorps | 310 | 219 | 27 | 27 | 14 | — | — | 4 | — | — | 16 | 3 | — | — | — | 2 | 308 | 28 | 135 | 135 | 12 | — | 16 | 195 | 61 | 272 | 32 | 5 | 1 | — | 268 | 39 | 3 | 120 | |
| XVIII. Armeekorps | 462 | 342 | 36 | 20 | 26 | 13 | — | 3 | — | — | 5 | 7 | 9 | — | 1 | 2 | 460 | 23 | 187 | 224 | 27 | 1 | 37 | 276 | 93 | 406 | 48 | 6 | — | 2 | — | 377 | 53 | 32 | 204 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 237 | 168 | 12 | 28 | 9 | 11 | — | 3 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 236 | 12 | 131 | 90 | 4 | — | 60 | 120 | 37 | 217 | 19 | — | — | 1 | — | 213 | 15 | 9 | 90 |
| Armee | 7163 | 5217 | 522 | 602 | 262 | 197 | 49 | 88 | 1 | 38 | 22 | 48 | 73 | 26 | 18 | 50 | 7113 | 347 | 3335 | 3031 | 422 | 28 | 664 | 4426 | 1229 | 6319 | 673 | 111 | 30 | 26 | 4 | 6083 | 724 | 356 | 3044 |

1) Darunter 19 Mann von Königlich Sächsischen und 22 Mann von Königlich Württembergischen Truppenteilen. — 2) Darunter befinden sich 47 Mann, welche bei ihrer Entlassung militärisch noch nicht ausgebildet waren. — 3) Darunter 18 Festungsgefangene. — 4) Darunter 6 Festungsgefangene. — 5) Darunter 1 Festungsgefangener. — 6) Darunter 1 Festungsgefangener.

2. Die Dienstunbrauchbaren der ganzen Armee,

geordnet nach den Ursachen der Dienstunbrauchbarkeit, nach Armeekorps, nach der Zeit der Entwicklung des Leidens und nach dem Dienstalter.

a. Die Dienstunbrauchbaren, welche bei ihrer Entlassung militärisch noch nicht ausgebildet waren.

| Buchstabe | Ursachen der Dienstunbrauchbarkeit | Armeekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Armee | Das Leiden hat sich entwickelt | | Dienstalter | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------|--------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-------------|----|----------------|---|---|
| | | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K. W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | | | | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | vor der Einstellung | während der aktiven Dienstzeit | im | | | länger dienend | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. bis 6. | | | | 7. bis 12. | Dienstmonat | | | | |
| A. Nach Anlage 1 zu § 4 der H. O. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Oberflächliche Narben | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | | |
| d | Kleine Geschwüre von gutartigem Charakter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | | |
| e | Nicht hindernde Knochenauswüchse | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | | |
| g | Kurzsichtigkeit | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | | |
| h | Herabsetzung der Sehschärfe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | 8 | — | — | | |
| l | Schiefheit, Verkrümmung des Rückgrats | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — | 1 | 5 | 1 | — | |
| m | Ausgebildeter Kropf | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | | |
| n | Verkrüppelung der Nagelglieder der Finger | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |
| p | Die als Bruchanlage bezeichnete bloße Erweiterung des äußeren Leistenringes | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 | — | — | 5 | 6 | 1 | — | |
| s | Einzelne Blutadern an den Beinen | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | |
| t | Geringe Form- und Richtungsfehler an den Beinen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | |
| u | Breitfüßigkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |
| v | Mangel einer Zehe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |
| w | Verunstaltung des Schlüsselbeins | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | |
| x | Sogenannte X- oder O-Beine | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | 4 | 1 | — | — | |
| y | Unausgebildete Plattfüßigkeit | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 16 | 2 | 3 | 12 | 3 | — | — | |
| z | Stärker gekrümmte oder sich zum Teil deckende Zehen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — | — | — | 6 | 1 | — |
| Summe A. | | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | — | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | — | 77 | 75 | 2 | 9 | 58 | 10 | — | — | | |
| B. Nach Anlage 2 zu § 7 der H. O. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Schielen höheren Grades | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |
| b | Mäßiger Grad von chronischer Schwerhörigkeit auf beiden Ohren | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 21 | 21 | — | 3 | 18 | — | — | — | |
| c | Taubheit auf einem Ohr | 1 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 2 | — | — | |
| e | Mangel sämtlicher Schneide-, Augen- und ersten Backzähne in einem Kiefer | — | 4 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 34 | 1 | 2 | 17 | 16 | — | — | |

| Buchstabe, Nummer | Ursachen der Dienstunbrauchbarkeit | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | Armee | Das Leiden hat sich entwickelt | | Dienstalter | | | |
|--|---|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vor der Ein- stellung | während der ak- tiven Dienstzeit | im | | | länger dienend |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. bis 6. | 7. bis 12. | |
| f | Hohler Rücken | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 10 | 10 | — | 1 | 8 | 1 | — |
| g | Ein etwas kurzer oder im Ellenbogen- gelenk etwas gekrümmter Arm | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 20 | 20 | — | 4 | 16 | — | — |
| h | Krümmung oder Steifheit eines Fingers, die den Gebrauch der ganzen Hand nicht erheblich be- hindert | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 5 | — | — | 1 | — | 23 | 22 | 1 | 3 | 19 | 1 | — |
| i | Verlust eines Fingers (ausschl. Daumen und rechter Zeigefinger) und Verlust eines Gliedes an einzelnen Fingern | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 12 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | — |
| k | Abnormes Hervorragendes eines oder beider Fußballen | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — |
| Summe B. | | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 14 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 15 | 17 | 2 | 6 | 7 | 3 | 138 | 133 | 5 | 18 | 98 | 22 | — |
| C. Nach Anlage 3 zu § 8 der H. O. (Krankheiten und Gebrechen, welche zu ihrer Heilung längere Zeit er- fordern und infolgedessen zeitig un- tauglich machen.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gruppe I. Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen | 12 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | — | 4 | 1 | 3 | 7 | — | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 76 | 64 | 12 | 1 | 60 | 13 | 2 |
| | Darunter: Tuberkulose der ersten Luftwege und Lunge | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 2 | Gruppe II. Krankheiten des Nerven- systems | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 1 | 18 | 2 | — |
| 3 | Gruppe III. Krankheiten der At- mungsorgane | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | — | 1 | — | 4 | 1 | — | 9 | 1 | 6 | 4 | — | 8 | 3 | 3 | — | 68 | 59 | 9 | 3 | 56 | 8 | 1 |
| 4 | Gruppe IV. Krankheiten der Kreis- laufs- u. s. w. Organe | 18 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | — | 2 | 1 | 4 | 1 | — | 7 | 2 | 6 | 5 | 71 | 64 | 7 | 11 | 44 | 16 | — |
| 5 | Gruppe V. Krankheiten der Er- nährungsorgane | 5 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | 2 | 23 | 5 | — |
| 6 | Gruppe VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ausschl. der venerischen | 9 | 6 | 5 | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | — | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 82 | 71 | 11 | 10 | 55 | 16 | 1 |
| | Darunter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wasserbrüche | — | 1 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 23 | 22 | 1 | 4 | 16 | 3 | — |
| | Lage eines oder beider Hoden im Bauchringe | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | 5 | 1 | 18 | 16 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 |
| 7 | Gruppe VII. Venerische Krank- heiten | 24 | 7 | 2 | 6 | 17 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | — | 11 | 15 | 1 | 1 | 14 | 142 | 119 | 23 | 1 | 112 | 25 | 4 |
| 8 | Gruppe VIII. Augenkrankheiten . | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 62 | 55 | 7 | 4 | 38 | 18 | 2 |
| | Darunter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Die nach § 36 Absatz 4 der Dienst- anweisung zur Disposition der Ersatzbehörden entlassenen un- ausgebildeten Mannschaften | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — |
| | Chronische Entzündung der Augen- bindehäute | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | — | 39 | 35 | 4 | — | 24 | 13 | 2 |
| | Chronische Entzündung der Tränen- wege | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | — |
| | Augenmuskellähmungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — |
| 9 | Gruppe IX. Ohrenkrankheiten . | 10 | — | — | 1 | 6 | — | — | 1 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | 5 | 2 | 39 | 35 | 4 | 9 | 28 | 2 | — |

| Nummer | Ursachen der Dienstunbrauchbarkeit | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (I. K. S.) Armeekorps | XIII. (K. W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Armee | Das Leiden hat sich entwickelt | | Dienstalter | | | |
|----------|--|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vor der Ein- stellung | während der ak- tiven Dienstzeit | im | | | länger dienend |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2 bis 6. | 7. bis 12. | |
| 10 | Gruppe X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 | 6 | 107 | 87 | 20 | — | 66 | 41 | — |
| Darunter | Chronische Hautausschläge . . . | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 57 | 48 | 9 | — | 33 | 24 | — |
| | Gutartige Geschwülste | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | 7 | 7 | — | — | 6 | 1 | — |
| | Mangel der Kopfhare nach akuten Krankheiten | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | — | 3 | — | — |
| 11 | Gruppe XI. Krankheiten der Bewegungsorgane | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 98 | 95 | 3 | 10 | 74 | 14 | — |
| 12 | Gruppe XII. Mechanische Verletzungen | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 73 | 69 | 4 | 6 | 61 | 5 | 1 |
| Darunter | Knochenbrüche | — | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 3 | 4 | — | 1 | 3 | 2 | — | 28 | 25 | 3 | 2 | 24 | 1 | 1 |
| | Verstauchungen | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 14 | 14 | — | — | 13 | 1 | — |
| | Verrenkungen | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| | Wunden | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — |
| 13 | Gruppe XIII. Andere Krankheiten | 16 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | — | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | — | 77 | 71 | 6 | 7 | 66 | 3 | 1 |
| | Darunter: Allgemeine Körperschwäche | 16 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | — | 75 | 71 | 4 | 7 | 64 | 3 | 1 |
| | Summe C. | 135 | 35 | 37 | 46 | 82 | 30 | 28 | 22 | 55 | 34 | 20 | 47 | 26 | 67 | 37 | 45 | 70 | 35 | 55 | 40 | 946 | 832 | 114 | 65 | 701 | 168 | 12 |
| | D. Nach Anlage 4a zu § 9 der H. O. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schwacher Knochen- und Muskelbau und schwache Körperkonstitution | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 | 12 | 8 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | 4 | 19 | 3 | 157 | 154 | 3 | 13 | 118 | 26 | — |
| 2 | Übermäßige Fettleibigkeit | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | 2 | 5 | — | — |
| 3 | Mit den Knochen verwachsene oder sehr ausgedehnte Narben | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 81 | 71 | 10 | 6 | 59 | 16 | — |
| 4 | Chronische Nervenleiden | 4 | 1 | 4 | — | 2 | 4 | 2 | — | 6 | 2 | 3 | 3 | — | — | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 62 | 56 | 6 | 1 | 43 | 18 | — |
| 5 | Formfehler am Schädel | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — |
| 6 | Unheilbare ausgedehnte Kahlköpfigkeit | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 7 | Umkehrung von Augenlidern | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | — |
| 8 | Tränenfisteln | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 9 | 9 | — | — | 8 | 1 | — |
| 9 | Augenzittern (Nystagmus) | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | — | 2 | 19 | 18 | 1 | 5 | 13 | 1 | — |
| 10 | Herabsetzung der Sehschärfe auf beiden Augen von 1/2 bis mehr als 1/4 | 8 | 7 | 16 | 6 | 7 | 12 | 13 | 7 | 34 | 16 | 14 | 10 | 17 | 13 | 19 | 28 | 14 | 19 | 21 | 16 | 297 | 296 | 1 | 55 | 221 | 21 | — |
| 11 | Kurzsichtigkeit von 0,15 m (6 Zoll) bei Sehschärfe von mehr als 1/4 | 3 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | — | — | — | 3 | 3 | — | 6 | — | 4 | 38 | 38 | — | 13 | 24 | 1 | — |
| 12 | Blindheit auf einem Auge bei guter Gebrauchsfähigkeit des anderen | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 3 | — | 1 | 21 | 20 | 1 | 7 | 12 | 2 | — |
| 14 | Erhebliche, schwer heilbare Krankheitszustände des Gehörapparates | 15 | 17 | 13 | 11 | 13 | 9 | 23 | 14 | 20 | 19 | 13 | 19 | 11 | 12 | 23 | 25 | 38 | 22 | 24 | 9 | 350 | 338 | 12 | 43 | 237 | 69 | 1 |
| 15 | Chronische Verschwörung, Geschwülste u.s.v. der Nasen-, Stirn- oder Oberkieferhöhlen | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | — | 3 | 3 | 67 | 63 | 4 | 8 | 43 | 16 | — |

| Nummer | Ursachen der Dienstunbrauchbarkeit | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.)Armeekorps | XIII. (K.W.)Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.)Armeekorps | Armee | Das Leiden hat sich entwickelt | | | Dienstalter | | | |
|--------|---|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vor der Ein- stellung | während der ak- tiven Dienstzeit | Dienstm. 1. | im | | länger dienend | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. bis 6. | 7. bis 12. | | |
| 16 | Verunstaltung der Nase durch Knochen- oder Knorpelersetzung | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | 4 | 1 | — |
| 17 | Stärkeres Stottern | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 57 | 57 | — | 7 | 48 | 2 | — |
| 18 | Ausgebildeter Kropf | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | 3 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 2 | 3 | 26 | 25 | 1 | 6 | 16 | 4 | — | |
| 19 | Chronische Heiserkeit ohne tiefere Erkrankung des Kehlkopfes | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | — | 22 | 20 | 2 | 1 | 16 | 5 | — | |
| 20 | Schwach gebaute Brust | 4 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 | 4 | 21 | 3 | — | |
| 21 | Chronische Leiden der Atmungsorgane ohne wesentliche Störung des allgemeinen Körperzustandes | 6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 16 | 2 | 7 | 16 | 12 | 23 | 2 | 18 | 1 | 162 | 138 | 24 | 15 | 114 | 30 | 3 | |
| 22 | Asthmatische Beschwerden geringeren Grades | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 44 | 39 | 5 | 1 | 35 | 8 | — | |
| 23 | Nachgewiesener Bluthusten ohne nachweisbare materielle Veränderung der Lunge | 3 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | 3 | 5 | 1 | — | 3 | 1 | 27 | 25 | 2 | 5 | 21 | 1 | — | |
| 24 | Ausgebildete, durch ein Bruchband zurückhaltbare Unterleibsbrüche | 17 | 18 | 15 | 17 | 23 | 39 | 19 | 32 | 23 | 30 | 6 | 19 | 7 | 15 | 17 | 32 | 29 | 9 | 32 | 7 | 406 | 249 | 157 | 69 | 227 | 108 | 2 | |
| 25 | Bedeutende Hämorrhoidalknoten | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | 3 | 2 | — | |
| 26 | Bildungsfehler der Harnröhre von Bedeutung | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | |
| 27 | Größerer, eine Geschwulst darstellender Krampfaderbruch | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 12 | 12 | — | — | 11 | 1 | — | |
| 30 | Verlust des rechten Zeigefingers | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| 32 | Verlust einzelner Glieder an mehr als 2 Fingern einer Hand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | |
| 33 | Krümmung oder Steifheit eines Fingers, die den Gebrauch der ganzen Hand erheblich behindert | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | 22 | 19 | 3 | 4 | 14 | 4 | — | |
| 34 | Stärkere Erweiterung der Blutadern | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | — | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 85 | 84 | 1 | 11 | 59 | 15 | — | |
| 35 | Bedeutende, von Unterschenkelgeschwüren zurückgebliebene, zum Wiederaufbruch neigende Narben | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | — | |
| 36 | Ausgebildeter Plattfuß | 9 | 5 | 9 | 17 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 19 | 6 | 24 | 14 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 168 | 166 | 2 | 13 | 118 | 37 | — | |
| 37 | Erhebliche Verstümmelung einer großen Zehe | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 | 4 | 1 | — | 3 | 2 | — | |
| 39 | Andauernde Schwäche des Fußgelenks oder anderer größerer Gelenke | 9 | 7 | 26 | 14 | 9 | 10 | 6 | 17 | 12 | 14 | 3 | 17 | 10 | 8 | 13 | 6 | 5 | 11 | 12 | 2 | 211 | 201 | 10 | 13 | 160 | 37 | 1 | |
| | Summe D. | 110 | 100 | 128 | 101 | 93 | 114 | 105 | 123 | 169 | 137 | 75 | 139 | 65 | 110 | 149 | 182 | 160 | 112 | 177 | 73 | 2422 | 2167 | 255 | 305 | 1669 | 441 | 7 | |
| | E. Nach Anlage 4 b zu § 9 der H. O. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Verkrüppelung oder Mißgestaltung des ganzen Körpers | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 2 | Bösartige Geschwülste und Geschwüre | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| 3 | Mit den Knochen verwachsene oder sehr ausgedehnte, die Funktion eines Körperteils verhindernde Narben | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | — | |

| Nummer | Ursachen der Dienstunbrauchbarkeit | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | Armee | Das Leiden hat sich entwickelt | | | Dienstalter | | | |
|--------|--|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|----|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vor der Ein- stellung | während der ak- tiven Dienstzeit | im | | | länger dienend | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. bis 6. | 7. bis 12. | | Dienstmonat |
| 4 | Erhebliche chronische Drüsenleiden | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 4 | — | 1 | 2 | — | — | 4 | — | 2 | — | 1 | — | 27 | 15 | 12 | 1 | 8 | 16 | 2 | |
| 5 | Große, nicht heilbare Geschwülste, Auswüchse | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | — | 1 | |
| 6 | Chronische entzündliche Knochenleiden (Karies, Nekrose) | — | 2 | 5 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 33 | 29 | 4 | 5 | 23 | 5 | — | |
| 7 | Progressive Muskelatrophie und andere Entartungen u. s. w. der Muskeln | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 4 | — | 5 | 25 | 25 | — | 1 | 22 | 2 | — | |
| 8 | Chronische Krankheiten der Blutgefäße | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | |
| 9 | Leukämie, perniziöse Anämie | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | 1 | 4 | 1 | |
| 10 | Bluterkrankheit | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | 3 | 1 | — | |
| 11 | Harnruhr | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 16 | 14 | 2 | 3 | 11 | 2 | — | |
| 12 | Chronische, nachweisbare Gicht . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 13 | Chronischer Gelenkrheumatismus (einschl. Arthritis deformans) | 1 | 4 | 2 | 3 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | — | 34 | 33 | 1 | 2 | 22 | 10 | — | |
| 14 | Geisteskrankheiten, geistige Beschränktheit | 15 | 24 | 21 | 13 | 32 | 20 | 17 | 20 | 50 | 26 | 16 | 23 | 13 | 30 | 30 | 31 | 13 | 27 | 21 | 25 | 467 | 384 | 83 | 21 | 297 | 120 | 29 | |
| 15 | Nachgewiesene Epilepsie | 12 | 21 | 20 | 13 | 15 | 19 | 8 | 17 | 22 | 18 | 12 | 15 | 14 | 11 | 18 | 25 | 18 | 19 | 12 | 19 | 328 | 297 | 31 | 22 | 210 | 91 | 5 | |
| 16 | Andere chronische Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten (z. B. Tabes) | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 24 | 20 | 4 | 1 | 19 | 4 | — | |
| 17 | Andere chronische Nervenleiden erster Art | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | — | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 8 | 20 | 16 | 15 | 14 | 10 | 3 | 12 | 10 | 168 | 147 | 21 | 4 | 106 | 54 | 4 | |
| 18 | Mißgestaltungen, Substanzverluste u. s. w. an den Schädelknochen | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 8 | 8 | — | — | 7 | 1 | — | |
| 19 | Herabsetzung der Sehschärfe auf 1/4 oder weniger | 4 | 3 | 4 | 2 | — | 9 | 8 | 9 | 15 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 124 | 123 | 1 | 22 | 97 | 5 | — | |
| 20 | Blindheit auf beiden Augen oder auf einem Auge bei beschränkter Gebrauchsfähigkeit des anderen | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | 3 | — | — | 2 | 17 | 16 | 1 | 3 | 12 | 2 | — | |
| 21 | Taubheit oder unheilbare erhebliche Schwerhörigkeit auf beiden Ohren | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | — | 5 | 8 | — | 4 | — | — | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | — | 54 | 53 | 1 | 8 | 35 | 11 | — | |
| 24 | Geschwülste und bösartige Geschwüre am Munde | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | |
| 27 | Stummheit, Taubstummheit | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | |
| 28 | Kropf hohen Grades | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 29 | Bildungsfehler und erhebliche chronische Leiden des Kehlkopfes und der Luftröhre | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 3 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | |
| 30 | Verengung der Speiseröhre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | Auffallende Schiefheit des Halses mit Störung der Bewegungsfähigkeit | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | 8 | 8 | — | 2 | 5 | 1 | — | |
| 32 | Bedeutende Verkrümmung des Rückgrats | 1 | — | — | 2 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 4 | — | 1 | 1 | — | 19 | 19 | — | 2 | 16 | 1 | — | |
| 33 | Erhebliche Mißbildung des Brustkastens | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 1 | 2 | — | — | |

| Nummer | Ursachen der Dienstunbrauchbarkeit | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | Armee | Das Leiden hat sich entwickelt | | | Dienstalter | | | |
|---|--|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vor der Ein- stellung | während der ak- tiven Dienstzeit | Dienstmonat | im | | | länger dienend |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. bis 6. | 7. bis 12. | |
| 34 | Fehler, chronische Leiden der Lunge und des Brustfelles mit wesentlicher Störung des Atmens bzw. des allgemeinen Körperzustandes | 4 | 8 | 10 | 5 | 2 | 9 | 12 | 3 | 13 | 8 | 6 | 8 | 5 | 13 | 16 | 19 | 24 | 10 | 11 | 3 | 189 | 163 | 26 | 24 | 145 | 17 | 3 | |
| 35 | Nachgewiesene, häufig wiederkehrende asthmatische Anfälle | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 11 | 11 | — | 2 | 8 | 1 | — | |
| 36 | Fehler und chronische Krankheiten des Herzens, des Herzbeutels und der großen Gefäße | 17 | 11 | 25 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 52 | 36 | 27 | 26 | 7 | 76 | 30 | 41 | 37 | 9 | 53 | 7 | 563 | 524 | 39 | 77 | 422 | 62 | 2 | |
| 38 | Ausgebildete, durch ein Bruchband nicht zurückhaltbare Unterleibsbrüche | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 1 | 2 | — | — | |
| 39 | Fehler und chronische Leiden der Unterleibsorgane mit Ernährungsstörungen | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 100 | 84 | 16 | 4 | 60 | 34 | 2 |
| 40 | Chronischer Mastdarmvorfall . . . | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 9 | 4 | — | 6 | 7 | — | |
| 41 | Chronische Leiden der Urinwerkzeuge | 9 | 17 | 2 | 4 | 3 | — | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 49 | 12 | 7 | 5 | 5 | 11 | 3 | 167 | 160 | 7 | 9 | 120 | 38 | — | |
| 42 | Bösartige Geschwülste des Hodens und Samenstranges | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | |
| 43 | Verlust eines größeren Gliedes . . | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — | 1 | 2 | — | |
| 44 | Erhebliche Verlängerung, Verkürzung, Verkrümmung der Gliedmaßen | 3 | 6 | 3 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 40 | 36 | 4 | 5 | 30 | 5 | — | |
| 45 | Übermäßiges Wachstum, Lähmung, Schwund der Gliedmaßen | — | 2 | 2 | — | 2 | 4 | 4 | 4 | — | 2 | 1 | — | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 42 | 39 | 3 | 7 | 31 | 4 | — | |
| 46 | Chronische Krankheiten und wesentliche Fehler größerer Gelenke | 4 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 | 2 | 13 | 8 | 16 | 7 | 6 | 6 | 3 | 144 | 134 | 10 | 26 | 99 | 19 | — | |
| 47 | Verlust, Verstümmelung, Steifheit oder Verkrümmung eines Daumens | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | — | |
| 48 | Steifheit oder Krümmung eines Fingers, die den Gebrauch der Hand und die Handhabung der Waffe verhindert | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 6 | 4 | 2 | — | 4 | 2 | — | |
| 49 | Überzahl eines Fingers unter gleicher Voraussetzung wie bei No. 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| 50 | Sehr große Blutaderknoten an den Beinen | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 6 | 6 | — | — | 3 | — | 3 | |
| 51 | Veraltete Geschwüre von größerer Ausdehnung an den Unterschenkeln | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 52 | Verbildung eines Fußes (Klumpfuß, Spitzfuß, hochgradiger Plattfuß) | — | 2 | 5 | 1 | — | 2 | 1 | 5 | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 36 | 35 | 1 | 2 | 19 | 15 | — | |
| 54 | Bedeutende, das Tragen der militärischen Fußbekleidung verhin-dernde Krümmung einer oder mehrerer Zehen | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 2 | — | 3 | 1 | — | 14 | 14 | — | 3 | 11 | — | — | |
| 55 | Überzahl der Zehen unter gleicher Voraussetzung wie bei No. 54 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | |
| 56 | Sonstige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Summe E. | | 100 | 133 | 124 | 94 | 96 | 120 | 125 | 120 | 216 | 152 | 116 | 123 | 85 | 237 | 179 | 209 | 168 | 111 | 166 | 95 | 2769 | 2478 | 291 | 268 | 1896 | 551 | 54 | |
| Außerdem Mindermaße | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| Gesamtsumme aller nicht militärisch ausgebildeten Dienstunbrauchbaren (A. bis E.) | | 367 | 277 | 303 | 247 | 279 | 272 | 266 | 270 | 460 | 338 | 222 | 318 | 181 | 416 | 385 | 454 | 402 | 273 | 408 | 215 | 6353 | 5686 | 667 | 665 | 4423 | 1192 | 73 | |

¹⁾ Siehe Anmerkungen 2, 3, 4, 5 u. 6 auf Seite 80*.

Anhang.

Übersicht der unmittelbar nach der Einstellung wegen körperlicher Untauglichkeit zum Dienst im aktiven Heere wieder Entlassenen, geordnet nach den Ursachen der Dienstuntauglichkeit, nach Armeekorps und nach ihrem Dienstalter.

| Buchstabe | Ursachen der Dienstuntauglichkeit | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1. K. S.) Armeekorps | XIII. (K. W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Armee | Dienstalter im | | | | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|----|----|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. bis 6. | 7. bis 12. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dienstmonat | | | | | | | |
| d | A. Nach Anlage 1 zu § 4 der H. O. Kleine Geschwülste von gutartigem Charakter, die weder das Tragen der Kleidung noch der Waffe verhindern | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | | | | |
| h | Herabsetzung der Sehschärfe | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 4 | — | — | | |
| l | Leichte Krümmung des Nackens, nicht auffallende Schiefheit des Halses, nicht auffallende Erhöhung der einen Schulter oder Hüfte | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | 1 | — | | | |
| p | Die als Bruchanlage bezeichnete bloße Erweiterung des äußeren Leistenringes | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 5 | — | — | | |
| r | Erweiterung der Blutadern am Samenstrange | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | | |
| w | Verunstaltung des Schlüsselbeins | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | | |
| z | Stärker gekrümmte oder sich zum Teil deckende Zehen | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | | |
| § | § 53 e Abs. 2. | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | | |
| | Summe A. | 7 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 3 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | — | |
| a | B. Nach Anlage 2 zu § 7 der H. O. Schielen höheren Grades. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| b | Mäßiger Grad von chronischer Schwerhörigkeit auf beiden Ohren | 2 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | — |
| c | Taubheit auf einem Ohr | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 8 | 2 | — | |
| d | Einfache Hasenscharten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| e | Mangel sämtlicher Schneide-, Augen- und ersten Backzähne in einem Kiefer | 11 | 4 | 5 | 2 | — | 6 | 55 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | 127 | 126 | 1 | — | — | | |
| f | Hohler Rücken | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | | |
| g | Ein etwas kurzer oder im Ellenbogengelenk etwas gekrümmter Arm | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 34 | 3 | — | | |
| h | Krümmung oder Steifheit eines Fingers, die den Gebrauch der ganzen Hand nicht erheblich behindert | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | — | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 46 | 38 | 8 | — | | |
| i | Verlust eines Fingers (ausschl. Daumen und rechter Zeigefinger) und Verlust eines Gliedes an einzelnen Fingern | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 11 | 10 | 1 | — | | |
| k | Abnormes Hervorragen eines oder beider Fußballen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| | Summe B. | 22 | 8 | 12 | 5 | 6 | 10 | 65 | 14 | 18 | 16 | 13 | 13 | 3 | 5 | 12 | 16 | 4 | 12 | 13 | 2 | — | — | 269 | 246 | 23 | — | — | | |

| Nummer | Ursachen der Dienstuntauglichkeit | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (I. K. S.) Armeekorps | XIII. (K. W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Armee | Dienstalter im | | |
|--------|--|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. bis 6. | 7. bis 12. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dienstmonat | | |
| 12 | Gruppe XII. Mechanische Verletzungen | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 100 | 90 | 10 | — |
| | Darunter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Knochenbrüche | 3 | 3 | 2 | — | 4 | — | 2 | 4 | 4 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | 38 | 3 | — |
| | Verstauchungen | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | — |
| | Verrenkungen | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 1 | — |
| | Wunden | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 6 | 4 | 2 | — |
| 13 | Gruppe XIII. Andere Krankheiten | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | — | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 87 | 82 | 4 | 1 |
| | Darunter: Allgemeine Körperschwäche | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | — | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 87 | 82 | 4 | 1 |
| | Summe C. | 122 | 42 | 30 | 32 | 58 | 18 | 48 | 27 | 49 | 31 | 40 | 47 | 48 | 35 | 18 | 61 | 25 | 49 | 41 | 65 | 886 | 661 | 223 | 2 |
| | D. Nach Anlage 4a zu § 9 der H. O. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Schwacher Knochen- und Muskelbau und schwache Körperkonstitution | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 1 | 8 | 3 | — | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 90 | 76 | 14 | — |
| 2 | Übermäßige Fettleibigkeit | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 1 | — |
| 3 | Mit den Knochen verwachsene oder sehr ausgedehnte Narben | 2 | — | 4 | 5 | 1 | — | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | 3 | 3 | 3 | 1 | 46 | 44 | 1 | 1 |
| 4 | Chronische Nervenleiden | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 18 | 9 | 9 | — |
| 5 | Formfehler am Schädel | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 9 | 9 | — | — |
| 6 | Unheilbare ausgedehnte Kahlköpfigkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — |
| 7 | Umkehrung von Augenlidern | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 1 | — | — | 11 | 8 | 3 | — |
| 8 | Tränenfisteln | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 12 | 9 | 3 | — |
| 9 | Augenzittern (Nystagmus) | 1 | 5 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 4 | — | 4 | 26 | 25 | 1 | — |
| 10 | Herabsetzung der Sehschärfe auf beiden Augen von 1/2 bis mehr als 1/4 | 8 | 18 | 6 | 9 | 1 | 9 | 11 | 10 | 26 | 9 | 4 | 12 | 28 | 6 | 5 | 17 | 1 | 16 | 13 | 14 | 223 | 146 | 77 | — |
| 11 | Kurzichtigkeit von 0,15 m (6 Zoll) bei Sehschärfe von mehr als 1/4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | 4 | 1 | 5 | 47 | 40 | 7 | — |
| 12 | Blindheit auf einem Auge bei guter Gebrauchsfähigkeit des anderen | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | — | 2 | 1 | — | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 41 | 36 | 5 | — |
| 14 | Erhebliche schwer heilbare Krankheitszustände des Gehörapparates | 45 | 33 | 34 | 37 | 25 | 21 | 73 | 23 | 52 | 22 | 34 | 35 | 42 | 16 | 21 | 36 | 42 | 25 | 22 | 25 | 663 | 537 | 126 | — |
| 15 | Chronische Verschwämung, Geschwülste u. s. w. der Nasen-, Stirn- oder Oberkieferhöhlen | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | — | 2 | 3 | 5 | 2 | — | 5 | 2 | — | — | 5 | 50 | 38 | 12 | — |
| 16 | Verunstaltung der Nase durch Knochen- oder Knorpelzerstörung | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — |
| 17 | Stärkeres Stottern | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | — |
| 18 | Ausgebildeter Kropf | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | — |

| Nummer | Ursachen der Dienstuntauglichkeit | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1. K.S.) Armeekorps | XIII. (K. W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2. K.S.) Armeekorps | Armee | Dienstalter im | | |
|--------|---|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. bis 6. | 7. bis 12. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dienstmonat | | |
| 19 | Chronische Heiserkeit ohne tiefere Erkrankung des Kehlkopfes | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 6 | 4 | 2 | — |
| 20 | Schwach gebaute Brust | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 3 | 39 | 37 | 2 | — |
| 21 | Chronische Leiden der Atmungsorgane ohne wesentliche Störung des allgemeinen Körperzustandes | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 15 | — | 108 | 71 | 37 | — |
| 22 | Asthmatische Beschwerden geringeren Grades | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | — | 13 | 8 | 5 | — |
| 23 | Nachgewiesener Bluthusten ohne nachweisbare materielle Veränderung der Lunge. | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 11 | 6 | 5 | — |
| 24 | Ausgebildete, durch ein Bruchband zurückhaltbare Unterleibsbrüche | 49 | 50 | 37 | 29 | 32 | 29 | 83 | 50 | 46 | 25 | 43 | 31 | 38 | 27 | 56 | 58 | 42 | 44 | 36 | 39 | 844 | 812 | 32 | — |
| 25 | Bedeutende Hämorrhoidalknoten . . | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 27 | Größerer, eine Geschwulst darstellender Krampfadernbruch | 4 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 12 | 12 | — | — |
| 28 | Verlust oder Schwund beider Hoden | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — |
| 30 | Verlust des rechten Zeigefingers . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — |
| 33 | Krümmung oder Steifheit eines Fingers, die den Gebrauch der ganzen Hand erheblich behindert | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | — | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 43 | 37 | 6 | — |
| 34 | Stärkere Erweiterung der Blutadern | 20 | 16 | 1 | 7 | 3 | 14 | 16 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | — | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 131 | 122 | 9 | — |
| 35 | Bedeutende, von Unterschenkelgeschwüren zurückgebliebene, zum Wiederaufbruch neigende Narben | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 | 3 | 2 | — |
| 36 | Ausgebildeter Plattfuß | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 67 | 59 | 8 | — |
| 37 | Erhebliche Verstümmelung einer großen Zehe | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| 39 | Andauernde Schwäche des Fußgelenks oder anderer größerer Gelenke | 5 | 4 | 4 | 2 | — | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 1 | 57 | 49 | 8 | — |
| | Summe D. | 158 | 167 | 112 | 122 | 81 | 110 | 259 | 143 | 200 | 96 | 128 | 110 | 143 | 77 | 109 | 160 | 109 | 127 | 117 | 113 | 2641 | 2254 | 386 | 1 |
| | E. Nach Anlage 4b zu § 9 der H. O. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bösartige Geschwülste und Geschwüre | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — |
| 3 | Mit dem Knochen verwachsene oder sehr ausgedehnte, die Funktion eines Körperteils verhindernde Narben | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 2 | 2 | — |
| 4 | Erhebliche chronische Drüsenleiden | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 11 | 9 | 2 | — |
| 5 | Grofse, nicht heilbare Geschwülste, Auswüchse | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — |
| 6 | Chronische entzündliche Knochenleiden (Karies, Nekrose) | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 11 | 8 | 3 | — |

| Nummer | Ursachen der Dienstuntauglichkeit | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (I. K. S.) Armeekorps | XIII. (K. W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Armee | Dienstalter im | | | | |
|--------|--|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dienstmonat | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. bis 6. | 7. bis 12. | | |
| 7 | Progressive Muskelatrophie und andere Entartungen u. s. w. der Muskeln | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | 10 | — | — | |
| 8 | Chronische Krankheiten der Blutgefäße | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 9 | Leukämie, perniziöse Anämie . . . | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 2 | — | |
| 10 | Bluterkrankheit | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | |
| 11 | Harnruhr | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | |
| 13 | Chronischer Gelenkrheumatismus (einschließlich Arthritis deformans) | — | 3 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | — | |
| 14 | Geisteskrankheiten, geistige Beschränktheit | 2 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 22 | 9 | 13 | — | — | |
| 15 | Nachgewiesene Epilepsie | 5 | 2 | 4 | — | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | — | 3 | 3 | 54 | 33 | 21 | — | — | |
| 16 | Andere chronische Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten (z. B. Tabes) | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 | 2 | 4 | — | |
| 17 | Andere chronische Nervenleiden ernster Art | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 2 | — | 23 | 8 | 15 | — | — | |
| 18 | Mißgestaltungen, Substanzverluste u. s. w. an den Schädelknochen | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | |
| 19 | Herabsetzung der Sehschärfe auf 1/4 oder weniger | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 78 | 58 | 20 | — | — | |
| 20 | Blindheit auf beiden Augen oder auf einem Auge bei beschränkter Gebrauchsfähigkeit des anderen | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 4 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 14 | 12 | 2 | — | — | |
| 21 | Taubheit oder unheilbare erhebliche Schwerhörigkeit auf beiden Ohren | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 1 | 1 | 43 | 25 | 18 | — | — | |
| 25 | Komplizierte Hasenscharten . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — |
| 27 | Stummheit, Taubstummheit . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 28 | Kropf hohen Grades | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | |
| 29 | Bildungsfehler und erhebliche chronische Leiden des Kehlkopfes und der Luftröhre | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | |
| 31 | Auffallende Schiefheit des Halses mit Störung der Bewegungsfähigkeit | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 3 | — | — | — | |
| 32 | Bedeutende Verkrümmung des Rückgrats | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 14 | 14 | — | — | |
| 33 | Erhebliche Mißbildung des Brustkastens | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | |
| 34 | Fehler, chronische Leiden der Lunge und des Brustfelles mit wesentlicher Störung des Atmens bzw. des allgemeinen Körperzustandes | 13 | 15 | 8 | 13 | 2 | 10 | 9 | 16 | 27 | 4 | 16 | 11 | 3 | 15 | 18 | 18 | 15 | 8 | 13 | 11 | 245 | 185 | 60 | — | — | |
| 35 | Nachgewiesene, häufig wiederkehrende asthmatische Anfälle | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 2 | — | |

| Nummer | Ursachen der Dienstuntauglichkeit | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1. K. S.) Armeekorps | XIII. (K. W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2. K. S.) Armeekorps | Armee | Dienstalter im | | | |
|--------|---|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dienstmonat | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. bis 6. | 7. bis 12. | |
| 36 | Fehler und chronische Krankheiten des Herzens, des Herzbeutels und der grossen Gefässe | 17 | 23 | 20 | 14 | 19 | 23 | 60 | 31 | 75 | 8 | 30 | 40 | 26 | 41 | 33 | 27 | 28 | 19 | 42 | 46 | 622 | 498 | 123 | 1 | |
| 38 | Ausgebildete, durch ein Bruchband nicht zurückhaltbare Unterleibsbrüche | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 8 | 7 | 1 | — | |
| 39 | Fehler und chronische Leiden der Unterleibseingeweide mit Ernährungsstörungen | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | 1 | — | 2 | 2 | 22 | 12 | 9 | 1 | |
| 40 | Chronischer Mastdarmvorfall . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| 41 | Chronische Leiden der Urinwerkzeuge | 1 | 6 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 4 | — | 41 | 25 | 16 | — | |
| 42 | Bösartige Geschwülste des Hodens und Samenstranges | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | — | |
| 44 | Erhebliche Verlängerung, Verkürzung, Verkrümmung der Gliedmassen | 3 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 27 | 21 | 6 | — | |
| 45 | Übermässiges Wachstum, Lähmung, Schwund der Gliedmassen | 2 | 1 | 4 | — | — | 3 | 6 | 2 | 4 | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | — | 2 | 2 | — | 31 | 26 | 5 | — | |
| 46 | Chronische Krankheiten und wesentliche Fehler grösserer Gelenke | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 108 | 91 | 17 | — | |
| 47 | Verlust, Verstümmelung, Steifheit oder Verkrümmung eines Daumens | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | — | |
| 48 | Steifheit oder Krümmung eines Fingers, die den Gebrauch der Hand und die Handhabung der Waffen verhindert | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 9 | 9 | — | — | |
| 50 | Sehr grosse Blutaderknoten an den Beinen | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 1 | — | |
| 52 | Verbildung eines Fusses (Klumpfuß, Spitzfuß, hochgradiger Plattfuß) | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 5 | 4 | 1 | — | |
| 54 | Bedeutende, das Tragen der militärischen Fußbekleidung verhindernde Krümmung einer oder mehrerer Zehen | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | 1 | — | |
| 55 | Überzahl der Zehen unter gleicher Voraussetzung wie bei No. 54 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| | Summe E. | 59 | 83 | 64 | 54 | 33 | 68 | 125 | 76 | 153 | 35 | 90 | 82 | 53 | 80 | 76 | 76 | 61 | 55 | 84 | 78 | 1485 | 1127 | 356 | 2 | |
| | Gesamtsumme A—E. | 368 | 300 | 218 | 213 | 179 | 207 | 499 | 260 | 423 | 178 | 272 | 254 | 248 | 197 | 215 | 313 | 199 | 243 | 257 | 260 | 5303 | 4309 | 989 | 5 | |
| | Außerdem Mindermafs | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 3 | — | — | — | — | 12 | 9 | 3 | — | |
| | Gesamtsumme der Dienstuntauglichen | 368 | 300 | 219 | 213 | 179 | 208 | 499 | 262 | 423 | 178 | 273 | 255 | 249 | 197 | 217 | 316 | 199 | 243 | 257 | 260 | 5315 | 4318 | 992 | 5 | |

Dritte Abteilung: Halbinvalidität der Mannschaften und ihre Ursachen.

Vorbemerkung: Die bei den Ursachen der Halbinvalidität angegebenen Nummern beziehen sich auf diejenigen der Beilage IIa der Dienstanweisung vom 1. Februar 1894.

I. Die Halbinvaliden der ganzen Armee, geordnet nach Armeekorps, Truppengattung, Dienstgrad, Lebensalter, Dienstalter, dem Grunde und der Dauer der Halbinvalidität.

| Armeekorps | Zahl der Halb- invaliden | Truppengattung | | | | | | | | | | | | | | Dienstgrad | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|
| | | Infanterie | Kavallerie | Feldartillerie | Fußartillerie | Pioniere | Verkehrstruppen | Train | Maschinengewehr- Abteilungen | Bekleidungsämter | Landwehrstämme | Unteroffizier- schulen | Festungsgefäng- nisse | Arbeiter-Abtei- lungen bzw. Disziplinar- Abteilung | Alle anderen Truppengattungen | Unteroffiziere | Mannschaften |
| Gardekorps | 396 | 292 | 49 | 29 | 16 | 5 | 49 | 9 | — | 3 | — | 3 | — | — | 1 | 219 | 177 |
| I. Armeekorps . . . | 286 | 170 | 51 | 33 | 7 | 17 | — | 3 | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 161 | 125 |
| II. Armeekorps . . . | 187 | 134 | 22 | 14 | 9 | 2 | — | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 85 | 102 |
| III. Armeekorps . . . | 173 | 105 | 21 | 20 | — | 9 | 2 | 5 | — | — | 9 | — | 2 | — | — | 99 | 74 |
| IV. Armeekorps . . . | 238 | 135 | 35 | 24 | 18 | 9 | — | 5 | — | — | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 136 | 102 |
| V. Armeekorps . . . | 125 | 77 | 13 | 16 | 7 | 1 | — | 5 | — | 1 | 5 | — | — | — | — | 81 | 44 |
| VI. Armeekorps . . . | 188 | 108 | 29 | 20 | 17 | 5 | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 2 | 93 | 95 |
| VII. Armeekorps . . . | 219 | 146 | 21 | 32 | 7 | 3 | — | 3 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 117 | 102 |
| VIII. Armeekorps . . . | 189 | 108 | 21 | 29 | 11 | 3 | 1 | 9 | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 86 | 103 |
| IX. Armeekorps . . . | 188 | 141 | 29 | 10 | — | 3 | — | 1 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 115 | 73 |
| X. Armeekorps . . . | 190 | 120 | 31 | 23 | — | 9 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 96 | 94 |
| XI. Armeekorps . . . | 149 | 99 | 15 | 26 | — | 3 | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — | 65 | 84 |
| XII.(1.K.S.)Armeekorps | 99 | 56 | 18 | 15 | — | 3 | — | 2 | — | 2 | — | — | 3 | — | — | 24 | 75 |
| XIII. (K.W.) Armeekorps | 144 | 96 | 14 | 23 | — | 4 | — | 2 | — | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 70 | 74 |
| XIV. Armeekorps . . . | 206 | 144 | 22 | 16 | 11 | 3 | — | 5 | — | 2 | — | 3 | — | — | — | 94 | 112 |
| XV. Armeekorps . . . | 215 ¹⁾ | 129 | 18 | 23 | 17 | 16 | — | 9 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 90 | 125 |
| XVI. Armeekorps . . . | 200 | 112 | 29 | 28 | 11 | 11 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | 124 | 76 |
| XVII. Armeekorps . . . | 202 | 120 | 27 | 26 | 14 | 5 | — | 3 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | 109 | 93 |
| XVIII. Armeekorps . . . | 234 | 154 | 28 | 26 | 11 | 7 | — | 2 | — | — | 1 | 5 | — | — | — | 116 | 118 |
| XIX.(2.K.S.)Armeekorps | 96 | 66 | 3 | 12 | 4 | 4 | — | 3 | — | 4 | — | — | — | — | — | 12 | 84 |
| Armee . . . | 3924 | 2452 | 496 | 445 | 155 | 122 | 52 | 83 | 1 | 18 | 49 | 22 | 8 | 7 | 14 | 1992 | 1932 |

¹⁾ Darunter 6 Mann von Königlich Sächsischen und 21 Mann von Königlich Württembergischen Truppenteilen.

| Lebensalter | | | | | Dienstalter | | | | | | | | | | Grund der Halbinvalidität | | Dauer der Halbinvalidität | | Bis zur Entlassung als Halbinvalide waren in militärärztlicher Behandlung |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------|---|
| bis zum vollendeten 22. Lebensjahre | im 23. und 24. Lebensjahre | im 25.—29. Lebensjahre | im 30.—40. Lebensjahre | nach dem 40. Lebensjahre | im 1. Dienstjahre | | | | im 2. Dienstjahre | im 3. Dienstjahre | im 4. Dienstjahre | im 5.—8. Dienstjahre | im 9.—12. Dienstjahre | länger als 12 Jahre dienend | durch Dienstbeschädigung | ohne Dienstbeschädigung auf Grund der Dienstzeit | zeitig | dauernd | |
| | | | | | im 1. Monat | im 2.—6. Monat | im 7.—12. Monat | insgesamt | | | | | | | | | | | |
| 98 | 69 | 30 | 199 | — | 1 | 58 | 49 | 103 | 58 | 17 | 2 | 11 | 11 | 194 | 216 | 180 | 162 | 234 | 40 |
| 41 | 72 | 29 | 144 | — | — | 23 | 30 | 53 | 54 | 14 | 5 | 13 | 20 | 127 | 171 | 115 | 87 | 199 | 29 |
| 33 | 56 | 19 | 79 | — | — | 21 | 32 | 53 | 33 | 15 | 2 | 4 | 10 | 70 | 131 | 56 | 91 | 96 | 37 |
| 33 | 31 | 19 | 90 | — | — | 6 | 23 | 29 | 37 | 6 | 5 | 5 | 5 | 86 | 91 | 82 | 70 | 103 | 24 |
| 48 | 43 | 24 | 123 | — | — | 25 | 28 | 53 | 39 | 11 | 1 | 4 | 10 | 120 | 128 | 110 | 88 | 150 | 50 |
| 13 | 30 | 7 | 75 | — | — | 3 | 16 | 19 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 71 | 57 | 68 | 44 | 81 | 13 |
| 38 | 51 | 13 | 86 | — | — | 14 | 31 | 45 | 37 | 12 | 5 | 1 | 6 | 82 | 116 | 72 | 35 | 153 | 17 |
| 56 | 37 | 21 | 105 | — | — | 14 | 40 | 54 | 36 | 13 | 2 | 6 | 6 | 102 | 124 | 95 | 75 | 144 | 37 |
| 42 | 57 | 16 | 74 | — | — | 27 | 40 | 67 | 32 | 5 | 2 | 7 | 6 | 70 | 128 | 61 | 68 | 121 | 57 |
| 35 | 28 | 20 | 101 | 4 | — | 7 | 26 | 33 | 33 | 8 | 1 | 9 | 3 | 101 | 93 | 95 | 50 | 138 | 1 |
| 40 | 41 | 16 | 92 | 1 | — | 9 | 41 | 50 | 37 | 6 | 1 | 1 | 7 | 88 | 122 | 68 | 40 | 150 | 7 |
| 41 | 37 | 14 | 56 | 1 | — | 13 | 28 | 41 | 37 | 7 | — | 4 | 4 | 56 | 98 | 51 | 70 | 79 | 25 |
| 34 | 32 | 17 | 16 | — | — | 12 | 20 | 32 | 28 | 13 | 3 | 5 | 4 | 14 | 93 | 6 | 72 | 27 | 26 |
| 36 | 33 | 12 | 63 | — | 1 | 13 | 25 | 39 | 27 | 7 | 5 | 4 | 3 | 59 | 88 | 56 | 76 | 68 | 18 |
| 47 | 60 | 17 | 82 | — | — | 19 | 40 | 59 | 42 | 10 | 2 | 6 | 7 | 80 | 137 | 69 | 99 | 107 | 30 |
| 51 | 60 | 26 | 77 | 1 | — | 14 | 51 | 65 | 48 | 13 | 3 | 2 | 12 | 72 | 152 | 63 | 117 | 98 | 14 |
| 25 | 45 | 24 | 106 | — | 1 | 8 | 22 | 31 | 39 | 6 | 1 | 8 | 20 | 95 | 110 | 90 | 66 | 134 | 30 |
| 37 | 47 | 23 | 92 | 3 | — | 18 | 29 | 47 | 35 | 10 | 4 | 5 | 19 | 82 | 124 | 78 | 80 | 122 | 11 |
| 47 | 54 | 26 | 107 | — | — | 17 | 31 | 48 | 52 | 17 | 3 | 4 | 6 | 104 | 142 | 92 | 109 | 125 | 30 |
| 40 | 38 | 8 | 9 | 1 | — | 17 | 24 | 41 | 39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 89 | 7 | 63 | 33 | 7 |
| 835 | 921 | 381 | 1776 | 11 | 3 | 333 | 626 | 962 | 766 | 195 | 49 | 104 | 166 | 1682 | 2410 | 1514 | 1562 | 2362 | 503 |

2. Die Halbinvaliden der ganzen Armee,

geordnet nach den Ursachen der Halbinvalidität, nach Armeekorps, dem Dienstalter, dem Grunde der Halbinvalidität und nach der Dauer derselben.

| Nummer | Ursachen der Halbinvalidität | Gardekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dienstalder im | | | | | | | | | | | | | Grund der Halbinvalidität | | | Dauer der Halbinvalidität | | | | | |
|--------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------------------------|--|--------|---------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| | | Armeekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dienstalder im | | | | | | | | | | | | | durch Dienstbeschädigung | ohne Dienstbeschädigung auf Grund der Dienstzeit | zeitig | dauernd | | | | | |
| | | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | Armee | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | | | | | über 12 | | | | |
| 1 | Schwächung des Körpers im allgemeinen | 33 | 35 | 6 | 11 | 15 | 13 | 15 | 4 | 8 | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | — | 7 | 15 | 13 | 11 | 1 | 222 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 220 | 4 | 218 | — | 222 |
| 2 | Chronische Hautausschläge | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 14 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | |
| 3 | Übermäßige Fettleibigkeit | 36 | 26 | 11 | 16 | 18 | 10 | 10 | 17 | 5 | 16 | 4 | 6 | — | 1 | 4 | 6 | 14 | 13 | 9 | 1 | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 221 | — | 223 | — | 223 |
| 4 | Narben, welche die Bewegungsfähigkeit eines größeren Körperteils vermindern | 3 | 5 | 4 | — | 4 | — | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | — | 58 | 13 | 23 | 11 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 6 | 55 | 3 | 49 | 9 | 9 | | |
| 5 | Eindrücke oder Verluste an den Schädelknochen, wenn sie das Tragen der dienstlichen Kopfbedeckung erschweren | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | — | 4 | 1 | | |
| 6 | Chronische Entzündung und Verdickung der Augenlider | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 3 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 18 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 15 | 3 | 15 | 2 | 16 | 16 | | |
| 7 | Herabsetzung der Sehschärfe unter 1/2 und bis 1/4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | | |
| 8 | Taubheit auf einem Ohre; mäßige chronische Schwerhörigkeit auf beiden Ohren | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 6 | — | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 20 | 9 | 18 | 3 | 24 | 24 | |
| 9 | Chronische Heiserkeit ohne tiefere Erkrankung des Kehlkopfes | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | — | — | 2 | 3 | — | 2 | 4 | — | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | — | 61 | — | 61 | 61 |
| 10 | Chronische Leiden der Atmungsorgane ohne wesentliche Beeinträchtigung des allgemeinen Körperzustandes | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 5 | 1 | 47 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 2 | 45 | 1 | 46 | 46 |
| 11 | Asthmatische Beschwerden geringeren Grades | 26 | 14 | 7 | 9 | 20 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 29 | 15 | 14 | 5 | 7 | 16 | — | 221 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 220 | 1 | 220 | — | 221 | |
| 12 | Unterleibsbrüche, die durch ein Bruchband zurückgehalten werden können | 107 | 75 | 38 | 47 | 50 | 12 | 62 | 47 | 52 | 31 | 57 | 45 | 59 | 42 | 58 | 73 | 36 | 62 | 62 | 61 | 1076 | 408 | 439 | 78 | 17 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 83 | 1026 | 50 | 693 | 383 | 383 | | |
| 13 | Objektiv nachweisbare chronische Unterleibsleiden, ohne wesentliche Beeinträchtigung des allgemeinen Körperzustandes | 34 | 15 | 12 | 23 | 31 | 12 | 9 | 19 | 13 | 19 | 24 | 19 | 3 | 11 | 24 | 24 | 38 | 20 | 36 | 2 | 388 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 379 | 10 | 378 | 4 | 384 | 384 | 384 | |
| 14 | Größere, leicht blutende Hämorrhoidalknoten | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | 17 | — | — | 17 | | |
| 15 | Wasserbrüche mittleren Grades | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 3 | — | — | — | 15 | 2 | 9 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 13 | 2 | 2 | 2 | |

| Nummer | Ursachen der Halbinvalidität | Gardekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Armee | Dienstalter im | | | | | | | | | | | | Grund der Halbinvalidität | | Dauer der Halbinvalidität | | | | |
|--------|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-------------|------------------------------|------|------|------|----|
| | | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | XIX. (2.K.S.) Armeekorps | | Dienstjahre | | | | | | | | | | | | durch Dienst- beschädigung ohne Dienstbeschä- digung auf Grund der Dienstzeit | zei- tig | dau- ernd | | | | |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | über 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Gutartige Geschwülste am Hoden oder Nebenhoden | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 10 | 4 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 8 | 2 | |
| 17 | Krampfaderbrüche | 2 | 1 | — | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | 4 | — | — | 1 | — | — | 18 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 7 | 7 | 11 | |
| 18 | Verkürzter oder im Ellenbogen- gelenk etwas gekrümmter Arm, wobei die Bewegung desselben nach allen Rich- tungen hin, wenn auch be- schränkt, möglich ist | 2 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 10 | 2 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | | |
| 19 | Verunstaltung des Schüssel- beins | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | 12 | 7 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12 | — | 10 | 2 | | |
| 20 | Andauernde Schwäche eines größeren Gliedes nach Ver- letzung | 27 | 13 | 24 | 11 | 18 | 16 | 10 | 16 | 20 | 11 | 17 | 14 | 7 | 10 | 21 | 23 | 17 | 12 | 16 | 4 | 307 | 141 | 72 | 25 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 36 | 297 | 10 | 245 | 62 | |
| 21 | Schwäche eines größeren Ge- lenkes und chronische Gelenk- erkrankungen | 45 | 31 | 45 | 16 | 34 | 15 | 27 | 42 | 25 | 29 | 31 | 29 | 14 | 28 | 36 | 28 | 23 | 23 | 42 | 8 | 571 | 218 | 103 | 39 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 8 | 4 | 153 | 500 | 71 | 367 | 204 | |
| 22 | Verlust eines Gliedes an zwei Fingern einer Hand sowie Verlust eines Fingergliedes, durch welchen die Hand- habung der Waffen erschwert wird. | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 37 | 19 | 11 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 36 | 1 | 11 | 26 | |
| 23 | Verlust von zwei Gliedern an einem Finger oder Verlust eines Fingers, wenn nicht Daumen oder rechter Zeige- finger in Betracht kommen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | — | 8 | — | 1 | 1 | 46 | 23 | 17 | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 46 | — | 1 | 45 |
| 24 | Den Waffengebrauch er- schwerende Steifheit oder Krümmung eines Fingers | 16 | 12 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 149 | 89 | 35 | 16 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 148 | 1 | 100 | 49 | |
| 25 | Verkürzung eines Beines ge- ringeren Grades | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 | | | |
| 26 | Stärkere zylindrische Erweite- rungen der Blutadern | 39 | 43 | 14 | 10 | 18 | 19 | 19 | 15 | 27 | 14 | 18 | 6 | 4 | 9 | 12 | 16 | 26 | 25 | 12 | 2 | 348 | 13 | 35 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 15 | 23 | 17 | 22 | 8 | 176 | 185 | 163 | 24 | 324 | |
| 27 | Ausgebreitete Narben von Unterschenkelgeschwüren | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 | — | 3 | 2 | | | |
| 29 | Das Marschieren behindernder Verlust einer Zehe (mit Aus- nahme einer großen) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | — | | | |
| | Sonstige | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 8 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | |
| | Summe aller Halbinvaliden | 396 | 286 | 187 | 173 | 238 | 125 | 188 | 219 | 189 | 188 | 190 | 149 | 99 | 144 | 206 | 215 | 200 | 202 | 234 | 96 | 3924 | 962 | 766 | 195 | 49 | 21 | 26 | 29 | 28 | 51 | 43 | 43 | 29 | 1682 | 2410 | 1514 | 1562 | 2362 | |

Vierte Abteilung: Ganzinvalidität der

Vorbemerkung: Die bei den Ursachen der Ganzinvalidität angegebenen Nummern

I. Die Ganzinvaliden

geordnet nach Armeekorps, Truppengattung, Dienstgrad, Lebensalter, Dienstal, nach dem

| Armeekorps | Zahl der Ganzinvaliden | Truppengattung | | | | | | | | | | | | | | Dienstgrad | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|----------------|--------------|
| | | Infanterie | Kavallerie | Feldartillerie | Fußartillerie | Pioniere | Verkehrstruppen | Train | Maschinengewehr-Abteilungen | Bekleidungsämter | Landwehrtämme | Unteroffizierschulen | Festungsgefangnisse | Arbeiter-Abteilungen bzw. Disziplinar-Abteilung | Alle anderen Truppengattungen | Unteroffiziere | Mannschaften |
| Gardekorps | 754 | 453 | 102 | 74 | 25 | 13 | 62 | 7 | 1 | 10 | 1 | 4 | — | — | 2 | 127 | 627 |
| I. Armeekorps | 420 | 234 | 70 | 69 | 13 | 16 | — | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | — | 4 | — | 65 | 355 |
| II. Armeekorps | 401 | 274 | 39 | 35 | 23 | 13 | — | 6 | — | — | 4 | 7 | — | — | — | 74 | 327 |
| III. Armeekorps | 309 | 199 | 31 | 38 | — | 11 | 4 | 7 | — | 4 | 7 | — | 7 | — | 1 | 73 | 236 |
| IV. Armeekorps | 256 | 140 | 23 | 27 | 20 | 18 | — | 5 | — | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | — | 54 | 202 |
| V. Armeekorps | 231 | 157 | 16 | 31 | 14 | 5 | — | 3 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | 54 | 177 |
| VI. Armeekorps | 354 | 201 | 69 | 33 | 17 | 10 | — | 10 | — | — | 12 | — | — | — | 2 | 96 | 258 |
| VII. Armeekorps | 393 | 248 | 58 | 43 | 11 | 7 | — | 10 | — | 4 | 8 | — | 2 | — | 2 | 55 | 338 |
| VIII. Armeekorps | 405 | 233 | 50 | 58 | 27 | 5 | 8 | 4 | — | — | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 65 | 340 |
| IX. Armeekorps | 295 | 205 | 37 | 29 | — | 11 | — | 5 | — | — | 8 | — | — | — | — | 67 | 228 |
| X. Armeekorps | 305 | 188 | 39 | 53 | — | 7 | — | 6 | — | — | 9 | — | — | — | 3 | 57 | 248 |
| XI. Armeekorps | 306 | 210 | 21 | 51 | — | 10 | — | 7 | — | 1 | 4 | — | — | — | 2 | 42 | 264 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps | 198 | 127 | 27 | 26 | — | 7 | — | 6 | — | 2 | — | — | 1 | — | 2 | 21 | 177 |
| XIII. (K. W.) Armeekorps | 289 | 194 | 41 | 32 | — | 8 | — | 4 | — | 1 | 2 | — | 5 | — | 2 | 44 | 245 |
| XIV. Armeekorps | 343 | 216 | 36 | 28 | 14 | 19 | — | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | — | 1 | 41 | 302 |
| XV. Armeekorps | 335 ¹⁾ | 188 | 38 | 37 | 28 | 36 | — | 4 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 44 | 291 |
| XVI. Armeekorps | 356 | 216 | 38 | 50 | 28 | 16 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | 2 | 49 | 307 |
| XVII. Armeekorps | 377 | 207 | 56 | 57 | 18 | 12 | — | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | — | 6 | 62 | 315 |
| XVIII. Armeekorps | 284 | 182 | 41 | 24 | 18 | 5 | — | 2 | — | — | 5 | 4 | — | — | 3 | 51 | 233 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps | 203 | 131 | 9 | 22 | 20 | 8 | — | 6 | — | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 33 | 170 |
| Armee | 6814 | 4203 | 841 | 817 | 276 | 237 | 74 | 115 | 5 | 38 | 90 | 45 | 29 | 13 | 31 | 1174 | 5640 |

1) Darunter 23 Mann von Königlich Sächsischen und 22 Mann von Königlich Württembergischen Truppenteilen.

Mannschaften und ihre Ursachen.

beziehen sich auf diejenigen der Beilagen IIb der Dienstanzweisung vom 1. Februar 1894.

der ganzen Armee,

Grunde und der Dauer der Ganzinvalidität und nach dem Grade der Erwerbsunfähigkeit.

| Lebensalter | | | | | Dienstalter | | | | | | | | | | Grund der Ganzinvalidität | | | Dauerd. Ganzinvalidität | | Grad der Erwerbsunfähigkeit | | | | | | Bis zur Entlassung als ganz-invalide waren in militär-ärztlicher Behandlung | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|---------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------------------|-----|-----|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zeitig erwerbsunfähig | | | dauernd erwerbsunfähig | | | | |
| bis zum vollendeten 22. Lebensjahre | im 23. und 24. Lebensjahre | im 25. bis 29. Lebensjahre | im 30. bis 40. Lebensjahre | nach dem 40. Lebensjahre | im 1. Dienstjahre | | insgesamt | im 2. Dienstjahre | im 3. Dienstjahre | im 4. Dienstjahre | im 5.—8. Dienstjahre | im 9.—12. Dienstjahre | länger als 12 Jahre dienend | ohne Dienstbeschädigung nach mehr als 8jähriger Dienstzeit | durch Dienstbeschädigung | | zeitig | dauernd | erwerbsfähig | zeitig erwerbsunfähig | | | dauernd erwerbsunfähig | | | | |
| | | | | | äußere | innere | | | | | | | | | teilweise | größtenteils | | | | gänzlich | teilweise | größtenteils | gänzlich | | | | |
| 333 | 277 | 65 | 74 | 5 | — | 88 | 256 | 344 | 220 | 57 | 13 | 24 | 25 | 71 | 60 | 177 | 517 | 440 | 314 | — | 113 | 380 | 149 | 75 | 28 | 9 | 394 |
| 157 | 177 | 57 | 27 | 2 | — | 54 | 126 | 180 | 138 | 29 | 14 | 24 | 11 | 24 | 19 | 107 | 294 | 237 | 183 | — | 69 | 177 | 108 | 45 | 10 | 11 | 239 |
| 136 | 178 | 39 | 48 | — | — | 44 | 137 | 181 | 113 | 37 | 6 | 14 | 11 | 39 | 23 | 128 | 250 | 279 | 122 | — | 104 | 178 | 71 | 42 | 2 | 4 | 204 |
| 95 | 137 | 35 | 39 | 3 | — | 29 | 82 | 111 | 87 | 39 | 6 | 23 | 12 | 31 | 20 | 87 | 202 | 177 | 132 | — | 61 | 124 | 85 | 35 | 1 | 3 | 208 |
| 105 | 83 | 31 | 32 | 5 | — | 31 | 80 | 111 | 73 | 18 | 6 | 12 | 3 | 33 | 19 | 90 | 147 | 192 | 64 | — | 76 | 99 | 42 | 25 | 9 | 5 | 153 |
| 77 | 99 | 20 | 35 | — | — | 24 | 69 | 93 | 67 | 16 | 3 | 10 | 12 | 30 | 18 | 65 | 148 | 146 | 85 | 1 | 62 | 92 | 43 | 23 | 8 | 2 | 120 |
| 103 | 133 | 47 | 69 | 2 | — | 20 | 96 | 116 | 88 | 43 | 16 | 18 | 19 | 54 | 25 | 110 | 219 | 178 | 176 | 3 | 71 | 144 | 45 | 58 | 22 | 11 | 135 |
| 165 | 141 | 53 | 32 | 2 | — | 56 | 116 | 172 | 121 | 43 | 5 | 10 | 14 | 28 | 10 | 110 | 273 | 258 | 135 | 1 | 87 | 169 | 90 | 31 | 9 | 6 | 226 |
| 134 | 183 | 50 | 37 | 1 | 1 | 55 | 117 | 173 | 130 | 34 | 17 | 13 | 9 | 29 | 14 | 103 | 288 | 221 | 184 | — | 89 | 169 | 82 | 48 | 14 | 3 | 286 |
| 101 | 121 | 34 | 36 | 3 | — | 15 | 88 | 103 | 102 | 22 | 13 | 12 | 8 | 35 | 27 | 75 | 193 | 118 | 177 | — | 47 | 120 | 66 | 48 | 5 | 9 | 33 |
| 85 | 144 | 40 | 36 | — | — | 27 | 82 | 109 | 108 | 25 | 8 | 17 | 7 | 31 | 20 | 89 | 196 | 155 | 150 | — | 51 | 153 | 41 | 53 | 6 | 1 | 100 |
| 121 | 128 | 33 | 24 | — | — | 30 | 113 | 143 | 98 | 22 | 5 | 11 | 6 | 21 | 13 | 67 | 226 | 208 | 98 | 1 | 80 | 125 | 67 | 24 | 4 | 5 | 170 |
| 87 | 84 | 17 | 8 | 2 | — | 28 | 64 | 92 | 71 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | — | 36 | 162 | 100 | 98 | — | 28 | 106 | 42 | 12 | 5 | 5 | 166 |
| 152 | 81 | 31 | 24 | 1 | — | 36 | 95 | 131 | 89 | 24 | 7 | 11 | 6 | 21 | 10 | 84 | 195 | 213 | 76 | — | 74 | 158 | 24 | 25 | 7 | 1 | 135 |
| 134 | 152 | 30 | 25 | 2 | — | 38 | 110 | 148 | 116 | 35 | 6 | 10 | 6 | 22 | 15 | 75 | 253 | 257 | 86 | — | 86 | 157 | 59 | 24 | 9 | 8 | 211 |
| 104 | 169 | 45 | 16 | 1 | — | 43 | 103 | 146 | 107 | 37 | 5 | 18 | 9 | 13 | 8 | 80 | 247 | 234 | 101 | — | 62 | 163 | 78 | 21 | 5 | 6 | 156 |
| 109 | 185 | 46 | 16 | — | — | 35 | 115 | 150 | 127 | 28 | 14 | 16 | 10 | 11 | 7 | 119 | 230 | 286 | 70 | — | 56 | 189 | 81 | 21 | 3 | 6 | 214 |
| 139 | 140 | 64 | 34 | — | — | 38 | 110 | 148 | 113 | 48 | 8 | 18 | 15 | 27 | 22 | 121 | 234 | 240 | 137 | 1 | 68 | 167 | 88 | 38 | 8 | 7 | 184 |
| 92 | 118 | 47 | 24 | 3 | — | 22 | 74 | 96 | 95 | 38 | 10 | 13 | 7 | 25 | 10 | 77 | 197 | 192 | 92 | 1 | 73 | 121 | 59 | 18 | 4 | 8 | 147 |
| 85 | 80 | 23 | 14 | 1 | — | 25 | 54 | 79 | 85 | 8 | 5 | 9 | 5 | 12 | — | 60 | 143 | 105 | 98 | — | 20 | 77 | 82 | 18 | 2 | 4 | 97 |
| 2514 | 2810 | 807 | 650 | 33 | 1 | 738 | 2087 | 2826 | 2148 | 616 | 173 | 288 | 196 | 567 | 340 | 1860 | 4614 | 4236 | 2578 | 8 | 1377 | 3068 | 1402 | 684 | 161 | 114 | 3578 |

2. Die Ganzinvaliden

geordnet nach den Ursachen der Ganzinvalidität, nach Armeekorps, dem Dienstalter, dem Grunde

| Nummer | Ursachen der Ganzinvalidität | Gardekorps | Armeekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | Armee | | |
|--------|--|------------|------------|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|---------------|--------------|------|-----|------|-------|-------|--------|---------------|
| | | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. (1.K.S.) | XIII. (K.W.) | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | | XVIII. | XIX. (2.K.S.) |
| 1 | Objektiv nachweisbare, erhebliche Ernährungsstörungen und bleibende Schwächung des Körpers | 17 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 78 |
| 2 | Chronische, ekelerregende oder ansteckende Hautausschläge und Hauterkrankungen | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 8 |
| 3 | Chronische Drüsenleiden erheblichen Grades, Skrophulose | 4 | 5 | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 56 |
| 4 | Große Geschwülste, Auswüchse | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 11 |
| 5 | Bösartige Geschwülste oder Geschwüre | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 6 | Chronische, entzündliche Knochenleiden, Knochenfraks, Knochenbrand | 15 | 5 | 17 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 5 | 8 | 15 | 14 | 6 | 4 | 192 |
| 7 | Sehr umfangreiche, die Funktion des betreffenden Körperteils störende, festsitzende oder stark entstellende Narben | 22 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 | 12 | 18 | 1 | 5 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 165 |
| 8 | Progressive Muskelatrophie und sonstige Entartungen der Muskeln und Sehnen | 7 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | 3 | — | 3 | — | 3 | 4 | 4 | 67 |
| 9 | Chronische Krankheiten der Blutgefäße | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 13 |
| 10 | Leukämie und perniziöse Anämie | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 |
| 11 | Bluterkrankheit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Harnruhr | 1 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 16 |
| 13 | Chronische, nachweisbare Gicht | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | 8 |
| 14 | Chronischer Gelenkrheumatismus (einschließlich Arthritis deformans) | 24 | 24 | 21 | 12 | 10 | 8 | 7 | 17 | 9 | 10 | 16 | 13 | 6 | 6 | 18 | 8 | 13 | 10 | 3 | 14 | 249 |
| 15 | Chronische Gehirn- oder Rückenmarkskrankheiten | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 73 |
| 16 | Chronische Nervenleiden ernster Art. | 27 | 19 | 20 | 10 | 15 | 3 | 16 | 16 | 22 | 10 | 8 | 15 | 6 | 8 | 13 | 14 | 14 | 19 | 13 | 9 | 277 |
| 17 | Geisteskrankheiten | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | — | 3 | 1 | 1 | — | 5 | 56 |
| 18 | Beträchtliche Eindrücke oder Verluste an den Schädelknochen | 3 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 16 |
| 19 | Chronische Entzündung der Augenlidbindehäute mit bleibender Veränderung | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 27 |
| 20 | Umkehrung eines Augenlides | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 21 | Chronische Entzündung der Tränenwege, Tränenfisteln | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 9 |
| 22 | Unheilbare Augenmuskellähmungen | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 |
| 23 | Herabsetzung der Sehschärfe auf dem besseren Auge auf $\frac{1}{4}$ oder weniger | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 |
| 24 | Chronische Entzündung der tieferen Gebilde eines Auges | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | — | 60 |

**der ganzen Armee,
der Ganzinvalidität, der Dauer derselben und nach dem Grade der Erwerbsunfähigkeit.**

| Dienstalter im | | | | | | | | | | | | über 12 | Grund der Ganzinvalidität | | | | Dauer | | Grad der Erwerbsunfähigkeit | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----------------|--|-------------------------------|--------|--------|---------|--------------|-----------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | | ohne Dienst- beschädi- gung nach mehr als 8jähriger Dienstzeit | durch Dienst- beschädigung | | zeitig | dauernd | erwerbsfähig | zeitig | | | dauernd | | |
| | | | | | | | | | | | | | | äußere | innere | | | | teilweise | größtenteils | gänzlich | teilweise | größtenteils | gänzlich |
| Dienstjahre | | | | | | | | | | | | erwerbsunfähig | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 17 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | 1 | — | 13 | 13 | 6 | 59 | 53 | 25 | 1 | 14 | 30 | 18 | 8 | 7 | — |
| — | 5 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | — | — | — |
| 27 | 17 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 8 | 47 | 37 | 19 | — | 20 | 22 | 8 | 5 | — | 1 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | 10 | 1 | — | 8 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| 2 | 4 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | — | — | 2 | 4 | — | — | 5 |
| 107 | 62 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 169 | 23 | 150 | 42 | — | 92 | 53 | 37 | 6 | — | 4 |
| 72 | 67 | 20 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 131 | 33 | 108 | 57 | — | 41 | 85 | 31 | 8 | — | — |
| 22 | 23 | 7 | 2 | — | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 5 | 2 | 48 | 17 | 41 | 26 | — | 21 | 23 | 3 | 15 | 5 | — |
| 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | — | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 14 | — | — | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | — | 4 | — | 8 | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 3 |
| 105 | 71 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | — | 4 | — | 1 | 35 | 7 | 8 | 234 | 187 | 62 | — | 46 | 124 | 47 | 24 | 7 | 1 |
| 23 | 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 12 | 1 | 27 | 45 | 28 | 45 | — | 5 | 20 | 29 | 4 | 3 | 12 |
| 87 | 86 | 15 | 9 | 8 | 4 | 9 | 1 | 13 | 9 | 2 | — | 34 | 15 | 64 | 198 | 168 | 109 | 1 | 66 | 113 | 45 | 39 | 11 | 2 |
| 20 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | 4 | — | — | — | 1 | 3 | 5 | 48 | 14 | 42 | — | — | 8 | 38 | 5 | — | 5 |
| 5 | 8 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 1 | 9 | 7 | — | 2 | 8 | 4 | 2 | — | — |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 | 12 | — | 12 | 6 | 1 | 8 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 1 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 6 | 6 | 3 | — | 5 | 3 | — | 1 | — | — |
| 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — |
| 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | — | 2 | — | — | 3 | 1 | — |
| 18 | 27 | 9 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 18 | 41 | 33 | 27 | — | 12 | 28 | 6 | 10 | 4 | — |

| Nummer | Ursachen der Ganzinvalidität | Armeekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Armee | |
|--------|---|------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------|--------------------------|
| | | Gardekorps | I. Armeekorps | II. Armeekorps | III. Armeekorps | IV. Armeekorps | V. Armeekorps | VI. Armeekorps | VII. Armeekorps | VIII. Armeekorps | IX. Armeekorps | X. Armeekorps | XI. Armeekorps | XII. (1.K.S.) Armeekorps | XIII. (K.W.) Armeekorps | XIV. Armeekorps | XV. Armeekorps | XVI. Armeekorps | XVII. Armeekorps | XVIII. Armeekorps | | XIX. (2.K.S.) Armeekorps |
| 25 | Blindheit auf einem Auge | 5 | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | — | 3 | 41 |
| 27 | Taubheit oder unheilbare erhebliche Schwerhörigkeit auf beiden Ohren | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| 28 | Erhebliche, schwer heilbare Krankheitszustände des Ohres | 23 | 20 | 15 | 9 | 9 | 4 | 15 | 19 | 18 | 10 | 18 | 11 | 4 | 12 | 12 | 6 | 9 | 11 | 5 | 12 | 242 |
| 29 | Verlust oder Verunstaltung der Nase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 30 | Chronische Verschwörung, Geschwülste u.s.w. der Nasen-, Stirn- oder Oberkieferhöhlen | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 14 |
| 31 | Geschwülste oder bösartige Geschwüre im Munde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 33 | Wesentliche Sprachstörung | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 5 |
| 34 | Wesentliche Störung des Kauens | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 3 | 2 | — | 25 |
| 35 | Höherer Grad von Kropf | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 14 |
| 36 | Schwere chronische Leiden des Kehlkopfes oder der Luftröhre | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | — | 4 | 2 | — | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | — | 79 |
| 38 | Fehler, chronische Krankheiten der Lungen oder des Brustfelles mit wesentlichen Störungen des Atmens bzw. des allgemeinen Körperzustandes | 226 | 166 | 104 | 101 | 57 | 78 | 75 | 109 | 97 | 99 | 86 | 85 | 47 | 71 | 120 | 92 | 110 | 114 | 88 | 39 | 1964 |
| 39 | Asthmatische Beschwerden höheren Grades | 7 | 2 | — | 3 | 3 | — | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | 30 |
| 40 | Nachgewiesener Bluthusten, auch ohne festzustellende Veränderung der Lunge | 15 | 8 | 9 | — | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 113 |
| 41 | Fehler und chronische Krankheiten des Herzens, des Herzbeutels und der großen Gefäße | 137 | 24 | 55 | 39 | 46 | 26 | 67 | 53 | 76 | 39 | 52 | 64 | 57 | 78 | 57 | 81 | 32 | 48 | 52 | 46 | 1129 |
| 42 | Große Unterleibsbrüche, die nicht durch ein Bruchband zurückgehalten werden können | — | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 15 |
| 43 | Fehler oder chronische Leiden der Unterleibseingeweide mit Ernährungsstörungen | 44 | 18 | 13 | 17 | 11 | 10 | 21 | 15 | 25 | 11 | 8 | 15 | 7 | 7 | 11 | 11 | 19 | 11 | 15 | 11 | 300 |
| 44 | Chronischer Mastdarmvorfall, unheilbare Mastdarmfistel | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 46 | Chronische Leiden der Urinwerkzeuge, unheilbare Urinfisteln, Steinkrankheit | 15 | 9 | 12 | 4 | 4 | 8 | 7 | 14 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 168 |
| 47 | Bösartige Geschwülste des Hodens oder Samenstranges; Verlust oder Schwund beider Hoden | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | 3 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 16 |
| 48 | Große Krampfaderbrüche | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 4 |
| 49 | Verlust eines größeren Gliedes, erhebliche Verlängerung oder Verkürzung von Gliedmaßen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | — | 4 | 4 | 3 | 2 | 50 |
| 50 | Erhebliche Verkrümmung von Gliedmaßen, falsche Gelenke | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 17 |
| 51 | Krankhafte Vergrößerung (Hypertrophie), Schwund, Lähmung von Gliedmaßen | 16 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 12 | 5 | 10 | — | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 8 | 14 | 6 | 4 | 142 |

| Nummer | Ursachen der Ganzinvalidität | Gardekorps | Armeekorps | | | | | | | | | | | | | | | | | Armee | | |
|--------|--|------------|------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|--------------|-------------|------|-----|------|-------|-------|--------|--------------|
| | | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII.(1.K.S.) | XIII.(K.W.) | XIV. | XV. | XVI. | XVII. | | XVIII. | XIX.(2.K.S.) |
| 52 | Chronische Krankheiten und wesentliche Fehler der größeren Gelenke | 56 | 42 | 46 | 33 | 28 | 31 | 39 | 35 | 41 | 24 | 30 | 25 | 11 | 37 | 23 | 24 | 54 | 57 | 26 | 20 | 682 |
| 54 | Verlust, Verstümmelung eines Daumens . . | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 3 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 30 |
| 55 | Verlust des rechten Zeigefingers oder zweier Glieder desselben | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 16 |
| 56 | Verlust zweier Finger an einer Hand . | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 |
| 57 | Verlust eines Gliedes an mehr als zwei Fingern einer Hand | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 7 |
| 58 | Die Handhabung der Waffen verhindernde Steifheit oder Krümmung eines Fingers | 22 | 6 | 12 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 15 | 8 | 11 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 157 |
| 59 | Den Gebrauch der Gliedmaßen störende Blutaderknoten an den Beinen | 5 | 2 | 5 | — | 1 | 6 | 3 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 41 |
| 60 | Veraltete von erweiterten Blutadern umgebene Unterschenkelgeschwüre oder nach solchen Geschwüren zurückgebliebene Narben | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 10 |
| 61 | Verbildung eines Fusses nach Verletzungen . | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 43 |
| 62 | Verlust, Verstümmelung u. s. w. einer großen Zehe | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | 9 |
| | Sonstige | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 |
| | Summe aller Ganzinvaliden | 754 | 420 | 401 | 309 | 256 | 231 | 354 | 393 | 405 | 295 | 305 | 306 | 198 | 289 | 343 | 335 | 356 | 377 | 284 | 203 | 6814 |

| Dienstalter im | | | | | | | | | | | | über 12 | Grund der Ganzinvalidität | | | | Grad der Erwerbsunfähigkeit | | | | | | | |
|----------------|------|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------------|--|-------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | | ohne Dienst- beschädi- gung nach mehr als 8jähriger Dienstzeit | durch Dienst- beschädigung | | Dauer | | erwerbsfähig | zeitig | | | dauernd | | |
| Dienstjahre | | | | | | | | | | | | aufserer | | innere | zeitig | dauernd | teilweise | | größtenteils | gänzlich | teilweise | größtenteils | gänzlich | |
| | | | | | | | | | | | | | erwerbsunfähig | | | | | | | | | | | |
| 301 | 222 | 84 | 19 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | — | 17 | 6 | 626 | 50 | 565 | 117 | — | 253 | 318 | 71 | 31 | 5 | 4 |
| 19 | 9 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | 8 | 22 | — | 5 | 9 | 1 | 13 | 2 | — |
| 6 | 5 | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 15 | — | 1 | 15 | — | 1 | 5 | 1 | 9 | — | — |
| 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| 1 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 5 | 2 | — | 2 | 5 | — | — | — | — |
| 100 | 42 | 10 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 157 | — | 103 | 54 | — | 69 | 55 | 8 | 21 | 4 | — |
| 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | — | 20 | 19 | 17 | 5 | 3 | 38 | — | 3 | 2 | — | 32 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | — | 2 | 6 | — | 2 | — | — |
| 19 | 14 | 4 | 2 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 43 | — | 32 | 11 | — | 17 | 18 | 5 | 3 | — | — |
| 3 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 5 | 4 | — | 5 | 2 | 2 | — | — | — |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 2 | — | — |
| 2826 | 2148 | 616 | 173 | 104 | 75 | 70 | 39 | 93 | 71 | 22 | 10 | 567 | 340 | 1860 | 4614 | 4236 | 2578 | 8 | 1377 | 3068 | 1402 | 684 | 161 | 114 |

Fünfte Abteilung: Die Todesfälle unter

Vorbemerkung: In den nachstehenden

- A. in solche, welche durch Krankheiten — und zwar innerhalb der militärärztlichen Behandlung und außerhalb derselben — verursacht
 B. in solche, welche die Folgen eines unglücklichen Ereignisses waren (im ganzen 139 Verunglückungen), 53 Verunglückte wurden vor
 C. in solche, welche durch Angriffe auf das eigene Leben (Selbstmord) veranlaßt waren (im ganzen 263), bei 32 war der Tod innerhalb

A. Die durch Krankheiten unter den

Bemerkung: Die in den Querspalten vorgedruckten Nummern stimmen

I. Die Todesfälle, geordnet nach Krankheiten, Truppengattung, Dienstgrad, Lebensalter,

| Nummer der Krankheit | Name der Krankheit | Zahl der Behandelten (Bestand und Zugang) | Zahl der Gestorbenen | | Truppengattung †) | | | | | | | | | | | | Dienstgrad | | | |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------|----------------|---------|---|
| | | | absolut*) | % der Behandelten | Infanterie | Kavallerie | Feldartillerie | Fusartillerie | Pioniere | Verkehrstruppen | Train | Bekleidungsämter | Militärkrankenwärter | Landwehrstämme | Unteroffizierschulen | Festungsgefängnisse | Sonstige | Unteroffiziere | Gemeine | |
| 3 | Scharlach | 339 | 17 | 5,0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 15 | |
| 6 | Diphtherie (Krupp) | 199 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| 7 | Rose | 629 | 5 | 0,79 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |
| 8 u. 9 | Karbunkel (Milzbrand), Rotz | 6 | 1 | 16,7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 10 u. 11 | Hospitalbrand, Pyämie, Septikämie | 52 | 29 | 55,8 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 26 | |
| 13 | Unterleibstypus | 556 | 45 | 8,1 | 27 | 5 | 8 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 42 | |
| 17 | Grippe | 6261 | 6 | 0,10 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | |
| 18 | Tuberkulose { | Akute Miliartuberkulose | 31 | 29 | 93,5 | 17 | 4 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 4 | 25 | |
| 19 | | der ersten Luftwege und Lunge | 943 | 79+1 | 8,5 | 54 | 9 | 7 | 2 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | 16 | 64 | |
| 20 | | der Knochen und Gelenke | 80 | 5 | 6,3 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 21 | | anderer Organe | 116 | 23+1 | 20,7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 23 | |
| 22 | Ruhr | 93 | 1 | 1,1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 25 | Epidemische Genickstarre | 36 | 7 | 19,4 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |
| 26 | Starrkrampf (Trismus, Tetanus) | 5 | 1 | 20,0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 27 | Akuter Gelenkrheumatismus | 4456 | 12 | 0,27 | 5 | 2 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 11 | |

*) Die außerhalb militärärztlicher Behandlung Gestorbenen sind von den in militärärztlicher Behandlung Gestorbenen durch ein

†) Erläuterung der

Infanterie (einschl. Jäger, Schützen, Lehr Infanterie-Bataillon, Infanterie-Schießschule, Gewehr-Prüfungs-Kommission).
 Kavallerie.
 Feldartillerie (einschl. Feldartillerie-Schießschule).
 Fusartillerie (einschl. Fusartillerie-Schießschule, Oberfeuerwerkerschule und Artillerie-Prüfungs-Kommission).
 Pioniere.
 Verkehrstruppen (Eisenbahn-, Telegraphentruppen und Luftschiffer-Bataillon).
 Train (einschl. Militär-Bäcker-Abteilungen).

den Mannschaften und ihre Ursachen.

Tabellen sind die Todesfälle geschieden:

waren (es sind $660 + 29 = 689$ Todesfälle durch Krankheiten bedingt gewesen);

ihrem Tode militärärztlich behandelt (vgl. den summarischen Truppen-Krankenrapport der Armee);

der militärärztlichen Behandlung erfolgt (vgl. den summarischen Truppen-Krankenrapport der Armee).

Mannschaften verursachten Todesfälle.

mit den bezüglichen Nummern der Truppen-Krankenrapporte überein.

Dienstalter der Verstorbenen und nach den Monaten, während welcher sie vorgekommen sind.

| Lebensalter | | | | | | | | Dienstalter | | | | | Todesmonat | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| bis zum vollendeten 19. Lebensjahre | im 20. Lebensjahre | im 21. Lebensjahre | im 22. Lebensjahre | im 23. Lebensjahre | im 24. u. 25. Lebensjahre | im 26. bis 30. Lebensjahre | nach dem 30. Lebensjahre | im 1. Dienstjahre | im 2. Dienstjahre | im 3. Dienstjahre | im 4. Dienstjahre | darüber | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| — | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | — | 6 | 8 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — |
| — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — |
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| — | 1 | 7 | 11 | 4 | 4 | 2 | — | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| — | — | 7 | 11 | 10 | 15 | 2 | — | 14 | 25 | 4 | 2 | — | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| — | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| — | — | 4 | 10 | 9 | 5 | — | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | — | 4 |
| — | 1 | 11 | 16 | 27 | 16 | 6 | 3 | 28 | 28 | 10 | — | 14 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 14 | 7 | 5 | 3 |
| — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — |
| — | — | 1 | 6 | 9 | 8 | — | — | 7 | 13 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| — | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 5 | 5 | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |

+Zeichen getrennt.

Spalte „Truppengattung“.

Bekleidungsämter.

Militärkrankenwärter.

Landwehrstämme.

Unteroffizierschulen (einschl. Kriegsschulen, Kadettenanstalten und Unteroffizierschulen).

Festungsgefängnisse (einschl. Arbeiter-Abteilungen bzw. Disziplinar-Abteilung).

Sonstige.

| Nummer der Krankheit | Name der Krankheit | Zahl der Behandelten (Bestand und Zugang) | Zahl der Gestorbenen | | Truppengattung †) | | | | | | | | | | | | | Dienstgrad | |
|----------------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------|----------------|---------|
| | | | absolut*) | % der Behandelten | Infanterie | Kavallerie | Feldartillerie | Fußartillerie | Pioniere | Verkehrstruppen | Train | Bekleidungsämter | Militärkrankenwärter | Landwehrstämme | Unteroffizierschulen | Festungsgefängnisse | Sonstige | Unteroffiziere | Gemeine |
| 30 | Blutarmut | 530 | 1 | 0,19 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 31 u. 32 | Purpura, Skorbut | 63 | 1 | 1,6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 33 | Zuckerruhr | 36 | 10 + 1 | 30,6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 |
| 34 | Vergiftung durch Alkohol (akut u. chronisch) | 43 | + 1 | 2,3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 38 | Hitzschlag | 80 | 6 + 1 | 8,8 | 6 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 39 | Bösartige Geschwülste | 40 | 14 | 35,0 | 10 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 |
| 41 | Geisteskrankheiten | 487 | 4 | 0,82 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 42 | Fallsucht | 464 | 1 + 1 | 0,43 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 44 | Hirnhautentzündung ausschl. No. 21 und 25 | 59 | 20 + 1 | 35,6 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 45 | Krankheiten des Gehirns | 81 | 15 + 2 | 21,0 | 13 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 6 | 11 |
| 48 | Andere Rückenmarkskrankheiten | 38 | 3 | 7,9 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 52 | Andere Krankheiten des Nervensystems | 154 | 1 + 1 | 1,3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 56 | Akuter Bronchialkatarrh | 26116 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 57 | Chronischer Katarrh der Luftwege | 1364 | 1 | 0,07 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 58 | Akute Lungenentzündung | 3348 | 136 + 2 | 4,1 | 85 | 20 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | — | 7 | 131 |
| 59 | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes ausschl. No. 19 | 172 | 2 | 1,2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 60 | Brustfellentzündung und Ausgänge ausschl. No. 19 | 2187 | 28 + 1 | 1,3 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 26 |
| 63 | Andere Krankheiten der Atmungsorgane | 14 | 3 + 2 | 35,7 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 |
| 64 | Entzündung des Herzbeutels | 38 | 4 + 1 | 13,2 | 2 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 65 | Idiopathische Herzvergrößerung | 130 | 1 + 1 | 1,5 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 66 | Erkrankung der Herzklappen | 597 | 11 + 2 | 2,2 | 8 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | 9 |
| 68 | Andere Herzkrankheiten | 130 | 5 + 7 | 9,2 | 8 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 10 |
| 73 bis 75 | Erkrankungen der Lymphgefäße und Lymphdrüsen ausschl. No. 21 und 116 | 4272 | 2 | 0,05 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 77 | Leukämie | 7 | 3 | 42,9 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 78 | Perniziöse Anämie | 5 | 2 | 40,0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 82 | Mandelentzündung | 23170 | 2 + 1 | 0,01 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |

*) Siehe Anmerkung *) auf Seite 110*. — †) Siehe Anmerkung †) auf Seite 110*.

| Lebensalter | | | | | | | | Dienstalter | | | | | Todesmonat | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| bis zum vollendeten 19. Lebensjahre | im 20. Lebensjahre | im 21. Lebensjahre | im 22. Lebensjahre | im 23. Lebensjahre | im 24. u. 25. Lebensjahre | im 26. bis 30. Lebensjahre | nach dem 30. Lebensjahre | im 1. Dienstjahre | im 2. Dienstjahre | im 3. Dienstjahre | im 4. Dienstjahre | darüber | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 6 | 2 | — | 3 | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 4 |
| — | — | — | — | — | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | — | 3 | — | — | 4 | — |
| — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 1 | — | 4 | 7 | 7 | 2 | — | — | 13 | 6 | 2 | — | — | — | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| 1 | — | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | — | — | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | 1 |
| — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 5 | 29 | 40 | 40 | 17 | 3 | 1 | 92 | 37 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 | 23 | 26 | 10 | 12 | 16 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | — | 16 | 8 | 3 | — | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
| — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| — | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — |
| — | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |

| Nummer der Krankheit | Name der Krankheit | Zahl der Behandelten (Bestand und Zugang) | Zahl der Gestorbenen | | Truppengattung†) | | | | | | | | | | | | | Dienstgrad | |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|------------------|------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------|----------------|---------|
| | | | absolut*) | % der Behandelten | Infanterie | Kavallerie | Feldartillerie | Fußartillerie | Pioniere | Verkehrstruppen | Train | Bekleidungsämter | Militärkrankenwärter | Landwehrstämme | Unteroffizierschulen | Festungsgefängnisse | Sonstige | Unteroffiziere | Gemeine |
| 83 | Andere Mund- und Rachenkrankheiten . . | 329 | 1 | 0,30 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 88 | Magenblutung bezw. Magengeschwür . . | 88 | 1 | 1,1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 90 | Chronischer Darmkatarrh | 97 | 1 | 1,0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 91 | Brechdurchfall | 85 | 2 | 2,4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 93 | Eingeklemmter Bruch | 24 | 1 | 4,2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 94 | Innerer Darmverschluss | 18 | 8 | 44,4 | 4 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 95 | Darm-, Blinddarmentzündung | 1087 | 27 + 1 | 2,6 | 18 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 26 |
| 96 | Bauchfellentzündung und Ausgänge . . . | 62 | 25 | 40,3 | 20 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 21 |
| 97 | Katarrhalische Gelbsucht | 480 | 1 | 0,21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 98 | Krankheiten der Leber und deren Ausführungsgänge | 50 | 3 | 6,0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 101 | Andere Krankheiten der Ernährungsorgane | 83 | 1 | 1,2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 102 u. 103 | Krankheiten der Nieren, Nebennieren und Harnleiter | 510 | 25 + 1 | 5,1 | 12 | 6 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 13 | 13 |
| 137 | Krankheiten des mittleren und inneren Ohrs | 5080 | 5 | 0,10 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 4 |
| 144 | Panaritium | 5755 | 2 | 0,03 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 145 | Zellgewebsentzündung und Ausgänge . . | 36262 | 8 | 0,02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 7 |
| 150 u. 151 | Knochenentzündung und Ausgänge ausschl. No. 20, Mißbildung der Knochen | 216 | 3 | 1,4 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 152 bis 154 | Akute und chronische Gelenkentzündung ausschl. No. 27 bezw. No. 20 und 28, Mißbildung der Gelenke | 2964 | 2 | 0,07 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 191 | Erfrierung (Frostschäden) | 998 | 4 | 0,40 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Summe | | 333501 | 660 + 29 | 0,21 | 431 | 79 | 85 | 26 | 19 | 6 | 11 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 95 | 594 |

*) Siehe Anmerkung *) auf Seite 110*).

†) " " †) " " 110*).

| Lebensalter | | | | | | | | Dienstalter | | | | | Todesmonat | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| bis zum vollendeten 19. Lebensjahre | im 20. Lebensjahre | im 21. Lebensjahre | im 22. Lebensjahre | im 23. Lebensjahre | im 24. u. 25. Lebensjahre | im 26. bis 30. Lebensjahre | nach dem 30. Lebensjahre | im 1. Dienstjahre | im 2. Dienstjahre | im 3. Dienstjahre | im 4. Dienstjahre | darüber | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| — | — | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | — | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | — | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | — | 12 | 7 | 3 | — | 3 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | — | 2 | 11 | 2 | 1 | — | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | — | 2 | 2 | 1 |
| — | 1 | — | 3 | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 2 | — | 3 | 2 | — | — | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | 3 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 13 | 26 | 115 | 169 | 173 | 124 | 40 | 29 | 326 | 232 | 45 | 13 | 73 | 42 | 57 | 67 | 71 | 68 | 69 | 51 | 66 | 52 | 59 | 44 | 43 |

2. Die Todesfälle, geordnet nach

| Nummer der Krank- heit | Name der Krankheit | Gardekorps | | I. | | II. | | III. | | IV. | | V. | | VI. | | VII. | | VIII. | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|---|---|
| | | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A r m e e - | | |
| 3 | Scharlach | 68 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 2 | 5 | 1 | — | — | 17 | 2 | |
| 6 | Diphtherie (Krupp) | 21 | 1 | — | — | 15 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | |
| 7 | Rose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 1 | — | — | — | — | |
| 8 u. 9 | Karbunkel (Milzbrand), Rotz . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 u. 11 | Hospitalbrand, Pyämie, Septikämie | 3 | 3 | 5 | 4 | — | — | — | — | 4 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Gastrisches Fieber | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Unterleibstypus | — | — | 47 | 4 | 104 | 5 | — | — | 16 | 4 | 5 | 2 | 33 | 3 | 27 | 3 | 67 | 6 | — | — | |
| 17 | Grippe | — | — | 712 | 1 | — | — | 428 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 187 | 1 | |
| 18 | Tuberkulose { Akute Miliartuberkulose | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 4 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | |
| 19 | | { der ersten Luftwege und Lunge | 85 | 10 | 63 | 2 | 39 | 1 | 63 | 1 | 23 | 3 | 29 | 3 | 41 | 7 | 46 | 8 | 51 | 1 | — | — |
| 20 | | { der Knochen und Gelenke | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | { anderer Organe | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | — | — | 5 | 1 | — | — | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | — | — | |
| 22 | Ruhr | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Epidemische Genickstarre | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | Starrkrampf (Trismus, Tetanus) . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | Akuter Gelenkrheumatismus | 412 | 1 | — | — | 3 ¹⁾ 161 | 1 | — | — | 158 | 2 | — | — | — | — | — | — | 206 | 1 | 194 | 1 | |
| 30 | Blutarmut | — | — | 25 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 u. 32 | Purpura, Skorbut | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Zuckerruhr | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | |
| 34 | Vergiftung durch Alkohol (akut und chronisch) | — | — | 6 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | Hitzschlag | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 4 | 1+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | |
| 39 | Bösartige Geschwülste | — | — | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | — | — | 2 | 1 | |
| 41 | Geisteskrankheiten | 20 | 1 | — | — | 21 | 1 | — | — | — | — | — | — | 17 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | Fallsucht | 25 | 1+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | Hirnhautentzündung ausschl. No. 21 und 25 | 11 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | Krankheiten des Gehirns | — | — | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | — | — | — | — | 6 | 1 | — | — | 4 | 2 | — | — | |

1) Siehe Anmerkung 1) auf Seite 4*).

Krankheiten und Armeekorps.

| IX. | | X. | | XI. | | XII. (1.K.S.) | | XIII. (K. W.) | | XIV. | | XV. | | XVI. | | XVII. | | XVIII. | | XIX. (2.K.S.) | | Armee | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| k o r p s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben |
| — | — | 25 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 1 | 18 | 1 | 21 | 3 | — | — | 5 | 1 | 339 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 199 | 3 |
| — | — | — | — | 15 | 1 | — | — | 37 | 1 | 34 | 1 | 28 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 629 | 5 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 |
| — | — | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | — | — | 4 | 1 | 3 | 2 | — | — | 6 | 2 | 7 | 1 | 52 | 29 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 20 | 2 | 19 | 3 | — | — | 20 | 1 | 35 | 2 | 35 | 3 | 17 | 3 | 56 | 3 | 5 | 1 | — | — | 556 | 45 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 480 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6261 | 6 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 | 29 |
| 36 | 1 | 49 | 4 | 40 | 3 | 31 | 5 | 40 | 3 | 63 | 7+1 | 47 | 3 | 31 | 3 | 59 | 10 | 60 | 2 | 32 | 2 | 943 | 79+1 |
| 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | 80 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | — | — | 4 | 1 | 8 | 2 | — | — | 11 | 3 | — | — | 8 | 1 | 5 | 2+1 | — | — | 116 | 23+1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 | 1 |
| — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 3 | — | — | 36 | 7 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 287 | 2 | 314 | 1 | — | — | — | — | 160 | 1 | 283 | 1 | 224 | 1 | 4456 | 12 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 530 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 63 | 1 |
| — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 | 2 | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 36 | 10+1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | +1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 6+1 |
| — | — | 4 | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 14 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 487 | 4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 464 | 1+1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 7 | 3 | 2 | 2 | — | — | 1 | +1 | — | — | 2 | 1 | 59 | 20+1 |
| 3 | 1 | — | — | — | — | 3 | 2+1 | — | — | 7 | 2 | — | — | 2 | +1 | — | — | 5 | 2 | 1 | 1 | 81 | 15+2 |

| Nummer der Krank- heit | Name der Krankheit | Gardekorps | | I. | | II. | | III. | | IV. | | V. | | VI. | | VII. | | VIII. | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---|
| | | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | A r m e e - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | militärärztl. behandelt | gestorben | |
| 48 | Andere Rückenmarkskrankheiten . . . | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Andere Krankheiten des Nerven- systems | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Akuter Bronchialkatarrh | — | — | — | — | 1158 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Chronischer Katarrh der Luftwege . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Akute Lungenentzündung | 222 | 11 | 252 | 4+1 | 230 | 8 | 141 | 6 | 149 | 3 | 185 | 6 | 170 | 7 | 167 | 9 | 153 | 14 | — | — | |
| 59 | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes ausschl. No. 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Brustfellentzündung und Ausgänge ausschl. No. 19 | 337 | 3 | 156 | 3 | 116 ¹⁾ | 3 | 106 | 1 | 56 | 1 | 110 | 1 | — | — | 119 | 1 | 85 | 1 | — | — | |
| 63 | Andere Krankheiten der Atmungs- organe | 1 | 1+1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 64 | Entzündung des Herzbeutels | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65 | Idiopathische Herzvergrößerung . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 66 | Erkrankung der Herzklappen | 41 | 1 | 21 | 1 | — | — | — | — | — | — | 25 | 1 | — | — | 27 | 1 | — | — | — | — | |
| 68 | Andere Herzkrankheiten | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | +1 | — | — | 5 | 1+1 | 2 | 1 | 6 | +1 | — | — | |
| 73 bis 75 | Erkrankungen der Lymphgefäße und Lymphdrüsen ausschl. No. 21 u. 116 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 133 | 1 | 170 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | Leukämie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 78 | Perniziöse Anämie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 82 | Mandelentzündung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1581 | 1+1 | |
| 83 | Andere Mund- und Rachenkrankheiten | 17 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 88 | Magenblutung bzw. Magengeschwür | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 90 | Chronischer Darmkatarrh | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 91 | Brechdurchfall | — | — | — | — | 42 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 93 | Eingeklemmter Bruch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | |
| 94 | Innerer Darmverschluss | — | — | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 95 | Darm-, Blinddarm-entzündung | 131 | 4+1 | 48 | 3 | — | — | 50 | 3 | 55 | 2 | 36 | 2 | — | — | 56 | 1 | 38 | 2 | — | — | |
| 96 | Bauchfellentzündung und Ausgänge | 5 | 4 | — | — | 3 | 2 | — | — | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | |
| 97 | Katarrhalische Gelbsucht | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 98 | Krankheiten der Leber und deren Ausführungsgänge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | |

1) Siehe Anmerkung 1) auf Seite 4*.

| Nummer der Krank- heit | Name der Krankheit | Gardekorps | | I. | | II. | | III. | | IV. | | V. | | VI. | | VII. | | VIII. | |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | A r m e e - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben |
| 101 | Andere Krankheiten der Ernährungsorgane | 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 102 u. 103 | Krankheiten der Nieren, Nebennieren und Harnleiter | 40 | 3 | — | — | 29 | +1 | 21 | 1 | 17 | 1 | — | — | 21 | 1 | 28 | 1 | — | — |
| 137 | Krankheiten des mittleren und inneren Ohrs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 219 | 1 | 267 | 3 |
| 144 | Panaritium | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 145 | Zellgewebsentzündung und Ausgänge | 3116 | 2 | 2337 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 u. 151 | Knochenentzündung und Ausgänge aussch. No. 20, Mißbildung der Knochen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 152 bis 154 | Akute und chronische Gelenkentzündung aussch. No. 27 bezw. No. 20 und 28, Mißbildung der Gelenke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 191 | Erfrierung (Frostschäden) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | 1 | — | — | — | — |
| Summe | | 29620 | 65+3 | 22456 | 42+2 | 18060 | 31+1 | 12693 | 21+1 | 12701 | 24+1 | 14498 | 32 | 14243 | 36+1 | 17136 | 34 | 19389 | 40+2 |

| IX. | | X. | | XI. | | XII. (I. K. S.) | | XIII. (K. W.) | | XIV. | | XV. | | XVI. | | XVII. | | XVIII. | | XIX. (2. K. S.) | | Armee | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| k o r p s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben | militärärztl. behandelt | gestorben |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 | 1 |
| 27 | 1 | 31 | 2 | 23 | 1 | — | — | 33 | 3 | 24 | 3 | 28 | 1 | 16 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 7 | 1 | 510 | 25+1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 266 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5080 | 5 |
| — | — | 244 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 334 | 1 | — | — | 5755 | 2 |
| — | — | — | — | — | — | 851 | 1 | 1509 | 1 | — | — | — | — | 2787 | 1 | 1577 | 1 | 1775 | 1 | — | — | 36262 | 8 |
| — | — | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 1 | — | — | — | — | — | — | 216 | 3 |
| — | — | — | — | 142 | 1 | 71 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2964 | 2 |
| — | — | — | — | 53 | 1 | — | — | — | — | 64 | 1 | — | — | — | — | — | — | 37 | 1 | — | — | 998 | 4 |
| 13500 | 17+1 | 12548 | 41 | 15383 | 26+1 | 11102 | 33+3 | 17293 | 28+1 | 19475 | 40+3 | 19527 | 28 | 19250 | 33+2 | 15727 | 34+6 | 16770 | 38+1 | 12130 | 17 | 333501 | 660+29 |

2. Nach Truppengattung und Dienstgrad.

| Truppengattung (siehe Erläuterung†) auf Seite 110*) | D i e n s t g r a d | | | | | | Auf Tausend der Iststärke der Truppen- gattung | Militär- ärztlich behandelt sind |
|--|---------------------------------|------------|---------------------|----------|---------|-------|--|---|
| | Feldwebel, Wacht- meister | Sergeanten | Unter- offiziere | Gefreite | Gemeine | Summe | | |
| Infanterie | — | 2 | 2 | 9 | 49 | 62 | 0,18 | 20 |
| Kavallerie | — | — | 2 | 6 | 21 | 29 | 0,49 | 18 |
| Feldartillerie | — | — | 2 | 1 | 24 | 27 | 0,45 | 11 |
| Fußartillerie | — | — | — | 3 | 2 | 5 | 0,24 | 1 |
| Pioniere | — | — | 1 | — | 11 | 12 | 0,86 | 1 |
| Verkehrstruppen | — | — | — | — | 1 | 1 | 0,16 | 1 |
| Train | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bekleidungsämter | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Militärkrankenwärter | — | — | — | — | 1 | 1 | 0,71 | 1 |
| Landwehrstämme | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 0,32 | — |
| Unteroffizierschulen | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Festungsgefängnisse | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | — | — |

C. Die Selbstmorde in der Armee

(einschließlich der Selbstmordversuche mit tödlichem Ausgange, vergl. letzte Spalte), geordnet:

1. Nach Armeekorps, Truppengattung, Dienstgrad, Lebens- und Dienstalter.

| Armeekorps | Absolute Zahl der Selbstmorde | Von 1000 Mann der Iststärke haben sich das Leben genommen | Truppengattung (siehe Erläuterung †) auf Seite 110*) | | | | | | | Dienstgrad | | | | Lebensalter | | | | | | Dienstalter | | | | | | Unzweifelhafte Fälle | Zweifelhafte Fälle | Militärärztlich behandelt sind (Selbstmordversuche) | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---|------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------|----------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------|----------|---------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----|---|---|
| | | | Infanterie | Kavallerie | Feldartillerie | Fußartillerie | Pioniere | Verkehnstruppen | Train | Landwehrstämme | Unteroffizierschulen | Feldwebel (Wachtmeister) | Sergeanten | Unteroffiziere | Gefreite | Gemeine | bis zum vollendeten 20. Lebensjahre | im 21. Lebensjahre | im 22. Lebensjahre | im 23. Lebensjahre | im 24. u. 25. Lebensjahre | im 26.—30. Lebensjahre | über 30 Jahre alt | im 1. Monat dienend | im 2.—6. Monat dienend | | | | im 7.—12. Monat dienend | im 13.—18. Monat dienend | im 19.—24. Monat dienend | länger als 4 Jahre dienend | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gardekorps | 11 | 0,27 | 6 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 9 | 2 | 3 | 4 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | — | 1 | 11 | — | 1 |
| I. Armeekorps | 1) 14 | 0,44 | 10 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — | 3 | 3 | 5 | 1 | — | 2 | 14 | — | 3 | | |
| II. Armeekorps | 12 | 0,46 | 9 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 5 | — | 5 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 4 | 12 | — | — | | |
| III. Armeekorps | 19 | 0,81 | 15 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 | — | 15 | — | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | — | — | 6 | 3 | 6 | — | 1 | 3 | 19 | — | 2 | | | |
| IV. Armeekorps | 2) 18 | 0,80 | 8 | 5 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | 1 | 3 | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | 6 | 5 | 3 | 2 | — | 2 | 18 | — | 1 | | | |
| V. Armeekorps | 13 | 0,51 | 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 | — | — | 3 | — | 9 | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | — | — | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | 13 | — | — | | | |
| VI. Armeekorps | 18 | 0,70 | 8 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | — | 4 | | |
| VII. Armeekorps | 5 | 0,19 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | 5 | — | 1 | | | |
| VIII. Armeekorps | 11 | 0,41 | 6 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 3 | 2 | 6 | — | 1 | — | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — | 1 | 3 | 2 | — | 1 | 4 | 11 | — | 2 | | | |
| IX. Armeekorps | 9 | 0,36 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 6 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 6 | — | — | 1 | — | 2 | 9 | — | — | | |
| X. Armeekorps | 20 | 0,91 | 15 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 | — | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | 8 | 5 | 2 | 2 | — | 3 | 20 | — | 4 | | | |
| XI. Armeekorps | 3) 16 | 0,77 | 13 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 4 | — | 9 | — | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | — | — | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | — | 1 | | | |
| XII. (1.K.S.) Armeekorps | 7 | 0,35 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | 7 | — | — | | |
| XIII. (K.W.) Armeekorps | 13 | 0,59 | 8 | — | 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 9 | — | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | — | 3 | | | |
| XIV. Armeekorps | 13 | 0,41 | 10 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | — | 1 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | 4 | 2 | 3 | 1 | — | 3 | 13 | — | 3 | | | |
| XV. Armeekorps | 9 | 0,29 | 5 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 3 | 8 | 1 | — | | | |
| XVI. Armeekorps | 4) 17 | 0,62 | 10 | 4 | — | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — | 13 | — | 4 | 8 | 2 | — | 3 | — | — | — | 6 | 3 | 4 | — | — | 4 | 17 | — | 2 | | | |
| XVII. Armeekorps | 17 | 0,57 | 12 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 13 | — | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | — | — | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | — | 2 | | | |
| XVIII. Armeekorps | 13 | 0,49 | 9 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | 8 | — | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | — | 2 | | | |
| XIX. (2.K.S.) Armeekorps | 8 | 0,39 | 5 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 6 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 5 | — | 1 | — | 8 | — | 1 | | | |
| Armee | 5) 263 | 0,50 | 170 | 38 | 27 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 15 | 38 | 13 | 187 | 17 | 48 | 54 | 54 | 52 | 30 | 8 | 5 | 71 | 57 | 55 | 15 | 13 | 47 | 262 | 1 | 32 | | |

- 1) Außerdem verübte 1 Mann, welcher sich wegen chronischen Magenkatarrhs in ärztlicher Behandlung befand, Selbstmord durch Vergiften.
 2) Außerdem verübte 1 Mann, welcher sich wegen Rifs- und Quetschwunde in ärztlicher Behandlung befand, Selbstmord durch Erschießen.
 3) Außerdem verübte 1 Mann, welcher sich wegen akuten Gelenkrheumatismus in ärztlicher Behandlung befand, Selbstmord durch Erhängen.
 4) Außerdem verübte 1 Mann, welcher sich wegen Wundreitens in ärztlicher Behandlung befand, Selbstmord durch Erhängen.
 5) Außerdem kamen noch 77 Selbstmordversuche vor, bei denen die Erhaltung des Lebens gelang.

3. Nach Todesart und Dienstalter.

| Todesart | Zahl der Selbstmorde | Von Hundert der Gesamtzahl | Dienstalter | | | | | | | Unzweifelhafte Fälle | Zweifelhafte Fälle | Militärärztlich behandelt sind (Selbstmordversuche) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|
| | | | im 1. Monat dienend | im 2.—6. Monat dienend | im 2. Halbjahre dienend | im 2. Dienstjahre stehend | im 3. Dienstjahre stehend | im 4. Dienstjahre stehend | über 4 Jahre dienend | | | |
| Erschießen | 121 | 46,0 | — | 15 | 27 | 25 | 8 | 9 | 37 | 121 | — | 22 |
| Erhängen | 75 | 28,5 | 2 | 29 | 14 | 16 | 6 | 3 | 5 | 75 | — | 2 |
| Ertränken | 31 | 11,8 | 1 | 12 | 4 | 10 | — | 1 | 3 | 31 | 1 | — |
| Schnitt, Hieb und Stich | 8 | 3,0 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 1 | 8 | — | 1 |
| Vergiften | 3 | 1,1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 3 | — | 2 |
| Überfahrenlassen | 21 | 8,0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | — | — | 21 | — | 2 |
| Sturz in die Tiefe | 4 | 1,5 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 3 |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

4. Nach Armeekorps, Art,

| Armeekorps | Art | | | | | | | | Ort | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------|-----------------|--|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|---|------------------------|----|
| | Erschießen | Erhängen | Ertränken | Schnitt, Hieb und Stich | Vergiften | Überfahrenlassen | Sturz in die Tiefe | Sonstige | in der Garnison | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | im Freien | | | | | | | | | in umschlossenen Räumen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | im Walde | auf dem Schießstande, Schießplatz bezw. Exerzierplatz | in öffentlichen Gärten oder Anlagen | auf Kirchhöfen | auf dem Bahnkörper | in fließenden Gewässern | in stehenden Gewässern | in Festungsgräben | auf Posten | in Kasernen | im Festungsgefängnis, Arrest | im Lazarett | in anderen militärischen Gebäuden | in Bürgerquartieren | in nicht militärischen öffentlichen oder privaten Gebäuden | auserhalb der Garnison | |
| Gardekorps | 4 | 5 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| I. Armeekorps | 7 | 5 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| II. Armeekorps | 3 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 4 | — | — | 2 | 2 | — | 2 |
| III. Armeekorps | 11 | 2 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| IV. Armeekorps | 5 | 8 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 1 | — | 6 |
| V. Armeekorps | 5 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| VI. Armeekorps | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 10 | 1 | — | — | 2 | — | 1 |
| VII. Armeekorps | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| VIII. Armeekorps | 7 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 5 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| IX. Armeekorps | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 | — | 2 |
| X. Armeekorps | 13 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 1 | — | 6 |
| XI. Armeekorps | 7 | 4 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| XII. (I.K.S.) Armeekorps | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| XIII. (K.W.) Armeekorps | 4 | 5 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 6 |
| XIV. Armeekorps | 9 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| XV. Armeekorps | 4 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| XVI. Armeekorps | 11 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 10 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| XVII. Armeekorps | 8 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| XVIII. Armeekorps | 6 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 1 | — | 5 |
| XIX. (2.K.S.) Armeekorps | 4 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| Armee | 121 | 75 | 31 | 8 | 3 | 21 | 4 | — | 8 | 6 | 7 | 1 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | — | 120 | 3 | 1 | 8 | 22 | 7 | 42 |

Ort, Ursache und Zeit.

| Ursache | | | | | | | | | | | | | | Zeit (Monat) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|---------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| Lebensüberdrufs | Körperliche Leiden | Geistesstörung | Leidenschaft (Liebe u. s. w.) | Laster (Trunk, Spiel u. s. w.) | Unglückliche Familien-, zerrüttete Vermögens-Verhältnisse | Reue, Scham, Gewissensbisse | Ärger, Streit | Gekränktes Ehrgefühl | Furcht vor Strafe | Unlust zum Dienst | Mißhandlung bezw. Mißbrauch der Dienst-gewalt durch Vorgesetzte | Schwermut | Heimweh | Verletzung der Eidspflicht | Unbekannt | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 4 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 2 | 1 | — |
| — | — | 4 | — | — | — | — | — | 2 | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — |
| 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 4 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 3 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 4 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 9 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 2 | 3 | 3 | — | — |
| — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 1 |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 |
| 2 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | 1 | — |
| 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | 2 | 9 | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | 2 | 3 | 5 | — | 4 | 1 | — | 2 | 3 |
| — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 8 | — | 1 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | — |
| — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | 1 |
| 1 | — | 3 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | — | 2 | — | — | — | 3 | — | 3 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 |
| 1 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 9 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — |
| — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 8 | 5 | 18 | 14 | 1 | 18 | 7 | 3 | 24 | 96 | 13 | 11 | 5 | 1 | 1 | 38 | 9 | 22 | 21 | 32 | 30 | 29 | 23 | 36 | 19 | 18 | 11 | 13 |

5. Nach Truppengattung,

| Truppengattung (siehe Erläuterung†) auf Seite 110*) | A r t | | | | | | | O r t | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|---|------------------------|
| | Erschießen | Erhängen | Ertränken | Schnitt, Hieb und Stich | Vergiften | Überfahrenlassen | Sturz in die Tiefe | i n d e r G a r n i s o n | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | i m F r e i e n | | | | | | | | i n u m s c h l o s s e n e n R ä u m e n | | | | | | | außerhalb der Garnison |
| | | | | | | | | im Walde | auf dem Schießstande, Schießplatz bezw. Exerzierplatz | in öffentlichen Gärten oder Anlagen | auf Kirchhöfen | auf dem Bahnkörper | in fließenden Gewässern | in stehenden Gewässern | in Festungsgräben | auf Posten | in Kasernen | im Festungsgefängnis, Arrest | im Lazarett | in anderen militärischen Gebäuden | in Bürgerquartieren | in nicht militärischen öffentlichen oder privaten Gebäuden | |
| Infanterie | 87 | 41 | 20 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 83 | 1 | — | 2 | 14 | 3 | |
| Kavallerie | 16 | 17 | 2 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 22 | 2 | — | — | 2 | — | 6 |
| Feldartillerie | 8 | 11 | 3 | — | — | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 9 | — | — | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Fufsartillerie | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Pioniere | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| Verkehrstruppen | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Train | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Bekleidungsämter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Militärkrankenwärter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Landwehrstämme | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| Unteroftizierschulen | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Festungsgefängnisse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

6. Nach Dienstgrad, Art,

| Dienstgrad | Erschießen | Erhängen | Ertränken | Schnitt, Hieb und Stich | Vergiften | Überfahrenlassen | Sturz in die Tiefe | im Walde | auf dem Schießstande, Schießplatz bezw. Exerzierplatz | in öffentlichen Gärten oder Anlagen | auf Kirchhöfen | auf dem Bahnkörper | in fließenden Gewässern | in stehenden Gewässern | in Festungsgräben | auf Posten | in Kasernen | im Festungsgefängnis, Arrest | im Lazarett | in anderen militärischen Gebäuden | in Bürgerquartieren | in nicht militärischen öffentlichen oder privaten Gebäuden | außerhalb der Garnison |
|--------------------------|------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|---|------------------------|
| Feldwebel, Wachtmeister | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Sergeanten | 14 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 10 | — | — | 2 | — | — | 1 |
| Unteroftiziere | 28 | 7 | 3 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 23 | 1 | — | — | 1 | 1 | 6 |
| Gefreite | 8 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Gemeine | 65 | 62 | 27 | 7 | 2 | 20 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 14 | 4 | — | 5 | 76 | 2 | 1 | 5 | 17 | 5 | 32 |

Art, Ort, Ursache und Zeit.

| Ursache | | | | | | | | | | | | | | | Zeit (Monat) | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|---------|----------------------------|--------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| Lebensüberdruß | Körperliche Leiden | Geistesstörung | Leidenschaften (Liebe u. s. v.) | Laster (Trunk, Spiel u. s. v.) | Unglückliche Familien-, zerrüttete Ver- mögensverhältnisse | Reue, Scham, Gewissensbisse | Ärger, Streit | Gekränktes Ehrgefühl | Furcht vor Strafe | Unlust zum Dienst | Mißhandlung bezw. Mißbrauch der Dienst- gewalt durch Vorgesetzte | Schwermut | Heimweh | Verletzung der Eidspflicht | Unbekannt | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| 5 | 3 | 13 | 6 | 1 | 14 | 5 | 1 | 16 | 65 | 6 | 5 | 4 | 1 | — | 25 | 5 | 11 | 12 | 23 | 19 | 16 | 16 | 24 | 16 | 11 | 7 | 10 |
| 1 | — | 2 | 2 | — | 3 | — | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | — | — | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | 4 | 8 | 2 | 2 | — | — | — | 5 | — | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | — |
| 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |

Ort, Ursache und Zeit.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|---|----|---|---|----|----|----|----|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 |
| — | — | — | 3 | — | 3 | — | — | 3 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| 2 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 10 | 18 | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 5 | — | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | 5 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 4 | — | 1 | 1 | — |
| 5 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 7 | 2 | 10 | 64 | 11 | 10 | 3 | 1 | — | 35 | 6 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 | 16 | 24 | 15 | 13 | 5 | 8 |

D. Gesamtübersicht der Todesfälle der ganzen Armee.

| Armeekorps | E s s i n d g e s t o r b e n | | | | | | | | | Summe aller Todesfälle | ‰ der Iststärke |
|------------------------------|----------------------------------|------------|-------|----------------------------------|------------|-------|----------------------------------|------------|-------|------------------------|-----------------|
| | an Krankheiten | | | infolge von Verunglückung | | | infolge von Selbstmord | | | | |
| | innerhalb | aufserhalb | Summe | innerhalb | aufserhalb | Summe | innerhalb | aufserhalb | Summe | | |
| | der militärärztlichen Behandlung | | | der militärärztlichen Behandlung | | | der militärärztlichen Behandlung | | | | |
| Gardekorps | 65 | 3 | 68 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 82 | 2,0 |
| I. Armeekorps | 42 | 2 | 44 | 3 | 8 | 11 | 3 | 11 | 14 | 69 | 2,2 |
| II. Armeekorps | 31 | 1 | 32 | 3 | 7 | 10 | — | 12 | 12 | 54 | 2,1 |
| III. Armeekorps | 21 | 1 | 22 | 4 | 8 | 12 | 2 | 17 | 19 | 53 | 2,3 |
| IV. Armeekorps | 24 | 1 | 25 | 4 | 3 | 7 | 1 | 17 | 18 | 50 | 2,2 |
| V. Armeekorps | 32 | — | 32 | 4 | 3 | 7 | — | 13 | 13 | 52 | 2,0 |
| VI. Armeekorps | 36 | 1 | 37 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 18 | 62 | 2,4 |
| VII. Armeekorps | 34 | — | 34 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 49 | 1,8 |
| VIII. Armeekorps | 40 | 2 | 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 57 | 2,1 |
| IX. Armeekorps | 17 | 1 | 18 | — | 2 | 2 | — | 9 | 9 | 29 | 1,2 |
| X. Armeekorps | 41 | — | 41 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 | 65 | 3,0 |
| XI. Armeekorps | 26 | 1 | 27 | 3 | 5 | 8 | 1 | 15 | 16 | 51 | 2,5 |
| XII. (1. K. S.) Armeekorps . | 33 | 3 | 36 | 1 | 6 | 7 | — | 7 | 7 | 50 | 2,5 |
| XIII. (K. W.) Armeekorps . | 28 | 1 | 29 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 13 | 51 | 2,3 |
| XIV. Armeekorps | 40 | 3 | 43 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 13 | 62 | 1,9 |
| XV. Armeekorps | 28 | — | 28 | 4 | 5 | 9 | — | 9 | 9 | 46 ¹⁾ | 1,5 |
| XVI. Armeekorps | 33 | 2 | 35 | 3 | 4 | 7 | 2 | 15 | 17 | 59 | 2,2 |
| XVII. Armeekorps | 34 | 6 | 40 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 17 | 62 | 2,1 |
| XVIII. Armeekorps | 38 | 1 | 39 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 13 | 58 | 2,2 |
| XIX. (2. K. S.) Armeekorps . | 17 | — | 17 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 30 | 1,5 |
| Armee | 660 | 29 | 689 | 53 | 86 | 139 | 32 | 231 | 263 | 1091 | 2,1 |

1) Darunter 1 Mann vom Königlich Sächsischen Truppenteil.

Sechste Abteilung: Bewegung

1. Krankenrapport über Spezialanstalten der ganzen Armee für

| Truppengattungen u. s. w. | Iststärke | Bestand waren | | | Zugang | | | | Im ganzen sind behandelt | | | |
|---|-----------|---------------|-----------|-------|-------------|-----------|------------------------|-------|--------------------------|-----------|------------------------|-------|
| | | im Lazarett | im Revier | Summe | im Lazarett | im Revier | im Lazarett und Revier | Summe | im Lazarett | im Revier | im Lazarett und Revier | Summe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Bekleidungsämter . . | 3056 | 49 | 6 | 55 | 674 | 969 | 144 | 1787 | 721 | 973 | 148 | 1842 |
| Militärkrankenwärter . | 1414 | 12 | — | 12 | 415 | 213 | 50 | 678 | 426 | 213 | 51 | 690 |
| Oberfeuerwerkerschule . | 284 | 2 | — | 2 | 37 | 83 | 7 | 127 | 39 | 83 | 7 | 129 |
| Gewehr-Prüfungs-Kommission | 157 | 1 | — | 1 | 6 | 18 | 1 | 25 | 7 | 18 | 1 | 26 |
| Infanterie-Schießschule | 376 | 3 | — | 3 | 21 | 84 | 5 | 110 | 24 | 84 | 5 | 113 |
| Lehr-Infanterie-Bataillon | 811 | 2 | — | 2 | 55 | 316 | 27 | 398 | 57 | 316 | 27 | 400 |
| Kriegsschüler | 982 | 5 | 7 | 12 | 99 | 624 | 74 | 797 | 103 | 630 | 76 | 809 |
| Festungsgefängnisse . . | 1789 | 55 | 31 | 86 | 594 | 1154 | 210 | 1958 | 642 | 1185 | 217 | 2044 |
| Arbeiter-Abteilungen bezw. Disziplinar- Abteilung | 419 | 21 | 5 | 26 | 275 | 344 | 58 | 677 | 296 | 349 | 58 | 703 |
| Schloßgarde- u. s. w. Kompagnie | 141 | 1 | 2 | 3 | 2 | 35 | 1 | 38 | 2 | 37 | 2 | 41 |
| Invaliden | 127 | 5 | 14 | 19 | 3 | 37 | 3 | 43 | 8 | 50 | 4 | 62 |
| Kadetten | 1958 | 43 | 10 | 53 | 1920 | 371 | 3 | 2294 | 1963 | 381 | 3 | 2347 |
| Unteroffizier-Vorschüler | 2044 | 22 | 11 | 33 | 322 | 1361 | 145 | 1828 | 343 | 1371 | 147 | 1861 |
| Militär-Bäcker- Abteilungen | 855 | 7 | — | 7 | 160 | 119 | 18 | 297 | 167 | 119 | 18 | 304 |
| Militär-Lehrschmieden u. s. w. | 309 | 5 | — | 5 | 63 | 75 | 20 | 158 | 66 | 75 | 22 | 163 |
| Militär-Reitinstitut bezw. Militär-Reitanstalt | 370 | 2 | — | 2 | 55 | 47 | 30 | 132 | 57 | 47 | 30 | 134 |
| Sonstige*) | 202 | — | — | — | 14 | 16 | 4 | 34 | 14 | 16 | 4 | 34 |
| Summe | 15294 | 235 | 86 | 321 | 4715 | 5866 | 800 | 11381 | 4935 | 5947 | 820 | 11702 |

*) Leibgardemarmerie, Festungsbauschule, Kavallerie-Telegraphenschule und Militär-Apotheker.

Außerhalb der militärärztlichen Behandlung sind

a) gestorben durch Krankheit 2, Unglücksfall 2, Selbstmord 1, Summe 5;

b) entlassen als dienstunbrauchbar 91, halbinvalide 41, ganzinvalide 33, Summe 165.

Gesamtzahl aller Todesfälle (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 37.

Gesamtzahl aller als dienstunbrauchbar und invalide Entlassenen (innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung) 393.

im Kranken-Zu- und Abgang.

das Berichtsjahr vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903.

| Abgang | | | | Bestand bleiben | | | Behandlungstage | | | Truppengattungen u. s. w. |
|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----------|-------|-----------------|-----------|--------|---|
| dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | im Lazarett | im Revier | Summe | im Lazarett | im Revier | Summe | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1657 | 5 | 117 | 1779 | 58 | 5 | 63 | 21272 | 5984 | 27256 | Bekleidungsämter |
| 626 | 5 | 39 | 670 | 20 | — | 20 | 9716 | 1862 | 11578 | Militärkrankenwärter |
| 119 | — | 9 | 128 | 1 | — | 1 | 1062 | 477 | 1539 | Oberfeuerwerkerschule |
| 26 | — | — | 26 | — | — | — | 244 | 143 | 387 | Gewehr-Prüfungs-Kommission |
| 108 | — | 3 | 111 | 2 | — | 2 | 1183 | 532 | 1715 | Infanterie-Schießschule |
| 387 | 1 | 10 | 398 | 2 | — | 2 | 1838 | 1714 | 3552 | Lehr-Infanterie-Bataillon |
| 765 | 1 | 30 | 796 | 5 | 8 | 13 | 2852 | 5442 | 8294 | Kriegsschüler |
| 1847 | 5 | 116 | 1968 | 51 | 25 | 76 | 24344 | 10180 | 34524 | Festungsgefängnisse |
| 615 | — | 56 | 671 | 30 | 2 | 32 | 9192 | 1993 | 11185 | Arbeiter-Abteilungen bezw. Disziplinar- Abteilung |
| 34 | — | 3 | 37 | 1 | 3 | 4 | 45 | 911 | 956 | Schloßgarde- u. s. w. Kompagnie |
| 31 | 10 | 4 | 45 | 3 | 14 | 17 | 1357 | 5363 | 6720 | Invaliden |
| 2271 | 2 | 51 | 2324 | 23 | — | 23 | 17636 | 3592 | 21228 | Kadetten |
| 1748 | 2 | 67 | 1817 | 25 | 19 | 44 | 8782 | 7481 | 16263 | Unteroffizier-Vorschüler |
| 284 | — | 11 | 295 | 9 | — | 9 | 4906 | 926 | 5832 | Militär-Bäcker- Abteilungen |
| 155 | — | 6 | 161 | 1 | 1 | 2 | 1547 | 597 | 2144 | Militär-Lehrschmieden u. s. w. |
| 123 | 1 | 8 | 132 | 2 | — | 2 | 2296 | 500 | 2796 | Militär-Reitinstitut bezw. Militär-Reitanstalt |
| 32 | — | — | 32 | 1 | 1 | 2 | 350 | 119 | 469 | Sonstige*) |
| 10828 | 32 | 530 | 11390 | 234 | 78 | 312 | 108622 | 47816 | 156438 | Summe |

Erläuterung der Längsspalte 14.

| | |
|---|-----|
| In die Heimat beurlaubt | 70 |
| In Kurorte bezw. Genesungsheime entsendet | 37 |
| Den Zivilbehörden überwiesen | 1 |
| An Irrenanstalten überwiesen | 3 |
| Als dienstunbrauchbar entlassen | 143 |
| Als halbinvalide entlassen | 3 |
| Als ganzinvalide entlassen | 82 |
| Vor abgeschlossener Beobachtung aus dem Lazarett entwichen | 1 |
| Nach Einleitung des Dienstunbrauchbarkeits- bezw. Invaliditätsverfahrens dienstunfähig zur Truppe entlassen | 110 |
| Aus anderen Gründen in Abgang gebracht | 80 |
| Summe | 530 |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang bei | | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-----|
| | | | | den Bekleidungs- ämtern | den Militär- krankenwärt- ern | der Oberfeuer- werkerschule | der Gewehr- Prüfungs- Kommission | der Infanterie- Schiffsschule | dem Lehr-Infan- terie-Bataillon | den Kriegs- schülern | den Festungs- gefängnissen | den Arbeiter- Abteilungen bezw. bei der Disziplinar- Abteilung | der Schloßgarde- u. s. w. Kompagnie | den Invaliden | den Kadetten | den Unteroffizier- Vorschülern | den Militär- Bäcker-Abteilungen | den Militär-Lehr- schmieden u. s. w. | dem Militär- Reitinstitut bezw. bei der Militär- Reitanstalt | den Sonstigen ¹⁾ | Summe | dienstfähig | | | gestorben | anderweitig | Summe | |
| noch IV. Krankheiten der Kreislauf- und blutbereitenden Organe. | 67 | Nervöse Störung der Herztätigkeit | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | 6 | 1 | — | — | 6 | 9 | 1 | — | — | — | 25 | 16 | — | 11 | 27 | 2 | 534 | |
| | 68 | Andere Herzkrankheiten | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 2 | 4 | — | 92 | |
| | 69 | Pulsadergeschwulst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 70 | Hämorrhoiden | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 10 | — | — | 10 | 1 | 208 |
| | 71 | Krampfadern ausschl. No. 110 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | 1 | 6 | 1 | 399 |
| | 72 | Venenentzündung | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 89 |
| | 73 bis 75 | Erkrankungen der Lymphgefäße und Lymphdrüsen ausschl. No. 21 u. 116 | 3 | 25 | 8 | — | — | 5 | 9 | 11 | 32 | 10 | — | — | 21 | 28 | 7 | 1 | 2 | — | 159 | 150 | — | 4 | 154 | 8 | 2386 | |
| | 76 | Kropf | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 1 | 3 | — | 163 |
| | 77 | Leukämie . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 78 | Perniziöse Anämie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Andere Krankheiten der Gruppe IV. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 6 | |
| | Summe | 13 | 35 | 14 | 1 | — | 5 | 14 | 13 | 48 | 13 | — | — | 29 | 40 | 9 | 1 | 2 | — | 224 | 189 | 2 | 34 | 225 | 12 | 4815 | | |
| V. Krankheiten der Ernährungsorgane. | 80 | Krankheiten der Kiefer und Zähne | 1 | 31 | 4 | — | — | 17 | 8 | 21 | 11 | 2 | — | 7 | 21 | 3 | — | 1 | — | 126 | 127 | — | — | 127 | — | 614 | | |
| | 81 | Zungenentzündung | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | | |
| | 82 | Mandelentzündung | 9 | 171 | 99 | 22 | 1 | 13 | 44 | 86 | 225 | 33 | 1 | — | 445 | 330 | 17 | 15 | 8 | 4 | 1514 | 1516 | — | — | 1516 | 7 | 8251 | |
| | 83 | Andere Mund- und Rachenkrankheiten | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | 90 | 3 | — | 1 | — | — | 107 | 107 | — | — | 107 | 1 | 774 | |
| | 84 | Krankheiten der Speicheldrüsen ausschl. No. 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 6 | 5 | — | 1 | 6 | — | 42 | |
| | 85 | Krankheiten der Speiseröhre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 86 | Akuter Magenkatarrh | 3 | 60 | 25 | 2 | 3 | 3 | 17 | 41 | 89 | 23 | 2 | 4 | 70 | 63 | 8 | 2 | 3 | — | 415 | 411 | — | — | 411 | 7 | 2784 | |
| | 87 | Chronischer Magenkatarrh | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 9 | 4 | — | 3 | 7 | 2 | 435 | |
| | 88 | Magenblutung bzw. Magengeschwür | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | 2 | 3 | 2 | 357 | |
| | 89 | Akuter Darmkatarrh | 4 | 64 | 22 | 4 | 1 | 2 | 21 | 33 | 54 | 24 | 4 | 1 | 48 | 35 | 6 | 1 | 1 | — | 321 | 321 | — | 1 | 322 | 3 | 2400 | |
| 90 | Chronischer Darmkatarrh | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 629 | | |

1) Leibgardemarie, Festungsbauerschule, Kavallerie-Telegraphenschule, Militärapotheke.

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang bei | | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | |
|---|-------------------|--|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | | | den Bekleidungs- ämtern | den Militär- krankenwärtern | der Oberfeuer- werschule | der Gewehr- Prüfungs- Kommission | der Infanterie- Schiefschule | dem Lehr-Infan- terie-Bataillon | den Kriegs- schülern | den Festungs- gefangnissen | den Arbeiter- Abteilungen bezw. bei der Disziplinar- Abteilung | der Schloßgarde- u. s. w. Kompagnie | den Invaliden | den Kadetten | den Unteroffizier- Vorschülern | der Militär- Bäcker-Abteilungen | den Militär-Lehr- schmieden u. s. w. | dem Militär- Reitinstitut bezw. bei der Militär- Reitanstalt | den Sonstigen ¹⁾ | Summe | dienstfähig | | | gestorben | anderweitig |
| noch V. Krankheiten der Ernährungsorgane. | 91 | Brechdurchfall | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 8 | |
| | 92 | Unterleibsbrüche ausschl. No. 93 | 1 | 19 | 6 | 1 | — | — | — | 2 | 8 | 3 | — | — | 3 | 1 | 3 | — | — | 46 | 39 | — | 7 | 46 | 1 | 512 |
| | 93 | Eingeklemmter Bruch | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 1 | 3 | — | 56 |
| | 94 | Innerer Darmverschluss | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 95 | Darm-, Blinddarmentzündung | 4 | 7 | 6 | — | — | 2 | 3 | 5 | 9 | — | — | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 70 | 56 | — | 9 | 65 | 9 | 1981 |
| | 96 | Bauchfellentzündung und Ausgänge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 97 | Katarrhalsche Gelbsucht | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 2 | — | — | 6 | 2 | 1 | — | — | 25 | 23 | — | 2 | 25 | 1 | 509 |
| | 98 | Krankheiten der Leber u. deren Ausführungsgänge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 36 |
| | 99 | Krankheiten d. Mastdarms ausschl. No. 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 55 |
| | 100 | Eingeweidewürmer | — | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 19 | — | — | 19 | — | 196 |
| | 101 | Andere Krankheiten der Ernährungsorgane | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | 3 | 6 | — | 1 | — | — | 15 | 14 | — | 1 | 15 | 1 | 548 |
| | Summe | 28 | 362 | 170 | 30 | 5 | 20 | 104 | 184 | 436 | 104 | 10 | 10 | 714 | 458 | 41 | 20 | 15 | 5 | 2688 | 2651 | 1 | 28 | 2680 | 36 | 20191 |
| VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane einschließlich der venerischen. | 102 und 103 | Krankheiten der Nieren, Nebennieren u. Harnleiter | — | 2 | 5 | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | 4 | 4 | — | — | — | 1 | 21 | 9 | — | 11 | 20 | 1 | 1030 |
| | 104 und 105 | Blasenkatarrh und andere Blasenkrankheiten | 2 | 6 | 4 | — | — | 1 | — | 2 | 13 | 1 | — | — | 6 | 1 | — | — | — | 34 | 26 | — | 8 | 34 | 2 | 660 |
| | 106 bis 108 | Krankheiten d. Vorstehdrüse, Eichel, Vorhaut und Harnröhre | 2 | 9 | 4 | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 7 | — | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | 33 | 32 | — | 2 | 34 | 1 | 458 |
| | 109 | Wasserbruch | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 7 | 6 | — | 2 | 8 | — | 139 |
| | 110 | Krampfaderbruch | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | — | 1 | 5 | — | 95 |
| | 111 | Andere Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | — | 9 | 1 | 98 |
| | Summe | 6 | 19 | 17 | 2 | — | 2 | 1 | 9 | 29 | 7 | — | — | 5 | 12 | 4 | — | 1 | 1 | 109 | 86 | — | 24 | 110 | 5 | 2480 |

1) Leibgarderie, Festungsbauschule, Kavallerie-Telegraphenschule, Militärapotheke.

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Z u g a n g b e i | | | | | | | | | | | | | | | | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | |
|------------------------------|--|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | | den Bekleidungs- ämtern | den Militär- krankenwärtern | der Oberfeuer- wekerschule | der Gewehr- Prüfungs- Kommission | der Infanterie- Schießschule | dem Lehr-Infan- terie-Bataillon | den Kriegs- schülern | den Festungs- gefangnissen | den Arbeiter- Abteilungen bezw. bei der Disziplinär- Abteilung | der Schloßgarde- u.s.w. Kompagnie | den Invaliden | den Kadetten | den Unteroffizier- Vorschülern | den Militär- Bäcker-Abteilungen | den Militär-Lehr- schmieden u.s.w. | dem Militär- Reinstitüt bezw. bei der Militär- Reitanstalt | den Sonstigen 1) | S u m m e | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | S u m m e | |
| VII. Venerische Krankheiten. | 112 | Tripper . . . | 9 | 55 | 27 | 9 | 2 | — | 5 | 27 | 23 | 17 | — | — | 2 | 4 | 17 | 2 | 9 | 1 | 200 | 189 | — | 11 | 200 | 9 | 8079 | |
| | 113 | Hoden- und Nebenhoden- entzündung | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | 8 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 18 | 16 | — | 1 | 17 | 2 | 258 | |
| | 114 | Spitze Feig- warzen | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 14 | |
| | 115 | Weicher Schanker | 2 | 11 | 4 | 7 | — | 2 | — | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 39 | 31 | — | 5 | 36 | 5 | 1154 | |
| | 116 | Bubo | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 150 | |
| | 117 | Konstitutio- nelle Syphilis | — | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | — | — | — | — | 5 | 2 | 3 | — | 50 | 41 | — | 3 | 44 | 6 | 2064 | |
| | | Summe | | 12 | 77 | 37 | 18 | 3 | 3 | 8 | 36 | 51 | 25 | — | — | 2 | 5 | 25 | 5 | 15 | 2 | 312 | 282 | — | 20 | 302 | 22 | 11719 |
| VIII. Augenkrankheiten. | 118 | a. An- steckende. Granulö- ser (folli- kulärer) Binde- haut- katarrh | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 1 | 3 | — | 33 | |
| | 119 | die kontagiöse Augenkrankheit Granulöse (folliku- läre) Binde- haut- erkrankungen u. Folgezu- stände | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 40 | |
| | 120 | Akute Blen- norrhoe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 121 | Chronische Blennorrhoe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 122 | Tripper- Blennorrhoe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 72 |
| | | Summe a | | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 | 2 | — | 3 | 5 | — | 145 | |
| | 123 | b. Nicht an- steckende. Krankheiten der Lider | — | 15 | — | 1 | — | — | 2 | 3 | 13 | 4 | — | — | 4 | 16 | 1 | 1 | — | 1 | 61 | 61 | — | — | 61 | — | 330 | |
| 124 | Krankheiten der Binde- haut | 6 | 49 | 5 | 2 | — | 4 | 11 | 11 | 62 | 14 | 1 | — | 56 | 47 | 1 | 1 | 2 | — | 266 | 269 | — | 1 | 270 | 2 | 2018 | | |
| 125 | Krankheiten der Tränen- organe | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 30 | | |
| 126 | Krankheiten der Augen- muskeln | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 40 | | |
| 127 | Krankheiten der Hornhaut | 2 | 15 | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 7 | 1 | — | — | 3 | 5 | — | 1 | 2 | 1 | 43 | 41 | — | 4 | 45 | — | 941 | | |
| 128 | Krankheiten der Regen- bogenhaut | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 3 | — | — | 3 | 1 | 78 | | |
| 129 | Krankheiten der Linse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |

1) Leibgardarmerie, Festungsbauschule, Kavallerie-Telegraphenschule, Militärapotheke.

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Z u g a n g b e i | | | | | | | | | | | | | | A b g a n g | | | | | Summe | Bestand bleiben | Behandlungstage | | |
|---|--|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------|-------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | | | den Bekleidungs- ämtern | den Militär- krankenwärtern | der Oberfeuer- werkerschule | der Gewehr- Prüfungs- Kommission | der Infanterie- Schiffsschule | den Lehr-Infan- terie-Bataillon | den Kriegs- schülern | den Festungs- gefangnissen | den Arbeiter- Abteilungen bezw. bei der Disziplinär- Abteilung | der Schloisgarde- u.s.w. Kompagnie | den Invaliden | den Kadetten | den Unteroffizier- Vorschülern | den Militär- Bäcker-Abteilungen | den Militär-Lehr- schmieden u.s.w. | dem Militär- Reitstütz bezw. bei der Militär- Reitanstalt | den Sonstigen ¹⁾ | Summe | dienstfähig | | | | gestorben | anderweitig |
| noch VIII. Augenkrankheiten. | 130 | Krankheiten der Aderhaut | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 3 | — | 213 | | |
| | 131 | Krankheiten des Sehnerven und der Netzhaut | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 3 | 102 | | |
| | 132 | Krankheiten u. Fehler des Brechungs- u. Einstellungsvermögens | 1 | 6 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 8 | 7 | — | 2 | 9 | — | 74 | | |
| | 133 | Nachtblindheit | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | 4 | — | 41 | |
| | 134 | Andere Augenkrankheiten | 1 | 5 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 10 | — | 3 | 13 | — | 242 | | |
| | | Gesamtsumme (a u. b) | 11 | 95 | 11 | 7 | — | 4 | 15 | 17 | 89 | 26 | 1 | — | 65 | 71 | 3 | 5 | 4 | 2 | 415 | 406 | — | 14 | 420 | 6 | 4254 |
| IX. Ohrenkrankheiten. | 135 | Krankheiten der Ohrmuschel | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 7 | | |
| | 136 | Krankheiten des äußeren Gehörganges | 1 | 12 | 3 | 1 | — | — | 2 | 3 | 9 | 8 | — | — | 11 | 8 | 2 | — | — | 1 | 60 | 58 | — | — | 58 | 3 | 671 |
| | 137 | Krankheiten des mittleren und inneren Ohrs | 5 | 41 | 12 | 1 | — | 2 | 4 | 13 | 64 | 13 | — | — | 59 | 33 | 4 | 1 | 4 | 1 | 252 | 199 | — | 46 | 245 | 12 | 5673 |
| | 138 | Schwerhörigkeit | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 24 | |
| | 139 | Andere Ohrenkrankheiten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | Summe | 6 | 55 | 15 | 2 | — | 2 | 6 | 16 | 74 | 21 | — | — | 70 | 41 | 6 | 1 | 4 | 2 | 315 | 260 | — | 46 | 306 | 15 | 6375 |
| X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen. | 140 | Krätze | — | 3 | — | 1 | — | — | 6 | — | 3 | 4 | — | — | — | 8 | 5 | — | 1 | — | 31 | 31 | — | — | 31 | — | 168 |
| | 141 | Akute Hautkrankheiten ausschl. Gruppe I | 7 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 48 | 3 | — | — | 18 | 39 | 9 | 3 | 1 | — | 175 | 175 | — | 1 | 176 | 6 | 2513 |
| | 142 | Chronische Hautkrankheiten | — | 9 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 14 | 13 | — | 1 | 14 | — | 594 |
| | 143 | Chronisches Unterschenkelgeschwür | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 11 | 9 | — | 1 | 10 | 1 | 365 |
| | 144 | Panaritium | 1 | 32 | 23 | — | — | — | 3 | 6 | 66 | 17 | — | — | 3 | 25 | 18 | 8 | 3 | — | 204 | 196 | — | 4 | 200 | 5 | 3490 |
| | 145 | Zellgewebsentzündung und Ausgänge | 24 | 140 | 43 | 5 | — | 12 | 21 | 32 | 187 | 56 | 1 | — | 66 | 121 | 34 | 20 | 12 | 3 | 753 | 750 | — | 9 | 759 | 18 | 9224 |
| | 146 | Furunkel . . | 16 | 97 | 11 | 5 | 2 | 19 | 54 | 75 | 141 | 60 | — | — | 93 | 119 | 16 | 15 | 11 | 1 | 719 | 725 | — | 1 | 726 | 9 | 5757 |
| | 147 | Gutartige Geschwülste | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | 9 | 1 | — | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 26 | 24 | — | — | 24 | 2 | 322 |
| 148 | Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 26 | |
| | Summe | 48 | 314 | 86 | 13 | 3 | 32 | 93 | 122 | 463 | 141 | 1 | 1 | 184 | 317 | 85 | 48 | 28 | 5 | 1936 | 1926 | — | 17 | 1943 | 41 | 22459 | |

1) Leibgendarmerie, Festungsbauschule, Kavallerie-Telegraphenschule, Militärapotheke.

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang bei | | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | den Bekleidungs- ämtern | den Militär- krankenwärtern | der Oberfeuer- werschule | der Gewehr- Prüfungs- Kommission | der Infanterie- Schießschule | dem Lehr-Infan- terie-Bataillon | den Kriegs- schülern | den Festungs- gefangnissen | den Arbeiter- Abteilungen bezw. bei der Disziplinar- Abteilung | der Schloßgarde- u. s. w. Kompagnie | den Invaliden | den Kadetten | den Unteroffizier- Vorschülern | den Militär- Bäcker-Abteilungen | den Militär-Lehr- schmiedern u. s. w. | dem Militär- Retinstitüt bezw. bei der Militär- Retanstalt | den Sonstigen ¹⁾ | Summe | | | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe |
| XI. Krankheiten der Bewegungsorgane. | 149 und 150 | Entzündung der Knochen- haut und Knochen ausschl. No. 20 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | — | 10 | 11 | — | — | — | 49 | 41 | — | 6 | 47 | 4 | 1268 | |
| | 151 | Mißbildung der Knochen | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 7 | |
| | 152 | Akute Gelenk- entzündung ausschl. No. 27 | 1 | 5 | 2 | 3 | — | — | 4 | 5 | 12 | 3 | — | — | 7 | 8 | 3 | — | — | 53 | 51 | — | 1 | 52 | 2 | 802 | |
| | 153 | Chronische Gelenkent- zündung ausschl. No. 20 u. 28 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 | — | — | — | 11 | 7 | — | 6 | 13 | — | 457 | |
| | 154 | Mißbildung der Gelenke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 155 | Fuß- geschwulst | — | 16 | 2 | — | — | — | 2 | 11 | 4 | 12 | 5 | — | — | 3 | 7 | — | — | 62 | 61 | — | 1 | 62 | — | 423 | |
| | 156 | Plattfüßig- keit u. Folge- zustände | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 9 | 9 | — | 2 | 11 | — | 125 | |
| | 157 | Andere Ver- bildungen des Fußes und Folge- zustände | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 158 | Muskelrheu- matismus | 3 | 62 | 18 | 3 | 5 | 1 | 15 | 26 | 52 | 14 | 2 | 5 | 24 | 33 | 10 | 1 | 4 | 4 | 279 | 277 | — | 1 | 278 | 4 | 2585 |
| | 159 | Exerzier- und Reitknochen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 160 | Andere Krankheiten der Muskeln | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 5 | 4 | — | 1 | 5 | — | 100 |
| 161 und 162 | Krankheiten der Schleim- beutel und Sehnen | 6 | 11 | 5 | 1 | — | 4 | 7 | 8 | 14 | 17 | — | — | 8 | 11 | 2 | — | — | 2 | 90 | 89 | — | 4 | 93 | 3 | 1105 | |
| | Summe | 16 | 103 | 34 | 7 | 5 | 7 | 40 | 49 | 102 | 44 | 3 | 5 | 58 | 75 | 15 | 1 | 5 | 6 | 559 | 540 | — | 22 | 562 | 13 | 6872 | |
| XII. Mechanische Verletzungen. | 163 | Wundlaufen | 1 | 7 | 3 | — | — | 1 | 5 | — | 21 | 23 | — | — | 2 | 7 | — | 1 | — | 70 | 70 | — | — | 70 | 1 | 643 | |
| | 164 | Wundreiten | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | 1 | 6 | — | 39 | |
| | 165 | Quetschung (der Weich- teile ohne äußere Wunde | 15 | 43 | 8 | 3 | — | 1 | 13 | 84 | 34 | 17 | 1 | — | 117 | 96 | 11 | 13 | 15 | 3 | 459 | 456 | — | 9 | 465 | 9 | 4515 |
| | 166 | Quetschung innerer Organe | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 12 |
| | 167 | Zerreißen innerer Or- gane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 168 | Knochenbruch des Ober- arms | 3 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 6 | 8 | — | 1 | 9 | — | 260 |
| | 169 | des Unter- arms | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 15 | 11 | — | — | — | — | 32 | 25 | — | 7 | 32 | 2 | 1179 |
| | 170 | der Hand | — | 4 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 9 | 9 | — | — | 9 | — | 261 |
| | 171 | des Ober- schenkels | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 2 | 1 | 182 |
| | 172 | des Unter- schenkels | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 12 | 8 | — | 5 | 13 | 1 | 709 |
| 173 | des Fußes | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 15 | 14 | — | 1 | 15 | — | 472 | |
| 174 | des Kopfes | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 34 | |
| 175 | des Schlüssel- beins | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 8 | 7 | — | 1 | 8 | — | 187 | |

1) Leibgardarmerie, Festungsbauschule, Kavallerie-Telegraphenschule, Militärapotheke.

b) Nach der Zeit des Zugangs.

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | | | | | |
|---|-------------------|--|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------|---|---|---|---|---|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen. | 1 | Pocken | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 2 | Windpocken . . . | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 4 | 3 | — | — | — | 11 | 11 | — | — | 11 | — | — | 122 | | | | | |
| | 3 | Scharlach | — | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | — | — | 50 | 46 | 3 | 1 | 50 | — | — | 1865 | | | | | |
| | 4 | Masern (Röteln) . | 11 | 1 | 2 | — | 24 | 25 | 11 | 4 | 9 | 14 | — | 1 | 91 | 102 | — | — | 102 | — | — | 1535 | | | | | |
| | 5 | Epidemische Ohrspeicheldrüsenentzündung | — | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 26 | 26 | — | — | 26 | — | — | 327 | | | | | |
| | 6 | Diphtherie(Krupp) | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 2 | — | 9 | 9 | — | — | 9 | — | — | 203 | | | | | |
| | 7 | Rose | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 35 | — | 1 | 36 | 1 | 786 | | | | | |
| | 8 | Karbunkel (Milzbrand) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 9 | Rotz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 10 und 11 | Hospitalbrand, Pyämie, Septikämie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 12 | Gastrisches Fieber | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 13 | Unterleibstypus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 9 | 1 | 16 | 14 | 1 | 2 | 17 | 1 | — | 685 | | | | | |
| | 14 | Flecktyphus . . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 15 | Rückfallfieber . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 16 | Wechselfieber . . | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | — | 1 | 9 | 1 | 315 | | | | | |
| | 17 | Grippe | 1 | 4 | 13 | 38 | 247 | 17 | 26 | 7 | 6 | 7 | 2 | 11 | 13 | 391 | 391 | — | 1 | 392 | — | 2248 | | | | | |
| | 18 | Tuberkulose (Akute Miliartuberkulose der ersten Luftwege u. Lunge der Knochen u. Gelenke anderer Organe | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 8 | | | | | |
| | 19 | | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | — | 2 | 35 | — | 4 | 33 | 37 | 2 | 1694 | | | | | |
| | 20 | | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | 3 | — | 151 | | | | | |
| | 21 | | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 2 | — | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 740 | | | | | |
| | 22 | Ruhr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | | | | | |
| | 23 | Asiatische Cholera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | 24 | Einheimische Cholera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | 25 | Epidemische Genickstarre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------|-----|---|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen. | 26 | Starrkrampf (Trismus, Tetanus) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 27 | Akuter Gelenkrheumatismus | 8 | 9 | 18 | 12 | 21 | 19 | 22 | 21 | 15 | 12 | 10 | 4 | 12 | 175 | 145 | 3 | 27 | 175 | 8 | 5376 | | |
| | 28 | Chronischer Gelenkrheumatismus | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | — | 2 | 5 | 5 | 739 | |
| | 29 | Gicht | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 16 | | |
| | 30 | Blutarmut | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 36 | 29 | — | 7 | 36 | 2 | 730 | | |
| | 31 und 32 | Purpura, Skorbut | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 2 | 4 | — | 166 | | |
| | 33 | Zuckerruhr | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | 3 | 4 | — | 169 | | |
| | 34 | Vergiftung durch (Alkohol (akut und chronisch) Gase andere Gifte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 19 | |
| | 35 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 36 | | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 128 | |
| | 37 | Trichinose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 38 | Hitzschlag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 39 | Bösartige Geschwülste | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 5 | | |
| | 40 | Andere allgemeine Erkrankungen | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 6 | | |
| | Summe | 36 | 40 | 58 | 73 | 313 | 87 | 85 | 55 | 55 | 48 | 41 | 24 | 38 | 917 | 830 | 14 | 86 | 930 | 23 | 18034 | | | |
| II. Krankheiten des Nervensystems. | 41 | Geisteskrankheiten | 19 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 51 | — | 1 | 66 | 67 | 3 | 5844 | | |
| | 42 | Fallsucht | — | 2 | 2 | — | 2 | 3 | — | — | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 17 | — | — | 14 | 14 | 3 | 431 | | |
| | 43 | Erkrankungen im Gebiete einzelner Nervenbahnen | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | — | 5 | 10 | 46 | 42 | — | 2 | 44 | 7 | 1541 | | |
| | 44 | Hirnhautentzündung aussch. No. 21 u. 25 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | — | 71 | | |
| | 45 | Krankheiten des Gehirns | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 5 | 1 | 3 | — | 4 | 1 | 124 | | |
| | 46 | Gehirn- (Rückenmark-) Erschütterung | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | — | 7 | 1 | 94 | | |
| | 47 | Tabes dorsalis | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 666 | | |
| | 48 | Andere Rückenmarkskrankheiten | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 3 | — | 183 | | |
| | 49 | Progressive Muskelatrophie | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 85 | | |
| | 50 | Neurasthenie . . . | 2 | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 12 | 10 | — | 3 | 13 | 1 | 438 | | |
| 51 | Hysterie | 5 | 1 | 2 | — | 3 | 2 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 11 | — | 9 | 20 | 3 | 908 | | | |
| 52 | Andere Krankheiten des Nervensystems | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 9 | 7 | — | 2 | 9 | — | 203 | | | |
| | Summe | 35 | 10 | 18 | 10 | 22 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 8 | 13 | 18 | 171 | 78 | 8 | 100 | 186 | 20 | 10588 | | | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage |
|---|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | | |
| III. Krankheiten der Atmungsorgane. | 53 | Krankheiten der Nase und Nebenhöhlen | 1 | 6 | 23 | 4 | 13 | 12 | 20 | 28 | 16 | 8 | 3 | 11 | 35 | 179 | 175 | — | 4 | 179 | 1 | 1668 |
| | 54 | Akuter Kehlkopf- und Luftröhrenkatarrh | 4 | 21 | 38 | 50 | 79 | 65 | 33 | 29 | 24 | 10 | 12 | 11 | 14 | 386 | 386 | — | 2 | 388 | 2 | 3201 |
| | 55 | Andere Krankheiten der ersten Luftwege und Stimmwerkzeuge ausschl. No. 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 1 | — | 7 | 6 | — | — | 6 | 1 | 197 |
| | 56 | Akuter Bronchialkatarrh | 16 | 64 | 84 | 127 | 139 | 102 | 82 | 60 | 62 | 60 | 43 | 54 | 44 | 921 | 907 | — | 14 | 921 | 16 | 9387 |
| | 57 | Chronischer Katarrh der Luftwege | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 51 | 14 | 1 | 36 | 51 | 5 | 2699 |
| | 58 | Akute Lungenentzündung | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 73 | 52 | 4 | 15 | 71 | 5 | 2356 |
| | 59 | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes ausschl. No. 19 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 6 | 1 | — | 4 | 5 | 2 | 223 |
| | 60 | Brustfellentzündung und Ausgänge ausschl. No. 19 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 | 66 | 50 | — | 11 | 61 | 14 | 2725 |
| | 61 | Lungenerweiterung | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 41 |
| | 62 | Asthma | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 20 |
| 63 | Andere Krankheiten der Atmungsorgane | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 10 | |
| | Summe | 40 | 111 | 158 | 200 | 246 | 201 | 154 | 131 | 127 | 99 | 68 | 89 | 108 | 1692 | 1594 | 5 | 87 | 1686 | 46 | 22527 | |
| IV. Krankheiten der Kreislaufs- und blutbereitenden Organe. | 64 | Entzündung des Herzbeutels | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 101 | |
| | 65 | Idiopathische Herzvergrößerung | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 138 |
| | 66 | Erkrankung der Herzklappen | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 13 | 1 | 1 | 13 | 15 | — | 699 |
| | 67 | Nervöse Störung der Herzthätigkeit | 4 | 4 | 3 | 2 | — | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 25 | 16 | — | 11 | 27 | 2 | 534 |
| | 68 | Andere Herzkrankheiten | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 3 | 2 | — | 2 | 4 | — | 92 |
| | 69 | Pulsadergeschwulst | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 70 | Hämorrhoiden . . | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | — | — | 10 | 1 | 208 |
| | 71 | Krampfadern ausschl. No. 110 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 5 | — | 1 | 6 | 1 | 399 |
| 72 | Venenentzündung | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 89 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|---|--|--|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| noch IV. Krankheiten der Kreislauf- und blutbereitenden Organe. | 73 bis 75 | Erkrankungen der Lymphgefäße und Lymphdrüsen ausschl. No. 21 und 116 | 3 | 20 | 15 | 7 | 14 | 16 | 17 | 9 | 12 | 16 | 16 | 8 | 9 | 159 | 150 | — | 4 | 154 | 8 | 2386 |
| | 76 | Kropf | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 1 | 3 | — | 163 |
| | 77 | Leukämie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 78 | Perniziöse Anämie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 79 | Andere Krankheiten der Gruppe IV | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 6 |
| | | Summe | | 13 | 29 | 22 | 13 | 18 | 25 | 20 | 13 | 20 | 19 | 19 | 15 | 11 | 224 | 189 | 2 | 34 | 225 | 12 |
| V. Krankheiten der Ernährungsorgane. | 80 | Krankheiten der Kiefer u. Zähne | 1 | 10 | 14 | 11 | 5 | 21 | 11 | 10 | 12 | 13 | 4 | 8 | 7 | 126 | 127 | — | — | 127 | — | 614 |
| | 81 | Zungenentzündung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 4 |
| | 82 | Mandelentzündung | 9 | 98 | 194 | 186 | 201 | 190 | 148 | 112 | 136 | 79 | 45 | 57 | 68 | 1514 | 1516 | — | — | 1516 | 7 | 8251 |
| | 83 | Andere Mund- und Rachenkrankheiten | 1 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | 13 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | 107 | 107 | — | — | 107 | 1 | 774 |
| | 84 | Krankheiten der Speicheldrüsen ausschl. No. 5 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 6 | 5 | — | 1 | 6 | — | 42 |
| | 85 | Krankheiten der Speiseröhre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 86 | Akuter Magenkatarrh | 3 | 40 | 40 | 30 | 41 | 24 | 23 | 22 | 29 | 49 | 38 | 37 | 42 | 415 | 411 | — | — | 411 | 7 | 2784 |
| | 87 | Chronischer Magenkatarrh | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 3 | — | — | 9 | 4 | — | 3 | 7 | 2 | 435 |
| | 88 | Magenblutung bzw. Magengeschwür | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 4 | 1 | — | 2 | 3 | 2 | 357 |
| | 89 | Akuter Darmkatarrh | 4 | 23 | 34 | 23 | 27 | 17 | 18 | 28 | 15 | 32 | 34 | 43 | 27 | 321 | 321 | — | 1 | 322 | 3 | 2400 |
| | 90 | Chronischer Darmkatarrh | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 629 |
| | 91 | Brechedurchfall . . | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 8 |
| | 92 | Unterleibsbrüche ausschl. No. 93 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 46 | 39 | — | 7 | 46 | 1 | 512 |
| | 93 | Eingeklemmter Bruch | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 1 | 3 | — | 56 |
| 94 | Innerer Darmverschluss | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 95 | Darm-, Blinddarm-entzündung | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 16 | 70 | 56 | — | 9 | 65 | 9 | 1981 | |
| 96 | Bauchfellentzündung u. Ausgänge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 97 | Katarrhalische Gelbsucht | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 25 | 23 | — | 2 | 25 | 1 | 509 | |
| 98 | Krankheiten der Leber und deren Ausführungsgänge | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 36 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|---|-------------------|--|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| noch V. Krankheiten der Ernährungsorgane. | 99 | Krankheiten des Mastdarms ausschl. No. 70 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | 55 |
| | 100 | Eingeweidewürmer | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | — | — | 19 | — | 196 |
| | 101 | Andere Krankheiten der Ernährungsorgane | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | 1 | 1 | 15 | 14 | — | 1 | 15 | 1 | 548 |
| | | Summe | 28 | 199 | 312 | 269 | 311 | 282 | 227 | 180 | 220 | 194 | 134 | 166 | 194 | 2688 | 2651 | 1 | 28 | 2680 | 36 | 20191 |
| VI. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane ausschließlich der venerischen. | 102 und 103 | Krankheiten der Nieren, Nebennieren und Harnleiter | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 9 | — | 11 | 20 | 1 | 1030 |
| | 104 und 105 | Blasenkatarrh u. andere Blasenkrankheiten | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 5 | 4 | 34 | 26 | — | 8 | 34 | 2 | 660 |
| | 106 bis 108 | Krankheiten der Vorsteherdrüse, Eichel, Vorhaut und Harnröhre | 2 | 6 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 33 | 32 | — | 2 | 34 | 1 | 458 |
| | 109 | Wasserbruch . . . | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 7 | 6 | — | 2 | 8 | — | 139 |
| | 110 | Krampfaderbruch | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | 5 | 4 | — | 1 | 5 | — | 95 |
| | 111 | Andere Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 9 | 9 | — | — | 9 | 1 | 98 |
| | Summe | 6 | 13 | 10 | 4 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 109 | 86 | — | 24 | 110 | 5 | 2480 | |
| VII. Venerische Krankheiten. | 112 | Tripper | 9 | 36 | 16 | 7 | 18 | 24 | 19 | 16 | 13 | 17 | 15 | 13 | 6 | 200 | 189 | — | 11 | 200 | 9 | 8079 |
| | 113 | Hoden- und Nebenhodenentzündung | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 | 18 | 16 | — | 1 | 17 | 2 | 258 |
| | 114 | Spitze Feigwarzen | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 14 |
| | 115 | Weicher Schanker | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 39 | 31 | — | 5 | 36 | 5 | 1154 |
| | 116 | Bubo | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 150 |
| | 117 | Konstitutionelle Syphilis | — | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 50 | 41 | — | 3 | 44 | 6 | 2064 |
| | Summe | 12 | 45 | 25 | 16 | 28 | 32 | 28 | 24 | 22 | 24 | 22 | 29 | 17 | 312 | 282 | — | 20 | 302 | 22 | 11719 | |
| VIII. Augenkrankheiten. | 118 | a. Ansteckende. Die kontagiöse Augenkrankheit (Granulöser (follikulärer) Bindehautkatarrh) | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 3 | 2 | — | 1 | 3 | — | 33 |
| | 119 | (Granulöse (follikuläre) Bindehauterkrankungen und Folgezustände) | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 40 |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------|---|---|---|------|------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| noch VIII. Augenkrankheiten. | 120 | Akute Blennorrhoe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 121 | Chronische Blennorrhoe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 122 | Tripper-Blennorrhoe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | Summe a | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | b. Nicht ansteckende. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123 | Krankheiten der Lider | — | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | — | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 61 | 61 | — | — | 61 | — | — | — | — | — | — | 330 |
| | 124 | Krankheiten der Bindehaut | 6 | 26 | 24 | 7 | 18 | 37 | 19 | 14 | 25 | 33 | 21 | 22 | 20 | 266 | 269 | — | 1 | 270 | 2 | — | — | — | — | — | 2018 |
| | 125 | Krankheiten der Tränenorgane | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 30 |
| | 126 | Krankheiten der Augenmuskeln | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| | 127 | Krankheiten der Hornhaut | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43 | 41 | — | 4 | 45 | — | — | — | — | — | — | 941 |
| | 128 | Krankheiten der Regenbogenhaut | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 | 3 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 78 |
| | 129 | Krankheiten der Linse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 130 | Krankheiten der Aderhaut | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 213 |
| | 131 | Krankheiten des Sehnerven und der Netzhaut | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 102 |
| | 132 | Krankheiten und Fehler des Brechungs- und Einstellungsvermögens | 1 | — | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 8 | 7 | — | 2 | 9 | — | — | — | — | — | — | 74 |
| | 133 | Nachtblindheit . . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 41 |
| | 134 | Andere Augenkrankheiten | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | — | 3 | 13 | — | — | — | — | — | — | 242 |
| | | Gesamtsumme (a und b) | 11 | 38 | 42 | 21 | 29 | 51 | 28 | 24 | 34 | 38 | 32 | 41 | 37 | 415 | 406 | — | 14 | 420 | 6 | — | — | — | — | — | 4254 |
| | IX. Ohrenkrankheiten. | 135 | Krankheiten der Ohrmuschel | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 136 | | Krankheiten des äußeren Gehörgangs | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 60 | 58 | — | — | 58 | 3 | — | — | — | — | 671 | |
| 137 | | Krankheiten des mittleren und inneren Ohrs | 5 | 26 | 22 | 14 | 32 | 29 | 23 | 12 | 22 | 18 | 12 | 17 | 25 | 252 | 199 | — | 46 | 245 | 12 | — | — | — | — | 5673 | |
| 138 | | Schwerhörigkeit . | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 24 | |
| 139 | | Andere Ohrenkrankheiten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Summe | 6 | 30 | 26 | 15 | 40 | 37 | 29 | 16 | 29 | 21 | 16 | 27 | 29 | 315 | 260 | — | 46 | 306 | 15 | — | — | — | — | — | 6375 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|---|--|---|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen. | 140 | Krätze | — | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | 31 | 31 | — | — | 31 | — | 168 |
| | 141 | Akute Hautkrankheiten ausschl. Gruppe I | 7 | 21 | 19 | 9 | 14 | 19 | 13 | 3 | 15 | 16 | 15 | 13 | 18 | 175 | 175 | — | 1 | 176 | 6 | 2513 |
| | 142 | Chronische Hautkrankheiten | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 14 | 13 | — | 1 | 14 | — | 594 |
| | 143 | Chronisches Unterschenkelgeschwür | — | 2 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 11 | 9 | — | 1 | 10 | 1 | 365 |
| | 144 | Panaritium | 1 | 22 | 17 | 28 | 28 | 19 | 17 | 16 | 16 | 11 | 4 | 12 | 14 | 204 | 196 | — | 4 | 200 | 5 | 3490 |
| | 145 | Zellgewebsentzündung, Ausgänge | 24 | 84 | 80 | 70 | 51 | 43 | 70 | 59 | 71 | 62 | 61 | 31 | 71 | 753 | 750 | — | 9 | 759 | 18 | 9224 |
| | 146 | Furunkel | 16 | 58 | 85 | 58 | 77 | 59 | 48 | 47 | 61 | 60 | 54 | 55 | 57 | 719 | 725 | — | 1 | 726 | 9 | 5757 |
| | 147 | Gutartige Geschwülste | — | — | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4 | 1 | 5 | 3 | 26 | 24 | — | — | 24 | 2 | 322 |
| | 148 | Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 26 |
| | Summe | | 48 | 198 | 211 | 168 | 176 | 148 | 156 | 133 | 168 | 157 | 138 | 118 | 165 | 1936 | 1926 | — | 17 | 1943 | 41 | 22459 |
| XI. Krankheiten der Bewegungsorgane. | 149 und 150 | Entzündung der Knochenhaut und Knochen ausschl. No. 20 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 49 | 41 | — | 6 | 47 | 4 | 1268 |
| | 151 | Mißbildung der Knochen | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 7 |
| | 152 | Akute Gelenkentzündung ausschl. No. 27 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 53 | 51 | — | 1 | 52 | 2 | 802 |
| | 153 | Chronische Gelenkentzündung ausschl. No. 20 u. 28 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | 11 | 7 | — | 6 | 13 | — | 457 |
| | 154 | Mißbildung der Gelenke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 155 | Fußgeschwulst . | — | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 62 | 61 | — | 1 | 62 | — | 423 |
| | 156 | Plattfüßigkeit und Folgezustände | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 9 | 9 | — | 2 | 11 | — | 125 |
| | 157 | Andere Verbildung des Fußes und Folgezustände | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 158 | Muskelrheumatis- mus | 3 | 30 | 26 | 21 | 33 | 27 | 25 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 279 | 277 | — | 1 | 278 | 4 | 2585 |
| | 159 | Exerzier- und Reitknochen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 160 | Andere Krankheiten der Muskeln | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 5 | 4 | — | 1 | 5 | — | 100 |
| 161 und 162 | Krankheiten der Schleimbeutel und Sehnen | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 14 | 4 | 11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 90 | 89 | — | 4 | 93 | 3 | 1105 | |
| | Summe | | 16 | 65 | 52 | 43 | 55 | 47 | 58 | 28 | 42 | 51 | 38 | 38 | 42 | 559 | 540 | — | 22 | 562 | 13 | 6872 |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | | |
|--------------------------------|-------------------|--|--|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII. Mechanische Verletzungen. | 163 | Wundlaufen . . . | 1 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 70 | 70 | — | — | 70 | 1 | 643 | |
| | 164 | Wundreiten . . . | 1 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 5 | 5 | — | 1 | 6 | — | 39 | |
| | 165 | Quetschung { der Weichteile ohne äußere Wunde | 15 | 36 | 57 | 35 | 39 | 38 | 41 | 28 | 48 | 40 | 16 | 38 | 43 | 459 | 456 | — | 9 | 465 | 9 | 4515 | |
| | 166 | | innerer Organe | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 12 |
| | 167 | Zerreiſung innerer Organe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 168 | Knochenbruch | des Oberarms | 3 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | 6 | 8 | — | 1 | 9 | — | 260 |
| | 169 | | des Unterarms | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 25 | — | 7 | 32 | 2 | 1179 |
| | 170 | | der Hand . . . | — | — | 1 | — | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 9 | 9 | — | — | 9 | — | 261 |
| | 171 | | des Ober- schenkels | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 2 | 2 | 1 | 182 |
| | 172 | | des Unter- schenkels | 2 | — | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 12 | 8 | — | 5 | 13 | 1 | 709 |
| | 173 | | des Fußes . . | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | — | 1 | 15 | — | 472 |
| | 174 | | des Kopfes . . | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | 34 |
| | 175 | | des Schlüssel- beins | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 8 | 7 | — | 1 | 8 | — | 187 |
| | 176 | des Schulter- blatts | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 15 | |
| | 177 | der Rippen . . | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 117 | |
| | 178 | der Wirbelsäule | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 179 | des Beckens . | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 17 | |
| | 180 und 181 | Verstauchung der Gelenke | 11 | 68 | 40 | 34 | 40 | 41 | 58 | 27 | 47 | 49 | 33 | 45 | 47 | 529 | 520 | — | 6 | 526 | 14 | 5078 | |
| | 182 | Verrenkung | der Gelenke der oberen Glied- maßen | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 13 | 10 | — | 3 | 13 | — | 227 |
| | 183 | | der Gelenke der unteren Glied- maßen | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 3 | — | 26 |
| 184 | anderer Gelenke | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 185 | Wunden | Schuſs- ausschl. No. 194 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 4 | 5 | — | — | 5 | — | 125 | |
| 186 | | Hieb-u.Schnitt- | 6 | 12 | 14 | 10 | 17 | 15 | 14 | 14 | 20 | 10 | 11 | 12 | 12 | 161 | 162 | — | 4 | 166 | 1 | 1731 | |
| 187 | | Stich- | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 66 | 64 | — | 1 | 65 | 2 | 772 | |
| 188 | | Rifs-u.Quetsch- | 8 | 31 | 24 | 29 | 25 | 27 | 23 | 29 | 23 | 32 | 28 | 17 | 30 | 318 | 312 | — | 3 | 315 | 11 | 3385 | |
| 189 | | Bifs- | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 19 | |

| Krankheitsgruppe | No. der Krankheit | Krankheit | Bestand waren | Zugang im Monat | | | | | | | | | | | | Abgang | | | | Bestand bleiben | Behandlungstage | |
|-------------------------------------|-------------------|--|---------------|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | | | Summe |
| noch XII. Mechanische Verletzungen. | 190 | Verbrennung . . . | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | — | 9 | 9 | 5 | 68 | 69 | — | — | 69 | 1 | 613 |
| | 191 | Erfrierung (Frostschäden) | — | — | 1 | 6 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 11 | 11 | — | — | 11 | — | 175 |
| | 192 | Andere Wunden u. Verletzungen | 2 | 2 | 1 | 4 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 12 | 13 | — | — | 13 | 1 | 272 |
| | | Summe | 56 | 183 | 171 | 142 | 145 | 144 | 162 | 122 | 169 | 155 | 117 | 145 | 158 | 1813 | 1779 | — | 46 | 1825 | 44 | 21065 |
| XIII. Andere Krankheiten. | 193 | Selbstverstümmelung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 194 | Selbstmordversuch | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 2 | — | 1 | 3 | — | 91 |
| | 195 | Vorgetäuschte Krankheiten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 196 | Allgemeine Körperschwäche | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | 2 | — | 2 | 4 | — | 61 |
| | 197 | Altersschwäche | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 2 | 2 | 558 |
| | Summe | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 710 | |
| XIV. | 198 | Zur Beobachtung | 11 | 31 | 18 | 8 | 16 | 17 | 19 | 16 | 10 | 18 | 17 | 21 | 31 | 222 | 203 | — | 3 | 206 | 27 | 4349 |
| | | Gesamtsumme | 321 | 995 | 1123 | 982 | 1409 | 1099 | 991 | 763 | 919 | 845 | 661 | 737 | 857 | 11381 | 10828 | 32 | 530 | 11390 | 312 | 156438 |
| | | Davon kamen in Lazarett- (einschließlich Lazarett- und Revier-) Behandlung | — | 475 | 541 | 446 | 665 | 540 | 505 | 375 | 462 | 400 | 292 | 373 | 441 | 5515 | — | — | — | — | — | — |

3. Die bei den Spezialanstalten im Lazarett und Revier vorgekommenen Erkrankungen in ihrem Verhältnis zur Jahres-Iststärke und den Diensttagen.

a. Ohne Unterscheidung in Lazarett- und Revierkranke.

| Truppengattung u. s. w. | Iststärke | Diensttage | Zugang | | Im ganzen sind behandelt einschl. des gewesenen Bestandes | Behandlungstage | | Täglich waren krank Mann | Auf jeden Mann der Iststärke kommen Krankheitstage | Von 1000 Mann der Iststärke waren täglich krank | Auf einen Krankheitstag kommen Dienstage |
|--|-----------|------------|---------------------|---------------------------|---|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--|---|--|
| | | | in absoluten Zahlen | auf Tausend der Iststärke | | im ganzen | durchschnittlich für jeden Kranken | | | | |
| Bekleidungsämter | 3056 | 1115440 | 1787 | 584,8 | 1842 | 27256 | 14,8 | 74,7 | 8,9 | 24,4 | 40,9 |
| Militärkrankenwärter | 1414 | 516110 | 678 | 479,5 | 690 | 11578 | 16,8 | 31,7 | 8,2 | 22,4 | 44,6 |
| Oberfeuerwerkerschule | 284 | 103660 | 127 | 447,2 | 129 | 1539 | 11,9 | 4,2 | 5,4 | 14,8 | 67,4 |
| Gewehr-Prüfungs-Kommission | 157 | 57305 | 25 | 159,2 | 26 | 387 | 14,9 | 1,1 | 2,5 | 6,8 | 148,1 |
| Infanterie-Schießschule | 376 | 137240 | 110 | 292,6 | 113 | 1715 | 15,2 | 4,7 | 4,6 | 12,5 | 80,0 |
| Lehr-Infanterie-Bataillon . . . | 811 | 296015 | 398 | 490,8 | 400 | 3552 | 8,9 | 9,7 | 4,4 | 12,0 | 83,3 |
| Kriegsschüler | 982 | 358430 | 797 | 811,6 | 809 | 8294 | 10,3 | 22,7 | 8,4 | 23,1 | 43,2 |
| Festungsgefängnisse | 1789 | 652985 | 1958 | 1094,5 | 2044 | 34524 | 16,9 | 94,6 | 19,3 | 52,9 | 18,9 |
| Arbeiter-Abteilungen bezw. Disziplinar-Abteilung | 419 | 152935 | 677 | 1615,7 | 703 | 11185 | 15,9 | 30,6 | 26,7 | 73,1 | 13,7 |
| Schloßgarde-u.s.w. Kompagnie | 141 | 51465 | 38 | 269,5 | 41 | 956 | 23,3 | 2,6 | 6,8 | 18,6 | 53,8 |
| Invaliden | 127 | 46355 | 43 | 338,6 | 62 | 6720 | 108,4 | 18,4 | 52,9 | 145,0 | 6,9 |
| Kadetten | 1958 | 714670 | 2294 | 1171,6 | 2347 | 21228 | 9,0 | 58,2 | 10,8 | 29,7 | 33,7 |
| Unteroffizier-Vorschüler . . . | 2044 | 746060 | 1828 | 894,3 | 1861 | 16263 | 8,7 | 44,6 | 8,0 | 21,8 | 45,9 |
| Militär-Bäcker-Abteilungen . . | 855 | 312075 | 297 | 347,4 | 304 | 5832 | 19,2 | 16,0 | 6,8 | 18,7 | 53,5 |
| Militär-Lehrschmieden u. s. w. | 309 | 112785 | 158 | 511,3 | 163 | 2144 | 13,2 | 5,9 | 6,9 | 19,0 | 52,6 |
| Militär-Reitinstitut bezw. Militär-Reitanstalt | 370 | 135050 | 132 | 356,8 | 134 | 2796 | 20,9 | 7,7 | 7,6 | 20,7 | 48,3 |
| Sonstige ¹⁾ | 202 | 73730 | 34 | 168,3 | 34 | 469 | 13,8 | 1,3 | 2,3 | 6,4 | 157,2 |
| Summe | 15294 | 5582310 | 11381 | 744,1 | 11702 | 156438 | 13,4 | 428,6 | 10,2 | 28,0 | 35,7 |

1) Leibgarderie, Festungsbauschule, Kavallerie-Telegraphenschule und Militärapotheke.

b. Mit Unterscheidung in Lazarettkranke, Revierkranke und Lazarett- und Revierkranke.

| Truppengattung u. s. w. | Ort der Behandlung | Zugang | | Im ganzen sind behandelt einschl. des gewesenen Bestandes | Ort der Be- handlung | Behandlungstage | | Täglich waren krank Mann 1) | Auf jeden Mann der Iststärke kommen Krank- heitstage 1) | Von 1000 Mann der Iststärke waren täglich krank 1) | Auf einen Krank- heitstag kommen Dienst- tage 1) |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| | | in absoluten Zahlen | auf Tausend der Iststärke | | | im ganzen | für jeden Kranken 1) | | | | |
| Bekleidungsämter | Lazarett | 674 | 220,5 | 721 | Lazarett . | 21269 | 24,5 | 58,3 | 7,0 | 19,1 | 52,4 |
| | Revier | 969 | 317,1 | 973 | Revier . . | 5987 | 6,2 | 16,4 | 2,0 | 5,4 | 186,3 |
| | Lazarett und Revier . | 144 | 47,1 | 148 | | | | | | | |
| Militärkranken- wärter | Lazarett | 415 | 293,5 | 426 | Lazarett . | 9716 | 20,4 | 26,6 | 6,9 | 18,8 | 53,1 |
| | Revier | 213 | 150,6 | 213 | Revier . . | 1862 | 8,7 | 5,1 | 1,3 | 3,6 | 277,2 |
| | Lazarett und Revier . | 50 | 35,4 | 51 | | | | | | | |
| Oberfeuerwerker- schule | Lazarett | 37 | 130,3 | 39 | Lazarett . | 1062 | 23,1 | 2,9 | 3,7 | 10,2 | 97,6 |
| | Revier | 83 | 292,3 | 83 | Revier . . | 477 | 5,7 | 1,3 | 1,7 | 4,6 | 217,3 |
| | Lazarett und Revier . | 7 | 24,6 | 7 | | | | | | | |
| Gewehr-Prüfungs- Kommission | Lazarett | 6 | 38,2 | 7 | Lazarett . | 244 | 30,5 | 0,67 | 1,6 | 4,3 | 234,9 |
| | Revier | 18 | 114,6 | 18 | Revier . . | 143 | 7,9 | 0,39 | 0,91 | 2,5 | 400,7 |
| | Lazarett und Revier . | 1 | 6,4 | 1 | | | | | | | |
| Infanterie-Schiefs- schule | Lazarett | 21 | 55,9 | 24 | Lazarett . | 1183 | 40,8 | 3,2 | 3,1 | 8,6 | 116,0 |
| | Revier | 84 | 223,4 | 84 | Revier . . | 532 | 6,3 | 1,5 | 1,4 | 3,9 | 258,0 |
| | Lazarett und Revier . | 5 | 13,3 | 5 | | | | | | | |
| Lehr-Infanterie- Bataillon | Lazarett | 55 | 67,8 | 57 | Lazarett . | 1838 | 21,9 | 5,0 | 2,9 | 6,2 | 161,1 |
| | Revier | 316 | 389,6 | 316 | Revier . . | 1714 | 5,4 | 4,7 | 2,1 | 5,8 | 172,7 |
| | Lazarett und Revier . | 27 | 33,3 | 27 | | | | | | | |
| Kriegsschüler | Lazarett | 99 | 100,8 | 103 | Lazarett . | 2852 | 15,9 | 7,8 | 2,9 | 8,0 | 125,7 |
| | Revier | 624 | 635,4 | 630 | Revier . . | 5442 | 8,6 | 14,9 | 5,5 | 15,2 | 65,9 |
| | Lazarett und Revier . | 74 | 75,4 | 76 | | | | | | | |
| Festungs- gefängnisse | Lazarett | 594 | 332,0 | 642 | Lazarett . | 24344 | 28,3 | 66,7 | 13,6 | 37,3 | 26,8 |
| | Revier | 1154 | 645,1 | 1185 | Revier . . | 10180 | 8,6 | 27,9 | 5,7 | 15,6 | 64,1 |
| | Lazarett und Revier . | 210 | 117,4 | 217 | | | | | | | |
| Arbeiter- Abteilungen bezw. Diszipli- nar-Abteilung | Lazarett | 275 | 656,3 | 296 | Lazarett . | 9192 | 26,0 | 25,2 | 21,9 | 60,1 | 16,6 |
| | Revier | 344 | 821,0 | 349 | Revier . . | 1993 | 5,7 | 5,5 | 4,8 | 13,0 | 76,7 |
| | Lazarett und Revier . | 58 | 138,4 | 58 | | | | | | | |
| Schloßgarde- u.s.w.Kompagnie | Lazarett | 2 | 14,2 | 2 | Lazarett . | 45 | 11,3 | 0,12 | 0,32 | 0,87 | 1143,7 |
| | Revier | 35 | 248,2 | 37 | Revier . . | 911 | 24,6 | 2,5 | 6,5 | 17,7 | 56,5 |
| | Lazarett und Revier . | 1 | 7,1 | 2 | | | | | | | |

1) Die im Lazarett und Revier Behandelten sind hier als Lazarettkranke verrechnet.

| Truppengattung u. s. w. | Ort der Behandlung | Zugang | | Im ganzen sind behandelt einschl. des gewesenen Bestandes | Ort der Be- handlung | Behandlungstage | | Täglich waren krank Mann 1) | Auf jeden Mann der Iststärke kommen Krank- heitstage 1) | Von 1000 Mann der Iststärke waren täglich krank 1) | Auf einen Krank- heitstag kommen Dienst- tage 1) |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| | | in absoluten Zahlen | auf Tausend der Iststärke | | | im ganzen | für jeden Kranken 1) | | | | |
| Invaliden | Lazarett | 3 | 23,6 | 8 | Lazarett . | 1357 | 113,1 | 3,7 | 10,7 | 29,3 | 34,2 |
| | Revier | 37 | 291,3 | 50 | Revier . . | 5363 | 107,3 | 14,7 | 42,2 | 115,7 | 8,6 |
| | Lazarett und Revier . | 3 | 23,6 | 4 | | | | | | | |
| Kadetten | Lazarett | 1920 | 980,6 | 1963 | Lazarett . | 17636 | 9,0 | 48,3 | 9,0 | 24,7 | 40,5 |
| | Revier | 371 | 189,5 | 381 | Revier . . | 3592 | 9,4 | 9,8 | 1,8 | 5,0 | 199,0 |
| | Lazarett und Revier . | 3 | 1,5 | 3 | | | | | | | |
| Unteroffizier- Vorschüler | Lazarett | 322 | 157,5 | 343 | Lazarett . | 8782 | 17,9 | 24,1 | 4,3 | 11,8 | 85,0 |
| | Revier | 1361 | 665,9 | 1371 | Revier . . | 7481 | 5,5 | 20,5 | 3,7 | 10,0 | 99,7 |
| | Lazarett und Revier . | 145 | 70,9 | 147 | | | | | | | |
| Militär-Bäcker- Abteilungen | Lazarett | 160 | 187,1 | 167 | Lazarett . | 4906 | 26,5 | 13,4 | 5,7 | 15,7 | 63,6 |
| | Revier | 119 | 139,2 | 119 | Revier . . | 926 | 7,8 | 2,5 | 1,1 | 3,0 | 337,0 |
| | Lazarett und Revier . | 18 | 21,1 | 18 | | | | | | | |
| Militär- Lehrschmieden u. s. w. | Lazarett | 63 | 203,9 | 66 | Lazarett . | 1547 | 17,6 | 4,2 | 5,0 | 13,7 | 72,9 |
| | Revier | 75 | 242,7 | 75 | Revier . . | 597 | 8,0 | 1,6 | 1,9 | 5,3 | 188,9 |
| | Lazarett und Revier . | 20 | 64,7 | 22 | | | | | | | |
| Militär- Reitinstitut bezw. Militär- Reitanstalt | Lazarett | 55 | 148,6 | 57 | Lazarett . | 2296 | 26,4 | 6,3 | 6,2 | 17,0 | 58,8 |
| | Revier | 47 | 127,0 | 47 | Revier . . | 500 | 10,6 | 1,4 | 1,4 | 3,7 | 270,1 |
| | Lazarett und Revier . | 30 | 81,1 | 30 | | | | | | | |
| Sonstige ²⁾) | Lazarett | 14 | 69,3 | 14 | Lazarett . | 350 | 19,4 | 0,96 | 1,7 | 4,7 | 210,7 |
| | Revier | 16 | 79,2 | 16 | Revier . . | 119 | 7,4 | 0,33 | 0,59 | 1,6 | 619,6 |
| | Lazarett und Revier . | 4 | 19,8 | 4 | | | | | | | |
| Summe | Lazarett | 4715 | 308,3 | 4935 | Lazarett . | 108619 | 18,9 | 297,6 | 7,1 | 19,5 | 51,3 |
| | Revier | 5866 | 383,5 | 5947 | Revier . . | 47819 | 8,0 | 131,0 | 3,1 | 8,6 | 116,7 |
| | Lazarett und Revier . | 800 | 52,3 | 820 | | | | | | | |

1) Die im Lazarett und Revier Behandelten sind hier als Lazarettkranke verrechnet.

2) Leibgardarmerie, Festungsbauschule, Kavallerie-Telegraphenschule und Militärapotheke.

4. Die bei den Spezialanstalten vorgekommenen Erkrankungen in ihrem Verhältnis zur Art des Abganges.

| Truppengattung u. s. w. | Gesamt-Abgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | Von den militärärztlich Behandelten (Bestand und Zugang) sind | | | | | | durch Tod einschl. der aufser militärärztlicher Behandlung durch Krankheit, Verunglückung und Selbstmord Verstorbenen | | | | | | | | | durch Dienstunbrauchbarkeit | | durch Halbinvalidität | | durch Ganzinvalidität | |
| | dienstfähig entlassen | | | gestorben | | | insgesamt | | davon | | | durch Dienstunbrauchbarkeit | | durch Halbinvalidität | | durch Ganzinvalidität | | | | | |
| | in absoluten Zahlen | in ‰ zur Zahl der Behandelten | in ‰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in ‰ zur Zahl der Behandelten | in ‰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in ‰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in ‰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in ‰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in ‰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in ‰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in ‰ zur Iststärke der Truppengattung | in absoluten Zahlen | in ‰ zur Iststärke der Truppengattung | |
| Bekleidungsämter . . | 1657 | 899,6 | 542,2 | 5 | 2,7 | 1,6 | 5 | 1,6 | 5 | 1,6 | — | — | — | — | 43 | 14,1 | 17 | 5,6 | 38 | 12,4 | |
| Militärkrankenwärter . | 626 | 907,2 | 442,7 | 5 | 7,2 | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 3,5 | — | — | — | — | 18 | 12,7 | 4 | 2,8 | 20 | 14,1 | |
| Oberfeuerwerkerschule . | 119 | 922,5 | 419,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gewehr-Prüfungs-Kommission | 26 | 1000,0 | 165,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Infanterie-Schießschule | 108 | 955,8 | 287,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2,7 | |
| Lehr-Infanterie-Bataillon | 387 | 967,5 | 477,2 | 1 | 2,5 | 1,2 | 2 | 2,5 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kriegsschüler | 765 | 945,6 | 779,0 | 1 | 1,2 | 1,0 | 3 | 3,1 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | — | — | — | — | 1 | 1,0 | |
| Festungsgefängnisse . . | 1847 | 903,6 | 1032,4 | 5 | 2,4 | 2,8 | 5 | 2,8 | 5 | 2,8 | — | — | — | — | 63 | 35,2 | 8 | 4,5 | 28 | 15,7 | |
| Arbeiter-Abteilungen bezw. Disziplinar- Abteilung | 615 | 874,8 | 1467,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 85,9 | 8 | 19,1 | 13 | 31,1 | |
| Schloßgarde u. s. w. Kompagnie | 34 | 829,3 | 241,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 14,2 | 6 | 42,6 | |
| Invaliden | 31 | 500,0 | 244,1 | 10 | 161,3 | 78,7 | 12 | 94,5 | 12 | 94,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kadetten | 2271 | 967,6 | 1159,9 | 2 | 0,85 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Unteroffizier-Vorschüler | 1748 | 939,3 | 855,2 | 2 | 1,1 | 0,98 | 2 | 0,98 | 2 | 0,98 | — | — | — | — | 73 | 35,7 | — | — | — | — | |
| Militär-Bäcker- Abteilungen | 284 | 934,2 | 332,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1,2 | 5 | 5,8 | 7 | 8,2 | |
| Militär-Lehrschmieden u. s. w. | 155 | 950,9 | 501,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3,2 | |
| Militär-Reitinstitut bezw. Militär-Reitanstalt | 123 | 917,9 | 332,4 | 1 | 7,5 | 2,7 | 1 | 2,7 | 1 | 2,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sonstige ¹⁾ | 32 | 941,2 | 158,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Summe | 10828 | 925,3 | 708,0 | 32 | 2,7 | 2,1 | 37 | 2,4 | 34 | 2,2 | 2 | 0,13 | 1 | 0,07 | 234 | 15,3 | 44 | 2,9 | 115 | 7,5 | |

¹⁾ Leibgarderie, Festungsbauschule, Kavallerie-Telegraphenschule und Militärapotheke.

Krankenrapporte.

gekommenen Todesfälle nach; die zweite Querspalte (b) gibt die Zahl der von dem Gesamtzugange im Lazarett behandelten Kranken und die Ziffer der im Lazarett ereignet haben.

als 3000 Mann Iststärke.

kranken litten:

| VI. an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschl. der venerischen (102-111) | | VII. an venerischen Krankheiten | | VIII. an Augenkrankh. | | IX. an Ohrenkrankheiten | | X. an Krankheit der äußeren Bedeckungen | | XI. an Krankh. der Bewegungsorgane | | XII. an mechanischen Verletzungen | | | | | XIII. an anderen Krankheiten | | | XIV. Außerdem zur Beobachtung | | | Entlassen als | | | Laufende Nummer | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------------|-------|---|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----|----|---|
| erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | | | | |
| 19 | — | 67 | 18 | 107 | 7 | 70 | — | 650 | — | 546 | — | 229 | — | 13 | — | 525 | — | 150 | — | 12 | 114 | 4 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | 1 | 1 | 9 | 45 | 40 | 39 | 1 |
| 18 | — | 67 | 18 | 48 | 7 | 62 | — | 274 | — | 238 | — | 97 | — | 6 | — | 194 | — | 59 | — | 12 | 35 | 3 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 26 | 1 | 211 | 30 | 74 | 1 | 61 | — | 608 | — | 561 | — | 328 | — | 30 | — | 448 | — | 91 | — | 89 | 104 | 6 | 83 | — | 5 | — | 4 | — | 28 | 2 | 1 | — | 4 | 99 | 35 | 49 | 2 | | |
| 22 | 1 | 211 | 30 | 51 | 1 | 59 | — | 348 | — | 314 | — | 167 | — | 20 | — | 243 | — | 53 | — | 85 | 46 | 5 | 39 | — | 5 | — | 4 | — | 27 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | | |
| 134 | 1 | 728 | 117 | 336 | 1 | 278 | — | 3959 | 1 | 3593 | 1 | 1965 | — | 199 | — | 3633 | 1 | 1130 | — | 392 | 811 | 27 | 967 | — | 18 | 1 | 7 | 1 | 179 | 2 | 8 | — | 61 | 261 | 277 | 498 | 3 | | |
| 100 | 1 | 725 | 117 | 136 | 1 | 202 | — | 1258 | 1 | 1088 | 1 | 499 | — | 145 | — | 951 | 1 | 276 | — | 264 | 178 | 18 | 199 | — | 16 | 1 | 7 | 1 | 170 | — | — | — | 51 | — | — | — | — | | |
| 14 | — | 116 | 30 | 55 | 2 | 38 | — | 342 | — | 300 | — | 238 | — | 26 | — | 404 | — | 129 | — | 36 | 114 | 7 | 86 | — | — | — | — | — | 46 | — | 2 | 1 | 6 | 33 | 15 | 35 | 4 | | |
| 11 | — | 113 | 29 | 27 | 2 | 36 | — | 129 | — | 96 | — | 82 | — | 15 | — | 140 | — | 30 | — | 35 | 30 | 6 | 35 | — | — | — | — | 45 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | | | |
| 24 | 1 | 108 | 20 | 96 | — | 67 | — | 578 | — | 522 | — | 169 | — | 10 | — | 561 | — | 201 | — | 33 | 128 | 11 | 151 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 87 | — | 4 | 1 | 15 | 80 | 27 | 125 | 5 | | |
| 24 | 1 | 107 | 20 | 64 | — | 58 | — | 244 | — | 202 | — | 64 | — | 8 | — | 219 | — | 80 | — | 33 | 39 | 7 | 51 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 87 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | | |
| 24 | — | 152 | 27 | 87 | 3 | 56 | — | 760 | — | 658 | — | 360 | — | 25 | — | 687 | 1 | 261 | — | 33 | 144 | 6 | 181 | 1 | 2 | — | — | — | 50 | 1 | 2 | — | 11 | 58 | 47 | 96 | 6 | | |
| 22 | — | 151 | 27 | 46 | 3 | 50 | — | 350 | — | 291 | — | 166 | — | 22 | — | 329 | 1 | 119 | — | 33 | 69 | 4 | 95 | 1 | 2 | — | — | 50 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | | | |
| 30 | — | 63 | 12 | 81 | — | 75 | — | 817 | — | 722 | — | 424 | — | 11 | — | 920 | 1 | 262 | — | 46 | 218 | 7 | 253 | — | — | — | — | 74 | — | 1 | 1 | 6 | 76 | 26 | 68 | 7 | | | |
| 25 | — | 61 | 11 | 32 | — | 65 | — | 318 | — | 268 | — | 170 | — | 4 | — | 259 | 1 | 70 | — | 42 | 55 | 7 | 65 | — | — | — | — | 67 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | | | |
| 48 | — | 125 | 17 | 112 | — | 111 | 1 | 1240 | — | 1053 | — | 401 | — | 15 | — | 1161 | — | 296 | — | 44 | 331 | 9 | 289 | — | 4 | — | — | — | 88 | — | 3 | — | 8 | 167 | 56 | 113 | 8 | | |
| 39 | — | 125 | 17 | 45 | — | 79 | — | 435 | — | 359 | — | 154 | — | 13 | — | 405 | — | 116 | — | 41 | 127 | 7 | 105 | — | 3 | — | — | 85 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | | | |
| 44 | — | 332 | 81 | 147 | — | 123 | 1 | 1434 | — | 1300 | — | 745 | — | 78 | — | 1254 | — | 341 | — | 67 | 320 | 8 | 310 | — | 2 | — | 1 | — | 144 | — | 3 | — | 14 | 165 | 71 | 145 | 9 | | |
| 42 | — | 330 | 81 | 77 | — | 108 | 1 | 571 | — | 499 | — | 252 | — | 50 | — | 480 | — | 138 | — | 65 | 116 | 7 | 141 | — | 2 | — | 1 | — | 139 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | | |
| 18 | — | 99 | 26 | 35 | — | 34 | — | 371 | — | 322 | — | 208 | — | 24 | — | 207 | — | 37 | — | 16 | 79 | 2 | 53 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | — | — | — | 5 | 51 | 11 | 26 | 10 | | |
| 12 | — | 97 | 26 | 20 | — | 27 | — | 130 | — | 96 | — | 71 | — | 18 | — | 79 | — | 19 | — | 15 | 25 | 1 | 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | | |
| 43 | 1 | 251 | 49 | 187 | 42 | 130 | — | 1089 | — | 995 | — | 414 | — | 27 | — | 1041 | 1 | 351 | — | 117 | 205 | 12 | 229 | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 60 | — | 2 | — | 15 | 104 | 37 | 137 | 11 | | |
| 38 | 1 | 251 | 49 | 116 | 40 | 110 | — | 393 | — | 335 | — | 155 | — | 19 | — | 331 | 1 | 101 | — | 102 | 42 | 8 | 70 | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 57 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | | |
| 27 | 1 | 37 | 3 | 100 | — | 80 | — | 804 | 1 | 707 | 1 | 314 | — | 27 | — | 713 | — | 277 | — | 42 | 163 | 9 | 169 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 45 | — | 1 | — | 9 | 52 | 36 | 55 | 12 | | |
| 24 | 1 | 36 | 3 | 52 | — | 68 | — | 374 | 1 | 305 | 1 | 124 | — | 20 | — | 255 | — | 90 | — | 41 | 46 | 8 | 60 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | | |
| 15 | 2 | 28 | 6 | 46 | — | 50 | — | 495 | — | 420 | — | 163 | — | 20 | — | 296 | — | 87 | — | 11 | 84 | 1 | 96 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | — | 1 | 5 | 20 | 24 | 17 | 13 | | |
| 11 | — | 28 | 6 | 16 | — | 45 | — | 174 | — | 141 | — | 56 | — | 8 | — | 91 | — | 29 | — | 11 | 17 | 1 | 28 | — | 1 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | | |
| 61 | — | 407 | 89 | 76 | — | 103 | — | 1059 | — | 943 | — | 762 | 1 | 38 | 1 | 868 | 1 | 208 | 1 | 88 | 191 | 8 | 217 | — | 3 | — | 2 | — | 62 | — | 2 | 1 | 24 | 114 | 49 | 135 | 14 | | |
| 48 | — | 400 | 89 | 17 | — | 65 | — | 290 | — | 216 | — | 145 | 1 | 14 | 1 | 270 | 1 | 50 | 1 | 71 | 53 | 3 | 53 | — | 3 | — | 2 | — | 51 | — | — | — | 19 | — | — | — | — | | |
| 11 | 1 | 113 | 31 | 43 | — | 40 | — | 484 | — | 412 | — | 132 | — | 4 | — | 483 | — | 172 | — | 17 | 95 | 6 | 153 | — | 2 | — | 2 | — | 47 | — | 1 | — | 7 | 44 | 32 | 53 | 15 | | |
| 10 | 1 | 113 | 31 | 22 | — | 32 | — | 253 | — | 218 | — | 57 | — | 8 | — | 189 | — | 61 | — | 16 | 31 | 4 | 73 | — | 2 | — | 2 | — | 45 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | | |

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtcrankenzugang in der militärärztlichen Behandlung | | b) Zugang im Lazarett | | Gestorben in der militärärztlichen Behandlung | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | II. | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | | | | | IV. | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------|-----------------------|--------|---|--------|--|-----------|----------------------------|-----|--------------------|------------|-----------------|---------|--------------------------------|------------|---------------|---------|-------------|------|----------------------------------|------|--|----------|-------|----|--|-----|-------------------------|------|--|------|---|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | an Krankheiten des Nervensystems | | davon | | | | | | | | | | an Krankheiten der Kreislauf- und blut-bereitenden Organe | | davon | | | |
| | | | | | | | | | Summe | | Scharlach, Masern (Röteln) | | Diphtherie (Krupp) | | Unterleibstypus | | Flecktyphus und Rückfallfieber | | Wechselfieber | | Tuberkulose | | Ruhr | | Akuter und chronischer Gelenk-rheumatismus | | Summe | | Katarrhe der Schleimhäute der Luftwege | | Akute Lungen-entzündung | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, ungeschl. No. 19 | | Brustfellentzündung u. Ausgänge, ungeschl. No. 19 | | Summe | | Mandel-entzündg. | |
| | | | | | | | | | erkrankt | gestorben | (3 u. 4) | (6) | (13) | (14 u. 15) | (16) | (18-21) | (22) | (27 u. 28) | (41-52) | (53-63) | (53-57) | (58) | (59) | (60) | (64-79) | (80-101) | (82) | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Frankfurt a. O. | 5268 | a 2514 b 1134 | 5 5 | 206 123 | 1 1 | 5 5 | | | 3 | | | | 2 | 9 | 1 | | 41 | 22 | 342 | 2 | 290 | | 28 | 2 | | | 23 | | 51 | | 280 | 2 | 157 | | | | | | |
| 17 | Glogau | 3395 | a 1930 b 993 | 6 6 | 63 61 | 5 5 | 23 23 | 1 | | | | | | | 8 | 2 | | 16 | 17 | 301 | | 248 | | 32 | | 2 | | 18 | | 19 | | 270 | 1 | 115 | | | | | | |
| 18 | Graudenz | 5802 | a 2849 b 1309 | 9 9 | 184 160 | 7 7 | 20 20 | 1 | | 4 | | | | 4 | 26 | 6 | 50 | 26 | 34 | 320 | 1 | 251 | | 44 | 1 | 3 | | 19 | | 56 | | 290 | 1 | 168 | | | | | | |
| 19 | Hagenau | 3881 | a 2343 b 986 | 3 3 | 51 49 | 2 2 | | | | 14 | 2 | | | | 3 | | 1 | 10 | 18 | 211 | | 174 | | 24 | | 2 | | 8 | | 55 | | 262 | 1 | 94 | | | | | | |
| 20 | Hannover | 7215 | a 3523 b 2123 | 15 15 | 190 174 | 7 7 | 26 26 | 2 2 | 10 | 16 | 1 | | | | 7 | 1 | | 70 | 30 | 438 | 5 | 363 | | 43 | 5 | 1 | | 27 | | 96 | 1 | 529 | 1 | 298 | | | | | | |
| 21 | Karlsruhe | 4465 | a 2747 b 1263 | 7 7 | 153 129 | 3 3 | | | | 1 | | | | | 17 | 2 | | 79 | 32 | 350 | 1 | 319 | | 16 | 1 | | | 13 | | 52 | | 462 | 1 | 232 | | | | | | |
| 22 | Königsberg i.Pr. | 9698 | a 6521 b 3023 | 19 19 | 285 244 | 7 7 | 11 11 | | 9 | 11 | 2 | | | 3 | 22 | 2 | 2 | 101 | 47 | 987 | 4 | 831 | | 98 | 3 | 4 | | 46 | 1 | 85 | 1 | 765 | 3 | 399 | | | | | | |
| 23 | Leipzig | 7911 | a 4134 b 1976 | 6 6 | 183 170 | 3 3 | 7 7 | 1 | 2 | 4 | | | | | 11 | 1 | | 97 | 61 | 521 | 1 | 438 | | 66 | | 2 | | 14 | 1 | 85 | 1 | 562 | | 246 | | | | | | |
| 24 | Lockstedter Lager | 3045 | a 338 b 123 | | 9 | | | | | | | | | 1 | | | 6 | 5 | 45 | | 37 | | 7 | | | | 1 | | 11 | | 71 | | 37 | | | | | | | |
| 25 | Ludwigsburg | 5237 | a 4046 b 1365 | 9 9 | 284 122 | 4 4 | 2 | | | | | | | | 14 | 3 | | 57 | 35 | 344 | 1 | 313 | | 17 | | | | 12 | | 102 | | 614 | | 267 | | | | | | |
| 26 | Magdeburg | 6921 | a 3971 b 2113 | 12 12 | 104 99 | 6 6 | 6 | 1 | 4 | | | | | | 10 | 1 | | 60 | 34 | 553 | 2 | 474 | | 62 | 2 | 1 | | 15 | | 70 | | 456 | 1 | 234 | | | | | | |
| 27 | Mainz | 8929 | a 5159 b 2492 | 11 11 | 243 179 | 6 6 | 11 11 | | | 1 | | | | 3 | 16 | 2 | | 75 | 53 | 727 | 2 | 667 | | 34 | | 6 | 1 | 15 | 1 | 151 | | 893 | | 500 | | | | | | |
| 28 | Metz | 22872 | a 16638 b 6605 | 29 29 | 766 550 | 8 8 | 18 18 | 2 | 10 | | | | | 1 | 33 | 3 | 2 | 179 | 123 | 2151 | 10 | 1936 | | 120 | 8 | 12 | | 77 | 2 | 314 | 2 | 2665 | 4 | 1108 | | | | | | |
| 29 | Minden | 3207 | a 2773 b 1033 | 2 2 | 74 63 | 1 1 | 8 | 1 | 1 | | | | | | 5 | | | 27 | 32 | 476 | | 444 | | 17 | | 2 | | 10 | | 62 | | 401 | | 191 | | | | | | |
| 30 | Mörchingen | 4533 | a 3616 b 1484 | 6 6 | 103 95 | 5 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | | | 11 | 2 | | 34 | 20 | 406 | 1 | 374 | | 22 | 1 | 1 | | 9 | | 118 | | 530 | | 234 | | | | | | |
| 31 | Mülhausen i. E. | 4207 | a 2447 b 1052 | 7 7 | 57 48 | 1 1 | 1 | 5 | | | | | | | 7 | 1 | | 20 | 18 | 493 | 1 | 457 | | 13 | | | | 23 | 1 | 64 | | 349 | | 131 | | | | | | |
| 32 | Münster | 4154 | a 2566 b 1097 | 11 11 | 409 124 | 3 3 | 9 | 2 | 2 | | | | | | 18 | 2 | | 47 | 17 | 333 | | 258 | | 59 | 6 | | | 15 | | 35 | | 375 | | 238 | | | | | | |
| 33 | Neifse | 3924 | a 1679 b 961 | 6 6 | 41 37 | 4 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 11 | 2 | | 10 | 15 | 252 | | 206 | | 31 | | 1 | | 14 | | 29 | | 193 | 2 | 58 | | | | | | |

krankenlitten:

| VI. an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschl. der venerischen (102-111) | | VII. an venerischen Krankheiten | | VIII. an Augenkrankh. | | IX. an Ohrenkrankheiten | | X. an Krankheit. der äußeren Bedeckungen | | XI. an Krankh. der Bewegungsorgane | | XII. an mechanischen Verletzungen | | | | | XIII. an anderen Krankheiten | | XIV. Außerdem zur Beobachtung | | | Entlassen als | | | Laufende Nummer | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------------|-------|--|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | |
| 19 | — | 82 | 15 | 51 | 10 | 69 | — | 443 | — | 405 | — | 394 | — | 516 | — | 177 | — | 20 | 159 | 2 | 93 | — | 1 | — | 1 | — | 38 | — | 4 | 1 | 10 | 69 | 37 | 75 | 16 | |
| 19 | — | 80 | 15 | 30 | 9 | 60 | — | 218 | — | 195 | — | 151 | — | 166 | — | 57 | — | 19 | 40 | 2 | 39 | — | 1 | — | 1 | — | 36 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | |
| 17 | — | 50 | 7 | 36 | 6 | 22 | — | 455 | — | 406 | — | 221 | — | 415 | — | 141 | — | 27 | 87 | 6 | 105 | — | 1 | — | — | — | 43 | — | 1 | — | 7 | 29 | 11 | 25 | 17 | |
| 16 | — | 50 | 7 | 22 | 6 | 18 | — | 223 | — | 186 | — | 92 | — | 194 | — | 60 | — | 26 | 33 | 5 | 52 | — | 1 | — | — | — | 43 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | |
| 28 | — | 136 | 36 | 69 | 4 | 39 | — | 677 | — | 623 | — | 358 | — | 593 | — | 130 | — | 27 | 233 | 14 | 119 | — | 3 | — | 1 | — | 62 | — | 1 | 2 | — | 12 | 68 | 41 | 64 | 18 |
| 22 | — | 134 | 36 | 41 | 4 | 32 | — | 210 | — | 176 | — | 147 | — | 204 | — | 41 | — | 27 | 65 | 12 | 45 | — | 1 | — | 1 | — | 62 | — | — | — | 9 | — | — | — | — | |
| 13 | — | 48 | 6 | 82 | 3 | 42 | — | 722 | — | 651 | — | 166 | — | 607 | — | 224 | — | 13 | 114 | 6 | 162 | — | 2 | — | — | — | 64 | — | — | 2 | 5 | 75 | 22 | 25 | 19 | |
| 10 | — | 48 | 6 | 35 | 3 | 39 | — | 250 | — | 212 | — | 63 | — | 181 | — | 79 | — | 12 | 29 | 4 | 49 | — | 2 | — | — | — | 48 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | |
| 37 | — | 201 | 51 | 79 | 1 | 114 | — | 790 | — | 700 | — | 287 | — | 654 | — | 189 | — | 114 | 140 | 7 | 162 | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 75 | — | 8 | — | 23 | 73 | 57 | 92 | 20 | |
| 35 | — | 199 | 51 | 49 | 1 | 101 | — | 478 | — | 415 | — | 148 | — | 366 | — | 94 | — | 107 | 56 | 6 | 90 | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 73 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | |
| 13 | 1 | 71 | 6 | 49 | — | 60 | 1 | 614 | — | 578 | — | 190 | — | 666 | — | 197 | — | 37 | 232 | — | 167 | — | 1 | — | — | — | 34 | — | 2 | — | 9 | 44 | 29 | 50 | 21 | |
| 10 | 1 | 71 | 6 | 32 | — | 51 | 1 | 248 | — | 224 | — | 55 | — | 232 | — | 79 | — | 35 | 51 | — | 63 | — | 1 | — | — | — | 33 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | |
| 57 | — | 278 | 61 | 165 | 19 | 169 | — | 1550 | 1 | 1307 | 1 | 604 | — | 1409 | — | 408 | — | 50 | 357 | 3 | 347 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 117 | — | 6 | 2 | 27 | 81 | 79 | 143 | 22 | |
| 50 | — | 277 | 61 | 87 | 19 | 143 | — | 667 | 1 | 549 | 1 | 237 | — | 438 | — | 126 | — | 48 | 104 | 2 | 133 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 108 | — | — | — | 19 | — | — | — | — | |
| 30 | — | 252 | 71 | 85 | 1 | 129 | — | 830 | — | 719 | — | 641 | — | 680 | 1 | 124 | — | 42 | 190 | 9 | 168 | — | 3 | — | 1 | — | 72 | — | 4 | 1 | 11 | 101 | 41 | 81 | 23 | |
| 27 | — | 251 | 71 | 49 | 1 | 103 | — | 370 | — | 282 | — | 213 | — | 205 | 1 | 38 | — | 32 | 51 | 7 | 47 | — | 1 | — | — | — | 68 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | |
| 2 | — | 3 | — | 5 | — | 2 | — | 66 | — | 62 | — | 31 | — | 85 | — | 17 | — | 4 | 29 | — | 15 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 3 | — | 2 | — | 2 | — | 17 | — | 16 | — | 9 | — | 15 | — | 5 | — | 4 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 2 | 41 | 6 | 84 | — | 48 | — | 917 | — | 857 | — | 313 | — | 1138 | 1 | 381 | 1 | 38 | 296 | 11 | 308 | — | 7 | 1 | 3 | 1 | 84 | — | 2 | 2 | 13 | 113 | 33 | 54 | 25 | |
| 31 | 2 | 39 | 5 | 38 | — | 39 | — | 226 | — | 196 | — | 115 | — | 325 | 1 | 136 | 1 | 35 | 69 | 10 | 64 | — | 7 | 1 | 3 | 1 | 67 | — | — | — | 13 | — | — | — | — | |
| 36 | 1 | 148 | 26 | 89 | 3 | 102 | — | 1044 | — | 966 | — | 413 | — | 816 | — | 226 | — | 75 | 243 | 11 | 206 | — | 7 | 1 | 6 | 1 | 99 | — | 5 | 1 | 19 | 90 | 62 | 95 | 26 | |
| 34 | 1 | 148 | 26 | 54 | 3 | 94 | — | 554 | — | 504 | — | 182 | — | 384 | — | 97 | — | 73 | 119 | 11 | 71 | — | 7 | 1 | 6 | 1 | 97 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | |
| 52 | — | 86 | 18 | 131 | 1 | 144 | — | 1179 | 1 | 1034 | 1 | 436 | — | 941 | 1 | 255 | — | 87 | 192 | 4 | 254 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 111 | — | 1 | 2 | 2 | 16 | 162 | 84 | 92 | 27 |
| 41 | — | 86 | 18 | 83 | 1 | 129 | — | 573 | 1 | 472 | 1 | 195 | — | 409 | 1 | 110 | — | 82 | 46 | 4 | 124 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 111 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | |
| 130 | — | 442 | 89 | 408 | 25 | 437 | — | 4322 | 2 | 3953 | 2 | 1742 | 1 | 2940 | 1 | 757 | 1 | 192 | 795 | 20 | 793 | — | 3 | — | 3 | — | 195 | — | 1 | 12 | 3 | 45 | 419 | 159 | 314 | 28 |
| 103 | — | 441 | 89 | 198 | 25 | 391 | — | 1452 | — | 1234 | — | 531 | — | 928 | — | 223 | — | 184 | 153 | 10 | 288 | — | 3 | — | 3 | — | 162 | — | — | — | 19 | — | — | — | — | |
| 18 | — | 40 | 16 | 60 | — | 43 | — | 512 | — | 456 | — | 381 | — | 594 | 1 | 168 | 1 | 12 | 146 | 1 | 200 | — | 1 | — | 1 | — | 79 | — | — | 1 | 3 | 38 | 41 | 55 | 29 | |
| 13 | — | 39 | 16 | 18 | — | 28 | — | 208 | — | 181 | — | 175 | — | 147 | 1 | 55 | 1 | 9 | 27 | 1 | 44 | — | 1 | — | 1 | — | 33 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 23 | — | 57 | 16 | 94 | 2 | 57 | — | 1049 | — | 887 | — | 364 | — | 767 | — | 183 | — | 62 | 258 | 3 | 231 | — | — | — | — | — | 28 | — | 4 | — | 11 | 73 | 34 | 86 | 30 | |
| 20 | — | 57 | 16 | 53 | 2 | 47 | — | 416 | — | 309 | — | 151 | — | 253 | — | 46 | — | 61 | 74 | 3 | 59 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | | |
| 13 | — | 50 | 12 | 40 | — | 44 | — | 620 | — | 576 | — | 292 | — | 356 | 1 | 77 | — | 19 | 116 | 6 | 94 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | — | — | — | 9 | 47 | 23 | 64 | 31 | |
| 11 | — | 50 | 12 | 24 | — | 35 | — | 201 | — | 168 | — | 88 | — | 116 | 1 | 23 | — | 18 | 31 | 4 | 32 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | |
| 12 | — | 36 | 8 | 62 | 4 | 41 | — | 486 | — | 434 | — | 237 | — | 473 | 2 | 133 | — | 65 | 97 | 13 | 101 | 1 | 3 | — | 1 | 47 | — | — | 1 | 12 | 35 | 32 | 72 | 32 | | |
| 9 | — | 36 | 8 | 37 | 4 | 33 | — | 222 | — | 189 | — | 95 | — | 200 | 2 | 55 | — | 55 | 25 | 9 | 40 | 1 | 2 | — | 1 | 45 | — | — | 1 | 11 | — | — | — | — | — | |
| 12 | — | 79 | 13 | 64 | 1 | 51 | — | 370 | — | 339 | — | 210 | — | 319 | — | 106 | — | 29 | 81 | 6 | 86 | — | 3 | — | — | — | 41 | — | — | 1 | 8 | 66 | 30 | 41 | 33 | |
| 12 | — | 79 | 13 | 44 | 1 | 42 | — | 154 | — | 132 | — | 107 | — | 152 | — | 41 | — | 29 | 35 | 6 | 40 | — | 3 | — | — | — | 41 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | |

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtkranken- zuzugang in der militärärztlichen Behandlung | | b) Zugang im Lazarett | | Gestorben in der militärärztlichen Behandlung | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | | | II. | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | | | IV. | | V. an Krank- heiten der Ernährungs- organe | | |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--|----|-----------------------|---|---|---|--|---|-----------|---|----------|---|-----------|----|----------|---|-----------|-----|----------|-----|-----------|------|---|------|--------------------------------------|----|----------|----|-----------|----|----------|-----|--|------|---|-----|-----------|
| | | | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | an Krank- heiten des Nerven- systems | | davon | | | | | | | | an Krank- heiten der Kreislaufs- und blut- bereitenden Organe | | davon | | |
| | | | | | | | | | Summe | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | | Summe | | | | | | | | Summe | | Summe | | |
| | | | | | | | | | erkrankt | | gestorben | | erkrankt | | gestorben | | erkrankt | | gestorben | | erkrankt | | gestorben | | erkrankt | | gestorben | | erkrankt | | gestorben | | erkrankt | | gestorben | | erkrankt | | gestorben |
| 34 | Posen | 7600 | a 4107 | 13 | 115 | 6 | 9 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 16 | 3 | — | 59 | 1 | 42 | 1 | 715 | 2 | 639 | — | 37 | 2 | 2 | — | 29 | — | 56 | 1 | 603 | 1 | 250 | |
| | | | b 1578 | 13 | 102 | 6 | 9 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 16 | 3 | — | 51 | 1 | 33 | 1 | 200 | 2 | 126 | — | 37 | 2 | 2 | — | 28 | — | 30 | 1 | 158 | 1 | 57 | | |
| 35 | Potsdam | 8698 | a 6295 | 13 | 456 | 5 | 32 | 1 | 12 | — | 1 | — | — | — | — | — | 19 | 2 | — | 100 | 2 | 65 | 1 | 722 | 1 | 587 | — | 52 | 1 | 7 | — | 73 | — | 120 | — | 1157 | 6 | 604 | |
| | | | b 2235 | 13 | 212 | 5 | 32 | 1 | 11 | — | 1 | — | — | — | — | — | 19 | 2 | — | 96 | 2 | 36 | 1 | 306 | 1 | 174 | — | 52 | 1 | 7 | — | 72 | — | 59 | — | 282 | 6 | 136 | |
| 36 | Rastatt | 4562 | a 2361 | 5 | 52 | 1 | 3 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — | 23 | — | 17 | — | 342 | — | 320 | — | 12 | — | 2 | — | 8 | — | 51 | — | 356 | 2 | 175 | |
| | | | b 867 | 5 | 42 | 1 | 3 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — | 21 | — | 15 | — | 109 | — | 87 | — | 12 | — | 2 | — | 8 | — | 31 | — | 86 | 2 | 25 | |
| 37 | Saar- brücken | 3423 | a 2005 | 6 | 80 | 4 | 6 | — | 1 | — | 18 | 3 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 31 | — | 17 | — | 245 | — | 219 | — | 10 | 1 | 2 | — | 14 | — | 34 | — | 377 | 1 | 166 | |
| | | | b 944 | 6 | 77 | 4 | 5 | — | 1 | — | 18 | 3 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 29 | — | 15 | — | 107 | — | 82 | — | 10 | 1 | 2 | — | 13 | — | 20 | — | 101 | 1 | 37 | |
| 38 | Saarburg | 4005 | a 1791 | 6 | 53 | 2 | 1 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 8 | 2 | — | 20 | — | 16 | — | 249 | 1 | 224 | — | 20 | 1 | 1 | — | 3 | — | 50 | 1 | 222 | 1 | 120 | |
| | | | b 884 | 6 | 50 | 2 | 1 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 8 | 2 | — | 18 | — | 15 | — | 100 | 1 | 75 | — | 20 | 1 | 1 | — | 3 | — | 34 | 1 | 61 | 1 | 11 | |
| 39 | Spandau | 5948 | a 3654 | 3 | 84 | — | 3 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | 40 | — | 28 | — | 517 | 2 | 445 | — | 27 | 2 | — | — | 44 | — | 88 | 1 | 526 | — | 282 | |
| | | | b 1782 | 3 | 78 | — | 3 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | 36 | — | 21 | — | 227 | 2 | 156 | — | 27 | 2 | — | — | 43 | — | 53 | 1 | 154 | — | 61 | |
| 40 | Stettin | 4895 | a 3466 | 6 | 139 | 3 | 8 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | — | 36 | 1 | 43 | 1 | 501 | 1 | 427 | — | 53 | — | 1 | — | 20 | 1 | 59 | — | 431 | 1 | 198 | |
| | | | b 1328 | 6 | 102 | 3 | 8 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | — | 32 | 1 | 36 | 1 | 186 | 1 | 112 | — | 53 | — | 1 | — | 20 | 1 | 38 | — | 134 | 1 | 61 | |
| 41 | Strafsburg i. E. | 16948 | a 10261 | 14 | 457 | 6 | 23 | — | 3 | — | 13 | 1 | — | — | — | — | 46 | 3 | — | 188 | — | 155 | 2 | 1437 | 1 | 1311 | — | 83 | 1 | 3 | — | 38 | — | 214 | 1 | 1582 | 1 | 814 | |
| | | | b 5365 | 14 | 392 | 6 | 23 | — | 3 | — | 13 | 1 | — | — | — | — | 46 | 3 | — | 182 | — | 137 | 2 | 701 | 1 | 577 | — | 81 | 1 | 3 | — | 38 | — | 145 | 1 | 552 | 1 | 195 | |
| 42 | Stuttgart | 4550 | a 2947 | 5 | 177 | 3 | 3 | — | — | — | 16 | 1 | — | — | — | — | 16 | 2 | 2 | 46 | — | 30 | — | 360 | — | 322 | — | 16 | — | — | — | 22 | — | 64 | — | 557 | 1 | 299 | |
| | | | b 1082 | 5 | 130 | 3 | 3 | — | — | — | 16 | 1 | — | — | — | — | 16 | 2 | 2 | 43 | — | 19 | — | 135 | — | 100 | — | 16 | — | — | — | 19 | — | 37 | — | 101 | 1 | 31 | |
| 43 | Thorn | 7988 | a 3404 | 9 | 145 | 6 | 9 | — | — | — | 12 | 1 | — | — | — | — | 22 | 4 | 1 | 50 | — | 25 | — | 493 | 1 | 419 | — | 51 | — | — | — | 22 | 1 | 70 | — | 412 | 1 | 218 | |
| | | | b 1514 | 9 | 118 | 6 | 9 | — | — | — | 12 | 1 | — | — | — | — | 22 | 4 | 1 | 46 | — | 18 | — | 202 | 1 | 132 | — | 48 | — | — | — | 22 | 1 | 39 | — | 115 | 1 | 29 | |
| 44 | Torgau | 3027 | a 1331 | 2 | 35 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 22 | — | 19 | — | 147 | — | 131 | — | 7 | — | 2 | — | 7 | — | 26 | — | 177 | 1 | 68 | |
| | | | b 606 | 2 | 30 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | 18 | — | 19 | — | 74 | — | 59 | — | 7 | — | 2 | — | 6 | — | 19 | — | 42 | 1 | 9 | |
| 45 | Trier | 5493 | a 3879 | 13 | 95 | 5 | 9 | 1 | — | — | 20 | 3 | — | — | — | — | 17 | — | — | 34 | — | 25 | — | 606 | 3 | 555 | — | 30 | 2 | 2 | — | 19 | — | 99 | — | 606 | 1 | 376 | |
| | | | b 1286 | 13 | 92 | 5 | 9 | 1 | — | — | 20 | 3 | — | — | — | — | 17 | — | — | 31 | — | 21 | — | 217 | 3 | 170 | — | 29 | 2 | 2 | — | 16 | — | 29 | — | 144 | 1 | 73 | |
| 46 | Ulm | 7415 | a 5585 | 14 | 359 | 7 | 9 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 11 | 1 | — | 127 | 1 | 35 | — | 808 | 1 | 734 | — | 29 | — | 10 | — | 34 | 1 | 130 | — | 933 | 1 | 551 | |
| | | | b 2339 | 14 | 256 | 7 | 9 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 11 | 1 | — | 119 | 1 | 31 | — | 295 | 1 | 223 | — | 28 | — | 10 | — | 33 | 1 | 89 | — | 246 | 1 | 128 | |
| 47 | Wesel | 4622 | a 2618 | 3 | 49 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 1 | — | 24 | — | 24 | 1 | 395 | — | 356 | — | 11 | — | — | — | 27 | — | 45 | — | 328 | — | 139 | |
| | | | b 902 | 2 | 45 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | — | 22 | — | 16 | — | 117 | — | 82 | — | 11 | — | — | — | 24 | — | 16 | — | 53 | — | 13 | |

II. Garnisonen von mehr als

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|------|--------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|----|---|---|---|---|----|----|-----|-----|----|-----|
| 48 | Aachen | 1826 | a 818 | 4 | 42 | 1 | 9 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 14 | — | 13 | — | 107 | 3 | 92 | — | 11 | 3 | — | — | 4 | — | 25 | — | 153 | — | 92 |
| | | | b 382 | 4 | 40 | 1 | 9 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 13 | — | 12 | — | 50 | 3 | 35 | — | 11 | 3 | — | — | 4 | — | 18 | — | 44 | — | 14 |
| 49 | Altenburg | 1188 | a 713 | 1 | 20 | 1 | 2 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 63 | — | 58 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | 15 | — | 111 | — | 46 |
| | | | b 255 | 1 | 15 | 1 | 2 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 21 | — | 17 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | 6 | — | 20 | — | — |
| 50 | St. Avold | 2479 | a 1615 | 1)4 | 29 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 13 | — | 8 | — | 218 | 1 | 199 | — | 12 | 1 | — | — | 7 | — | 21 | — | 213 | — | 104 |
| | | | b 432 | 3 | 28 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 13 | — | 7 | — | 57 | 1 | 38 | — | 12 | 1 | — | — | 7 | — | 10 | — | 42 | — | 22 |
| 51 | Bautzen | 1768 | a 987 | 2 | 91 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 27 | — | 7 | — | 130 | — | 122 | — | 8 | — | — | — | — | 13 | — | 128 | — | 71 | |
| | | | b 735 | 2 | 87 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | 26 | — | 7 | — | 83 | — | 75 | — | 8 | — | — | — | — | 12 | — | 82 | — | 34 | |

1) Darunter ein wegen Wundreiten im Revier befindlicher Mann, welcher Selbstmord verübte.

krankenlitten:

| VI. an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschl. der venerischen (102-111) | | VII. an venerischen Krankheiten | | | VIII. an Augenkrankh. | | IX. an Ohrenkrankheiten | | X. an Krankheit. der äußeren Bedeckungen | | XI. an Krankh. der Bewegungsorgane | | XII. an mechanischen Verletzungen | | | | | XIII. an anderen Krankheiten | | | XIV. Außerdem zur Beobachtung | | | Entlassen als | | | Laufende Nummer | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------------------------|-------|--|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| erkr. | gest. | erkr. | erkr. | gest. | erkr. | erkr. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | | | | |
| 45 | — | 174 | 55 | — | 119 | 4 | 63 | — | 952 | — | 839 | — | 406 | 1 | 32 | — | 715 | 1 | 222 | 1 | 50 | 152 | 6 | 202 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 100 | — | 4 | 2 | 19 | 99 | 32 | 72 | 34 |
| 36 | — | 171 | 53 | — | 73 | 4 | 49 | — | 304 | — | 247 | — | 85 | 1 | 16 | — | 235 | 1 | 64 | 1 | 48 | 31 | 6 | 79 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 100 | — | — | — | 13 | — | — | — | — |
| 47 | — | 180 | 50 | — | 173 | 1 | 147 | — | 1439 | — | 1307 | — | 545 | — | 18 | — | 1191 | — | 460 | — | 48 | 206 | 13 | 335 | — | 2 | — | — | — | — | — | 51 | — | 1 | — | 14 | 77 | 62 | 155 | 35 |
| 41 | — | 177 | 50 | — | 59 | 1 | 115 | — | 435 | — | 375 | — | 117 | — | 11 | — | 343 | — | 148 | — | 44 | 54 | 9 | 81 | — | 2 | — | — | — | — | — | 51 | — | — | — | 13 | — | — | — | — |
| 20 | 1 | 28 | 2 | — | 49 | — | 60 | — | 583 | — | 514 | — | 309 | — | 34 | — | 426 | — | 103 | — | 18 | 137 | 3 | 115 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 66 | — | 2 | — | 7 | 47 | 21 | 34 | 36 | |
| 13 | 1 | 28 | 2 | — | 24 | — | 50 | — | 200 | — | 159 | — | 88 | — | 20 | — | 118 | — | 29 | — | 16 | 42 | 3 | 28 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 61 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | |
| 9 | — | 52 | 7 | — | 33 | — | 46 | — | 446 | — | 414 | — | 151 | — | 17 | — | 473 | — | 174 | — | 27 | 122 | 3 | 127 | — | — | — | — | — | — | 42 | — | 1 | — | 7 | 64 | 20 | 43 | 37 | |
| 8 | — | 52 | 7 | — | 18 | — | 41 | — | 195 | — | 175 | — | 57 | — | 14 | — | 214 | — | 69 | — | 26 | 49 | 2 | 62 | — | — | — | — | — | 39 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | | |
| 24 | — | 192 | 24 | — | 25 | — | 40 | — | 394 | — | 353 | — | 77 | — | 1 | — | 429 | 1 | 165 | — | 15 | 124 | 6 | 110 | — | 1 | — | 1 | — | 19 | — | 1 | — | 8 | 76 | 24 | 41 | 38 | | |
| 19 | — | 192 | 24 | — | 14 | — | 33 | — | 162 | — | 129 | — | 29 | — | 1 | — | 156 | 1 | 39 | — | 15 | 51 | 5 | 46 | — | 1 | — | 1 | — | 18 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | | |
| 39 | — | 181 | 44 | — | 91 | 2 | 98 | — | 929 | — | 814 | — | 418 | — | 28 | — | 600 | — | 157 | — | 47 | 172 | 1 | 161 | — | — | — | — | — | 55 | — | 3 | 1 | 7 | 81 | 50 | 94 | 39 | | |
| 33 | — | 180 | 44 | — | 52 | 2 | 84 | — | 435 | — | 377 | — | 173 | — | 13 | — | 238 | — | 67 | — | 47 | 65 | 1 | 52 | — | — | — | — | 54 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | | |
| 25 | — | 73 | 28 | — | 79 | 4 | 75 | — | 779 | — | 734 | — | 595 | — | 24 | — | 619 | — | 197 | — | 22 | 192 | 8 | 148 | — | 3 | — | — | — | 45 | — | 4 | — | 10 | 54 | 30 | 78 | 40 | | |
| 18 | — | 73 | 28 | — | 46 | 4 | 69 | — | 213 | — | 194 | — | 171 | — | 22 | — | 199 | — | 70 | — | 20 | 59 | 6 | 39 | — | 1 | — | — | 42 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | | |
| 107 | — | 384 | 52 | — | 264 | 4 | 218 | — | 2272 | — | 2020 | — | 1160 | — | 115 | — | 1846 | 3 | 514 | 1 | 120 | 611 | 11 | 432 | — | 2 | — | 2 | — | 163 | — | 3 | 2 | 19 | 285 | 134 | 235 | 41 | | |
| 91 | — | 383 | 52 | — | 184 | 4 | 200 | — | 1123 | — | 935 | — | 493 | — | 56 | — | 814 | 3 | 224 | 1 | 116 | 236 | 10 | 193 | — | 2 | — | 2 | — | 148 | — | — | 14 | — | — | — | — | — | | |
| 28 | — | 64 | 12 | — | 29 | — | 39 | — | 440 | — | 398 | — | 430 | — | 33 | — | 688 | 1 | 158 | — | 47 | 275 | 7 | 143 | — | 5 | — | — | — | 36 | — | — | 1 | 6 | 119 | 35 | 59 | 42 | | |
| 26 | — | 62 | 11 | — | 15 | — | 35 | — | 121 | — | 96 | — | 164 | — | 16 | — | 203 | 1 | 41 | — | 46 | 67 | 4 | 44 | — | 4 | — | — | 30 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | | |
| 28 | — | 133 | 19 | — | 94 | 1 | 99 | — | 760 | 1 | 679 | 1 | 425 | — | 15 | — | 657 | — | 197 | — | 34 | 188 | 6 | 128 | — | 1 | — | — | 62 | — | 3 | 4 | 2 | 18 | 63 | 59 | 73 | 43 | | |
| 23 | — | 133 | 19 | — | 51 | 1 | 79 | — | 283 | 1 | 236 | 1 | 164 | — | 11 | — | 227 | — | 69 | — | 32 | 64 | 6 | 49 | — | 1 | — | — | 61 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | | |
| 16 | — | 35 | 7 | — | 33 | 1 | 28 | — | 326 | — | 264 | — | 120 | — | 20 | — | 341 | — | 87 | — | 32 | 86 | — | 106 | — | 6 | — | 4 | — | 22 | — | 1 | 2 | 5 | 30 | 28 | 31 | 44 | | |
| 8 | — | 32 | 7 | — | 16 | 1 | 22 | — | 165 | — | 125 | — | 52 | — | 18 | — | 100 | — | 21 | — | 30 | 11 | — | 35 | — | 5 | — | 4 | — | 22 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | — | 57 | 14 | — | 113 | — | 66 | 2 | 944 | — | 850 | — | 409 | — | 16 | — | 797 | — | 235 | — | 48 | 239 | 3 | 152 | — | 5 | 2 | 3 | 2 | 42 | — | 2 | 1 | 17 | 59 | 39 | 73 | 45 | | |
| 13 | — | 57 | 14 | — | 37 | — | 55 | 2 | 244 | — | 202 | — | 106 | — | 13 | — | 231 | — | 59 | — | 44 | 58 | 3 | 54 | — | 5 | 2 | 3 | 2 | 35 | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | 1 | 94 | 27 | — | 114 | 1 | 116 | — | 1214 | 1 | 1108 | 1 | 440 | — | 24 | — | 1215 | 2 | 268 | — | 19 | 421 | 6 | 370 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | — | 1 | 3 | — | 18 | 152 | 58 | 135 | 46 | |
| 49 | 1 | 94 | 27 | — | 41 | 1 | 100 | — | 441 | 1 | 370 | 1 | 200 | — | 12 | — | 430 | 2 | 104 | — | 19 | 161 | 5 | 128 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | — | 49 | 14 | — | 72 | — | 61 | — | 670 | — | 579 | — | 334 | — | 7 | — | 522 | — | 130 | — | 36 | 183 | 4 | 110 | — | 2 | — | 1 | — | 35 | — | — | 2 | 5 | 40 | 18 | 63 | 47 | | |
| 31 | — | 47 | 14 | — | 36 | — | 40 | — | 198 | — | 162 | — | 82 | — | 6 | — | 184 | — | 53 | — | 33 | 63 | 2 | 29 | — | 2 | — | 1 | — | 35 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |

1000 bis 3000 Mann Iststärke.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|-----|-----|-----|---|----|----|---|-----|---|---|---|---|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 14 | — | 11 | 2 | — | 23 | — | 8 | — | 174 | — | 147 | — | 75 | — | 13 | — | 153 | — | 38 | — | 20 | 40 | 1 | 35 | — | 1 | — | — | — | — | 19 | — | 1 | — | 5 | 39 | 10 | 23 | 48 |
| 14 | — | 11 | 2 | — | 11 | — | 8 | — | 63 | — | 55 | — | 31 | — | 10 | — | 60 | — | 18 | — | 20 | 9 | 1 | 8 | — | 1 | — | — | — | 19 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | 7 | 2 | — | 17 | — | 27 | — | 179 | — | 167 | — | 136 | — | 7 | — | 123 | — | 17 | — | 14 | 65 | 1 | 17 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 29 | 12 | 8 | 49 | | |
| 3 | — | 7 | 2 | — | 8 | — | 21 | — | 50 | — | 42 | — | 54 | — | 4 | — | 40 | — | 4 | — | 14 | 13 | 1 | 7 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | 25 | 6 | — | 39 | 2 | 27 | — | 441 | 1 | 396 | 1 | 121 | — | 7 | — | 454 | 1/2 | 168 | — | 13 | 93 | 5 | 125 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 | 27 | 15 | 18 | 50 | | |
| 9 | — | 25 | 6 | — | 26 | 2 | 17 | — | 72 | 1 | 54 | 1 | 33 | — | 5 | — | 103 | 1 | 32 | — | 12 | 16 | 4 | 35 | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | 39 | 3 | — | 9 | — | 2 | — | 195 | — | 174 | — | 167 | — | 9 | — | 184 | — | 31 | — | 9 | 51 | — | 49 | — | 1 | — | — | — | 11 | — | 1 | — | 4 | 25 | 4 | 1 | 51 | |
| 10 | — | 38 | 3 | — | 8 | — | 2 | — | 138 | — | 119 | — | 134 | — | 8 | — | 122 | — | 24 | — | 9 | 40 | — | 31 | — | 1 | — | — | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtcrankenzugang in der militärärztlichen Behandlung b) Zugang im Lazarett | | Gestorben in der militärärztlichen Behandlung | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | II. an Krankheiten des Nervensystems | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | IV. an Krankheiten der Kreislaufs- und blut-bereitenden Organe | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | davon | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------|---|--------|--|-----------|----------------------------|--------|--------------------|------------|-----------------|---------|------------------------------|------------|---------------|----------|-------------|--------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---|----------|----------|--------|--|--------|--|----------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------|------------------------|--|--|--|---|--|-------|--|-------|--|
| | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Summe | | Scharlach, Masern (Röteln) | | Diphtherie (Krupp) | | Unterleibstypus | | Flektypus und Rückfallfieber | | Wechselfieber | | Tuberkulose | | | | Ruhr | | Akuter und chronischer Gelenkrheumatismus | | Summe | | | | | | | | Katarre der Schleimhäute der Luftwege | | Akute Lungenentzündung | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, auschl. No. 19 | | Brustfellentzündung u. Ausgänge, auschl. No. 19 | | Summe | | davon | |
| | | | | | | | erkrankt | gestorben | (1-4) | (6) | (18) | (14 f. 15) | (16) | (18-21) | (22) | (27 f. 28) | (41-52) | (53-63) | (53-57) | (58) | | | (59) | (60) | (64-79) | (80-101) | (82) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Bitsch | 1909 | a 1130 b 273 | 1 1 | 38 29 | 1 1 | 3 3 | — — | — — | 4 4 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | 1 1 | — — | 15 13 | — — | 6 6 | — — | 107 25 | — — | 97 15 | — — | 7 7 | — — | 2 2 | — — | 1 1 | — — | 31 12 | — — | 192 25 | — — | 70 8 | | | | | | | | | | |
| 53 | Bonn | 1421 | a 837 b 412 | — — | 12 11 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 6 6 | — — | 8 5 | — — | 122 58 | — — | 107 43 | — — | 9 9 | — — | 6 6 | — — | 23 11 | — — | 138 32 | — — | 82 12 | | | | | | | | | | | |
| 54 | Braunschweig | 2784 | a 1442 b 837 | 4 4 | 64 57 | 1 1 | 6 6 | — — | — — | 4 4 | — — | — — | — — | — — | — — | 8 8 | 1 1 | 14 14 | — — | 8 7 | — — | 151 82 | 1 1 | 132 63 | — — | 16 16 | 1 1 | — — | — — | 3 3 | — — | 24 18 | — — | 140 81 | — — | 85 44 | | | | | | | | | | |
| 55 | Bremen | 1324 | a 860 b 352 | 1 1 | 39 26 | — — | 1 1 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 10 8 | — — | 95 51 | 1 1 | 90 47 | — — | — — | — — | 4 4 | 1 1 | 16 10 | — — | 121 52 | — — | 52 23 | | | | | | | | | | | |
| 56 | Brieg | 2334 | a 1139 b 591 | 1 1 | 21 19 | — — | — — | — — | — — | 6 6 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 13 11 | — — | 168 73 | 1 1 | 155 60 | — — | 4 4 | 1 1 | — — | — — | 9 9 | — — | 17 11 | — — | 162 37 | — — | 36 6 | | | | | | | | | |
| 57 | Celle | 2120 | a 1215 b 409 | 4 4 | 22 17 | 1 1 | 3 3 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 1 1 | — — | 11 10 | — — | 7 4 | 1 1 | 135 59 | 1 1 | 116 40 | — — | 12 12 | 1 1 | 1 1 | — — | 5 5 | — — | 20 13 | — — | 200 26 | — — | 111 7 | | | | | | | | | | |
| 58 | Charlottenburg | 2189 | a 1139 b 498 | 6 6 | 42 32 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 6 6 | 1 1 | — — | 17 15 | — — | 8 7 | 1 1 | 160 60 | 2 2 | 143 44 | — — | 12 12 | 2 2 | — — | — — | 3 2 | — — | 30 21 | — — | 158 56 | 1 1 | 85 22 | | | | | | | | | |
| 59 | Colmar i.E. | 2926 | a 1923 b 822 | 9 9 | 71 71 | 3 3 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 8 8 | 2 2 | — — | 21 21 | — — | 14 11 | — — | 196 106 | 2 2 | 177 91 | — — | 11 11 | 2 2 | — — | — — | 8 4 | — — | 32 19 | — — | 340 103 | 1 1 | 150 38 | | | | | | | | | |
| 60 | Cosel | 1261 | a 691 b 415 | 1 1 | 14 13 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 8 5 | — — | 110 53 | — — | 94 37 | — — | 8 8 | — — | 1 1 | — — | 6 6 | — — | 21 15 | — — | 31 17 | — — | 5 4 | | | | | | | | | |
| 61 | Cottbus | 1295 | a 727 b 344 | 2 2 | 40 20 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 5 5 | — — | — — | 5 5 | — — | 6 5 | — — | 62 25 | — — | 51 14 | — — | 6 6 | — — | 1 1 | — — | 1 1 | — — | 7 2 | — — | 92 16 | 1 1 | 41 2 | | | | | | | | | |
| 62 | Cüstrin | 1841 | a 702 b 424 | 2 2 | 27 26 | — — | 2 2 | — — | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | 4 4 | — — | — — | 13 13 | — — | 9 8 | 1 1 | 66 47 | — — | 51 34 | — — | 11 10 | — — | — — | — — | 3 2 | — — | 16 13 | — — | 47 24 | — — | 18 5 | | | | | | | | | |
| 63 | Dessau | 1257 | a 910 b 245 | 2 2 | 39 12 | 1 1 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 3 3 | 1 1 | — — | 2 2 | — — | 4 3 | — — | 110 33 | — — | 92 16 | — — | 15 15 | — — | — — | — — | 2 2 | — — | 18 8 | — — | 127 8 | — — | 78 3 | | | | | | | | | |
| 64 | Deutsch-Eylau | 2622 | a 1004 b 521 | 6 6 | 31 29 | 1 1 | 5 5 | 1 1 | — — | 2 2 | — — | — — | — — | — — | — — | 2 2 | — — | — — | 14 13 | — — | 6 6 | — — | 101 47 | 2 2 | 77 27 | — — | 12 12 | 2 2 | 1 1 | — — | 11 7 | — — | 20 10 | — — | 106 60 | 1 1 | 67 36 | | | | | | | | | |
| 65 | Dieuze | 2683 | a 1134 b 296 | 2 2 | 21 21 | 1 1 | — — | — — | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | 2 2 | — — | — — | — — | — — | 4 4 | — — | 110 31 | 1 1 | 102 23 | — — | 4 4 | 1 1 | — — | — — | 4 4 | — — | 16 5 | — — | 186 27 | — — | 85 8 | | | | | | | | | |
| 66 | Döbeln | 1778 | a 947 b 431 | 1 1 | 54 39 | — — | — — | — — | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | 2 2 | — — | — — | — — | — — | 16 9 | — — | 126 55 | 1 1 | 109 39 | — — | 15 14 | 1 1 | — — | — — | 2 2 | — — | 25 17 | — — | 97 32 | — — | 43 17 | | | | | | | | | |
| 67 | Erfurt | 2020 | a 1333 b 695 | 2 2 | 52 17 | 1 1 | 1 1 | — — | — — | 3 3 | — — | — — | — — | — — | — — | 7 7 | — — | — — | 27 25 | — — | 14 13 | 1 1 | 173 86 | — — | 150 65 | — — | 10 10 | — — | — — | — — | 10 8 | — — | 16 14 | — — | 142 45 | — — | 59 12 | | | | | | | | | |
| 68 | Flensburg | 1289 | a 570 b 361 | — — | 52 51 | — — | 18 18 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 7 6 | — — | 83 44 | — — | 59 25 | — — | 13 13 | — — | — — | — — | 11 6 | — — | 11 8 | — — | 73 34 | — — | 41 10 | | | | | | | | | |
| 69 | Frankfurt a. M. | 2651 | a 1657 b 847 | 5 4 | 82 60 | 1 1 | 4 4 | — — | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | 5 5 | 1 1 | — — | — — | — — | 19 15 | — — | 280 104 | 2 2 | 249 76 | — — | 14 14 | 1 1 | 1 1 | — — | 15 12 | 1 1 | 38 23 | — — | 256 81 | 1 1 | 135 37 | | | | | | | | | |
| 70 | Freiburg i. Baden | 2813 | a 1465 b 709 | 2 2 | 44 39 | 1 1 | 10 10 | — — | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | 8 8 | 1 1 | — — | — — | — — | 11 9 | 1 1 | 273 129 | — — | 245 105 | — — | 9 8 | — — | — — | — — | 19 16 | — — | 34 21 | — — | 227 101 | — — | 142 57 | | | | | | | | | |

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtankommt in der militärärztlichen Behandlung b) Zugang im Lazarett | | Gestorben in der militärärztlichen Behandlung | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | II. an Krankheiten des Nervensystems | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | IV. an Krankheiten der Kreislauf- und blut-bereitenden Organe | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|----------|--|----------|----------------------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|--------------------------------|---------|---------------|---------|-------------|--------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------|---|----------|----------|--------|---|--------|--|--|------------------------|--|---|--|--|--|-------|--|------------------|
| | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | davon | | | | | | | | davon | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Summe | | Scharlach, Masern (Röteln) | | Diphtherie (Krupp) | | Unterleibstypus | | Flecktyphus und Rückfallfieber | | Wechselfieber | | Tuberkulose | | | | Ruhr | | Akuter und chronischer Gelenkrheumatismus | | Summe | | | | Katarhe der Schleimhäute der Luftwege | | Akute Lungenentzündung | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, ausschl. No. 19 | | Brustfellentzündung u. Ausgänge, ausschl. No. 19 | | Summe | | Mandelentzündung |
| | | | | | | | (1-40) | (3 u. 4) | (6) | (13) | (14 u. 15) | (16) | (18-21) | (22) | (27 u. 28) | (41-52) | (53-63) | (53-57) | (58) | (59) | | | (60) | (64-79) | (80-101) | (82) | | | | | | | | | | | | | | | |
| erkrankt | gestorben | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Giessen | 1930 | a 1277 b 635 | 4 59 4 53 | 2 2 | | | | | | | 6 6 | | | 32 30 | | 18 13 | 2 2 | 186 76 | 1 1 | 165 55 | 10 10 | 1 1 | | | 9 9 | 31 18 | | 206 71 | | 118 29 | | | | | | | | | | |
| 72 | Glatz | 1757 | a 905 b 353 | 2 17 2 17 | 1 1 | | | 2 2 | | | | 2 2 | 1 1 | | 6 6 | | 6 4 | | 171 41 | | 156 27 | 8 8 | | | | 7 6 | 21 15 | 1 1 | 165 24 | | 52 5 | | | | | | | | | | |
| 73 | Gleiwitz | 1831 | a 1258 b 444 | 3 30 3 29 | 2 2 | 3 3 | | | | | | 3 3 | 1 1 | | 17 16 | | 9 3 | | 186 41 | | 167 23 | 14 14 | | 1 1 | | 4 3 | 31 16 | 1 1 | 147 33 | | 24 9 | | | | | | | | | | |
| 74 | Gnesen | 2474 | a 1188 b 623 | 5 128 5 119 | 2 2 | 4 4 | | 81 81 | 2 2 | | | 1 1 | | | 26 25 | | 12 10 | | 121 57 | | 90 27 | 23 23 | | | | 8 7 | 21 14 | | 139 66 | 1 1 | 43 7 | | | | | | | | | | |
| 75 | Görlitz | 1289 | a 788 b 314 | 1 38 1 32 | | | | | | | | 4 4 | | | 21 20 | | 16 12 | | 111 56 | | 99 44 | 8 8 | | | | 4 4 | 14 9 | 1 1 | 165 42 | | 67 14 | | | | | | | | | | |
| 76 | Göttingen | 1855 | a 1232 b 284 | 4 65 4 28 | 2 2 | 4 4 | | 2 2 | | 1 1 | | 6 6 | 1 1 | | 12 12 | | 8 7 | | 206 41 | | 189 26 | 10 10 | | | | 7 5 | 29 7 | | 161 25 | 2 2 | 83 5 | | | | | | | | | | |
| 77 | Goldap | 1406 | a 627 b 267 | 1 108 1 21 | | | | | | | | 1 1 | | | 6 6 | | 5 5 | 1 1 | 80 39 | | 69 28 | 4 4 | | | | 7 7 | 11 10 | | 73 35 | | 32 14 | | | | | | | | | | |
| 78 | Groß-Lichterfelde ²⁾ | 1508 | a 1198 b 542 | 2 38 2 31 | 1 1 | 11 11 | | | | | | 2 2 | | | 16 12 | | 8 2 | | 239 141 | | 221 126 | 12 12 | | 1 1 | | 4 2 | 10 7 | | 302 228 | 1 1 | 147 124 | | | | | | | | | | |
| 79 | Gumbinnen | 2887 | a 2194 b 724 | 4 65 4 53 | 2 2 | 1 1 | | | | | 1 1 | 4 4 | 2 2 | 1 1 | 21 20 | | 8 7 | | 351 81 | | 323 53 | 13 13 | | 1 1 | | 13 13 | 27 17 | | 295 43 | 1 1 | 185 16 | | | | | | | | | | |
| 80 | Halberstadt | 2367 | a 1146 b 820 | 2 61 2 50 | 2 2 | 1 1 | | 1 1 | 2 2 | 1 1 | | 1 1 | 1 1 | | 17 17 | | 14 13 | | 114 72 | | 97 56 | 11 11 | | | | 5 4 | 29 26 | | 115 70 | | 52 22 | | | | | | | | | | |
| 81 | Halle a. S. | 2061 | a 838 b 444 | 2 17 2 15 | 1 1 | | | 1 1 | 1 1 | | | 3 3 | | | 7 6 | | 9 8 | 1 1 | 105 47 | | 94 37 | 5 5 | 1 1 | | | 4 4 | 15 13 | | 112 48 | | 53 14 | | | | | | | | | | |
| 82 | Hamel | 1237 | a 530 b 248 | 1 12 1 10 | 1 1 | | | | | | 1 1 | | | | 2 2 | | 10 7 | | 82 42 | | 72 33 | 7 7 | | | | 3 2 | 19 9 | | 74 28 | | 26 6 | | | | | | | | | | |
| 83 | Hanau | 1991 | a 1463 b 530 | 1 92 1 72 | 1 1 | 7 7 | | | | | | 3 3 | | | 43 39 | | 18 12 | | 195 101 | | 175 81 | 6 6 | 2 2 | | | 11 11 | 23 12 | | 296 59 | | 190 35 | | | | | | | | | | |
| 84 | Heilbronn | 1247 | a 795 b 216 | 1 20 1 17 | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 9 9 | | 14 12 | | 116 20 | | 110 14 | 3 3 | | | | 3 3 | 23 7 | | 94 14 | | 44 4 | | | | | | | | | | |
| 85 | Hildesheim | 1935 | a 1040 b 376 | 4 90 4 55 | 1 1 | 3 3 | | 4 4 | 1 1 | | | 7 7 | 1 1 | | 11 10 | | 13 9 | | 92 32 | 3 3 | 78 19 | 8 7 | 3 3 | | | 5 5 | 21 12 | | 170 55 | | 56 15 | | | | | | | | | | |
| 86 | Jauer | 1192 | a 349 b 138 | 1 7 1 7 | | 1 1 | | 1 1 | | | | | | | 4 4 | | 3 2 | | 27 12 | | 19 5 | 4 4 | 1 1 | | | 3 2 | 8 7 | | 53 13 | 1 1 | 26 4 | | | | | | | | | | |
| 87 | Inowrazlaw | 2121 | a 1754 b 585 | 1 25 1 25 | 1 1 | | | | | | | | | 3 3 | 18 18 | | 16 5 | | 197 44 | | 178 26 | 14 13 | | | | 5 5 | 39 17 | | 240 40 | | 101 12 | | | | | | | | | | |
| 88 | Insterburg | 2848 | a 2248 b 907 | 3 159 3 118 | 2 2 | 1 1 | | 3 3 | | | | 1 1 | | | 10 10 | 2 2 | | | 265 101 | | 231 69 | 17 16 | 3 3 | | | 13 12 | 27 16 | | 200 46 | | 85 14 | | | | | | | | | | |

1) Der Verstorbene war beim Beginn des Berichtsjahres im Bestande.

2) Außerdem sind 63 Mann in dem für Groß-Lichterfelde zuständigen Lazarett No. II Berlin behandelt und daher in den Garnisonrapport von Groß-

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtfranzosenzugang in der militärärztlichen Behandlung b) Zugang im Lazarett | | Gestorben in der militärärztlichen Behandlung | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | II. an Krankheiten des Nervensystems | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | IV. an Krankheiten der Kreislauf- und blut-bereitenden Organe | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|---|--------|---|--------|--|-----------|----------------------------|--------|--------------------|-------|-----------------|--------|--------------------------------|-------|---------------|----------|-------------|----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---|----------|---------|--------|---|----------|--|----------|------------------------|------------|---|-----------|--|-------|-------|-------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|
| | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | davon | | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Summe | | Scharlach, Masern (Röteln) | | Diphtherie (Krupp) | | Unterleibstypus | | Flecktyphus und Rückfallfieber | | Wechselfieber | | Tuberkulose | | | | Ruhr | | Akuter und chronischer Gelenkrheumatismus | | Summe | | | | Katarhe der Schleimhäute der Luftwege | | Akute Lungenentzündung | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, ausschl. No. 19 | | Brustfellentzündung u. Ausgänge, ausschl. No. 19 | | Summe | | davon | | | | | | |
| | | | | | | | (1-40) | | (3 u. 4) | | (6) | | (13) | | (14 u. 15) | | (16) | | (18-21) | | | | (22) | | (27 u. 28) | | (41-52) | | | | (53-63) | | (53-57) | | (58) | | (59) | | (60) | | (64-79) | | (80-101) | | (82-103) | | |
| | | | | | | | erkrankt | gestorben | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. |
| 89 | Jüterbog | 1951 | a 1237 b 404 | 7 7 | 25 20 | 1 1 | 3 3 | | | | | | | 3 3 | 1 1 | | | 10 10 | | 9 5 | | 201 50 | 2 2 | 181 33 | | 4 4 | | | | 16 13 | 2 2 | 19 12 | | 188 46 | | 5 2 | | | | | | | | | | | |
| 90 | Kamenz | 1182 | a 422 b 176 | 2 2 | 17 17 | | 2 2 | | | | | | | 1 1 | | | | 13 13 | | 9 8 | 1 1 | 82 43 | | 65 26 | | 11 11 | | | | 6 6 | | 12 1 | | 49 12 | 1 1 | 1 1 | | | | | | | | | | | |
| 91 | Kolberg | 1390 | a 982 b 327 | 1 1 | 46 17 | 1 1 | 1 1 | | | | | | | 2 2 | | | | 6 4 | | 7 6 | | 150 48 | | 133 31 | | 7 7 | | 1 1 | | 7 7 | | 9 8 | | 105 28 | | 4 1 | | | | | | | | | | | |
| 92 | Konstanz | 1767 | a 1100 b 469 | 1 1 | 30 29 | | 1 1 | | | | | | | 2 2 | | | | 18 18 | | 15 14 | 1 1 | 217 92 | | 194 70 | | 10 9 | | 1 1 | | 12 12 | | 15 14 | | 217 56 | | 13 2 | | | | | | | | | | | |
| 93 | Krotoschin | 1748 | a 1026 b 428 | 4 4 | 35 33 | 1 1 | 2 2 | | | | | | | 3 3 | 1 1 | | | 19 18 | | 13 11 | 1 1 | 130 50 | 1 1 | 113 33 | | 13 13 | 1 1 | | | 4 4 | | 20 11 | | 154 34 | 1 1 | 8 1 | | | | | | | | | | | |
| 94 | Lahr | 1568 | a 933 b 339 | 1 1 | 34 32 | | | | | | 1 1 | | | 3 3 | | | | 23 21 | | 8 4 | 1 1 | 109 41 | | 101 34 | | 1 1 | | 1 1 | | 5 4 | | 19 15 | | 166 53 | | 9 2 | | | | | | | | | | | |
| 95 | Liegnitz | 1764 | a 1323 b 510 | 2 2 | 165 73 | 1 1 | 4 4 | | 1 1 | | | | | 4 4 | | | | 23 22 | | 12 8 | | 228 71 | | 203 50 | | 11 11 | 1 1 | 1 1 | | 12 9 | | 21 11 | | 205 49 | | 12 3 | | | | | | | | | | | |
| 96 | Lissa | 1243 | a 520 b 301 | 1 1 | 13 12 | | 1 1 | | | | | | | | | | | 9 9 | | 4 4 | | 78 42 | 1 1 | 65 29 | | 10 10 | | | | 3 3 | 1 1 | 4 1 | | 52 22 | | 2 1 | | | | | | | | | | | |
| 97 | Lübeck | 1241 | a 384 b 228 | | 50 35 | | 22 21 | | | | | | | 1 1 | | | | 8 8 | | 8 8 | | 50 34 | | 36 21 | | 10 9 | | | | 4 4 | | 7 7 | | 36 16 | | 1 1 | | | | | | | | | | | |
| 98 | Lyck | 1922 | a 1197 b 414 | 3 3 | 65 36 | 3 3 | 1 1 | | 1 1 | | | | | 7 7 | 1 1 | | | 20 17 | | 11 11 | | 121 41 | | 97 17 | | 13 13 | | 2 2 | | 9 9 | | 15 5 | | 115 23 | | 6 1 | | | | | | | | | | | |
| 99 | Mannheim | 1311 | a 965 b 238 | 2 2 | 39 23 | 1 1 | | | 1 1 | | 1 1 | | | 3 3 | 1 1 | | | 9 9 | | 6 5 | | 122 34 | | 104 18 | | 14 14 | | 1 1 | | 3 1 | | 21 9 | | 165 22 | | 5 1 | | | | | | | | | | | |
| 100 | Marlenerwerder | 1046 | a 331 b 197 | 2 2 | 17 14 | 1 1 | | | 1 1 | 1 1 | | | | 2 2 | | | | 8 7 | | 5 2 | | 78 51 | | 63 37 | | 12 12 | | | | 3 2 | | 12 11 | | 44 27 | 1 1 | 2 1 | | | | | | | | | | | |
| 101 | Meiningen | 1843 | a 1184 b 363 | 2 2 | 26 24 | 1 1 | | | | | | | | 5 5 | 1 1 | | | 10 10 | | 26 23 | | 107 42 | | 92 27 | | 5 5 | | 1 1 | | 9 9 | | 20 11 | 1 1 | 148 46 | | 4 1 | | | | | | | | | | | |
| 102 | Mülheim a. d. Ruhr | 1252 | a 568 b 219 | 1 1 | 21 21 | 1 1 | | | 3 3 | 1 1 | | | | 3 3 | | | | 9 9 | | 4 3 | | 55 21 | | 45 11 | | 4 4 | | | | 5 5 | | 11 8 | | 77 19 | | 4 1 | | | | | | | | | | | |
| 103 | Naumburg | 1429 | a 1268 b 559 | 4 4 | 46 44 | 2 2 | 15 15 | | 1 1 | | | | | 5 5 | 1 1 | | | 5 5 | | 12 11 | | 119 55 | | 104 40 | | 7 7 | | | | 8 8 | | 45 28 | 1 1 | 238 112 | | 138 63 | | | | | | | | | | | |
| 104 | Neubreisach ¹⁾ | 1427 | a 1063 b 495 | 4 4 | 56 55 | 2 2 | 4 4 | | | | | | | 6 6 | 1 1 | | | 42 41 | | 11 10 | | 148 69 | 1 1 | 125 48 | | 13 13 | 1 1 | | | 10 8 | | 30 25 | 1 1 | 186 45 | | 108 12 | | | | | | | | | | | |
| 105 | Neumünster | 1198 | a 580 b 238 | | 15 14 | | 2 2 | | 2 2 | | | | | 3 3 | | | | 4 4 | | 7 6 | | 75 22 | | 65 14 | | 3 3 | | | | 5 3 | | 10 4 | | 50 18 | | 19 5 | | | | | | | | | | | |
| 106 | Neuruppin | 1792 | a 984 b 483 | 2 2 | 78 20 | | | | | | | | | 2 2 | | | | 8 8 | | 6 6 | | 136 62 | | 115 42 | | 14 14 | | | | 7 6 | | 16 10 | | 106 40 | | 72 23 | | | | | | | | | | | |

1) Außerdem sind 148 Mann in dem für Neubreisach zuständigen Lazarett Breisach behandelt und daher in den Garnisonrapport von Neubreisach nicht

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtankunftszahl in der militärärztlichen Behandlung | b) Zugang im Lazarett | Gestorben in der militärärztlichen Behandlung | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II. an Krankheiten des Nervensystems | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | IV. an Krankheiten der Kreislauf- und blutbereitenden Organe | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|---|--|-----------|-------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------|-------|--|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-------|--|-------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|
| | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | davon | | | | | Summe | Summe | Summe | davon | | | | |
| | | | | | | Summe (1-40) | | Scharlach, Masern (Röteln) (3 u. 4) | | Diphtherie (Krupp) (6) | | Unterleibstypus (13) | | Flecktypus und Rückfallfieber (14 u. 15) | | Wechselfieber (16) | | Tuberkulose (18-21) | | Ruhr (22) | | Akuter und chronischer Gelenkrheumatismus (27 u. 28) | | Katarhe der Schleimhäute der Luftwege (58-57) | Akute Lungenentzündung (58) | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, auschl. No. 19 (59) | | Brustfellentzündung u. Ausgänge, auschl. No. 19 (60) | an Krankheiten der Kreislauf- und blutbereitenden Organe (64-79) | Summe (80-101) | | | | | davon | | | |
| | | | | | | erkrankt | gestorben | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | | | erkr. | gest. | | | | | | | | | erkr. | gest. | erkr. |
| 126 | Schweidnitz | 2344 | a 1268 | 4 | 35 | 1 | 4 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 16 | — | 15 | — | 164 | — | 148 | — | 11 | 2 | 2 | — | 3 | — | 17 | — | 137 | — | 56 | | |
| | | | b 720 | 4 | 31 | 1 | 4 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 14 | — | 15 | — | 75 | — | 59 | — | 11 | 2 | 2 | — | 3 | — | 12 | — | 69 | — | 24 | | |
| 127 | Schwerin | 2075 | a 930 | 2 | 61 | 2 | 6 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | — | — | 4 | — | 11 | — | 122 | — | 91 | — | 24 | — | — | — | 7 | — | 10 | — | 165 | — | 106 |
| | | | b 585 | 2 | 43 | 2 | 6 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | — | — | 3 | — | 9 | — | 66 | — | 37 | — | 23 | — | — | — | 6 | — | 6 | — | 85 | — | 51 |
| 128 | Stargard i. Pomm. | 1774 | a 1056 | 3 | 133 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 15 | — | 6 | — | 105 | 1 | 69 | — | 27 | 1 | — | — | 9 | — | 27 | — | 114 | — | 71 |
| | | | b 564 | 3 | 102 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 13 | — | 5 | — | 66 | 1 | 30 | — | 27 | 1 | — | — | 9 | — | 13 | — | 35 | — | 20 |
| 129 | Stralsund | 1228 | a 941 | 2 | 14 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | 7 | — | 123 | 2 | 109 | 1 | 10 | 1 | 1 | — | 3 | — | 19 | — | 102 | — | 45 |
| | | | b 401 | 1 | 14 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | 6 | — | 49 | 1 | 36 | — | 10 | 1 | 1 | — | 2 | — | 9 | — | 18 | — | 3 |
| 130 | Tilsit | 1917 | a 1198 | 2 | 49 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 11 | — | 14 | — | 250 | 1 | 223 | — | 15 | — | — | — | 11 | 1 | 16 | — | 118 | — | 70 |
| | | | b 490 | 2 | 46 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 9 | — | 14 | — | 105 | 1 | 78 | — | 15 | — | — | — | 11 | 1 | 10 | — | 33 | — | 14 |
| 131 | Weingarten | 1782 | a 1178 | 2 | 38 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 18 | — | 15 | — | 117 | — | 107 | — | 8 | — | — | — | 1 | — | 19 | — | 229 | — | 104 |
| | | | b 288 | 2 | 29 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | 15 | — | 13 | — | 32 | — | 24 | — | 7 | — | — | — | 1 | — | 13 | — | 38 | — | 20 |
| 132 | Weißenburg | 1947 | a 1150 | 2 | 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 8 | — | 10 | — | 132 | 1 | 128 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 36 | — | 149 | — | 66 |
| | | | b 292 | 2 | 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 8 | — | 5 | — | 23 | 1 | 19 | — | 2 | 1 | 2 | — | — | 10 | — | 24 | — | 8 | |
| 133 | Wiesbaden | 1621 | a 991 | 2 | 61 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 12 | — | 23 | — | 117 | 1 | 104 | — | 6 | 1 | — | — | 7 | — | 26 | — | 140 | — | 83 |
| | | | b 431 | 2 | 49 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 10 | — | 19 | — | 41 | 1 | 30 | — | 5 | 1 | — | — | 6 | — | 20 | — | 49 | — | 20 |
| 134 | Wittenberg | 2104 | a 926 | 2 | 42 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 11 | 1 | — | — | 163 | 1 | 135 | — | 16 | — | — | — | 12 | 1 | 19 | — | 121 | — | 51 |
| | | | b 481 | 2 | 37 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 11 | 1 | — | — | 81 | 1 | 53 | — | 16 | — | — | — | 12 | 1 | 14 | — | 37 | — | 10 |
| 135 | Worms | 1844 | a 908 | 4 | 30 | 3 | 1 | — | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 7 | 1 | — | — | 9 | — | 9 | 1 | 100 | — | 87 | — | 5 | — | — | — | 8 | — | 27 | — | 151 | — | 70 |
| | | | b 385 | 3 | 30 | 3 | 1 | — | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 7 | 1 | — | — | 9 | — | 7 | — | 32 | — | 19 | — | 5 | — | — | — | 8 | — | 19 | — | 52 | — | 22 |
| 136 | Wurzen | 1362 | a 636 | 3 | 17 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | 5 | — | 7 | — | 70 | — | 57 | — | 7 | — | 1 | — | 5 | — | 8 | — | 69 | — | 31 |
| | | | b 276 | 2 | 14 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | 5 | — | 7 | — | 27 | — | 15 | — | 6 | — | 1 | — | 5 | — | 7 | — | 23 | — | 4 |
| 137 | Zabern | 1317 | a 1139 | — | 20 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 109 | — | 99 | — | 9 | — | — | — | 1 | — | 24 | — | 197 | — | 123 |
| | | | b 285 | — | 20 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 13 | — | 1 | — | 26 | — | 16 | — | 9 | — | — | — | 1 | — | 6 | — | 21 | — | 10 |
| 138 | Zittau | 1723 | a 907 | 4 | 117 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 108 | 3 | 100 | — | 8 | 3 | — | — | — | — | 27 | — | 80 | — | 35 |
| | | | b 414 | 4 | 80 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 18 | — | 18 | — | 55 | 3 | 47 | — | 8 | 3 | — | — | — | 15 | — | 19 | — | 5 | |
| 139 | Zwickau | 1831 | a 1153 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165 | — | 148 | — | 10 | — | 2 | — | 5 | — | 18 | — | 159 | — | 51 |
| | | | b 324 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | 11 | — | 52 | — | 37 | — | 10 | — | 2 | — | 3 | — | 6 | — | 31 | — | 12 |
| 140 | Altbreisach ¹⁾ | 522 | a 212 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 31 | — | 18 |
| | | | b 35 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | 1 | |
| 141 | Altdamm | 414 | a 309 | 1 | 21 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 47 | — | 43 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 8 | — | 35 | — | 4 |
| | | | b 67 | 1 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 7 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | — | 8 | — | 2 | |
| 142 | Angermünde | 578 | a 259 | 1 | 17 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 36 | — | 20 | — | 4 | — | — | — | 12 | — | 2 | — | 36 | — | 12 |
| | | | b 111 | 1 | 14 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 9 | — | 2 | — | 23 | — | 9 | — | 4 | — | — | — | 10 | — | — | — | 24 | — | 4 |

III. Garnisonen von mehr

1) Außerdem sind 106 Mann in dem für Altbreisach zuständigen Lazarett Neubreisach behandelt und daher in den Garnisonrapport von Altbreisach

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtfrankenzugang in der militärärztlichen Behandlung b) Zugang im Lazarett | | Summe (1—40) | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | | | | II. an Krankheiten des Nervensystems (41—52) | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane (53—63) | | IV. an Krankheiten der Kreislauf- und blut-bereitenden Organe (64—79) | | | | | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------|---|--------|-----------------|--------|--|--------|------------------------------|--------|-------------------------|--------|--|--------|-----------------------|--------|------------------------|--------|--------------|----------|--|----------|--|---|--------|---|--------|--|----------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe (80—101) | | davon Mandel-entzündg. (82) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Scharlach, Masern (Röteln) (3 u. 4) | | Diphtherie (Krupp) (6) | | Unterleibstypus (13) | | Flektypus und Rückfallfieber (14 u. 15) | | Wechselfieber (16) | | Tuberkulose (18—21) | | Ruhr (22) | | Akuter und chronischer Gelenk-rheumatismus (27 u. 28) | | Katarhe der Schleimhäute der Luftwege (53—57) | | | | | | | | Akute Lungen-entzündung (58) | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, ausschl. No. 19 (59) | | Brustleitungs- u. Ausgänge, ausschl. No. 19 (60) | | Summe | | davon | |
| | | | | | | | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | | | | | | | | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. |
| 143 | Arolsen | 620 | a 418 b 102 | — — | 22 11 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 5 5 | — — | 1 1 | — — | 65 32 | — — | 53 22 | — — | 8 7 | — — | — — | — — | 4 3 | — — | 8 3 | — — | 35 5 | — — | 11 1 | | | | | | | |
| 144 | Aurich | 621 | a 243 b 140 | 1 1 | 8 8 | — — | — — | 1 1 | — — | — — | — — | 1 1 | — — | — — | 2 2 | — — | 2 1 | — — | 31 21 | 1 1 | 20 10 | — — | 6 6 | 1 1 | — — | — — | 5 5 | — — | 5 5 | — — | 25 15 | — — | 16 9 | | | | | | | |
| 145 | Bernburg | 592 | a 205 b 126 | — — | 4 3 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 6 6 | — — | 30 19 | — — | 25 14 | — — | 3 3 | — — | — — | — — | 2 2 | — — | 2 2 | — — | 23 8 | — — | 12 2 | | | | | | | |
| 146 | Beuthen i.Ob.Schl. | 620 | a 280 b 124 | 1 1 | 17 15 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 60 21 | — — | 53 14 | — — | 5 5 | — — | — — | — — | 1 1 | — — | 6 — | — — | 31 9 | — — | 4 3 | | | | | | | |
| 147 | Biebrich | 615 | a 397 b 142 | 1 1 | 13 13 | — — | — — | 3 3 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 66 27 | 1 1 | 54 19 | — — | 6 6 | 1 1 | — — | — — | 6 2 | — — | 8 3 | — — | 65 27 | — — | 40 20 | | | | | | | |
| 148 | Bielefeld | 645 | a 322 b 129 | 2 2 | 16 14 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 33 11 | 1 1 | 28 6 | — — | 3 3 | — — | — — | — — | 2 2 | 1 1 | 9 6 | — — | 63 9 | — — | 43 3 | | | | | | | |
| 149 | Bischofs-burg | 542 | a 345 b 148 | — — | 8 7 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 43 20 | — — | 34 11 | — — | 3 3 | — — | — — | — — | 6 6 | — — | 5 4 | — — | 28 10 | — — | 12 1 | | | | | | | |
| 150 | Blanken-burg | 593 | a 326 b 127 | — — | 5 5 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 51 17 | — — | 50 16 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | 5 3 | — — | 51 16 | — — | 17 2 | | | | | | | | |
| 151 | Borna | 734 | a 442 b 251 | 1 1 | 8 8 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 3 3 | 4 4 | 38 31 | — — | 5 4 | — — | — — | — — | — — | 10 8 | — — | 60 34 | — — | 15 9 | | | | | | | | |
| 152 | Brauns-berg | 574 | a 377 b 127 | — — | 33 20 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 3 2 | — — | 11 4 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | 5 1 | — — | 56 25 | — — | 15 13 | | | | | | | | |
| 153 | Bruchsal | 670 | a 486 b 191 | — — | 17 12 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 74 31 | — — | 70 28 | — — | 2 2 | — — | — — | — — | 2 1 | — — | 8 4 | — — | 49 33 | — — | 21 11 | | | | | | | |
| 154 | Bückeburg | 662 | a 329 b 135 | 1 1 | 16 14 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 9 5 | 53 12 | 46 8 | — — | — — | — — | — — | — — | 7 4 | — — | 10 6 | — — | 61 27 | 1 1 | 20 6 | | | | | | |
| 155 | Burg | 711 | a 455 b 129 | — — | 22 16 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 53 11 | 43 1 | — — | 8 8 | — — | — — | — — | 2 2 | — — | 10 6 | — — | 51 6 | — — | 29 1 | | | | | | | |
| 156 | Butzbach ¹⁾ | 619 | a 176 b 35 | — — | 7 6 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 32 8 | 30 6 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | 2 2 | — — | 22 2 | — — | 16 1 | | | | | | | | |
| 157 | Cleve | 601 | a 252 b 61 | 1 1 | 16 8 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 32 12 | 25 5 | — — | 4 4 | — — | — — | — — | 3 3 | — — | 46 10 | — — | 20 — | | | | | | | | | |
| 158 | Coburg | 614 | a 445 b 171 | — — | 28 20 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 5 4 | 66 28 | 62 24 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | 2 2 | — — | 40 11 | — — | 26 3 | | | | | | | | |
| 159 | Coeslin | 707 | a 498 b 333 | — — | 97 54 | — — | 28 28 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 4 3 | 64 56 | 54 46 | — — | 5 5 | — — | — — | — — | 5 5 | — — | 65 49 | — — | 36 27 | | | | | | | | |
| 160 | Crossen ²⁾ | 591 | a 222 b 19 | — — | 5 2 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 17 4 | 15 2 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | 2 — | — — | 18 — | — — | 11 — | | | | | | | | |

1) Außerdem sind 45 Mann in dem für Butzbach zuständigen Lazarett Gießen behandelt und daher in den Garnisonrapport von Butzbach nicht aufgeführt.

2) Außerdem sind 47 Mann in dem für Crossen zuständigen Lazarett Cottbus behandelt und daher in den Garnisonrapport von Crossen nicht aufgeführt.

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | Von den Er- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-------|-------|------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|------------|-------|---------|--------|---------|--------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|--|---------|---------|----------|-------|------|
| | | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | II. | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | IV. | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | | | | |
| | | | davon | | | | | | | | | | | | | | an | | davon | | | | | | an Krank- | | Summe | | davon | | | |
| | | | Summe | | | | | | | | | | | | | | Krank- | | Summe | | | | | | heiten der | | Summe | | Mandel- | | | |
| (1-4) | | (6) | | (13) | | (14 u. 15) | | (16) | | (18-21) | | (22) | | (27 u. 28) | | (41-52) | | (53-63) | | (53-57) | | (58) | | (59) | | (60) | | (64-79) | | (80-101) | | (82) |
| erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | |
| 161 | Darkehmen | 562 | a 458 | 74 | 1 | | | | | | | | | 3 | | 32 | | 30 | | 2 | | | | | | 3 | | 32 | | 11 | | |
| | | | b 131 | 11 | 1 | | | | | | | | | 3 | | 10 | | 8 | | 2 | | | | | | 2 | | 9 | | 4 | | |
| 162 | Demmin | 698 | a 428 | 1 19 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 7 | 3 | 35 | | 26 | | 6 | | | | | | | | 66 | | 32 | | |
| | | | b 164 | 1 13 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 5 | 3 | 15 | | 7 | | 6 | | | | | | | | 22 | | 5 | | |
| 163 | Detmold | 669 | a 342 | 1 7 | | | | | | 1 | | | | 4 | 1 | 43 | | 38 | | 2 | | | | | | 9 | | 46 | 1 | 11 | | |
| | | | b 113 | 1 6 | | | | | | 1 | | | | 4 | 1 | 12 | | 7 | | 2 | | | | | | 4 | | 12 | 1 | 2 | | |
| 164 | Diez | 594 | a 344 | 3 19 | | 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 31 | 1 | 28 | | 3 | 1 | | | | | 13 | | 45 | 1 | 26 | | |
| | | | b 66 | 3 7 | | 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 13 | 1 | 10 | | 3 | 1 | | | | | 3 | | 6 | 1 | 3 | | |
| 165 | Durlach ¹⁾ | 467 | a 334 | 21 | | | | | | | | | 15 | | | 25 | | 24 | | | | | | | | 3 | | 59 | | 38 | | |
| | | | b 35 | 7 | | | | | | | | | 6 | | | 3 | | 2 | | | | | | | | 1 | | 4 | | 3 | | |
| 166 | Eisenach | 616 | a 375 | 20 | | | | | | 2 | | | | 5 | 6 | 39 | | 37 | | 1 | | | | | | 11 | | 42 | | 28 | | |
| | | | b 130 | 10 | | | | | | 2 | | | | 3 | 5 | 16 | | 14 | | 1 | | | | | | 8 | | 20 | | 9 | | |
| 167 | Ettlingen ²⁾ | 669 | a 448 | 28 | 2 | | 1 | | | 2 | | | 15 | 6 | 75 | | 66 | | 3 | | 1 | | | | | 10 | | 99 | | 54 | | |
| | | | b 161 | 27 | 2 | | 1 | | | 2 | | | 14 | 2 | 39 | | 30 | | 3 | | 1 | | | | | 6 | | 32 | | 14 | | |
| 168 | Forbach | 429 | a 330 | 10 | | | | | | 1 | | | | 7 | 1 | 33 | | 29 | | 4 | | | | | | 2 | | 46 | | 11 | | |
| | | | b 49 | 10 | | | | | | 1 | | | | 7 | | 7 | | 3 | | 4 | | | | | | 1 | | 8 | | | | |
| 169 | Fraustadt | 559 | a 240 | 6 | 2 | | | | | | | | | 2 | 1 | 28 | | 28 | | | | | | | | 8 | | 40 | | 19 | | |
| | | | b 87 | 5 | 2 | | | | | | | | | 2 | 1 | 6 | | 6 | | | | | | | | 3 | | 12 | | 7 | | |
| 170 | Freiberg | 650 | a 402 | 1 23 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 2 | 61 | 1 | 58 | | 3 | 1 | | | | | | 6 | | 65 | | 40 | | |
| | | | b 119 | 1 11 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 20 | 1 | 17 | | 3 | 1 | | | | | | 3 | | 22 | | 9 | | |
| 171 | Fürstenwalde | 719 | a 414 | 1 23 | 5 | | 1 | | | 2 | | | 6 | 2 | 44 | 1 | 31 | | 11 | 1 | | | | | | 6 | | 103 | | 72 | | |
| | | | b 120 | 1 18 | 5 | | 1 | | | 2 | | | 6 | 2 | 21 | 1 | 9 | | 10 | 1 | | | | | | 3 | | 15 | | 8 | | |
| 172 | Fulda | 663 | a 484 | 80 | | 1 | | | | 1 | | | 23 | 13 | 54 | | 43 | | 4 | | 3 | | | | | 6 | | 44 | | 22 | | |
| | | | b 210 | 34 | | 1 | | | | 1 | | | 19 | 11 | 27 | | 16 | | 4 | | 3 | | | | | 4 | | 15 | | 5 | | |
| 173 | Gera | 633 | a 309 | 19 | 1 | | | | | 2 | | | 15 | 5 | 46 | | 24 | | 8 | | | | | | | 13 | | 39 | | 21 | | |
| | | | b 198 | 17 | 1 | | | | | 2 | | | 14 | 5 | 36 | | 16 | | 8 | | | | | | | 11 | | 16 | | 5 | | |
| 174 | Gmünd | 645 | a 417 | 2 13 | 1 | | | | | 2 | | | 8 | 5 | 67 | | 60 | | 6 | | | | | | | 8 | | 73 | | 26 | | |
| | | | b 192 | 2 11 | 1 | | | | | 2 | | | 6 | 4 | 36 | | 29 | | 6 | | | | | | | 6 | | 22 | | 7 | | |
| 175 | Goslar | 719 | a 313 | 8 | | | 1 | | | | | | 6 | 3 | 35 | | 30 | | 1 | | | | | | | 10 | | 36 | | 16 | | |
| | | | b 144 | 8 | | | 1 | | | | | | 6 | 3 | 18 | | 13 | | 1 | | | | | | | 6 | | 14 | | 4 | | |
| 176 | Gotha | 669 | a 346 | 2 17 | 1 | | | | | 1 | | | 7 | 1 | 20 | | 15 | | 4 | 1 | | | | | | 14 | | 44 | | 24 | | |
| | | | b 168 | 2 17 | 1 | | | | | 1 | | | 7 | 1 | 15 | | 10 | | 4 | 1 | | | | | | 6 | | 18 | | 4 | | |
| 177 | Greifswald | 593 | a 579 | 2 59 | 2 | | | | | 5 | | | 9 | 5 | 49 | | 38 | | 9 | 1 | | | | | | 8 | | 67 | | 40 | | |
| | | | b 243 | 2 30 | 2 | | | | | 5 | | | 9 | 2 | 36 | | 25 | | 9 | 1 | | | | | | 5 | | 20 | | 9 | | |
| 178 | Grimma | 700 | a 284 | 6 | | | | | | | | | 5 | 4 | 38 | | 35 | | 3 | | | | | | | 3 | | 28 | | 12 | | |
| | | | b 124 | 5 | | | | | | | | | 4 | 3 | 18 | | 15 | | 3 | | | | | | | 2 | | 12 | | 3 | | |

1) Außerdem sind 46 Mann in dem für Durlach zuständigen Lazarett Karlsruhe behandelt und daher in den Garnisonrapport von Durlach nicht auf-

2) Außerdem ist ein Mann in dem für Ettlingen zuständigen Lazarett Karlsruhe behandelt und daher in den Garnisonrapport von Ettlingen nicht

kranken litten:

| VI. an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschl. der venerischen (102-111) | | VII. an venerischen Krankheiten (112-117) | | VIII. an Augenkrankh. (118-122) | | IX. an Ohrenkrankheiten (135-139) | | X. an Krankheit. der äußeren Bedeckungen (140-148) | | XI. an Krankh. der Bewegungsorgane (149-163) | | XII. an mechanischen Verletzungen (163-192) | | | | | XIII. an anderen Krankheiten (193-197) | | | XIV. Außerdem zur Beobachtung (198) | | | Entlassen als | | | Laufende Nummer | | | | | | | |
|--|-------|---|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--|-------|--|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 9 | 8 | 193 | 43 | 181 | 38 | 39 | 14 | 1 | 58 | 15 | 7 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 161 | |
| — | — | 6 | 5 | 15 | 2 | 7 | 6 | 143 | 48 | 119 | 36 | 16 | 4 | 1 | 114 | 48 | 2 | 16 | 3 | 31 | 11 | — | — | 4 | 3 | — | — | 1 | 4 | 4 | 10 | 162 | |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 96 | 23 | 83 | 16 | 59 | 19 | 3 | 57 | 7 | 8 | 20 | 7 | 10 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 7 | 6 | 4 | 163 | |
| 3 | 1 | — | — | 6 | — | 15 | 1 | 72 | 6 | 63 | 3 | 39 | 8 | 4 | 95 | 25 | 4 | 48 | 1 | 14 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 3 | 11 | 7 | 14 | 164 | | |
| — | — | 2 | — | 3 | — | — | — | 104 | 7 | 100 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 46 | 2 | 24 | — | 26 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 8 | 165 | |
| 2 | 2 | 3 | — | 2 | — | 12 | — | 132 | 24 | 126 | 23 | 56 | 12 | 2 | 39 | 11 | — | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | — | — | 21 | 2 | 10 | 166 | | | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | — | 6 | — | 83 | 12 | 71 | 10 | 34 | 8 | 4 | 91 | 13 | 7 | 27 | 3 | 28 | 4 | — | — | — | — | — | — | 8 | 1 | 7 | 167 | | |
| — | — | 10 | 4 | 5 | — | 5 | — | 91 | — | 89 | — | 28 | — | 2 | 99 | 51 | 1 | 10 | 1 | 23 | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 8 | 4 | 168 | | |
| — | — | 3 | — | 4 | — | 5 | — | 67 | — | 57 | — | 40 | — | 1 | 35 | 21 | 2 | 1 | — | 6 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 1 | 2 | 169 | | |
| 4 | 3 | 22 | 3 | 4 | — | 9 | — | 53 | 5 | 50 | 3 | 71 | 11 | 1 | 78 | 20 | 3 | 19 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | 9 | 2 | 1 | 170 | | |
| 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | — | 11 | — | 72 | 12 | 59 | 10 | 16 | 6 | 5 | 116 | 66 | — | 19 | 1 | 21 | 5 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 | 5 | 6 | 171 | |
| 2 | 1 | 2 | — | 18 | — | 6 | — | 105 | 46 | 94 | 39 | 39 | 21 | 4 | 113 | 34 | 6 | 24 | 9 | 30 | 7 | — | — | 2 | 2 | — | — | 16 | 5 | 18 | 172 | | |
| 4 | 4 | 15 | 2 | 7 | — | 10 | — | 49 | 21 | 45 | 18 | 64 | 32 | 10 | 35 | 6 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | — | — | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 173 | |
| 3 | 3 | 3 | — | 8 | — | 7 | — | 81 | 27 | 78 | 27 | 46 | 18 | — | 93 | 13 | 5 | 43 | 1 | 25 | 8 | — | — | 10 | 10 | — | — | 2 | 10 | 3 | 6 | 174 | |
| 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | — | 2 | — | 70 | 19 | 60 | 16 | 37 | 17 | 1 | 92 | 8 | 7 | 49 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 14 | 7 | 11 | 175 | | |
| 3 | 3 | 21 | 8 | 7 | — | 9 | — | 67 | 32 | 56 | 25 | 60 | 13 | 1 | 82 | 8 | 27 | 32 | 1 | 12 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 7 | 7 | 11 | 176 | |
| 1 | — | 5 | 2 | 8 | — | 7 | — | 140 | 50 | 128 | 45 | 125 | 51 | 4 | 98 | 24 | 4 | 27 | — | 14 | 6 | — | — | 6 | 6 | — | 1 | 3 | 20 | 3 | 11 | 177 | |
| — | — | 18 | 5 | 10 | — | 3 | — | 64 | 15 | 58 | 10 | 12 | 2 | 4 | 89 | 55 | 2 | 10 | 1 | 21 | 6 | — | — | 8 | 8 | — | — | 4 | 1 | 6 | 178 | | |

genommen.
aufgenommen.

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtkrankenzugang in der militärärztlichen Behandlung b) Zugang im Lazarett | | Gestorben in der militärärztlichen Behandlung | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | II. an Krankheiten des Nervensystems | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | | | | | IV. an Krankheiten der Kreislauf- und blutbereitenden Organe | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--------|---|----------|--|-----------|-------------------------------------|--------|------------------------|-------|----------------------|-------|---|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------|--|-------|---------------|-------|---|-------|-----------------------------|-------|--|--|--|--|---|-------|--|-------|---------------|-------|----------------|-------|----------------------------|--|
| | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Summe (1-40) | | Scharlach, Masern (Röteln) (2 u. 4) | | Diphtherie (Krupp) (8) | | Unterleibstypus (13) | | Flecktyphus und Rückfallfieber (14 u. 15) | | Wechselfieber (16) | | Tuberkulose (18-21) | | | | Ruhr (22) | | Akuter und chronischer Gelenkrheumatismus (27 u. 28) | | Summe (53-63) | | Katarre der Schleimhäute der Luftwege (53-57) | | Akute Lungenentzündung (58) | | | | | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, auschl. No. 19 (59) | | Brustfellentzündung u. Ausgänge, auschl. No. 19 (60) | | Summe (64-79) | | Summe (80-101) | | davon Mandelentzündg. (82) | |
| | | | | | | | erkrankt | gestorben | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | | | | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | |
| 195 | Kiel | 636 | a 350 b 128 | 1 1 | 19 18 | 1 1 | | | | | | | | | 2 2 | | 14 13 | | 4 2 | | 67 26 | | 58 18 | | 5 5 | | | | 3 2 | | 7 2 | | 48 7 | | 32 4 | | | | | | | | | | | |
| 196 | Königstein | 605 | a 342 b 184 | | 56 26 | | | | | | | | | | 1 1 | | 8 8 | | 3 3 | | 34 28 | | 31 25 | | 1 1 | | | | 2 2 | | 2 2 | | 42 28 | | 17 14 | | | | | | | | | | | |
| 197 | Kulm | 695 | a 332 b 107 | 1 1 | 14 9 | 1 1 | | | | | | | | | 2 1 | | 4 4 | | | | 34 15 | | 28 9 | | 4 4 | | | | 2 3 | | 5 3 | | 49 19 | | 16 5 | | | | | | | | | | | |
| 198 | Lauban | 588 | a 241 b 79 | | 3 3 | | | | | | | | | | 1 1 | | 2 2 | | 4 3 | | 34 14 | | 27 7 | | 5 5 | | | | 2 2 | | 5 5 | | 33 5 | | 17 2 | | | | | | | | | | | |
| 199 | Leisnig | 543 | a 467 b 154 | | 27 22 | 1 1 | | | | | | | | | 2 2 | | 9 9 | | 7 6 | | 85 26 | | 76 17 | | 8 8 | | | | 1 1 | | 11 5 | | 84 15 | | 44 9 | | | | | | | | | | | |
| 200 | Leob-schütz | 584 | a 357 b 191 | 1 1 | 13 13 | 2 2 | | | | | | | | | 2 2 | | 4 4 | | 7 6 | | 30 19 | | 28 18 | | | | | | 1 1 | | 6 4 | | 46 33 | | 5 4 | | | | | | | | | | | |
| 201 | Lötzen | 953 | a 406 b 133 | | 10 10 | | | | | 2 2 | | | | | 2 2 | | 2 2 | | 5 2 | | 42 14 | | 37 9 | | 4 4 | | | | 1 1 | | 13 5 | | 55 17 | | 25 4 | | | | | | | | | | | |
| 202 | Ludwigs-lust | 690 | a 417 b 171 | | 144 52 | 23 22 | | | | | | | | | 3 3 | | 10 9 | | 3 3 | | 44 20 | | 36 12 | | 5 5 | | | | 3 3 | | 3 3 | | 47 19 | | 17 3 | | | | | | | | | | | |
| 203 | Lübben | 705 | a 305 b 104 | | 44 24 | 10 10 | | | | | | | | | 1 1 | | 3 3 | | | | 34 15 | | 27 8 | | 3 3 | | | | 4 4 | | 5 1 | | 54 14 | | 13 1 | | | | | | | | | | | |
| 204 | Lüben | 705 | a 400 b 64 | 1 1 | 60 8 | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | | 9 6 | | 5 2 | | 41 7 | | 38 4 | | 2 2 | | | | 1 1 | | 7 1 | | 51 8 | | 13 2 | | | | | | | | | | | |
| 205 | Lüneburg | 613 | a 440 b 250 | | 12 11 | 1 1 | | | | | | | | | 2 2 | | 3 2 | | 4 4 | | 57 29 | | 50 23 | | 6 5 | | | | 1 1 | | 5 4 | | 74 37 | | 35 13 | | | | | | | | | | | |
| 206 | Marburg | 643 | a 552 b 139 | 3 2 | 71 21 | 1 1 | | | | 1 1 | | | | | 5 5 | | 9 6 | 1 | 13 7 | | 48 10 | | 43 5 | | 2 2 | | | | 3 3 | | 12 7 | | 61 11 | | 33 2 | | | | | | | | | | | |
| 207 | Marien-berg | 619 | a 425 b 143 | | 78 38 | | | | | | | | | | | | 4 1 | | 2 1 | | 30 18 | | 30 18 | | | | | | | | 9 2 | | 94 16 | | 55 11 | | | | | | | | | | | |
| 208 | Memel | 558 | a 351 b 129 | 1 1 | 50 14 | 1 1 | 3 3 | | | | | | | | 1 1 | | 5 5 | | 3 3 | | 51 22 | | 41 12 | | 6 6 | | 3 3 | | | | 2 2 | | 43 11 | | 22 4 | | | | | | | | | | | |
| 209 | Mergent-heim | 583 | a 518 b 151 | 1 1 | 11 10 | 1 1 | | | | | | | | | 3 3 | | 6 6 | | 7 4 | | 56 17 | | 53 14 | | 2 2 | | | | | | 14 6 | | 84 19 | | 28 3 | | | | | | | | | | | |
| 210 | Militzsch | 588 | a 305 b 94 | | 15 14 | 2 2 | | | | | | | | | 2 2 | | 9 9 | | 3 2 | | 40 18 | | 26 4 | | 8 8 | | | | 6 6 | | 1 1 | | 61 9 | | 33 4 | | | | | | | | | | | |
| 211 | Mutzig ¹⁾ | 632 | a 397 b 84 | | 103 12 | | | | | | | | | | | | 3 3 | | 6 2 | | 36 14 | | 35 13 | | | | | | 1 1 | | 13 5 | | 46 12 | | 13 3 | | | | | | | | | | | |
| 212 | Neustadt i. Ob. Schl. | 530 | a 335 b 120 | | 3 3 | | | | | 1 1 | | | | | 1 1 | | 1 1 | | 1 1 | | 44 11 | | 44 11 | | | | | | | | 3 3 | | 43 15 | | 11 6 | | | | | | | | | | | |
| 213 | Neustrelitz | 748 | a 284 b 191 | 1 1 | 33 27 | 1 1 | 3 3 | | | | | | | | ²⁾ 1 ²⁾ 1 | | 7 7 | | 6 4 | | 32 25 | | 24 17 | | 5 5 | | | | 3 3 | | 5 5 | | 34 26 | | 18 14 | | | | | | | | | | | |

1) Außerdem sind 76 Mann in dem für Mutzig zuständigen Lazarett I und II Straßburg i. E. behandelt und daher in den Garnisonrapport von
2) Der Verstorbene war beim Beginn des Berichtsjahres im Bestande.

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtfrankenzugung in der militärärztlichen Behandlung b) Zugang im Lazarett | | Gestorben in der militärärztlichen Behandlung | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | | II. an Krankheiten des Nervensystems | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | IV. an Krankheiten der Kreislauf- und blutbereitenden Organe | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--------|---|--------|--|--------|----------------------------|----------|--------------------|--------|-----------------|-------|--------------------------------|--------|---------------|----------|-------------|----------|----------|--------------------------------------|--------|---|--------|---------|-------|---------------------------------------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|---------|--|----------|--|
| | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | davon | | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Summe | | Scharlach, Masern (Röteln) | | Diphtherie (Krupp) | | Unterleibstypus | | Flecktyphus und Rückfallfieber | | Wechselfieber | | Tuberkulose | | Ruhr | | | Akuter und chronischer Gelenkrheumatismus | | Summe | | Katarhe der Schleimhäute der Luftwege | | | | Akute Lungenentzündung | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, anschl. No. 19 | | Brustfellentzündung u. Ausgänge, ausschl. No. 19 | | Summe | | Summe | | | |
| | | | | | | | (1-40) | | (3 u. 4) | | (6) | | (13) | | (14 u. 15) | | (16) | | (18-21) | | (22) | | | (27 u. 28) | | (41-52) | | (53-68) | | | | (53-57) | | (58) | | (59) | | (60) | | (64-79) | | (80-101) | |
| erkrankt | gestorben | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | | | | | | | | | | | |
| 214 | Oels | 882 | a 451 b 304 | 2 2 | 10 9 | 1 1 | | | | | | | | | | 7 7 | | 2 2 | 65 35 | 59 30 | 3 3 | 1 1 | 2 1 | | | 9 9 | | 63 47 | 1 1 | 20 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Offenbach ¹⁾ | 657 | a 242 b 30 | | 6 4 | | 2 2 | | | | | | | | | 2 1 | | 2 1 | 21 1 | 20 1 | | | | | 1 1 | 7 2 | | 42 3 | | 24 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | Ohlau | 690 | a 413 b 154 | | 3 3 | | | | | | | 1 1 | | | | 1 1 | | 4 2 | 41 25 | 24 8 | 16 16 | | | 1 1 | | 5 5 | | 46 14 | | 18 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | Ortelsburg | 708 | a 517 b 169 | 2 2 | 61 19 | 1 1 | | 2 2 | | | | 1 1 | | | | 7 7 | | 3 2 | 42 17 | 33 8 | 5 5 | | 2 2 | 1 1 | | 8 2 | | 41 13 | | 22 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | Oschatz | 695 | a 223 b 131 | 1 1 | 16 13 | | | | | | | 4 4 | | | | 5 2 | | 3 1 | 51 18 | 45 12 | 4 4 | | | 2 2 | | 1 1 | | 24 13 | | 11 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | Parchim | 695 | a 481 b 124 | 1 1 | 57 9 | | | 1 1 | | | | 1 1 | | | | 8 3 | | 1 1 | 59 24 | 42 7 | 16 16 | | | 1 1 | | 11 8 | | 64 14 | 1 1 | 40 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | Pasewalk | 709 | a 633 b 146 | 1 1 | 29 15 | | | 1 1 | | | | | | | | 6 6 | | 5 1 | 18 5 | 14 1 | 2 2 | 1 1 | | 2 2 | | 5 3 | | 101 22 | | 42 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | Perleberg | 714 | a 335 b 162 | 2 2 | 28 15 | | | | | | | 1 1 | | | | 4 4 | | 4 3 | 26 22 | 18 14 | 6 6 | | | 2 2 | | 6 3 | | 37 13 | 1 1 | 18 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | Pfalzburg ²⁾ | 644 | a 519 b 159 | | 68 14 | | | 3 3 | | | | | | | | 6 5 | | 2 1 | 44 11 | 41 8 | 1 1 | | | 2 2 | | 10 6 | | 80 17 | | 42 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | Rathenow | 703 | a 470 b 192 | 3 3 | 48 16 | 1 1 | 1 1 | | | | | 4 4 | | | | 1 1 | | 5 2 | 43 18 | 37 13 | 4 3 | | | 2 2 | 1 1 | 6 5 | | 62 15 | | 22 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | Ratibor | 722 | a 409 b 231 | | 27 26 | | | | | | | 2 2 | | | 13 12 | | 3 2 | 63 31 | 56 24 | 5 5 | | | | 2 2 | | 10 5 | | 48 30 | | 19 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | Ratzeburg | 674 | a 377 b 196 | | 11 10 | | 6 6 | | | | | 1 1 | | | | 1 1 | | 1 1 | 31 17 | 25 11 | 2 2 | | | 4 4 | | 6 4 | | 55 32 | | 21 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | Riesenburg | 454 | a 236 b 129 | | 6 5 | | | | | | | | | | | 2 2 | | 5 4 | 21 12 | 19 10 | 1 1 | | | 1 1 | | 5 4 | | 24 13 | | 11 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | Rudolstadt | 564 | a 311 b 175 | 1 1 | 8 8 | | 1 1 | 2 2 | | 1 1 | | 1 1 | | | | 2 2 | | 1 1 | 54 37 | 49 32 | 5 5 | | | | | 10 7 | | 34 22 | | 17 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | Salzwedel | 442 | a 295 b 158 | | 8 8 | | | | | | | 1 1 | | | | 3 3 | | 2 1 | 16 16 | 12 12 | 4 4 | | | | | 4 2 | | 45 13 | | 19 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Schlestadt | 771 | a 527 b 230 | 2 2 | 81 40 | 1 1 | 1 1 | | | 19 19 | | 3 3 | 1 1 | | | 3 3 | | 3 3 | 58 32 | 56 30 | | | | 2 2 | | 10 7 | | 61 28 | 1 1 | 35 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Schrimm | 539 | a 178 b 55 | | 5 5 | | | | | | | | | | | 4 4 | | 1 1 | 27 7 | 24 4 | 3 3 | | | | | 4 2 | | 21 4 | | 7 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | Schwedt a. O. | 714 | a 381 b 207 | 1 1 | 18 15 | 1 1 | 1 1 | | | | | 4 4 | | | | 7 6 | | 2 2 | 55 25 | 45 15 | 9 9 | | | 1 1 | | 3 2 | | 44 24 | | 15 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | Sensburg | 676 | a 582 b 265 | | 16 13 | | | 2 2 | | | | | | | | 5 3 | | 9 5 | 86 38 | 78 31 | 2 2 | | 2 2 | 3 3 | | 12 9 | | 96 45 | | 28 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | Soldau | 552 | a 152 b 76 | | 4 4 | | | | | | | | | | | 4 4 | | 4 4 | 30 22 | 21 13 | 5 5 | | | 4 4 | | 4 2 | | 16 7 | | 7 1 | | | | | | | | | | | | | |

1) Außerdem sind 85 Mann in dem für Offenbach zuständigen Lazarett Frankfurt a. M.—Borkenheim behandelt und daher in den Garnisonrapport

2) Außerdem ist ein Mann in dem für Pfalzburg zuständigen Garnisonlazarett Zabern behandelt und daher in den Garnisonrapport von Pfalzburg

kranken litten:

| VI. an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, auschl. der venerischen (102-111) | | VII. an venerischen Krankheiten | | VIII. an Augenkrankh. | | IX. an Ohrenkrankheiten | | X. an Krankheit. der äußeren Bedeckungen | | XI. an Krankh. der Bewegungsorgane | | XII. an mechanischen Verletzungen | | | | | XIII. an anderen Krankheiten | | | XIV. Außerdem zur Beobachtung | Gestorben außerhalb der militärarztl. Behandlung | | | Entlassen als | | | Laufende Nummer | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------------|-------|--|-------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------------------------------|--|-----------|------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|----|---|-----|-----|-----|-----|
| erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | (195) | (198) | Krankheit | Selbstmord | Verunglückt | Summe aller Todesfälle | dienstunbrauchbar | | halbinvalide | ganzinvalide | | | | | | | | | | | |
| 4 | — | 18 | 3 | 8 | — | 11 | — | 114 | — | 99 | — | 36 | — | 2 | — | 100 | — | 38 | — | 1 | 39 | 1 | 15 | — | 2 | — | 1 | — | 9 | — | 2 | — | 4 | 7 | 11 | 3 | 214 | | | |
| 4 | — | 18 | 3 | 5 | — | 9 | — | 57 | — | 44 | — | 29 | — | 1 | — | 69 | — | 27 | — | 1 | 29 | 1 | 8 | — | 2 | — | 1 | — | 9 | — | 2 | — | 2 | — | — | — | 215 | | | |
| 4 | — | 1 | 1 | 5 | — | 2 | — | 62 | — | 55 | — | 37 | — | 3 | — | 53 | — | 16 | — | 2 | 23 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 7 | 7 | — | 215 | | | |
| 2 | — | — | — | 3 | — | — | — | 6 | — | 5 | — | 2 | — | — | — | 6 | — | 3 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 216 | | | |
| 4 | — | 22 | 6 | 6 | — | 4 | — | 153 | — | 139 | — | 9 | — | 3 | — | 112 | — | 48 | — | 7 | 17 | 1 | 34 | — | 4 | — | — | — | 4 | — | 2 | — | — | 4 | 8 | — | 216 | | | |
| 4 | — | 22 | 6 | 1 | — | 2 | — | 38 | — | 36 | — | 2 | — | 2 | — | 32 | — | 18 | — | 7 | — | 1 | 6 | — | 4 | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 216 | | | |
| 3 | — | 21 | 6 | 8 | — | 17 | — | 95 | — | 82 | — | 78 | — | 9 | — | 140 | — | 36 | — | 9 | 61 | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 217 | | | |
| 3 | — | 21 | 6 | 1 | — | 3 | — | 14 | — | 11 | — | 28 | — | 5 | — | 46 | — | 9 | — | 9 | 23 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 217 | | | |
| 1 | — | 11 | 5 | 3 | — | 4 | — | 47 | 1 | 41 | 1 | 21 | — | — | — | 38 | — | 16 | — | 11 | 1 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 218 | | | |
| 1 | — | 10 | 5 | 2 | — | 4 | — | 28 | 1 | 23 | 1 | 13 | — | — | — | 24 | — | 10 | — | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 218 | | | |
| 3 | — | 15 | 5 | 10 | — | 7 | — | 127 | — | 112 | — | 6 | — | 1 | — | 120 | — | 50 | — | 4 | 13 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 219 | | | |
| 2 | — | 15 | 5 | 3 | — | 6 | — | 16 | — | 11 | — | 4 | — | 1 | — | 22 | — | 8 | — | 3 | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 219 | | | |
| 5 | — | 5 | 3 | 16 | — | 8 | — | 165 | — | 155 | — | 25 | — | 2 | — | 247 | — | 137 | — | 7 | 33 | 1 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | | | |
| 3 | — | 5 | 3 | 5 | — | 1 | — | 32 | — | 28 | — | 5 | — | 1 | — | 45 | — | 20 | — | 5 | 6 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | | |
| 4 | — | 22 | 7 | 12 | — | 4 | — | 49 | — | 41 | — | 31 | — | 9 | — | 104 | — | 49 | — | 2 | 30 | 1 | 19 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 221 | | | |
| 3 | — | 21 | 7 | 6 | — | 3 | — | 14 | — | 10 | — | 9 | — | 2 | — | 42 | — | 14 | — | 2 | 16 | 1 | 8 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 221 | | |
| 1 | — | 5 | 2 | 15 | — | 2 | — | 124 | — | 103 | — | 59 | — | 13 | — | 104 | — | 32 | — | 3 | 43 | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 222 | | |
| 1 | — | 5 | 2 | 5 | — | 1 | — | 31 | — | 22 | — | 30 | — | 9 | — | 32 | — | 8 | — | 2 | 19 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 222 | | |
| 1 | — | 36 | 6 | 14 | — | 13 | — | 111 | — | 102 | — | 29 | — | 3 | — | 99 | — | 33 | — | 8 | 18 | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 223 | | |
| 1 | — | 35 | 6 | 4 | — | 5 | — | 47 | — | 43 | — | 10 | — | 3 | — | 31 | — | 6 | — | 8 | 4 | — | 13 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 223 | | |
| 3 | — | 25 | 8 | 5 | — | 2 | — | 82 | — | 67 | — | 42 | — | 7 | — | 92 | — | 20 | — | 5 | 18 | 2 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 224 | | |
| 3 | — | 25 | 8 | 4 | — | 2 | — | 38 | — | 28 | — | 24 | — | 6 | — | 34 | — | 11 | — | 5 | 6 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 224 | | |
| 3 | — | 14 | 1 | 15 | — | 4 | — | 92 | — | 84 | — | 41 | — | 4 | — | 103 | — | 14 | — | 11 | 25 | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 | | |
| 3 | — | 14 | 1 | 3 | — | 3 | — | 39 | — | 37 | — | 26 | — | 3 | — | 43 | — | 9 | — | 10 | 16 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 | | |
| 1 | — | 18 | 3 | 8 | — | 1 | — | 56 | — | 49 | — | 13 | — | 2 | — | 78 | — | 25 | — | 7 | 10 | 3 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 226 | |
| 1 | — | 18 | 3 | 6 | — | 1 | — | 26 | — | 20 | — | 4 | — | 1 | — | 35 | — | 11 | — | 6 | 6 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 226 | |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | — | 5 | — | 70 | — | 59 | — | 62 | — | 19 | — | 44 | — | 10 | — | 9 | 15 | 1 | 8 | — | 1 | — | 1 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227 | |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | — | 3 | — | 35 | — | 26 | — | 18 | — | 5 | — | 23 | — | 4 | — | 9 | 4 | — | 5 | — | 1 | — | 1 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227 | |
| 4 | — | 4 | — | 16 | — | 8 | — | 80 | — | 52 | — | 25 | — | 3 | — | 82 | — | 28 | — | 2 | 14 | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 228 | |
| 3 | — | 3 | — | 7 | — | 6 | — | 47 | — | 42 | — | 6 | — | 3 | — | 45 | — | 13 | — | 1 | 14 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 228 | |
| 2 | — | 12 | 1 | 12 | — | 3 | — | 96 | — | 88 | — | 66 | — | 9 | — | 113 | — | 20 | — | 4 | 51 | 2 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 229 | |
| 2 | — | 12 | 1 | 9 | — | 1 | — | 43 | — | 37 | — | 10 | — | 1 | — | 35 | — | 7 | — | 4 | 15 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 229 | |
| 1 | — | 6 | 3 | 2 | — | 1 | — | 35 | — | 29 | — | 27 | — | 2 | — | 42 | — | 8 | — | 2 | 19 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 |
| 1 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | — | 7 | — | 4 | — | 5 | — | 1 | — | 11 | — | 1 | — | 2 | 5 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | |
| 1 | — | 12 | 5 | 6 | — | 4 | — | 118 | — | 111 | — | 9 | — | — | — | 106 | — | 45 | — | 1 | 20 | 1 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 231 | |
| 1 | — | 12 | 5 | 1 | — | 3 | — | 71 | — | 67 | — | 3 | — | — | — | 45 | — | 23 | — | 1 | 8 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 231 | |
| 4 | — | 30 | 14 | 19 | — | 12 | — | 83 | — | 79 | — | 82 | — | 8 | — | 121 | — | 52 | — | 2 | 35 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 232 | |
| 2 | — | 30 | 14 | 10 | — | 9 | — | 25 | — | 23 | — | 37 | — | 7 | — | 30 | — | 15 | — | 2 | 9 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 232 | |
| — | — | 8 | — | 7 | — | — | — | 9 | — | 7 | — | 13 | — | — | — | 37 | — | 3 | — | 2 | 21 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 233 | |
| — | — | 8 | — | 2 | — | — | — | 4 | — | 3 | — | 13 | — | — | — | 9 | — | 2 | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 233 | |

von Offenbach nicht aufgenommen.
nicht aufgenommen.

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtankunftszugang in der militärärztlichen Behandlung b) Zugang im Lazarett | | Gestorben in der militärärztlichen Behandlung | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | | II. an Krankheiten des Nervensystems | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | | | | | IV. an Krankheiten der Kreislaufs- und blut-bereitenden Organe | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------|--|------|---|----|--|-----------|-------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------|-------|---|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|-----------|--------------------------------------|---|---|-------|---------------|-------|---|-------|------------------------------|-------|--|-------|--|--|---|-------|---------------|-------|----------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | davon | | | | | | | |
| | | | | | | | Summe (1-40) | | Scharlach, Masern (Röteln) (3 u. 4) | | Diphtherie (Krupp) (6) | | Unterleibstypus (13) | | Flektypus und Rückfallfieber (14 u. 15) | | Wechselfieber (16) | | Tuberkulose (18-21) | | Ruhr (22) | | | Akuter und chronischer Gelenk-rheumatismus (27 u. 28) | | Summe (53-63) | | Katarhe der Schleimhäute der Luftwege (53-57) | | Akute Lungen-entzündung (58) | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, ausschl. No. 19 (59) | | | | Brustfellentzündung u. Ausgänge, ausschl. No. 19 (60) | | Summe (64-79) | | Summe (80-101) | | Mandel-entzündg. (82) | |
| | | | | | | | erkrankt | gestorben | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | | | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | | | gest. | erkr. | gest. | erkr. | | | | |
| 234 | Sonderburg-Düppel | 546 | a 291 b 167 | 2 21 | 2 21 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 1 | 24 | 17 | 2 | | | | 5 | | 1 | | 32 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 235 | Sondershausen | 598 | a 272 b 176 | 2 9 | 2 5 | 1 | | | | | | | 1 | | 7 | | 1 | | 25 | 2 | 22 | 3 | 2 | | | | | 4 | | 47 | | 22 | | | | | | | | | | | |
| 236 | Sprottau | 709 | a 264 b 108 | 1 17 | 1 11 | | | | | | | | | | 8 | | 3 | | 41 | 1 | 37 | 2 | 1 | | | 2 | | 6 | | 30 | | 12 | | | | | | | | | | | |
| 237 | Stade | 595 | a 413 b 191 | — 2 | — 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 5 | | 87 | 83 | 4 | | | | | | 9 | | 44 | | 29 | | | | | | | | | | | |
| 238 | Stendal | 707 | a 375 b 296 | 3 36 | 2 29 | | | | 1 | | | | | | | 3 | | 3 | 1 | 43 | 33 | 9 | | | 1 | | 2 | | 40 | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 239 | Stolp | 717 | a 274 b 143 | 2 17 | 1 17 | | | 7 | 1 | | | 2 | | | 5 | | 3 | | 37 | 31 | 4 | | | 2 | | 2 | | 5 | | 31 | | 6 | | | | | | | | | | | |
| 240 | Strasburg i. W. Pr. | 522 | a 350 b 86 | — 8 | — 8 | | | 3 | | | | 1 | | | 2 | | 1 | | 28 | 25 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 78 | | 44 | | | | | | | | | | | | |
| 241 | Swinemünde | 618 | a 428 b 157 | — 11 | — 5 | | | | | | | | | | 1 | | 5 | | 57 | 49 | 4 | | | 4 | | 4 | | 3 | | 34 | | 13 | | | | | | | | | | | |
| 242 | Treptow a. R. | 609 | a 292 b 157 | — 33 | — 20 | 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | 1 | | 33 | 29 | 4 | | | 4 | | 4 | | 6 | | 44 | | 25 | | | | | | | | | | | |
| 243 | Tübingen | 650 | a 593 b 105 | — 49 | — 16 | 1 | | 1 | | | | 3 | | | 9 | | 4 | | 69 | 66 | | | | | 3 | | 9 | | 121 | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| 244 | Verden | 672 | a 449 b 229 | 1 58 | 1 23 | | | 1 | | | | 3 | | | 7 | | 5 | | 36 | 1 | 24 | 6 | 1 | | 6 | | 9 | | 56 | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 245 | Schiefsplatz Wahn | 842 | a 179 b 124 | 1 9 | 1 9 | | | | | | | | | | 7 | | 1 | | 32 | 1 | 21 | 7 | 1 | 3 | | | 2 | | 21 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 246 | Wandsbek ²⁾ | 702 | a 201 b 35 | — 12 | — 6 | | | 1 | | | | 2 | | | 4 | | 1 | | 35 | 29 | 5 | | | | 1 | | 4 | | 39 | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| 247 | Weimar | 685 | a 421 b 174 | 2 36 | 1 28 | 7 | | | | | | 1 | 1 | | 15 | | 3 | | 59 | 54 | | | | | 4 | | 9 | 1 | 62 | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 248 | Weisensfels | 655 | a 513 b 200 | 2 34 | 2 30 | 2 | | 2 | | | | 1 | | | 9 | | 5 | | 51 | 42 | 1 | | 1 | | 7 | | 7 | | 124 | 2 | 85 | | | | | | | | | | | | |
| 249 | Wismar | 626 | a 399 b 88 | — 35 | — 27 | 13 | | | | | | | | | 6 | | 3 | | 61 | 51 | 6 | | | 4 | | 4 | | 7 | | 63 | | 37 | | | | | | | | | | | |
| 250 | Wollenbüttel | 419 | a 242 b 76 | 2 12 | 1 11 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | | 5 | | 5 | | 9 | 7 | 2 | | | | | | 6 | | 29 | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 251 | Wreschen | 568 | a 193 b 56 | — 11 | — 6 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 27 | 17 | 7 | | 1 | | 2 | | 6 | | 16 | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 252 | Zerbst | 558 | a 258 b 155 | — 7 | — 5 | | | 1 | | | | | | | 3 | | 2 | | 23 | 18 | 5 | | | | | | 4 | | 33 | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 253 | Züllichau | 692 | a 453 b 171 | 1 11 | 1 8 | | | 1 | | | | | | | 2 | | 5 | | 65 | 1 | 52 | 8 | 1 | | 5 | | 4 | | 57 | | 17 | | | | | | | | | | | | |

1) Der Verstorbene war beim Beginn des Berichtsjahres im Bestande.

2) Außerdem sind 137 Mann in dem für Wandsbek zuständigen Lazarett Altona behandelt und daher in den Garnisonrapport von Wandsbek nicht

kranken litten:

| VI. an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschl. der venerischen (102-111) | | VII. an venerischen Krankheiten | | VIII. an Augenkrankh. | | IX. an Ohrenkrankheiten | | X. an Krankheit. der äußeren Bedeckungen | | XI. an Krankh. der Bewegungsorgane | | XII. an mechanischen Verletzungen | | | | | XIII. an anderen Krankheiten | | | XIV. Aufserdem zur Beobachtung XIV. | Entlassen als | | | Laufende Nummer | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------|-------|--|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|---------------|-----------|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|
| erkr. | gest. | Summe | davon konstitutionelle Syphilis | | Summe | davon ansteckende | Summe | Summe | davon Zellgewebsentzündung | Summe | davon akute und chronische Gelenkentzündung, ausschl. No. 20, 27 und 28 | | Summe | davon | | | | | Summe | davon | | Krankheit | Gestorben außerhalb der militärärztl. Behandlung durch | | Summe aller Todesfälle | dienstunbrauchbar | halbinvalide | ganzinvalide | | | | | | | | | | |
| | | | (112-117) | (117) | | | | | | | (118-134) | (118-122) | | (135-139) | (140-148) | (144-146) | (149-162) | (152 u. 153) | | (163-192) | (165-167) | | | (168-179) | | | | | (180 u. 181) | (182-184) | (185-189 u. 192) | (193-197) | (194) | (195) Vorgetauschte Krankh. | Selbstmordversuche | Vorgetauschte Krankh. | Selbstmord | Verunglück. |
| 2 | — | 12 | 3 | — | 8 | — | 7 | — | 32 | — | 31 | — | 65 | — | 44 | — | 44 | — | 9 | — | 15 | 10 | — | 9 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 19 | 4 | 6 | 234 | |
| 2 | — | 12 | 3 | — | 4 | — | 7 | — | 17 | — | 16 | — | 36 | — | 24 | — | 24 | — | 5 | — | 15 | 3 | — | 15 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 1 | — | 7 | — | — | 10 | — | 3 | — | 69 | — | 68 | — | 45 | — | 5 | — | 51 | — | 15 | — | — | — | 22 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 2 | 9 | 8 | 3 | 235 | | |
| 1 | — | 7 | — | — | 9 | — | 2 | — | 47 | — | 46 | — | 24 | — | 5 | — | 24 | — | 9 | — | — | 9 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | | |
| 1 | — | 4 | 1 | — | 6 | — | — | — | 63 | — | 55 | — | 14 | — | — | — | 76 | — | 40 | — | 2 | 6 | 3 | 23 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 2 | 9 | 5 | 6 | 236 | |
| 1 | — | 4 | 1 | — | 4 | — | — | — | 29 | — | 25 | — | 5 | — | — | — | 25 | — | 9 | — | 2 | 2 | 2 | 9 | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | 10 | 3 | — | 12 | — | 5 | — | 127 | — | 115 | — | 50 | — | 1 | — | 61 | — | 15 | — | 4 | 29 | — | 9 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 10 | 3 | — | 7 | — | 4 | — | 56 | — | 49 | — | 24 | — | 1 | — | 27 | — | 6 | — | 4 | 13 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | 8 | 2 | — | 5 | — | 7 | — | 95 | — | 88 | — | 14 | — | — | — | 114 | — | 39 | — | 1 | 10 | 31 | 1 | 28 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | 8 | 2 | — | 4 | — | 6 | — | 74 | — | 67 | — | 10 | — | — | — | 88 | — | 1 | — | 1 | 10 | 20 | 1 | 21 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 2 | — | — | 6 | — | 6 | — | 45 | — | 40 | — | 19 | — | 3 | — | 101 | — | 39 | — | 4 | 22 | 2 | 30 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 2 | — | — | 4 | — | 3 | — | 20 | — | 16 | — | 11 | — | 3 | — | 38 | — | 16 | — | 4 | 9 | 2 | 7 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 6 | 1 | — | 9 | — | 5 | — | 85 | — | 76 | — | 44 | — | 3 | — | 79 | — | 21 | — | 1 | 23 | — | 18 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 6 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 20 | — | 16 | — | 8 | — | 3 | — | 19 | — | 3 | — | 1 | 6 | — | 6 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 15 | 4 | — | 9 | — | 5 | — | 117 | — | 114 | — | 75 | — | 5 | — | 94 | — | 34 | — | 1 | 20 | — | 36 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 15 | 4 | — | 7 | — | 4 | — | 49 | — | 47 | — | 12 | — | 4 | — | 26 | — | 8 | — | 1 | 6 | — | 11 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | 20 | — | 6 | — | 74 | — | 70 | — | 15 | — | 2 | — | 54 | — | 13 | — | 2 | 21 | 1 | 10 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | 18 | — | 6 | — | 28 | — | 25 | — | 8 | — | 2 | — | 28 | — | 7 | — | 2 | 10 | 1 | 3 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | — | 2 | — | — | 10 | — | 7 | — | 118 | — | 112 | — | 108 | — | 28 | — | 85 | — | 8 | — | 4 | 31 | 2 | 29 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 14 | — | 13 | — | 9 | — | 2 | — | 12 | — | 1 | — | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | 7 | 1 | — | 7 | — | 7 | — | 111 | — | 99 | — | 32 | — | 6 | — | 112 | — | 45 | — | 6 | 12 | 1 | 37 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | 6 | 1 | — | 4 | — | 6 | — | 59 | — | 50 | — | 12 | — | 4 | — | 55 | — | 20 | — | 5 | 1 | — | 26 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 2 | 1 | — | 4 | — | 8 | — | 50 | — | 44 | — | 13 | — | 2 | — | 33 | — | 10 | — | 1 | 4 | — | 14 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 2 | 1 | — | 4 | — | 8 | — | 33 | — | 30 | — | 8 | — | — | — | 22 | — | 7 | — | 1 | — | — | 11 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 45 | — | 44 | — | 7 | — | 2 | — | 50 | — | 23 | — | 1 | 12 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | — | 3 | — | — | — | — | — | 6 | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | 14 | 4 | — | 5 | — | 1 | — | 80 | — | 74 | — | 69 | — | 1 | — | 74 | — | 18 | — | 12 | 36 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | 14 | 4 | — | 2 | — | 1 | — | 19 | — | 15 | — | 26 | — | 1 | — | 30 | — | 5 | — | 11 | 14 | — | 14 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 17 | 2 | — | 11 | — | 11 | — | 112 | — | 101 | — | 24 | — | 3 | — | 109 | — | 42 | — | 7 | 33 | — | 13 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 16 | 2 | — | 2 | — | 9 | — | 32 | — | 27 | — | 10 | — | 3 | — | 46 | — | 20 | — | 7 | 10 | — | 4 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 3 | 1 | — | 6 | — | 19 | — | 76 | — | 71 | — | 68 | — | 1 | — | 56 | — | 16 | — | 1 | 13 | — | 13 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 3 | 1 | — | 1 | — | 3 | — | 10 | — | 9 | — | 9 | — | 1 | — | 10 | — | 6 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | 82 | — | 70 | — | 14 | — | 1 | — | 77 | — | 23 | — | 5 | 9 | — | 18 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 21 | — | 16 | — | 13 | — | 1 | — | 22 | — | 8 | — | 5 | 2 | — | 7 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 55 | — | 52 | — | 31 | — | 2 | — | 40 | — | 3 | — | 3 | 20 | — | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 10 | — | 9 | — | 3 | — | 2 | — | 7 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | 7 | — | — | 3 | — | 6 | — | 69 | — | 64 | — | 57 | — | 8 | — | 40 | — | 9 | — | — | 13 | — | 10 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 7 | — | — | 2 | — | 6 | — | 40 | — | 37 | — | 43 | — | 4 | — | 13 | — | 2 | — | — | — | — | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | 7 | 4 | — | 14 | — | 3 | — | 119 | — | 110 | — | 16 | — | 4 | — | 145 | — | 82 | — | 3 | 24 | — | 29 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | — | 7 | 4 | — | 6 | — | 3 | — | 29 | — | 27 | — | 5 | — | 3 | — | 42 | — | 21 | — | 3 | 7 | — | 10 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

aufgenommen.

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | Von den Er- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------|-------|---|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|----------------------------------|-------|---|-------|---------------|-------|---|-------|--|-------|------------------------------|-------|---|-------|---|--|---------------|--|----------------|
| | | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | II. | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | IV. | | V. an Krankheiten der Ernährungsorgane | | | | | | | | | | |
| | | | davon | | | | | | | | | | | | | | an Krankheiten des Nervensystems | | davon | | | | an Krankheiten der Kreislauf- und blut-bereitenden Organe | | davon | | | | | | | | | | |
| | | | Summe (1-40) | | Scharlach, Masern (Röteln) (3 u. 4) | | Diphtherie (Krupp) (6) | | Unterleibstypus (13) | | Flecktyphus und Rückfallfieber (14 u. 15) | | Wechselfieber (16) | | Tuberkulose (18-21) | | Ruhr (22) | | Akuter und chronischer Gelenk-rheumatismus (27 u. 28) | | Summe (41-52) | | Summe (53-63) | | Katarrhe der Schleimhäute der Luftwege (53-57) | | Akute Lungen-entzündung (58) | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, anschl. No. 19 (59) | | Brustfellentzündung u. Angänge, anschl. No. 19 (60) | | Summe (64-79) | | Summe (80-101) |
| erkrankt | gestorben | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | | | |
| 254 | Anklam ¹⁾ | 144 | a 176 b 6 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 10 | | | | | | | 1 | 1 | 48 | 28 | | | | | | |
| 255 | Annaburg | 308 | a 309 b 54 | 82 | 2 | | | | | | | | | | 8 | 2 | 15 | 15 | 11 | 3 | | | | | 1 | 8 | 89 | 59 | | | | | | | |
| 256 | Babenhäuser ²⁾ | 318 | a 240 b 28 | 1 3 1 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | 6 | 28 | 11 | | | | | | | |
| 257 | Bartenstein | 307 | a 157 b 26 | 5 4 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | 19 | 18 | 19 | 18 | | 1 | | | | 2 | 28 | 21 | | | | | | | | |
| 258 | Beeskow | 299 | a 196 b 73 | 1 9 1 7 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 7 | 1 | 33 | 25 | 33 | 25 | | 8 | | | | 3 | 32 | 17 | | | | | | | | |
| 259 | Belgard | 311 | a 168 b 102 | 10 10 | 4 4 | 2 2 | 1 1 | | 2 | | | | | 1 1 | 3 3 | 21 11 | 19 9 | 21 11 | 19 9 | 1 1 | | | | | 2 2 | 19 12 | 5 4 | | | | | | | | |
| 260 | Bensberg | 180 | a 146 b 146 | 1 44 1 44 | 1 36 1 36 | 1 | | | | | 1 | | | 2 2 | 1 1 | 23 23 | 22 22 | 23 23 | 22 22 | 1 1 | | | | | 4 4 | 44 44 | 30 30 | | | | | | | | |
| 261 | Bernstadt ³⁾ | 135 | a 47 b 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 9 | 7 | | | | | | | |
| 262 | Bischweiler ⁴⁾ | 319 | a 161 b 20 | 15 | | | | | | | | | | | 1 1 | 27 6 | 26 5 | 27 6 | 26 5 | | | | | | 1 1 | 17 2 | 9 1 | | | | | | | | |
| 263 | Bochum | 38 | a 22 b 7 | 5 3 | | | | | | | | | | 2 1 | | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | 2 2 | 1 1 | | | | | | | | |
| 264 | Cannstatt | 326 | a 186 b 18 | 1 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 1 | 28 4 | 24 1 | 28 4 | 24 1 | 1 1 | | | 3 2 | | 4 1 | 31 4 | 14 | | | | | | | | |
| 265 | Coesfeld | 51 | a 2 b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 266 | Dortmund | 49 | a 43 b 7 | 1 7 1 3 | 1 1 | | | | 1 1 | | | | | | | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | 8 3 | 3 1 | | | | | | | | |
| 267 | Truppenübungsplatz Elsenborn | 106 | a 36 b 13 | 1 | | | | | | | | | | | 1 1 | 11 2 | 11 2 | 11 2 | 11 2 | | | | | | 1 1 | 8 2 | 1 7 | | | | | | | | |
| 268 | Engers | 102 | a 31 b 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 8 2 | 4 | | | | | | | | |
| 269 | Essen | 46 | a 19 b 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 7 3 | 1 1 | | | | | | | | |
| 270 | Fritzlar | 257 | a 300 b 67 | 3 3 | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | | 45 | 44 6 | 45 | 44 6 | | | | | | 1 1 | 9 5 | 55 13 | 27 7 | | | | | | | |

IV. Garnisonen von mehr als

1) Außerdem sind 2 Mann in dem für Anklam zuständigen Lazarett Pasewalk behandelt und daher in den Garnisonrapport von Anklam nicht
2) Außerdem sind 17 Mann in dem für Babenhäuser (bis 31. 3. 03) zuständigen Lazarett Darmstadt behandelt und daher in den Garnisonrapport von
3) Außerdem sind 7 Mann in dem für Bernstadt zuständigen Lazarett Oels behandelt und daher in den Garnisonrapport von Bernstadt nicht
4) Außerdem sind 26 Mann in dem für Bischweiler zuständigen Lazarett Hagenau behandelt und daher in den Garnisonrapport von Bischweiler nicht

| Laufende Nummer | Garnison | Durchschnitts-Iststärke der Garnison | a) Gesamtkranken- gang in der militärärztlichen Behandlung | | b) Zugang im Lazarett | | Gestorben in der militärärztlichen Behandlung | | I. an Infektionskrankheiten und allgemeinen Erkrankungen | | | | | | | | | | | | | | II. an Krank- heiten des Nerven- systems | | III. an Krankheiten d. Atmungsorgane | | | | | | IV. an Krank- heiten der Kreislauf- und blut- bereiten- den Organe | | V. an Krank- heiten der Ernährungs- organe | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|--------|-----------------------|--------|--|--------|--|----------|-------------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------------|---------|---------------|---------|-------------|--------|---|--------|--------------------------------------|---------|---|--------|----------|---------|--|---------|---|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|-------|--|----------------------|--|
| | | | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | davon | | | | | | | | davon | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Summe | | Scharlach, Masern (Röteln) | | Diphtherie (Krupp) | | Unterleibstypus | | Flektypus und Rückfallfieber | | Wechselfieber | | Tuberkulose | | | | Ruhr | | Akuter und chro- nischer Gelenk- rheumatismus | | Summe | | | | Katarrhe der Schleimhäute der Luftwege | | Akute Lungen- entzündung | | Lungenblutung ohne Veränderung des Lungengewebes, ausschl. No. 19 | | Brustfellentzün- dung u. Ausgänge, ausschl. No. 19 | | Summe | | Mandel- entzündg. | |
| | | | | | | | | | (1-40) | (3 u. 4) | (6) | (13) | (14 u. 15) | (16) | (18-21) | (22) | (27 u. 28) | (41-52) | (53-63) | (53-57) | (58) | (59) | | | (60) | (64-79) | (80-101) | (82) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| erkrankt | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | erkr. | gest. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | Garde- legen | 271 | a 132 b 95 | 2 2 | 6 5 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 2 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 2 1 | — — | 19 12 | — — | 5 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | Greifen- berg i. Pomm. | 290 | a 194 b 29 | 1 1 | 19 3 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 4 2 | — — | 2 — | 35 9 | 1 1 | 28 3 | 3 3 | 1 1 | — — | 4 3 | — — | 66 2 | — — | 52 — | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | Greiz | 56 | a 23 b 1 | — — | 1 1 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 2 — | — — | 2 — | — — | — — | — — | — — | — — | 7 — | — — | 4 — | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | Grottkau ¹⁾ | 307 | a 125 b 47 | 1 1 | 3 3 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 15 5 | — — | 15 5 | — — | — — | — — | — — | 3 1 | — — | 12 5 | — — | 1 1 | | | | | | | | | | | | |
| 275 | Hersfeld | 143 | a 58 b 12 | — — | 6 3 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 12 2 | — — | 12 2 | — — | — — | — — | — — | 1 1 | — — | 9 2 | — — | 4 1 | | | | | | | | | | | | |
| 276 | Burg Hohenzollern ²⁾ | 130 | a 60 b 3 | 1 — | 6 — | 1 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 15 — | — — | 15 — | — — | — — | — — | — — | — — | 12 — | — — | 10 — | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | Königs- brück | 262 | a 153 b 70 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 17 13 | — — | 15 11 | — — | — — | — — | — — | — — | 4 3 | — — | 12 4 | — — | 4 1 | | | | | | | | | | | |
| 278 | Kreuzburg | 158 | a 76 b 42 | — — | 8 8 | 2 2 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 7 6 | — — | 4 3 | 3 3 | — — | — — | — — | 3 1 | — — | 18 9 | 1 1 | 8 1 | | | | | | | | | | | | |
| 279 | Truppen- übungs- platz Lamsdorf | 116 | a 107 b 20 | 1 1 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 25 6 | 1 1 | 24 5 | 1 1 | 1 1 | — — | — — | — — | 4 1 | — — | 11 2 | — — | 1 1 | | | | | | | | | | | |
| 280 | Landsberg a. W. ³⁾ | 356 | a 146 b 21 | — — | 8 6 | 4 4 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 27 2 | — — | 24 — | 3 2 | — — | — — | — — | — — | 2 — | — — | 17 2 | — — | 12 1 | | | | | | | | | | | |
| 281 | Langen- salza | 272 | a 173 b 4 | — — | 18 2 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 19 1 | — — | 18 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 32 — | — — | 14 — | | | | | | | | | | | | |
| 282 | Marien- burg ⁴⁾ | 298 | a 76 b 16 | — — | 3 3 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 8 2 | — — | 8 2 | — — | — — | — — | — — | — — | 4 2 | — — | 10 1 | — — | 9 — | | | | | | | | | | | |
| 283 | Truppen- übungs- platz Münsingen | 346 | a 269 b 120 | — — | 18 17 | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 49 10 | — — | 42 3 | 7 7 | — — | — — | — — | — — | 7 3 | — — | 45 20 | — — | 14 7 | | | | | | | | | | | |
| 284 | Namslau | 275 | a 164 b 78 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 21 14 | — — | 14 7 | 6 6 | — — | — — | — — | — — | 5 4 | — — | 33 20 | — — | 14 7 | | | | | | | | | | | |
| 285 | Naugard | 41 | a 7 b 4 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 1 1 | — — | 1 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 3 2 | — — | 2 2 | | | | | | | | | | | | |
| 286 | Neuhaldensleben | 76 | a 5 b — | — — | 1 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 2 — | — — | 1 — | | | | | | | | | | | | |
| 287 | Neuhaus ⁵⁾ | 378 | a 120 b 14 | 1 — | 7 — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 22 3 | — — | 21 2 | — — | — — | — — | — — | — — | 1 — | — — | 12 2 | — — | 3 1 | | | | | | | | | | | |

- 1) Außerdem sind 20 Mann in dem für Grottkau zuständigen Lazarett Neifse behandelt und daher in den Garnisonrapport von Grottkau nicht aufgeführt.
2) Außerdem sind 11 Mann in dem für Burg Hohenzollern zuständigen Lazarett Konstanz behandelt und daher in den Garnisonrapport von Burg Hohenzollern nicht aufgeführt.
3) Außerdem sind 19 Mann in dem für Landsberg a. W. zuständigen Lazarett Cüstrin behandelt und daher in den Garnisonrapport von Landsberg a. W. nicht aufgeführt.
4) Außerdem sind 10 Mann in dem für Marienburg zuständigen Lazarett Riesenburg behandelt und daher in den Garnisonrapport von Marienburg nicht aufgeführt.
5) Außerdem sind 94 Mann in dem für Neuhaus zuständigen Lazarett Paderborn behandelt und daher in den Garnisonrapport Neuhaus nicht aufgeführt.

Berichtigungen zum Sanitäts-Bericht 1901/02.

- Seite 25 rechts vom Teilstrich, oben, Tabelle:
Spalte Sanitätsmannschaften } Jahr 1901/02 statt „11 = 2,3“ setze: „9 = 1,8“.
„ Krankenwärter } „ „10 = 2,0“ „ „9 = 1,8“.
- Seite 42, Tabelle, lfd. No. 2, Gefreiter B.:
Spalte 3 statt „Mai 1900“ setze: „Mai 1901“.
- Seite 80, links vom Teilstrich, unten, in der letzten Zeile der zweiten Unterart:
statt „C. 5“ setze: „D“.
- Seite 127, rechts vom Teilstrich, Zeile 25 von unten:
statt „No. 568“ setze: „No. 575“.
- Seite 133, rechts vom Teilstrich, Zeile 7 von unten:
statt „379“ setze: „378“.
- Seite 135, rechts vom Teilstrich, Zeile 23 von oben:
statt „C. 1“ setze: „B. 6“.
- Seite 137, rechts vom Teilstrich, 4. Absatz, 4. Zeile:
statt „No. 43“ setze: „No. 42“.
- Seite 138, links vom Teilstrich, 3. Absatz, Zeile 3 von unten:
statt „Kniegegend“ setze: „Kinngegend“.
- Seite 140, links vom Teilstrich, letzte Zeile der laufenden No. 3:
statt „No. 492“ setze: „496“.
- Seite 140, links vom Teilstrich, 1. Absatz des Abschnitts II, letzte Zeile:
statt „No. 93“ setze: „94“.
- Seite 141, rechts vom Teilstrich, 2. Zeile von oben:
statt „C. 1“ setze: „B. 6“.
- Seite 142, links vom Teilstrich, unter No. 27 Zeile 4:
statt „0,6 mm“ setze: „0,6 cm“.
- Seite 146, links vom Teilstrich, 22. Zeile von unten:
statt: „A. 5“ setze: „A. 4“.
- Seite 148, links vom Teilstrich, Zeile 27 von unten:
statt „bis 390“ setze: „bis 391“.
- Ebendasselbst, nächste Zeile:
statt „391“ setze: „No. 392“.
- Seite 170, Fußnote 1) Zeile 1:
statt „12“ setze: „10“.
- Seite 175, unter lfd. No. 229, Spalte 4, 1. Zeile:
statt „1902“ setze: „1901“.
- Seite 181, unter lfd. No. 361, Spalte 4, letzte Zeile:
statt „1903“ setze: „1902“.

B.

Sanitäts-Bericht

über die

Kaiserliche Ostasiatische Besatzungs-Brigade

für den

Berichtszeitraum vom 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903.

Bearbeitet

von der

Medizinal-Abteilung

des

Königlich Preussischen Kriegsministeriums.

Mit 3 graphischen Darstellungen.

I. Teil.

Bericht

über

die Gesundheitsverhältnisse

der

Kaiserlichen Ostasiatischen Besatzungs-Brigade

während des Zeitraumes

vom **1. Oktober 1902** bis **30. September 1903.**

A. Bericht über den Krankenzugang¹⁾ im allgemeinen.

Der Krankenzugang betrug

| J a h r | bei einer Durchschnitts- iststärke von Mann | im Lazarett | | im Revier | | im ganzen | |
|-------------------------|--|-------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | | absol. | ‰ K. | absol. | ‰ K. | absol. | ‰ K. |
| 1900/01 ²⁾ . | 18 360 | 8171 | 445,0 | 11 412 | 621,6 | 19 583 | 1066,6 |
| 1901/02 . . | 4 740 | 2302 | 485,7 | 3 372 | 711,4 | 5 674 | 1197,0 |
| 1902/03 . . | 2 941 | 1250 | 425,0 | 1 600 | 544,0 | 2 850 | 969,1 |


Die Gesamtzahl der Erkrankungen in der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade im Jahre 1902/03 ist $227,9 \frac{\text{‰}}{\text{‰}}$ niedriger als im Vorjahre. Sie übersteigt aber diejenige in der Königlich Preussischen Armee im Jahre 1902/03 ($619,9 \frac{\text{‰}}{\text{‰}}$ K.) um $349,2 \frac{\text{‰}}{\text{‰}}$.

Die Verteilung des Gesamtkrankenzuganges auf die einzelnen Monate zeigt die folgende Tabelle.

Gleichzeitig sind die Zahlen für 1901/02 und für die Königlich Preussische Armee u. s. w. für 1902/03 beigelegt.

Der größte Zugang wurde im Oktober 1902 erreicht, und zwar hauptsächlich infolge Malaria und Ruhr.

Krankenzugang nach Monaten.



a ————— Ostasiatische Besatzungs-Brigade 1902/03,
b - - - - - » » » 1901/02,
c Königlich Preussische Armee u. s. w. 1902/03.

¹⁾ Die außerhalb des Bereichs der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade Erkrankten sind in den folgenden Zahlenangaben nicht mit enthalten; nur die Gestorbenen sind in den entsprechenden Tabellen von den übrigen getrennt aufgeführt. Über die während der Seetransporte Erkrankten gibt Tabelle VIII des II. Teils Aufschluss.

²⁾ Ostasiatisches Expeditionskorps.


In welcher Weise sich der Zugang in $\frac{0}{00}$ K. und $\frac{0}{00}$ M. auf die einzelnen Krankheitsgruppen verteilt, ist aus den nachstehenden Tabellen zu ersehen:

In 10 Gruppen ist eine zum Teil recht beträchtliche Verminderung in der Höhe des Zuganges eingetreten; nur 4 Gruppen (II, VIII, IX und XII) weisen eine Vermehrung auf.

Krankenzugang nach $\frac{0}{00}$ K. und $\frac{0}{00}$ M.

| | | Gruppe I | | Gruppe II | | Gruppe III | | Gruppe IV | | Gruppe V | | Gruppe VI | | Gruppe VII | |
|----------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. |
| Ostasiatisches Expeditionskorps | 1900/01 | 123,7 | 116,0 | 8,3 | 7,8 | 141,1 | 132,3 | 15,0 | 14,1 | 191,9 | 179,9 | 8,7 | 8,1 | 140,1 | 131,4 |
| Ostasiatische Besatzungs-Brigade | 1901/02 | 207,4 | 173,2 | 7,0 | 5,8 | 84,4 | 70,5 | 36,3 | 30,3 | 282,3 | 235,8 | 24,5 | 20,4 | 135,9 | 113,5 |
| | 1902/03 | 154,7 | 159,6 | 7,1 | 7,4 | 58,5 | 60,4 | 32,6 | 33,7 | 191,4 | 197,5 | 20,1 | 20,7 | 133,3 | 137,5 |
| | | Gruppe VIII | | Gruppe IX | | Gruppe X | | Gruppe XI | | Gruppe XII | | Gruppe XIII | | Gruppe XIV | |
| | | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. | $\frac{0}{00}$ K. | $\frac{0}{00}$ M. |
| Ostasiatisches Expeditionskorps | 1900/01 | 20,1 | 18,8 | 12,9 | 12,1 | 139,6 | 130,9 | 67,2 | 63,0 | 187,0 | 175,4 | 2,7 | 2,5 | 8,3 | 7,8 |
| Ostasiatische Besatzungs-Brigade | 1901/02 | 20,0 | 16,7 | 12,0 | 10,0 | 131,4 | 109,8 | 51,3 | 42,8 | 171,1 | 142,9 | 8,0 | 6,7 | 25,5 | 21,3 |
| | 1902/03 | 21,1 | 21,8 | 12,6 | 13,0 | 88,4 | 91,2 | 46,9 | 48,4 | 191,4 | 197,5 | — | — | 10,9 | 11,2 |

Zugang in den einzelnen Krankheitsgruppen nach $\frac{0}{00}$ K. $\frac{0}{00}$ M.



B. Die wichtigeren im Berichtsjahre 1902/03 zur Ausführung gelangten sanitären Maßnahmen.

1. Die Unterkunftsverhältnisse der Truppen.

Im Berichtsjahr galt es hauptsächlich, die in den Vorjahren geschaffenen Anlagen zu verbessern, Neuschaffungen waren nur nötig in der im Sommer 1902 besetzten und gelegentlich der Räumung von Shanghai stark vermehrten Garnison Syfang, wo durch Aufstellung mehrerer Schmidtscher Baracken der erforderliche Unterkunftsraum geschaffen wurde. In den übrigen Garnisonen blieb die Kopfstärke während des Jahres fast die gleiche, so daß die vorgenommenen Erweiterungen der Unterkunft nicht die Ergebnisse numerischer Verschiebungen, sondern lediglich hygienische Verbesserungen darstellen.

Vollständige Unterbringung in massiven Gebäuden europäischer Bauart gelangte im Berichtsjahr in Peking zur Durchführung.

In Tientsin, Tangku, Tsinhwangtau und Syfang dienten derartige Gebäude der Unterbringung eines Teiles der betreffenden Garnisonen.

Massive Gebäude chinesischer Bauart fanden Verwendung zur Unterkunft in Yangtsun (ehemaliges Leihhaus) und in Shanhaikwan (Tempelanlagen).

Unter den verschiedenen Arten von Baracken kamen im Berichtsjahr, soweit es die Truppenunterkunft angeht, fast nur noch Schmidtsche Baracken in Anwendung.

Die Schmidtschen Mannschaftsbaracken haben sich im allgemeinen auch nach den Erfahrungen in diesem Berichtsjahr als brauchbar erwiesen (vergl. San. Bericht für 1901/02, S. 61/62). Sie gewähren im Winter bei sachgemäßer Heizung genügenden Schutz gegen Kälte; im Sommer ist die Anbringung eines horizontalen Mattenschutzdaches 2 m über dem Barackendach zur Abhaltung der sengenden Sonnenstrahlen erforderlich. Im Sommer wurde das Fehlen einer Firstventilation häufig störend empfunden. Unter dem Einfluß der Trockenheit in den Herbst- und Wintermonaten zeigt das zum Barackenbau verwendete Holz Neigung zu Schrumpfungen; die infolgedessen entstehenden Spalten und Risse gewähren dem Wind und Staub vielfach freien Eintritt und nötigen zu fortwährenden Reparaturen. Als ein Nachteil der Baracke muß ihre Feuergefährlichkeit angesehen werden.

Die anderen Arten von Baracken (Kiautschou-, Wellblech-, Döckersche Baracken, Stirnräume von Stallbaracken) haben als Unterkunft von Mannschaften im Berichtsjahr nur gelegentlich und provisorisch gedient.

2. Abfuhrwesen und Wasserversorgung.

Bezüglich der Einrichtung von Latrinen und der Müllabfuhr kann auf das im letzten Sanitätsbericht S. 62 Gesagte verwiesen werden.

Die Entwässerung der Lager geht in allen Garnisonen, mit Ausnahme von Syfang, ohne Schwierigkeit vor sich. In Syfang förderten plötzlich einsetzende

Regengüsse oft enorme Wassermassen zu Tal, die in den vorhandenen Abflusrrinnen keinen Platz fanden und dann die auf zu niedrigem Sockel in den Bergeshang hinein gebauten Baracken überschwemmen.

In der Wasserversorgung ist gegenüber dem Vorjahre neu hinzugetreten die Zentralanlage der Garnison Syfang, die zur Versorgung mit abgekochtem Wasser eingerichtet ist.

Die Eisversorgung der Garnisonen geschieht mit Flußeis, das in Eisgruben chinesischer Konstruktion gelagert wird. Die im Feldlazarett Tientsin aufgestellte, vom Ostasiatischen Expeditionskorps beschaffte Eismaschine, deren keimfreies, aus destilliertem Wasser hergestelltes Eis die Gefahr der Infektion durch Eis ausschließt, hat leider meistens ihre Dienste versagt, weil das zur Kühlung verwendete Flußwasser im Sommer zu warm ist.

3. Lazarettanlagen, Revierkrankenstuben, Erholungsstationen.

Lazarette bestanden im Berichtsjahr in folgenden Garnisonen: Peking, Tientsin, Shanhaikwan, Shanghai und Syfang.

Die Garnisonen Langfang, Yangtsun, Tangku besaßen Revierkrankenstuben, deren Umfang und Einrichtung gegenüber dem Vorjahre keine Veränderungen erfahren hat. Sie waren derart ausgestattet, daß sie auch mehreren nicht transportfähigen Kranken Unterkunft gewähren konnten. Der Lazarettpflege Bedürftige wurden von Langfang aus in das Lazarett Peking, von Yangtsun und Tangku aus in das Feldlazarett Tientsin übergeführt.

Der Neubau des massiven Lazaretts zu Peking für die Gesandtschaftsschutzwache, das sich ungefähr auf dem Platze der jetzigen Anlage erheben wird und für welches im Etat 1903/04 150 000 Mark als erste Baurate eingestellt waren, ist im Berichtsjahr im Entwurf bearbeitet worden.

Als im September 1903 Pest in der Provinz Tschili auftrat, wurden 2 auf dem Lazarettgelände stehende Döckersche Baracken nach dem deutschen Glazis am Hatamen verlegt, um der ersten Unterbringung etwaiger Pestkranker der Garnison Peking zu dienen.

In den Monaten Juni bis September 1903 bezogen die in Peking garnisonierenden 2 Kompagnien abwechselnd Sommerquartier in dem in den westlichen Hügeln 40 km von Peking entfernt gelegenen Tempel Tie-tai-tze.

Die Anlage des Feldlazaretts und des Isolier-Lazaretts zu Tientsin hat keine Abänderungen erfahren. Krankenaufnahme war schon seit dem 1. 9. 1902 nur noch durch das Feldlazarett No. 1 erfolgt, während die Verwaltung der Depots und Laboratorien in den Händen von Feldlazarett No. 2 lag. Beim Abtransport des Feldlazaretts No. 2 Ende Dezember 1902 wurden Depots und Laboratorien dem Feldlazarett No. 1, nunmehr „Ostasiatisches Feldlazarett“ genannt, übergeben.

Das Lazarett Shanhaikwan (43 Lagerstellen) ist im Berichtsjahr unverändert geblieben.

Im Lazarett Shanhaikwan ist seit November 1902 die Erholungsstation Shanhaikwan eingerichtet mit

der Bestimmung, während des ganzen Jahres Rekonvaleszenten aus den Garnisonen der Provinz Tschili aufzunehmen. Im Berichtsjahr wurden im ganzen 61 Rekonvaleszenten bis zur völligen Wiederherstellung dort behandelt.

In dem Mannschaftsquartier Shanhaikwan, das bis zum Oktober 1902 zur Unterbringung von 2 Kompagnien und einem Bataillonsstab, seitdem jedoch nur noch zur Unterbringung einer Kompagnie diente, fand sich reichlich Platz, zahlreichen Mannschaften während eines sogenannten „Erholungskommandos“ Unterkunft zu gewähren. Vom 1. 7. bis 30. 9. 1903 wurden Kommandos von je 80 Mann auf je 3 Wochen zur Erholung nach Shanhaikwan gesandt, so daß ein großer Teil der Garnisonen Langfang, Yangtsun, Tientsin, Tangku dieser Wohltat teilhaftig werden konnte.

Das Lazarett Shanghai erfuhr im November 1902 mit Beendigung des Baues der Leichenbaracke seine Fertigstellung. Als in der zweiten Hälfte Dezember 1902 die Garnison Shanghai nach Übereinkunft der Mächte von den Kontingenten geräumt wurde, wurde das Lazarett Shanghai am 31. 12. 1902 nach neunmonatiger Tätigkeit geschlossen. Drei nicht transportfähige Kranke wurden dem Generalhospital Shanghai überwiesen, die übrigen wurden den Heimtransporten angeschlossen. Bei der Schließung wurde es der Auflösungskommission Shanghai übergeben. Die Baracken gelangten zum Verkauf, ebenso das Inventar, mit Ausnahme einer vollständigen Einrichtung von 40 Betten, der Einrichtung des Operationsaales, der Apotheke, des Röntgenapparates und des Laboratoriums, die dem Lazarett Syfang überwiesen wurden.

In Syfang fand sich eine doppelwandige Holzbaracke, die schon dem früher dort garnisonierenden Seebataillon als Revierbaracke gedient hatte. Sie gab den Kern der neuen Lazaretanlage, die aus dieser Baracke, einer neu zu errichtenden Schmidtschen Lazarettwirtschaftsbaracke sowie einer 20 männigen Schmidtschen Lazarettbaracke bestehend, mit 34 Lagerstellen den Bedürfnissen der rund 380 Köpfe starken neuen Garnison genügte. Das Lazarett Syfang wurde am 4. 2. 1903 eröffnet. Bis zu diesem Zeitpunkt waren der Lazarettpflege Bedürftige dem Gouvernementslazarett Tsingtau überwiesen worden. Bei Auflösung der Garnison Shanghai erhielt die Besatzung von Syfang Anfang Januar 1903 eine Vermehrung auf rund 650 Köpfe; eine Erweiterung des Lazaretts wurde notwendig. Es wurde zu diesem Zweck die Aufstellung einer 30 männigen, einer 20 männigen und einer 2. Schmidtschen Wirtschaftsbaracke sowie einer Wellblechbaracke und eines Leichenhauses in die Wege geleitet. Das Lazarett Syfang zählte Ende September 1903 64 Lagerstellen.

In Peitaiho blieben Kranke des Wachtkommandos im Mannschaftsquartier unter Pflege des dem Wachtkommando zugewiesenen Sanitätsunteroffiziers; der Lazarettpflege Bedürftige wurden nach Shanhaikwan übergeführt.

Die während des Sommers 1902 in Peitaiho eröffnete Erholungsstation (vergl. den Sanitätsbericht 1901/02)

wurde Ende Oktober 1902 geschlossen und mit dem Barackenlager Peitaiho abgebrochen.

Im Sommer 1903 dienten 2 stehengebliebene Kiautschou-Baracken der Unterbringung erholungsbedürftiger und beurlaubter Offiziere.

4. Einrichtung einer Wutschutzstation beim Feldlazarett Tientsin.

Die von tollen oder tollwutverdächtigen Hunden gebissenen Angehörigen der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade waren bis Anfang 1903 nach Shanghai in das dortige städtische Pasteur-Institut geschickt worden. Nach Räumung dieser Garnison wurde eine eigene Wutschutzstation beim Feldlazarett Tientsin eingerichtet.

O.-A. Eckert vom Ostasiatischen Feldlazarett, der die Wutschutzstation übernehmen sollte, machte sich vorher während eines Kommandos an das kaiserlich japanische Institut für Infektionskrankheiten in Tokio, bei dessen Direktor (Kitasato) und seinen Assistenten (Kitashima und Saito) er weitgehendstes Entgegenkommen fand, mit der Ausführung der immunisierenden Impfungen sowie gleichzeitig mit Gewinnung tierischer Lymphe zur Schutzpockenimpfung vertraut. Alle erforderlichen Geräte wurden aus Tokio bezogen und im Juli 1903 wurde der Betrieb der Wutschutzstation eröffnet.

Anfänglich wurde die von Oshida im Zentralblatt für Bakteriologie 1901 Band 29 beschriebene Methode der Kaninchenimpfungen geübt. Die Spitze der Kanüle wird vom unteren Augenhöhlenrande zwischen medianer Wand und Bulbus in der Richtung nach dem foramen opticum vorgeschoben. Hier durchbohrt sie die Scheide des Sehnerven und die Injektionsflüssigkeit gelangt so unter die dura mater. Aus äußeren Gründen — die vorrätigen Kanülen der Pravazschen Spritzen waren für die hiesigen Kaninchen zu groß und setzten deshalb leicht tödliche Hirnverletzungen — wurde später zur subduralen Impfung mittels Trepanation übergegangen, wie dies im Berliner Institut für Infektionskrankheiten geschieht; durch den Vorstand der dortigen Wutschutzabteilung St.-A. Dr. Schüder gelangte die Station in Besitz der in Berlin gebrauchten Meyerschen Spritzen mit gebogener Kanüle und einer Beschreibung der dort geübten Methoden der Lymphgewinnung und Impfung.

Während der Berichtszeit bot sich nur einmal Gelegenheit zur Ausführung einer Immunisierungskur bei einem Kanonier der Ostasiatischen fahrenden Batterie. Die Bißwunden bestanden in leichten Hautabschürfungen am rechten Daumen und in der linken Hohlhand. Die Injektionen blieben alle völlig reaktionslos — das getrocknete Mark wird stets zuvor auf Sterilität geprüft —, Schmerzen, Unbehagen, Fieber wurde nicht beobachtet. Der Mann ist gesund geblieben.

Da die Tierställe des bakteriologischen Laboratoriums für die Zwecke der Wutschutzstation nicht ausreichten und die im Laboratorium so häufig vorzunehmenden Arbeiten mit infektiösem Material, z. B. Ruhr, Typhus, Rotz, Cholera eine räumliche Trennung beider Institute notwendig machten, so wurde ein kleines massives Gebäude mit 3 Räumen, nämlich Stall für verdächtige Hunde, Stall für geimpfte und ungeimpfte Kaninchen und Präparierzimmer zur Gewinnung der Vaccine errichtet, das am 15. 1. 1904 fertiggestellt und seiner Bestimmung übergeben wurde.

C. Berichterstattung über die einzelnen Gruppen der Lazarett- und Revierkranken im besonderen.

Nur die Berichtswertes enthaltenden Krankheitsnummern haben Erwähnung gefunden. Bezüglich des Zugangs bei den Krankheitsnummern, die nicht besonders aufgeführt sind, wird auf Tabelle II des II. Teils hingewiesen.

I. Gruppe: Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen. (No. 1 bis 16 des Rapportmusters.)


| J a h r | Z u g a n g | | |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 2272 | 123,7 | 116,0 |
| 1901/02 | 983 | 207,4 | 173,2 |
| 1902/03 | 455 | 154,7 | 159,6 |

Der Zugang hat sich gegen das Vorjahr um 52,7 ‰ K. verringert; die Verringerung hat hauptsächlich bei den Infektionskrankheiten Ruhr, Typhus und Malaria stattgefunden.

Von den Behandelten starben 7 Mann.

Die Gruppe steht nach wie vor im Vordergrund des Interesses, denn die in ihr enthaltenen Infektionskrankheiten bedrohen noch immer Gesundheit und Schlagfertigkeit der Truppen in China. Dafs die Aufgabe der Seuchenbekämpfung weiter gefördert worden ist, beweist die Abnahme um 52,7 ‰ K. im Zugang dieser Gruppe. Auch die folgende Kurventafel veranschaulicht, dafs der Kampf gegen die Infektionskrankheiten auch in den hygienisch ungünstigsten Monaten des Jahres mit Erfolg geführt worden ist.

Zugang nach Monaten in absoluten Zahlen und in ‰ K.



1) Ostasiatisches Expeditionskorps.

Erste Unterart: Infektionskrankheiten.

(No. 1 bis 10 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 1705 | 92,9 | 87,1 |
| 1901/02 | 894 | 188,6 | 157,6 |
| 1902/03 | 333 | 113,2 | 116,8 |

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 121 | 47 | 11 | 11 | 7 | 13 | 9 | 16 | 18 | 29 | 22 | 29 |
| ‰ K. | 34,3 | 13,5 | 3,2 | 4,0 | 2,5 | 4,7 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 10,7 | 8,2 | 9,7 |

5 Behandelte starben.

Der Rückgang der Erkrankungsziffer ist der systematisch fortschreitenden Verbesserung der hygienischen Verhältnisse und der Räumung der Garnison Shanghai, deren hoher Krankenzugang, besonders an Ruhr und Malaria, während der Sommermonate dauernd eine starke Belastung der Krankenzahlen bildete, zu verdanken.

1. Echte und modifizierte Pocken. (No. 1 des Rapportmusters.)

Es kam kein Fall von Pocken in Zugang, obwohl, einer schon in den Vorjahren gemachten Beobachtung entsprechend, im Frühjahr 1903 in fast allen Garnisonen der Brigade wiederum ein stärkeres Auftreten von Pocken unter den Chinesen sich bemerkbar machte. Im Januar 1903 wurde allgemein angeordnet, daß mit allen innerhalb der letzten 2 Jahre nicht mit Erfolg geimpften Angehörigen der Brigade eine Wiederimpfung vorzunehmen sei. Zur Impfung wurde japanische, vom Institut für Infektionskrankheiten in Tokio bezogene Lymphe benutzt, welche vor der Ausgabe im Laboratorium des Feldlazarets Tientsin auf ihre Wirksamkeit geprüft worden war.

2. Unterleibstypus und Typhoid. (No. 4 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|-----------------------|-------------|------|------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 564 | 30,7 | 28,8 |
| 1901/02 | 97 | 20,5 | 17,1 |
| 1902/03 | 41 | 13,9 | 14,4 |

1) Ostasiatisches Expeditionskorps.

Von den Behandelten (52; 11 waren im Bestande, 41 kamen in Zugang) wurden 38 dienstfähig, 2 starben und 3 gingen anderweitig ab.

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 12 | 6 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | 5 | 5 | 7 |
| ‰ K. | 3,4 | 1,7 | — | 0,72 | 0,36 | 0,36 | — | — | 0,74 | 1,9 | 1,9 | 2,4 |

Ein Vergleich des monatlichen Zuganges an Typhus im Berichtsjahre 1902/03 und 1901/02 bestätigt die schon früher gemachte Erfahrung, daß der Typhus hier in den Monaten September, Oktober und November am heftigsten aufzutreten pflegt, daß er im Frühjahr allmählich verschwindet (im Berichtsjahre 1903 waren zum ersten Male seit dem Bestehen der Brigade 3 Monate ohne Zugang an Typhus), und daß er in den späteren Sommermonaten wieder ansteigt.

Eine kleine Epidemie kam nur in Yangtsun zur Beobachtung (10 Fälle, davon 3 im September 1902, 7 im Oktober/November 1902); die übrigen Fälle verteilen sich in größeren Zwischenräumen auf die anderen Garnisonen; ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen liefs sich nicht nachweisen. In Yangtsun bildete wahrscheinlich das destillierte Wasser des dortigen Dampf-Destillations-Apparates die Infektionsquelle. Das Destillat zeigte sich nicht steril; bei einer daraufhin vorgenommenen Untersuchung des Apparates fand sich, daß das Kühlwasser durch ein kleines Loch in der Kühlschlange mit dem destillierten Wasser in Verbindung stand.

Zugang an Unterleibstypus nach Garnisonen.

| G a r n i s o n | Absolute Zahl | ‰ K. |
|------------------------------|---------------|------|
| Yangtsun | 9 | 68,2 |
| Tientsin | 21 | 17,8 |
| Shanghai | 3 | 13,6 |
| Peking | 3 | 9,6 |
| Shanhaikwan und Tsinhwangtau | 1 | 8,1 |
| Tangku | 1 | 7,4 |
| Syfang | 3 | 5,1 |
| Langfang | — | — |

In Tientsin bildet die Nähe des als verseucht zu betrachtenden Peiho immer noch die Quelle für eine große Anzahl von Infektionsmöglichkeiten; gleichwohl haben sich hier wie in allen anderen Garnisonen die Zugangsziffern gegen das Vorjahr erheblich vermindert. Der größte Teil der an Typhus Erkrankten bestand aus Leuten, die in ihrer dienstlichen Tätigkeit bei der Pferdepflege, beim Geschütz-

und Fahrzeugwaschen, bei der Küchenarbeit usw. mit un- abgekochtem Wasser häufig in Berührung kamen. Nach- dem seit Mitte 1902 die Benutzung nur von abgekochtem Wasser zu Genuß- und Gebrauchszwecken in allen Gar- nisonen durchgeführt war, ist nunmehr auch versucht worden, jede Ansteckung bei der Pferdepflege usw. durch Neuanlage von Brunnen, zweckmäßige Abdeckung derselben und Aufstellung von Waschegelegenheiten mit abgekochtem Wasser bei den Pferdeställen und Schuppen nach Möglich- keit auszuschließen. In 2 Fällen scheint die Infektion beim Putzen von Gemüse erfolgt zu sein; letzteres wird von den Chinesen, um ein frisches Aussehen zu zeigen, vor dem Verkauf mit Flußwasser besprengt.

Vom Krankenpflegepersonal erkrankte ein Sanitäts- unteroffizier.

Von besonderen Komplikationen sind ein Fall von eitriger Bauchfellentzündung infolge Durchbruches eines Typhusgeschwürs (1,9 % der Behandelten) und 2 Fälle von Leberabszefs nach Typhus (= 3,8 % der Behandelten) zu erwähnen. Der Leberabszefs trat in einem Falle im Ver- laufe eines sehr schweren Typhus auf, in dem anderen Falle folgte er dem abgelaufenen mittelschweren Typhus um einen Monat später. Beide Fälle (Shanghai) wurden mit Erfolg operiert; sie kamen tropendienstunfähig in Ab- gang. Der Abszefseiter war steril.

Die Typhusbehandlung bestand in lauen Bädern, die bei drohender Herzschwäche durch kühle Einpackungen ersetzt wurden. Bei hartnäckigem hohen Fieber wurde gelegentlich auch Chinin in Dosen von 2,0 g täglich 2 und 3 Stunden vor dem zu erwartenden Temperaturmaximum gereicht. Bei hohem Fieber und Herzschwäche bewährte sich wie früher die nach Bedarf wiederholte Injektion von 750 ccm physiologischer Kochsalzlösung.

Bei allen Fällen, die von vornherein sich wegen Be- nommenheit, hohen Fiebers und schlechten Pulses als schwere kennzeichneten, wurde frühzeitig Digitalis in schwachem Infus (0,5:200,0) gegeben. Im allgemeinen wurde von der Darreichung größerer Alkoholdosen ab- gesehen.

Von den 52 an Typhus Behandelten starben nur 2 = 3,8 % der Behandelten (im Vorjahr 12,4 %). Der Tod war in einem Falle durch Herzlähmung, im anderen Falle durch eitrige Bauchfellentzündung bedingt.

3. **Malariaerkrankheiten.** (No. 6 des Rapport- musters.)

Der Zugang betrug 172 Fälle = 58,5 % K. Er ist gegen das Vorjahr um 61,1 % K. zurückgegangen.

Die Gründe für diesen auffälligen Rückgang sind in erster Linie in der im Dezember 1902 erfolgten Auflösung der Garnison Shanghai zu suchen, auf die nach dem letzten Sanitätsbericht fast $\frac{1}{3}$ aller Malariaerkrankungen entfiel, und weiterhin in der systematischen Durchführung der Bekämpfung der Malaria im Sommer 1903.

Auf die einzelnen Monate verteilt sich der Zugang folgendermaßen:

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. . | 67 | 26 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 |
| % K. . | 19,0 | 7,5 | 2,3 | 1,4 | 1,1 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 3,7 | 4,4 | 3,3 | 1,7 |

Der Zugang war demnach am größten im Oktober und demnächst im November 1902, d. h. zu einer Zeit, als noch die Malariaepidemie in Shanghai herrschte; während der kalten Monate sank der Zugang, um mit Beginn wärmerer Temperaturen wieder ein wenig zu steigen; im August und September 1903 zeigte er, trotz des verhältnis- mäßig regenreichen Sommers, sogar ein Absinken.

Zugang nach Garnisonen.

| Garnison | Absolute Zahl | % K. |
|--|---------------|-------|
| Shanghai | 56 | 253,4 |
| Yangtsun | 15 | 113,6 |
| Syfang | 28 | 47,8 |
| Tientsin | 55 | 47,0 |
| Shanhaikwan und Tsinhwangtau | 4 | 32,5 |
| Langfang | 4 | 31,0 |
| Peking | 9 | 29,0 |
| Tangku | 1 | 7,3 |

Von den verschiedenen Malariaformen wurde am häufigsten Tertianaria, oft als Tertianaria duplex, beobachtet. Tropicaria kam 6 mal (= 3,5 % des Zugangs an Malaria) in Shanghai vor; bei den Truppen in der Provinz Tschili und in Syfang ist sie bis jetzt noch nicht gefunden worden. Quartana ist niemals beobachtet.

Von besonderen Fällen sind folgende anzuführen:

Einen auffallend schweren Verlauf nahm eine Tertianaria in Peking. Die durch die gewöhnlichen Chinindosen nur wenig zu beeinflussende Erkrankung war mit Blutungen in die Haut, die Schleimhäute und das Nierenbecken kompliziert. Der Erkrankte ging tropendienstunfähig ab.

Über einen tödlich verlaufenen Fall von Gallensteinikterus nach Malaria s. unter Erkrankungen der Leber.

In 4 Fällen wurde durch eine an überstandene Malaria sich anschließende Blutarmut Tropendienstunfähigkeit bedingt, alle übrigen Fälle kamen zur Heilung.

1 Fall (Shanghai) zeichnete sich dadurch aus, daß durch den Fieberanfall jedesmal epileptiforme Krämpfe ausgelöst wurden; nach Darreichung von Chinin und nach Schwinden des Fiebers blieben auch die Krämpfe aus (St.-A. Krulle).

Über die Rückfälle ist in diesem Jahr eine besondere Statistik geführt. Unter 172 Zugängen waren 76 Rück- fälle (= 44,2 %) bereits durchgemachter Erkrankungen. Die Behandlung bestand in Chinindarreichung nach den von R. Koch aufgestellten Grundsätzen, und zwar hat sich die Verabfolgung von Chinin, mur. pulver. in Oblaten nach wie vor als die einzig zweckmäßige herausgestellt. Chinin-

tabletten sind oft unzuverlässig, weil sie leicht unverdaut abgehen.

Sobald die Diagnose „Malaria“ durch den gelungenen Parasitennachweis im Blut sichergestellt war, wurden folgende Chinindosen verabreicht:

a) bei Tertiana: Am ersten Tag morgens 6 Uhr und 7 Uhr je 1 g, am zweiten und dritten Tage je 1 g, 3 Tage Pause, dann 2 Tage hintereinander je 1 g, dann 3 monatige Nachbehandlung jeden 9. und 10. oder jeden 10. und 11. Tag je 1 g.

b) bei Tropica: wie bei Tertiana, nur wurden auch am 2. Tag 2 g gegeben; die Nachbehandlung wurde auf 4 Monate ausgedehnt. Veranlassung zu letzterer Maßregel gab folgender Fall: Ein Mann der Garnison Shanghai kam mit Tertiana in Zugang. Behandlung und Nachbehandlung wurden systematisch durchgeführt, nach Ablauf der Nachbehandlung wurde er mit Tropica rückfällig. Es wurde angenommen, daß seinerzeit eine Mischinfektion vorgelegen hatte und daß die 3 monatige Nachbehandlung nicht ausreichend gewesen war, um Rückfälle der Tropica zu verhindern (St.-A. Krulle).

Mit der fortschreitenden Besserung der Quartiere hat auch der Schutz vor Moskitos mehr und mehr sich vervollkommen können. Für die Anbringung der Moskitonetze über den Betten, Anbringung von Drahtgittern an Fenstern und Türen sind jetzt zweckmäßige Methoden ermittelt und durchgeführt. Freilich wird der Schutz vor Moskitos aus militärischen Gründen sich nicht auf alle Zweige des Dienstes ausdehnen lassen, so werden z. B. die Wachmannschaften den Moskitostichen und somit der Malariainfektion auch in Zukunft stets ausgesetzt sein. Die prophylaktische Darreichung von Chinin erfolgte bei allen Truppenteilen von Anfang August bis Mitte Oktober (Flugzeit des Anopheles in Nordchina).

Bei den in Tientsin stehenden Teilen des 1. Ostasiatischen Infanterie-Regiments (St.-A. Krulle) wurde folgender Weg zur Verhütung der Malaria eingeschlagen: Im Anfang Mai, zur Zeit der zu erwartenden Rückfälle, wurden sämtliche Mannschaften (etwa 300 Mann) auf Malariaparasiten untersucht, um die Träger latenter Malaria auszusondern und in Behandlung nehmen zu können. Von den Untersuchten hatte nur einer Parasiten. Ebenso wurden die mit dem Herbstablösungstransport Anfang September in Tientsin eingetroffenen, dem 1. Ostasiatischen Infanterie-Regiment zugeteilten Mannschaften (136 Mann) auf Parasiten untersucht. Im übrigen ging die Prophylaxe in der schon beschriebenen Weise vor sich.

Von den genannten Truppenteilen erkrankten an Malaria 13 = 40,7 $\frac{0}{0}$ K. (Malariazugang in Tientsin = 47,0 $\frac{0}{0}$ K.), unter denen sich 7 Rückfälle = 53,8 $\frac{0}{0}$ (Maliarückfälle in Tientsin = 47,3 $\frac{0}{0}$) befanden.

Ein Fortschritt gegen das Vorjahr ist unverkennbar, wie schon die eingangs erwähnten Zahlen zeigten; er kommt am deutlichsten zum Ausdruck, wenn man die Malariazüge der Heimtransporte 1901/02 und 1902/03 vergleicht, worüber Tabelle VIII im II. Teil Aufschluß gibt.

4. Ruhr. (No. 7 des Rapportmusters.)

Von 180 Behandelten (63 waren Bestand, 117 kamen in Zugang) wurden dienstfähig 114, 3 starben und anderweitig gingen ab 42.

| | Z u g a n g | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| | absol. | $\frac{0}{0}$ K. | $\frac{0}{0}$ M. |
| Ostasiatisches Expeditionskorps 1900/01 | 1028 | 56,0 | 52,5 |
| Ostasiatische Besatzungs-Brigade 1901/02 | 212 | 44,7 | 37,4 |
| Ostasiatische Besatzungs-Brigade 1902/03 | 117 | 39,8 | 41,1 |

Unter den Infektionskrankheiten hat Ruhr nächst Malaria den größten Zugang aufzuweisen. Der Zugang hat sich gegen das Vorjahr um 4,9 $\frac{0}{0}$ K. verringert, eine größere Besserung im Auftreten der Ruhr liegt jedoch darin, daß, abgesehen von einer im Sommer 1902 in Shanghai entstandenen und noch in die Monate Oktober und November 1902 hinübergreifende Epidemie, anderweitige Ruhrepidemien nicht beobachtet worden sind.

Auf die einzelnen Monate verteilt sich der Zugang folgendermaßen:

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 41 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 17 |
| $\frac{0}{0}$ K. | 11,6 | 3,7 | 0,87 | 1,8 | 1,1 | 0,73 | 0,73 | 1,8 | 2,2 | 4,4 | 3,0 | 5,7 |

Der Höhepunkt des Zuganges liegt im Oktober 1902 (Epidemie in Shanghai); er sinkt im November und hält sich während der kalten Monate Dezember, Januar, Februar, März und April auf ungefähr gleicher Höhe. Mit Eintritt wärmerer Witterung (Mai) beginnt er wieder anzusteigen, im August zeigt sich eine schon im Vorjahr beobachtete auffällige Abnahme. Im September wird, wie im Vorjahr, ein nochmaliges Ansteigen der Ruhrerkrankungen beobachtet.

Die folgende Tabelle ergibt, wie die einzelnen Garnisonen am Ruhrzugang beteiligt sind.

| Garnison | Absolute Zahl | $\frac{0}{0}$ K. |
|--|---------------|------------------|
| Tangku | 17 | 125,0 |
| Shanghai | 23 | 104,1 |
| Yangtsun | 12 | 90,9 |
| Tientsin | 46 | 39,3 |
| Syfang | 13 | 22,2 |
| Langfang | 2 | 15,5 |
| Peking | 3 | 9,6 |
| Shanhaikwan und Tsinhwangtau | 1 | 8,1 |

Abgesehen von Shanghai stehen Tangku und Yangtsun am ungünstigsten. Die einzelnen Zugänge erfolgten indessen in wochenlangen Interwallen ohne Zusammenhang. Die übrigen Zahlen haben sich gegen das Vorjahr erheblich gebessert.

Über die Verbreitungsweise der Ruhr und die Vorbeugungsmaßnahmen sind neue Erfahrungen nicht berichtet.

Die Ruhrfälle zeigten meist gleichen Charakter, sie verliefen in der Mehrzahl mittelschwer, doch ist die Anzahl der leicht verlaufenden Fälle gegen früher im Steigen. Schwerere Fälle mit 30 bis 40 Entleerungen täglich kamen nur ganz vereinzelt zur Beobachtung; nur in einem Falle starb der Erkrankte an unkomplizierter Ruhr am 5. Krankheitstage infolge von Erschöpfung. Die Neigung zu Rückfällen und chronischem Verlauf tritt noch ebenso deutlich hervor wie in den letzten Jahren; unter 117 Zugängen befanden sich 16 (= 13,7 %) Rückfälle. Besonders im Anschluß an diese letzteren trotzte oft ein hartnäckiger Dickdarmkatarrh allen Heilmitteln, um schliesslich meist zur Tropendienstunfähigkeit zu führen.

Von wichtigen Mitkrankheiten wurde 3 mal Leberentzündung und 7 mal Leberabszess beobachtet = 5,5 % der Behandelten. Zur Stellung der Diagnose des Leberabszesses hat sich die Zählung der weissen Blutkörperchen und die Feststellung der Leukocytose als wichtiges Unterstützungsmittel erwiesen.

Die Behandlung spielte sich im wesentlichen nach den von St.-A. Kramm seinerzeit aufgestellten Grundsätzen ab, d. h. der Schwerpunkt der medikamentösen Behandlung ruhte in der direkten Einwirkung auf die erkrankte Darm-schleimhaut und in der diätetischen Behandlung.

Meist wurde folgendermassen verfahren: Am 1. Behandlungstag ein Einlauf Sol. arg. nitr. 1,0:750,0; Calomel 0,1 viermal täglich, solange als Blut im Stuhl; am 3. Tag Ol. Ricini zur Beseitigung des Calomels. Sobald das Blut geschwunden war, also meist am 3. bis 5. Tage, Einlauf Acid. tannic. 15,0:750 + 30,0 Amyl. tritic. mit Darmrohr, für die Zukunft 5 mal wöchentlich; besonders bei chronischen Zuständen ganz unentbehrlich. Von inneren Mitteln haben sich nach wie vor bewährt in den ersten Tagen Inf. Ipecac. deemet., in den späteren Stadien Decoct. cort. Simarub. auch Tannigen und Tannalbin. Zur Ernährung dienten in den ersten Tagen Reisswasser, Glühwein, später Milch, Haferschleim, Kakao, Bouillon, Eier, Milchreis, Kartoffelbrei, Hühnerfleisch. Bei Zuständen von Herzschwäche: subkut. Kochsalzinfusionen je 750 g. Bei Darmblutungen: mehrere Eisblasen auf den Leib.

Bei Leberentzündung: Natr. salicyl. in Lösung und ein-greifende Schwitzkur. Bei Verdacht auf Leberabszess: Leberpunktionen (event. bis 20 mal). Bei nachgewiesener Eiterbildung: zweizeitige Operation.

Von 7 operierten Fällen starben 2 = 28,6 % der Operierten und 1,1 % der an Ruhr Behandelten. In beiden Fällen führte multiple Abszessbildung durch Erschöpfung zum Tode. Der Abszesseiter erwies sich in allen Fällen als steril.

Im ganzen starben an Ruhr und Folgekrankheiten im Berichtsjahr 3 Mann, und zwar 1 an unkomplizierter Ruhr, 2 an Leberabszess nach Ruhr.

Tropendienstunfähigkeit war 50 mal (= 45,5 % des Abganges durch Tropendienstunfähigkeit) durch Ruhr und Folgekrankheiten bedingt.

Untersuchungen über den Ruhrerreger wurden im bakteriologischen Laboratorium Tientsin und im bakteriologischen Laboratorium Shanghai bis zur Schließung des dortigen Lazarets am 31. 12. 1902 angestellt.

Die gewonnenen Kulturen und zahlreiche Proben von Blutsera wurden dem hygienisch-chemischen Laboratorium

der Kaiser Wilhelms-Akademie in Berlin zur Nachprüfung übersandt.

5. *Asiatische Cholera.* (No. 8 des Rapportmusters.)

Am 1. 10. 1902 waren im Bestand 2 Kranke, beide gingen im Oktober 1902 dienstfähig ab. Zugänge an asiatischer Cholera sind im Berichtsjahr 1902/03 nicht erfolgt.

Die Cholera trat im Sommer 1903 in China wesentlich milder auf als 1902. Das erste Auftreten der Seuche wurde im August aus Amoy (Südchina) gemeldet, einige Tage später schon wurde die Cholera in Shanghai beobachtet, von dort wurde sie in der zweiten Hälfte dieses Monats durch chinesische Dschunken nach Peitang, einem kleinen Hafen 10 km nördlich von Taku, eingeschleppt; Ende August wurden einige Fälle unter der Bevölkerung der Chinesenstadt Tientsins bekannt; in den europäischen Niederlassungen Tientsins erkrankten 3 kurze Zeit vorher aus Shanghai zugereiste Personen. Die erste bakteriologische Feststellung der Seuche erfolgte durch deutsche Sanitätsoffiziere. Von den in Petschili stehenden Kontingenten der fremden Mächte erkrankten und starben ein italienischer und ein französischer Soldat an Cholera. Unter der chinesischen Bevölkerung der Provinz scheint die Seuche über Tientsin nach Westen und Norden nicht hinausgegangen zu sein.

Mit dem Bekanntwerden der ersten Cholerafälle in Tientsin wurde das Inkrafttreten der schon im Vorjahr angeordneten Abwehrmassregeln, mit Ausnahme der Lagersperre, befohlen. Ende September konnte die Seuche in Tientsin als erloschen betrachtet werden.

Zweite Unterart: Vergiftungen, einschliesslich tierische und alkoholische.

(No. 11 des Rapportmusters.)

In Zugang kamen 4 Fälle = 1,4 ‰ K., und zwar 3 Fälle von chronischem Alkoholismus und 1 Fall von Bifs durch einen tollwutverdächtigen Hund. Die Fälle von chronischem Alkoholismus gingen sämtlich als tropendienstunfähig ab.

Der durch den tollwutverdächtigen Hund Gebissene wurde in der Wutschutzstation des Feldlazarets behandelt und nach beendeter Kur als dienstfähig entlassen.

In einem anderen Fall von Bifs durch einen tollwutverdächtigen Hund, der sich, gleichfalls in Tientsin, vor Eröffnung unserer Wutschutzstation im Frühjahr 1903 ereignete, mußte der Gebissene dem Pasteur-Institut Shanghai zur Immunisierung überwiesen werden. Der verdächtige Hund war wie auch in dem vorigen Falle, nach dem Bifs entlaufen. Der Gebissene hat in den Rapporten keine Aufnahme gefunden, weil er nicht als krank geführt wurde.

Dritte Unterart: Gelenkrheumatismus.

(No. 12 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|-----------------------------|-------------|------|------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ . . . | 183 | 10,0 | 9,3 |
| 1901/02 . . . | 35 | 7,4 | 6,2 |
| 1902/03 . . . | 11 | 3,7 | 3,9 |

Der Zugang ist gegen das Vorjahr um 50 ‰ zurückgegangen.

¹⁾ Ostasiatisches Expeditionskorps.

Die geringe Zahl der Zugänge, namentlich im Vergleich zur Heimatsarmee, erklärt sich aus den klimatischen Verhältnissen Nordchinas.

Erwähnt sei folgender Fall, der zu einer Gelenkauslösung führte.

Ein Sergeant kam Ende März 1903 in Zugang mit Rheumatismus verschiedener Gelenke, der einen sehr hartnäckigen Verlauf zeigte. Während die zuerst befallenen (Schulter-) Gelenke allmählich die normale Bewegungsfähigkeit wieder erlangten, blieb das linke Kniegelenk dauernd verdickt und bewegungsunfähig. Es wurde infolgedessen Mitte Juli die Aussägung des zerstörten Gelenkes (O.-St.-A. Albers) vorgenommen. Vereinigung durch Silberdraht, Watsonsche Schiene. Glatte Wundverlauf. Ende August Gipsverband. Mitte September dienstunfähig dem Heimtransport angeschlossen.

Fünfte Unterart: Hitzschlag und Sonnenstich.

(No. 14 des Rapportmusters.)

In Zugang kamen 2 Fälle (= 0,68 ‰ K.) von Hitzschlag, davon einer im Mai in Tientsin, der andere im Juli in Shanhaikwan; der erstere war leichter Art, der Erkrankte wurde dienstfähig; der zweite endete tödlich.

Der letztere Fall ist bemerkenswert:

Ein Gefreiter der Garnison Tientsin, der sich beim Erholungskommando in Shanhaikwan befand, stürzte bei der Rückkehr von einem unter Führung eines Offiziers freiwillig ohne Gewehr und Gepäck unternommenen Spaziergang in die Berge plötzlich bewußtlos zusammen und starb, trotzdem ärztliche Hilfe sofort zur Stelle war, nach 3 Stunden an Hitzschlag. Bei der Leichenöffnung fanden sich verkalkte Tuberkel in der rechten Lunge und pleuritische Verwachsungen dieser Lunge; Leber und Milz waren vergrößert. Der Gestorbene war 10 Monate vorher „zur Beobachtung auf Asthma“ 11 Tage lang in Lazarettbehandlung gewesen, ohne dafs damals besondere Krankheitserscheinungen festgestellt worden waren, doch hatte er, wie Kameraden bezeugten, gelegentlich nachts über Atemnot geklagt.

Sechste Unterart: Andere allgemeine Erkrankungen, wie Karbunkel, Grippe, Zuckerruhr, Skrofulose, Blutarmut, Leukämie, Bluterkrankheit.

(No. 15 des Rapportmusters.)

Der Zugang betrug 102 Fälle = 34,7 ‰ K. und ist gegen das Vorjahr (33 Fälle = 7,0 ‰ K.) um 27,7 ‰ K. gestiegen, was hauptsächlich dem stärkeren Auftreten der Grippe zuzuschreiben ist.

Unter den Zugängen befanden sich 1 Fall von Karbunkel (Milzbrand), 100 Fälle von Grippe und 1 Fall von Blutarmut.

Die Karbunkel- (Milzbrand-) Erkrankung verlief folgendermaßen: Zahlmeisteraspirant Sch. ging am 28. 12. 1902 dem Feldlazarett Tientsin zu, weil im Anschluß an einen schon 7 Tage bestehenden kleinen Furunkel der rechten Halsseite sich plötzlich eine starke ödematöse Schwellung des Halses und der anschließenden Brustpartien gebildet hatte. Ausgedehnte Einschnitte bis auf die sulzig verfärbten Muskelfaszien; in der Ödemflüssigkeit wurden mikroskopisch und durch Tierversuch Milzbrandbazillen nachgewiesen. Tod am 30. 12. 1902 infolge Übergreifens der Phlegmone auf das Mediastinum anticum (gallertartige Verdickung des Herzbeutels).

Sch. pflegte sich an kalten Tagen beim Arbeiten die Beine mit einem Ziegenfell zu bedecken, von dem er höchstwahrschein-

lich den Krankheitserreger mit den Händen in die wunde Stelle am Hals gebracht hat. Die Untersuchung dieses Ziegenfells auf Milzbrandsporen blieb ergebnislos.

Die infolge dieses Falles angestellten Versuche über Desinfektion von Ziegenfellen zeitigten kein befriedigendes Resultat; es wurde daher angeordnet, dafs die an die Truppen ausgegebenen Ziegenfelle grundsätzlich nur zum Bedecken des Fußbodens zu benutzen und wöchentlich mehrere Stunden der Besonnung auszusetzen seien.

Der Grippezugang ist gegen das Vorjahr um 27,0 ‰ K. gestiegen, ohne dafs besondere ursächliche Momente, etwa abnorme klimatische Verhältnisse oder gröfsere Epidemien, hierfür verantwortlich gemacht werden könnten.

Eine kleinere Epidemie (13 Fälle) wurde in Langfang beobachtet, in den anderen Garnisonen erfolgten die Zugänge in gröfsen Zwischenräumen und ohne Zusammenhang. Winter- und Sommerhalbjahr haben die gleichen Zugangsziffern (je 50) aufzuweisen.

Der Verlauf der Fälle war meist leicht, die im Vordergrund stehenden Erscheinungen betrafen hauptsächlich die Luftwege.

Ein Todesfall an Grippe kam nicht vor.

II. Gruppe: Krankheiten des Nervensystems.

(No. 17 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|---------------------------------|-------------|------|------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 153 | 8,3 | 7,8 |
| 1901/02 | 33 | 7,0 | 5,8 |
| 1902/03 | 21 | 7,1 | 7,4 |

Die Krankheiten des Nervensystems nehmen mit der Zahl der Zugänge den vorletzten Platz unter allen Krankheitsgruppen ein.

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ‰ K. | 0,57 | 0,29 | 0,29 | — | 0,73 | 0,73 | 0,36 | 1,1 | 0,37 | 0,74 | 1,1 | 1,0 |

Die beobachteten Krankheiten waren:

| | |
|---|--------|
| Geisteskrankheiten | 2 mal, |
| Fallsucht | 4 „ |
| Ischias | 3 „ |
| Neuralgien im Bereiche des Nerv. trigeminus | 3 „ |
| Gehirnerschütterung | 3 „ |
| Hirnhautentzündung | 2 „ |
| Neurasthenie | 3 „ |
| Traumatische Neurose | 1 „ |

¹⁾ Ostasiatisches Expeditionskorps.

Bei den Geisteskrankheiten handelte es sich einmal um akute Verwirrtheit, das andere Mal um Melancholie; im ersteren Fall (Offizier) hatte schon 5 Jahre vorher Anstaltsbehandlung wegen des gleichen Leidens stattgefunden.

Beide Erkrankte gingen als tropendienstunfähig ab.

Die an Fallsucht Erkrankten gingen als tropendienstunfähig ab.

Ein an Ischias Erkrankter wurde tropendienstunfähig, die übrigen blieben dienstfähig.

Die Gehirnerschütterung war in allen 3 Fällen die Folge eines Sturzes vom Pferde. Einer der Erkrankten ging später mit einer im Anschluß an die Gehirnerschütterung entstandenen traumatischen Neurose nochmals zu und wurde infolge letzterer tropendienstunfähig; die beiden anderen blieben dienstfähig.

Die beiden Erkrankungen an Hirnhautentzündung endeten tödlich; in einem Fall bestand zu gleicher Zeit eine katarrhalische Erkrankung der Lunge. Aus der bei der Leichenöffnung entnommenen Subduralflüssigkeit wurden Diplokokken gezüchtet. Auch in dem anderen Fall, für den sich keinerlei Ursachen auffinden ließen, wurde die Diagnose durch die Obduktion bestätigt.

Ein aus dem Vorjahr im Bestand gebliebener Fall von Hirngeschwulst endete tödlich. Die Leichenöffnung ergab ein im linken Schläfenlappen sitzendes, fast walnufsgroßes Spindelzellensarkom.

Die Zugänge an Neurasthenie betrafen sämtlich obere Beamte (1 Kassenrendant, 1 Militärgerichtsschreiber, 1 Oberveterinär); die Erkrankten gingen als tropendienstunfähig ab. Die auffallend starke Beteiligung der oberen Beamten am Abgang durch Tropendienstunfähigkeit infolge von Neurasthenie dürfte darauf zurückzuführen sein, daß die klimatischen Verhältnisse sich infolge der vorwiegend sitzenden Beschäftigung und des Fehlens einer ausgleichenden körperlichen Bewegung bei den Beamten besonders ungünstig bemerkbar machen.

III. Gruppe: Krankheiten der Atmungsorgane.

(No. 18 bis 20 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|---------------------------------|-------------|-------|-------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 2590 | 141,1 | 132,3 |
| 1901/02 | 400 | 84,4 | 70,5 |
| 1902/03 | 172 | 58,5 | 60,4 |

Der Zugang ist gegen das Vorjahr um 25,9 ‰ K. zurückgegangen. Als Ursachen dieses Rückganges müssen Verbesserungen in den hygienischen Einrichtungen, namentlich der Unterkunft, angesehen werden.

¹⁾ Ostasiatisches Expeditionskorps.

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 7 | 15 | 22 | 25 | 24 | 15 | 14 | 9 | 13 | 5 | 12 | 11 |
| ‰ K. | 2,0 | 4,3 | 6,4 | 9,0 | 8,7 | 5,4 | 5,1 | 3,3 | 4,8 | 1,9 | 4,5 | 3,7 |

IV. Gruppe: Krankheiten der Zirkulationsorgane.

(No. 21 und 22 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|---------------------------------|-------------|------|------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 276 | 15,0 | 14,1 |
| 1901/02 | 172 | 36,3 | 30,3 |
| 1902/03 | 96 | 32,6 | 33,7 |

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 4 | 4 | 3 | 8 | 14 | 6 | 5 | 7 | 16 | 9 | 8 | 12 |
| ‰ K. | 1,1 | 1,1 | 0,87 | 2,9 | 5,1 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 5,9 | 3,3 | 3,0 | 4,0 |

Erste Unterart: Krankheiten des Herzens, des Herzbeutels und der Arterien.

(No. 21 des Rapportmusters.)

Der Zugang betrug 5 Fälle = 1,7 ‰ K., er hat sich gegen das Vorjahr um 4,2 ‰ K. verringert. Der Rückgang ist mit der Verbesserung des Ersatzes Hand in Hand gegangen.

Bei den 5 Zugängen handelte es sich um nervöse Störung der Herzstätigkeit; aus dem Vorjahr blieb außerdem noch ein Fall von Basedowscher Krankheit im Bestand.

Die Behandelten gingen sämtlich als tropendienstunfähig ab.

V. Gruppe: Krankheiten der Ernährungsorgane.

(No. 23 bis 26 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|---------------------------------|-------------|-------|-------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 3523 | 191,9 | 179,9 |
| 1901/02 | 1338 | 282,3 | 235,8 |
| 1902/03 | 563 | 191,4 | 197,5 |

¹⁾ Ostasiatisches Expeditionskorps.

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 59 | 45 | 29 | 34 | 31 | 15 | 35 | 32 | 70 | 82 | 58 | 73 |
| ‰ K. | 16,7 | 12,9 | 8,4 | 12,3 | 11,2 | 5,4 | 12,7 | 11,7 | 25,8 | 30,3 | 21,6 | 24,5 |

Die Gruppe hat den größten Rückgang (90,9 ‰ K.) gegen das Vorjahr aufzuweisen, gleichwohl bilden die Krankheiten der Ernährungsorgane noch immer fast den 5. Teil aller Erkrankungen. Der Rückgang ist zum großen Teil dem Ausbleiben der Cholera im Sommer 1903 und der Räumung der Garnison Shanghai, dann aber auch der fortschreitenden Verbesserung aller hygienischen Einrichtungen bei der Brigade zuzuschreiben. In dem immer noch hohen Zugang der Gruppe kommen die klimatischen Einflüsse des heißen feuchten Sommers voll zur Geltung; andererseits liegt in diesen Ziffern das Zeugnis des Erfolges der den Soldaten in immer wiederholten Gesundheitsbelehrungen zur Pflicht gemachten Selbstbeobachtung.

Der Zugang weist in den einzelnen Monaten erhebliche Schwankungen auf; da diese jedoch fast ausschließlich von dem Zugang an Krankheiten des Magens und Darms (No. 24 des Rapportmusters) abhängig sind, werden sie erst bei dieser Unterart besprochen werden.

Zweite Unterart: Krankheiten des Magens und Darms.

(No. 24 des Rapportmusters.)

Die Krankheiten des Magens und Darms weisen mit 476 Fällen = 161,8 ‰ K. den bei weitem größten Zugang unter allen Rapportspalten auf. Gegen das Vorjahr (1132 Fälle = 238,8 ‰ K.) macht sich ein Rückgang um 77,0 ‰ K. bemerkbar.

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 48 | 33 | 23 | 24 | 21 | 10 | 31 | 21 | 63 | 78 | 53 | 71 |
| ‰ K. | 13,6 | 9,5 | 6,7 | 8,7 | 7,6 | 3,6 | 11,3 | 7,7 | 23,2 | 28,9 | 19,7 | 23,8 |

In dem Zugange der einzelnen Monate bestehen erhebliche Schwankungen, die Sommermonate und anschließenden Herbstmonate bringen einen starken Anstieg der Zugänge, deren Höhepunkt, wie im Vorjahr, im Juli liegt, während in der kalten Jahreszeit der Zugang eine ungefähr gleichbleibende Höhe innehält.

Im einzelnen kamen folgende Magen-Darmkrankheiten zur Beobachtung:

Akute Magen-Darmkatarrhe . . . 449 mal,
 Chronische Magen-Darmkatarrhe . . . 7 mal,
 Blinddarmentzündung . . . 1 mal und
 Darmparasiten 19 mal.

Der Verhütung der akuten Magen-Darmkatarrhe, die besonders in der warmen Jahreszeit eine so mächtige Ausbreitung gewinnen, ist stets die größte Sorgfalt gewidmet worden. Hier stehen die ständige Überwachung der Ernährung, Sorge für zweckmäßige Kleidung (Tragen der wollenen Leibbinde, eventl. Anlegen des Tuchanzuges nach Sonnenuntergang), reichliche Ausstattung mit Wäsche, um häufigen Wechsel schweiß- oder regendurchnässter Stücke zu ermöglichen, in erster Linie.

Bei dem an Blinddarmentzündung Erkrankten trat 85 Tage nach operativer Entfernung des Wurmfortsatzes der Tod ein (in einem Zivilhospital).

Dritte Unterart: Unterleibsbrüche.

(No. 25 des Rapportmusters.)

In Zugang kamen 8 Fälle = 2,7 ‰ K., es handelte sich um 7 einfache Leistenbrüche und einmal um einen eingeklemmten Leistenbruch. Der eingeklemmte Bruch wurde durch Operation beseitigt, Bruch und Einklemmung waren in diesem Falle zugleich beim Fahren mit dem Geschütz über einen Graben entstanden. Sämtliche 7 Leute wurden dem Dienste erhalten.

Vierte Unterart: Krankheiten der Leber, der Milz und des Bauchfells.

(No. 26 des Rapportmusters.)

Der Zugang betrug 13 Fälle = 4,4 ‰ K. Außerdem kamen noch 7 Fälle von Leberabszess und 3 Fälle von Leberentzündung vor, die im Anschluß an Ruhr entstanden waren und dementsprechend in No. 7 des Rapportmusters verrechnet und besprochen sind. Unter den Zugängen befanden sich:

Leberentzündung infolge von Gallensteinen
 und wahrscheinlich infolge von Malaria . . . 1 mal,
 Leberentzündung, wahrscheinlich infolge von
 Typhus 2 mal,
 akute gelbe Leberatrophie 1 mal,
 katarrhalische Gelbsucht 9 mal.

Der erste Fall ist bemerkenswert wegen seines Verlaufes:

Ein Hoboist, der im Anfang September 1903 einen leichten Malariaanfall mit 3 tägigem Kranksein (Parasiten nachgewiesen) durchgemacht hatte, erkrankte am 20. 9. 1903, einen Tag nach der Abreise von Taku-Reede, auf der Heimreise mit Fieber, Gelbfärbung, Druckempfindlichkeit und Vergrößerung der Leber. Wegen Verdachtes auf Leberabszess wurde er am 21. 9. 1903 in Tsingtau ausgeschifft; am folgenden Tage wurde im Lazarett Syfang die Leber 15 mal punktiert, ohne auf Eiter zu stoßen. Unter dauernd hohem Fieber und heftigen Schmerzen in der Lebergegend Tod am 23. 9. 1903 an Herzschwäche. Die Obduktion ergab: Herz schlaff, Herzmuskulatur trübe, fleckig, Leber vergrößert, schlaff, gelblich, in der Gallenblase etwa 50 hanfkerngroße Gallensteine, Gallenausführungsgang durch einen

Stein verschlossen. Milz vergrößert. Die Leberentzündung ist entstanden durch einen Gallensteinikterus, wahrscheinlich in Verbindung mit der vorhergegangenen Malaria.

2 Leberabszesse standen offenbar mit vorangegangenen Typhus in Zusammenhang. (Siehe unter Typhus.)

Die Zahl der im ganzen operierten Leberabszesse beträgt 9 (s. unter Typhus und Ruhr), von denen 2 = 22,2 % infolge vielfacher Abszessbildung starben und 7 = 77,8 % wiederhergestellt wurden, aber tropendienstunfähig in Abgang kamen.

Die akute gelbe Leberatrophie verlief in 19 Tagen tödlich. Eine Ursache für die Erkrankung war nicht auffindbar.

9 Fälle von katarrhalischer Gelbsucht boten nichts Erwähnenswertes.

VI. Gruppe: Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschließlich der venerischen, Krampfaderbruch, Wasserbruch u. s. w.

(No. 27 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|---------------------------------|-------------|------|------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 159 | 8,7 | 8,1 |
| 1901/02 | 116 | 24,5 | 20,4 |
| 1902/03 | 59 | 20,1 | 20,7 |

Auf die einzelnen Monate verteilen sich die Zugänge folgendermaßen:

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | — |
| ‰ K. | 1,1 | 1,1 | 0,29 | 1,4 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | — |

Unter den beobachteten Erkrankungen fehlen solche der Nieren, der Nebennieren und der Harnleiter.

Die beobachteten Fälle bieten nichts Erwähnenswertes.

VII. Gruppe: Venerische Krankheiten.

(No. 28 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|---------------------------------|-------------|-------|-------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 2573 | 140,1 | 131,4 |
| 1901/02 | 644 | 135,9 | 113,5 |
| 1902/03 | 392 | 133,3 | 137,5 |

Auf die einzelnen Monate verteilt sich der Zugang folgendermaßen:

¹⁾ Ostasiatisches Expeditionskorps.

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 41 | 46 | 46 | 44 | 27 | 19 | 30 | 28 | 33 | 19 | 26 | 33 |
| ‰ K. | 11,6 | 13,2 | 13,4 | 15,9 | 9,8 | 6,9 | 10,9 | 10,3 | 12,2 | 7,0 | 9,7 | 11,1 |

Die Verteilung des Zugangs auf die einzelnen Garnisonen zeigt folgende Tabelle:

Zugang nach Garnisonen.

| G a r n i s o n | Absolute Zahl | ‰ K. |
|------------------------------------|---------------|-------|
| Peking | 77 | 247,6 |
| Yangtsun | 31 | 234,9 |
| Syfang | 79 | 134,8 |
| Shanhaikwan-Tsinhwangtau | 16 | 130,1 |
| Langfang | 16 | 124,0 |
| Tientsin | 139 | 118,7 |
| Tangku | 13 | 95,6 |
| Shanghai | 21 | 95,0 |

Die Gründe des außerordentlich hohen Zugangs an venerischen Krankheiten in der Besatzungs-Brigade sind im Sanitätsbericht über das Ostasiatische Expeditionskorps u. s. w. S. 43 ausführlicher dargelegt worden.

Von seiten der anderen hier befindlichen Kontingente liegen Ziffern über die Höhe des Zuganges an venerischen Krankheiten nicht vor, in dessen darf aus zahlreichen von fremdländischen Sanitätsoffizieren über diesen Punkt gegebenen mündlichen Mitteilungen geschlossen werden, daß auch dort die Krankenziffern durch die venerisch Kranken eine ebenso starke Belastung erfahren wie bei uns, ja vielleicht sogar in stärkerem Maße, weil die Abwehrraßregeln nirgends so scharf durchgeführt zu werden scheinen wie bei den deutschen Truppen. Wenigstens erhebt sich der Zugang an venerischen Krankheiten in einem kleineren Kontingent einer europäischen Macht, über welchen genauere Nachrichten vorliegen, in der Zeit vom 1. 10. 1902 bis 30. 9. 1903 bis zu der enormen Höhe von 461,6 ‰ K. Bei anderen Nationen wurde festgestellt, daß venerisch Erkrankte nach Ablauf der entzündlichen Erscheinungen mit ambulanter Behandlung als dienstfähig zur Truppe entlassen werden und aus den Krankenbüchern und -Rapporten verschwinden.

Die Verhütung der venerischen Krankheiten und der Kampf gegen ihre Weiterverbreitung wurde mit allen Mitteln durchgeführt, insbesondere durch regelmäßige Belehrungen über die Gefahren des Geschlechtsverkehrs, durch Einführung vorbeugender Waschungen und Einträufelungen (1 ‰ Sublimat- bzw. 20 ‰ ige Protargollösung), durch sanitätspolizeiliche Überwachung der öffentlichen Häuser.

Von besonderem Interesse ist ein Krankheitsfall, bei dem Schanker und Bubo vorlag. Der Bubo wurde mit Einspritzung von Höllesteinlösung (1,0 : 100,0) behandelt. Die Injektionsstelle wurde schankrös und von hier aus entwickelte sich ein serpinöser Schanker, der nach allen Seiten hin, aller Behandlung

zum Trotz, die Haut der Unterbauchgegend zerstörte und erst nach zweimaliger Schmierkur (à 120 g) und Jodkalibehandlung sich besserte; nach 273 tägiger Lazarettbehandlung wurde der Erkrankte mit einer noch markstückgroßen Wunde ungeheilt dem Heimtransport angeschlossen.

Die venerischen Erkrankungen in Ostasien zeigten, soweit sie bei der Brigade beobachtet wurden, im allgemeinen keinen schwereren Verlauf als in der Heimat. Auffallend war nur die häufige Komplikation des Trippers mit Nebenhodenentzündung und die Neigung zu Rückfällen bei der ersteren Erkrankung.

VIII. Gruppe: Augenkrankheiten.

(No. 29 und 30 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|---------------------------------|-------------|------|------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 369 | 20,1 | 18,8 |
| 1901/02 | 95 | 20,0 | 16,7 |
| 1902/03 | 62 | 21,1 | 21,8 |

Die Verteilung des Zuganges auf die einzelnen Monate ist folgende:

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| ‰ K. | 2,0 | 3,4 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 0,37 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |

Da in der ersten Unterart: kontagiöse Augenkrankheiten (No. 34 des Rapportmusters) Erkrankungen überhaupt nicht in Zugang kamen, beziehen sich alle Zahlenangaben auf die zweite Unterart: nicht kontagiöse Augenkrankheiten (No. 35 des Rapportmusters).

Der Zugang an diesen ist höher als in der Heimat infolge der ungünstigen Einflüsse, die in den ersten Jahresmonaten durch die Staubstürme, in den Sommermonaten durch das grelle Sonnenlicht ausgeübt werden.

Unter den beobachteten Erkrankungen waren:

| | |
|---|---------|
| Bindehautentzündung und -Verletzung | 53 mal, |
| Erkrankungen der Lider | 2 " |
| Hornhautverletzung | 3 " |
| Hornhautentzündung | 1 " |
| Netzhautentzündung | 2 " |
| Flügelfell | 1 " |

Die Ursache der Netzhautentzündungen wurde in keinem Fall ermittelt, der eine der beiden Erkrankten hatte

¹⁾ Ostasiatisches Expeditionskorps.

3 Monate vorher Rückfallfieber durchgemacht. Eingreifendere Operationen kamen nicht vor.

IX. Gruppe: Krankheiten des Ohres.

(No. 31 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|---------------------------------|-------------|------|------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 236 | 12,9 | 12,1 |
| 1901/02 | 57 | 12,0 | 10,0 |
| 1902/03 | 37 | 12,6 | 13,0 |

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | — | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| ‰ K. | — | 1,7 | 0,87 | 0,36 | 1,1 | 0,36 | 0,73 | 1,1 | 0,37 | 1,5 | 2,6 | 2,0 |

Unter den beobachteten Erkrankungen befanden sich: Erkrankungen des Gehörganges (Furunkel) . . . 5 mal, Erkrankungen des mittleren und inneren Ohres . 32 „ .

In einem Falle nötigte bei einem eiterigen Mittelohrkatarrr das Übergreifen auf die Zellen des Warzenfortsatzes zu operativer Eröffnung der letzteren. Der Operierte wurde tropendienstunfähig.

X. Gruppe: Krankheiten der äußeren Bedeckungen.

(No. 32 bis 34 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|---------------------------------|-------------|-------|-------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 2563 | 139,6 | 130,9 |
| 1901/02 | 623 | 131,4 | 109,8 |
| 1902/03 | 260 | 88,4 | 91,2 |

Der Zugang zeigt gegen das Vorjahr eine Abnahme um 43,0 ‰ K., die hauptsächlich ihren Grund in der Räumung von Shanghai hat.

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 24 | 21 | 14 | 16 | 13 | 17 | 19 | 14 | 23 | 22 | 45 | 32 |
| ‰ K. | 6,8 | 6,0 | 4,1 | 5,8 | 4,7 | 6,2 | 6,9 | 5,1 | 8,5 | 8,1 | 16,7 | 10,7 |

¹⁾ Ostasiatisches Expeditionskorps.

XI. Gruppe: Krankheiten der Bewegungsorgane.

(No. 35 und 36 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|-------------------------------|-------------|------|------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 1234 | 67,2 | 63,0 |
| 1901/02 | 243 | 51,3 | 42,8 |
| 1902/03 | 138 | 46,9 | 48,4 |

Der Zugang ist geringer als in der Heimat. Der Grund hierfür ist darin zu suchen, daß die Ausbildungszeit, die dort die meisten derartigen Erkrankungen stellt, bei der Brigade fortfällt.

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. . | 15 | 13 | 13 | 10 | 18 | 16 | 15 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| ‰ K. . | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 2,4 |

Todesfälle infolge von Krankheiten der Bewegungsorgane kamen nicht zur Beobachtung; Tropendienstunfähigkeit war in 3 Fällen durch diese Krankheiten bedingt.

XII. Gruppe: Mechanische Verletzungen.

(No. 37 bis 41 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 3434 | 187,0 | 175,4 |
| 1901/02 | 811 | 171,1 | 142,9 |
| 1902/03 | 563 | 191,4 | 197,5 |

Der Zugang ist demnach ungünstiger als im vorausgegangenen Berichtsjahre und auch ungünstiger als in der Heimat, wo er im Rapportjahre 1902/03 nur 126,6 ‰ K. betrug.

Von den Behandelten starben 3 = 1,0 ‰ K.

Auf die einzelnen Monate verteilt sich der Zugang in folgender Weise:

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. . | 54 | 73 | 32 | 35 | 43 | 53 | 63 | 50 | 51 | 39 | 26 | 44 |
| ‰ K. . | 15,3 | 20,9 | 9,3 | 12,7 | 15,6 | 19,2 | 22,9 | 18,3 | 18,8 | 14,4 | 9,7 | 14,8 |

¹⁾ Ostasiatisches Expeditionskorps.

Erste Unterart: Verwundungen durch Schußwaffen.

(No. 37 des Rapportmusters.)

Der Zugang betrug 2 Fälle = 0,68 ‰ K., und zwar ging je 1 Fall im Oktober 1902 und April 1903 zu.

Zu erwähnen ist die Schußverletzung eines unter Rapportnummer 4 verrechneten Typhuskranken, der im Lazarett Shanhaikwan im Fieberdelirium aus dem Barackenfenster sprang, auf das von den italienischen Truppen besetzte Fort lief und von dem italienischen Posten in kriechender Stellung auf ungefähr 75 m angeschossen worden war. An der hinteren Seite des rechten Oberschenkels, in der Mitte, befand sich ein 2 cm langer Hautdefekt mit glatten Rändern. In der gleichen Höhe Einschufs von 2 cm Durchmesser am linken Oberschenkel an der Innenseite nach hinten von den großen Gefäßen; Ausschufs an der Außenseite des linken Oberschenkels etwas mehr nach hinten 10 cm lang, 5 cm breit; die Muskulatur quoll aus der Ausschufsöffnung hervor. Die Schußverletzung bildete infolge mehrfacher Eiterverhaltungen eine schwere Komplikation des an sich mittelschweren Typhus. Der Kranke, der am Ende des Berichtsjahres im Bestand verblieb, ist schließlich als tropendienstunfähig entlassen worden.

Dritte Unterart: Knochenbrüche, Verstauchungen, Verrenkungen.

(No. 39 des Rapportmusters.)

In Zugang kamen 252 Fälle = 85,7 ‰ K. Der Zugang hat gegen das Vorjahr (61,0 ‰ K.) um 24,7 ‰ K. zugenommen. Von den Behandelten starb 1 Mann.

Es gingen zu mit Knochenbrüchen 23 Fälle = 7,8 ‰ K., mit Verstauchungen 217 Fälle = 73,8 ‰ K. und mit Verrenkungen 12 Fälle = 4,1 ‰ K.

Erwähnt seien folgende Fälle:

1. Ein Militärkrankenwärter stürzte von einem scheuenden Pony und zog sich einen Bruch des linken Oberarms im chirurgischen Hals mit Verrenkung des Oberarmkopfes nach unten zu. Zunächst fixierender Verband in abduzierter Stellung; 3 Wochen nach der Verletzung blutige Reposition des Oberarmkopfes, der inzwischen schon mit dem Schaft in knöcherner Verbindung getreten war, mit Abmeißelung eines überstehenden Schaftstückes (St.-A. Esselbrügge). 10 Wochen nach der Operation Erhebung des Armes nach vorn bis 90°, seitlich bis 86°, nach hinten bis 45°. Als tropendienstunfähig entlassen.

2. Ein Musketier erhielt von einem Pony einen Hufschlag auf das linke Scheitelbein. Nach der Verletzung war eine Einsenkung der Schädeldecke mit zackigen Rändern festzustellen. Der Verletzte blieb einige Tage teilnahmslos und unruhig, Puls verlangsamt und unregelmäßig; mehrmals Nasenbluten; Stauungspapille. Schnelle Besserung. 14 Tage nach dem Unfall als Genesender ins Revier, 21 Tage nach dem Unfall dienstfähig.

3. Auf dem Heimtransport stürzte ein Mann von der Plattform eines Waggons des mit verlangsamer Fahrt in die Station einfahrenden Eisenbahnzuges. Starke Blutung aus Mund und Nase, Bewusstlosigkeit, die nur vorübergehend schwand. Später traten tonische Krämpfe in Armen und Beinen, schließlich Erbrechen auf. Tod 4 1/2 Stunde nach der Verletzung. Die Leichenöffnung ergab einen durchgehenden Bruch der Schädelgrundfläche mit Zerreißen der rechten Arteria meningea media und Zerstörung des rechten Schläfenlappens.

Fünfte Unterart: Sonstige Wunden und Verletzungen, Verbrennungen, Frostschäden.

(No. 41 des Rapportmusters.)

Es gingen zu 301 Fälle = 102,3 ‰ K. Davon starben 2 Mann.

Von besonders wichtigen Fällen seien folgende erwähnt:

1. Gefreiter D. (Shanghai) rannte auf einem durchgehenden Pony mit der Innenseite des rechten Oberschenkels gegen die Deichsel Spitze eines ihm entgegen kommenden Wagens und fiel hierbei vom Pferd. Ein bei dem Unfall zufällig anwesender Sanitätsoffizier (St.-A. Wendel) stillte die aus einer 4 cm langen schräg am unteren Winkel des Scarpaschen Dreiecks verlaufenden Quetschwunde kommende starke Blutung, die der zerrissenen vena femoralis entstammte, zunächst durch direkten Fingerdruck in der Wunde und nahm sofort an Ort und Stelle die Unterbindung vor. Der Verunglückte wurde in ein nahegelegenes Zivilkrankenhaus gebracht, wo er trotz Exzitantien und Kochsalzinfusionen 6 1/2 Stunden nach der Verletzung an Herzschwäche starb.

2. Ein Gefreiter fiel bei einer Felddienstübung vom Bock des von ihm geführten Packwagens, wobei ihm das Hinterrad des schweren Gefährtes quer über den Leib ging. Auf einer Dschunke wurde er seiner Garnison Tientsin zugeführt; um 12 Uhr nachts, 13 Stunden nach der Verletzung, langte er im Lazarett an und starb 27 Stunden nach dem Unfall an Bauchfellentzündung.

Leichenöffnungsbefund: In der Bauchhöhle 3 l kotige Flüssigkeit. Fibrinöse Auflagerungen auf der Darmserosa. An der Übergangsstelle des Zwölffingerdarms in den Leerdarm ein 3 cm langer, querer Darmrifs.

XIV. Gruppe: Zur Beobachtung.

(No. 43 des Rapportmusters.)

| J a h r | Z u g a n g | | |
|---------------------------------|-------------|------|------|
| | absol. | ‰ K. | ‰ M. |
| 1900/01 ¹⁾ | 152 | 8,3 | 7,8 |
| 1901/02 | 121 | 25,5 | 21,3 |
| 1902/03 | 32 | 10,9 | 11,2 |

Zugang nach Monaten.

| Zugang | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ‰ K. | 1,4 | 1,1 | 0,58 | 1,1 | 0,36 | 0,73 | 0,73 | 1,1 | 1,1 | 0,74 | 0,74 | 1,0 |

Die Beobachtung erstreckte sich auf den
 Geisteszustand 8 mal,
 Neurasthenie 1 „
 Krampfanfälle 14 „
 Syphilis 7 „
 chronischen Alkoholismus 2 „

1) Ostasiatisches Expeditionskorps.

D. Bericht über den Krankenabgang.

| Von den insgesamt Behandelten sind | Absolute Zahl | ‰ der Behandelten | ‰ K. |
|------------------------------------|---------------|-------------------|-------|
| dienstfähig geworden | 2564 | 885,4 | 871,8 |
| gestorben | 15 | 5,2 | 5,1 |
| anderweitig abgegangen | 184 | 63,5 | 62,6 |
| in Behandlung geblieben | 133 | 45,9 | 45,2 |
| insgesamt behandelt | 2896 | | 984,7 |

1. Abgang als dienstfähig.

Von je 1000 der Behandelten sind 1902/03 885,4 und 1901/02 936,3 als dienstfähig entlassen worden.

2. Abgang durch Tod.

Die nachstehende Tabelle ergibt die Gesamtzahl aller Todesfälle innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung unter Gegenüberstellung der gleichen Verhältnisse im Ostasiatischen Expeditionskorps und in der Königlich Preussischen Armee usw.

| Todesfälle innerhalb und außerhalb militärärztlicher Behandlung | Ostasiatische Besatzungs-Brigade | | Ostasiatisches Expeditionskorps | | Königlich Preussische Armee usw. | |
|---|----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------------|------|
| | 1902/03 | 1901/02 | 1900/01 | 1902/03 | abs. | ‰ K. |
| Gesamtzahl | 17 | 43 | 201 | 1091 | 17 | 2,1 |
| davon waren verursacht | | | | | | |
| durch Krankheit | 12 | 30 | 133 | 689 | 12 | 1,3 |
| durch Verunglückung | 4 | 10 | 65 | 139 | 4 | 0,26 |
| durch Selbstmord | 1 | 3 | 3 | 263 | 1 | 0,50 |
| innerhalb militärärztlicher Behandlung | 15 | 38 | 156 | 745 | 15 | 1,4 |
| aufserhalb militärärztlicher Behandlung | 2 | 5 | 45 | 346 | 2 | 0,66 |

Außerdem starben 2 Kranke — einer nach Räumung der Garnison Shanghai am 6. 3. 1903 im Generalhospital daselbst und einer am 12. 10. 1902 im Hospital zu Singapore, abgesetzt vom Dampfer Pisa im September 1902 auf der Heimreise — außerhalb des Bereichs der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade, die in den vorstehenden Zahlen nicht enthalten sind. (Vergl. auch S. 5†.)

Weitere Angaben über diese Verstorbenen sind aus den Tabellen III und VI des II. Teils zu ersehen.

| | Todesfälle nach Monaten | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|
| | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | |
| | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| absol. | 3 | — | 4 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| ‰ K. | 0,85 | — | 1,2 | 0,72 | 0,36 | 0,73 | — | — | — | 1,1 | 0,37 | 0,34 |

Die meisten Todesfälle entfallen auf die Monate Dezember 1902, Juli 1903 und Oktober 1902. Im November 1902, April, Mai und Juni 1903 sind Todesfälle nicht vorgekommen.

Angehörige des Sanitätspersonals sind nicht gestorben.

An 16 = 94,1 % der im Berichtsjahre Verstorbenen wurde die Leichenöffnung vorgenommen.

3. Anderweitiger Abgang.

Als anderweitig schieden aus der militärärztlichen Behandlung aus:

| | 1902/03 | 1901/02 |
|---|---------|---------|
| insgesamt | 184 | 288 |
| davon: | | |
| tropendienstunfähig | 110 | 183 |
| aus anderen Gründen abgegangen (in Schiffslazarette übergeführt u. s. w.) | 74 | 105 |

| Die Tropendienstunfähigkeit wurde bedingt durch | | |
|--|--|--------|
| Blutarmut | | 3 mal, |
| chronischen Alkoholismus | | 7 " |
| Malaria und Folgekrankheiten | | 4 " |
| übermäßige Fettleibigkeit | | 2 " |
| Folgen von Gelenkrheumatismus | | 3 " |
| Epilepsie | | 4 " |
| Neurasthenie | | 3 " |
| überstandene Geisteskrankheit | | 1 " |
| Nervenschwäche nach Nervenentzündungen | | 2 " |
| nervöse Störungen nach Verletzungen | | 2 " |
| chronischen Mittelohrkatarrh | | 2 " |
| Lungentuberkulose | | 1 " |
| Folgen von Brustfellentzündung und chronischem Bronchialkatarrh | | 3 " |
| nervöse Herztätigkeit und Basedowsche Krankheit | | 7 " |
| chronischen Kehlkopfkatarrh | | 1 " |
| Ruhr und Folgekrankheiten einschliesslich Leberentzündung und Leberabszess | | 50 " |
| Typhus | | 2 " |
| chronischen Magen-Darmkatarrh | | 5 " |

Blasenkatarrh 1 mal
 chronischem Tripper 1 "
 serpiginösen Schanker 1 "
 nach geheilten Verletzungen zurückgebliebene Schwäche von Gliedern 3 "
 Krampfadern 2 "

Infolge von Dienstunbrauchbarkeit und Invalidität wurden entlassen:

| | als dienstunbrauchbar | | als halb-invalide | | als ganz-invalide | | zusammen | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | absol. | $\frac{0}{00}$ K. | abs. | $\frac{0}{00}$ K. | abs. | $\frac{0}{00}$ K. | abs. | $\frac{0}{00}$ K. |
| Ostasiatisches Expeditions-korps 1900/01 | 11 | 0,60 | 146 | 8,0 | 543 | 29,6 | 700 | 38,1 |
| Ostasiatische Besatzungs-Brigade { 10. 6. 1901 bis 30. 9. 1901 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| { 1901/02 | — | — | 16 | 3,4 | 142 | 30,0 | 158 | 33,3 |
| { 1902/03 | 2 | 0,68 | 15 | 5,1 | 98 | 33,3 | 115 | 39,1 |

70 Mann wurden als noch weiterer Behandlung bedürftig, zum grössten Teil gelegentlich der Räumung von Shanghai, den Heimtransporten angeschlossen.

E. Operationsliste.

Im Berichtsjahre 1902/03 kamen in den Lazaretten der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade im ganzen 21 grössere Operationen zur Ausführung.

Es handelte sich um:

- 1 Warzenfortsatzaufmeisselung,
- 11 Lebereiterherde,
- 1 Wurmfortsatzausschneidung und Gallenblaseneröffnung,
- 1 Harnröhrennaht,
- 1 Radikalleistenbruchoperation,
- 1 Schenkelblutaderunterbindung,
- 1 blutige Oberarmkopfeinrenkung,
- 1 Kniegelenkaussägung,
- 1 Gelenkmausentfernung,
- 1 Schädeloperation und
- 1 Knochenauslösung.

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|----------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Syfang, L., Gefreiter. | Mittelohrkatarrh rechts. — 5. 3. 1903. — Übergreifen der Eiterung auf die Zellen des Warzenfortsatzes. | 17. 3. 1903. Durchstechung des rechten Trommelfells. 6. 4. 1903. Aufmeisselung des rechten Warzenfortsatzes. Ungestörter Verlauf. Der Mittelohrkatarrh wurde durch den Eingriff nicht beseitigt. | Heilung. Tropendienstunfähig. |
| 2 | Langfang, R., Gefreiter. | Ruhr. — 6. 10. 1902. Eiterherd in der Leber. | 11. und 13. 10. 1902. Bauchschnitt rechts von der Mittellinie; Ver-nähung des Bauchfells mit der Leberoberfläche; zweizeitige Er-öffnung des Eiterherdes. | Fistelbildung. Tropendienstunfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bzw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|----------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 3 | Shanghai, G., Musketier. | Ruhr. — 22. 10. 1902. — Eiterherde in der Leber. | 27. 10. 1902. Ausschneidung der 6. Rippe; Eröffnung eines Eiterherdes. 24. 12. 1902. Ausschneidung eines Stückes der 7. Rippe; Eröffnung eines 2. Eiterherdes. Dauernd hohes Eiterfieber. St.-A. Wendel. | Tod am 12. 1. 1903 an Entkräftung. |
| 4 | Tientsin, W., Musketier. | Chronische Ruhr. — 12. 11. 1902. — Eiterbildung in der Leber. | 19. 11. 1902. Ausschneidung der 8. Rippe; Vernähung des Bauch- und Zwerchfells. 20. 11. 1902. Eröffnung eines Eiterherdes. 21. 11. 1902. Eröffnung zweier weiterer Eiterherde. Ungestörter Verlauf. St.-A. Kramm. | Heilung. Tropendienstunfähig. |
| 5 | Shanghai, R., Musketier. | Ruhr. — 3. 11. 1902. — Eiterbildung in der Leber. | 6. 11. 1902. Ausschneidung der 8. Rippe. Eröffnung eines Eiterherdes. Ungestörter Verlauf. St.-A. Wendel. | Heilung. Tropendienstunfähig. |
| 6 | Shanghai, B., Musketier. | Typhus. — 28. 9. 1902 — Eiterbildung in der Leber. | 19. 11. 1902. Ausschneidung der 6. Rippe. Eröffnung eines Eiterherdes. Ungestörter Verlauf. St.-A. Wendel. | Heilung. Tropendienstunfähig. |
| 7 | Shanghai, W., Musketier. | Typhus und Malaria. — 21. 11. 1902. — Eiterbildung in der Leber. | 23. 11. 1902. Ausschneidung der 8. Rippe. Eröffnung eines Eiterherdes. Ungestörter Verlauf. St.-A. Wendel. | Fistelbildung. Tropendienstunfähig. |
| 8 | Tangku, R., Musketier. | Ruhr. — 13. 11. 1902. — Eiterbildung in der Leber. | 4. 1. 1903. Ausschneidung der 8. Rippe. Vernähung zwischen Brust- und Zwerchfell. 6. 1. 1903. Eröffnung eines Eiterherdes. Anfänglich hochgradige Entkräftung. St.-A. Esselbrügge. | Fistelbildung. Tropendienstunfähig. |
| 9 | Yangtsun, A., Sergeant. | Eiterherd in der Leber. — 11. 2. 1903. | 13. 2. 1903. Ausschneidung des 9. und 10. Rippenknorpels am Brustbeinrande. Freilegung der Leber; Einstich. 15. 2. 1903. Entleerung eines kleinen Eiterherdes. Verlauf langsam, häufiger auftretendes Fieber, das den Verdacht weiterer Eiterherde erweckte. St.-A. Esselbrügge. | Heilung. Tropendienstunfähig. |
| 10 | Shanghai, L., Musketier. | Blinddarm- und Leberentzündung. — 10. 12. 1902. — Eiterherdbildung am Blinddarm. | 22. 12. 1902. Bauchschnitt; Eröffnung des Eiterherdes; Ausschneidung des Wurmfortsatzes. — Eröffnung der Gallenblase. Dauernd hohes Fieber. St.-A. Wendel. | Tod am 5. 3. 1903 an Entkräftung. |
| 11 | Syfang, W., Gefreiter. | Zerreißen der Harnröhre. — 8. 1. 1903. — Vereinigung der Wundränder. | 8. 1. 1903. Einschnitt am Damm; Naht der Harnröhre. Ungestörter Verlauf. Marine-O.-A.-A. Kaustsch. | Dienstfähig. |
| 12 | Tientsin, H., Gefreiter. | Eingeklemmter Leistenbruch. — 9. 4. 1903. — Unmöglichkeit der Zurückbringung. | 9. 4. 1903. Endgültig heilender Eingriff nach Bassini. Ungestörter Verlauf. St.-A. Esselbrügge. | Dienstfähig. |
| 13 | Shanghai, D., Musketier. | Zerreißen der rechten Oberschenkelblutader. — 20. 12. 1902. — Stillung der lebensgefährdenden Blutung. | 20. 12. 1902. Unterbindung der Schenkelblutader rechts; Naht. Die durch den Blutverlust eingetretene Herzschwäche war durch Einspritzung von Kochsalzlösung unter die Haut nicht zu beseitigen. St.-A. Wendel. | Tod am 20. 12. 1902 an Herzschwäche. |
| 14 | Tientsin, D., Militärkrankenwärter. | Bruch des linken Oberarmknochens mit Zersplitterung und Verrenkung des Oberarmkopfes. — 31. 12. 1902. — Besserung der Bewegungsfähigkeit und Einrenkung des Oberarmkopfes. | 20. 1. 1903. Blutige Einrenkung. Volkmannscher Ausschneidungsschnitt. Mediko-mechanische Behandlung. Hebung des Armes seitlich mit Hilfe des Schulterblatts bis 80°, ohne Hilfe bis 45°; Hebung nach vorn bis 90°, nach hinten bis 45°. St.-A. Esselbrügge. | Heilung. Tropendienstunfähig. |
| 15 | Peking, W., Sergeant. | Chronische Entzündung des linken Kniegelenks und Gelenkrheumatismus. — 28. 3. 1903. — Steifigkeit, Schwellung und Schmerzhaftigkeit des linken Kniegelenks, die, aller Behandlung trotzend, die Gebrauchsfähigkeit des linken Beins ausschloß. | 9. 7. 1903. Aussägung des linken Kniegelenks. Schienenbehandlung, später Gipsverband. Gute Verwachsung. O.-St.-A. Albers. | Heilung. Tropendienstunfähig. |

| Lfd. No. | Standort, Name, Dienstgrad | Art und Ursache des Leidens, Tag der Erkrankung, Veranlassung bezw. Zweck der Operation | Operationstag, Operationsart, Behandlung, Verlauf | Ausgang |
|---|---------------------------------------|--|--|---|
| 16 | Tientsin, M., Gefreiter. | Gelenkmaus im rechten Ellbogengelenk. — 15. 5. 1903. — Beseitigung der Bewegungsbeschränkung. | 26. 5. 1903. Entfernung einer Gelenkmaus. Ungestörter Verlauf. St.-A. Esselbrügge. | Dienstfähig. |
| Außerdem fanden Operationen an nicht zur Ostasiatischen Besatzungs-Brigade gehörigen Personen statt. | | | | |
| 17 | Syfang, L., Seesoldat. | Zwei offene Schädelbrüche. — 27. 8. 1903. — Beseitigung von Knochensplittern zur Vermeidung von Gehirnverletzungen. | 27. 8. 1903. Entfernung eines losgeschlagenen und nach dem Schädelinnern zu gedrängten Knochenstücks des Hinterhauptbeins. Ungestörter Verlauf. St.-A. Ley. | Als nicht mehr Gegenstand der Lazarettbehandlung zum Truppenteil. |
| 18 | Tientsin, B., Kaufmann. | Eiterherd in der Leber. — 20. 10. 1902. | 21. 10. 1902. Ausschneidung des 9. und 10. Rippenknorpels in der Achsellinie; Vernähung des Zwerch- und Bauchfells; zweizeitige Eröffnung des Eiterherdes. Ungestörter Verlauf. Feste Narbenbildung. St.-A. Kramm. | Als Genesender entlassen. |
| | | Grippe. — 23. 12. 1902. — Rückfall von Eiterbildung in der Leber. | 27. 12. 1902. Ausschneidung der 8. Rippe. Zweizeitige Eröffnung des Eiterherdes. Häufig auftretendes Fieber, weitere Eiterherde nicht gefunden. Feste Narbenbildung. St.-A. Esselbrügge. | Als Genesender entlassen. |
| | | Eiterherdbildung in der Leber im 2. Rückfall. — 22. 6. 1903. | 24. 6. 1903. Einstich; Eröffnung der vom ersten Eingriff herstammenden Narbe. 26. 6. 1903. Entleerung von etwa 200 ccm Eiter. Fieber; Fistelbildung. St.-A. Esselbrügge. | Als Genesender entlassen. |
| 19 | Tientsin, R., Kaufmann. | Chronische Ruhr und Leberentzündung. — 5. 1. 1903. — Verdacht auf Eiterherde in der Leber (Lebervergrößerung, hohes Fieber). | 6. 1., 17., 21. und 23. 2. 1903. Bauchschnitt unterhalb des Schwertfortsatzes; Einstiche in die Leber ohne Nachweis von Eiter. Eröffnung mehrerer kleiner Eiterherde. Dauernd hohes Eiterfieber. St.-A. Esselbrügge. facher Eiterherde in der Leber und chronischer Ruhr. | Tod am 13. 3. 1903 an Herzschwäche infolge vieler |
| 20 | Tientsin, P., Matrose (Österreicher). | Chronische Ruhr. — 17. 11. 1902. — Eiterbildung in der Leber. | 17. 11. 1902. Ausschneidung der 8. und 9. Rippe. Vernähung der Brustfellblätter und des Bauchfells; Eröffnung eines Eiterherdes in der Leberkuppe. Blutvergiftung. St.-A. Kramm. | Tod am 19. 11. 1902 an Entkräftung. |
| 21 | Tientsin, T., Arbeiter (Chinese). | Zerschmetterung der rechten Hand durch Explosion einer Gewehrpatrone M. 88. — 24. 2. 1903. — Besserung der Heil- und Arbeitsfähigkeit. | 25. 2. 1903. Auslösung der Knochenreste des 3., 4. und 5. Fingers im Mittelhandknochengelenk; Reinigung und Abtragung verschmutzter und zeretzter Weichteile. Staffelförmiger Fieberabfall. St.-A. Esselbrügge. | Heilung. |

F. Bericht über die Tätigkeit des Zahnarztes.

Im Berichtsjahr 1902/03 wurden bei der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade 102 Offiziere, 23 Sanitätsoffiziere, 59 Beamte und 847 Unteroffiziere und Mannschaften zahnärztlich behandelt.

In 532 Fällen handelte es sich um Extraktion von Zähnen oder Wurzeln.

An Füllungen wurden gelegt:

427 Kupfer-Amalgam,

246 Zement,

52 Gold-Amalgam,

74 provisorische Füllungen.

In 31 Fällen lag Reinigung der Zähne vor.

Im technischen Laboratorium wurde angefertigt:

1 Kautschukschiene für Oberkieferbruch, der durch Schlag eines Maultieres herbeigeführt war,

97 obere Ersatzstücke mit 364 Zähnen,

8 untere Ersatzstücke mit 36 Zähnen,

20 Stifzähne, deren 13 mit Goldschutzplatten, 6 in Zinn,

1 in Viktoria,

1 Goldkrone,

20 Reparaturen von alten Ersatzstücken, wobei 12 neue Zähne verwendet wurden.

Die zahntechnischen Arbeiten wurden unter Leitung des Zahnarztes von einem Sanitätssergeanten, der von Beruf Zahntechniker ist, ausgeführt.

G. Bericht über die Tätigkeit des hygienisch-chemischen Laboratoriums in Tientsin.

a. Bakteriologisches Laboratorium.

In der Berichtszeit wurden im bakteriologischen Laboratorium insgesamt 1287 mikroskopische und bakteriologische Untersuchungen — ausschließlich der zahlreichen für die Stationen ausgeführten Untersuchungen auf Gonokokken und ausschließlich der mikroskopischen Harnuntersuchungen — ausgeführt, die sich im einzelnen in folgender Weise verteilen. Darunter:

Blutuntersuchungen auf Widalsche Reaktion: 77, davon 32 positiv — auf Malariaparasiten: 573, davon 23 positiv.

Auch in diesem Jahre wurden in Tientsin nur die Parasiten des Tertianfiebers gefunden.

Um einer ausgedehnten Malariaverbreitung durch etwaige larvierte Fälle unter den Mannschaften vorzubeugen, vor allem auch, um eine Einschleppung der hier bisher unbekannteren tropischen Form durch Leute, die früher in Shanghai standen, zu verhindern, wurden Ende April 244 Angehörige des 1. Ostasiatischen Infanterie-Regiments untersucht. Nur einer beherbergte Tertianparasiten, ohne dies zu wissen und ohne Beschwerden davon zu haben. Mitte September wurde diese Untersuchung wiederholt.

Zählungen der weissen Blutkörperchen wurden an zwei Kranken vorgenommen, bei denen beide Male durch die dauernd niedrige Leukocytenzahl das vermutete Vorhandensein eines Leberabszesses ausgeschlossen werden konnte.

Unter 3 Untersuchungen des Stuhles auf Choleravibrionen fiel eine bei einer aus Shanghai zugereisten Zivilperson positiv aus.

Der Eiter eines Leberabszesses nach chronischer Ruhr erwies sich als steril.

Bei einer eiterigen Hodenentzündung wurden im Eiter Gonokokken gefunden.

Fünfmal wurden im Mandelbelag vergebens Diphtheriebazillen gesucht. Die schon früher gemachte Erfahrung, daß echte Diphtherie hier äußerst selten ist, wurde aufs neue bestätigt.

Milzbrand wurde einmal bei einem Zahnmeisterspiranten festgestellt. Die Pustula maligna safs am Halse. 4 weitere positive Untersuchungen auf Milzbrand wurden bei Ponys und Schlachtvieh ausgeführt.

Untersuchungen von Hautausschlägen auf Trichophyton tonsurans: 9, davon 1 positiv. Die Ansteckungsquelle für die Mannschaften bildeten die mit Trichophyton behafteten Pferde bzw. Ponys.

Neben diesen von den Stationen des Feldlazarets oder einzelnen Sanitätsoffizieren geforderten Untersuchungen wurden noch weitere umfangreichere Arbeiten vorgenommen:

An erster Stelle stehen hier die Untersuchungen über die Ätiologie der ostasiatischen Ruhr. Über sie ist eine gesonderte Berichterstattung in Aussicht genommen.

Die in diesem Jahre vorgenommenen Untersuchungen des Wassers einiger Teiche und Brunnen der Peihoebene bestätigte von neuem die Tatsache, daß in der Peihoebene ein brauchbares Trinkwasser nicht gefunden werden kann.

Die Herstellung des künstlichen Eises, des destillierten und namentlich auch des Selterswassers sowie das Abkochen des Gebrauchswassers für die Garnison unterstanden nach wie vor der dauernden bakteriologischen Kontrolle des Laboratoriums.

Mehrfach fand sich Gelegenheit zu einer Beteiligung an den im chemischen Laboratorium auszuführenden Nahrungsmitteluntersuchungen.

28 Tierversuche wurden in der Berichtszeit angestellt. Die Wirksamkeit japanischer Lymphe wurde an einem Kalbe erprobt. Für die Herstellung von Testseris für Typhus und Ruhr wurde durch Immunisierung von geeigneten Tieren gesorgt.

b. Chemisches Laboratorium.

Im chemischen Laboratorium wurden in der Zeit vom 1. 10. 1902 bis 30. 9. 1903 268 Untersuchungen erledigt, die zu 79 Beanstandungen führten. Untersucht wurden:

| Bezeichnung der untersuchten Gegenstände | Zahl der Untersuchungen | Beanstandungen |
|--|-------------------------|----------------|
| Bier | 5 | — |
| Branntwein | 9 | 5 |
| Butter und andere Fette | 12 | 2 |
| Essig | 8 | 2 |
| Fleischkonserven | 5 | 3 |
| Kaffee | 2 | — |
| Mehl und Kleie | 16 | 2 |
| Messer, Gabeln, Kochgeschirre u. s. w. | 6 | 3 |
| Milch | 25 | 1 |
| Mineralwasser | 36 | 6 |
| Reis | 1 | — |
| Schokolade | 1 | — |
| Verschiedenes | 5 | 1 |
| Wasser | 97 | 49 |
| Wein | 14 | 4 |
| Wundstreupulver, chinesisches | 1 | — |
| Zucker | 3 | 1 |
| chemisch-physiologische Untersuchungen | 22 | — |

5 Branntweine wurden wegen ihres hohen Fuselölgehalts beanstandet, der zwischen 0,722 und 0,940 % schwankte. 2 Butterproben waren ranzig; 3 Fleischkonserven waren in Fäulnis übergegangen. Eine Essigprobe enthielt nur 1,69 % Essigsäure, eine andere mußte wegen starker Trübung zurückgewiesen werden. Eine Kleie war dumpfig, eine zweite mit Unkrautsamen versetzt. Kitt, mit dem Messer und Gabeln in den Handhaben befestigt worden waren, verflüssigte sich schon bei einer Temperatur weit unter 100°, so daß die Geräte in heißem Wasser nicht zu reinigen waren. 6 Mineralwässer waren aus nicht einwandfreiem Wasser hergestellt worden. 3 Weine waren gestreckt, 1 verdorben. Das chinesische Wundstreupulver bestand aus Kreide. 1 Zucker war übermäßig geblaut.

Erwähnt sei noch das Ergebnis einer Reihe von Untersuchungen des künstlichen Mineralwassers aus der Shanghai-kwan-Crystal-Soda-Waterfabrik. Das zur Herstellung des kohlensäuren Wassers verwendete Quellwasser war einwandfrei, enthielt keine salpetrige Säure, während in dem mit Kohlensäure imprägnierten Wasser wechselnde Mengen von salpetriger Säure nachzuweisen waren. Das Quellwasser passierte vor dem Imprägnieren mit Kohlensäure große Berkefeldfilteranlagen. Waren die Filterkerzen lange Zeit im Gebrauche gewesen, so enthielt das kohlensäure Wasser viel salpetrige Säure, waren die Filterkerzen kurz vor der Verwendung ausgekocht worden, so war in dem kohlensäuren Wasser keine salpetrige Säure nachweisbar. Aus dem Gehalt des Wassers an salpetriger Säure konnte auf die Verwendungszeit der Filterkerzen geschlossen werden. Nachdem dafür Sorge getragen worden war, daß die Filterkerzen häufiger gewechselt und sterilisiert wurden, war das kohlensäure Wasser tadellos.

II. Teil.

Tabellen zu dem Sanitäts-Bericht.

Krankensbewegung in der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade.

Absolute Zahlen.

Tabelle I.

| Iststärke | Bestand waren | Z u g a n g | | | A b g a n g | | | | Bestand bleiben |
|-----------|------------------|----------------|--------------|-------|-------------|------------------|-------------------|-------|--------------------|
| | | im Lazarett | im Revier | Summe | dienstfähig | gestorben | anderweitig | Summe | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2941 | 46 | 1250 | 1600 | 2850 | 2564 | 15 ¹⁾ | 184 ²⁾ | 2763 | 133 |

| | Krank- heit | Unglücks- fall | Selbst- mord | Zu- sammen |
|--|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1) Davon gestorben durch . | 12 | 3 | — | 15 |
| Aufserhalb militärärztlicher Behandlung sind gestorben durch | — | 1 | 1 | 2 |
| Summe aller Todesfälle durch | 12 | 4 | 1 | 17 |

| | |
|---|-----|
| 2) Davon tropendienstunfähig | 110 |
| Aus anderen Gründen abgegangen (in Schiffslazarette übergeführt usw.) | 74 |
| Summe | 184 |

Krankenzugang nach Krankheiten und Monaten.

Tabelle II.

In absoluten Zahlen und in ‰ zu den bezüglichen Iststärken.

| Krankheitsgruppen | K r a n k h e i t | Nummer | a absolut b ‰ K. | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | Jahressumme | ‰ M. | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | | | September | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen. | Infektionskrankheiten | Echte und modifizierte Pocken | 1 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | | |
| | | (Scharlach, Masern) Rose . . . | 2 | a b | — — | 2 0,57 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 2 0,68 | 0,70 | |
| | | Diphtheritis | 3 | a b | 1 0,28 | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 1 0,34 | 0,35 |
| | | Unterleibstypus und Typhoid | 4 | a b | 12 3,4 | 6 1,7 | — — | 2 0,72 | 1 0,36 | 1 0,36 | — — | — — | — — | 2 0,74 | 5 1,9 | 5 1,9 | 7 2,4 | 41 13,9 | 14,4 | |
| | | Flecktyphus und Rückfallsieber | 5 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | | Malariakrankheiten | 6 | a b | 67 19,0 | 26 7,5 | 8 2,3 | 4 1,4 | 3 1,1 | 10 3,6 | 7 2,5 | 11 4,0 | 10 3,7 | 12 4,4 | 9 3,3 | 5 1,7 | 172 58,5 | 60,4 | — | |
| | | Ruhr | 7 | a b | 41 11,6 | 13 3,7 | 3 0,87 | 5 1,8 | 3 1,1 | 2 0,73 | 2 0,73 | 5 1,8 | 6 2,2 | 12 4,4 | 8 3,0 | 17 5,7 | 117 39,8 | 41,1 | — | |
| | | Asiatische Cholera | 8 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | | Sporadische Cholera | 9 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | | Epidemische Genickstarre . . | 10 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | | Infektionskrankheiten zusammen | | a b | 121 34,3 | 47 13,5 | 11 3,2 | 11 4,0 | 7 2,5 | 13 4,7 | 9 3,3 | 16 5,9 | 18 6,6 | 29 10,7 | 22 8,2 | 29 9,7 | 333 113,2 | 116,8 | — | |
| | | Vergiftungen, einschl. tierische und alkoholische | 11 | a b | — — | 1 0,29 | 1 0,29 | — — | — — | 1 0,36 | — — | — — | — — | — — | — — | 1 0,34 | 4 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| | | Gelenkrheumatismus | 12 | a b | 2 0,57 | — — | — — | 2 0,72 | 1 0,36 | 3 1,1 | — — | 1 0,37 | 1 0,37 | — — | 1 0,37 | — — | 11 3,7 | 3,9 | — | |
| | | Skorbut und Purpura | 13 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | |
| | | Hitzschlag und Sonnenstich . . | 14 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 1 0,37 | — — | 1 0,37 | — — | — — | 2 0,68 | 0,70 | — | |
| | | Andere allgemeine Erkrankungen | Karbunkel, Grippe, Zucker- ruhr, Skrofulose, Blut- armut, Leukämie, Bluter- krankheit | 15 | a b | — — | 6 1,7 | 20 5,8 | 6 2,2 | 8 2,9 | 11 4,0 | 15 5,4 | 16 5,9 | 2 0,74 | 6 2,2 | 6 2,2 | 6 2,0 | 102 34,7 | 35,8 | |
| Die übrigen allgemeinen Erkrankungen und Infek- tionskrankheiten | 16 | | | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 1 0,36 | 2 0,73 | — — | — — | — — | — — | 3 1,0 | 1,1 | |
| | Summe I | | a b | 123 34,9 | 54 15,5 | 32 9,3 | 19 6,9 | 16 5,8 | 28 10,2 | 25 9,1 | 36 13,2 | 21 7,7 | 36 13,3 | 29 10,8 | 36 12,1 | 455 154,7 | 159,6 | — | | |
| II. | Krankheiten des Nervensystems . . | 17 | a b | 2 0,57 | 1 0,29 | 1 0,29 | — — | 2 0,73 | 2 0,73 | 1 0,36 | 3 1,1 | 1 0,37 | 2 0,74 | 3 1,1 | 3 1,0 | 21 7,1 | 7,4 | — | | |

| Krankheitsgruppen | Krankheit | Nummer | a absolut b $\frac{0}{0}$ K. | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | | Jahressumme | $\frac{0}{0}$ M. |
|--|--|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Krankheiten der Atmungs- organe | Krankheiten der Nase und der Highmorschöhle, Katarrh des Kehlkopfs, der Luftröhren, Bronchien, Krupp, Asthma, Emphysem . . . | 18 | a b | 7 2,0 | 15 4,3 | 21 6,1 | 24 8,7 | 23 8,3 | 15 5,4 | 11 4,0 | 9 3,3 | 13 4,8 | 5 1,9 | 12 4,5 | 11 3,7 | 166 56,4 | 58,2 — |
| | Lungen- und Rippenfellentzündung und Ausgänge | 19 | a b | — — | — — | 1 0,29 | 1 0,36 | 1 0,36 | — — | 3 1,1 | — — | — — | — — | — — | — — | 6 2,0 | 2,1 — |
| | Lungenblutung, Schwindsucht, Miliar-tuberkulose | 20 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Summe III | | a b | 7 2,0 | 15 4,3 | 22 6,4 | 25 9,0 | 24 8,7 | 15 5,4 | 14 5,1 | 9 3,3 | 13 4,8 | 5 1,9 | 12 4,5 | 11 3,7 | 172 58,5 | 60,4 — |
| IV. Krankheiten der Zirkulations- organe | Krankheiten des Herzens, des Herzbeutels und der Arterien | 21 | a b | — — | — — | 1 0,29 | — — | 2 0,73 | — — | 1 0,36 | — — | 1 0,37 | — — | — — | — — | 5 1,7 | 1,8 — |
| | Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und Drüsen, ausschl. der dyskrasischen | 22 | a b | 4 1,1 | 4 1,1 | 2 0,58 | 8 2,9 | 12 4,4 | 6 2,2 | 4 1,5 | 7 2,6 | 15 5,5 | 9 3,3 | 8 3,0 | 12 4,0 | 91 30,9 | 31,9 — |
| | Summe IV | | a b | 4 1,1 | 4 1,1 | 3 0,87 | 8 2,9 | 14 5,1 | 6 2,2 | 5 1,8 | 7 2,6 | 16 5,9 | 9 3,3 | 8 3,0 | 12 4,0 | 96 32,6 | 33,7 — |
| V. Krankheiten der Ernährungsorgane | Krankheiten des Mundes und Rachens, der Speicheldrüsen und Speiseröhre | 23 | a b | 7 2,0 | 10 2,9 | 5 1,5 | 6 2,2 | 8 2,9 | 4 1,5 | 3 1,1 | 10 3,7 | 6 2,2 | 3 1,1 | 2 0,74 | 2 0,67 | 66 22,4 | 23,2 — |
| | Krankheiten des Magens und Darms | 24 | a b | 48 13,6 | 33 9,5 | 23 6,7 | 24 8,7 | 21 7,6 | 10 3,6 | 31 11,3 | 21 7,7 | 63 23,2 | 78 28,9 | 53 19,7 | 71 23,8 | 476 161,8 | 167,0 — |
| | Unterleibsbrüche | 25 | a b | 1 0,38 | 1 0,29 | — — | 1 0,36 | — — | 1 0,36 | 1 0,36 | — — | — — | — — | 3 1,1 | — — | 8 2,7 | 2,8 — |
| | Krankheiten der Leber, der Milz und des Bauchfells | 26 | a b | 3 0,85 | 1 0,29 | 1 0,29 | 3 1,1 | 2 0,73 | — — | — — | 1 0,37 | 1 0,37 | 1 0,37 | — — | — — | 13 4,4 | 4,6 — |
| Summe V | | a b | 59 16,7 | 45 12,9 | 29 8,4 | 34 12,3 | 31 11,2 | 15 5,4 | 35 12,7 | 32 11,7 | 70 25,8 | 82 30,3 | 58 21,6 | 73 24,5 | 563 191,4 | 197,5 — | |
| VI. | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschl. der venerischen, Krampfaderbruch, Wasserbruch usw. | 27 | a b | 4 1,1 | 4 1,1 | 1 0,29 | 4 1,4 | 8 2,9 | 9 3,3 | 7 2,5 | 5 1,8 | 4 1,5 | 6 2,2 | 7 2,6 | — — | 59 20,1 | 20,7 — |
| VII. | Venerische Krankheiten | 28 | a b | 41 11,6 | 46 13,2 | 46 13,4 | 44 15,9 | 27 9,8 | 19 6,9 | 30 10,9 | 28 10,3 | 33 12,2 | 19 7,0 | 26 9,7 | 33 11,1 | 392 133,3 | 137,5 — |
| VIII. Augen- krankheiten | Kontagiöse | 29 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Nichtkontagiöse | 30 | a b | 7 2,0 | 12 3,4 | 4 1,2 | 5 1,8 | 3 1,1 | 4 1,5 | 5 1,8 | 4 1,5 | 1 0,37 | 6 2,2 | 5 1,9 | 6 2,0 | 62 21,1 | 21,8 — |
| | Summe VIII | | a b | 7 2,0 | 12 3,4 | 4 1,2 | 5 1,8 | 3 1,1 | 4 1,5 | 5 1,8 | 4 1,5 | 1 0,37 | 6 2,2 | 5 1,9 | 6 2,0 | 62 21,1 | 21,8 — |
| IX. | Krankheiten des Ohrs | 31 | a b | — — | 6 1,7 | 3 0,87 | 1 0,36 | 3 1,1 | 1 0,36 | 2 0,73 | 3 1,1 | 1 0,37 | 4 1,5 | 7 2,6 | 6 2,0 | 37 12,6 | 13,0 — |
| | Kritze | 32 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | 1 0,34 | 1 0,34 | 0,35 — |
| X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen | Hautkrankheiten, Beingeschwüre, Zellgewebsentzündungen, Furunkel | 33 | a b | 24 6,8 | 19 5,4 | 14 4,1 | 15 5,4 | 13 4,7 | 17 6,2 | 18 6,5 | 14 5,1 | 23 8,5 | 22 8,1 | 45 16,7 | 31 10,4 | 255 86,7 | 89,5 — |
| | Gutartige Geschwülste | 34 | a b | — — | 2 0,57 | — — | 1 0,36 | — — | — — | 1 0,36 | — — | — — | — — | — — | — — | 4 1,4 | 1,4 — |
| | Summe X | | a b | 24 6,8 | 21 6,0 | 14 4,1 | 16 5,8 | 13 4,7 | 17 6,2 | 19 6,9 | 14 5,1 | 23 8,5 | 22 8,1 | 45 16,7 | 32 10,7 | 260 88,4 | 91,2 — |

| Krankheitsgruppen | Krankheit | Nummer | a absolut b $\frac{0}{100}$ K. | 1902 | | | 1903 | | | | | | | | | Jahressumme | M. $\frac{0}{100}$ | |
|---|--|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|
| | | | | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | | | |
| XI. Krankheiten der Bewegungs- organe | Entzündung der Knochenhaut, Knochen und Gelenke | 35 | a b | 1 0,28 | — | 3 0,87 | 3 1,1 | 4 1,5 | 3 1,1 | 2 0,73 | 6 2,2 | — | — | 1 0,37 | 2 0,67 | 25 8,5 | 8,8 — | |
| | Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel | 36 | a b | 14 4,0 | 13 3,7 | 10 2,9 | 7 2,5 | 14 5,1 | 13 4,7 | 13 4,7 | 5 1,8 | 6 2,2 | 6 2,2 | 7 2,6 | 5 1,7 | 113 38,4 | 39,6 — | |
| | Summe XI | | a b | 15 4,3 | 13 3,7 | 13 3,8 | 10 3,6 | 18 6,5 | 16 5,8 | 15 5,4 | 11 4,0 | 6 2,2 | 6 2,2 | 8 3,0 | 7 2,4 | 138 46,9 | 48,4 — | |
| XII. Mechanische Verletzungen | Verwun- dungen | durch Schußwaffen | 37 | a b | 1 0,28 | — | — | — | — | — | 1 0,36 | — | — | — | — | 2 0,63 | 0,70 — | |
| | | durch blanke Waffen | 38 | a b | 1 0,28 | — | — | 1 0,36 | — | — | — | — | 1 0,37 | — | — | 3 1,0 | 1,1 — | |
| | Anderweitige | Knochenbrüche, Verstauchun- gen, Verrenkungen | 39 | a b | 19 5,4 | 39 11,2 | 21 6,1 | 17 6,2 | 19 6,9 | 21 7,6 | 17 6,2 | 24 8,8 | 26 9,6 | 21 7,8 | 6 2,2 | 22 7,4 | 252 85,7 | 88,4 — |
| | | Wundlaufen und Wundreiten | 40 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | 1 0,36 | — | — | 1 0,37 | — | — | 3 1,0 | 5 1,7 | 1,8 — |
| | | Sonstige Wunden und Ver- letzungen, Verbrennungen, Frostschäden | 41 | a b | 33 9,4 | 34 9,7 | 11 3,2 | 17 6,2 | 24 8,7 | 31 11,2 | 45 16,3 | 26 9,5 | 23 8,5 | 18 6,7 | 20 7,4 | 19 6,4 | 301 102,3 | 105,6 — |
| Summe XII | | a b | 54 15,3 | 73 20,9 | 32 9,3 | 35 12,7 | 43 15,6 | 53 19,2 | 63 22,9 | 50 18,3 | 51 18,8 | 39 14,4 | 26 9,7 | 44 14,6 | 563 191,4 | 197,5 — | | |
| XIII. | Sonstige Krankheiten | 42 | a b | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | |
| XIV. | Zur Beobachtung | 43 | a b | 5 1,4 | 4 1,1 | 2 0,58 | 3 1,1 | 1 0,36 | 2 0,73 | 2 0,73 | 3 1,1 | 3 1,1 | 2 0,74 | 2 0,74 | 3 1,0 | 32 10,9 | 11,2 — | |
| | Summe 1 bis 43 | | a b | 345 97,9 | 298 85,4 | 202 58,8 | 204 73,8 | 203 73,6 | 187 67,8 | 223 81,0 | 205 75,1 | 243 89,5 | 238 88,1 | 236 87,8 | 266 89,3 | 2850 969,1 | — | |
| | Iststärke | | | 3524 | 3489 | 3437 | 2764 | 2758 | 2757 | 2753 | 2728 | 2715 | 2702 | 2689 | 2978 | 2941 | — | |

Tabelle IV.

Die durch Verunglückung verursachten Todesfälle.

A. Im Bereich der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade.

1. 1. Ostasiatisches Infanterie-Regiment, Gefreiter, innerhalb militärärztlicher Behandlung, Zerreiſung der rechten Oberschenkelblutader, Anprallen gegen eine Wagendeichsel auf durchgehendem Pony, Dezember 1902, Shanghai.
2. 2. Ostasiatisches Infanterie-Regiment, Sergeant, auſerhalb militärärztlicher Behandlung, Ersticken, Wälzen auf das Gesicht im Bett in der Trunkenheit, März 1903, Tientsin.
3. 1. Ostasiatisches Infanterie-Regiment, Gefreiter, innerhalb militärärztlicher Behandlung, Darmzerreiſung und Bauchfellentzündung, Überfahrenwerden durch einen Packwagen, Juli 1903, Tientsin.
4. Ostasiatische Eskadron Jäger zu Pferde, Jäger zu Pferde, innerhalb militärärztlicher Behandlung, Bruch der Schädelbasis und Zerreiſung der Art. Mening. Med. dextr., Sturz aus einem fahrenden Eisenbahnzuge, Dezember 1902, Tangku.

Summe 4.

B. Auſerhalb des Bereichs der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade.

Keine.

Tabelle V.

Die durch Selbstmord verursachten Todesfälle.

A. Im Bereich der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade.

1. 2. Ostasiatisches Infanterie-Regiment, Gefreiter, auſerhalb militärärztlicher Behandlung, Erschieſen, Lebensüberdrufs, Dezember 1902, Tientsin.

B. Auſerhalb des Bereichs der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade.

Keine.

Gesamtübersicht der Todesfälle der Besatzungs-Brigade.

Tabelle VI.

| Waffengattung | E s s i n d g e s t o r b e n | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| | an Krankheiten | | | infolge Verunglückung | | | infolge Selbstmordes | | | insgesamt | | |
| | inner- halb | aufser- halb | Summe | inner- halb | aufser- halb | Summe | inner- halb | aufser- halb | Summe | inner- halb | aufser- halb | Summe |
| | militär- ärztlicher Behandlung | | | militär- ärztlicher Behandlung | | | militär- ärztlicher Behandlung | | | militär- ärztlicher Behandlung | | |
| A. Im Bereich der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade. | | | | | | | | | | | | |
| Infanterie. | 9 | — | 9 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 |
| Kavallerie | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Feldartillerie | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Pioniere | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alle anderen Waffengattungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summe A | 12 | — | 12 | 3 | 1 | 4 | — | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 |
| B. Aufserhalb des Bereichs der Ostasiatischen Besatzungs-Brigade. | | | | | | | | | | | | |
| Infanterie | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Summe B | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |

bei den Lazaretten für 1902/03.


| Z u g a n g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------|--------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--|--|-----------------------|---------|---|---|----------|-------------------------------|---|---------------------------|---|------------|------------|----------------------|-----------------|-------|------|
| V. Krankheiten der Ernährungsorgane | | | | | VI. | VII. | VIII. Augenkrankheiten | | | IX. | X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen | | | | XI. Krankheiten der Bewegungsorgane | | | XII. Mechanische Verletzungen | | | | | XIII. | XIV. | | | |
| Krankheiten des Mundes u. Rachens, der Speicheldrüsen und Speiseröhre | | | | | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschl. der venerischen, Krampfaderbruch, Wasserbruch usw. | Venerische Krankheiten | Kontagiöse | Nichtkontagiöse | Summe VIII. | Krankheiten des Ohrs | Krätze | Hautkrankheiten, Beingeschwüre, Zellgewebsentzündungen, Furunkel | Gutartige Geschwülste | Summe X | Entzündung der Knochenhaut, Knochen und Gelenke | Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel | Summe XI | Verwundung durch | | Anderweitige | | | Summe XII. | Sonstige Krankheiten | Zur Beobachtung | Summe | |
| Krankheiten des Magens und Darms | Unterleibsbrüche | Krankheiten der Leber, der Milz und des Bauchfells | Summe V | Schusswaffen | | | | | | | | | | | | | | Blanke Waffen | Knochenbrüche, Verstauchungen, Verrenkungen | Wundläufen und Wundreiten | Sonstige Wunden und Verletzungen, Verbrennungen, Frostschäden | Summe XII. | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 23-26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 u. 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 32-34 | 35 | 36 | 35 u. 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 37-41 | 42 | 43 | 1-43 | |
| 3 | 28 | — | 2 | 33 | 5 | 99 | — | — | — | 1 | — | 8 | — | 8 | 7 | 1 | 8 | — | — | 7 | — | 18 | 25 | — | — | 2 | 219 |
| — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| — | 5 | — | — | 5 | 1 | 24 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 | 60 |
| — | 12 | — | 5 | 17 | 3 | 23 | — | 1 | 1 | 1 | — | 5 | — | 5 | — | 3 | 3 | — | — | 6 | — | 11 | 17 | — | — | 2 | 142 |
| 4 | 59 | — | 5 | 68 | 8 | 70 | — | 4 | 4 | 3 | — | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | — | — | 8 | — | 8 | 16 | — | 1 | 2 | 235 |
| 10 | 65 | 1 | 11 | 87 | 18 | 171 | — | 14 | 14 | 11 | — | 28 | 2 | 30 | 4 | 20 | 24 | 1 | — | 18 | — | 38 | 57 | — | — | 24 | 628 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
| 17 | 169 | 1 | 23 | 210 | 35 | 387 | — | 19 | 19 | 16 | — | 50 | 3 | 53 | 14 | 31 | 45 | 1 | — | 40 | — | 76 | 117 | — | 1 | 32 | 1287 |
| — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 7 |

Krankenzugang auf den einzelnen Transportdampfern.

Tabelle VIII.

| Name des Dampfers | | | | Ausreise nach Ostasien | Heimreise | | | | |
|--|--|---|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| | | | | Silvia | Hamburg | Bayern | König Albert | Silvia | |
| Zeit der Ausreise bzw. Heimreise (von ... bis...) | | | | 2. 8. bis 16. 9. 1903 | 25. 10. bis 13. 12. 1902 | 20. 12. 1902 bis 2. 2. 1903 | 3. 1. bis 20. 2. 1903 | 19. 9. bis 10. 11. 1903 | |
| Durchschnittsstärke des Transports | | | | 1002 | 54 | 160 | 568 | 838 | |
| Bestand waren (krank an Bord gebracht) | | | | — | — | — | — | — | |
| Zugang | | | | | | | | | |
| Gruppe | Krankheit | No. der Krankheit | a absol. b % K. | | | | | | |
| I. Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen | Infektionskrankheiten { Unterleibstyphus und Typhoid Malariaerkrankungen Ruhr | 4 | a b | — — | — — | — — | 1 1,8 | 1 1,2 | |
| | | 6 | a b | — — | — — | 1 6,3 | 3 5,3 | — | |
| | | 7 | a b | — — | 3 55,6 | — — | 1 1,8 | 11 13,1 | |
| | Infektionskrankheiten zusammen | | | a b | — — | 3 55,6 | 1 6,3 | 5 8,8 | 12 14,3 |
| | Vergiftungen, einschl. tierische und alkoholische | | 11 | a b | — — | — — | — — | 2 3,5 | — |
| | Gelenkrheumatismus | | 12 | a b | 1 1,0 | — — | 1 6,3 | 1 1,8 | 1 1,2 |
| | Andere allgemeine Erkrankungen: Karbunkel, Grippe, Zuckerruhr, Skrofulose, Blutarmut, Leukämie, Bluterkrankheit | | 15 | a b | 2 2,0 | 1 18,5 | — — | — — | — — |
| | Summe I | | | a b | 3 3,0 | 4 74,1 | 2 12,5 | 8 14,1 | 13 15,5 |
| | II. | Krankheiten des Nervensystems | 17 | a b | — — | 1 18,5 | — — | — — | 1 1,2 |
| | III. Krankheiten der Atmungsorgane | Krankheiten der Nase und der Highmorshöhle, Katarrh des Kehlkopfs, der Luftröhren, Bronchien, Krupp, Asthma, Emphysem | 18 | a b | 5 5,0 | — — | — — | 11 19,4 | 2 2,4 |
| Lungen- und Rippenfellentzündung und Ausgänge | | 19 | a b | — — | 2 37,0 | — — | — — | — — | |
| Lungenblutung, Schwindsucht, Miliartuberkulose | | 20 | a b | — — | 1 18,5 | — — | — — | — — | |
| Summe III | | | a b | 5 5,0 | 3 55,6 | — — | 11 19,4 | 2 2,4 | |
| IV. Krankheiten der Zirkulationsorgane | Krankheiten des Herzens, des Herzbeutels und der Arterien | 21 | a b | 1 1,0 | 1 18,5 | — — | — — | 1 1,2 | |
| | Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und Drüsen, ausschließlich der dyskrasischen | 22 | a b | 2 2,0 | 1 18,5 | — — | 1 1,8 | 2 2,4 | |
| Summe IV | | | a b | 3 3,0 | 2 37,0 | — — | 1 1,8 | 3 3,6 | |
| V. Krankheiten der Ernährungsorgane | Krankheiten des Mundes und Rachens, der Speicheldrüsen und Speiseröhre | 23 | a b | 7 7,0 | 1 18,5 | 1 6,3 | 8 14,1 | 1 1,2 | |
| | Krankheiten des Magens und Darms | 24 | a b | 9 9,0 | — — | — — | 8 14,1 | 17 20,3 | |
| | Krankheiten der Leber, der Milz und des Bauchfells | 26 | a b | 1 1,0 | 1 18,5 | — — | 3 5,3 | 3 3,6 | |
| Summe V | | | a b | 17 17,0 | 2 37,0 | 1 6,3 | 19 33,5 | 21 25,1 | |

| Name des Dampfers | | | | Ausreise nach Ostasien | Heimreise | | | | |
|--|---|---|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| | | | | Silvia | Hamburg | Bayern | König Albert | Silvia | |
| Zeit der Ausreise bzw. Heimreise (von... bis...) | | | | 2. 8. bis 16. 9. 1903 | 25. 10. bis 13. 12. 1902 | 20. 12. 1902 bis 2. 2. 1903 | 3. 1. bis 20. 2. 1903 | 19. 9. bis 10. 11. 1903 | |
| Durchschnittsstärke des Transports | | | | 1002 | 54 | 160 | 568 | 838 | |
| Bestand waren (krank an Bord gebracht) | | | | — | — | — | — | — | |
| Zugang | | | | | | | | | |
| Gruppe | Krankheit | No. der Krankheit | a absol. b % K. | | | | | | |
| VI. | Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, ausschl. der venerischen, Krampfadernbruch, Wasserbruch usw. | 27 | a b | 1 1,0 | — — | — — | 1 1,8 | 4 4,8 | |
| VII. | Venerische Krankheiten | 28 | a b | 5 5,0 | 1 18,5 | 11 68,8 | 55 96,8 | 32 38,2 | |
| VIII. Augenkrankheiten | (Nur nichtkontagiöse) | 30 | a b | 6 6,0 | — — | — — | 4 7,0 | 2 2,4 | |
| IX. | Krankheiten des Ohrs | 31 | a b | 2 2,0 | — — | — — | — — | 4 4,8 | |
| X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen | Hautkrankheiten, Beingeschwüre, Zellgewebsentzündungen, Furunkel | 33 | a b | 31 30,9 | 2 37,0 | 2 12,5 | 9 15,8 | 19 22,7 | |
| | Gutartige Geschwülste | 34 | a b | 2 2,0 | — — | — — | — — | — — | |
| Summe X | | | a b | 33 32,9 | 2 37,0 | 2 12,5 | 9 15,8 | 19 22,7 | |
| XI. Krankheiten der Bewegungsorgane | Entzündung der Knochenhaut, Knochen und Gelenke | 35 | a b | 1 1,0 | — — | — — | 2 3,5 | 2 2,4 | |
| | Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel | 36 | a b | 3 3,0 | — — | 1 6,3 | 8 14,1 | 3 3,6 | |
| Summe XI | | | a b | 4 4,0 | — — | 1 6,3 | 10 17,6 | 5 6,0 | |
| XII. Mechanische Verletzungen | Verwundungen durch Schußwaffen | 37 | a b | — — | — — | — — | 1 1,8 | — — | |
| | Anderweitige | Knochenbrüche, Verstauchungen, Verrenkungen | 39 | a b | 3 3,0 | — — | — — | 3 5,3 | 4 4,8 |
| | | Wundlaufen und Wundreiten | 40 | a b | — — | — — | — — | — — | 1 1,2 |
| | Sonstige Wunden und Verletzungen, Verbrennungen, Frostschäden | 41 | a b | 5 5,0 | 2 37,0 | 2 12,5 | 3 5,3 | 3 3,6 | |
| Summe XII | | | a b | 8 8,0 | 2 37,0 | 2 12,5 | 7 12,3 | 8 9,5 | |
| XIII. | Sonstige Krankheiten | 42 | a b | — — | — — | — — | 1 1,8 | — — | |
| XIV. | Zur Beobachtung | 43 | a b | — — | 1 18,5 | — — | 6 10,6 | 1 1,2 | |
| Summe 1 bis 43 | | | a b | 87 86,8 | 18 333,3 | 19 118,8 | 132 232,4 | 115 137,2 | |

012743




Gedruckt in der Königl. Hofbuchdruckerei von E. S. Mittler & Sohn,
Berlin SW, Kochstraße 68—71.



Aug. 19. XII. 25. C.

Biblioteka Uniwersytecka
w Toruniu

012173 / 1902-03