

W4494741

ALBERTI HALLER

PHIL. ET MED. D. P. P. O.

OBSERVATIONES
BOTANICAE

EX ITINERE

IN SYLVAM HERCYNIAM

ANNO MDCCXXVIII SVSCEPTO.



W
Haller

GOTTINGAE

SVMTV MICH. TURPIONIS.


Embossed signature

44



7294





§. I.

Pauculos elapsae aestatis dies inpendimus itineri per Hercyniam syluam, quo suprema eius iugater omnino superauimus, vidimus fodinas argentiferas Clausthalenses, antiquissimas Vitrioli, sulphuris, Cupri, Plumbique Venas Montis Rammelii, Montem tandem Bructerum qui in hac boreali Germania altissimus habetur; atque plusculas stirpes collegimus vel lectas olim a THALIO, sed postliminio demum in notitiam Botanicorum reuocandas, vel alioquin non vbiique obvias, neque explicatas satis. Operae ergo precium duximus ut obscuriores stirpes, adeo incognitas hodie ut pene nouae sint, describeremus, enarraremus dubia synonyma aliarum, vulgationes demum alias, sed montanas tamen, ipsis saltem nominibus indicaremus.

§. II.

In luco WEENDAE proximo, ad primum a *Goettinga* lapidem PETASITES nascitur non visus in *Helvetia*

vetia, & cuius nomen difficile fuerit cruere. Nascitur ad purissimam scaturiginem, quae rotas agit molendini comminuendis in Chartam scriptoriam pannis destinati. A vulgari heluetico, qui *maior vulgaris* passim audit, non foliis adeo differt, sed spica floris longiore, laxiore, pedali, rara, pedicellis longis & saepe pendulis : *Calyce* non longo adeo, neque acutis, neque reflexis, sed subrotundis squamis facta, vno concinno ordine flosculos preesse circumstantibus : *Flore* in quacunque aetate albo & quasi sene, quod vix nisi pappus seminum ultra calycem emineat, multo exiliore quam in nostro *maiori*; *Flosculis* demum androgynis paucissimis, uno vel altero, subrubellis, qui multis femininis flosculis cinguntur, quorum semen & pappus eadem sunt, sed campanulae loco bifidus *Tubus* est, emitens absque omni stamine *Tubam*. Promptum est, & Character id suadere videtur, referre nostram stirpem ad *primam speciem Petasitiis maioris vulgaris*, quam RVPIVS a) dixit duorum generum flosculos habere. Eam BVXBAVM b) repetit nomine *Petasitis in medio maioribus flosculis, reliquis minoribus*. In *synopsi stirp. Britannicar. Ed III.* c) vocatur *Petasites maior floribus longis pediculis insidentibus*; eodemque nomine pulcherrime depingitur in *Hort. Eltham.* d) Verum ab ea facile nostra distinguitur flore lato non ventricoso, & calyce, cuius in DILLENIANA icona squamae videntur multorum ordinum pingi, a nostra fabrica diuersissimae.

Missus

a) *flor. Jenens.* p. 153.b) *Enum. plant. circa Halam nasc.* p. 258.

c) p. 179.

d) p. 309. ic. CCXXX.

Missus est hic ipse Weendensis Petasites pro *Petasiti-de minori* C. B. P. Verum licet iste manifesto flosculos duorum generum habeat, vti ex primi inuentoris CAMERARI^e iconē adparet, & haud dissimilem a nostra aut RVPPIANA stirpem a Germanis THALIO, f) SCHWENKFELDIO g) LOESELIO h) HOFMANNO i), VOLKAMERO k) DILLENIO l), a BESLERO m) deinceps descriptam esse, vel ipsa locorum similitudo suadeat, certum tamen est n) *Petasitidem minorem* C.B. Cacaliae tormentosae ad finem esse, & hinc molli lanugine obductum folium habere, inde fature virens & glabrum paucō goffypio pubescens. Sed & I. B. aliam stir-

A 3

pem

- e) *Petasites flore albo* Epit. Matth. p. 593. Idem vocat *Petasiten nostrum Leucanthemon* hort. p. 122. qui licet odoratus ibi dicatur, descriptus equidem videtur a LVGDVNENSIBVS nomine *Petasitis odorati*, non vero depictus p. 1054, florū enim icon & situs omnino ad vulgarem pertinet.
- f) *Petasites flore candido* hercyn. p. 91. Andersbergae..
- g) *Petasites alpina*, stirp. Siles. p. 155. quem dicit flore esse subluteo.
- h) *Petasites minor* Flor. Pruss. p. 192.
- i) *Tussilago maior altera* sive *Petasites minor*. Delic. sylv. Flor. Altd.
- k) *Flor. Norimb.* p. 325. *Petasitem minorem* vocat.
- l) *Catal. plant. circa Gieff. nasc.* p. 37.
- m) in *hort Eystettens. Hybern. Tab. V. f. II.* vbi equidem icones commutatas esse & haec quidem vulgarem, quae vero vulgarem dicunt illum *flore albo* exprimere videtur, si figuræ florū propius species.
- n) *ex herb. viv. Quare & SCHEVCHZERV^s* noster *Itin. V.* p. 425, cum *Cacalia tormentosa* eum coniunxit,

pem videtur intellexisse o), qui sexus diuersitatem descriptione sua excludit. Diligentissimus tandem RAVIS p) Genuae suam plantam descripsit, vt vix Germanici soli videatur. Quare nostram, neque pro CAMERARIANA q) neque pro RVPIANIA stirpe tradere ausi, proponimus eruditorum disquisitioni: neque sustinemus pronunciare cuinam ex tribus propositis plantis conueniant synonyma AMBROSINI r), MORISONI s), HERMANNI t), SVTHERLANDI u), MAGNOLII x) TOVRNEFORTII y), PLVKNETII z), RAIJ aa) PONTEDERAE bb), LEMERYI cc), TILLI

- o) v. *Petasites albus anguloso folio, hist. plant.* III. p. 567. qui *Petasites folio anguloso, radice geniculata caule striato* dicitur CHABRAEO *Sciagraph.* p. 513.
- p) *Syllag. Plant. extra Brit.* p. 201. vti & I. B. pro exoticade-
scriptit.
- q) Quam, Germanica cum sit, & Noribergae ab eius excessu
perpetuo visa, proximam nostrae vel eamdem esse auguramur.
- r) *Petasites minor Phytolog.* p. I. p. 419.
- s) *Petasites flore albo.* *Hort. Bles.* p. 156. *Petasites maior albus an-*
guloso folio H. ox. III. p. 95.
- t) *Petasites albus anguloso folio.* *H.L.B.* 438.
- v) *Flor. Bat. Petasites minor.*
- u) *Hort. Edimb. Petasites minor.* p. 257.
- x) H. R. M. p. 157. eodem nomine.
- y) eod. *Schol. Bot.* p. 10. & I. R. H. eodem.
- z) *Almageſt.* p. 288. nomine I. B.
- aa) eodem *Hist. plant.* I. p. 261. ex I. B.
- bb) eodem *Diss.* p. 159. vbi de flosculis femininis nulla fit
mentio.
- cc) *Diction. de drog. simpl.* p. 416. *Petasites minor.*

TILLI dd), VAILLANTII ee), BOERHAAVII ff), MILLERI gg), WALTHERI hh) De vulgari maiori addere visum est, icones FVCHSII ii), TRAGI kk), MATTHIOLI ll), TABERNAEMONTANI mm), spicam nimis arctam & breuem facere, optimam vero esse, quam DODONAEVS nn), LOBELIVS oo), & CLVSIS pp) proposuerunt.

§. III.

In omnibus circa Goettingam nemoribus, vmbrosis locis & in dumetis, prouenit Pyrolae species, cui Tuba recta est, minor quam altera cui stamina & Tuba declinata sunt, folio frequentius serrato, spica breviori, & densiori. Pau-
lorarior obseruante RAIO a) est haec altera, atque montana
herc-

dd) *hort. pisan.* 133. eodem nomine.

ee) *Memoir. de l' Acad.* 1719. p. 403. eodem.

ff) eod. *Ind. alt. hort. Lugd. Bat.* p. 118.

gg) *Gardeners Dictionary* nomine I. B.

hh) *designat. plant. hort. sui* p. 95. *Petasites maior flore albo:*

ii) p. 644.

kk) eadem p. 414.

ll) p. 849.

mm) p. 749.

nn) *Pempt. ed. 1616.* p. 597.

oo) *Icon.* p. 591.

pp) *Hist. plant.* p. CXVI.

a) *Catal. stirp. in ext. region* 1673. p. 59. & in altera Editione 1694.

five *Catal. stirp. Exterar.* p. 211. coniecturam addidit de diuer-
sitate sexus, quam nemo lecutus est,

hercyniae syluae nemora Iurassique coryleta amat,
speciosa altitudine, spica laxa longiori, Tuba pro-
boscidis instar ex pendulo flore incurva, foliis vix serra-
tis amplioribus. Difficile est synonyma inter utramque
partiri, cum ante RAIVM diuersitas earum neglecta
fuerit. Manifestum tamen est, maiorem cui stamna &
Tuba deflexa sunt, proponi a CAMERARIO. b) IOH.
BAVHINO c), & post hos a RAIO d) RIVINO e), RVP-
PIO f) TOVRNEFORTIO g), LEMERYO h), DIL-
LENIO i), ERNDTELIO k) LINNAEO l). Non ita
certum est eamdem proponi a LOBELIO m), aut utram-
que

- b) *Pyrola*. EPIT. Matib. p. 723. spica laxa, Tuba incurua, folia iusto longiora.
- c) descript. *Pyrolae*, ubi florem difformem & Tubam recurvam habet histor. Plant. p. 535. Icon. ex DODONAEO est obscurius diuersitatem exprimens.
- d) HIST. plant. II. p. 1233. & synops. III. p. 363. ubi minorem Tuba recta distinguit, a maiori de qua agimus.
- e) qui diuersis iconibus, & nominibus *Pyrolae*, *Pyrolae folio rotundo* & *Pyrolae folio obtuso* maiorem nostram expressit Pen-
tapet. Irreg.
- f) cui est *Pyrola maior* & elatior foliis oblongis pistillo florum in-
curvo, flor. Ienens. p. 236.
- g) Mat. medic. L. II. p. 140. L. III. p. 190. ex descriptione.
- h) *Pyrola* Dict. dos Drog. p. 451. & T. 18.f. 14. ic. DODONAEI.
- i) Cat. plant. circa Gieff.. p. 94. *Pyrola*.
- k) ad mentem RIVINI *pyrolam* vocat, & denuo *pyrolam* folio
obtuso. Viridar. Warsaw. p. 92.
- l) *Pyrola flaminibus* & *pistillis declinatis* Fl. Lapon. 169.
- m) *Pyrola* a *pyrifolio* Ic. stirp. p. 294. similis CAMERARIANAE
sed obscurior.

que distingui a CLVSIO n); neque satis eas distinxit BESLERO) aut MORISON p). Sed Tubam rectam adeo- que alteram speciem habent RIVIN. q) RVPPIVS r., WAL- THER s), DILLENIVS t). Plane non liquet de stirpibus BRVNFELESII u), DORSTENI x), FVCHSII y) TRAGI, z), GESNERI aa) LONICERI, bb) MATTHIOLI cc), DODO- NAEI,

- n) Varietatem facit *Pyrolae vulgatioris* folio maior & molliori & aliā folio minori & duriori, PANN. p. 505. & Hist. CXVI. descr. sed veras notas distinguēntes non tradit: Eas vari- etates servat C. B. P. & MOR.
- o) *Pyrola H. EYST.* Aest. Ord. V. T. XI. f. 2. folia & exiguitas plantae respondent, Tubae aliae rectae, aliae incurvæ.
- p) *Pyrola rotundifolia maior.* H. Oxon. III. p. 504. habet de- scriptionem I. B., icones duas, aliām rectis, aliām incurvis Tubis, hancque maiorem.
- q) *Pyrola minor.* Pentap. irreg. bene.
- r) *Pyrola rotundifolia maior. flor. Ienens.* p. 236.
- s) *Design. plant. bort. sui.* nomine RIV.
- t) *Catal. plant. circa Gieſſ.* p. 94. eodem nomine, tum *synops.* RAIANAЕ Edit. III. p. 363.
- u) *Pirolae HIERONYMVS HERBAR.* II. p. 312. facit marem & feminam. BRVNFELES v, III. p. 88. obſcuram dat Iconem.
- x) ſimilis icon. p. 225.
- y) *Limonium c. 175.* p. 467. Tuba brevis recta, ſed ſpica rara, habitus altior.
- z) *Limonium sylvestre* p. 707: ead. Icon.
- aa) *de collect. ſtirp. Pirola,* nihil diſtingui, neque *Pirola vulgo dicta* bort. German. p. 272. b.
- bb) *Limonium pratense berbar.* Germ. 1560. L. V. cap. 235. ha- bet icones DORST. & FVCHSII.
- cc) in DIOSC. p. 982.

NAEI, dd) CAESALPINI ee) CASTORIS ff) THALII gg)
 LVGDVNENSIVM hh), TABERNAEMONTANI ii),
 SCHWENKFELDI kk), C. BAVHINI ll) PARKISONI mm)
 AMBROSINI nn), MERRETI oo) LOESELII pp) ELSHOL-
 ZI qq), HOFMANNI rr) NYLANDI ss), COMMELINI tt)
 HERMANNI uu), KNAVTHII xx) MAGNOLI yy,)
 FRANCI zz), SIBBALDI aaa) SVTHERLANDI bbb),
 PLVK-

- dd) *Pempt.* ed. 1616. p. 138. *Pyrola*,
 ee) *de plant.* L. VIII. cap. 32.
 ff) *Pirola herb. nuovo* p. 363.
 gg) *bercyn.* p. 85. *Pyrola maior seu Beta sylvestris*.
 hh) *ex Dodon. hist. plant.* p. 841.
 ii) *Pyrola* p. 718. ad minorem *Tubarecta* videtur pertinere
 ob folia crenata &c.
 kk) *Pyrola maior* p. 172. *stirp. files*.
 ll) *Pyrola rotundifolia maior.* C. B. P. & *plant. Basil.* p. 56.
 mm) *Pyrola nostras vulgaris* p. 508. cum *icone Lobel.*
 nn) *Pyrola maior sine beta sylvestris Phytol.* p. 450.
 oo) *Pyrola Pin. ver. Brit.* p. 99.
 pp) *Pyrola rotundifolia maior. flor. pruss.* p. 209.
 qq) eod. nomine, *flor. March.* p. 163,
 rr) *Pyrola Delic. sylv. altd.*
 ss) *nederl. Kruyt.* 6. p. 112.
 tt) *Pyrola rotundifolia maior. catal. pl. indig. boll.* p. 92.
 uu) *H. L. B.* p. 311.
 xx) *Enum. plant. circa hal.* p. 64.
 yy) *H. R. M.* p. 166.
 zz) *Pyrola limonium, Flora francica* p. 468.
 aaa) *Pyrola, spec. hist. nat. Scot.* p. 44.
 bbb) *Catal. plant. hort. Edimburg.* 281.

PLVKNETIccc), VOLKAMMERI ddd), MVNTINGII eee),
 TOVRNEFORTII fff), TITAE ggg), IOHRENII hhh),
 TILLI iii), DALE kkk), LINDERI III), BOECLERI mmm),
 BVXBAVMI nnn), SIEGESBECKII ooo), VAILLAN-
 TII ppp).

De maiori omnino loqui videtur TOVRNEFORT
 qqq), & BOERHAAVIVS rrr).

De minori DUVERNOI sss), & MICHELI ttt).

B 2

Py-

ccc) Almagest. Bot. p. 309.

ddd) Pyrola nostras vulgaris, Flor. Nor. p. 347.

eee) Pyrola officinarum vulgaris, waare offening p. 552.

fff) schol. Bot. p. 5.

ggg) bort. Mauroc. p. 141.

hhh) Vadem. botan. p. 169.

iii) bort. pisan. p. 141.

kkk) Pyrola pharmacol. p. 333.

III) Pyrola rotundifolia maior. Tournef. Alsat. p. 100.

mmm) Mater. Med. p. 560.

nnn) enum. plant. circa Hal. p. 274.

ooo) Pyrola rotundifolia maior. Primit. flor. Petrop. p. 92.

ppp) Botan. paris. p. 169.

qqq) IRH. conf. Tab. 132.

rrr) Jnd. Alt. p. 278. Characterem enim genericum utriusque
 subit Tuba incurva.

sss) Pyrola rotundifolia minor. Catal. pl. circa. Arc. Tub. p. 123.

in quo natali solo ipse legi minorem vulgarem, nunquam
 eam, cuius nomen dedit AVCTOR, raram & montanam
 stirpem.

ttt) Pyrola folio subrotando leviter crenato apud TILL. Hort.
 pis. p. 414,

Pyrola rotundifolia minor RVPPII uuu); quam cum duriori CLVSII coniungit, videtur minoris varietas esse.

§. IV.

In sylvis inter Niirten & Soeterohr *Fungus parvus lubricus*, *aureus*, *lamellis raris amplioribus pediculo crassiore* 1) repertus est: cui pediculus flavus splendens, latus, in medio linea depresso notatus: Capitulum leniter pulvinatum vel planum, totum viscidum, superius aurantium, lamellis raris, paucis, crassis pallidioribus. Eam vero syluam egressi, in agello cis pagum Soeterohr elegantia sua spectabile vidimus *Papauer erraticum maius flore albo*, varietatem nempe vulgaris rubri, quam pro rarissima habuit C. BAVHINVS 2). Eius mentionem opinione pauciores visi sunt fecisse, MORISON 3), RAIVS 4), VOLCAMMER 5), TOURNEFORT 6), TILLI 7), VAILLANT 8), & BOER-HAAVE 9). SUTHERLANDUS 10), copiosus florum albedine variantium nomenclator, hunc quidem non habet. Ungues flavi sunt, bracteae niueae.

§. V.

uuu) *flor. Jenens.* I.C.

1) MICH. *nov. gen. plant.* p. 147.

2) PIN.

3) H. OXON. II. p. 277.

4) HIST. PLANT. p. 855. syn. III. p. 308.

5) *flor. Noric.* p. 317.

6) IRH

7) *hort. pisani.* p. 131.

8) *Bosan. Paris* p. 156.

9) *ind. alt.* p. 280.

10) *Vid. hort. Edimburg.* p. 260.

§. V.

Pluvia intercessit diligentiae nostrae, quae ubi coelo sereniori excepta fuit, in pratis apricis sesquileuca cis Osterodam viae Regiae sinisterius adjacentibus, plantulas aliquas perelegantes legimus. Universum solum tegebatur *Trifolio Lupulino minimo*, quod primus distincta iconē & descriptione sufficiente adseruit DILENIVS. 1) Sed primus id proposuisse videtur THALIUS, cuius vestigia legendō, non sine voluptate aliqua plantas haud paucissimas restituere didicimus, quae ut laterent, fecit iconum defectus, descriptionum brevitas, ac ipsa saepe ubertas congenerum. Descritit nempe *Trifolium Lupulinum*, tum aliud, quod Medicaginis species est, sed tertium addit, 2) *minus suffruticans ferme, viticulis multis exiguis, gracilibus & striatis in terra direptans, quosdam etiam dodrantali altitudine erigens, foliis brevioribus, humani ferē cordis (qua nempe figura vulgo pingi solet) aliquam similitudinem experimentibus, ac pulchre suis neruis striatis: capitulis florū & racemis semenum iisdem cum priori (Medicagine) Reperitur in aridioribus pratis, marginibus & sécūs vias*. Sic ille. Folia cordis humani figura & striae foliorum, manifesto indicant, non esse varietatem Medicaginis, cui folia molliora subhirsuta neque cordata sunt. Deinde nostrum esse, ipse locus natalis indicat in apricis & siccioribus hercyniae sylvae pratis, Quod capitula Medicagini similia faciat THALIUS, videtur ex familiari seculo

B 3

illo,

1) *Synops. III p. 31. T. XIV. f. 4.*2) *hercyn. Saxono-Thuring. p. 124.*

illo neglectu minutioris observationis factum esse. Dignoscitur a reliquis facile, foliis concinne striatis hilo majori excisis, capitulo vix ultra novem flosculos habente, ipsa statura humiliori cum duritie tamen et fruticosa natura coniuncta. Si coniecturae locus esset, *Trifolium lupulinum alterum minus*, *Catal. plant. circa Cantab.* p. 166. & *Cat. Stirp. Angl.* p. 290. omnino cum hoc nostro coniungerem. Ea enim RAIVS locis modo citatis dicit omnium Trifoliorum Anglicorum minima esse, cum *Trifolium Lupulinum alterum minus in Hist. Plant.* 949. & *Syn. III.* p. 330. caules habere dicat etiam ramosiores & maiores quam vulgare Lupulinum maius. Verum longe certiora synonyma sunt, *Trifolium luteum Lupulinum minimum* H. OX. 3) SVTHERL. 4) IRH. BVXBVM, 5) VAILL. 6) *Trifoliastrum pratense Lupulinum annuum luteum omnium minimum, foliis cordatis, siliculis compressis, monospermis* MICHEL. 7) *Lupulinum minimum* RVPP 8) & GEMEINHART. 9)

§. VI.

Abundant ea prata in primis Orchidibus. Inter quas solam excitare libuit *Monorchis*, cum altera, quae odore

- 3) II. p. 142.
- 4) *hort. Edimb.* p. 341.
- 5) *enum. plant. circa Hal.* p. 325.
- 6) *Botan. Paris.* p. 196.
- 7) *nov. gen. plant.* p. 29. Annon huc etiam *Trifolium arvense Lupulinum supinum minimum subluteum folio cordato.* MICHEL. apud TILL. p. 168?
- 8) *flor. Jenens.* p. 207.
- 9) *plant. circa Laub.* 69.

odore hirci minor est. MONORCHIS equidem habitu & staminum fabrica Orchis est, differt galeae duobus foliis non vt in Orchide solent simplicibus, sed ex scutulo pallido spinulam producentibus 1), defectu calcaris, radice vnicula, substantiae paulo firmioris. Odor suauis & mellitus est. Admiratio subit, quando apud CB. vnicum synonymon video CLVSII, 2) cum dubio de alio synynomio C. Gesneri. Namque praeterquam quod de C. GESNERI 3) stirpe dubium nullum sit, manifeste huc pertinet, *Satyrii VII. prima species in apricis montibus TRAGI.* 4) deinde *Triorchides LOBELIANAE*, quibus rotundi bulbi sunt. & quas nemo mortalium post GEMMAM distinctas vedit. Sunt hae *Orchis frisia littoralis* siue *triorchis lutea tertia LOBELLII* 5) ex qua nata est *Orchis Frisia littoralis LVGDVN.* 6) PARKINS 7) AMBROSI- NI. 8) *Testiculus luteus* : *Orchis lutea TABERN.* : 9) *Orchis*

1) conf. opt. Icon. MICH. pro labello inferiori etiam IOH. BAVHINI.

2) *Orchis pusilla alba odorata* EIVS Pann. p. 239, *Orchis VII. hist. p. 269.*

3) *Satyrii species quam monorchin dixeris* GESN. hort. Germ. p. 279.

4) *herbar.* p. 782. altera vero species in uliginosis pratis autumno florens est *Orchidastrum* MICH. cuius & icon adest.

5) *Icon.* 186. icon exterior: folia vero hirsuta valde anomala sunt. Nostram esse & radicum forma & floris effigies rudior indicat. Ejus autem *Varietas Orchidastrum* videtur.

6) *hist. gener* p. 1560. ic. int.

7) *Theatr. Botan.* p. 1355.

8) *Phytolog.* p. 394.

9) *Icon.* p. 670.

chis lutea hirsuta folio CB. 10) MORIS. 11) *Orchis Frisia lutea* MERRET. 12) *Orchis Frisia hirsuta* IB. 13) RAI 14) *Orchis Frisia hirsuta littoralis* Lobelii CHABR. 15) Deinde hic facit *Orchis minor Leodiensis* LOBEL. 16) AMBROS. 17) ex qua prouenerunt *Triorchis lutea Gemmae LVGD.* 18) *Triorchis lutea altera* CB. 19) RAI. 20) *Triorchis lutea Leodiensis* PARKINSONI. 21) & vti plane videtur, *Triorchis lutea I.* TABERNAEM. 22) Tandem hic etiam referenda est *Triorchis lutea flore luteo sive Basilia minor, serapias* & *Triorchis Aeginetae* LOBELII. 23) quae eadem est *Triorchis lutea flore luteo Gemmae LVGDVN.* 24) *Triorchis lutea II.* TABERN. 25) *Triorchis lutea*

10) *Pin.*11) *H. Oxon.* III. p. 497.12) *Pin. rer. Brit.* p. 87.13) *hist. univ* II. p. 769.14) *hist. Plant.* p. 1717. cum signo ignotas indicante15) *Sciagraph.* p. 252.16) *icon.* p. 187. in semine.17) *phytolog.* p. 394.18) *hist. gener.* II. p. 156t.19) *Cat. plant. circa Basil.* p. 23. indicata in monte *Wassersall*, ubi nemo vidit distinctam stirpem a *Monorchide* totius helvetiae familiari planta.20) *Cat. plant. exter.* p. 193.21) *Theatr.* p. 1555.22) *icon.* p. 677. licet paulum a LOBELIANA immutata sit.23) *icon.* p. 187. exterior.24) *hist. gener.* p. 1561.25) *Icon.* p. 677.

lutea folio glabro CB. 26) MOR. 27) RAI. 28) *Triorchis lutea altera Gemmae folio glabro* PARKINSON 29) Quare non erat, cur quinque nomina noua obrutae iam huius herbulae historiae inferret MENZELIVS 30) neque erat cur in MENZELIO confisteret MICHELIVS 31), ante quem tot fuerant huius Monorchidis descriptores, & inter eos eximius CLVSIVS atque I. BAVHINVS. 32) Alias etiam icones dederunt LOESELIVS 33) & RVPPIVS 34) non optimas tamen, & nomina PARKINS. 35) MORISON, 36) RAI 37) MERRET 38) PLVKNET 39)

26) *Catal. plant. circa Basil.* p. 23. circa arcem Birseck, vbi a nemine hucusque alia reperta est, & Pin.

27) H. ox. III. 497.

28) *Catal. plant. extr. Brit.* p. 193. & *Hist. Plant.* p. 1217. cum signo indicante sibi ignotam fuisse.

29) *Theatr. Bot.* p. 1355.

30) *Pugill. Stirp. rar. post Lexicon,* cum figuris mediocribus Tab. V. Eadem exstant etiam apud RAIVM p. 1216, 1217. & MOR. III. p. 497.

31) in ejus historia novo nomine proposita nov. gen. plant. p. 30.

32) cui est *Orchis parva autumnalis lutea* II. 768.

33) *Orchis coleo unico seu monorchis florculis pallide viridibus flor. pruss.* p. 154. Icon n. 6 i, an hoc etiam referenda *Opbris monophyllum bulbosum* id. p. 180. & Ic. 57?

34) *Flor. Jenens.* T. II.


35) *Orchis pusilla odorata* *Theatr.* p. 1354.

36) *Orchis odorata moschata sive monorchis* H. ox. III. p. 499. quo nomine & CB. & AMBROSINVIS vsi fuerant.

37) *Hist. plant.* p. 1217. eod. nomine & Syn. III. p. 378. in *Cat. Stirp. Angl.* p. 217. nomine PARKINS utitur.

38) *Pin. rer. brit.* p. 87. eodem.

C



39) SCHEVCHZER 40) vt mirabile sit longe magis, quod omissa sit a TOVRNEFORTIO, Galliae forte non indigena. Nomen antiquum *Monorchis* efficax & breve videtur; neque mallem illud HERMINII quod inposuit CL. LINNAEVS 41)

§. VII.

Paulo proprius speculam sed in eodem prato, sicciori tamen loco, nascitur frequens *Orchis odore hirci minor*, cui *Folia* angusta cauli adpresso, *spica* florum laxa odore cimicum, *Cucullus* ita arctus ut trifolium esse iurares, colore aut viridi aut obsolete purpureo, aut mixto ex vtroque, cum lineis saturationibus: Duo Petala acutiora latent inter reliqua: *Apices* pallidi; *Barba* trifida ad ouarium reflexa, segmentis lateralibus uno alteroue dente insignibus, medio mucronato, viridis aut ex purpureo virens, punctis in medio rictu purpureis. *Calcar* purpureum parallelum ouario. Hanc speciem num DODONAEVS a) atque CLVSIVS b) descri-

39) *Almag. Bot.* p. 271. nomine CB.

40) eod. It. VII. p. 516. cum charadere.

41) *Flor. Lapon.* n. 317.

a) *Minores testiculi hujus generis* 4. (nempē Morionum) DOD.

pl. Coron. p. 216. & *Pemptad.* p. 235. videtur ex colore vario, odore ingrato, & quod vix alia *Orchis* sit, cui haec voces DOD. tribui possint.

b) *Pro Orchide VI. Histor.* p. 268. Convenit odor; sed color, & spica arcta, non admodum respondent. Coniunxit tamen VAILLANTIVS. Natae sunt ex stirpe CLV-

scripserint, non satis liquet; de LOBELIO c) vero res extra controuersiam est, cuius prima Icon, neque mala est, habitu etiam reflexo expresso, licet TABERNAE-MONTANI d) figura etiam magis placeat. VAIL-LANTIVS e) non nisi flores dedit. Descriptio prae-stantissima est RAI f) Caeterum LVGDVNENSES g) CASPAR BAVHINVS, h) IOH. BAVHINVS, i) CHABRAEV-S, k) PARKINSONVS, l) AMBROSINVS. m) MORISONVS n) NYLAND o), MAGNOL, p) TOVRNEFOR-

C 2

TIVS,

SII, *Orchis odore hirci minor spica purpurascente* CB. IRH.
spica purpurea H. OXON. III. p. 492. *Orchis Batavica* IB. II.
 764. CHABR. p. 250. *Tragorchis batavica* Clusii PARK
 1049.

- c) *Tragorchis minor* & verior C^t Gemmae s. coriosmites & Corio-phora flore inflar cimicum LOBEL. IC. p. 177.
- d) *Testiculus hircinus* III. minor. Icon. omn. stirp. p. 672.
- e) *Bot. Paris* T. XXXI. f. 30. 31. 32. absque nomine. Idem nomine a CB. adcepto describit *Bot. Par.* p. 149. & varietatem addit flore subviridi.
- f) *Histor. plant.* p. 1213. *Tragorchis minor* flore fuliginoſo.
- g) *Tragorchis minor* & verior Gemmae LVGD. 1557.
- h) *Orchis hirci odore minor* PIN.
- i) *Tragorchis minor* flore fuliginoſo II. p. 764.
- k) *Sciagraph.* p. 250. eodem nomine.
- l) *Tragorchis minor* & verior Theatr. p. 1349.
- m) nomine C. B. *Phytol.* p. 392.
- n) eodem H. OXON. III. p. 491. S. XII. T. 12. f. 10.
- o) kleene Bockskullekens nederl. kruytb. p. 279.
- p) *Bot. Monspel.* p. 192. H. R. M. p. 149. nomine C. B.

TIVS. q) PLVKNET, r) DILLENIVS, s) RVPPIVS, t)
LINDERVS u) BVXBAVMIVS, x) TILLIVS, y) ERND-
TELIVS, z) &c. eius meminerunt, & hi fere in indu-
stria priorum acquieuerunt.

§. IIX.

Ad asperas rupes, quae ea prata finiunt, frequens
est *Turritis minor*, quae & ipsa videtur descripta a THA-
LIO, a) nomine *Pilosellae siliquatae maioris*. Adce-
dit locus natalis in aridis, folia ad terram longa &
aspera, siliquae & flores. Id vnum non respondet,
quod caulem foliis pene carere dicat. Et eo videtur
respicere icon b) D. quam CAMERARIVS *minori spe-*
ciei attribuit. Prima a THALIO descriptio est I. BÄV-
HINI,

- q) *Hist. des Pl. aut. de Par.* 508. IRH. eodem.
- r) *Orchis foetida III. f. birci odore minor. Almag. Bot.* p. 271.
quo & RAI *Catal. stirp. Ext.* p. 191.
- s) *Cat. Plant. circa Giess. nasc.* p. 85. nomine C. B.
- t) *Flor. Jenens.* p. 239.
- u) *Tournef. Alsat.* p. 44.
- x) *Enumer. plant. circá Hal. nasc.* p. 242.
- y) *Hort. Pisan.* p. 124.
- z) *Virid. Warfav.* p. 85.
- a) p. 84. neque videtur hanc praetervidere potuisse. Stirpem
THALIANAM peculiarem facit C. BAVHINVS, dicitque
Bursae pastoris similem siliquosam maiorem seu maioribus fo-
liis & conjungit Aizoon Telephium LVGD. p. 1131. cuius
icon mala est, descriptio non recedit. Inter stirpes CB.
nulla planta reperta est hoc nomine insignita.
- b) *ic. VII. post Thal.*

HINI. c) Eadem macilenta tota obducit *Lichen* in *Alpibus* etiam visus, cui expansio est nigricans, tuberosa, aliquando in sphaerulas ex cyaneo atras congesta, per quam denso ordine sparguntur scuta magna, variae figurae, rufa, in quibus frequentia puncta nigra absque lente conspicua. Pertinet omnino ad ordinem MICHELI xxxvi. qui adeo ad finis est *Lichen-Agaricis* & in primis *disci formi punctato nigro* qui in ligno arescente reperitur, ut diuersitatem exhibere non sit facillimum. An *Lichen pulmonarius saxatilis minimus fuluus foliis pulposis* MICHEL. d)

§. IX.

Supra OSTERODAM syluae incipiunt ex Abiete rubra, altae & late patentes. In iis adcliibus locis, & vbi arbores excisae sunt, *Digitalis purpurea*, & *Chamaenerium vulgare latifolium* vbiique nascuntur speciosa pulchritudine. Ad humecta vero viarum, frequens est per omnes *hercyniae* sylvas *Cardamine annua exiguo flore*, quam THALIVS nomine *Nasturtii montani maioris* 1) primus descripsit, nisi eadem fuerit *Cardamine Alpina media* CLVSI 2) quae tamen, cum folia dicatur habere hirsuta & aspera, non penitus respondet. Atque consimilibus locis prouenit *Cardamine IV. Dalechampii* 3)

C 3 filius

c) *Herba S. Alberti Barbarea muralis, de plant. a Divis nomen bab. p. 9.*

d) O. xxxvi. p. 107. n. 2.

1) *Hercyn. Saxonothur.* p. 79. Icon non mala I. BAVHINI.

2) PANNON. p. 455. absque icona.

3) quae omnino videtur primum etiam proponi a THALIO,

siliquis, semine, flore, simillima, sed caule & foliis hirsutis, foliis praeterea imis integris, superioribus non eleganter tridentatis, vt in priori, sed vagis, atque vase incisis, pinnis rarius ad pediculos confluentibus. Vulgare etiam hic est *Equisetum syluaticum tenuissimis setis*: Tum *Melampyrum montanum floribus minoribus syluis*. Hoc primum a BVRSERO 4) dictum videtur, nomine *Melampyri parui Alpini*, id enim locus natalis indicare videtur, cum in Iurassi & alpium inferiorum syluis, & vniuersa Hercynia frequens sit. Idem videtur *Melampyrum latifolium floribus paruis luteis* CELSII apud LINNAEVM. 5) Hanc stirpem pro varietate *Melampyri vulgaris* habet amicissimus LINNAEVS. Verum proportionis diuerissima contrarium videtur indicare. Est nostro habitus ramosior, folia magis nutantia, floris hiatus magis patulus, flos tandem vniuersus altero tanto minor in stirpe etiam proceriore quam est vulgare, & aequabili flavo colore tinctus, qui in vulgari albus est rectu flavo. Quod autem noui generis loco sit proposita olim a nobis, vixum est hic rationem indicare. Quum in sylvis Iurassi versus autumnum anni 1734. copiose id legerem, manifesto vidi labium inferius trifidum esse tribus nempe profundis dentibus incisum. Verum *Melampyri Character*

sub tertia specie *Sisymbrii aquatichi* p. 107. quod jam suspicatus est I. BAVHINVS. Icon elegans pro parvo specimine CAMERARII EPIT. p. 270. pro *Sisymbrio aquatico altero*.

4) ACT. SVECIC. ann. 1724. p. 508.

5) *Flor. Lapon.* p. 240.

racter a TOVRNEFORTIO, 6) RAIO, 7) BOERHAEVIO, 8) KNAVTIO, 9) ita erat constitutus, vt labium inferius integrum pro maxima distinctionis nota adesset. Quare existimauit, iactum me esse hanc obscuram diversitatis notam, donec sequente aetate, sed emissâ iam irrevocabili schedula, comperii, omnia nostra Melampyra eodem modo labium inferius habere tridentatum, manifestius quidem hoc & vulgatius *Latifolium luteum*, & *violaceum* quod & RIVINI Iconibus exprimitur, 10) obscurius illud *coma purpurascens*, 11) verum & id satis etiam manifesto. Quare nouo arguento didici, nunquam alienis oculis videndum esse, nunquam praecipitandas obseruationes, quae a senioribus annis maturitatem in usus publicos exspectant.

§. X.

Frequens in iisdem sylvis omnibus est *Dentaria heptaphyllum baccifera*, quam vbique fere floribus atque siliquis absque vlla sobolis generatione marcescentibus offendit, baccis vero ex aliquot acinis compactis ad alas foliorum sedentibus. Quae planta quoties superior scapus absque

6) IRH. p. 173. & icon. Characterist. T. 78, D.

7) Method. plant. p. 91.

8) Ind. alt. p. 236.

9) Meth. genuin. p. 108.

10) monop. Irreg.

11) cui labium inferius integrum pingitur a TOVRNEFORTIO l. c. & RIVINO.

absque foliis imis pinnatis decerpitur, fit iconi similis, quam pro *Coralloidis* alia specie videmus apud CORDVM, 1) & pro *Dentaria angustifolia baccifera* peculiari apud BESLER. Hort. Eyst. 2) Ex qua nata est spuria species, *Dentaria baccifera foliis Ptarmicae* CB. repetita sed cum asterisco a RAIO. 3) Obiter etiam notamus in iconе, quae a KENTMANNO communicata, adest in CORDO pro *Coralloide*, 4) male baccas omissas esse foliaque terna depicta; DODONAEVM 5) vero stirpem CORDI, quae certo nostra est, cum *pentaphylla*, & *heptaphylla* minus recte coniunxisse: Heluetia enim, vbi plurima nascitur *quinquefolia* & *septifolia* DODONAEI, caret baccifera, cuius in vniuersum habitus multo est minor & tenerior, & siliquae, si quidem perficiuntur, exiliores.

§. XI.

Sylvas vbi reliquimus, iam proximi oppido CLAVSTHAL, prata humecta offendimus, in quibus immensa erat vis stirpis, quae insolita specie oculos perstrinxit, quam ipsam sequentibus diebus frequentissimam ad riuulum die Innerste prope opera metallica, & denuo GOSLARIAE, semper ad aquas vidimus. Radices erant graciles, repentes albae, *Caules*, alias *erecti*, procumbebant

1) Hist. Plant. L. II. c. CXI.

2) Aest. Ord. VII. tab. 12. fig. 2.

3) Hist. plant. p. 785.

4) l. c.

5) Pompr. II. L. I. c. 7.

bebant saepe admodum ramosi, glabri caeterum, teretes & striati. *Folia* virentia varia, ima subrotunda, angulosa, paucis dentibus incisa, subhirsuta: haec ex radice ante natum caulem, & ad laterales stolones. In imo caule alia, *Barbareae* foliis adfinia, praeter bracteam latam sinuatam recipientia aliquot graciles pinnas ad pedunculum eundem, haec glabra. Superiora denique glabra, sature virentia, ambitu dentato: ultima integra. *Flores* copiosi ad summos ramos non adpressi caulibus, sed vagi magis. *Calyx* quadrifolius, pallens, minor petalis. *Petala* quatuor subrotunda lactea. *Siliquae* sparsae & a caule recedentes, vnciales & ultra, seminibus incrementibus distinctae, ut pene articulatae videantur. Quae cum viderem, a *Turritide vulgari ramosa*, cuius fere faciem prae se fert, distinxii facile, foliis & flore maiori: *Aleucoio verno perenni albo*, cui adfinis videbatur aliquo modo, foliis glabris & pinnatis tenuibus. In scriptis Botanicorum duae obuiæ sunt stirpes nostræ similes. Altera *Thlaspios generibus cognata planta THALII*, 1) cui coniungo *Nasturtium montanum SCHWENKFELDI* 2) *Nasturtium Barbareae foliis C. BAVHINI* 3) *PARKINSONI* 4) *RAII*, 5) *Nasturtium Alpinum Barbareae foliis BVRSERI* apud C. BAVHINVM. 6)

1) *Hercyn.* p. 122.

2) *Stirp. Sileſ.* p. 145.

3) *Pin.*

4) *Theatr. Bot.* p. 828.

5) *Catal. Stirp. extra Brit.* p. 188. *Hist. plant.* p. 817. cum Allerisco.

HINVM. 6) Atque de hac *Thaliana*, omissa a recentioribus, neque visa RVPPIO, DILLENIO, LOSELIO &c. dubium nullum erat, quin ipsa stirps nostra esset. Verum in recentioribus scriptis offendit *Turritidem minorem foliosam PETIVERI* apud RAIM, 7) quae foliis imis hirsutis, superioribus glabris, siliquis a caule abscedentibus, nostrae satis videbatur adfinis. Sed Icon *Brassicae spuria exilis hirsutioris subrotundis foliis caule magis folioso PLVKNETI* 8) admodum a nostra recedit, foliis rotunde dentatis, & habitu erecto, ita ut si adiungas hirsutiem, similior sit *Turritidi minori*. Quare cum *Nasturtii* nomen ferri non possit, *Sisymbrii* nomine insigniendam existimauit, quo *Turritis vulgaris ramosa* ob sparsas siliquas referenda videtur. Licet, ut veram fatear, limites *Leucoii*, *Hesperidis*, *Sisymbrii*, *Erysimi* & *Erucae*, non ita constituti videantur, ut certas distinctionis notas subpedinent. Dixi itaque *Sisymbrium palustre album*, *foliis imis Barbareae*, *reliquis integris dentatis*.

XII.

In iisdem elatioribus, sed humidis tamen pratibus frequens nascitur ARNICA, quam in fasciculos colligatam sub fenestris aedium ubique per syluam hercyniam siccari vidimus. Semiflosculi in ea semen habent pappo coronatum, quare a *Doronici* genere ad *Solidaginem* remota est a VAILLANTIO,¹⁾ & eamdem ob

6) Prodr. p. 45. ex *Austria*.

7) Synops. p. 294.

8) Almag. Botan. p. 70. & T. 80. f. 2.

1) *Solidago foliis oblongis neruosis plerumque coniugatis Memoir.*
de l'Acad. des sc. 1720. p. m. 380.

ob rationem in proprium genus constituta ARNICAЕ nomine a Cl. MOEHRINGIO. 2) Quae eadem ratio *Doronicum latifolium magno flore iunget Solidagini*, contra quam visum est VAILLANTIO, 3) vti repetito in Alpibus Helueticis obseruauit. In hac stirpe a CLVSIO & IOHANNE BAVHINO, quod rarissime fit, & a LINNAEO dissentire cogimur, qui omnes duas faciunt huius stirpis species. Et CLVSIVS quidem, in *Pannonicis* proponit *Doronicum Austriacum III.* 4) caule in summa parte ramoso, foliis plantagineis modice acuminatis, idque coniungit cum stirpe SIMLERI, 5) *Muttervwarz* dicta, in Heluetiae alpinis & subalpinis pratis frequente. Idem in magno opere, iconem eamdem pro *Doronico Pannonico VI.* 6) cum alia descriptione ponit, descriptioni vero Austriaci quarti, nouam addit iconem, folia ex primentem acutiora, atque florē vnicum, altero tamen ex ala folii subnascente. In quibus euidentis est, optimum Virum non satis sibi constare: Hoc etiam caput cum festinatione aliqua scriptum esse, vel inde adparet, quod sub finem *Quaratum*

D 2

2) *bort. primit. p. 106.*3) *l. c. p. 390.*4) *Pann. p. 520. & ic. p. 522.* vt absque iusta ratione mo-
neat I. BAVHINVС alienam iconem *Doronici* ferrati ad-
positam esse, ea enim ad III. spectat, ipso titulo id in-
dicante.5) *de Vales. & Alp. p. 353.* quae tamen omnia ex ARETII, ci-
vis mei, Itinere per Stockhorn & Nessum montes exscripta
sunt, ex p. 234. b. apud CORDVM editionis GESNERIA-
NAE.6) *Histor. Plant. p. xviii.*

tum Doronicum 7) cum SIMLERI stirpe coniungat, quod nempe quartum fuerat in Pannonicis, in historia num quintum an sextum sit, non satis liquet, quartum certe non est.

IOHANNES BAVHINVS descriptionem *Doronici Quarti in Pannonicis*, & V. in *historia*, recenset sub titulo *Doronici Germanici foliis binis ex aduerso nascentibus villoso*. 8) *Doronicum* vero nouum *Pannonicum* VI. cum stirpe MATTHIOLI & omnium Auctorum coniungit, nomenque facit *Alismatis Matthioli siue Plantaginis montanae*. 9) Vbi liquido adparet, a stirpe MATTHIOLI & aliorum scriptorum, male separari *Doronicum Quintum CLVSII* in *historia*. (vt quod in Austria, Francofurti & in Belgicae monte natci testatur CLVSIVS) & coniungi cum stirpe peculiari Hungarica. DALEVS certe ita secutus est CLVSIVM & IOH. BAVHINVM, vt *Doronicum germanicum* & *Arnicam officinarum* 10) suspectum habeat naturae venenatae; *Alisma* 11) vero officinarnm pro egregio vulnerario laudet, excitatis locis in EPHEMERIDIBVS NAT. CVR. 12) manifesto de *Arnica* agentibus. Cl. LINNAEVS vltimo loco causam egit CLVSII & IOHANNIS BAVHINI, & duas stirpes fecit aliam monanthon, 13) foliis acutis, quam *Doronicum foliis lanceolatis* vocat, & coniungit cum

7) p. XIX.

8) *Hist. Univ.* III. L. XXV. p. 19.

9) *ibid.* p. 20.

10) *Pharmacolog. suppl.* p. 51.

11) *ibid.*

12) FEHR. *Dec.* I. *Ann.* IX, & X. *Ob.* II. *cum* IC.

13) *Flor. Lapon.* 30f.

cum Alismate IOH. BAVHINI, & cum Doronico VI.
Clusii, sed praeterea cum eodem Doronico IIII. in *Pan-*
nonicis quod in *historia V.* est. Aliam vero speciem facit
polyanthon foliis obtusioribus, quam dicit *Doronicum*
foliis oblongo ovalibus, 14) eamque absque CLVSIANO
synonymo cum stirpe MATTHIOLI 15) SCHEVCHZERI
16), RVPPII 17) cum Arnica nempe officinarum con-
iungit. Qua in re vñh infert optimus LINNAEVS CLV-
SIO, qui *Doronicum* suum V. *Germanicum* nunquam
monanthon descripsit, sed ramis aliquot in summitate,
neque depinxit etiam. Deinde CLVSIANVM *germa-*
nicum in *Austria*, *Belgio* & *Francofurti* nascens auellit
a stirpe vulgata Germaniae RVPPIO, SCHROEDERO,
MATTHIOLO & SCHEVCHZERO dicta, & peculiarem
facit summarum alpium. Videtur omnino CLVSIANA
enarratio confusionis habere aliquid, *Iohannes* vero
BAVHINVS stirpem V. CLVs. in *histor.* exscripsisse sibi
non cognitam; & plantam ramosam sibi visam, cum
ramosa etiam VI. CLVSI pro distincta posuisse. Neque
enim facile stirpes multiplicat, nisi quando post alios
loquitur. LINNAEVS tandem varietates duas ante oculum
habuit. Nos ipsi in *Gotthardo M.* & *Valle Vrse-*
rana *Doronicum* vidimus monanthon, foliis ad caulem
aut minimis aut nullis, humile, foliis acutis asperioribus.
In humilioribus vero *Vallis Haseliae*, & in sylua her-
cynia, *Doronicum* caule ramoso folioso multifloro, fo-

D 3

liis

14) *Flor. Lapon.* 304.15) *Alisma*, ed. 1565. p. 933. 934.16) *It. I.* p. 36. cum nomine CB.17. *Flor. Ienens.* p. 141.

liis mollioribus obtusis, plantagineis. Sed facilime per omnes intermedios 18) gradus demonstrare possumus, eamdem esse stirpem quae in editis & frigidioribus vti fieri solet, aliam faciem induit ab ea, quam in riguis vallibus prae se fert. Quare cum CASPARE BAVHINO & VAILLANTIO, vtramque stirpem CLVSII coniungendam esse censemus, & vtramque praeterea LINNAEI, in admittendis varietatibus alioquin non facilis Botanici.

§. XIII.

Vberrime in eisdem pratis prouenit *Bistorta*, quam ab omni aevo in duas species distinxerunt, praeente iam ciue nostro BRVNFELESIO: 1) atque ita definiterunt, vt alia radice magis complicata, folio vero planiori esset, qualis est icon CAMERARII 2) alia vero radice minus intorta folio vero rugoso & sinuato qualem pulchre expressit DODONAEVS. 3) Verum quando Bistortae exemplaria ex *Iurasso*, ex *Alpibus* variis, ex humidis ditionis *Bernensis*, ex *Bructero* & *sylua hercynia*, vario loco

18) Aliquando enim Alpina specimina biflora aut triflora sunt, alias in humilioribus vallibus nascuntur uniflora. Folia etiam omnia neruosa, acumen per infinitos gradis variabile habent.

1) Foliis rugosis Naterwurz das manlein I. p. 62. foliis vero planis icon prior p. 61. absque nomine.

2) ex GESNERIANIS Epit. p. 683., descriptio vero sinuata habet.

3) Hjst. Plant. Pempt. III. L. I. c. IX. p. 332. bené, qua icone usus est LOBELIVS Icon. p. 292.

loco & tempore lecta confero, fateor, me quidem veram diuersitatem non reperire. Folia alias plana, amplissima & pedalia, exigua alias & plicata. Radix aut recta aut semel, bis, ter intorta, statura denique variant. Sed ita, vt alias plana folia cum 4) simplici radice (in BRVCTERO M.) alias folia sinuata cum radice ter intorta visa sint. 5) Quare valde vellem veras & interiores diuersitatis huius notas edoceri.

§. XIV.

Altera die obiuimus operas metallicas, atque in pratis circa CLAUS THALIAM, praeter *Violam tricolorum* repente, frequens vidimus GERANIVM, de quo dudum multa fuit nobis dubitatio. Habitus ipsi est penne qui *fusci*, foliis semper in lobos ad dimidium sectis, nunquam ad pedunculum usque, floribus binatis, calyce glabro, aut subhirsuto, aut hirsutissimo, magna enim varietas etiam in eodem specimine est: *Petalis* ambitu rotundo, purpureis perpetuo sed vel obsoletis magis, vel saturatioribus, nunquam coeruleis, picta lineis aliquot tinctioribus, vmbilico albo; *Staminum* apices cyanei sunt; *Tubae* reflexae fissae purpureae, *Capsulae* monospermae una cum rostris hirsutae. Hanc speciem in vniuersa heluetia vidi, nempe ad *Birsam*, & *Suzam* in valle *Delemontana* & *S. Imier*, prope *Bernam* in prato quodam adiacenti balneo exteriori, in *Argouiae* sepibus vdis, in M, *Boezberg* supra *Brugam*, in subalpinis ad *Tbermas Leucenses*,

4) qualis fere est Icon prior BRVNFELES Ic. p. 61.

5) qualis icon est MATTHIOLI p. 946.

censes, in montanis circa *Candersteg*. Deinde in omni sylua hercynia in pratis, & *Gottingae* in prato inter syluas *Heimholz* & *Gottingerholz*, vberrime. Francofurto idem etiam misit D. D. SÉNKENBERG, semper ex loco palustri, & humecto. Ut facile adpareat, vulgarem & late nascentem stirpem esse. Quo magis mirum videri possit, difficillime eam extricari, atque ab adfinibus distingui posse. Ab eo quidem quod *Gratia Dei germanorum* dicitur. 1) distinguitur facile foliis simplicioribus, non ad pediculum adeo sectis, floribus neque coeruleis, neque pictis, minoribus denique. Loci certe natalis ratio efficit, vt necessario huc pertineat *Geranium batrachoides Dodonaei flore purpureo magno THALII*. 2) *Geranii tertia species similis montanae GESNERI*, 3) quam cum bistorta frequentem nasci dicit, & *Geranii montani species foliis asperioribus* quae mas eiusd. in append. 4) (ibi vero prior species, qua haec mas asperior esse dicitur, videtur ad *Geranium phaeum siue fuscum* 5) referri debere) *Ger-*

- 1) In *helvetia* hoc sponte nasci, & CB. in *Bafl. catal.* p. 89. & IB. III. p. 476. adfirmant. Nobis nunquam spontaneum visum est. Quare cum Fratres optimi hoc in *Helvetia* ponant, dubitare licet, an non idem Ipsi viderint quod nos adeo frequens inuenimus.
- 2) p. 44. loco natali eodem. vedit & albo flore.
- 3) *hort. Germ.* p. 260. in pratis vdis cum Bistorta.
- 4) app. p. 292. 6. hoc DILLENIVS in *Hort. Eltham.* ad suum *palustre flore sanguineo* refert.
- 5) quod foliis est hirsutis & simillimis nostro, sed minus asperis, neque omitti potuit a GESNERO, cum in Heluetia non sit infrequens.

Geranium alpinum SCHWENKFELD 6); *Geranium Batrachioides paruo flore* BVRS. act. Suecic. p. 532. ex sylvis Heluetiae; *Geranium batrachioides maximum minus laciniatum folio Aconiti* IOH. BAVHINI 7), SCHEVCHZERI 8) forte & reliquorum. *Gruinalis pratensis maxima* folio aconiti minus profunde laciñato RVPPII.9); *Geranium Batrachioides montanum* RAI 10) & *montanum nostras* 11) eiusdem, cuius etiam descriptio simillima. Neque videretur fieri posse ut diuersum sit *Geranium Batrachioides alterum* 12) CLVSII, cuius & icon & descriptio conuenit, cum praeterea vix potuerit nostrum effugisse notitiam diligentissimi viri. Verum inde deducta sunt synonyma multa, quorum aliqua vix videntur admissi

(6) *Stirp. Siles.* p. 85.

(7) qui & ipse cum Bistorta nasci dicit & descriptionem exhibet simillimam. Ex eo habet CHABRAEVS. p. 487. Monere debemus quod I. BAVHINVS Clusianam stirpem nunquam viderit, quare sibi obseruatam pro noua proposuit absque synonymo.

(8) *It. Alp.* p. 512. plane ex eisdem pratis, ubi nostram, & ego & I. GESNERVS, & HVBERVS noster saepè legimus.

(9) *Flor. Ienensis.* p. 103.

(10) *Cat. Stirp. Angl.* p. 129.

(11) *Hist. Stirp.* p. 1062. optima descriptio, & *Synops.* III. p. 361. Stirpem suam in *Historia* cum dubii signo, in *synopsi* iam certior coniungit cum CLVSIANA. Ex eo MILLERVS.

(12) *Pennon.* p. 417. & *bistor.* p. IC. &. C. Icon equidem folia habet profunda & fere ad pedunculum divisa, quod & RAI dubium fuit. Sed locus natalis alpinus & floris color & foliorum ratio reliqua conueniunt.

mitti posse. Huc nempe *Geranium batrachoides rubrum minus* CAMERAR. 13) Forte & IIII. eiusdem. 14); *Geranium sanguinarium TABERNAEMONTANI* 15); *Geranium Batrachoides aliud folio Aconiti nitente* I. BAVHINI 16); *Geranium Batrachoides maximum folio Aconiti nitente* CHABRAEI. 17) *Geranium Batrachoides aliud* I. BAVH 18); *Geranium Batrachoides minus* PARK. 19) *Geranium Batrachoides folio Aconiti MORISONI* 20); & forte multorum aliorum, de quibus minus certos esse licet. Sed miscet hic C. BAVHINVS 21) cum stirpe CLVSH exquisitis verbis excludentis coeruleum colorem, varietates flore coeruleo, & coeruleo & albo, sicque suspicionem mouet haud leuem, ipsum non satis a *Gratia Dei Germanorum* hoc nostrum distinxisse. Quare neque C. BAVHINI neque TOVRNEFORTII 22) neque RVPPII 23) neque TILLII 24) neque LINNAEI 25) stirpem ad

(13) *Hort. Med. Phil.* p. 66.

(14) in *Epit.* p. 602. exhibitum pro *Gratia Dei*, sed foliis pa-
rum divisis nostro proprius.

(15) *Icon* p. 62. fere ad CLVSIANAM.

(16) III. p. 476. plane ex Clusio, nulla sua obseruatione,

(17) p. 487.

(18) *Font. Boll.* p. 206.

(19) *Theatr.* p. 704.

(20) *H. oxon.* II. p. 514. ex CLVS. nomine CB.

(21) *Geranium Batrachoides folio Aconiti Pin.*

(22) IRH. eodem nomine.

(23) *Gruinialis pratensis* foliis *Aconiti Ranunculiue*, flor. *Ienensi*.
p. 103.

(24) *Hort. Pisan.* p. 66.

(25) *Geranium petiolis bifloris*, foliis *peltatis multifloris*, caule
erecto

ad nostram referre ullo modo possumus, qui omnes
eamdem tamen CLVSII stirpem suae coniungunt. Tan-
dem & id fateri debemus, nullas nos habere notas satis
evidentes, quibus a nostro separemus *Geranium palustre*
flore sanguineo DILLENII 26) VOLCAMERI, 27) HOF-
MANNI, 28) Calyx enim & capsulae glabrae non vi-
dentur sufficere, radix, folia & flos & locus natalis
conuenitunt. Cogimur ergo ab eruditis quaerere, pri-
mo, An detur *Geranium Batrachoides folio Aconiti coeru-*
leo flore, diuersum a *Gratia Dei* quod & a nostro diuer-
sum dici queat; deinde, qua ratione a nostra diuersa sit
stirps DILLENII.

§. XV.

In clivis sterilibus & lapidosis, qui fluuiolo *die innerste* inminent, & ad aregosa viarum prope aceruos lapi-dum tritorum, qui metallo omni iam priuati sunt, tum *Goslariae* similibus locis, magnus prouentus est *Alfines* *saxatilis* & *multiflorae capillaceo* folio. Hanc primus.

E 2 fed

erecto, flor. Lap. 266. ponit colorem ordinarium coeruleum,
& admittit varietates ex albo, neque minus coniungit suam
cum CLVSIANA & RAIANA stirpe.

(26) Hort. Eltham. p. 160. T. 134. *Geranium Geranii bac-
matodis folio & facie C. G. nov. sp. p. 55.*

(27) *Flor. Noric.* p. 186.

(28) *Delic. sylv. Flor. Altdorff.* Reliqua synonyma a nostro non recedunt, uti icon *Geranii sanguinarii maioris* H. EYSTETT. Cl. Vern. Ord. herb. I. T. IX. f. 2. & aliud GESNERI. CLVSIANVM vero haematoches alterum omnino aliud videatur a Batrachioide altero, *Panz.* p. 422. & *histor.* p. cii.

sed breuissime, descripsit THALIVS, 1) & dixit *Alfines minoris aliam adhuc speciem.* BARRELERIVS, 2) iconem dedit *Anthyllidis Lychnitis annuae seu minoris angusti foliae flore albo,* quae nostram satis bene exprimit. HERMANNVS 3) *Alfinen glabram tenuissimis foliis floribus albis* vocauit, aliamque dedit Iconem. Tertiam PLVKNETIVS, 4) sed minus laudabilem, dixitque *Alfinen caryophylloiden tenuifoliam flore albo punctato.* Quartam MAGNOL 5) sed absque flore, cui est *Alfine Saxatilis Laricis folio minor & minori flore.* Quintam & perfectissinam VAILLANTIVS, 6) *Alfines saxatilis & multiflorae capillaceo folio nomine,* quo & TOVRNEFORTIVS 7) & GARIDELLVS 8) vsi sunt. Alia etiam nomina habent 9) RAIVS, BOCCONE 10) TOVRNEFORTIVS, 11)

(1) p. II. lin. penult.

(2) Stirp. Gall. Hispan. Ital. ie. 580.

(3) Parad. Batav. p. 12. bené.

(4) Almag. Botan. p. 22. & T. 7. f. 3. inde RAI. III. p. 498.

(5) Hort. Reg. Monsp. p. 11. & ic. eo nomine usus est TOVRN. in IRH, TILL. hort. Pis. p. 8. & ipse MAGNOL Nov. Char. p. 259.

(6) Botan. Paris. T. II. f. 3.

(7) IRH.

(8) hist. des plant. aut. d' Aix. p. 25.

(9) *Alfine pusilla pulchro flore tenuissimo nostras seu saxifraga caryophylloides pusilla flore albo punctato Hist. plant.* p. 1033. syn. III. p. 350.

(10) Plant. ex sicil. p. 22. Tab. 12. *Alfine Bononiensis non aculeata,* iuxta VAILLANTIVM, verum icon vix adgnoscitur, neque nostra planta, etiam senex, aculeata est, neque fo-

VS, 11) SCHEVCHZER, 12) DILLENIUS 13). Differt elegans haec plantula ab *Alpine tenuifolia* I. BAVHINI 14) flore maiore, caule magis ramoso, & ramis adeo frequentibus, vt iuniorum foliolorum copia, non foliorum coniugatorum adeo, sed multiplici penicillo congestorum speciem pree se ferat. Ab *Alpine Alpina iunceo folio* C. BAVHINI, siue *Auricula muris tenuissimo folio pulchro flore* IOH. BAVH. 15) flore longe minore, foliis breuioribus minus rigidis & minus congestis. A *Tunica Alpina* BVRSERI 16) toto habitu & charactere, ea enim stirps ad Knawel ad cedit alio loco dicenda.

§. XVI.

Sub *Cellerfelda*, in sylvis quae supra *Goslariam* sunt, & in omni Hercynia sylua, frequens est Filicina planta, in peculiaribus caulinis ad propria folia semen ferens
 E 3 quam

lia habent latitudinem qua pinguntur apud AMBROS (quem pungere videtur BOCCONE) nomine *Alpine spinosae minimae montanae Phytol.* p. 17.

11) ex BOCCONE.

12) *Alpine Alpina minima glabra It. Alp.* II. p. 129. quod nomen C. BAVHINVS diuersissimae stirpi inposuerat, *Lycnidii nempe saxifragae alpinae glabrae pumilae* PLVKNETI.

13) *Spergula Caryophylloides tenuifolia Catal. Plant.* circa Gieß. p. 18.

14) III. p. 364.

15) III. p. 360.

16) in *herb. vivo* C. BAVHINI, & forte *Caryophyllus saxatilis*, *Polygoni minoris foliis 5 facie*, floribus albis, tanquam in umbella positis BVFS in *Act. Suecic* 1724. p. 507.

quam *Asplenii sylvestris* nomine primus descriptis & com-mode depinxit TRAGVS: 1) Eam in his ipsis sylvis inuenit THALIVS, 2) & *Struthiopteridem CORDI* vocauit, atque vix excusabili constantia adseruit a stirpe GESNERI 3) & TRAGI diuersam esse. *Goslariensis* enim planta cum nostra *Bernae* perquam vulgari in omnibus conuenit.

In iisdem sylvis nascitur *Filix Lonchitidi adfinis*, IOH. BAVHINI, quam pro noua proposuit C. BAVHINVS, 4) cum extra dubium positum sit eamdem esse *Filicem feminam asperam* GESNERI: 5) *Filicem marem tertiam spinosam seu aculeatam* THALII 6) *Filicem spinosam seu aculeatam* SCHWENKFELDI. 7)

Vulgaris in vniuersa hercynia est *Filix mas non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissime dentatis* CASP. BAVHINI, 8) quam esse *Filicem feminam mollem* GESNERI, 9) *Pteridion masculum* CORDI 10) *Filicem marem secun-*

1) berbar. p. 550.

2) p. 119.

3) GESNERVS CORDIANAE *struthiopteridi* iconem & nomen TRAGIANI *Asplenii* iunxerat, CORD. bift. L. II. c. 179. p. 171, hunc aduersat THALIVS & quod diuersissimas stirpes miscuerit notat; sed pro GESNERO descriptiones, & ipse locus natalis loquuntur.

4) *Filix aculeata maior* PRODR. p. 151.

5) *hort. app.* p. 292. b.

6) p. 43.

7) *Stirp. Silef.* p. 78.

8) *Cat. plant. circā Bas.* p. 99. & PIN.

9) *Hort. Germ.* app. 292. b.

10) bift. L. II. c. 175. est enim diversitas non ramosae, quare nolim

secundam teneriorem & molliorem THALII ⁱⁱ) pene certo affirmamus.

Sed & *Dryopteris* siue *ramosa minor* & *Filix femina minor* *Thalii* ¹²) quae *Pteriadion Cordi.* ¹³) *Filix femina minor laeuior candidiorque* GESNERI ¹⁴) *Filicula saxatilis parua & elegans* CAMERARII, ¹⁵) *Filix muraria seu minor* SCHWENKFELDI; ¹⁶) *Adiantum folio filicis* CASP. BAVHINI ¹⁷) hic prouenit. Quae teneritate quadam fragili, diuisione terna, raris, neque pinnatis, sed rutaes murariae similiорibus lobulis, vtrumque acute incisis, punctis flauis creberrimis distinguitur.

§. XVII.

In eadem sylua, & in Hercyniae nemoribus, tum circa *Gottingam* frequens est *Lactuca sylvestris* flore luteo, quam repetito examinatam, vidimus habere caly-
cem tubulatum, qui simplex videri possit, licet ad basin
duo paria squamarum adcedentia habeat, semen vero
latum nigrum conpresum, vtrumque acuminatum, quod
pappum gerit in stipite notabili. Is tamen stipes in
iuni-

nolim cum THALIO ad *Adiantum album* *filicis folio* referre
quae ex genere ramosarum est.

(11) p. 43.

(12) p. 43.

(13) L. II. c. 176. p. 170.

(14) Hor. Germ. app. 292. b.

(15) Hort. Med. & Phil. p. 60.

(16) p. 78.

(17) Cat. Basil. p. 98. & PIN. docente *Herbaris viuo.*

iunioribus stirpibus lactucarum omnium adeo breuis est, ut vix distinguiatur. Quia in aetate, cum squamulis ad basin minimis, obseruata esse videtur Lactuca nostra a Cl. MARTYN, 1) indeque nata occasio nouo creando generi.

Suillus etiam in ea sylua visus est, bulbo crasso purpureo reticulato, Pileo ex ochroleuco subfuscō, Poris minutissimis ochroleucis. Substantia & lamellae albidæ, coeruleum colorem cito induunt quando laeduntur. An *Suillus crassus superne fulvus* & leuis, inferne luteus pulpa rosea pediculo ex fulvo subrubente & velut reticulato, MICHELI. 2) Difficile dictu, suilli enim etiam magis quam reliqui fungi coloreni per aetates mutant.

§. XVIII.

Circa Goslariam, qua ad ad cuniculos montis Ramelli iter fecimus, frequens est *Statice*, quam ad pagum sieber supra Herzbergam denuo vidimus. Elegans etiam *Caryophyllus* ibi nascitur, quem primus descriptis CLVSIVS, *sylvestris septimi* nomine; 1) novam vero descriptionem nouo cum nomine dedit RAIVS, 2) historiam eius perfecit tandem DILLENIVS. 3) Multi flores

1) *It. Phil. Trans.* n. 407. p. 22.

2) *nov. gen. plant.* p. 129.

1) *Hist. plant. rar.* p. 285.

2) *Caryophyllus minor repens nostras, hist. plant.* p. 988. &
Syn. III. p. 335.

3) *Hort. Eltebam.* p. 402.

rus est. Petala pulchre purpurea sunt, inscripta ad vnguem circulo sature admodum purpureo, ultra quem frequentia puncta alba; Apices subcoerulei. *Caryophyllum humilis flore unico* 4). CASP. BAVHINI caule est erecto vniuerso, nudo, foliis angustissimis ad laricina adcedentibus, flore purpureo puro, radice maxima brachiata, a nostro diuersissimus & heluetiae indigena. Hunc *Goslariensem* magna copia extra *Wernigerodam* vidimus, similibus locis arenosis & iuxta vias publicas. *Vulnerariam* flore ochroleuco hic & circa *Göttingam* aequa vulgarem atque luteam illam. Videlur de *Lagopodio* flore albo 5) TABERNAEMONTANI dubitare IOH. BAVHINVS, 6) quum notet descriptorem ob omissum locum natalem: Sed huc omnino referimus. Cum mucrone vexilli carinae & alarum purpureo, frequentem circa *Thermas Leucenses* vidi- mus, sed albo penitus flore, quam videtur IOH. BAV- HI NVS ex *Gotthardo M.* habuisse.

§. XIX.

Visis *Goslariae* venis Vitrioli natui & metalli mis- ti ex Plumbo, Argento, Cupro & Sulfure, tum vber- rima minerarum omnis generis collectione SCHLVTE- RIANA, iis tandem fabricis quibus sulphur ex pyrite excoquitur, *Harzburgum* petiuimus ad pedem Montis
Bru-

4) huic stirpem suam coniungebat RAIVS. l. c.

5) Icon. p. 525.

6) *bijl. plant. univ. II.* p.

Bructeris situm, ita tamen ut lenta adclivitate per montanam planitem dumetis obsitam, ad verum demum montem sero perueniat. Ipse Mons, ut qui a palude dictus sit, viginosus est totus, syluis nudus, circa verticem congestis absque ordine lapidibus, interceptisque haud modicis foueis molestus. Vertice nudus & lapidosus, vndique libere oculos late per vrbes agrosque errantes dimittit. In eo culmine commodum exstructa est casa, ad nocturna frigora arcenda per quam necessaria iis, qui solius spectaculi gratia montem descendunt. Altitudo rudi aestimatione, quae *Iurassifere*, neque recedunt obseruationes Geometricae, est autem ea ad bis mille pedes Rhenanos. Descensus inde rapidus ad *Ilserburgum*, quo paucis admodum horis descendendo peruenitur per sylvas abiegnas. Stirpes paucissimae Alpinae, sed aliae quaedam nostris inuisae, insolita sua pulchritudine mihi gratissimae fuerunt.

§. XX.

In primis nemoribus prope *Harzburg*, *Anagallis lutea nemorum*, in planioribus hic terrarum rarer, & *Dentaria baccifera* frequens est. Verum ad vias passim procumbit & serpit *Veronica supina Teucri folio*, foliis suis rarioribus, rotundioribus, & amplioribus, floribus minus conspicuis rubellis ex alis foliorum erumpentibus, ouariis valde latis & conpressis, caule humum non relinquentे se distinguens a *rotundifolia minori*. Eam COLVMNA pulcherrime depinxit & nomen dedit *Alyssi Dioscoridis montani* 1) cuius iconem

in

1) *Ecpbr. stirp. rar.* L. I. c. 121. p. 286. Ex eo plerique alii, inde

in peruetusto codice visam non recedere a stirpe sua adseuerat. Alia icon est RIVINI in posterioribus tantum exemplaribus 2). Non in Italia solum, sed & in Germania nasci, diligentia IVNGERMANNI 3) RVPPII 4), DILLENII 5) docuit, in Anglia etiam prouenit RAIQ 6) teste. *Heluetia* quidem, & *ager Parisinus* ea carent.

§. XXI.

In iisdem humilioribus syluis non solum *Pyrola folio mucronato serrato*, in vniuersa Hercynia sylua frequens,
F 2 sed

inde enim nata *Chamaedry spuriac adfinis rotundifolia*
scutellata C. BAVHINI. *Alyssum montanum* COL. PARKINS.
p. 590. *Veronica rotundifolia scutellata aut biscutata hederae*
folio H. OXON. II. p. 321. PLVKN. Almag. Bot. p. 334. Ver-
nica supina Teucrri folio ELEM. BOT. MAGNOL. H. R. M.
p. 203. IRH.

- 2) *Veronica procumbens*. Monop. Irreg.

3) nulla enim alia stirps ab eius excessu in Germania visa est,
cui conueniat nomen *Chamaedryos hederaceae* sive *Teucrium
pratense hederaceum foliis* HOFM. ex IVNGERMANNO.
Quare neque *Chamaedrys spuria hederacea* sive *Scutellaria
repens* C. B. & RAIJ hist. plant. p. 847, vera & distincta
planta erit.

4) nomine TOVRNEF. flor. Jenens. p. 197. habet & GE-
MEINH. fl. Laub. p. 41.

5) eodem nomine *Cat. plant. circa Giess* p. 92.

6) cui est *Chamaedrys spuria foliis pediculis longis insidentibus*
Cat. stirp. Angl. p. 64. *bistor. plant.* p. 250. cum descriptio-
ne aucta: In *Syn. vero II. & III.* p. 281. *Veronica Chama-
dryoides foliis pediculis oblongis insidentibus.*

sed pulchra etiam species illa *scapo unifloro* satis copiose nascitur, in sylvis supra *Wernigeroda* denuo visa, sed in Patria mea rarissima. Primus eam depinxit CLVSIVS cui *Pyrola minima* ¹⁾ est. Altera Icon est BESLERI ²⁾. Tertia RIVINI ³⁾, omnes satis bonae; ultima etiam stamina habet, sed diuersa ratione ab ea quam proposuit LINNAEVS ⁴⁾. Habet enim RIVINVS 1. 2. 2. 3. 2. LINNEVS 1. 2. 3. 1. 3. Observations meae pro LINNAEO faciunt, sed in iis minutis procul dubio aliquid sibi permittit Natura. Hoc vero difformitatis genus in floribus rarissimum est, nisi staminum numerus a numero segmentorum floris differat, ut in octostemonibus.

§. XXII.

Paulo altius in Montis *Winterberg* sylvis primum visa *Tridentalis* CORDI, nunquam nos deseruit in toto monte *Bryctero*, gratissima comes, in Helvetia, Gallia, Italia, nunquam visa, & citra quinquagesimum gradum nullibi proueniens. Descriptio LINNAEI omnino conuenit. *Caulis simplex*, ligulas foliaceas exiguae primum, in vertice vero maiores, tandemque in vera folia auctas producit, folia vero ad nouem usque numeraui. *Petiolos* vñifloros & simplices & binos frequenter vidi. *Flos* plerūmque septemfidus, ut raro aberret, *calyce* septifido purpureo, *petalo* rotato plano exterius sub purpureo

1) *Pannion.* p. 508. *bifl. plant. rar.* p. cxviii.

2) *Hist. Ejst. Class. Vern.* Ord. XI. T. 12. f. 2.

3) *Pentapet. Irreg.* T. ult. *Pyrola flore singulari.*

4) *Fl. r. Lapon.* 157.

pureo intus lacteo. *Stamina septem aureis apicibus, globosis.* Tuba simplex vnika. Elegantia stirpis facit, ut synonymorum historiam addere visum sit. Breuissima descriptio est inuentoris CORDI 1), a quo *Herba Trientalis* dicta est; bona & vberior THALI 2) tertia SCHWENKFELDI 3). CASPARVS BAVHINVS pro noua proposuit, *Pyrolam Alpines flore Europaeam* 4) dixit, & pro more suo fecit maiorem & minorem, maiorisque dedit iconem bonam, primamque. Sed folia & vniuersus habitus *Pjyllii minoris* quod idem BAVHINVS depingit alibi 5), ita se habent, ut capitula squamosa descriptionis, & fructus mori figura in icone, non persuaserint LINNAEO, aliam esse stirpem a nostra *Trientali*. Frater IOH. BAVHINVS Cordi nomen retinuit 6). CHAERAEVS indigna simia, *Herbam Trientalem pyrolae speciem secundum quosdam* 7) vocavit. PARKINSONVS pro *Pyrola Europaea Alpines flore* 8) figuram nimis ferratam dedit, ipsissimam vero Casparis BAVHINI iconem quae *Trientalem* exprimit pro *Pyrola brasiliensis Alpines flore maiori & minori* 9). Nomen CASPARIS BAVHINI

F 3

reti-

1) *Sylv. obseruat.* p. 222. a.

2) Αλσινανθεμον p. 15.

3) *Stirp. Siles.* p. 17.4) *Prodr.* p. 100.5) *ib.* p. 99.6) *Hist. Univ. plant.* III. p. 506.

7) p. 501.

8) *Theatr. Bot.* p. 509.

9) p. 510.

retinuit LOESELIVS 10), MORISON 11) RAI 12) & SV-
THERLAND 13). MERRETVS 14) *Pyrolam Alsines folio*
minore dixit, OELHAVEN Alsinanthemon 15), AMBRO-
SINVS alsinanthemon vel alsinanthemon 16) BARRELE-
KIVS Pyrolam longo folio flore albo singulari 17). PLVK-
NETVS Pyrolae affinem alsinanthemon nostram alpinam 18).
RVPPIVS 19), qui primus Characterem dedit, *Trientalem*
CORDI & RIVINI. Idem nomen retinuit ERNDL 20)
BVXBAVM 21) SIEGESBECK 22). *Trientalem* demum
GEMEINHART 23) WALther 24) & LINNAEVs 25)
KRAMERI *Tentamen* nondum vidi. MOEHRINGIVS,
alsinan-

10) *Flor. Pruss.* p. 211.11) *H. Oxon.* III. p. 505.12) *Cat. stirp. Angl.* p. 246. *Hisp. plant.* p. 1101, ubi florem
facit pentapetalum.13) *Hort. Edim.* p. 281.14) *Pin. rer. Brit.* p. 99.15) *Catal. plant. circa Dant.* p. 3.16) *Phytolog.* p. 35.17) *Icon. plant. in Gall. Ital. Hisp.* 1156. icon propria non optima.18) *Almag. Bot.* p. 309.19) *flor. Jenens.* p. 15. In Charactere floris segmenta & stami-
na omisit, fructum in tres carinas dicit dehiscere.20) *Virid. Warfav.* p. 122.21) *Plant. circa Hal.* p. 333.22) *Prinnit. flor. Petrop.* p. 106.23) *plant. circa Laub.* p. 11.24) *design. plant. hort. sui.* p. III.25) *flor. Lapon.* 139.26) *hort. priv.* p. 8. & 111.

alpinanthemi nomine Characterem nuperrime dedit, segmenta floris incerto numero recenset.

§. XXIII.

In eadem sylua frequens est Solidaginis species, summis Botanicis, RAIO, TOVRNEFORTIO & VAILLANTIO non cognita, licet omnino peculiaris sit. Flores habet solidaginis saracenicae, *semiflosculis* raris & omni charactere simillimos: Caulis & nascendi modus idem: *Folia* differunt, ferrata equidem, sed adeolatiora vt longitudine latitudinis vix sit sesquitertia, molliora, & subitus lanuginosa: In *solidagine* vero *saracenica*, folia habent longitudinem latitudinis quintuplicem, dura praeterea & glaberrima: Quare tota facies magis ad *Iacobaeam Pannonicam* *III.* CLVSII accedit, a qua vero flore & defectu aurum sub foliis, & folio minus rotundo manifesto differt. Videtur omnino inter THALIANAS consolidae species esse, forte *Consolida saracenica alia* 1), in qua tamen proportionem latitudinis nimiam facit. Deinde *Consolida sarracenica maior* LVGD. 2) vt pro rudi icone satis nostram refert; Melior tamen est icon *Virgae Aureae siue solidaginis latifoliae serratae* I. BAVHINI 3), quam CHABRAEVS 4) repetit. Huc referremus

1) p. 27.

2) *Hist. gener.* p. 1271. flores dicit senecioni affines. Flores tamen radiati indicant non esse *senacionem montium Averniae*, dictum CHOMELIO.

3) *Hist. plant.* II. p. 1063.

4) p. 333. mutato nomine. *Virga aurea Solidago sarracenica dicta latifolia serrata.*

minus Solidaginem *sarracenica* dictam latifoliam serratam LOESELII 5) nisi destitui lanuginem moneret. An sit *Virga aurea* altera *solidago sarracenica* MORIS. PRAEV. LVD. 6) folio minus ipsis, non satis liquet: *Virgae aureae montanae latifoliae birsutae* H. R. P. & SCHÖL. BOTAN 8), sola nomina habemus. PLVKNETIVS 9) iconem & nostrae & LVGDVNENSIVM stirpi similem dedit, cum nomine IOH. BAVHINI. An *Iacobaea Alpina latifolia* foliis longioribus serratis PONTEDER 10). Omnino videtur esse *Iacobaea nemorensis* latiore rigiliore & *birsuto* folio RVPPII 11), BVXBAVMI 12) ERNDTE- LII 13), sub nomine IOH. BAVHINI a LISCHWIZIO 14,) relata ad *Iacobaeas*. Verum similitudo nominum fecit, ut MORISONVS 15) & RAIUS 16) stirpem peculiarem I. BAVHINI miscerent cum vulgatissima *Virga aurea latifolia serrata* fratri CASPARI diuersissima 17) certe & flores

5) flor. Pruss. p. 286.

6) p. 323. probabile videtur. In *Historia* non habet.8) p. 20. repetit MORISON *Hist. Oxon.* III, p. 124.

9) p. 390. T. 235. f. I.

10) Compend. Tab. Botan. p. 140. non recedit.

11) flor. Jenens. p. 142.

12) Enum. plant. circa Hal. p. 144.

13) Virid. Warf. p. 62. plusculas plantas rariores ex RVPIO repetit, vti fungos suos ad verbum ex HOFMANNI *Deliciis sylvestribus* excrispit.

14) Diff. de Virg. Aureis p. 27.

15) Hist. Oxon. III. p. 124.

16) Hist. plant. p. 279. cum signo stirpem sibi non perspectam fuisse.

17) Cl. etiam LISCHWIZ stirpes LOBELII, & PARKINSONI,

flores gerente in spicas, quae a *Virga aurea latifolia* exterritorum non ferrata, aut penitus non differt aut solis crenis: nobis enim nunquam tota absque crenis prouenit. Neque TOVRNEFORTIVS 18) neque VAILLANTIVS 19) errorem correxerunt. Iungenda fuerat apud VAILLANTIVM *Solidagini Saracenicae*, simillima sed diuersa species.

§. XXIV.

Cum ea nascitur *Virga aurea Broccenbergensis* THALII 1), varietas humilior minus ferrata durior & glabra Virgae aureae vulgaris, qualem iconem elegan-tem dedit CAMERARIVS 2), & quae a BOCCONE 3) pro noua stirpe depicta est. *Acetosa montana maxima* 4) in iisdem sylvis prouenit, speciosa varietas vulgaris Acetosae, iuxta LINNAEVM 5). Id monendum,

reti-

SONI, veras Virgae Aureae varietates, ad suam veram Iacobaeam refert.

18) Qui stirpes fratrum coniungit secutus MORISONVM, p. 484.

19) nullam mentionem facit plantae IOH. BAVHINI.

1) p. 129.

2) EPIT. MATTH. p. 748.

3) *Virga aurea Alpina laurinis rigidioribus foliis* Mus. de Pian-te p. 33. T. XVI. Inde IHR. RAI. Hist. vol. III. p. 167. VAILLANTIVS equidem peculiarem facit Mem. de l' Acad. 1720. p. 396. Sed repugnat stirps simillima iconi, toties in *Alpibus* & *Jurasso* visa, diuersitate notabili, sed per gradus decrescente.

4) CB *Oxalis maior Broccenbergensis* THALII. p. 82.

5) Flor. Lap. 130.

retinere eam in hortis suam proceritatem neque unquam ad staturam pratinensis speciei redire, ut in amoenaissimis hortis Ill. HVGONIS vidi *Hanouerae*.

§. XXV.

Ingressi paludem, vix superabilem nisi per aggerem ligno stratum, quae accolis vocatur *Hunerbruch*, in mensam vim vidi *Linagrostidis alpinae* unica spica caulem terminante. Est ea absque controversia *Gramen iuncuum lanigerum* THALII 1) inuentoris, indicante id loco natali. *Iuncus Alpinus capitulo lanuginoso* C. BAVHINI in *Prodr.* 2) atque THEATRO. 3) qui & ipse ex Hercynia sylva habuit, *Iuncus capitulo lanuginoso* siue *Schoenolauros* PIN. AMBROSINI 4) SCHEVCHZERI 5). *Iuncus alpinus cum cauda Leporina* IOH. BAVHINI 6), RAI 7) PLVKNETI 8), SCHEVCHZERI maioris, *Gramen Iuncoides alterum lanatum* DANIcum PARKINS. 9) MORISONI 10). *Iuncus alpinus bom-*

1) p. 55.

2) p. 23. cum icono.

3) Theatr. p. 187. 188.

4) Phytolog. p. 303.

5) in Agrostogr. p. 302. & ic. opt. Tab. VII.

6) II. p. 514.

7) bist. Plant. p. 1306. Cat. Angl. p. 132, Syn. III. 436. minorem speciem non habet.

8) p. 200. Almagest.

9) coniungit RAI. & icon conuenit. Theatr. p. 1271.

10) H. oxon. p. 224.

bombycinus PARKINS 11). (non vero C.B.) 12) *Linagrostis syluatica spica simplici* RVPP. 13) *Linagrostis spica singulari alopecuroides* VAILLANTII 14). *Linagrostis Alpina maior capitulo singulari minori* MICHELII 15) Ab hac specie Linagrostidis, differt habitu humiliori, foliis paucis brevibus, spica aut aequa magha aut maiori, vaginis rarioribus, cespite minori *Gramen tomentosum Alpinum* & *minus* CASP. BAVHINI 16) MORISONI 17) *Gramen tomentosum alpinum minus* PARK. 18) *Iuncus alpinus capitulo tomentoso maior* SCHEVCHZERI 19) minoris, *Linagrostis alpina media capitulo singulari maior*, MICHELI 20). Eam nos in M. Gotbardo, Scheidek & alibi in Alpibus lectam, ita comparauiimus cum Hercynica, ut aliquanto latiora folia & culmum & spicam Alpinam haberet, Hercynica haec omnia longiora. Id an a solo natali pendeat non dixerim. Vnam certe speciem fecit SCHEVCHZERVS 21) maior,

G 2

11) certo *Theatr.* p. 1272.12) quae rarissima stirps est summarum alpium, vid. SCHEVCHZ.
Agrologr. Tab. iam cit.13) *Flor. Jenens.* p. 260.14) *Bot. Paris.* p. 117.

15) nov. gen. p. 54.

16) *Theatr.* p. 60. ex Alpibus Rhaetic. & Vales.17) *H. oxon.* III. p. 224.18) *Theatr.* p. 1272.19) *Agrologr.* p. 304. & icon. T. VII.

20) l. c.

21) Juvo enim *Alpino cum canda Leporina Itin. Alp.* I. p. 41.
quae maior species est, & humili quem addit in alpibus nasci, quae minor species est, nomina distincta non impedit.

ior, vnam LINNAEVS 22) nixus praeterea specimine BVRSERIANO sibi viso. Nos iuncos C. BAVHINI non vidimus.

§. XXVI.

Tota haec palus fit cespitibus ex *Sphagni* 1) duabus speciebus factis, cuius ideo meminimus, per uulgati equidem, quod ea ipsa capitula quae polline plena offendimus in *M. Bructero*, offendamus descripta a ΓΗΑΛΙΟ 2) depicta vero a DODONAEO 3) & LOBE-LIO 4) Angustifolii iconem hucusque nullibi vidi, est autem diuersum omnino, & faciem suam diuersam in eodem loco natali seruans. Capitula, uti totus habitus minor est, minora, simillima tameñ gerit.

§. XXVII.

Ad fluuioli die Ecker lapidosum littus, passimque in scrobibus summi etiam montis, prouenit *Ranunculus albo flore* 1), in Alpibus omnibus, sed in humiliori earum

- 22) cui est *Eriophorum spica erecta caule tereti* Fl. Lap. 23.
- 1) *palustris candidantis* &c. DILL. CG. 229. & *Synops.* III. 104. nro. 1. & 2.
- 2) *In Brocckenbergi iugo candida musci species . . . capitulum continens pusillum, cymbali versus superiora patentis figura, coloris spadicei*, p. 78.
- 3) *Muscus palustris* Pempt. p. 472.
- 4) *Muscus terrestris vulgaris* eadem ic. Icon. II. p. 242.
- 1) *Ranunculus maximus Leucanthemos* sue *Aconitiformis* THAL. p. 101.

earum sede, & in *Iurasso* frequens, qui folio quinquelobato amplo splendente, caule alto brachiato, sapore non acri, floris demum colore satis se distinguit. Primus eum descripsit C. GESNERVS 2) MATTHIO-LI 3) enim icon eo referri solita *Anemonoidi montano polyantho* longe est similior: deinde DODONAEVS 4) & alii longo ordine. Magna est apud me auctoritas ingenui & diligentissimi viri CAROLI CLVSII. Sed vix tamen possum a me obtainere, post tot per alpes itinera, ut credam diuersum esse a nostro *Ranunculum montanum* III. 5) in *Pannon.* & *Historia descriptum.* Facies enim, flos, sapor ipse, locus notatus conueniunt. humilior habitus, flos minor, praecocior eruptio in florem possunt a causis exterioribus profecta esse.

§. XXVIII.

Ad eundem riuum frequens nascitur, *Myrrhis Broccenbergensis* THALII 1) & VOLCAMERI 2) *Myrrhis montana* SCHWENKFELDI 3) *Meum Sileiacum forte*

G 3

2) *M. fract. descr.* p. 65. nomine *albi maioris.* In *Tabulis Col-lect.* vocat *Ranunculum sylvestrem album Fidertsche,* in *kortis Germaniae,* *Ranunculum montanum tertium Fidertsche Are-*
iii p. 275. a., in *append. Ranunculum album maiorem foliis Platani fere sylvestrem flore simplici* p. 295. b.

3) *Ranunculus* III. p. 613.

4) *Ranunculus albus extenororum* III. *bifl. plant. Coronar.* p. 288. ic. p. 286. *quintus Pempt.* III. L.IV. c.3. p. 430. ic. p. 429.

5) *Pannon.* p. 369. 370. *bifl. Plant. rar.* p. 236.

1) p. 77.

2) *Flor. Noric.* p. 296.

3) *Stirp. Siles.* p. 142.

CAMERARII 4): *Myrrhis palustris hercynica* IVNGERMANNI, HOFMANNI 5), RAI 6). THALIANAM stirpem neque C.BAVH(NVS 7) neque FRATER 8), neque RAIVS 9) notam habuit. Est vero certissime, cum omnibus Synonymis modo dictis, *Myrrhis palustris latifolia alba* Grubra IRH. 10). Ad quam pertinere alibi dixi, *Seseli montanum cicutae folio subhirsutum* C. BAVHINI 11): Cuius nomen repetit, RAIVS 12) & MORISONVS 13), plantam neuter cognitam habuit. De eō vero & ex herbario viuo, & ex itinere in locum natalem facto mihi constat. An hoc pertineat *Cicuta sylvestris* maioribus quam *vulgaris* foliis CORDI 14) id ex paucissimis vocibus definiri non potest. Id addendum, semina longa bicorni Tuba sua insignia, striis conspicuis non notari; sicque

4) hort. p. 101.

5) Flor. Alt. delic. sylv.

6.) Hist. Plant. III. p. 257. & catal. stirp. exter. 1694. p. 185.

7) qui in Pinaco recenset sub titulo *Myrrhis Broccenbergensis* quid?

8) cui est *Myrrhis Broccenbergensis* foliis *Myrrhidis Italicas* flore albo radice crassa nigra III. p. 78.

9) Hist. 431. cum Asterisco.

10) cuius pulchram iconem RIVINVS dedit nomine *Myrrhidis palustris*.

11) Prodr. Theatr. p. 85. Cat. plant. circa Bas. p. 49. Pin.

12) Catal. plant. exter. 1694. p. 236. [Obiter obseruo Montem Wasserfall ibi dici vicinum *Scaphusiae*. Sed longe abest, Basilea vix duobus milliaribus Germanicis distans.] Hist. plant. p. 452. cum signo dubii.

13) Hist. Oxon. III. p. 286.

14) Sylv. observ. p. 222. b,

sicque recte stirpem nostram ad *Chaerophylla* relatam esse ab optimo BOERHAAVIO 15) qui nuper rebus mortali bus eruptus, omnibus veri bonique amantibus perpetuum sui desiderium reliquit: vir ex hominum memoria ingenii magnitudine, animi vero modestia & benignitate nemini secundus.

§. XXIX.

Speciosa *Sonchi species*, *coeruleus latifolius* 1), flore spicato, in ipsis crepidinibus eiusdem riui frequens est, denuo visus nobis ad littora fluuioli *die kalte bode*, prope villam venatoriam *das Elend*. Eum THALIVS 2) etiam albo flore vidit.

§. XXX.

Inde adscendimus ipsum montem qua parte propria magis voce *der Broken* vocatur. *Bryum* ibi vidi & quod icon eius non existet, sculpi curauit 1). Eius *caules* valde ramosi, erecti tamen neque ad *Hypni* speciem repentes; *folia* latiuscula non adeo acuta, neruo medio valde conspicuo, seriatim & imbricatim caulem contingunt,

15) *Chaerophyllum latifolium palustre* flore albo & rubro. Ind. alt. p. 70.

1) I. B. II. p. 1004, cuius pulchra icon, mutuo accepta a FRA-TRE, sculpta prostata apud CAMERARIUM Epit. Matth. p. 280.

2) *Intybus πλατυφύλλος* *Bercynica* p. 62.

1) fig. 2.

tigunt, atque in speciem ex terete polygonam ambiunt; adulta nigricant. *Setae* ex caulis longitudine, bulbis minus conspicuis adscendunt, rectae & saepe aristarum instar intortae, vnciales, raro ex summa stirpe prodeuntes. *Capitulum* erectum crassum ouatum fuscum, *calyptra* in acutissimam acum educta. Retuli ad *Bryum hypnoides* *erectum montanum*, *erectis capitulis acutis* DILLENII 2). Ad ligna putrida frequens ibi prouentus est *Lichenis*, qui modo simplex, modo prolifer coccineis fungosis verrucis ornatur. Eum non rarum certe, ideo nomino quia THALIVS 3) longe primus eum descripsit. Quid sentiendum de fungosis istis excrescentiis, an morbus aut exuberantis succi vicium? suadet figura irregularis, prouentus in siccis & moribundis lichenibus, analogia Agaricorum. Repugnat constantia horum scutorum in eo Lichenum genere, quod ramis arbusculas exprimit.

§. XXXI.

In eadem via, quae fluuiolum sinistriorem diu obseruat, *Polyporum* cespitosum ligno haerentem decerpsumus. Tota substantia dura coriacea filamentosa fuit. Figura infundibuli, intus pilis in concentricos circulos dispositis fuluis pubescebat, externa facies albida & glabra, poris frequentibus distincta, quos efficiebant breuissimae & vix percipiendae laminae. *Polyporum* dicimus, ob adfinitatem & naturam sicciorum, tubuli vero

2) Rat. *Synops.* III. p. 94. nro. 12.

3) *Lichen* circa *Andersbergam*, p. 73.

vero Suillum faciunt, licet duplēm substantiam non habuerit. Non absimilis erat *Polyporo exiguo Alpino fulvo infundibuliformi pediculo breuiori* 1) MICELI.

§. XXXII.

Passim ibi *Osmunda lunato folio* proueniebat, & *Lichen terrestris folio Eryngij* 2) BVXBAVM 1), cuius synonyma recenset MICELI 2). Verum ante omnes scriptores, quos excitat, CORDVS 3) ipse hunc Lichenem viderat, dixeratque *Muscum crispae Lactucae similem*. CAMERARIVS 4) etiam iconem eius qualemcunque exhibuerat. Quaerit de eo LINNAEV 5), quomodo possit in cibum recipi, cum SIBBALDO 6) & BORRICHIO 7) teste aluum vehementer ducat. Respondet BORRICHIVS 8), & ROBINSON 9), vere primo purgare, reliqua aestate exsiccatum in farinam fieri edulem.

1) nov. gen. plant. p. 130. T. 70. f. 10.

1) Centur. plant. II. p. 11. T. VI. f. 1.

2) p. 85. T. 44. f. 4. qui & scuta vidit, oppido rara, & quae offendere nunquam mihi datum est.

3) Sylv. observ. p. 221. a.

4) EPIT. p. 783. ic. 2.

5) Flor. Lapon. 44.

6) cui est *Muscus in Islandia purgans*. Prodr. hist. natur. Scot. p. 39.

7) Act. Hafniens. A. 1671. p. 126.

8) ibid.

9) apud RAIVM. hist. p. 114. cui est *Muscus Islandicus* BAR. THOLINI.

dulem : exspirante forte ea quam semper in eo percepit
summa amaritudine. Neque obstat , quod purgans
cum sit, egregium vulnerarium & conglutinans dica-
tur a BREYNIO 10), Gratiola enim, validum utique Ca-
tharticum, pro summo vulnerario a rusticis nos-
tris ha-
betur.

§. XXXIII.

Plurimum ad terram ibi prouenit *Lycopodium caule*
erecto spica glabra terminato eximii LINNAEI 1) cuius
inuentor videtur AGERIVS 2), mixtum vulgari *Lycopodium*,
Vitis etiam *Idaeae* plura genera frequentia nascuntur per
paludosa prata montis, proprie magis BRVCTERI nomen-
gerentis. Inuenimus ibi *Vitem Idaeam foliis oblongis*
crenatis fructu nigricante. Deinde *Vitem Idaeam foliis*
subrotundis non crenatis baccis rubris, ad quam aliquae
obseruationes videntur addendae esse. Namque TRA-
GVM huius inuentorem fecit CASP. BAVHINVS , qui
tamen in *Myrtillo exiguo* 3) non huius sed manifeste
admodum *vulgaris fructu nigro* descriptionem dedit,
cum iconе minus bona. Inde etiam factum est, vt sub
titulo *Myrtilli exigui* AMBROSINVS 4) & TITA 5) no-
stram

10) *Muscum pulchrum terrestrem sanguincum* in E. N. C. Dec. I.
ann. III. Obs. 289. cum iconе non mala.

1) *Flor. Lapon.* 419.

2) apud I. BAVHINVM p. 767. sub *Musco terrestri foliis re-*
tro reflexis.

3) p. 974.

4) *Phytolog.* p. 368.

5) *Hort. Maurocen.* p. 125.

stram proposuerint. Porro folia nostrae euidenter subtus punctata sunt, vt valde manifestum sit CASP BAVHINVM hanc prae oculis habuisse, quando *Viam Vrsi*, diuersam vtique & punctis carentem, dixit *Vitem Idaeam foliis carnis punctatis*, quae voces diu mihi inposuerunt. In herbario viuo C. B. vti passim aliqua ita arbores in primis fere perierunt pluiae iniuria, neque potuerunt consuli. Descriptioni floris addi potest, quod gemelli apices quatuor cornua longiuscula edificant, & ita conglutinati sint ad similitudinem staminum in *Viola*, vt *monadelphiam* omnino imitantur, euidentius quam *Hypericum* aut *Geranium*; *Tuba* vero apice incuruo sit, quod RIVINIANIS sufficere deberet ad plantam in Irregulares amouendam. *Fructus* in patria mea edules non habentur, multo minus ad delicias referuntur 6). Primus eius meminit C. GESNERVS noster in descriptione M. FRACTI 7). THALIVS 8) *Vitem Idaeam rubram* dixit. Haec in omnibus sylvis editioribus *Hercyniae*, plane vti in *Iurasso* & *subalpinis* vulgatissima est.

§. XXXIV.

Paludes magis sequitur *Myrtillus grandis* 1) TRAGI, quod synonymon cum illo THALII 2) male ad aliam
H 2 speci-

6) vti in Suecia & Laponia testante LINNAEO *flor. Lap.* 144.

7) *Vitis Idaea rubris acinis* p. 63. In *Collect. Tab.* *Vitem Idaeam in alpibus rubram* vocavit, ed. II. p. 115. in *hortis Germaniae Vitis Idaea* speciem alteram *acinis rubris* p. 287.

8) p. 129.

1) L. III. c. 13. p. 974. absque icone.

2) *Vitis Idaea nigra maior*. p. 129. ad speciem diuersissimam foliis oblongis alibanticibus quae III. TABERN. & CLVSII.

speciem retulit CASP. BAVHINVS. Inuentor TRAGVS est, deinde *du CHOVL* 3) eius meminit, descriptionem & iconem primam dedit CLVSIUS 4). Baccae nigrae sunt, iis ineibriandi vim tribuit RVPPIVS 5) quam in vulgi sermonibus receptam de *Myrtillus* M. Bructeri, ad *Empetri* baccas refert THALIVS 6). In patria mea in visus humanos non recipiuntur.

§. XXXV.

Paludes amat etiam *Oxycoccus*, sed humiliores, cum *Myrtillus grandis* in summas Alpes adscendat 1). Eum CORDVS 2) primus proposuit & nomine donauit. Prima icon est C. GESNERI 3), elegans. Flos manifesto monopetalos, sed in quatuor portiones profundissime secedens 4): antherae non cornutae. Baccae cum saccharo edules apud Batauos 5), nobis in mensis ignotae 6).

Ad

- 3) *humilis frutex cuius baccae Airelles, descr. Pilat. apud GESNER. fract. p. 74.*
- 4) *Vitis Idaea H. Pann. p. 77. 80. Hist. rar. p. 61.*
- 5) *Vaccinium altissimum foliis subrotundis exalbidis flor. Ien. p. 39. post CAMERARIUM in hort. p. 128.*
- 6) *p. 41.*
- 1) *in ipso Gemmii vertice & Gotthardo visus.*
- 2) *Oxyeoccum Hist. plant. L. II. c. 63. cum bona descriptione.*
- 3) *ibid.*
- 4) *quod recte obseruat eximius LINNAEVS. flor. Lap. 145.*
- 5) *DODON. Pempt. vi. L. II. c. 9. p. 770. Vaccinia palustria.*
- 6) *vti neque apud Suecos & Lapones edules habentur LINN.*

§. XXXVI.

Adfinis Vitibus Idaeis est *Andromeda*, foliis contractis ad margines, vt superficiem pronam eleuatae orae ambiant. Prouenit proprius iam verticem BRVCTERI in paludosis pascuis, amoeno spectaculo, recentibus germinibus corallinis, petiolis pendulis vna cum flore pulchre purpurascentibus. Hanc omnino primus proposuit THALIVS, *Myrtumque tenuifoliam* dixit 1) IOH. BAVHINVS descriptionem & Iconem dedit, & dixit *Vitis Idaea affinem polifoliam montanam* 2) quod nomen non corruptit CHABRAEVS 3), vt saepe quidem solet. Est porro *Rosmarinum sylvestre nostras* PARKINSONI 4). *Vitis Idaea Rosmarini folio auersa parte candido & nervoso* LOESELII 5). *Erica foliis roris marini flore ampio* VESLINGII 6) *Erica alpestris rorismarini incano folio* flore purpureo TITAE 7) *Rosmarinum sylvestre* MERRETI 8), *Erica rorismarini folio* RAI 9), *Erica humilis Rosmarini folio* *Vnedonis flore capsula cistoide* PLVKNET 10). *Erica palustris flore purpurascente, pendulo,* petiole
H 3

1) p. 78.

2) Hist. Univ. Vol. I. l. V. p. 525.

3) p. 41.

4) Theatr. p. 76.

5) Flor. Pruss. p. 289.

6) Cat. plant. Patav. apud TITAM.

7) Hort. Maurocen. p. 68. omnino videtur. In Itinere vocat Ericam alpinam palustrem Rorismarini folio flore purpureo.

8) Pin. rer. Britann. p. 106.

9) Hist. plant. II. p. 1489.

10) Almag. Bot. p. 136. T. 17 f. 1.

tiolo longo rubro rorismarini folio RVDEEK 11) Ledum palustre nostras arbuti flore RAI 12). Poliifolia BVXBVM 13) Ledoides rosmarini foliis rigidis superne laete viridibus inferne albis floribus dilute rubentibus SIEGESBECK 14), Ericoides flore rubro siue purpureo HEIST. 15) Andromeda foliis alternis lanceolatis margine reflexis LINNAEI 16). Flos Ericaë figuram habet ; Staminum proportio , fructus & numerus segmentorum floris Chamaerhododendri est. CAMERARII Vitis Idaea Bavaria baccis rubris insipidis huc non videtur pertinere : vid. RAI ad eum titulum.

§. XXXVII.

Tandem & *Empetrum* versus verticem montis frequens nascitur, staminibus nunc onustum, & florens. Hoc a MATTHIOLO 1) primum descriptum, in *Bructero M.* inuenit AEMILIVS 2), deinde THALIVS 3) atque baccas ineibriare atque deliria gignere monuit, quod quidem neque BORRICHIVS 4) neque LINNAEVS 5) admittunt.

Sup-

11) *Catal. stirp. ex Lapon.* in *Act. suecic.* 1720, p. 97.

12) *Syn.* III. p. 472.

13) *Act. Petropol.* vol. II. p. 345.

14) *Primit. flor. Petrop.* p. 63.

15) *Catal. Hofst. ann.* 1731. monente LINNAEO, synonyma enim defunct.

16) *Flor. Lapon.* 163. cum icone rami T. I. f. 2.

1) p. 154.

2) qui *Corin Brockenbergi*: am dixit apud THALIVM.

3) *Erica baccifera* Matth. p. 41.

4) *Act. Hafniens.* 1673. p. 161.

5) *Flor. Lapon.* 305. an THALIVS popularem famam, a Myr-

§. XXXIX.

Superatis dumetis quae vertici proxima sunt, & in ipso culmine montis, magna vis *Pulsatillae albae* prouenit, plane similis illi quae in *Iuraffo* & *Alpibus* frequens nascitur, flore albo, ad petalorum ortum exterius coeruleo colore tincto, foliis myrrhidis minute diuisis. Est tamen in vniuersum habitus minus villosus & flos ipse minor. Inuentor CORDVS 1) est, icon prima CLVSII 2). *Pulsatilla Apii folio vernalis flore minore* SCHEVCHZERI 3) sub alieno nomine est eadem nostra, vt ex descriptione adparet.

§. XXXX.

Lapidibus in culmine copiose irrepit, *Bryum hypnoides capitulis plurimis erectum lanuginosum* DILLENII 1) foliis ex latiusculo ortu in pilum crispum eductis, capitulis exiguis ouatis in setis breuibus erectis per caulis longitudinem frequenter prouenientibus. Huc aliqui *Muscum montanum* TABERNAEM. 2) ex leui coniectura. An *Muscus capillaceus densissimus lanuginosus alboviridis apicibus niueis* SCHEVCHZERI 3)? non liquet, & fere mallem

tillo grandi per errorem transtulit in Empetri baccas? videtur.

1) *Ranunculi XI. species hist.* L. II. c. I. p. 121. b.

2) *Anemone sylvestris II.* Hist. p. 245. cum iconē, & *Anemone montana pulsatillae folio PANN.* p 382. descr.

3) *It. Alp.* IV. p. 339.

1) *Synops. Rai.* III. p. 97.

2) p. 809.

3) *It. vii.* p. 516.

mallem referre ad *Sphagni* 4) speciem. An *Muscus ericetorum birtutie canescens Gramosus* RVPPII 5): non repugnat.

§. XLI.

Cum Pulsatilla vbererrime prouenit *Hieracium alpinum pumilum folio lanuginoso*: cui *Radix* vix obsequens, lignosa, *Caulis* dodrantalis, aphyllos nonnisi ligulas quasdam graciles & sparsas paucasque adnatas habet. *Folia* cum flauedine virentia longos albos pilos educunt, longa, gracilia, ambitu alias integro, alias vagis dentibus sinuato. Ex villosissimo *calyce* nigro, cuius lanugo alba est, *Flos* flavius, petalis quinquedentatis. Inuentor THALIVS 1) est, qui *Hieracii minoris* speciem Brocembergo peculiarem vocavit. Iconem primam dedit COLVMNA, cui est *Hieracium pumilum* II. Fr. Gregor 2). Ex eo prouenit *Hieracium alpinum pumilum folio lanuginoso* CB. 3) VAILL. 4) *Hieracium alpinum pumilum lanuginosum* 5) PARK. *Pilosella monoclona non repens Alpina minor lanuginosa amplio flore* 6) MORISONI.
Hier-

4) quod in *syn. Rai.* quartum est p. 105.

5) *flor. Ienens.* p. 292.

1) p. 57.

2) *Ecpbras.* II. p. 29. *ic.* p. 30. exiguum specimen.

3) Pin.

4) *Memoir. de l' Acad.* 1719. p. 239. cum synonymo alieno PLVKNETI.

5) p. 799.

6) *H. Oxon.* III. p. 78. S. VII. T. 7. f. 5. ex COLVMNA.

Hieracium alpinum pumilum II. RAI 7). *Dens Leonis*
Alpinus minimus pilosellae folio TOVRNEFORTII 8) an &
 SCHEVCHZERI⁹⁾) *Hieracium alpinum angustifolium villo-*
sum 10) SCHEVCHZ.; *Hieracium alpestre pilosum angustis*
longioribus foliis flore pallente TITAE 11) pro noua plan-
 ta exhibitum. *Hieracium villosum alpinum flore magno*
singulari caule nudo RAI 12) *Hieracium caule unifolio*
 & *unifloro calyce villosò* LINNAEI 13).

Ab hoc, caule folioso & foliis omnibus dentatis di-
 uersum est, caeteroquin simillimum, *Hieracium alpinum*
folio acuto, molli, lanuginoso, dentato BVRSERI 14)
Hieracium forte alpinum lanuginosum longifolium leuiter
dentatum VAILLANTII 15).

Huic denuo ita ad fine est, vt proximum sit, aliud
 quod ab eo, quod in Bructero prouenit, foliis latioribus
 ad ipsum etiam ramosum caulem frequentibus, latius-
 culis, sinuatis & obtusis; a stirpe, quam BVRSERO
 tribuimus, foliis latis non dentatis differt, simillimum
 villo foliorum & calycis, ipsoque flore. Ea est *Hiera-*
cium

7) *hist. Plant.* p. 241. cum asterisco.

8) *hist. des plant. aut. de Paris* p. 54. & IRH.

9) *Itin. IV.* p. 333. absque descriptione; verum cum nostra stirps
 in eodem Itinere alio cum nomine recenseatur, haec potius
Pilosella videtur magis incana summarum Alpium.

10) in eodem *Itin. IV.* p. 336. certo.

11) *Itin. post hort. Mauroc.* omnino videtur.

12) *Syn. III. T. VI. f. 2*, bene nisi aliquid in habitu desideres.

13) *fior. Lap.* 283.

14) *Ast. Suecic* 1724. p. 502. Ex Gemmio M.

15) *Memoir. I. c.* p. 241. cum synonymo J. BAVHINI, quod ad
 vicinam plantam statim dicendam pertinet.

cium alpinum hirsuto folio CLVSII in Pann. 16) alpinum
V. villosum in hist. 17) *Hieracium V. Pannonicum*
 CAMERAR. 18) *Hieracium alpinum hirsuto folio V.*
CLVSII quodammodo incanum IOH. BAVHINI 19) exscriptum ex CLVSI, & denuo *Pilosella siue Pulmonaria lutea angustiori folio valde pilosa duplex* 20) eiusdem cum propria descriptione & icone stirpis ex Montibus Geneuenis petita, vbi & ipsi eam legimus. Priorem CHABAEVS *Hieracium alpinum hirsuto folio flore hieracii luteo* 21) vocat, in alterius nomine vocem *duplex* 22) solam omittit, idque nomen post CHABRAEVM MORISON 23) & RAIVS 24) retinuit. RAIVS alibi 25) *Philosellam siue pulmonariam luteam angustiori folio valde pilosam alteram* dixit. Ex CLVSIANA demum stirpe natum est, *Hieracium alpinum latifolium villosum magno flore* C. BAVHINI 26) PARKINSONI 27) MORISONI 28) HERMANNI 29)

RAII

16) p. 643. icon v. p. 646.

17) p. CXLI.

18) Hort. Med. p. 75.

19) II. p. 1027. ipsum non vidisse stirpem Clvsii adparet.

20) Varietas nempe in foliis imis, quorum pediculus modo longior modo brevior est, etiam nobis obseruata.

21) p. 320.

22) p. 325.

23) H. oxon. III. p. 31.

24) Hist. Plant. p. 240.

25) Catal. stirp. exter. p. 204.

26) PIN.

27) Theatr. Botan. p. 399.

28) H. oxon. III. p. 70.

29) H. L. B. 315. Flor. Bat., p. 21.

RAII 30) MAGNOLII 31) TOVRNEFORTII 32) TITAE 33) SCHEVCHZERI 34) PONTEDERAE. 35) *Hieracium V.*
villosum Clusii MVNTINGII 36) *Hieracium alpinum latiore* folio pilosum flore maiore PLVKNETI 37) cum propria & bona Icone. A montano tomentoso 38) diuersissimum est. Quae omnia quando collata sunt, adparet tres stirpes modo descriptas, conuenire longo villo folii, & calycis, huiusque nigredine, colore demum foli flauido, & mollitie, magnitudine & colore floris: Ita tamen, vt primum caulem pene aphyllon, folia ad radicem longiora & angustiora habeat: Duo reliqua caulem foliosum & folia latiora. Et eorum prius quidem serrata, alterum, quod simul ramosius, multiflorum & reliquis amplius est, integra. Secundum a primo vix satis differt, a tertio euidenter, quod & a primo certissime diuersum est. Primum in *Bructero & Gothardo M.* alterum in *Gothardo*, tertium in omnibus culminibus *Iurassii* & alpibus lectum est.

I 2

Circa

- 30) *Catal. stirp. exter.* p. 114. *bijl. plant.* p. 239. cum nota qua plantas sibi incognitas distinguit,
- 31) H. R. M. p. 98.
- 32) I. R. H.
- 33) *hort. Maurocen.* p. 89.
- 34) *It. Alp.* l. p. 39, bona descriptio.
- 35) *Dissert.* p. 91.
- 36) *waare oeffening van de Plant.* p. 454.
- 37) *Almag.* p. 184. & T. 194. f. 2. bona ic.
- 38) VAILLANTIVS hoc admiscet, breui suo tomento & toto habitu distinctum, atque pulcherrime depictum in *Hort. Eltham* ic. 181. Verum neque icon *Hieracii latifolii pilosi coccinei umbellatai Indici PLVKNET.* T. 194. f. 4, vlo modo stirpi nostrae respondet.

§. XLII.

Circa casam in vertice Bructeri M. exstructam, stirpem denuo vidi, quam in Alpinis pratis M. Schidek & Neunen olim inuenieram, & ex Bohemiae montibus miserat amicissimus HAENELIVS Schneebergensium Medicus. Eam cum pro noua tunc haberem descripsi 1); sed cum aliqua festinatione. Quare nunc, & synonyma & descriptionem meliorem visum est addere. *Radix* ex multis teretibus fibris, absque conspicuo carpo in imum caulem coeuntibus. *Scapus* a dodrantali ad cubitalem, *folia* ad terram pluscula, lata, & obtusiora quam in plerisque Orchidibus, si *palmatam* *flore viridi* exceperis, ad caulem angustiora acutiora. *Spica* florum mediocriter densa, interiectis, ut in *Palmatis* fieri solet, foliolis paulo longioribus quam ovarium. *Ovarium* contortum de more, duarum linearum longitudine. *Flos* ex albo herbaceus dimidia parte longior. *Galeae* foliolâ quinque, quorum alia tria ex albo pallentia magis conspicua sunt, duo minora lutea ex virore. *Barba* 2) trifida, simplex recta protensa, segmento medio maiori. *Calcar* 3) inflatum conicum vnius lineae longitudine. *Cucullus* *staminum* nihil peculiare habet. *Apices* lutei. Odore destituitur. Primus hanc stirpem proposuit LOESELIVS 4) deinde in montibus helueticis lectam SHERARDVS 5), cum BOBARTO communicauit, & BO-

1) *Orchidem palmatam alpinam spica densa albouiridi* vocauit, *Com. Lit. Phys. Techn. Med.* 1733. p. 20.

2) *MICH. l. c. B.*

3) *ib. C.*

4) cui est *Orchis palmata palmis inuersis flore albo.* *Flor. Pruss.* p. 182.

5) qui in *catal. inserto Catal. stirp. exter. RAI.* 1694. vocat *Orchidem Palmatam montanam latifoliam floribus in spica densa albis tantillo lutei admixto* p. 400.

BOBARTVS 6) quidem cum *Orchide pusilla alba odorata radice palmata* Angliae indigena eamdem fecit. PLVKNETVS 7) & RAIVS 8) videntur distinguere. Quam litem suam non fecit CHOMELIVS, neque nos definire possumus. CHOMELIVS pro noua planta descriptis, & ob radicis fibras in carpum non connascentes, *Limodoris* adscensuit, repugnante omni habitu, dixitque *Limodorum montanum flore albo dilute virecente* 9). MICHELIVS nouam iconem dedit, & nomen fecit *Pseudorchis alpina flore herbaceo* 10). Quamquam, vt verum fatear, radicis dignitas tanta esse non videatur, vt stirpem omni fabrica simillimam Palmatis, ab iis auellas. An etiam *Orchis palmata thyrsos speciosa longo dense stipato ex viridi albente* RICHARDSONII 11)? non satis liquet. An *Orchis flore albo minimo* MERRETI 12)?

§. XLIII.

In serobibus ad verticem, *Polygonatum tenuifolium* CORDI 1) vidimus, quod quare *maius* & *minus* fecerit THALLIVS 2), non video. In declivi vero parte montis, quae pagum Ilseburg spectat, vnicam stirpem *Mei*. Neque praeterea aliiquid singulare obuenit, ea die qua per Ilseburgum pagum metallis celebrem, *Wernigerodam* petiuimus.

§. XLIV.

A *Wernigeroda* ad *Specum Baumannianam* iter facientibus aliquoties visus est pilosus in *Hieracio murorum phlofissimo*

I 3

tumor,

6) cui est *Orchis palmata pusilla alba odorata* H. Oxen. III. p. 499.

7) *Almagr. fl. p. 271.*

8) *Cat. stirp. angl. p. 217. Hist. plant. p. 1225. Syn. III. p. 381.*

9) *Mem. de l' Acad. des scienc. 1705. p. 517. ex Aruerniae montibus.*

10) *nov. gener. plant. p. 30. & T. 26.*

11) apud RAIVM *synops. III. p. 382.*

12) *Pin. rer. Brit. p. 86.*

1) *Hist. L. I. c. 86. p. 113.*

2) p. 85.

tumor, qui fulvo crine, modo adsidens radici, modo angulis caulum, aliquam & rudem imaginem musculi sedentis exhibet. In sylvis Brocomagi visus fuerat morbus iste elegans a TRAGO, dictus etiam 1) CHEMNIZIO 2) & RVPPIO. 3) HEVCHERVS vero, vt nouum nomen ob eum tumorem faceret Hieracio myophoro 4) non admundum erat necesse. STOBAEVS 5) etiam, & LINNAEVIS 6) eius meminerunt. In pratis, sub iisdem sylvis, copiose prouenit Filipendula. In supercilio specus Baumannianae ubique, Geranium sanguineum maximo flore, raro inter Gerania exemplo monanthos, cuius iconem non bonam CLVSIVS 7), optimam dedit BESLERVS 8).

§. XLV.

Plures omnino, pulchrasque stirpes alit Hercynia sylua, quod ex THALIO satis adparet, & certius persuasit nobis fasciculus plantarum indigenarum Hercyniae missus ab illustri Viro Aug. Iob. HVGONE Archiatro Brittannico. Sed plures hoc in itinere non vidimus, obstabant praeter tempestatem pluuiam aliae quaedam difficultates. Alterius aestatis labor, vt speramus felicior erit. Comites autem nostri Itineris fuerunt Fridericus Ludovicus Christianus CROPP, qui hanc Dissertationem defendit, Iohannes Christophorus Ludovicus SEIP, celeberrimi medici Pyrmontani IOHANNIS PHILIPPI filius, Carolus Philippus GESNER, I. M. F. Iohannes Arnoldus Julius RICHERS, Hoyensis, Ioachimus FVRSEN Holsatus, Iohannes Henricus HOFMEISTER Hildesiensis. Fridericus Ludovicus ENGELSTAETTER Dresdensis, omnes Medicinae Cultores, Iter exeunte Iunio perfecimus.

- | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---|---|
| 1) p. 77. | 2) Catal. plant. circa Brunsv. p. 43. cum propria icono
in Appendice n. 7. | 3) Flor. Tenerf. p. 163. | 4) Nov. prov.
hort. Med. Wisteb. 1713. p. 74. cum icono. | 5) Act. suecic. ann.
1723. p. 415. | 6) Flor. Lappon. 229. | 7) Geranium haematoches Pannon. p. 419. hisp. Cl. CII. Eadem icone visus est LOB. ic.
660. | 8) H. EYST. Vern. Ord. I. T. XVI. f. 1. |
|-----------|---|--------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---|---|
- * * *

THESES BOTANICAE.

I.

Methodus naturalis, coniungit stirpes ex maiori numero conuentientium characterum, licet unus vel alter manifesto differant; Asarum & Aristolochiam, Rutam, Moschatellinam & Hypopityn.

II.

Distinguit stirpes pluribus characteribus diuersas, et si vnu vel alter manifesto conueniat, Veronicam a Pinguicula, Verbascum a Digitali, Saxifragam ab Umbelliferis.

III.

Methodus artificialis, coniungit plantas pluribus notis diuersas & vnicam conuenientes: Veronicam & Salicem, Moschatellinam & Solanum, Valerianam & Echium.

IV.

Methodus artificialis, distinguit stirpes pluribus notis conuenientes, diuersam vnicam, Echium separat ab Asperifoliis, Saponariam & Caryophyllum a Lychide, Aescyon ab Hyperico.

V.

An noua methodus petenda a proportione Staminum ad Tubas & ad petala, horumque ad calycem proportione? Medetur malis quibusdam a numero ortis, sed manet artificialis, separat Alsinen medium a reliquis, Myosotides a se inuicem &c.

THESES CHIRURGICAE.

VI.

Sectio calculi Rauiana vix vñquam aperit Vesicam ipsam.

VII.

Sed fit continuatio Sectionis adparatu magno, ita ut haec anterior sit & a Vesica remotior, Rauiana posterior & ipsos ceruicis terminos aperiat.

VIII.

Manet tamen eius praestantia, quod adtinet instrumentorum Iter facile, & minus incontinentiae atque lacerationis periculum.

IX.

Adparatus altus alias succedit, alias minime, nullo vitio Chirurgi, neque facile est distinguere quando felix futura sit operatio quando minime.

X.

Adparatus parvus a RAVIANO parum differt, & vix nisi quod directe admittat incisionem, Rauianus oblique.

XI.

THESES ANATOMICAЕ.

XI.

Vena alia Cordis perpetua a sinu dextro in ostium Mediae,
recipiens saepe innominatas.

XII.

Vena anterior Cordis rarissima, sed visa est tamen inserta in
coniunctione auris dextrae cum Vena Cava superiori.

XIII.

Visus est vere in homine ductus a BARTHOLINO descriptus,
neque infrequens est.

XIV.

Incisus ductus, in recente cadauere patulum est infundibulum
setam transmittens.

XV.

Vasa lymphatica a Ventriculo amplissima pene omnium, ad
receptaculum abeunt.

THESES PHYSIOLOGICAЕ.

XVI.

Quid fit in systemate spirituum, de spiritu qui musculum in
motum egit? An refluit ad cerebrum? minime, fieret sensus: an
abit in venas? cur non prius?

XVII.

Per eadem vasa & transpirari & nutriti necesse est.

XVIII.


Fit ergo vera transpiratio per Vasa generis minimi


XIX.

Diaphragma stringit Oesophagum utique, & relaxatur in vo-
mitu.

XX.

Vomitus fit vel sola conuulsione ventriculi, vel adcedente con-
vulsione muscularum abdominalium.





Bryum hypnoide eredium montanum
erectis capitulis acutis.

Sisymbrium palustre album foliis imis
Barbareae reliquis integris

