

1 89518

У 153





Lehrbuch

der

✓ 7 3

# Zoologie

von

F. S. Voigt,

Geheimer Hofrath, ordentl. Professor der Medizin und Botanik, Direktor des botan. Gartens zu Jena; Mitglied der mathematischen Fakultät der K. Universität zu Pesth in Ungarn, korrespondirendes der K. Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, zu Haarlem, der Kaiserl. Leop. Karol. Akademie der Naturforscher, der K. mediz. zu Paris u. c.

—  
Vierter Band.



Spezielle Zoologie. Crustaceen; Arachniden;  
Hymenopteren; Käfer.

---

Mit lithographirten Tafeln.

---

Stuttgart.

E. Schweizerbart's Verlagsbuchhandlung.

1838.



6276



89518  
II

Sechste Abtheilung.

---

## Spezielle Zoologie.

Gliederthiere.

---



---

## Dritte große Abtheilung des Thierreichs.

---

### G e g l i e d e r t e T h i e r e.

#### Animalia articulata.

320.

Indem unsere Schilderung des Thierreichs an diese gegenwärtige Abtheilung gelangt, wird es zweckmäßig seyn, vorerst auf das Bisherige einen Rückblick zu werfen. Nicht blos um des Zusammenhanges willen: sondern auch um überhaupt den großen Plan, den wir uns bei der Ausarbeitung dieses Werkes vorgesetzt, immer deutlicher zu machen.

321.

Der philosophische Geist, welcher allein ordnend in die Mannigfaltigkeit der Dinge eingreift, mußte auch in der beschreibenden Naturgeschichte ein höchstes Prinzip erfassen, von dem aus sich ihm die einzelnen Gegenstände unterordneten. Denn die Natur an sich, so wie sie unseren Sinnen vorliegt, ist für uns nur eine Mannigfaltigkeit von Erscheinungen; der Geist der Ordnung, der in ihr webt, muß durch den Verstand erst in sie hineingelegt werden, ehe er aus ihr wieder herauserkannt werden kann. Nur erst nachdem man sich mit Methode ein Bild des Ganzen eingeprägt hat, ist man im Stande, durch Beobachtung diesen Kreis ferner zu erweitern.

323.

Der erste Schritt zur systematischen Zusammenstellung der Gegenstände geschah auf empirische Weise, nach der äuferen Aehnlichkeit. Ein solches Verfahren beruhigte schon den Ueberblick, räumte die erste Verwirrung auf, und gab der Beobachtung Zeit, sich mit dem Einzelnen zu beschäftigen. Bald folgte auf diese äuferliche Anschauung eine tiefere: es stellte sich ein gewisser Takt ein, nach welchem man hie und da an seinem Verfahren zweifelte: endlich drang die Forschung ins Innere, fäste die feinsten Merkmale auf, verglich sie, und sah vom äuferen Schein ab; so gewann sie ein immer richtigeres System, das wenigstens in seinen großen Zügen feststand.

324.

Indes vergaß der Forscher doch bisweilen, daß es doch immer nur sein Geist war, den er mit dem Objekte verband, und es, wenn auch durch dieses bestimmt, mit ihm nur zu sich zurückleitete. Er kann, schöpft er nicht zu Seiten neue Kraft aus dem ewigen Urquell, doch nur bis auf einen gewissen Punkt gelangen, über den seine Einsichten nicht hinausreichen, und so mag es sich geschichtlich erklären, warum auch die besten Physiker nur ihr eigenes Zeitalter, und nicht das aller Zeiten repräsentirten. Feder, seinen Vorgänger übereilend und einen neuen Schritt vorwärts thuend, mußte es sich gefallen lassen, daß für eine neue Generation seine Werke wieder umgeschrieben wurden.

325.

Dieses Schicksal erfuhr denn auch insbesondere die Zoologie. Linné hatte die gesammelten Erfahrungen zu einem Ganzen vereinigt, und ihnen eine feste Nomenclatur gegeben. Er wurde dadurch Reformator, veranlaßte aber, daß seine Nachfolger fast nichts weiter als Naturbeschreiber, Artenbestimmer wurden. Durch seine terminologischen Definitionen leistete er die weniger Umschauenden von dem physiologischen Wege wieder ab, der namentlich in der Insektenwelt so schön und unterhaltend verfolgt worden war: allein sein Auftreten war nothwendig, um ein gesichertes

Verzeichniß alles Entdeckten zu haben, und diese seine Verzeichnisse waren mehr als bloße methodische Cataloge, wie man sie hat nennen wollen, ohne sie begriffen zu haben, denn so Manches auch in Linnés Anordnungen gegenwärtig verbessert worden ist, so liegen ihnen doch die tiefsten und die gelstreichsten Ansichten zu Grunde.

326.

Linné hatte sich absichtlich die Grenze gesetzt, nichts weiteres als was die äußere Anschauung bietet, für die Charakteristik zu benutzen. Und dies war um so weiser gehandelt, als zu seiner Zeit die Zootomie noch zu weit zurück war, um sie durchgreifend anwenden zu können. Diese vollständige Anwendung war seinem Nachfolger Cuvier aufzuhalten, und die darauf begründete Systemreform erschöpfte nun gewissermaßen, was die durch das Auge wahrnehmbare Gestalt zu liefern vermag.

327.

Da aber der menschliche Forschungstrieb seiner Natur nach nicht stehen bleiben kann, so überschritt er auch bald wieder jene Formeln-Ansicht und wandte sich zur Betrachtung des Lebens, als des eigentlich Wesentlichen zurück. Man versuchte es, dieses in der Erscheinung selbst zum Begriff zu erheben, und so entstand die naturphilosophische Richtung, welche vom Körper aus zum Geiste schreitet, und in der Materie das Bild des Gesetzes erkennt. Auch für die Systematik des Thierreiches wurde diese Weise angewendet, als genetisches Verfahren, welches eine Reihe vom unvollkommensten bis zum höchsten Geschöpf hin demonstriert.

328.

Diese Betrachtungsart hatte, abgesehen von einigen früheren Mißgriffen, die gute Folge, daß nun die Untersuchung der Lebenserscheinungen wieder mehr Reiz gewann, auch wohl, weil man umgekehrt verfuhr, daß manche bisher zu wenig beachtete Rückseite zur erneuerten Prüfung kam. Mit ihr konnte aber nun auch der letzte Schritt nicht ausbleiben, der Weg unmittelbar vom Geiste aus zu ber durch ihn gebildeten

Form hin. Damit erschien die Natur nun wieder im Sinne der Philosophen und Theologen, als die Erscheinung Gottes in der Welt, das des Schöpfers außer sich in seinen Werken. Hier untersucht man zuerst sich selbst, der Mensch nimmt den Menschen als Naturgegenstand, und sucht in den ihm ähnlichen Geschöpfen und so immer abwärts analoge Thätigkeiten und Kräfte wieder zu finden, die dann auf den tieferen Stufen immer entfalteter, aber auch vom allgemeinen Erdenleben wieder abhängiger bemerkbar werden.

329.

Auch unsere Schilderung hat diesen Weg eingeschlagen. Überzeugt, daß nur die Seele ihren Körper baue, nicht dieser jene; daß der Schöpfer überhaupt über die Schöpfung zu sezen sey, wo nur sorgfältig die Klippe zu vermeiden, daß man nicht das besondere Leben mit dem allgemeinen verwechsle, und vor Allem: nicht die Philosophie der Natur mit ihrer Geschichte. Es ist eine wichtige Aufgabe der Naturgeschichte, das Werden der Wesen gesetzmäßig vom Tieffsten bis zum Höchsten zu verfolgen, allein es gelingt dieses nur am Einzelnen, nicht am Ganzen. Die Entstehung der Wesen ist uns noch ein Geheimniß, selbst ihre Zeugung. Sie selbst erkennen wir nicht, lediglich nur ihre Fortsetzung im Gezeugten. Wenn wir dagegen das Seyn in seinem ganzen unseren Sinnen erreichbaren Umfange verstehen wollen, so müssen wir nächst einer empirischen Aufzählung desselben diese von oben herab in logischer Ordnung zusammenstellen, und von einem abstrakten höchsten Bild aus, die Ebenbilder an ihm prüfen. Der absolute Geist ist uns gleichfalls ein Geheimniß; wir können nur den unserer Forschung unterwerfen, den wir zunächst in uns selbst besitzen, und so bleibt dann nicht nur des Menschen Leib, sondern auch seine Seele das Maß und Muster der übrigen Schöpfung.

330.

Eine weise Beschränkung führte hier zu glücklichen Resultaten. Der Anatom und Physiolog, später der Psycholog, erforschten die Natur des Menschen unermüdlich mehrere Jahrhunderte hindurch, und schufen eine Terminologie, die unwillkürlich

auf das Analoge aller Mitgeschöpfe übertragen wurde. Niemand zweifelte, daß die niederen Triebe der uns zunächst lehrenden Thiere dasselbe bezeichneten, was wir an uns bemerkten, aber man zog, um der moralischen Natur des Menschen willen, eine Scheidungslinie zwischen beiden. Konnte man nun auch in der Amphibie, dem Fisch, dem Mollusk, jener höheren Seelentriebe immer weniger gewahr werden, so wurde man doch immer noch gezwungen, auch diese Organisationen den höheren als verwandt, nur als tiefere Stufen derselben anzuerkennen. Man ließ endlich den Vergleich fallen, den immerfort fruchtlos anzustellen, man ermüdete, und nahm diese niederen Wesen, als schlechthin gegeben, an denen man bloß was noch an ihnen merkwürdig seyn konnte, beobachtete.

### 331.

Jetzt aber begegnete man einem zahlosen Heer von kleinen Geschöpfen, welche wiederum weit höhere Geistesfähigkeiten zu offenbaren schienen, als die eben genannten Mittelstufen. Viele derselben zeigten sie nicht so unmittelbar, als man zu sehen gewohnt gewesen, sondern erst nach Durchgehung einer Reihe von sichtbaren Verwandlungen, und dieses Phänomen erregte schon im Alterthum ebenso großes Erstaunen wie Bewunderung. Hier sah man ein Werk des Schöpfers, seiner Gestaltung nach bereits so entfernt von uns, daß man sich nicht die Mühe nahm, den Uebergang von da durch alle Glieder der Organisation hindurch zu verfolgen, um sich zu überzeugen, daß auch hier noch derselbe Naturart, dem auch wir unser Daseyn verdanken, gewaltet, sondern man betrachtete sie gleichsam wie eine Welt für sich, eine reiche Schöpfung, in welcher ihr Urheber uns deutliche Zeichen seiner Weltregierung gegeben hatte. Man stounzte, je länger man das Treiben der Ameise, der Biene, der Spinne beobachtete, ja man findet noch tagtäglich neue bewunderungswerte Neuerungen eines kleinen thierischen Verstandes, in einem manchmal bis ans Unstichtbare grenzenden Wesen \*), einer Organisation, in der

\* ) La difficulté de la recherche des Apères repousse le vulgaire des amateurs; celle de leur examen effraie les connoisseurs eux-mêmes.

nicht einmal ein bedeutendes Gehirn, das wir doch auf den höheren Stufen als den Maßstab dafür zu nehmen gewohnt sind, zu finden ist. Diese unerklärliche Kluft überspringend, ergriff der Philosoph schon vor Zeiten diese Erscheinungen, um uns auf das höhere Weltleben, von welchem dieses nur eine Neuerung seyn konnte, hinzuweisen, und es auf dogmatische Weise zu benutzen. Und wohl hatte er recht; die Deutung war richtig aufgefaßt und die Sache ernst und zur Verehrung leitend. Wie es aber ein Fortschritt der Zeit geworden ist, nicht bloß die Zwecke vorwärts, sondern auch die Gründe rückwärts ins Auge zu fassen — nicht bloß sich um End-Ursachen, sondern auch um Anfangs-Ursachen zu befragen, um beides zusammenzufassen, — so mußten auch jene Erscheinungen des wunderbaren Instinktes und der Kunstrieben der Insekten nicht allein in der schönen Naivität wie sie unsere Altvorderen beschrieben, wiederholt, sondern sie mußten auch bis an ihre Quelle verfolgt werden. Dabei war ein ganzes Zeitalter gemüthlosen Haschens zu überspringen, was eine Menge thätiger Menschen beschäftigt hat, um in unermüdlichem Zagen, Fangen und Anspießen dieser Geschöpfe, deren Artenzahl man jetzt schon bis an 560,000 anschlägt, den bloßen Vorrath der Sammlungen zu vermehren, ohne sich um ihre Lebensweise weiter zu kümmern.

332.

Und so wären wir bereits an der Stelle angelkommen, von wo aus uns eine Erklärung dieser Stufe der Organisation möglich seyn möchte. Cuvier bemerkte zuerst wieder, als er diese Thiere zootomisch durchmusterte, daß die höheren Würmer in ihrem Bau fast gänzlich dem der eigentlichen Insekten, vornämlich ihrer Larven glichen, und es bestimmte ihn dieses, sie unter dem Namen Anneliden von den übrigen zu trennen und dieser Abtheilung zuzuweisen. Man konnte sagen, daß sie Raupen, Maden und Aaseln seyen, denen es nicht gelungen, in eine weitere Verwandlung überzutreten. Da diese Würmer sämmtlich dem feuchten Element, ja eigentlich ganz dem Wasser, und keines der trocknen Luft angehören, so ließe sich gar wohl die Hypothese aufstellen, daß auch die Larven der Insekten ursprünglich nur

Würmer gewesen, die, durch die Beschaffenheit unseres Planeten veranlaßt, einst einer ferneren Metamorphose unterworfen worden. Wie dem aber auch seyn möge, die große Erfahrung geht wenigstens daraus hervor, daß in der scheinbar so niederen Organisation ein solcher Reichthum geheimer Keime verborgen liege, die in ihrer Entfaltung das höchste Seelenleben zu entwickeln vermögen, daß man wohl davon einen Schluß auf das Unserige, künftigen solchen Entwicklungen vorbehaltene, zu ziehen wagen möchte. Und da nun schon den Alten die Ueberzeugung nicht fremd war, daß unsere Seele für diesen Leib zu eng, einer reineren Verklärung zueile, so lag das Bild der Psyche im Schmetterling nicht fern, das nicht nur sie gern benutzten, sondern das auch dem christlichen Zugendlehrer brauchbar und willkommen wurde.

### 333.

Dabei zeigte sich ferner, bei weiterer Beobachtung, eine Größe der Schöpfung, die nicht minderen Stoff des Nachdenkens bot. Jene Metamorphose nämlich erschien keinesweges einfach. Sie offenbarte sich in ganz verschiedenartigen Formen der Insektenwelt, und während sie sich einerseits am weichen, blumengleichen Schmetterling eben so vollständig wie am harten, fruchtähnlichen Käfer, der lustigen Mücke, ebenso wie an der schwerfälligen Biene zeigte, so fanden sich auch andere Fälle, wo sie nicht mehr in scharfer Trennung erfolgt, sondern die Stufen ineinander übergehen. Zuletzt gelangte man gar an die Grade, wo sie gänzlich am Individuum haften blieb, wie der Krebs zeigt, dessen Schwanz noch Wurm, dessen Mitte Puppe, und dessen Vordertheil schon ein deutliches Käfergesicht ist.

### 334.

Also bietet uns auch hier die Natur eine Mannigfaltigkeit von Stufen, welche die Erklärung wieder erweitert. Denn wenn es auch der Wahrscheinlichkeit nahe liegt, daß die Luft es sey, welche jene höhere Entwicklung veranlaßte, und das Licht, welches sie bewerkstelligte, so blieb doch die Epoche einer solchen Schöpfung immer noch im allertiefsten Dunkel. Es ist jetzt

bekannt, daß wir in den ziemlich ältesten Gebirgslagern, welche Petrefakten enthalten, im Übergangsgestein, ein krebsartiges Thier, den Trilobiten, gefunden haben. Der Grauwackenschreier wird für dieses alte Gestein anerkannt. Wenn wir nun auch weiter nichts als dieses einzige Gliederthier entdecken sollten, so müßte uns doch dies allein schon Bürge seyn, daß zu jener Zeit eine Insektenwelt, — wenn auch anderer Gattungen, — wenigstens möglicherweise, existirt habe. Denn daß wir bis jetzt keine eigentlichen Insekten gefunden, beweist so wenig als wennemand, der nie eine Nadel gefunden, die Möglichkeit ihres Verlierens läugnen wollte: zudem sind die Gebirgsschichten jener Zeit nur verhärtete Niederschläge eines Meergewässers, und in diesen finden sich auch jetzt wohl kaum Insekten. Sie werden verzehrt oder verwesen schnell. Wenn also auf jeden Fall wenigstens zugegeben werden muß, daß der Alt, welcher gegliederte Thiere schuf, bereits statt gefunden; wenn mit dieser Erfahrung wenigstens als wahrscheinlich das damalige Vorhandenseyn anderer analoger Thiere nahe liegt\*); so ist die Theorie einer successiv stetigen Schöpfung damit widerlegt. Wollte man endlich noch weiter voraussehen, daß in jener sogenannten Urzeit Landinsekten existirt hätten, deren Leben auf die Nahrung von Pflanzen und anderen Thieren angewiesen: so würden wir zugeben müssen, daß wir trotz unserer so großen und glücklichen geologischen Forschungen doch nur immer noch an der Pforte zum Eingang in die Vorwelt stehen, und diesen Schauplatz einer Scene vergleichen können, bei der uns allmälig ein hinterer Vorhang nach dem andern aufgezogen, immerfort eine neue unbekannte Decoration öffnet, hinter welcher aber noch gar viele andere verborgen stecken möchten, von denen dereinst eine nach der andern aufgethan werden könnte.

335.

Die gegenwärtige Abtheilung von Thieren ist *Animalia articulata*, gegliederte Thiere, auch *Condylopa* genannt

---

\* ) Graf Münster hat wenigstens schon einen Insektenflügel im Lias gesehen.

worben, nicht bloß, weil die meisten seitliche eingelenkte Gliedmassen besitzen, sondern weil ihr ganzer Leib der Länge nach in mehrere Gelenke zerfällt ist. Und in diesem Charakter liegt auch zugleich das Geheimniß ihrer Erklärung. Ihr Leib ist kein so verschmolzenes Ganzes mehr wie das Ei, das Mollusk, oder im Grunde der Rumpf aller Skeletthiere, sondern er trennt sich in sich, und wenn auch nicht gänzlich durch Auseinanderfallen, doch annähernd. Denn es zeigt der Wurm, daß er, in Stücke zerschnitten, aus jedem wieder zu einem Ganzen erwachsen kann\*). So bedenklich uns nun diese Eigenschaft in Bezug auf die Einheit der Seele vorkommen möchte, so liegt auch die verwandte Beobachtung nahe, daß auch die ausgerissenen Beine mancher Gliederthiere, z. B. der Afterspinnen (*Opilio*), mehrere Tage lang ihre Lebendigkeit behalten. An dieses so leicht zertheilbare Leben schließt sich das große Reproduktionsvermögen der Glieder, der Krebse, die reichliche Brut der Blattläuse ohne Begattung, und endlich die Erzeugung solcher Geschöpfe gänzlich ohne Eltern, wie wir nicht anders von den Milben und Eingeweidewürmern annehmen können. Dagegen erscheint der Alt, den die Verwandlung eines Tagfalters durchläuft, wieder geschlossener, obgleich er auf denselben Basen beruht.

336.

Wenn aber bemerkt man in der ganzen lebendigen Schöpfung ja bis ins Gebiet des sittlichen Lebens hinein, daß nur Trennung und richtige Sonderung des vermischten, zur Bildung fähre, so wie von der anderen Seite, daß nur Hemmung produktiv mache. Verfolgen wir von den Mollusken her die Thiere gegenwärtiger Abtheilung, so möchte es scheinen, als ob sie, vom Licht gewaltig

\*) Professor San Giovanni in Neapel zerschneidet im April drei Regenwürmer: im Dezember waren aus diesen sechs Stücken sechs vollständige, jeder mit seinem Kopfe gebildet. — An dem Wasserschlängelchen, *Nais proboscidea*, bemerkt man, wie sich eines der hinteren Glieder in einen Kopf mit Augen und Fühläden ausbildet, während es noch lange Zeit als solches an der Mutter haftet, bis es sich löst. Auch viele Eingeweidewürmer, namentlich die Bandwürmer, möchten sich durch freiwillige Zerfällung ihrer Glieder vermehren können.

angeregt, einer pflanzenartigen Streckung unterworfen worden, und nun nicht mehr im Stande gewesen seyen, sich als gleichartiger Leib zu behaupten. Sie sonderten sich in Ringe, einzelne Leiber, ohne ihren Zusammenhang gänzlich aufzugeben; der Trieb zur molluskenartigen Zusammenziehung blieb bei allen noch deutlich, ja die weicheren ringeln sich, gleich den Schnecken, die härteren ziehen wenigstens die Glieder an den Leib, um mehr Einheit bei der Gefahr zu gewinnen.

337.

Wenn nun das Thier mit diesem in abwechselnder Spannung befindlichen Leben noch den Einflüssen der warmen, austrocknenden Luft ausgesetzt ist, so muß seine Haut zuletzt verhärtet, die Bewegung hemmen und zur Erstarrung führen. Hier wird sie dann einigemale gesprengt, damit das Innere verjüngt daraus hervortreten könne; ist aber die Organisation höher angelegt, schon innerlich mannigfacher gestaltet, so wird auch während dieser Zeit das wurmähnliche Geschöpf sich, mittels eigener Organe, seiner sich anhäufenden Gästen entledigen, und so das Gespinnst bereiten. Da es werden sich für jede Funktion die benachbarten Glieder wieder inniger verbinden, und die allgemeinere Sonderung in Kopf, Mittel- und Bauchstück vorbereiten, durch welche Gestaltverfeinerung nun um so besser jene äußere Thätigkeiten zu Stande gebracht werden können. Diese Gliederung ist es also, auf welcher die Möglichkeit der höheren Funktionen beruht, und die hierdurch herbeigeführte besondere Organisation wird uns hiemit der nächste Gegenstand der Be trachtung werden.

338.

Sämtliche Thiere dieser großen Abtheilung haben einen mehr oder minder langen, in mehrere Ringe oder Abschnitte gesonderten Körper. Nur bei einigen, welche die letzten dieser Reihe bilden, z. B. bei den Milben und den Planarien, sind sie undeutlich, bei allen übrigen ist die Körperhaut verhärtet, um Ringe zu bilden, die an ihren weicheren Enden zusammenstoßen oder sich übereinander schieben, und daher eine Zusammenziehung möglich

machen. Nur einige der letzten Classe, der Ringelwürmer, sind außerdem ganz nackt; die mehresten, selbst unter diesen, dagegen an jedem solchen Ringe mit Ansäßen von Büscheln, Borsten oder anderen dergleichen Anhängseln versehen, und die sämtlichen ausgebildeten Thiere der übrigen vier großen Klassen, der Myriapoden, der eigentlichen Insekten, der Arachniden, und der Krebse, noch mit eingelenkten seitlichen Bewegungswerkzeugen versehen, welche man vornehmlich in Füße, Flügel und Fresswerkzeuge unterscheiden kann.

Diese Thiere haben daher kein innerliches Knochenklebet wie die höheren; auch fehlt ihnen die allgemeine Mantelhülle und das Schalgehäuse der Mollusken: aber sie besitzen eine durch Verhärtung vielgliederige Haut, deren horniges Schleimnetz hier und da fast knochig oder steinhart werden kann, und in welchem sich Muskeln befestigen, die ihnen alle Arten von Bewegung, das Laufen, Springen, Hüpfen, Fliegen, Kriechen und Schwimmen gestatten.

Eine nothwendige Folge dieses Baues sind die mannigfachen Bewegungen, mit welchen sie nicht nur im Stande sind, den Ort leicht zu wechseln, sondern auch die oft so mühsamen Werke ihrer Industrie auszuführen.

Ihr Nervensystem besteht aus zwei Strängen, längs der Bauchseite gelegen, und von Glied zu Glied in Knoten oder Ganglien angeschwollen und mittels derselben vereinigt, von denen die besonderen Nerven der Sinne und der Glieder ausgehen. Diese Stränge umfassen vorn den Schlund nach oben, und die beiden größeren Knoten, in welche sie sich hier verbinden, bezeichnen das Gehirn. Allein jedes der nachfolgenden Ganglien scheint auch für den besonderen Leibesring, dem es angehört, Hirnfunktion auszuüben, und, wenn der Körper zerstört worden, noch eine Zeitlang für dessen Sensibilität auszureichen.

Ihre Irritabilität und Muskelkraft ist groß. Mehrere besitzen eine für ihre Kleinheit außerordentliche Kraft und Stärke, wovon man nur die Beispiele unter den größeren Krebsen und Käfern zu suchen braucht, deren Muskeln freilich durch die conchylienarten Hüllen die besten Stützpunkte erhalten — allein auch die Zusammenziehungs Kraft vieler Würmer, die unermüdliche oft stundenlange Beweglichkeit der Mücken in der Luft, so wie

der Entomostraken im Wasser, und die über ganze Länder weggehenden Züge der Libellen und Hirschrecken, oder die Rührigkeit der Ameisen, Bienen und Spinnen, legen hinlängliches Zeugniß hierfür ab.

Ihre Kinnladen, wo verglichen vorhanden, bewegen sich stets seitlich, nie, wie ein Vogelschnabel, von oben nach unten. Augen sind bei vielen vorhanden; eben so gewiß bei vielen ein Geschmack- und Tastsinn; auch hie und da ein Ohr; im übrigen aber sind die Sätze ihrer Sinne theils problematisch, theils wenigstens noch nicht entdeckt.

Ihr Blut ist verschieden, so wie ihr Atmungsprozeß, daher sich über diese nichts Allgemeines sagen läßt.

Ihre Ernährung ist ebenso mannigfaltig. Man findet unter ihnen, ja wieder unter jeder Klasse besonders, Raubthiere, beißende, fauende, so wie saugende, leckende oder stechende. Besides theils für Nahrung aus dem Thierreiche wie aus dem Pflanzenreiche. Manche gehen am Tag, manche des Nachts ihrem Raube nach, andere sind Parasiten auf den Leibern höherer und niederer Thiere, ja vieler Insekten selbst wieder. Deswegen kann denn ihr Gesamtcharakter auch in ein unaufhörlich geschäftiges summendes, zerstörendes oder verzehrendes Wesen gesetzt werden, welcher aber auf den höheren Stufen auch zugleich als ein kunstreiches erscheint. Wenn die Mollusken und Korallen mehr auferbauend und ruhig sich vermehrend erscheinen, so zeigen sich dagegen diese Gelenkthiere mehr als alles durchnagend, verwüstend und vernichtend. Und wie sie hierdurch, indem sie faulende Stoffe schnell verzehren, nützlich wirken, so schaden sie durch oft schreckliche Zerstörung der Obst- und Waldbäume, der Saaten und Getreideförner, des Hausgeräthes und der Kleider. Die Borkenkäfer, Spannraupen, Kornwürmer, Pelzmotten, Heuschrecken, Termiten und Schaben sind die Plagen der Menschheit, Mücken und Ungeziefer peinigen, und Würmer saugen an seinem Innern. Wegen Termiten und Ameisen hat man in Amerika Länder verlassen müssen, und bei uns sind oft Wanzen, Fliegen und Mäuse kaum zu bekämpfen.

Dabei ist auch ihre Fruchtbarkeit außerordentlich. Raumur hat berechnet, daß eine einzige Blattlaus in der fünften Generation schon gegen sechstausend Millionen Nachkommen habe,

so wie eine einzige Schmelzfliege in einem Sommer deren fünfhundert Millionen erzeugen kann; nach Rambohr sogar ein einziges Wasserloch binnen zwei Monaten schon gegen dreizehnhundert Millionen! und so würde man diese Angaben nach der Eierzahl eines Individuums und der Zeit, in welcher die Brut wiederum fortpflanzungsfähig ist, noch mit vielen Beispielen vermehren können, wenn solche Zahlen nicht zugleich eine gewisse Unbrauchbarkeit, ja Unrichtigkeit, mit sich führten, indem nämlich der schnelle Verlust, den solche Mengen immer wieder erleiden, nicht mit in Ansatz gebracht wird. Allerdings beweisen sie die ungeheure und mächtige Schöpfungskraft, die sich in ihrem Reichthum hier wieder in einer anderen Form aufthut, und in den plötzlich entstehenden oder sich schrecklich schnell vermehrenden Individuen hier und da fand gibt: allein eben so schnell vernichtet auch die, das Gleichgewicht der Natur behauptende höhere Thätigkeit solche Exesse wieder, wie denn von Raupen und Borkenkäfern heimgesuchte Wälder, wo kein Vertilgungsmittel wirksam genug war, unverhofft von diesen Gästen wieder befreit worden sind, ohne daß man die Ursache davon genügend aufzufinden gewußt\*).

### 339.

Diese große Abtheilung läßt sich in fünf Klassen zertheilen, deren jede aber wieder so viel Eigenthümliches zeigt, daß nur obige allgemeine Charaktere ihren Zusammenhang bestimmen. Auch

---

\*) Gewiß sind oft schon eintretende Kälte oder Regen, oder eine Auswanderung, wie die der Borkenkäfer selbst, erklärbare Ursachen; anderemale reichen sie jedoch nicht hin, ebenso wie es schwer ist, das plötzliche übermäßige Erscheinen zu erklären. In den Jahren 1822 bis 1824 zeigte sich hier um Jena die Todtentkopfraupe zu Hunderten, die ich zuvor nie, nachmals nur sehr spärlich, wieder gesehen; ihr Verschwinden könnte hier auch wohl von dem unermüdlichen Suchen der Liebhaber nach ihnen erklärt werden. Ebenso läßt sich hier und da die Vermehrung von Ungeziefer, wenn auch nur davon einige Individuen verzettelt worden sind, nach obigem denken, und fordert um so mehr zu sorgfältiger Vertilgung auf. Die Spannraupen der Obstbäume sollen durch die italienische Pappel, so wie die Pelzmotten durch die Matrasen der Feldlager der Armeen in den ersten Revolutionskriegen in Deutschland verbreitet worden seyn.

diese Klassen enthalten einiges Willkürliche: allein sie sind nach wesentlichen Eigenschaften entworfen und allgemein angenommen.

Die erste Klasse schließt sich noch unter allen am deutlichsten an die vorhergehende, die Mollusken, namentlich an die schnurrenfüßigen Enteromuscheln an. Die ersten unter ihnen, die Entomostraken, zeigen mehrere Arten gegliederter, in zwei muschelähnlichen Schalen steckender\*) Thiere, deren Bau man in den meisten Punkten mit ihnen parallelisiren kann. Auch die eigentlichen Krebse nähern sich physiologisch der Natur der Conchylien durch die Härte und Färbung ihrer Schale, so wie durch das reichliche Fleisch. Alle aber haben gegliederte, an den Seiten des Leibes befestigte, nur im ginglymus sich bewegende zahlreiche Füße (höher entwickelt äußere Kiemen der Muscheln mit Kiemenblättern daranhängend (dem inneren Kiemenpaar der Muscheln entsprechend), ein fleischiges Herz, im Rücken wie bei jenen liegend, und in einen Bauchkanal verlängert. Sie besitzen fast alle vier gegliederte Fühler und mehrere Kinnladen. Ihr Kopf ist noch in das Bruststück verschmolzen (Cephalothorax). Er trägt zusammengesetzte Augen. Sie leben fast sämmtlich im Meer oder Süßwasser, und nur wenige auf der feuchten Erde. Unter ihnen kommen die größten an Volum vor, aber ihre Reihe endigt bis in die kleinsten, fast mikroskopischen Parasiten, ja eine Art muß zur Zeit noch in die Klasse der Infusorien verwiesen werden. Sie heißen sämmtlich Crustaceen.

Die zweite Klasse besaß Thiere, bei denen gleichfalls der Kopf noch nicht aus dem Bruststück herausgetreten ist, die aber stets nur acht, in einem Halbkreis unten am Bruststück (Cephalothorax) befestigte Füße haben. Die Eingewölde liegen bei ihnen auch hinter demselben in einem abgesonderten Bauche. Der Mund hat Kinnbacken, oder Saugrüssel und lange Taster, der Kopf dagegen keine Fühler und nur einfache Augen. Das Herz hat die Gestalt eines langen Rückengefäßes, das mit Arterien und Venen in Verbindung steht. Die Respiration geht

---

\*) So daß man eine einzelne Schale verselben für die einer Bivalve halten könnte, z. B. bei der neuerlich von Rüppel beschriebenen *Estheria dahalacensis* (Mus. Senckenberg. II. B. 2. H.); bei uns sieht man diesen Bau zumal an den kleinen Cypris.

theils durch lungenähnliche Organe, theils durch Lufröhren vor sich: beide münden nach außen durch Stigmen, wie bei den folgenden. Sie leben alle auf dem Lande, aber gewöhnlich in dunklen Schlupfwinkeln, oder sind Parasiten. Ihre Größe ist gerin- ger als die der meisten vorigen, und geht auch bis zur mikroskopischen Kleinheit. Viele sondern ein gefährliches Gift ab, oder sind durch ihren Biß dem Menschen lästig. Man nennt sie Arachniden.

Die dritte Klasse bildet die zahlreichste des ganzen Thierreiches. Hier ist ein Kopf deutlich von einem Bruststück, und dieses wieder von einem Bauchstück geschieden und das Bruststück trägt allein die Füße, deren nie mehr und weniger als sechs sind. Doch sind an denselben die Flügel entwickelt, eigentlich der Anlage nach auch sechs, aber gewöhnlich deren nur vier, bisweilen nur zwei, und manchmal gar keine entwickelt. Der Kopf trägt zwei Fühler, unten die Fresswerkzeuge, und zweierlei Art Augen, zusammengesetzte wie bei den Crustaceen und dazwischen einfache Punktaugen. Der Bauch enthält die wichtigsten Eingeweide. Ihr Herz ist nur noch in einer Spur zu finden, als ein langes zartes Rückengefäß, Arterien und Venen fehlen. Sie atmen durch zahlreich verzweigte Lufröhren, die sich nach außen in Stigmen öffnen. Eigentlich durchgehen alle eine allmäßige Verwandlung oder Metamorphose, die meisten eine sogenannte vollkommene, indem aus dem Ei eine wurmähnliche Larve, mit oder ohne Füße kommt, welche sich nach einigen Häutungen verpuppt, dann unbeweglich liegt, und aus sich das vollkommene geflügelte Insekt hervorkommen läßt. Erst dieses ist begattungs- und fortpflanzungsfähig, begattet sich aber nur einmal im Leben, und stirbt hierauf. Andere haben eine sogenannte halbe oder unvollkommene Metamorphose, welche in einer nur geringen Veränderung der Gestalt, oft nur darin besteht, daß das vollendete Insekt erst Flügel und reife Geschlechtstheile bekommt. Ja bei einigen fließen alle diese Zustände in einander über\*). Die Ordnungen

\*) Man hat mehrmals Fälle beobachtet, und dies namentlich bei den Seidenraupen; die man leichter vor Augen hatte, daß die Raupen bei der letzten Häutung, sogleich, wenn auch verkrüppelte, Flügel erhalten, ohne erst in den Puppenzustand überzugehen. Man sah,

dieser großen Classe, der eigentlichen Insekten, sind unter sich sehr verschieden, und Aufenthalt, Nahrung, Lebensweise mannigfaltig. Die bei weitem Meisten leben aber in der Luft. Die niedersten sind saugende, ungestügelte Parasiten.

Eine vier te, neuerlich mit Recht abgesonderte kleine Classe, begreift einige Thiere, die zwar einen deutlich abgesonderten Kopf, mit Kinnladen, Fühlern und Augen zeigen, welche einen Mittenzustand zwischen zusammengesetzten und einfachen bilden, bei denen aber das Bruststück nicht vom Bauche unterscheiden, sondern beides wormartig schlank ist, und wovon jeder Ring ein doppeltes paar Füße trägt, nie unter vierzehn. Sie atmen durch Luftröhren, die nach außen in Stigmen endigen, wie bei den Insekten, und erleiden auch eine Art Metamorphose, indem sie bei der Geburt noch nicht alle Leibesringe und Füße, noch ausgebildete Geschlechtstheile haben. Sie gleichen den Nereiden und einigen anderen Seewürmern, leben im Dunkeln, unter Holz und Steinen, und haben mitunter giftige Säfte. Sie heißen Myriapoden.

Die fünfte und letzte Classe endlich zeigt itum mehr Thiere dieser Abtheilung, die gleichsam zu den niederen Formen zurückkehren. Ihr Körper ist lang und weich, gleichartig in Gürtel oder Leibesringe abgetheilt, aber ohne Verhärtung derselben und ein Kopf bei den meisten kaum entwickelt. Eingelenkte Füße oder Flügel besitzen sie nie, nur Borsten, Häälchen oder Kiemenblätter an den Leibesringen, und ihre Respiration geschieht durch letztere oder durch innerliche Bläschen. Ihr Blut ist roth wie das der Wirbelthiere, und cirkulirt in einem geschlossenen Systeme von Arterien und Venen. Einige haben Augen, die meisten sind Zwitter, die sich wechselseitig begatten wie die Landschnecken. Eine Verwandlung durchgehen sie nicht. Die meisten und größten leben in der See, einige im Süßwasser, wenige in der nassen Erde. Dieses sind die Anneliden. Ihr Bau ist aber so verschiedentlich, daß sie noch besonders eingetheilt werden müssen, indem man einige so unvollkommene antrifft, daß sie gar keine Leibesringe mehr zeigen. Ja diese Thierform geht genau

---

daß dergleichen die Spinngefäße verkümmert hatten, was in dem S. 537 Gesagten seine Erklärung findet.

in die der Eingeweidebewahrer hinüber, welche man würde zu ihnen schlagen müssen, wenn sie nicht durch einige andere wesentliche Charaktere von ihnen getrennt zu werden verbienten.

Diese fünf Klassen der Gliederthiere unterscheiden sich also auf den ersten Blick so, daß die Crustaceen einen Rumpf mit schmalem Schwanz ohne Kopf; die Arachniden einen bloßen Rumpf mit Bauchstück darstellen, und erst die eigentlichen Insekten die drei Regionen von Kopf, Brust und Bauch gleichmäßig; die Myriapoden erscheinen wie ein bloßer Schwanz mit Kopf, und im Wurm fängt auch letzterer an sich wieder zu verlieren. Die Arachniden kann man Krebstiere im Trocknen, die Crustaceen Meerspinnen und Meer-Skorpione nennen; die Myriapoden erscheinen wie Nereiden auf dem trocknen Lande, die Anneliden wie Aaseln und Raupen im Wasser.

## I. Krebstiere. Crustacea.

Haben Kopf und Bruststück verschmolzen.

Zusammengesetzte Augen.

Vier Fühler.

Keine Flügel.

Zehn und mehr Füße.

Keine Verwandlung.

Weißes Blut.

Athmen durch Kiemen oder Bläschen.

Begatten sich mehrmals im Leben.

Und sind meist Wasserbewohner.

## II. Arachniden. Arachnides.

Haben Kopf und Bruststück verschmolzen.

Einfache Augen.

Keine Fühler.

Keine Flügel.

Acht im Halbkreis stehende Füße.

Keine Verwandlung.

Athmen durch Lungen und Luströhren.

Begatten sich mehrmals im Leben.

Und sind Landbewohner.

### III. Insekten. Insecta.

Haben Kopf, Bruststück und Bauch unterschieden.  
Zweierlei Augen.  
Zwei Fühler.  
Flügel.  
Sechs Füße.  
Eine Verwandlung.  
Atmnen durch Luftröhren.  
Begatten sich nur einmal.  
Und sind größtentheils Luftbewohner.

### IV. Myriapoden. Myriapoda.

Haben nur den Kopf unterschieden.  
Gehäufte Punktaugen.  
Vier Fühler.  
Keine Flügel.  
Undeutliche Verwandlung.  
Vierzehn paar und mehr Füße.  
Atmnen durch Luftröhren.  
Und sind Landbewohner.

### V. Ringelwürmer. Annelides.

Haben keine eingelenkte Füße.  
Keine Verwandlung.  
Haben rothes Blut und doppelte Circulation.  
Atmnen durch äußere Klemmen oder innere Säckchen.  
Und sind Wasserbewohner.

---

# Spezielle Zoologie.

---

Crustaceen.

---



---

## Sechste Klasse.

---

### Crustaceen.

340.

Crustaceen, weniger gut Schaltheere genannt, heißen nach der vorn angegebenen Bestimmung djenigen gegliederten Thiere die längs des Körpers wenigstens fünf Paar eingelenkter Füße, und dabei an der Basis derselben Kiemablätter besitzen. Ihr Kopf ist nur durch eine Furche vom Bruststück unterschieden, ja bei den meisten eigentlich noch ganz fehlend, und nur durch die ihm zukommenden Organe angedeutet. Dieses sind, unten, mehrere Paar zu Füßchen umgebildete Kinnladen oben vier Fühler, und zwei zusammengesetzte Augen.

341.

Von der Verwandtschaft dieser Thiere mit den Muscheln ist schon vorn die Rede gewesen. Doch lässt sich hiermit nicht sowohl eine Abstammung oder auch nur Ableitung der einen aus den andern nachweisen, als vielmehr bloß die in der Natur so oft zu bemerkende Modifikation gleicher Grundgestalten. Denn eben so bequem ließe sich, von den Insekten aus durch die Arachniden, der Übergang bis zu ihnen finden, wodurch aber auch nichts weiter als ihre natürliche Verwandtschaft einstichtig wird.

342.

Wohl aber möchten diese Thiere in der Schöpfungsgeschichte zu den primitivsten und ältesten gehören. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sich selbst jetzt noch welche unter den Kleinsten erzeugen, auch stehen sie in der Entwicklungsreihe offenbar tiefer als die Arachniden und die vollkommenen Insekten. Ihr Kopf ist noch nicht vollkommen, da, wo man ihn, und ließ mehr darum, weil man Augen sieht, annimmt, ausgebildet: auch scheint er, zumal bei manchen Krebsen, in das Bruststück wie eingekleist, daher man dieses Cephalothorax genannt hat. Um messen bewährt sich ihre niedere Stufe dadurch, daß sie den ganzen abgesetzten Gang der Metamorphose der Insekten an sich selbst der Länge nach andeuten, ohne sich durch ihre Häutungen zu einer höheren Gestalt zu erheben; und daß sie ihrer Lebensart nach größtentheils Parasiten sind, welche Thier- und Pflanzentheile verzehren, oder sich geradzu als Ungeziefer an lebendige Thiere heften, um sie zeitlebens nicht zu verlassen.

342.

Ihre Gestalten sind dabei so außerordentlich verschieden, daß es nur um den höheren Überblick zu erhalten, geschieht, daß man sie in sechs Ordnungen, und nicht in eben so viele Klassen abtheilt. Deshalb ihre eigentliche Naturgeschichte auch erst bei diesen gegeben werden kann.

343.

Unter ihnen finden sich die größten Gliederthiere. Die Hummer des Nordmeeres wie des Mittelmeeres und Indiens erreichen bis an anderthalb Fuß Länge, und gewisse Krabben des nördlichen stillen Oceans sollen eine ähnliche Breite haben. Andere dagegen sind kaum eine Linie lang. Wo sie sich aber finden, sind sie sehr zahlreich, und dienen Menschen und Thieren zu einer unerschöpflichen Nahrung.

344.

Die meisten bewohnen das Meer, nur wenige das Süßwasser und das freie Land. Letzteres thun nur die Kellerasseln. Im

Süßwasser finden sich *Gammarus*, *Asellus aquatilis*, und die zahlreichen *Cypris*, *Daphnia* und *Cyclops*, so wie andere Kiefernfüße. Die Meerbewohner theilen sich aber wiederum nach der Art ihrer Lebensweise in den Aufenthalt. Die Börsenkrabbe entsteigt dem Wasser, um selbst auf Bäume zu klettern. Andere, ebenso räuberische, Landkrabben, leben in Erdlöchern, und laufen des Nachts mit spinnengleicher Schnelligkeit an den Ufern herum, wo sie ein gefährlicher Feind der Beute des Jägers werden. Reisende, welche sich schlafen legen und die Frucht ihrer Jagd neben sich, finden dieselbe von diesen *Ocypoda*-Arten nach wenigen Stunden völlig aufgezehrt. Diese letzteren halten sich auch den Tag über in den Löchern im Sande am Meeresufer auf, und da sie des Abends so schnell laufen, daß sie ein Pferd nicht soll einholen können, so hat man ihnen im Alterthum den Namen: Reiter (*Eques, Hippus*) gegeben.

Von den Meerkrebsen sind die *Grapsus* und *Talitrus* noch wahre Amphibien. Sie sitzen auf den Meeresfelsen in der Lust und lassen sich nur selten in die Wellen hinabfallen. Die eigentlichen Krabben, *Pagurus*, *Thalassina* u. a. nehmen die Gestade ein. Die *Porcellana*, die aesselartigen *Ligia*, *Caprella*, *Sphaeroma* und *Idotea* verstecken sich unter mit Seetang bedeckten Steinen, wenigstens sechs Fuß tief\*). Die *Anceus*, *Bopyrus*, *Hippa*, *Pinnotheres*, hesten sich an andere Thiere, wie die *Caligus* und *Cyamus* an die Knorpelfische, und die *Cymothoa* an die Knochenfische. *Palaemon*, *Crango*, *Phronima*, schwimmen bald an der Oberfläche, bald springen sie darüber hinaus, wie spielende Insekten. Die *Portunus*, *Maja* u. a. leben gesellig in der Region des Seewiers. Aber die größten Krebse, jene *Astacus*, *Palinurus* und *Scyllarus*, deren Fang das reichlichste Nahrungsmitte gewährt, ziehen eine Felsen tiefe von 200—2000 Fuß vor. Einige Gattungen hausen, wie die Erdspinnen, stets in Felsen und Corallenlöchern, andere stecken ihren nackten Schwanz in Conchylengehäuse, aus welchen sie erst das Thier herausfressen und schleppen diese Wohnung mit sich umher\*\*). Dabei sind sie,

\*) Daher sie bei den Franzosen Soldat heißen, weil sie sich selbst Quartier zu verschaffen wissen.

\*\*) *Risso Histoire naturelle des Crustacés des environs de Nice* p. 3.

mit ihren corallenrothen Fühlern und smaragdgrünen Augen listig und pfiffig im Fassen und Erlauschen ihrer Beute.

Die Süßwassercrustaceen sieht man in unseren Bächen und Gräben. Auch der gemeine Krebs versteckt sich in Löcher und unter Baumwurzeln, und geht nur des Nachts dem Raube nach. Die Wasserasseln trifft man tausendweise unter den Steinen der Fleißbäche, aber ein an viele Missionen grenzendes Heer bilden die Wasserflühe und verwandte Entomostraken, welche die Tümpel und Pfühlen oft in den dichtesten Schwärmen erfüllen. Die Larven heften sich an die Augen, Schuppen und Kiemen der Fische.

345.

Manche Entomostraken zeigen sich oft plötzlich, in ungeheuren Mengen, anderemale sind sie, wie auf Jahre, verschwunden. Mehrere Krabben wandern in großen Zügen, des Nachts, nach dem Meer, um ihre Eier abzusetzen, und machen dabei ein Geräusch, wie ein Regiment Reiterei. Die Börsenkrabbe erklettert die höchsten Cocospalmen, soll da die Nüsse abknippen, daß sie herabfallen, und sie dann unten, um sie zu genießen, öffnen. So wenigstens erzählt Rumph. Die Hummern und Langusten unternehmen Süge im Ocean, wie manche Fische.

Sonst ist keine eigenthümliche Industrie an den Thieren dieser Klasse wahrzunehmen. Der Einsiedlerkrebs, die sich in Schneckenhäusern nisten, ist bereits gedacht. Aber obschon an einem Krebs kaum ein wahrer Kopf zu unterscheiden und seine Hirnmasse keineswegs beträchtlich ist, so zeigen doch viele Gattungen eine Verschlagenheit und List, daß man sie für sehr gescheute Thiere erklären möchte.

346.

Ausgezeichnet ist dagegen ihre Muskelkraft. Man kennt sie schon an den Lasten, die der gemeine Krebs mit seiner Scheere zu halten vermag. Die der weit größeren Hummer ist noch weit beträchtlicher, und der Börsenkrebs (*Birgus latro L.*) hob einst, nach Rumph's Versicherung, mit seiner Scheere eine Siege am Ohr in die Höhe. Manche vergleichen Thiere knippen mit solcher Hartnäckigkeit und Stärke, daß man ihnen das Glied zerschlagen

muß, um den gefaßten Gegenstand zu befreien. Auch in ihren Schwänzen haben die Langusten große Kraft. Nicht minder deutet der so pfeilschnelle Lauf der oben erwähnten Landkrabben das hin. Die Riesenfüße, zumal Apus, Branchipus und Daphnia bewegen dieselben im Wasser mit unermüdlicher Lebhaftigkeit, man kann diesem Schauspiel mit Vergnügen stundenlang zusehen.

347.

Eine Reproduktionsfähigkeit ist von den Scheeren und Füßen der Krebse mehrerer Arten bekannt. Sie schnellen z. B. gequetschte oder anders verletzte Glieder dicht am Leibe ab, und diese sollen sich wieder ersezten. Ich habe dieses Loslösen verschiedentlich an unseren Krebsen zu veranlassen versucht, jedoch nie bemerken können. So wird auch behauptet, daß die Hummer beim Gewitter oder Kanonendonner ihre Scheeren weg schnellen, und daß die mit vergleichlichen Thieren beladenen Fahrzeuge, wenn sie einem Kriegsschiff begegnen, denselben einen Tribut abgeben müssen, widrigenfalls diese sonst einige Kanonen lösten.

348.

So wie man nun schon an den Conchylien schön mechanische Formen und Einrichtungen bemerkte, so an den Thieren dieser Klasse in der That noch viel mehr. Die Mannigfaltigkeit der zahlreichen Glieder eines gemeinen Krebses und ihre Gelenkigkeit erregt Bewunderung. Noch mehr, wenn man die Varianten derselben bei den verschiedenen Gattungen betrachtet. Die Gelenke aller Gliederthiere, der Krebse, Arachniden und Insekten bewegen sich im ginglymus, d. h. nach einer Richtung auf und niederwärts, wodurch eine weit bedeutende Kraftäußerung möglich wird, als wenn es einfache Gelenkköpfe wären, die sich, wie die Knochen, auch im Kreise drehen könnten. Diese Insektengelenke sind aber dabei auch noch von einer Zierlichkeit, wie sie das beste Instrument des Mechanikers nicht schöner ausarbeiten kann. Die Gelenkköpfe mancher Scheeren von Krabben sind kugelrund und dabei so glatt wie Elsenbein; sie bewegen sich in ihrer Nuss wie in einer auspolierten Metallhöhlung; Daumen und Finger solcher Scheeren sind oft mit den feinsten, regelmäßigsten Bähnen besetzt,

wie man sie an den chirurgischen Pinzetten anbringt, und bei manchen, zumal beim Geschlecht Calappa, fügen sich alle eingeschlagenen Gelenke so genau in einander, daß man hier die Einrichtung der compendiösen Reiseinstrumente in Taschensutteralen wieder zu erblicken glaubt. Auch die Schwänze zeigen die aller-zweckmäßigste Einrichtung. Sie bilden Schienen; nichts sieht zierlicher gerollt aus, als eine Gürtelthierassel (Armadillo). Der dreikantige, dolchförmige Schwanzstachel eines molluskiischen Krebses, seine so sauber gerandete Schale, die zahlreichen Kiemenblätter, ja auch die Besatzung dieser Schalen mit Stacheln, Dornen, Sägen und Federbüscheln, in größter Regelmäßigkeit, Feinheit und Schärfe, alles gibt uns den Beweis, daß in der Natur auch die Fähigkeit zur Darstellung jeder Art von mechanischen Kunstwerken liege, und daß sich dieselbe nur im Menschen für seine technischen Zwecke abermals entwickelt \*).

### 349.

Die Crustaceen haben, so wenig wie die folgenden Klassen, ein wahres Skelet nach Art der höheren Thiere, sondern die Knochenmasse ist bei ihnen in die Haut (das Schleimneß S. 73 des I. Bandes) übergetreten, und hat innerlich den mittleren Theil dieses Hautgebildes verhärtet, so daß die Glieder immer noch durch die weichen Theile derselben zusammenhängen. Nur bei den eigentlichen Krebsen ist diese Haut wirklich kalkhaltig, aber nur kohlersaurer Kalk; bei den Entomostraken, Insekten u. a. bleiben sie stets knorpelig oder hornartig. Die Gestalt und Bildung dieser äußeren Bedeckungen gleicht im Ganzen allerdings der eines Gerippes, aber doch nur deshalb, weil es Rumpftheile und Gliedmassen darstellt. Eine weiter getriebene Parallelisierung läßt sich nicht rechtfertigen.

\* ) So daß man Franklin's Definition des Menschen er sey: a tool-making animal, „ein Instrument-machendes Thier“ dahin bei obigen auslegen kann, daß der Krebs sich selbst als solches Instrument bilde, denn er bedient sich wenigstens seiner Scheeren also. Ob dagegen, wie man auch hierher gezogen, die Dromia wirklich Muscheln ergreife, um daraus zu saufen, scheint doch noch genauer geprüft werden zu müssen.

Man theilt diese ganze Classe in sechs Ordnungen, welche sich folgendermaßen charakterisiren lassen.

### I. Muschelartige, mit freien Schalen bedeckte.

Theils im Wasser umherschwärmende, theils parasitisch fest-sichende Thiere, mit hornartiger, dünner, schildförmiger Schale und bloßen Schwimmfüßen.

#### Erste Ordnung. Kiefernfüße. Entomostacea.

Ihre Augen sitzen auf dem Schilde, thells zwei, theils durch Zusammenrücken derselben scheinbar nur eins. Die Kiemenartigen Schwimmfüße in verschiedener Zahl. Vier verästelte Fühler.

Ihre Fresswerkzeuge sind verschieden. Entweder bestehen sie aus Kinnladen, Kinnbacken, und einer Zunge (Brachiopoda *Latr.*); oder nur aus einem kleinen schnabelähnlichen Saugrohr (Parasita); oder sie werden aus den Hüften der Füße gebildet, die um einen großen Centralschlund gestellt sind (Poecilopoda *Latr.*).

### II. Insektenartige, mit einer Reihe von Schienen bedeckt.

Ihre Schienenstücke bilden härtere, kalkige Schalen, so wie auch die Füße der meisten hart sind. Es sind ihrer zehn bis vierzehn und sie endigen in spitze Krallen. Die Augen sind gewöhnlich gestielt, selten feststehend. Ihr Mund zeigt eine Oberlippe, eine Zunge, zwei Mandibeln mit einem Taster, und zwei paar Maxillen, von den Fußkinnladen bedeckt. Die Kiemen sind unter den Seitenrändern der Schale oder des Schildes verborgen. Sie zerfallen in fünf Ordnungen, die man zusammen Malacos-traca genannt hat.

#### Zweite Ordnung. Aßseln. Isopoda.

Mit plattem Körper, vier Fühlern, wovon die inneren zwei sehr kurz, zwei zusammengehäufte feststehende Augen, und die vor-deren Füße nicht mit dem Kopfe verbunden, sondern von einem

eigenen Segment herabhängend. Sie leben im Wasser oder auf dem feuchten Lande, und begreifen das Linné'sche Geschlecht *Oniscus*.

#### Dritte Ordnung. *Walfischläuse. Lämodipoda.*

Mit raupenförmigem Körper, dessen Schwanz verkürzt ist, feststehende Augen, die Vorderfüße am Kopf befestigt, vier vorstieligen Fühlern und blasigen Körpern an den vorderen Fußpaaren. Die Füße in starke Haken endigend. Von Linné unter die vorrigen geworfen. Sizien parasitisch an Walfischen u. a. Meer- geschöpfen.

#### Vierte Ordnung. *Flohkrebs. Amphipoda.*

Mit zusammengedrücktem Körper, deutlichem Kopf, feststehenden Augen, das erste Segment des Bruststückes vom Kopfe gesondert. Die stielförmigen Afterfüße zum Springen. Zwischen oder außen an den verschiedentlich gestalteten Füßen blasige Respirationsäcke. Lebhafte Wasserthiere. *Gammarus* etc.

#### Fünfte Ordnung. *See-Hauschrecken. Stomatopoda.*

Kopf, Brust und Hinterleib deutlich unterschieden. Am Kopfe zwei gestielte, zusammengesetzte Augen, und vier Fühler. Die Fresswerkzeuge wie bei den folgenden, die Füße verschieden- gestaltig, am Bauch fünf Paar Kiemenanhängsel in Gestalt von Blättern, mit Büscheln am Ende. Die Bedeckung des Körpers ist zart, und es sind überhaupt die am höchsten entwickelten dieser Reihe, die auch mehr die Meere der heißen Zone bewohnen, und in etwas den Fangheuschrecken (*Mantis*) unter den Insekten gleichen. *Squilla*, *Phyllosoma*.

#### Sechste Ordnung. *Eigentliche Krebse. Decapoda.*

Kopf und Bruststück mit einem gemeinsamen Schilde bedeckt. Die Augen zusammengesetzt, gestielt und beweglich. Vier, oft lange, gertenartige Fühler, an der Basis der äußeren ein Ohr, die inneren in Fäden getheilt. Als Fresswerkzeuge zwei Mandibeln, von denen jede an der Basis einen Taster trägt; eine zweilappige Zunge, zwei paar Maxillen, drei paar Kinnladenfüße, und fünf paar eigentliche Füße, wovon meist die vorderen in

Scheeren endigen. Der Schwanz gegliedert, mit verkümmerten Füßen als fünf paar Flossenanhängseln. Sieben paar Kiemen, unter dem Schilde verborgen. Sie leben fast alle im Meer und bildeten Linné's großes Geschlecht Cancer. Fabricius begriff die langschwänzigen (Macrouri) unter dem Namen Astacus, die kurzschwänzigen (Brachyuri) allein unter jenem Namen Cancer.

---

## Uebersicht der Geschlechter.

### I. ENTOMOSTRACA.

- a. *Branchiopoda*. Mit Oberlippe, zwei Mandibeln, ein bis zwei paar Maxillen, und eine Zunge. Der Körper mit Schalen bedeckt.
- a. *Lophopoda ostrapoda*. Nicht über zehn cylindrische Füße; zwei Schalen durch ein Schloß verbunden; scheinbar ein Auge, der Kopf versteckt.
- 1. *Cypris*. Sechs Füße; die Fühler endigen in Pinsel. Die Schalen bohnenförmig.
- 2. *Cythere*. Sehn Füße.
- β. *Lophopoda cladocera*. Zwei Schalen ohne Schloß, hinten in eine Spitze endigend. Der Kopf offen, mit einem Schnabel bedeckt. Scheinbar ein Auge. Zwei ästige Fühler. Sehn Füße.
- 3. *Daphnia*. Wassersfloh. Zwei gabelförmig verästelte Fühler, frei herausstehend. Das Auge klein, punktförmig, bisweilen noch ein Punkt davor. Die Schalen geschlossen.
- 4. *Polypheus*. Der Kopf vom Rumpf gesondert, mit einem, ihn fast ganz enehmenden Auge.
- γ. *Carcinoidea*. Die Schale eiförmig, in zwei getheilt, nach unten offen. Einfache Fühler.
- 5. *Cyclops*. Der Körper birnförmig. Der gegliederte Schwanz in zwei Borsten endigend. Bei den Weibchen daran zwei freie Eierstöcke.
- δ. *Phyllopoda*. Zwei Augen, zwei kleine Fühler; wenigstens 20 Füße.

6. **Limnadia.** Zwei den Körper einschließende, eisförmige Schalen. Zwei feststehende Augen. 22 paar Füße.
7. **Branchipus.** Der Körper schmal, ohne Schild oder Schale. 11 Paar platte Schwimmfüße. Der Kopf vom Rumpf verschieden, mit 2 gestielten Augen.
8. **Triophthalmus (Apus).** Riesenfuß. Der Körper mit einem eisförmigen Schild bedeckt; hinten ein Gabelschwanz und 60 meist blätterige Fußpaare. Drei Augen.
  - b. **Poecilopoda.** Ein Rückenschild bei den meisten, den Körper bedeckend, bisweilen oben quer in zwei getheilt. Die vorderen Füße zum Greifen, die hinteren blätterig, zum Schwimmen. Keine deutlichen Kinnladen.
  - a. **Xiphosum.** Die hornigen Hüften der sechs ersten Fußpaare versehen die Stelle der Kinnladen.
9. **Limulus.** Molukkischer Krebs. Der Körper oben ein vorn kreisrundes Schild bildend, mit 2 feststehenden Augen. Dahinter ein kleineres, vierseitiges Schild. Der Schwanz ein dreikantiger Stachel.
- β. **Parasita.** Die Schale dünn, oft fehlend. Unbedeutliche Fresswerkzeuge. Meist nur ein Saugrüssel. Nie über 14 Füße.

\* **Caligida.** Mit Schild.

10. **Argulus.** Der Rumpf durch ein eisförmiges hinten ausgeschnittenes Schild bedeckt. Auf dem dreieckigen Kopfschild zwei Augen, und vier kleine Fühler. 12 Füße; die ersten mit Saugnäpfchen.
11. **Caligus.** Fischlaus. Ebenso, aber alle Füße ohne Saugnäpfchen; die vorderen mit Krallen. Der Körper hinten in zwei lange Fäden endigend.
12. **Ergasilus.** Eisförmig, Kopf und Rücken aus drei großen Schildern gebildet. Der Schwanz mit 4 Borsten. Zwei lange, denselben überragende Eiertrauben.
13. **Lamproglena.** Langgestreckt, raupenförmig, aus vier Absätzen bestehend. Die Eierstöcke lange Schäüre.
14. **Dinemura.** Vorderschild rund, das hintere länglich; ein Saugrohr. Zwei lange dünne Schwanzfäden.

15. **Leptophthirus.** Kopf- und Rumpfschild; der Bauch groß, dick, cylindrische Eiertrauben tragend.
- \*\* **Lernaeacea.** Mehr wurmförmig, nackt; mit Eiertrauben.
16. **Dichelesthium.** Körper langgestreckt, aus sieben Segmenten bestehend. Vier Fühler.
17. **Chondracanthus.** Die Seiten des Leibes lappig gezackt. Keine armförmige Heftorgane.
18. **Achtheres.** Kopfbruststück herzförmig, der Bauch rund und gegliedert. Die schlanken Arme zu einem Reif verbunden.
19. **Lernaeopoda.** Wie zuvor; der Bauch langgestreckt, un-gegliedert.
20. **Brachiella.** Das Kopfbruststück halsförmig verlängert. Die hakigen Klammersüße am Anfange des Halses, gleich hinter dem Schnabel entstehend.
21. **Venella.** Der Leib gerade, gleich dick, mit vier paar Hautlappen am halsförmigen Vorderende. Ein gefiederter Schwanz und Arme.
22. **Lernaeocera.** Der Leib winkelig gebogen, vorn mit gabeligen Armen, als vier Lappen um den Mund. Die Eierschnüre gerade, eiförmig, kurz.
23. **Lernaea.** Der Leib winkelig hin und her gebogen. Drei lange gabelige Arme um den Mund. Die Eierschnüre spiral gewunden.

## II. ISOPODA.

- a. **Ligia.** Die äußeren Fühler mit 17—36 Gliedern. Ein paar Schwanzanhängsel.
24. **Ligia.** Die Endglieder der Schwanzanhängsel dem abgestutzten Basalgliede eingefügt.
25. **Ligidium.** Das äußere Endglied der Schwanzanhängsel an der Spitze des Basalgliedes; das innere an einem eigenen Fortsatz, der aus der Spitze des Basalgliedes entsteht.
- b. **Oniscina.** Die äußeren Fühler 6—8gliederig. Zwei paar Schwanzanhängsel.
26. **Porellio.** Kelleresel. Die Fühler siebengliederig.

27. *Oniscus*. Maueresel. Die Fühler achtgliederig. Die Unterseite der fünf vordersten Leibesgürtel hinten in einen Fortsatz ausgeschwend.

28. *Armadillo*. Die äusseren Schwanzanhängsel zweigliederig, das Endglied der Seitenanhängsel klein. Der Hinterrand der sechs ersten Rückengürtel gerade.

c. *Asellota*. Mit vier vorspringenden Fühlern, in eine mehrgliederige Gerte endigend. Der Schwanz aus einem einzigen Stück bestehend, mit zwei zweispaltigen Dolchspitzen.

29. *Asellus*. Wasserassel.

d. *Cymothoada*. Mit vier vorspringenden Fühlern, in eine mehrgliederige Gerte endigend; die Vorderfüße mit starken krummen Krallen; der Schwanz aus 6 Segmenten mit einer Flöze zu jeder Seite gebildet.

30. *Cymothoa*. Mit undeutlichen Augen.

e. *Epicaridia*. Weder Augen noch Fühler.

31. *Bopyrus*.

### III. LAEMODIPODA.

32. *Cyamus*. Walfischlaus. Eisförmig, flach mit sechzehn Füßen. Die zwei ersten Paare Taster, die vier folgenden mit scharfen Krallen, die letzten häufig-cylindrisch, mit Blasenanhängseln.

### IV. AMPHIPODA.

a. *Ambulatoria*. Mit 10—14 Füßen, bloß zum Schwimmen und Laufen.

33. *Corophium*. Sämtliche Füße Gangfüße. Der Körper schlank, vier Fühler.

b. *Saltatoria*. Der Körper zusammengedrückt, stets mit 14 Füßen. Die Schwanzanhänge und Vorderfüße stielförmig oder gabelig, zum Springen helfend.

34. *Talitrus*. Ohne Scheerensüsse. Die vier Fühler groß und dornig.

35. *Gammarus*. Die vier vorderen Füße mit kleinen Scheeren.

## V. STOMATOPODA.

36. *Squilla*. Seeheuschrecke. Die Schale bildet nur ein einziges Rückenschild. Die vorderen Füße sind Scheerenfüße.
37. *Phyllosoma*. Zwei Rückenschilder, ein großes für den Kopf und ein kleineres für das Bruststück. Der Körper platt, hautig. Keine Scheeren.

## VI. DECAPODA.

- a. *Macroura*. Langschwänzige Krebse. Der Schwanz ausgestreckt, offen, so lang als der Körper, jederseits mit floßenartigen Anhängseln versehen.
38. *Palaemon*. Die Scheeren einsch, cylindrisch, lang. Die oberen Fühler mit drei Fäden.
39. *Crango*. Garnelen. Die äußeren Fühler kleiner eingeklent als die mittleren, und mit einer großen, ihren Stiel verdeckenden Schuppe versehen. Die mittleren Fühler mit zwei neben einanderliegenden Gerten.
40. *Penaeus*. Die mittleren Fühler mit zwei übereinanderliegenden Gerten; die drei vorderen Fußpaare mit Scheeren.
41. *Astacus*. Hummer. Die äußere Platte der seitlichen Schwanzanhänge besteht aus zwei Stücken. Große Scheeren.
42. *Palinurus*. Languste. Die Seitenfühler sehr groß, borstenförmig, mit Dornen besetzt. Das erste Fußpaar ohne Scheeren.
43. *Scyllarus*. Die Seitenfühler ohne Stamm, und die Gerte in einen platten, horizontalen, gezähnten Kamm verbreitert.
44. *Porcellana*. Der Schwanz unten umgeschlagen, wie bei der folgenden Abtheilung.
45. *Pagurus*. Einsiedlerkrebs. Der Schwanz weich, lang, cylindrisch, an der einen Seite mit eiertragenden Anhängseln.
46. *Birgus*. Diebskrebs. Der Schwanz solid, fast kreisrund, mit zwei Reihen Anhängseln.

b. *Brachyuri*. Krabben. Der Schwanz wie verkümmert, kürzer als das Bruststück, auf dieses unten umgeschlagen. Das letzte paar Kiefersüße breit, die Kauwerkzeuge bedeckend. Die Fühler stets klein.

47. **Matuta.** Alle Fußpaare, mit Ausnahme des ersten scheertragenden, Schwimmfüße. Brustschild kreisrund, jederseits mit einem scharfen Dorn bewaffnet.
48. **Portunus.** Nur das letzte Fußpaar Schwimmfüße. Das Brustschild vorn breit und bogenförmig, hinten schmal und abgestutzt.
49. **Cancer.** Keine Schwimmfüße. Das Bruststück vorn bogenförmig, hinten schmal und abgestutzt, von Substanz hart.
50. **Gonoplax.** Das Brustschild an der Vorderkante fast geradlinig, viereckig oder unvollkommen herzförmig, zwischen den Augen abwärts gebogen. Die Augenstiele lang und dünn, die Scheeren der Männchen lang, cylindrisch.
51. **Gelasimus.** Sandkrabbe. Das Brustschild stark, quadratisch. Die Augen wie ein Knöpfchen an einem sehr langen Stiele. Scheeren ungleich, zusammengedrückt.
52. **Ocyopoda.** Ebenso; die Augen sich über den größten Theil der Länge ihrer Stiele erstreckend, eine Art Keule bildend. Die Scheeren gleich, die Hände umgekehrt herzförmig.
53. **Pinnotheres.** Pinnenwächter. Brustschild kreis- oder kugelrund, doch etwas quadratisch dabei. Die Augenstiele kurz.
54. **Ulea.** Brustschild herzförmig, dick, abgerundet, vorn abwärts gebogen, hinten abgestutzt. Die Füße lang, behaart.
55. **Gecarcinus.** Turluru. Wie zuvor; die vier Fühler durch das herabgehende Stirnschild bedeckt.
56. **Grapsus.** Brustschild breit, flach, die herabgebogene Stirn sehr breit. Die Augen nahe an der Vorderecke.
57. **Corystes.** Das Brustschild eisförmig länglich, gezähnt, zart. Die Seitenfühler lang, vorgestreckt, gewimpert. Die Scheeren der Weibchen kurz, der Männchen viel länger.
58. **Leucosia.** Brustschild kugelig, selten eisförmig, steinhart. Stirn aufwärts gebogen, Augen und Fühler klein. Der Schwanz breit, fast rund.
59. **Parthenope.** Brustschild oval dreieckig, rauh, mit Höckern besetzt; die Stirn hervorstehend; die vorderen Scheerenfüße sehr groß, im rechten Winkel abstehend, die Finger eingeschlagen, höckerig; die vorderen Füße klein.

60. *Maja*. Brustschild eiförmig, etwas dreieckig, bedornt; Stirn hervorgezogen. Alle Fuß- und Scheerenpaare ziemlich gleich, von hinten nach vorn an Länge zunehmend.
61. *Lithodes*. Die zwei letzten Fußpaare verkümmert; der Schwanz hautig. Das Brustschild dreiseitig, sehr dornig nach vorn in eine gezähnte Spitze ausgehend.
62. *Calappa*. Brustschild gewölbt, an den Seiten überragend, die Scheeren dreieckig, sehr zusammengedrückt, oben kammartig gezähnt, beim Zusammenziehen die Vorderseite des Körpers senkrecht bedeckend.
63. *Dromia*. Brustschild gewölbt, wollig behaart. Die beiden hintersten Fußpaare auf dem Rücken eingefügt, in einen doppelten Haken endigend.

---

### Literatur der Crustaceen.

Mehrere allgemeine Werke s. bei den Insekten.

*Desmarest* Considérations générales sur la classe des Crustacés. Paris 1825.

*Cuvier* Thierreich von Voigt. IV. Band.

*J. Fr. W. Herbst* Versuch über die N. G. der Krabben und Krebse. Berlin 1803, m. K. 4.

*W. Leach and Sowerby* Malacostraca podophthalma Britanniae. London 1817. 4. m. K.

*A. Risso* Histoire naturelle des Crustacés des environs de Nice. Paris 1816. 8.

*Dess.* Histoire naturelle de l'Europe méridinale. ib. 1830, V. Band.

*F. Rüppel* Beschreibung und Abbildung kurzschwänziger Krabben. Frankfurt a. M. 1830.

*H. Rathke* Untersuchungen über die Bildung und Entwicklung des Flusskrebses. Leipzig 1829. fol. m. K.

*O. F. Müller* Entomostraca seu Insecta testacea. Hafniae 1785. 4. c. tbb.

*Dess.* Zoologia danica. Hafn. 1788—1806. IV. Band m. 160 Kupfertafeln.

R. A. Ramdohr mikrographische Beiträge zur Entomologie,  
1. Thl. Halle 1805. 4. m. K.

Jurine histoire des Monocles qui se trouvent aux environs de  
Genève. Genève 1820. 4. av. pl.

A. v. Nordmann mikrographische Beiträge, 2 Heft, Berlin 1832.  
4. m. K.

Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte 1 u. 2 Heft.  
Wien 1836, 4.

---

## Erste Ordnung.

### Kiefenfüße.

Man nennt sie lateinisch Entomostraca, d. h. Insekten mit Schalen, und deutsch: Kiefenfüße, so viel als Kiemefüße, weil ihre oft sehr zahlreichen, bis an Hundert gehenden Füße, mehr oder weniger blattartig, gewimpert, und zum Atmen und Schwimmen eingerichtet sind. Sie tragen noch andere härtige, federige oder sammelförmige Organe, zu ihnen gehörig oder an sie befestigt, welche ihnen insbesondere zum Atmen dienen. Deswegen werden die ersteren auch Branchiopoda genannt.

Linné und Müller begriffen sie sämmtlich unter dem Namen Monoculus, der zwar an sich unrichtig gebildet ist, indem die meisten zwei, je getrennte und aus vielen zusammengesetzte Augen besitzen, die: aber doch richtig ein großes allgemeines Geschlecht bezeichnet, dessen Formen eine regelmäßige Reihe von Stufen, von den fast fußlosen moluskeischen Krebsen bis zu den mikroskopischen Cypriden, und sogar bis zu den parasitischen Vernäen bilden, deren Natur Linné und seine ersten Nachfolger, ja selbst Cuvier, noch nicht genau kannten. Man kann sich daher wohl ein allgemeines Bild von ihnen entwerfen, welches zugleich zeigt, daß diese unter allen gegliederten Thieren den Übergang zu den kopflosen Mollusken machen, während sie anderseits an manche Arachniden grenzen.

Ihr Gehirn besteht aus einem oder zwei Knötzchen. Die größten haben auf dem Rückenschild zwei weit von einander abstehende Augen, die kleineren sind so zusammengerückt, daß sie nur eines zu bilden scheinen. Es ist jedoch kaum anzunehmen, daß ihnen diese Organe zum Sehen dienen.

Ihre Fühler sind oftmals dichotomisch, d. h. gabelig ästig, und dienen mehreren zum Rudern. Ihre Frischwerkzeuge sind verschieden. Bei den vollkommenen sind Kinnlader und Kinnbacken vorhanden, bei den unvollkommenen legen sich diese in eine Art von Saugrüssel zusammen. Ein Schlund und Magen führt zu einem Darm und hinten sich öffnenden After. Oft sieht man die verschluckten Thiere noch deutlich darin. Oben im Rücken liegt das pulsirende Herz. An eben dieser Stelle dahinter, bei mehreren die Eierstöcke. Bei anderen stehen sie äußerlich, an der Basis des Schwanzstückes, in Gestalt von Trauben (Cyclops, Lernaeae), wo sie dann ausschließen. Diese Eier scheinen, selbst nach dem Ver trocknen noch eine lange Lebensdauer zu besitzen, da sie sich aus den Aufgüssen todtter solcher Thiere entwickeln, auch man sich nicht anders als auf diese Weise erklären kann, wie eine Menge Cypris u. dgl. aus einem Aufguß Wasser über lang getrocknete und selbst zerriebene Con serven hervorkommen sollten \*). Zu den Seiten des Leibes befinden sich die Füße, welche bei den einzelnen genauer beschrieben werden müssen. Ihre Bewegung ist sehr schnell und unermüdlich. Um alle diese Organe ist eine bald einfache, anschließende, bald mehr offene, doppelte, dünne, hornartige Schale gelegt, welches die schildförmigen Rückenstücke, wie sie auch die Krebse haben, sind, hier aber mannigfaltig modifizirt.

Die Entomostraken haben doppelte Geschlechter, die man oft aufeinandersitzend in der Begattung sieht. Bei mehreren aber zeugen den Sommer hindurch viele Generationen nur Weibchen, die sich demungedacht fort pflanzen, und erst im Herbst erscheinen beide Geschlechter. Ihre Fruchtbarkeit ist außerordentlich, so daß

\*) Dergleichen trockenes, ein halbes Jahr altes Con servenpulver hat mir einst Herr Prof. Wiegmann d. Ä. aus Braunschweig zugeschickt, und ich habe durch Aufgießen von Wasser Cypris conchaea erhalten. Straus sagt, daß ihm ähnliche Versuche mit Daphnien nie gelingen wollen.

man in Pfützen und Teichen Myriaden solcher Thiere erblickt, wo man wenige Wochen zuvor noch kaum einige wahrnehmen konnte.

Ihr Aufenthalt ist größtentheils das stillstehende Süßwasser, und einzelne erhalten sich auch noch im Winter. Manchmal erscheinen sie plötzlich da, wo sie anderemale Jahr und Tag nicht wiederzufinden sind. Ihr Nutzen und Schaden ist von keinem Belang.

## I. Cypris.

Sie schelnen nur eine nierenförmige oder eisförmige, fast gerade, etwas ausgeschweifte, aber doppelte Schale, oben mit einem Schloß, ganz wie Muscheln, zu haben. Das Auge bildet vor dem Schloß, in der Mittellinie, einen dicken, runden, schwärzlichen Punkt. Die unmittelbar darunter eingefügten Fühler sind kürzer als der Körper, borstigförmig, nach oben zurück gerichtet, und bestehen aus sieben bis acht Gliedern, wovon die letzten kürzer sind, und in einem Büschel von 12—15 als Ruder dienende Borsten endigen.

Der Mund besteht aus einer gekiulsten Lippe, zwei großen gezahnten Mandibeln, wovon jede einen dreigliederigen Taster trägt und an deren erstem ein kleines Kiemenblättchen mit fünf Digitationen hängt, und aus zwei paar Maxillen. Die beiden oberen, viel größeren, haben am inneren Rande vier bewegliche borstige Anhängsel und an der äußeren ein großes fannsförmiges Kiemenblatt. Die zweiten bestehen aus einem kurzen, fast kegelförmigen, ungegliederten, am Ende borstigen Taster. Eine Art zusammengedrücktes Brustbein versieht die Funktion der Unterlippe. Jeder der sechs Füße besteht aus fünf Gliedern, wovon das dritte dem Schenkel und das fünfte dem Fußblatt entspricht. Die beiden vorderen sind unter den Fühlern eingefügt. Sie sind stärker als die andern, nach vorn gerichtet, und haben steife Borsten oder lange Krallen. Den vier folgenden Füßen fehlen diese. Die zweiten, etwa in der Mitte der Unterseite des Körpers stehend, sind anfangs nach hinten gerichtet, bogig, und endigen in eine lange, starke, nach vorn gerichtete Kralle. Die beiden letzten sieht man nie äußerlich, sie richten sich aufwärts und legen sich an die hinteren Seiten des Leibes, um die Eierstöcke zu unterstützen.

Der Körper zeigt keine deutliche Gliederung und endigt hinten in einen weichen, nach unten umgeschlagenen Schwanz mit zwei kegelförmigen oder borstigen Fasern, mit drei Borsten oder Haken am Ende besetzt, der sich nach hinten richtet und aus der Schale heraustritt. Die Eierstücke bilden zwei dicke, kegelförmige geschlossene Säcke, die an den hinteren Seiten des Leibes, unter der Schale liegen, und sich, einer neben dem andern, an der vorderen Seite des Bauches öffnen, wo der durch den Schwanz gebildete Kanal eine Kommunikation zwischen ihnen bewerkstelligt. Man hat ihre Begattung oder ihre Zeugungsorgane bis jetzt, wo man doch so genau untersucht hat, noch nicht entdecken können.

Die Fühler sind wahre Flohsen, deren Strahlen diese Thiere nach Belieben entfalten und vereinigen können. Wenn sie schwimmen, so bewegen sie auch die Vorderfüße sehr schnell; man sieht sie aber auch auf dem Schlamm langsam umherspazieren, oder, gleich kleinen Spinnen, an der Wand der Gläser, in denen man sie hält, hinaufkrabbeln. Die Weibchen legen ihre Eier in Klumpen, die sie, mittels einer klebrigen Substanz, auf dem Schlamm oder an Pflanzen absetzen. Das Weibchen klammert sich dabei mit den zweiten Füßen an, und braucht zu dieser Operation etwa zwölf Stunden, wobei es 24 Eier legt. Nach Jurine's ferneren Beobachtungen pflanzen sich die Cypris im Sommer ebenso ohne Befruchtung fort, wie die Daphnien, und häuteten sich von einer Generation zur andern, welches etwa fünf Wochen beträgt, sechsmal.

#### 1. *Cypris conchacea.*

*Cypris detecta Müller.*

Sehr regelmäßig länglich nierenförmig, fast elliptisch, glatt. Weiblich. Der Augenpunkt ganz klein, etwas zurück. 1 Linie lang. Die häufigste.

*Jurine Monocles.* pl. XVII, f. 7, 8. — *Müller Entomostr.* III, f. 1—3.

#### 2. *Cypris pubera.*

Zusammengedrückt, nach vorn etwas stumpf, eisförmig, hell grün, über und über behaart. 1''' lang.

*Jurine l. c. XVIII, 1, 2. — Müller l. c. V, 1—5.*

### 3. *Cypris ornata*.

Weißlichgrün, bogig, grün gestreift, wie marmoriert vorne und hinten borstig. Die größte.

*Jurine XVII*, 1—4. — *Müller III*, Fig. 4—6.

Und noch mehrere andere Arten.

## II. Wasserloch.

### *Daphnia*.

Die Fühler liegen bis an ihre Basis frei, sind fast so lang als der Körper, und ihr Stiel in zwei Nestle getheilt, wovon der hintere vier, der vordere drei Glieder hat. Das Auge besteht aus zwei dicht zusammengedrückten, und bildet scheinbar nur einen schwarzen Punkt\*).

Der Mund liegt unten, an der Basis des durch das Oberschild gebildeten Schnabels. Der untere Theil des Kopfes bildet einen länglichen Helm und eine Lippe. Darunter liegen zwei starke Mandibeln, ohne Taster, vertikal gerichtet, und auf zwei horizontalen Maxillen ruhend, welche in drei starke, hornige, wie zurückgebogene Haken gestaltete Dornen endigen. Hierauf kommen fünf paar Füße, bei denen das zweite Glied blasig ist. Die ersten acht endigen in eine floßensförmige Ausbreitung, am Rande mit kammförmigen Borsten. Die beiden vorderen scheinen zum Greifen zu dienen. Die beiden letzten Füße haben einen etwas abweichenden Bau. Der Bauch, oder der eigentliche Körper, ist in acht Segmente getheilt, liegt völlig frei zwischen den zwei Schalenklappen, ist langgestreckt dünn, am hinteren Ende nach unten gekrümmt, und endigt in zwei kleine nach hinten gerichtete Häfchen. Die Eierstöcke liegen längs der Seiten, zwischen dem ersten und dem vierten Segment, und öffnen sich abgesondert, nicht weit vom Rücken, in eine Gebärmutter, die zwischen der Schale und dem Körper liegt, wo sie einige Zeit verweilen.

Die Schalen dieser Thiere sind eiförmig bis trapezoidisch,

\* ) *Straus*, sur les Daphnides; in den Mémoires du Muséum d'histoire naturelle Vol. VII. Eine schöne Abhandlung über dieses Geschlecht mit Abbildungen. S. auch *Latreille*, *Jurine* und *Ramdoht*.

und ebenfalls an beiden Seiten heruntergeschlagen, so daß sie den Körper und einen Theil der Füße bedecken. Hinten endigen sie in eine kleine, in der Jugend längere Spize. Vorn bildet eine kleinere, aber mit ihnen verwachsene, eine helmartige Bedeckung des Kopfs, mit einer Spize, wie ein Schnabel. Diese Schalen erscheinen unter dem Mikroskop wie gegittert. Die Thiere häuten sich fast alle Wochen.

Mehrere Gattungen bewohnen unsere Sumpfe, und sind fast stets in einzelnen Exemplaren, bisweilen aber in so unermesslichen Mengen zu finden, daß sie das Wasser erfüllen, und ihm auf den ersten Blick eine rothe Farbe geben. Sie schwimmen sahweise, gleichsam hüpfend. Morgens und Abends oder bei bedecktem Himmel sieht man sie an der Oberfläche, bei der Sonnenhitze dagegen nur in der Tiefe. Sie lassen sich sehr leicht in Gläsern im Simmer halten. Ihre Nahrung besteht in Conserven und kleinen vegetabilischen Theilchen auf dem Boden. Straus sah sie auch ihre eigenen Excremente fressen, andere animalische Substanzen aber stets verwerfen.

Man findet Männchen und Weibchen. Bei den Männchen ist der Kopf kürzer, der Schnabel weniger hervorspringend, die Klappen der Hautschalen nicht so weit und nach oben nicht so buckelig, und sie klaffen bei ihnen vorn, so daß sie eine weite kreisrunde Deffnung zeigen. Auch sind ihre Fühler viel größer und zeigen sich wie zwei nach unten gerichtete Hörner. Straus hat bemerkt, daß die Krasse, in welche das letzte Glied der beiden Vorderfüße endigt, viel größer als beim Weibchen ist, indem sie die Gestalt eines sehr großen nach außen gekrümmten Hakens hat. Auch die Borste des dritten Gliedes ist länger, und das Männchen bedient sich derselben, um das Weibchen zu fassen. Eigentliche männliche Geschlechtstheile hat man aber bis jetzt noch nicht auffinden können.

Die Männchen sind auf die Verfolgung ihrer Weibchen sehr hitzig, und oft auf dasselbe Individuum.

O. Fr. Müller hat einem großen dunklen viereckigen Fleck, welcher sich zu gewissen Jahreszeiten und zumal im Sommer nach der Häutung der Weibchen am oberen Theile der Schenkelklappen zeigt, den Namen Sattel gegeben. Für eine hält ihn für krankhaft, und ich ihn für ausgetretene Eier, die sich

unregelmäßig oder gar nicht entwickeln. Nach Straus zeigt er sich wie zwei eiförmige durchsichtige Flaschen, eine hinter der andern, sich wie eine zweiklappige Kapsel öffnend. Er theilt sich, wie die Klappen, in zwei Seitenhälften, oben durch eine Naht verbunden. Das Innere zeigt eine andere, kleinere, ähnliche; jede Kapsel enthält ein Ei mit horniger grünlicher Schale, was übrigens den gewöhnlichen Eiern gleicht, aber längere Zeit zur Entwicklung braucht. Bei einer Häutung wird dieser Satz mit Hülle und Eiern abgeworfen, wo sie jedoch noch auskriechen sollen.

Zwanzig Stunden nachdem das Ei gelegt worden zeigt sich der Embryo, als eine rundliche, unsymmetrische Masse, auf welcher man bei genauerer Untersuchung stumpfe Spuren von Armen, in der Gestalt kurzer, unvollkommener, an den Leib angelegte Stummel bemerkt. Weder Kopf noch Auge sind zu erkennen. Der grünliche oder röthliche Körper ist weiß punktiert und verträgt noch keine Bewegung. Erst nach der neunzigsten Stunde, nachdem das Auge erschienen, und Arme und Klappen verlängert sind, fängt der Embryo an sich zu bewegen. In der hundersten Stunde ist er schon sehr lebhaft; endlich in der hundertundzehnten, unterscheidet er sich vom Neugeborenen nur dadurch, daß die Ruderborsten noch am Stiele angeklebt sind, und daß das Hinterende der Klappen nach unten gebogen und zwischen die unteren Ränder derselben aufgenommen ist. Gegen das Ende des fünften Tages springt der Schwanz am Ende der Klappen und die Borsten der Füße wie durch Federkraft los, und die Füße fangen an, sich zu bewegen. Sind die Jungen zum Auskriechen reif, so biegt die Mutter nur den Bauch nach unten, und sie springen heraus. Im Winter dauert die Zeit bis zum Ausschlüpfen noch einmal so lange.

Etwa acht Tage nach der Geburt häuteten sich die jungen Daphnien zum erstenmal, und fahren damit, je nach der Temperatur, alle fünf bis sechs Tage fort. Sie streifen nicht bloß die Schalen, sondern auch die Klemmen und Ruderborsten ab. Erst mit der dritten Häutung werden sie fortpflanzungsfähig. Sie legen anfangs nur ein Ei, hierauf zwei bis drei, und dies nimmt allmälig zu, und steigt bei einer Art selbst bis achtundfünfzig. Das Weibchen streift, einen Tag nachdem es gelegt, die Haut

ab, und man findet in den abgeworfenen Hüllen die Eierschalen der letzten Absatzung. Einen Augenblick nachher macht es eine neue. Die Jungen einer und derselben Brut sind fast immer von einerlei Geschlecht, und es ist sehr selten, daß man unter einer Brut Weibchen zwei bis drei Männchen, oder umgekehrt findet. Allein auf fünf bis sechs Trächtigkeiten während eines Sommers findet man höchstens eine männliche. Man findet öfters Individuen, deren Hüllen milchweiss, undurchsichtig, und verdickt sind, ohne daß sie deshalb angegriffen scheinen. Bei der Erneuerung der Schalen finden sich nur noch lezte Spuren dieser Veränderung.

Mit herannahendem Winter hören sie auf sich zu häuten und gehen noch vor anfangendem Frost zu Grunde. Die in den Sätteln enthaltenen Eier schließen im nächsten Frühling aus. Bald sind alle Tümpel mit zahllosen neuen Daphnien bevölkert.

#### 1. Der gemeine Wasserfloh.

##### *Daphnia pulex.*

*Monoculus pulex* L. *Pulex aquaticus arborescens* *Swammerdam*  
Bibl. nat.

Mit großem converem Schnabel; federigen Ruderborsten; das erste Knötkchen des sechsten Segments zungenförmig; die Schalen am unteren Nande gezähnt, und in einen kurzen, bei den Weibchen stumpfen, Schwanz endigend.

*Mémoires du Muséum d'h. rat.* Vol. VII, T. 29, f. 1 bis

20. — *Jurine Monocles* VIII—XI. — *Müller Entomostraca* T. XII, f. 1—7.

#### 2. Der vornige Wasserfloh.

##### *Daphnia longispina.*

Etwas länger als der Vorige, mit geradem, in eine lange vorstige Spitze ausgehenden Rücken. Findet sich allerdings zwischen der vorigen Art, doch könnte es auch nur ein einzelner Zustand derselben, oder Abart seyn.

*Strauss in den Mém. du Mus.* VII, T. XXIX, f. 23, 24. —

*Müller l. c.* T. XII, f. 8—10.

Eine dritte, D. sima (ebendas. Müller Fig. 11, 12),

unterscheidet sich nur durch das stumpfe, nicht gegitterte Schwanzende und könnte gleichfalls nur Alterszustand seyn. Alle drei in unsern Sümpfen gemein.

### III. Grossäuge. Polyphemus.

Mit gabeligen Fühlern, deren jeder Ast aus fünf Gliedern besteht. Der runde Kopf steht auf einer Art von Hals und ist oben fast ganz von einem großen Auge bedeckt; die Füße stehen ganz frei, und bestehen aus einem Schenkel, einem Schienbein, einem zweigliedrigen Tarsus, und dem Endstück, aus welchem einige kleine Fäden hervortreten. Die Schale ist durchsichtig. Der Bauch biegt sich von hinten nach vorn, und dann zurück in einen spitzen Schwanz, aus dem zwei lange gegliederte Fäden hervortreten.

#### Polyphemus stagnorum.

*Monoculus Pediculus* *Degeer*. *Polyphemus oculus* *Müll.* *Cephaloculus stagnorum* *Jurine*.

Er ist kaum einige Linnen lang, und gleicht auf den ersten Blick einer Ameise mit ausgespreizten Rüdersfüßen. Er schwimmt horizontal, auf dem Rücken, indem er die Arme lebhaft braucht, und ist sehr schnell. Lebt nicht lange in der Gefangenschaft und ist nicht überall zu finden.

*Degeer* VII, T. XXVIII, f. 6—13. — *Müller* Entom. T. XX, f. 1—5.

### IV. Cyclops.

Der Körper ist eirund, weich gallertig, und theilt sich in zwei Theile: den Cephalothorax und den Schwanz. Jener ist in vier Segmente getheilt, wovon der erste, viel größere, den Kopf und einen Theil des Thorax zusammensetzt, die auf diese Art mit einer gemeinschaftlichen Schuppe bedeckt sind. Dieser Theil trägt das Auge, vier Fühler, zwei äußere und zwei innere Kinnladen, die letzten mit Tastern und vier Füße, deren jeder in zwei

zylindrische mit Haaren oder bärigen Fäden besetzte Stiele geschildert ist. Das vordere Paar, welches die zweiten Kinnladen repräsentirt, unterscheidet sich etwas von den folgenden. Jedes der folgenden drei Segmente dient einem Fußpaare zur Anheftung, gebildet wie die beiden letzteren der vorhergehenden. Das erste Schwanzglied liegt unmittelbar vor den Geschlechtstheilen, und hat bei den Weibchen zwei Anhängsel in Gestalt kleinerer Pfeilchen. Es fließt in das Bruststück über. Der übrige Schwanz besteht aus sechs Abschnitten; der zweite trägt unten, bei den Männchen, zwei eingelassene Anhängsel. Diese sind die männlichen Geschlechtsorgane. Die Vulva liegt bei den Weibchen auf dem nämlichen Gliede. Das letzte endigt in eine mit Borsten oder federförmigen Fäden besetzte Gabel.

Von den vier Fühlern stehen die zwei größeren, vielgliedrig, höher; die zwei unteren haben nur vier Glieder, sind fadenförmig, und bald einfach, bald gegabelt. Bei den Männchen zeigen die oberen Aufreibungen und Einschnürungen. Mittels dieser Organe, oder einem derselben ergreifen sie entweder das letzte Fußpaar oder das Schwanzende ihrer Weibchen beim Liebesvorspiel und halten sie fest. Sie führen ihre Weibchen mit sich fort, wenn diese sich nicht gleich ergeben wollen. Die Begattung hat durch schnellen und wiederholten Akt statt.

Am Schwanz des Weibchen findet sich jederseits an einem Stiele ein Sack voll Eier, am zweiten Glied, nicht von seiner Verbindung mit dem dritten, wo man auch die Mündung des Eierleiters sieht. Das Häutchen, welche diese Säcke bilden, ist nur eine Fortsetzung des inneren Eierstocks. Die Zahl der Eier, die sie enthalten, nimmt mit den Jahren zu. Isoliert und abgelöst stirbt der Keim. Eine einzige, aber unentbehrliche Befruchtung kann für die folgenden Generationen mit ausreichen. Ein und dasselbe Weibchen kann binnen drei Monaten zehnmal gebären. Rechnet man nur achtmal, und jedesmal 40 Jungen, so macht dies doch, nach Latrelle's Berechnung, fünfthalb Milliarden!

Bei der Geburt haben die Jungen nur vier Füße, und ihr Körper ist abgerundet und ohne Schwanz. Hieraus machte Müller sein Geschlecht *Amymone*. Nach vierzehn Tage erhalten sie noch eines, und dann ist es sein Nauplius. Nach der ersten Häutung

haben sie die Gestalt der erwachsenen. Sie nähren sich von Infusorien und anderen animalischen Theilen.

#### 1. *Cyclops quadricornis.*

*Cyclops vulgaris.*

Mit vier einfachen Fühlern, deren untere viergliederig, und nur ein Drittel so lang als die oberen sind. Das Thier ist grünlich, röthlich, blauschwarz und etwa zwei Linnen lang. Es schwimmt stoßweise, vor wie rückwärts, meist auf dem Rücken. In allen Gewässern sehr gemein.

*Müller l. c. XVIII, 1—14. — Ramböhr 7, 1, 2.*

#### 2. *Cyclops castor.*

Der Körper langgestreckt, mit sechs Abschnitten. Der Schwanz kurz, mit eben so viel. Der Eierstock eine einzige platte Masse unter dem Schwanz. Seltener.

*Müller l. c. t. XV, 1—9, XVI, 1—3, 5, 6.*

#### 3. *Cyclops staphylinus.*

*Cyclops minutus.*

Langgestreckt etwas kegelförmig. Der Körper mit zehn Abschnitten, der vorderste größer, der hinterste kleiner als die übrigen. Das Männchen meergrün, das Weibchen rosenroth. Eine halbe Linie lang. Die Eier hängen als ein birnförmiger Sack am Bauche des Weibchens herab. Streckt gewöhnlich den Schwanz in die Höhe.

### V. Kiefernfuß.

#### *Triophthalmus.*

*Apus.*

Der Körper ist, mit Inbegriff der Schale, eiförmig, nach vorn breiter und abgerundet, nach hinten in einen verjüngt cylindrischen Schwanz zusammengezogen; ohne Schale ist der Körper fast cylindrisch, obenher convex, untenher concav, und nur durch eine Längsfurche getheilt, nach hinten in einen länglichen

Regel endigend. Er besteht aus dreißig Ringen, die mit Ausnahme der letzten sieben bis acht, Füße tragen. Die zehn ersten Ringe sind hautig, weich, ohne Dornen, zeigen auf jeder Seite eine kleine knopfförmige Erhöhung, und tragen jeder nur ein Fußpaar. Die anderen sind mehr hornartig, am hinteren Rande mit einer Reihe kleiner Dornen besetzt, daß letzte ist größer, fast viereckig, und endigt in zwei gegliederte Borsten. Bei einigen sieht man zwischen diesen Schwanzborsten ein elliptisches Blatt. Wenn die Zahl der Füße etwa 120 ist, so müssen die letzteren Ringe (den Schwanz abgerechnet) deren mehrere tragen, wodurch diese Thiere eine Verwandtschaft mit den Myriapoden verrathen. Die von ihrer vorderen Anheftung an ganz freie Schale bedeckt einen großen Theil des Körpers. Sie besteht aus drei dünnen Schichten, wovon die mittlere mehr fleischig-zellig, und eine unmittelbare Fortsetzung des Kopftheiles ist, so daß sich diese Thiere also eigentlich vorn nur in eine breite Schuppe, welche ein großes, eisförmiges, convexes Schild bildet, ausdehnen. Dieses Schild, der Cephalothorax, ist hinten ausgeschnitten und gezahnt. Es ist obenher durch eine Querlinie getheilt, und bildet zwei vereinigte Bogen, deren vordere den Kopf, der hintere das Bruststück andeutet. Der erste zeigt in der Mitte drei einfache Augen; die einander sehr nahe stehen, und wovon die zwei vorderen größer und fast nierenförmig sind. Der hintere, dem Bruststück entsprechende Theil ist in der Mitte mit einem Längskiel versehen, und hängt bloß am vorderen Ende fest, so daß man von da das Thier bloß legen kann. Man sieht sogleich, daß dieser Theil des Schildes den beiden Schalen der Daphnien u. a. entspricht. Die Seiten dieser Schale, von unten durch das Licht betrachtet, zeigen jede einen großen Fleck, welcher aus mit rother Flüssigkeit gefüllten Röhrchen zu bestehen scheint. Unter dem vorderen oder Stirnschild liegen die Fühler und der Mund. Jener sind zwei; sie sind kurz, fadenförmig, und bestehen aus zwei fast gleichlangen Gliedern. Der Mund besteht aus einer viereckigen hervorstehenden Oberlippe, zwei starken, hornartigen, an der Basis bauchigen, am Ende gezähnelten Mandibeln ohne Zäster, und aus zwei Paar blätterförmigen, aufeinanderliegenden Maxillen, deren obere am Innenrande gewimpert und dornig,

die unteren fast hautig sind. Sie entigen in ein dünnes verlängertes Glied, und nach außen in ein Ohrchen, was einen gewimperten Laster trägt. Die Zunge zeigt einen gewimperten Kanal, der unmittelbar in die Speiseröhre übergeht.

Die sechzig paar Füße nehmen astmälig, vom zweiten Paar an gerechnet, an Größe ab. Sie sind sämmtlich sehr zusammengedrückt, blätterig, und bestehen aus drei Gliedern, und zwei Blättchen am Ende, welche als ein vierter Glied oder eine zweifingerige Scheere angesehen werden können. An der hinteren Seite des ersten Gliedes ist eine große dreiseitige Klemenhaut eingefügt, und das zweite oder folgende trägt daselbst einen blasigen rothen Sack. Der gegenüberliegende Rand an diesen Füßen trägt vier dreiseitige gewimperte Blättchen. Das erste Fußpaar gleicht verästelten Fühlern, ist größer, ruderförmig, und auch für das erste paar Kinnladenfüße angesprochen worden. Sie lassen sich hierauf selbst mit den Scheeren reduciren, indem die vier borstigen, aus einer Menge Gelenken zusammengesetzten Fäden so ge deutet werden können. Man kann sich hiervon überzeugen, wenn man sie im Jugendzustande bei ihren verschiedenen Häutungen vergleicht.

Bei der Geburt zeigen sie nur ein Auge, vier arm- oder ruderförmige Füße mit Federbüschchen, und die zweiten größer. Ihr Körper hat noch keinen Schwanz, und das Schild besteht nur aus einem Stück, das die vordere Hälfte des Körpers bedeckt.

### Der krebsartige Kiefenfuß.

### *Triophthalmus cancriformis V.*

*Apus cancriformis. Limulus palustris.*

Zwei Zoll lang, dunkelbraun, ohne Blatt zwischen den Schwanzfäden.

Schäffer über den krebsartigen Kiefenfuß. Regensburg 1757, m. Abb. — *Geoffroy Abrégé de l'h. des Insectes; tab. XXI.*

Dieses höchst merkwürdige, sonderbare Thier kommt zu Zeiten an manchen Orten in unsäglichen Mengen vor, zu anderen und an anderen Orten nie. So findet es sich in Schlesien, bei Eschwege in Hessen, und bei Göttingen, beim sogenannten

Gurkenkrüge, beständig, aber, wie das Volk behauptet, nur alle fünf Jahr, in einem überschwemmten Fahrwege, der in manchen Sommern ganz trocken liegt. Bei Jena wurde einst vor der Stadt ein einziges lebendiges Exemplar gefunden, und an Göthe gebracht, der gerade da spazieren ging\*). Nachmals nie wieder, und, wie es scheint, auch zuvor nie, da ich nie eine Spur davon in einem Kabinet oder bei einem hiesigen Sammler gesehen oder etwas davon gehört habe. Es scheint daher, daß die Eier dieses Kiefernfußes lange Zeit im Schlamm ruhen können, um in nassen Jahren auszuschließen, und daß auch wohl zu Zeiten einzelne verschleppt werden, wie denn der Ichthyolog Balenciennes bemerkte hat, daß ihnen die Bachstelzen sehr nachstellen. Latreille sagt, daß man sie, durch heftige Stürme fortgetrieben, gleich einem Regen habe herabfallen sehen. Sie finden sich also, auch in Frankreich, so wie nach Schöffer, bei Regensburg und hie und da anderwärts. Sie schwimmen sehr gut auf dem Rücken, wobei das Glümmern ihrer blättrigen Füße schön aussieht. Oft stecken sie im Schlamm, nur den Schwanz hervorstreckend. Ihre Nahrung besteht zumal in Kaulquappen. Sie haben viel Feinde, unter andern die Larven der großen Wasserläuse, von denen sie angebissen werden, daher man auch selten ganz unversehrte Exemplare erhält.

## VI. M o l u k k i s c h e r K r e b s.

### Limulus.

Erscheint fast kreisrund, nach hinten verschmäler. Obenher bildet der Körper zwei Schilder oder Schalen, wovon die vordere, weit größere, den Kopf vorstellende, unten hohl ist, als ein großes, halbmondförmiges Schild mit aufwärts gebogenem Rande. Auf der Oberseite zeigt es zwei eisförmige, aus einer

\* Göthe hat mir erzählt, daß er noch mehrere Exemplare verlangt, und, da man sie nicht gleich fand, für das nächste einen Speziesthaler, das dritte einen Gulden, und so herab für jedes folgende bis zu sechs Pfennig geboten, und eine Menge Leute in Bewegung damit gesetzt habe, aber alles vergebens. Das einzige Exemplar fand sich in einer Pfütze am Ufer der Saale.

Menge Facetten zusammengesetzte, feststehende Augen, an der Außenseite eines Längskieles liegend. Am vorderen Ende des mittleren, über beide Schalstücke weggehenden Kieles finden sich zwei kleine, einander genäherte Punktaugen. Diese Kiele sind mit einigen Dornen besetzt. Die Duplicatur dieser Stirnshale bildet unten am Vorderrande einen flachen, stark gebogenen, unterwärts in einen doppelten Bogen endigenden Saum, der am Vereinigungspunkte als ein Zahn vorspringt. Unter diesem zeigt sich vorn und unten eine kleine Lippe, und darüber zwei kleine Fühler mit Scheeren. Unter diesen fügen sich paarweise, in zwei Reihen, zwölf Füße ein, wovon die zehn ersten, die vorderen bei den Männchen ausgenommen, in eine zweifingerige Scheere endigen, und deren Wurzelglied, nach innen wie ein Lappen hervortretend und mit kleinen Dornspitzen besetzt, das Amt der Kinnladen ausübt. Die Größe dieser Füße nimmt progressiv zu. Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen durch die Scheeren, welche am Ende der zwöl oder vier vordersten stehen; sie sind aufgetrieben und ohne bewegliche Finger. Die beiden letzten Füße dieses Schildes sind vereinigt, und haben die Gestalt eines großen hautigen, fast halbzirkelförmigen Blatts.

Das zweite Schalstück, oder Schild, an das vorige in der Mitte seines hinteren Ausschnittes eingelenkt, und den Raum von diesem ausfüllend, ist dreiseitig, hinten abgestutzt, und winkelig ausgeschnitten. Seine Seitenränder sind gezähnt; jeder Ausschnitt, vom zweiten an gerechnet, zeigt in der Mitte einen langen und beweglichen Stachel, sechs auf jeder Seite.

Die untere Höhlung verbirgt in zwei Längsreihen zehn, an Gestalt den letzten ziemlich gleiche Kinnladenfüße, die an der Basis einfach, aneinanderliegend, und an der hinteren Seite Kiementragend sind, welche Kiemen aus zahlreichen, in einer Fläche dicht zusammengereihten Fäden bestehen. Der After liegt an der Basis des großen Stachels. Das Innere des Schildes zeigt das Gehirn und einen Ganglienknoten. Die beiden Nervenstränge verlängern sich hierauf in das Innere des zweiten Schildes, bilden aber am Ursprung der Kiemenfüße nur schwache Ganglien. Das Herz ist ein dickes, inwendig mit Fleischsäulen besetztes Gefäß, längs des Rückens, und zu beiden Seiten neste abgebend. Ein faltiger Schlund führt in einen fleischigen Vormagen, inwendig mit

Knorpeln und Höckern besetzt, der sich in einen weiten Darm fortsetzt. Die Leber ergießt die Galle in denselben. Ein großer Theil der Schale ist bei den Weibchen mit den Eierstöcken, und bei den Männchen mit den Hoden angefüllt.

### **Limulus Polyphemus.**

Fr. Casserolle.

Bewohnt die Meere heißer Länder, und wird mit dem Stachel wohl eine Elle lang. Man sieht oft beide Geschlechter auf einander hocken. Sie halten sich meist am Ufer auf, und wehren sich mit dem Stachel, dessen sich auch die Wilden bedienen. Wenn sie laufen, sieht man ihre Füße nicht. Sie finden sich an den Küsten von China, Ostindien, im mexikanischen Meerbusen u. s. w. Ihre Farbe ist grünbraun.

*Leach Zoological Miscellany II*, tab. 74. — *Seba Thes. III*, T. 17, Fig. 1.

Unter dem Namen Parasiten begriff man eine zweite Abtheilung dieser Ordnung, welche sich durch sehr unvollkommene oft nur ein kleines Saugrohr darstellende Mundwerkzeuge von den vorigen unterscheidet. Sie haben sechs bis vierzehn Füße, eine, aus einem einzigen Stücke bestehende Schale, sind weich, und leben sämtlich als Schmarotzer auf Fischen.

#### **a. Caligiden.**

Mit vierzehn Füßen, wovon die fünf hinteren Paare vielspaltig gefiedert, oder in eine blattähnliche Flosse endigend sind. Zwei Fühler und zwei Augen.

### **VII. Argulus.**

Das Schild bedeckt fast den ganzen Körper. Das zweite Fußpaar endigt vorn in einen weichen Saugnapf. Das dritte hat bedornte Hüften, die vier hintersten Paar sind verkümmert und floßenartig.

### **Argulus foliaceus.**

*Argulus Delphinus.* Auch Fischlaus genannt.

Platt, gelblichgrün, etwa dritthalb Linien lang.

*Jurine*, in den Annales du Muséum d'histoire naturelle, Vol. VII, tab. 26. — *Müller Entomostraca* T. 20, Fig. 1, 2. — *Herrmann Mémoire aptérologique* T. V, Fig. 3, T. VI, Fig. 11.

Hefstet sich unten an den Bauch der Froschlausquappen und des Stichlings, um sie auszusaugen. Auch soll er sich an den Lachsfressen, Barschen, Hechten und Karpfen finden, denen er in den Fischhältern wohl eher den Tod bringt. In den Kiemen findet er sich nicht. Sie schwimmen auch frei, wobei sie sich überpurzeln.

## **VIII. Fischlaus.**

### **Caligus.**

Ohne Saugnapffüße, die vorderen vielmehr mit Krallen; die hinteren blattartig, mit Federchen. Die Schale lässt den Hintertheil des Körpers unbedeckt, der hinten in lange Fäden oder geringelte Röhren endiget. Die Eier sitzen unter den letzten Füßen, doch können jene Fäden Eierleiter für sie seyn.

### **Caligus curtus.**

*Monoculus piscinus* L.

Mit drei Paar geraden Hakenfüßen, und zwei Paar in blätterige Federchen endigenden. Auf Lachsen, Schellfischen &c. gegen einen Zoll lang.

*Müller Entomostr.* T. XXI, Fig. 1, 2.

Und noch mehrere, auf anderen Seefischen. (So auch der *Binoculus productus* am Lachs &c.)

### **b. Eernäen.**

Mit sehr kurzen, nur wenig entwickelten Füßen, und cylindrischem, wurmförmigem Körper der Weibchen. Diese haben

die wunderbare Eigenschaft, daß sie eine große Metamorphose erleiden. Beide fast mikroskopisch kleine Geschlechter haben nämlich bei der Geburt einen runden Körper mit einigen Fußpaaren, und sind ganz wie kleine Cyclops gestaltet. Bald aber heften sich die Weibchen an die Fische, zumal deren Kiemen, und verändern sich so, daß sie gleich nach der ersten Häutung ihre ersten Füße in drei paar Krallenfüße verwandeln, und zugleich vier neue gegliederte, durch Borsten zum Schwimmen geschickte, hervortreiben. Am Kopfe treten dreigliedrige Fühler hervor. Hat das Weibchen seinen bleibenden Sitz am Fisch gefunden, so bildet sich zunächst das mittlere Fußpaar zu einem starken, dicken, mit einer klapsförmigen Spicula verschossen Haken aus, und das dritte, oder hinterste Krallenfußpaar verwächst an der Spicula, oder auch bis zur Basis zu einer knorpeligen Platte, aus der ein horniger Knopf (aber kein Saugnapf) hervortritt, mittels dessen sich dieses Weibchen nun parasitisch festsetzt. Das erste und vorderste Fußpaar rückt dann bei fernerer Metamorphose bis ganz an die Mundöffnung hinauf, und wird zu, mit Zähnen und Haken bewaffneten, mitunter auch scheerenförmigen Oberkiefern. Dazwischen ein Rüssel. Hinten haben diese Weibchen sehr lange oder runde Eiertrauben\*).

Der Unterschied dieser so umgebildeten Weibchen zu den unverändert bleibenden Männchen ist wie 4600 1, und letztere schwimmen frei, suchen diese Weibchen, und setzen sich hinten, in der Geschlechtsnähe auf Zeitlebens an Ihnen fest. Zur Ausgleichung dieses Missverhältnisses hat es aber die Natur so eingerichtet, daß sich immer zwei bis vier Männchen für ein Weibchen finden.

Man trifft sie auf einer Menge Süßwasser- und Seefischen, über den ganzen Erdball.

## IX. Barschlaus.

### Achtheres.

Der Cephalothorax der Weibchen ei-herzförmig, der Bauch

\*). Die schönsten Abbildungen und neuesten Beobachtungen über diese Thiere finden sich in v. Nordmann's mikrographischen Beiträgen 2ter Band; auch in den Annalen des Wiener Museums v. Kollar. (1. Hefte, Taf. IX, X). Die ersten Vermuthungen über diese Metamorphose verdanken wir dem Herrn Dr. Sury, Arzt zu Havre de Grace.

rund und gegliedert, die Eiersäcke eisförmig, so groß wie das Kopfsbruststück, und die langen schlanken Arme zu einem Reife verbunden.

### Achtheres Percarum N.

Zwei Linien lang, ohne die äußeren Eiersäcke.

v. Nordmann I. e. Taf. IV, V.

Findet sich zu allen Jahreszeiten in ziemlicher Menge am Flussbarsch und am Kaulbarsch, in der Mundhöhle; doch kommt sie, wiewohl selten, auch äußerlich vor, wo sie in einer dicken Lage gelblichen Schleims sitzt. Hier ist das Thier noch mit vielen Vorticellen umgeben.

## X. Lernaeopoda.

Wie zuvor, aber der Hinterleib langgestreckt und ungegliedert.

### Lernaeopoda elongata.

An den Augen und namentlich der Hornhaut des Haifisches. Die größte bekannte. Ohne die Eiertrauben über anderthalb Zoll lang, letztere einen Zoll lang.

*Scoresby account of the arctic regions I, T. XV.*

## XI. Tracheliastes N.

Mit halsförmig verlängertem Cephalothorax; die verbundenen Arme wie zuvor; halige Klammerfüße an der Basis des Halses; der Bauch faltig, die Eiersäcke sehr lang und cylindrisch.

### Tracheliastes polycopus.

H. v. Nordmann fand dieses interessante Thier an den Rücken- und Schwanzflossen des Allands (*Cyprinus Jeses*). Hals und Leib sind quersfaltig.

v. Nordmann I. e. Taf. VII.

## XII. Lernaeocera.

Mit langem, wurmähnlichem Leib von ungleicher Dicke, hinten quergebogen mit zwei seitlichen Eiertrauben; um die Mund-

Öffnung vier Lappen, als veränderte, gabelige Arme. Die Männer sehr zierlich gestaltet, den Cypriden ähnlich.

### Lernaeocera cyprinacea.

Fünf bis sechs Linien lang, die Gierschnüre cylindrisch. An Karauschen und anderen Karpfenarten.

Burmester in den neuen Verh. d. f. leop. Ak. d. N.F. B.

XVII, 1. Abth., Taf. 24 A.

---

## S e i t e   O r d n u n g.

### Isopoden oder Asseln.

Crustaceen, deren Gestalt von unserem gewöhnlichen Kesseler assel leicht zu entnehmen ist. Sie zeigen obenher härtere Gürtel wie die Schwänze unserer Krebse, weshalb man die Kopfgürtel, die sieben Brust- und die kleineren Hinterleibs-Ringe nicht so deutlich unterscheidet, und sind ziemlich platt. Ihre Fräswerkzeuge sind wie bei den Krebsen; von vier Fühlern sind die mittleren sehr kurz und nur zweigliederig; ihre Augen bestehen aus zusammengesetzten Punktaugen. Sie haben stets sieben Paar Füße, am Ende mit Krallen, und unter den Schwanzgliedern blasige Anhängsel, welches die Respirationsorgane seyn werden. Die männlichen Geschlechtstheile zeigen sich als liniensförmige Anhängsel oder Haken am inneren Ursprung der unteren Schwanzblätter. Die Weibchen tragen ihre Eier unter der Brust, entweder zwischen Schuppen oder in einem hautigen Sack, den sie öffnen, um die Jungen herauszulassen.

Die meisten bewohnen das Meer, und sitzen an anderen größeren Seethieren, unter Steinen u. s. w. Einige leben im Süßwasser. Mehrere sind aber auch Landthiere, wie die Kesseler assel unserer Häuser, deren Wohnort feuchte Mauern ausmachen, und einige verwandte, die man häufig unter Steinen und Laub, auf Feldern und im Walde antrifft. In Südamerika soll eine gewisse Gattung bloß in den Ohren der Maulthiere nisten,

daher sie diesen die Treiber abschneiden. Welche andere Gattung im Gaumen mancher Fische lebt (*Oniscus praegustator*) ist noch nicht ganz ausgemacht. Man findet sie in Häringen der nordamerikanischen Küsten, so wie auch, wie mir ein Reisender erzählt hat, im Maule eines Seefisches im griechischen Archipelagus, so daß dieser ekelhafte Fund dem Fremden allen Appetit vertreibt. Sie nähren sich von faulen animalischen und vegetabilischen Substanzen.

### XIII. K e l l e r a s s e l.

#### P o r c e l l i o.

Eisförmig und länglich, platt, die Rückenschilder bisweilen seitlich hinaustretend. Die äußeren Fühler haben sieben Glieder und sind lange. Die äußeren Schwanzanhängsel sind zweigliederig, mit kegel- oder borstenförmigem Endgliede, die inneren meist eingesiederig. Die Augen gleichen einem Häufchen silberner Körnchen.

#### 1. Der rauhe Kellerwurm.

##### P o r c e l l i o s c a b e r.

*Oniscus granulatus Lam.* (O. *Asellus Linn.*)

Länglich eisförmig, flach, schwarzgrau, wie grob gefürnt, meist ungefleckt, bisweilen gelb marmoriert oder gelb gerandet. Das letzte Schwanzglied zugespitzt.

Panzer Insektenfauna, als *Oniscus Asellus*. — Brandt und Raheburg A. Thiere II, Taf. XII.

Durch seine schleifergraue rauhförmige Oberfläche ausgezeichnet. Findet sich zumal in Gärten, an Wegen und Häusern, doch auch in Wäldern sc. Zwei sehr verwandte Arten: *B. dilatatus Br.* (ib. T. XII, Fig. 6) zeichnet sich durch größere, zumal nach hinten stärkere Breite, und mehr röthlichgraue Oberfläche, und *P. pictus Br.* (ib. Fig. 5) durch länglichen Körper von schmutzig-gelber Farbe mit guttigelben und schwarzen Fleckenreihen aus. Beide finden sich, zumal in Kellern, mit dem vorigen, und haben

gleiche Lebensart. Auch sind sie vielfach von den Autoren zusammengeworfen worden.

## 2. Der gehänderte Kellerwurm.

### *Porcellio taeniola Koch.*

Braun, mit ockergelb gemischt, obenher rauh, die Seitenränder weißlich, der letzte Rückengürtel und die zwei ersten Schwanzgürtel mennigroth. Nur 3—4 Linten lang.

Panzer Fauna Fortsh. Nro. 139, Taf. 2.

Bisher nur zwar vom Kreisvorstrath Koch im Stadtgraben von Regensburg, da jedoch sehr häufig gefunden, wird also wohl auch anderwärts vorkommen.

## 3. Der glatte Kellerwurm.

### *Porcellio laevis.*

Groß, gewölbt, einen Zoll lang, glänzend, die Seitencken der Gürtel scharf vorstehend. Graubraun mit weißlich gewässerten Flecken auf Kopf und Rücken. Die Schwanzendglieder lang, die Beine weißlich.

Panzer 139, 1.

Unter Steinen, mehr in der Nähe der Wälder.

## XIV. Mauerassel.

### *Oniscus.*

Wie zuvor, nur daß die äußeren Fühler achtgliederig sind; wie bei den vorigen ist das fünfte Glied derselben das längste.

### Die gemeine Mauerassel.

#### *Oniscus murarius.*

Maueresel, Kelleresel, Kellerlaus, Wetterwurm. Fr. cloporte (clou à porte). Engl. Tillerlouse.

Gleichförmig länglich oval, obenher glatt, schwärzlichgrau, mit zwei Reihen hellerer Punkte. Der Rand hellgelb, schwarz punktiert. Die Füße gewimpert. Einen halben Zoll lang.

Brandt und Raheburg l. c. Taf. XII, Fig. 7.

In ganz Deutschland und weiter, und an gleichen Ortern wie die vorigen. Sie laufen schnell, stellen sich tot, und kommen zumal bei feuchtem Wetter hervor. Ihre Vermehrung ist stark. Sie wurden früherhin, und noch jetzt in Frankreich, zerstoßen, frisch, als eine Arznei, zumal gegen Augenübel, und als urintreibend empfohlen, sind aber auf diese Weise den Patienten gewöhnlich zuwieder, so daß man ihren Gebrauch jetzt aufgegeben hat.

## XV. W a s s e r a s s e l.

### A sellus.

Der Hinterleib besteht nur aus einem Stück, und hat hinten zwei zweispaltige Spalten. Die Klauen am Ende der Füße sind ganz.

Die gemeine Wasserassel,

*A sellus aquaticus*,

ist etwa sechs Linien lang, erdbraun, flach, etwas hochbeinig und findet sich in Menge in stehenden süßen Wässern. Sie läuft langsam, außer wenn sie gesagt wird, schwimmt aber nicht. Im Frühjahr kommt sie aus dem Schlamm hervor, in welchem sie den Winter über zugebracht hat. Das Männchen ist viel dicker als das Weibchen, und trägt dieses etwa acht Tage lang, indem es dasselbe mit den Füßen des vierten Paares hält. Wenn es dasselbe fahren läßt, so ist es mit einer Menge in einem Sack unter der Brust eingeschlossenen Eiern beladen, der sich bei dem Aussiechen der Jungen durch eine Längsspalte öffnet.

Degeer VII, Taf. 31.

## XVI. B o p y r u s.

Ohne Augen noch Fühler; die sieben paar Füße sehr klein, nicht mehr zum Laufen tauglich, stehen umgedreht am Rande, und dienen nur noch zum Anklammern. Der Mund zeigt sich nur als hautige Blättchen.

Es sind Parasiten, und die unvollkommensten dieser Ordnung.

Die Weibchen sind viel größer als die Männchen; sie gleichen darin den Lernäen.

### Bopyrus Crangorum.

### Bopyrus Squillorum.

Sitzt auf den Kiemen des *Palaemon squilla* und *serratus* und bildet unter der Schale derselben eine dicke Geschwulst. Im Nordmeer.

---

## Dritte Ordnung.

### Lamodipoden.

Usselförmige Meerthiere mit feststehenden Augen, fast ohne Schwanz und ohne Kiemen an demselben. Die Vorderfüße stehen am Kopfe. Vier borstensörmige, an einem dreigliederigen Stiele sitzende Fühler, und blaßige Körper an den ersten vier Fußpaaren.

## XVII. Walfischlaus.

### Cyamus.

Mit acht gegliederten, mit scharfen Krallen versehenen, und vier cylindrisch häutigen, zu Kiemen umgebildeten Füßen, am vierten und fünften Segment mit Blasenanhängseln. Zwei einfache Augen oben; zusammengesetzte zur Seite.

### Die eigentliche Walfischlaus.

### Cyamus Ceti.

*Oniscus Ceti L.* *Squilla balaenarum D.* *Pycnogonum balaenarum F.*

Eisförmig, flach, eisengeingelb, mit sechs Gürteln; die Fußkrallen krumm und äußerst scharf.

*Degeer VII*, tab. 6. — *Pallas spicilegia zoologica IX*, T. IV, Fig. 14.

Etwa einen Zoll lang. Kriecht auf den Walfischen umher,

und befestigt sich zumal sehr fest an den weichen Stellen, an den Axillen der Flossen, oder in der Nähe der Geschlechtsstelle ein. Die Delphine und Cachalot's haben sie nicht, wohl aber andere Species von Balaena.

---

## Viertere Ordnung.

### Amphipoden.

Haben festzuhaltende Augen wie die vorigen, aber einen Laster an der Kinnlade. Ihre Schwanzanhängsel gleichen unechten Füßen oder Schwimmfüßen. Ihr Körper ist zusammengedrückt, das erste Segment des Bruststückes von den übrigen sechs, so wie vom Kopfstücke gesondert, trägt ein eigenes Fußpaar. Vier Fühler. Der Hinterleib ist sechsgliederig und einwärts gekrümmt. Die Anhängsel am Schwanz gleichen meist kleinen eingelenkten Spießen.

Sie springen und schwimmen mit vieler Leichtigkeit, meist seitlich. Einige leben in Bächen und anderem Süßwasser, andere im Meer. Sie haben keine besondere Färbung, sondern sind blaß, ins Röthliche oder Grünliche.

## XVIII. Corophium.

Lang und schlank, mit bloßen Lauffüßen ohne Scheeren, die unteren Fühler sehr lang; hinten am Schwanz kurze gabelförmige Stiele.

### Corophium longicorne.

*Cancer grossipes* L. *Gammarus longicornis* F. *Oniscus Volutator* *Pallas.*

Mit stumpfem Schwanz, die Fühler länger als der Körper. *Pallas* *Spicilegia Zoologica* fasc. IX, T. IV, Fig. 9. — *Pennant* *British Zool.* IV, T. 16, Fig. 31.

Findet sich in zahlloser Menge an den Küsten der Nordsee und des atlantischen Oceans. Diese Thiere durchwühlen den

Schlamm nach allen Richtungen und leben in den Höhlen desselben, von wo sie Myriadenweise bei steigender Fluth herankommen, um die Fische, Mollusken und Seegewürme aller Art anzufallen und zu zerfleischen. Sie schlagen mit ihren starken unteren Fühlern den Schlamm, um sie herauszulocken, und steigen selbst in die Körbe der Fischer, wenn diese voll sind.

## XIX. Talitrus.

Mit großen vornigen Fühlern; die Füße gleichfalls ohne Scheeren.

### Talitrus locusta.

*Cancer Gammarus saltator Montague. Oniscus locusta Pallas.*

Ganz glatt, glasglänzend, durchscheinig, blaßgelb; die Augen purpurschwarz, die Fühler fleischroth, die oberen äußeren kurz. Füße und Schwanzfloschen dornig. Dreiviertel soll lang.

*Pallas spicilegia zoologica IX, tab. IV, Fig. 7 — ej. Miscell. zool. T. XIV, Fig. 15.*

Ebenfalls an den Küsten um Europa, und von gleicher Lebensweise. Am Lido bei Venedig hüpfst er häufig auf dem feuchten Strande herum, auch soll er in den warmen Quellen von Albano vorkommen.

## XX. W a f f e r l a u s.

### Gammarus.

Die vier vorderen Füße haben die Gestalt kleiner einsfingeriger Scheeren; Fühler, Füße und die vier Afterfüße der letzten zwei Schwanzglieder sind vornig, nach hinten gerichtet, und diesen, nebst den Anhängseln des Schwanzes, zum Springen.

#### 1. Der Fluss-Flohkrebs.

##### *Gammarus fossarum Koch.*

Flussgarnele. *Cancer pulex L. Squilla pulex Degeer.*

Gelblichbraun, längs jeder Seite ein bräunlicher Streif, die Schwanzschilder unbewaffnet, ohne vorstehende Stachelspitzen.

*Panzer Fauna 138, 1. — Degeer Ins. VII, tab. 33, Fig.*

*1—10. — Frisch Ins. VII, tab. 13.*

Wird gewöhnlich mit dem *Gammarus pulex* vermengt, und findet sich nebst diesem und dem folgenden in unsäglichen Mengen, in Gräben, Brunnen, Fließbächen u. s. w. Es sind schädliche Thiere, welche die Fischerneße zeragen und den Fischen an die Klemmen gehen; dagegen dienen sie wieder den Hechten und anderen Raubfischen zur angenehmen Nahrung. Sie sind einen halben Zoll lang.

### 2. Der Brunnen-Flohkrebs.

*Gammarus puteanus Koch.*

Durchscheinig, weißlich, an den Seiten ockergelb, die Schwanzschilder ebenfalls unbewehrt; das Handglied der vier Scheerenfüße viereckig.

Panzer Fauna ib. Taf. 2.

Ganz glasartig weiß; mehr in Ziehbrunnen; sonst von der Lebensweise des vorigen und folgenden.

### 3. Der Bach-Flohkrebs.

*Gammarus pulex.*

Unterscheidet sich von den vorigen nur durch die kleinen Stachelspichen an den letzten Schwanzringen. Gegen  $\frac{3}{4}$  Zoll lang.

Baster opuse. subsec. T. 3, Fig. 7. — Rösel Insektenbel.

III, tab. 62.

Es gibt noch mehrere Gattungen in der See. Alle drei hier genannten sind nicht selten, und schwimmen sehr schnell, seitlich, oft sieht man Männchen und Weibchen aufeinander hockend. Das sechste und siebente Fußpaar ist aufwärts gerichtet, das Kopfschild behaart.

---

## Fünfte Ordnung.

### Stomatopoden.

Diese, auch Seeheuschrecken genannte Crustaceen machen den deutlichsten Übergang von den vorigen zu den eigentlichen

Krebsen, und können zugleich als die höchste Entwicklung der so eben abgehandelten angesehen werden.

Ihre Kiemen liegen offen und sind als Büschel an die fünf paar Auhängsel des Schwanzes oder Hinterleibes angeheftet. Diese sind zugleich Flossenfüße, zum Schwimmen. Ihre Rückenschale ist in zwei Stücke getheilt, wovon das vordere, der Kopf, die Augen und die zwei Zwischenspulen trägt. Die Kinnladenspulen, so wie die vier vorderen eigentlichen Füße sind dem Munde unten in zwei convergirenden Linien genähert (daher der Name Stomatopoda), aber haben keine Geißel oder Gerte. Die übrigen Mundwerkzeuge sind wie bei den Krebsen gestaltet, die mittleren zwei Spulen haben drei Geißeln, die äusseren zwei langen sind an ihrer Basis von einem eisförmigen Blatte bedeckt. Die Kinnladenspulen haben die Gestalt von Scheeren oder kleinen Füßen. Ihrer sind zehn. Die des zweiten Paars sind grösser als alle anderen, und endigen als eine schmale einfingerige, innen bedornte Scheere. Die vier folgenden zeigen gleichfalls eine Scheere, aber rundlicher, deren einfacher Haken sich in eine Rinne der Hand schlägt. Nur bei den Phyllosomen ist es nicht so, sondern die drei folgenden Fußpaare, die letzten am Bruststück, sind einfach. Die sieben Ringe des Schwanzstückes oder Hinterleibes, welche einen bedeutenden Theil des Herzes einschliessen und den Atemungsorganen zur Anheftung dienen, folglich den wahren Rumpf bilden, haben die oben genannten blattförmigen falschen Füße und am Ende eine Flöze.

Die Schalen dieser Thiere sind weiß, auch durchscheinig, und sehr dünn und weich. Sie bewohnen die wärmeren Zonen, und verlieren sich nur noch bis in das Mittelmeer, nicht weiter nördlich. Es sind die Cragones oder Crangines der Griechen. Ihre Lebensweise ist gänzlich unbekannt. Sie leben in den größten Tiefen auf sandigem und schlammigem Grund und begatten sich im Frühjahr.

## XXI. Seeheuschrecke.

### Squilla.

Mit halbzyindrischem Körper. Die Vorderschale bildet nur ein einziges, länglich-viereckiges Schild, hinten frei, welches  
Beigt. Zoologie. Bd. VI.

mit Ausnahme der Fühler und Augen den Kopf bedeckt. Die Scheerenfüße haben bewegliche Haken oder Finger. Mit Ausnahme der zweiten haben sie an der Basis ein gestieltes Blüschchen. Die anderen sechs Füße sind liniensförmig, in eine Bürste endigend, und Schwimmfüße.

### *Squilla mantis.*

Ital. Canocchia.

Porzellanweiß, oben mit mehreren Längskanten. Die großen Scheeren an der Basis mit drei beweglichen Stacheln, und an der langen etwas gebogenen Fangklaue sechs lange spitze kammmärtige Dornen.

Herbst Krebse Taf. XXXIII. — Degeer VII, Taf. 34.

Diese Seeheuschrecke ist etwa sechs Zoll lang, es scheint aber auch kleinere, und noch eine größere, an acht Zoll lange, zu geben, deren große Fangscheere acht Dornen hat. Die kleineren Scheeren der Füße dahinter sind rundlich. Im Leben schillern diese Thiere wie Perlenmutter, in verschiedenen Tinten von Ultramarin, Violet, Purpur und Grün. Die Augen sind goldgrün. Mit den vorderen Scheeren fassen sie ihren Raub nach Art der Fangheuschrecken, mit welchen Landgeschöpfen sie auch manche andere Ähnlichkeit gemein haben. Sie sind sehr furchtlos und flüchtig. Ihr Fleisch ist aber angenehm, daher sie täglich gespeist werden. Sie finden sich im ganzen mittelständischen und adriatischen Meer, auf dem Schlammgrund; man fängt sie in Nehen.

### *XXII. Phyllosoma.*

Die Schale ist in zwei Schilder getheilt, das vordere sehr groß, eiförmig, den Kopf bildend, das zweite, dem Bruststück entsprechend, schmal. Die Füße dünn, fadenförmig, mit gewimpern Seitenanhängseln. Die Augenstiele lang.

Sie leben in den wärmeren Zonen des Weltmeers.

Ihr ganzer Körper ist platt, so dünn wie ein Glimmerblättchen und so durchsichtig wie der reinsten Kristall. Sie gewähren daher bei der Wunderbarkeit ihres Baues einen höchst gefälligen Anblick.

#### 1. *Phyllosoma mediterraneum.*

Ganz glatt, mit Strahlen auf dem Rückenschild, vom Mittelpunkt nach dem Umkreis. Anderthalb Zoll lang.

*Risso Europe mérid. T. V, Fig. 9.*

Der Vorderschild ist quereiförmig, die äusseren Fühler haben nach außen eine Spize. Das Thier ist rothgefleckt, außerordentlich lebhaft, und hält auch lange außer dem Wasser aus, wo es in einem fort die federigen Anhängsel am vierten Fußgelenk bewegt. Im Mittelmeer, doch immer sehr selten.

#### 2. *Phyllosoma australe.*

Die äusseren Fühler breit, kurz, und zweispaltig.

*Voyage de Freycinet, Atlas pl. 82, Fig. 1.*

Drei Zoll lang und anderthalb breit; im Weltmeer. Es gibt noch andere, ebenso schöne.



### S e c h s t e O r d n u n g.

#### D e k a p o d e n.

Bilden die zahlreichste Ordnung mit den größten Arten, und begreifen die langschwänzigen wie die kurzschwänzigen Krebse.

Sie sind sämmtlich in eine harte Bedeckung eingeschlossen und nur eine Familie, die der Einsiedlerkrebs, zeigt einen weichen Hinterbauch wie die Spinnen. Obwohl es eine ganze Reihe von Formen von den lange gestreckten bis zu den zusammengezogenen, mit freirundem, ja breitem Schilden gibt, so sind diese doch sämmtlich nur Übergänge einer Grundgestalt, welche man der Reihe nach verfolgen kann. Ihre Glieder und Gelenke sind so zierlich, wie zu mechanischen Zwecken ausgebildet, daß man Definition und Beschreibung an ihnen sehr genau und deutlich zu geben vermag. Als Vorbild der folgenden Klassen, der Arachniden, Insekten und Myriapoden, verdienen sie auch, zur Kenntnis

der Terminologie besonders studiert zu werden, wozu unser gemeiner Krebs schon das zweckmässtige Muster abgibt.

Sie leben, außer dem ebenenannnten, alle in der See. Viele der grösseren haben ein reichliches, schmackhaftes Fleisch und sind deshalb ein Gegenstand des Fangs. Einige gehen wie schon früher angeführt worden, zu Zeiten an das Land, oder leben in Erdlöchern.

Beginnt man die nähere Betrachtung mit unserem Flusskrebs, oder seinem colossalen Ebenbild, dem Hummer, so bemerkt man einen langgestreckten Körper, an dem die drei thierischen Hauptregionen angedeutet sind. Das die vordere Hälfte einnehmende grosse Schild ist durch eine bogensförmige Querfurche in zwei Theile unterschieden, die man als zwei verschiedene, nur verwachsene Schilder anzusehen hat und die man zusammen Kopfbruststück, Cephalothorax nennt. Der vordere Theil bestimmt demnach den Kopf, mit den Sinneswerkzeugen, nämlich den zwei Augen, den Fühlern und Tastern, dem Ohr, welches man als eine mit einer Haut verschlossene Höhle, in der ein mit Flüssigkeit angefülltes Säckchen liegt, an der Basis der äusseren Fühler entdeckt hat, und wohin sich der Gehörnerv begibt; und einem Geruchssorgan, wenn die Haut an der Basis der inneren Fühler so gedeutet werden kann. Auch ist nicht unwahrscheinlich, daß die Krebsse Geschmackssinn besitzen. Der unten liegende Mund ist mit verkürzten fußähnlichen Organen, als den Kinnladen *et c.* umgeben, und das auf sie folgende erste Fußpaar, gewöhnlich grösser, beim Flusskrebs und andern zu wahren Händen mit Finger und Daumen entwickelt. Von da an werden die Füsse nach hinten unvollkommen.

Das zweite oder eigentliche Bruststück, nämlich der hintere Theil des grossen Rückenschildes, bedeckt die innerlich an den Fußpaaren liegenden Kiemen, und schliesst auch die übrigen Haupteingeweide, Magen, Herz und Geschlechtsorgane ein.

Der ganze Hintertheil aber, gewöhnlich Schwanz genannt, müste eigentlich der Bauch heißen. Allein abgesehen vom gemeinverständlichen Sprachgebrauch verdient er bei den kurzschwanzigen Krebsen so wenig noch den Namen dieses Organes, daß er dort fast nur zu einer dünnen Schuppe zurückgebracht ist. In ihm läuft indess auch da noch der Darm bis zum After.

Dieser Bauch oder Schwanz nun, besteht bei den lang-schwanzigen Krebsen aus sieben Ringstücken, welche nach oben muschelförmige Panzerschienen bilden, deren jede unten durch einen Querbügel verbunden ist, und welche alle durch eine weichere Haut zusammenhängen. Die ersten fünf tragen unten sogenannte falsche, oder Ruderfüße, nämlich an einem Knochengelenk einen breiten Stiel, der in zwei gewimperte Blätter endigt, welche wohl Kiemenfunktion ausüben könnten. Das vorletzte Glied zeigt sie gewaltig verbreitert, groß, und hart, als den eigentlichen wahren Schwanz. Denn das äußerste, eisdrmige, durch eine Querabtheilung zweigliederige Blatt, und das innere, ungetheilte wiederholen nur in Metamorphose jene falschen Floßensätze, und indem sie zu ihrer großen Entwicklung viel verlangen, haben sie die Entwicklung dazu im nächsten Gliede aufgezehrt. Denn das siebente oder letzte innerste, das in der Mitte die Aftersöffnung zeigt, ist wie aus allen jenen Theilen verschmolzen.

Weiter nach vorn die Betrachtung verfolgend, zeigen die beiden vordersten Schwanzfüßchen beim männlichen Flusskrebs schon deutlich die Beschaffenheit gewöhnlicher Füße, indem sie vorwärts gerichtet erscheinen, und zum Festhalten des Weibchens bei der Begattung dienen. Von da aber nehmen, mit Anfang des Rückenschildes, die Entwicklungen mächtig zu.

Das Rückenschild nämlich muß als aus fünf verschmolzenen Bauchringen gebildet angesehen werden, dem auf der Unterseite die fünf großen Fußpaare entsprechen. Diese sind, genauer betrachtet, unten an fünf Brustwirbelspangen gehetzt. Der erste Brustwirbel ist klein, dreieckig; der zweite dagegen der größte von allen, und mehr hervorstehend; die folgenden drei wieder schmal. Unmittelbar an diese ist die Hüfte, coxa, mit ihrer Gelenkhöhle gehetzt. An sie schließt sich das erste, kurze Glied, der Gelenkknopf, trochanter genannt, den man als solchen deutlicher noch bei den Käfern erkennt. Der bei diesen sogenannte Oberschenkel, femur, ist hier gleichfalls noch kurz, es ist das innerste Glied, was man, von obenher betrachtet, erblickt. Das nächste Glied, der Unterschenkel oder das Schienbein, tibia, bei Käfern und Heuschrecken gewöhnlich senkrecht stehend, ist hier das längste, und am Scheerensatz schon dornig. Die beiden noch übrigen Gelenke müssen nun zu dem

eigentlichen Fuß, tarsus, gerechnet werden, und sie endigen bei den zwei hintersten Fußpaaren in eine einfache eingelenkte Kralle, bei den zwei folgenden Paaren in eine doppelte, also schon eine kleine Scheere, und das fünfte hat nun alle diese Stücke auf das Gewaltigste ins Große entwickelt. Man nennt hier die Tarsenglieder insbesondere die Scheere, und den dicksten innerlich fleischigsten Theil derselben die Hand, manus, carpus, welche sich in den unbeweglichen Finger, digitus, und den ihm gegenüber eingelenkten beweglichen Daumen, pollex, fortsetzt.

Diese mächtige Entwicklung mußte nun die Folge haben, daß die nächsten Fußpaare wiederum verkürzt und beschränkt, jedoch zu höheren Funktionen veredelt wurden, indem sie nunmehr die Kinnladenfüße bilden. Sie entsprechen daher auch dem oberen Kopftheil, und wie man den großen Scheeren die Funktionen eines Armes mit wahrer Hand nicht absprechen kann, so sind hier die zu Geschwerkzeugen umgewandelten Füße abermals ein schönes Beispiel höherer Metamorphose.

Es sind ihrer sechs Paar. Das erste Paar ist noch ganz den Füßen ähnlich gestaltet, aber kleiner als sie alle, und folgt zunächst nach vorn auf die Scheerenarme. Es hat sieben Gelenke, das scheinbar unterste, eigentlich dritte, ist dreikantig, dick, an der inneren Kante mit Zähnen bewaffnet, und alle seine Glieder sind mit braunen Haaren gewimpert. Unten, an der äußeren Basis, befindet sich ein Taster, oder die Geißel, und daselbst nach innen eine wahre Kieme, mit zwei Anhängseln, wie bei den eigentlichen Füßen. Das darauf folgende, mehr nach innen, der natürlichen Stellung nach aber eigentlich darüber liegende Paar ist noch mehr verkürzt, und seine Endglieder sind hakenförmig einwärts gekrümmt; es bildet schon deutlicher eine Hülfsskinnlade. Auch an diesem Paar findet sich an der Außenseite ein Taster, und innerlich Kiemen. Das dritte, auf dieses folgende Paar ist noch mehr verkürzt und umgestaltet, und zeigt sich als eine kleine breite Kinnbacke; der äußere Taster ist aber eher noch größer als der vorhergehende; das vierte Paar ist gänzlich umgebildet; es besteht aus einer Art von fünffingeriger Hand; das darauf folgende fünfte und so auch das sechste Paar bilden nur kleine, maxillenähnliche Schuppen.

Auf diese Hülfsskinnlade (pieds-machoires der Franzosen)

folgt endlich noch vorn das wahre Kinnladenpaar, aus zwei convexen, länglich-viereckten, an der Oberfläche wie emailsirten, nach innen mit Zähnchen versehenen Stückchen gebildet. Über diesen Organen liegt erst die Mundhöhle mit ihrer Öffnung, und darüber eine Oberlippe labrum. Davor gerade unter den äußeren Fühlern, an dem vorletzten, oder neunzehnten Brustwirbel, jederselts die Öffnung.

Es folgen jetzt die Fühler (antennae), deren beim gemeinen Krebs vier, oder zwei Paar sind. Das äußere Paar hat unten einen Stiel, mehrgliedrig und dick; auf ihn setzt sich die lange, geringelt gegliederte Gerte. Das innere Fühlerpaar ist viel kürzer, und auf jedem Stiele sitzen kleinere, doppelte Gerten. An der Basis dieser Fühler stehen zwei spitze Schuppen.

Die zwei Augen stehen auf einem mehr oder minder langen Stiele, und ihre Hornhaut ist gegittert (facettirt), daher sie aus vielen einzelnen zusammengesetzt, oculi compositi, sind.

Alle diese Theile variiren nun, nach den einzelnen Geschlechtern, mehr oder minder, sind verkürzt, hie und da fast schwundend oder verwachsen, so daß man sie immer erst aus dem Typus ableiten muß.

Von dem inneren Bau des Krebses ist nur so viel anzugeben nöthig, daß sie ein aus vier Lappen bestehendes Gehirn zeigen, von welchem nach hinten zwei Nervenstränge abgehen, die sich bald vereinigen, und ihrer Länge nach in Knoten angeschwollen sind. Sie geben die Nervenfäden zu den Sinnes- und Bewegungsorganen ab. Die Mundöffnung führt zwischen den Kinnladen zu einem Schlund, der zu einem durch drei Knochenbögen wie ausgespannten, inwendig gezähnten, Magen führt. Er setzt sich in einen engeren Kanal fort, bis zu einem erweiterten Punkt, den Pförtner genannt, und von da als Dünndarm den Bauchschwanz entlang, bis zum After. Zur Seite des Magens liegt eine Masse gelbgrüner, blind endigender Gefäßchen, fast die ganze Brusthöhle ausfüllend, und eine Leber bildend, welche Röhre voll gelber bitterer Flüssigkeit in den Darm münden. Oben neben dem Magen zeigt sich auf jeder Seite eine mit einer grünen Haut umgebene Höhlung, die zur Zeit der Häutung die sogenannten Krebssteine enthält, welche ebenfalls

vom Krebs mit abgeworfen werden. Hinter dem Magen liegt das Herz, von eiförmiger Gestalt, nach vorn, unten und hinten Gefäße abgebend. Es ist ein Vortenherz. An jedem ächten Fußpaare und so auch den Kinnladenfüßen, befinden sich nach innen federige Organe gehestet, die Kiemen, welche man sowohl beim Abreißen eines Fusses, als auch, noch besser, beim Abheben der großen Schale bemerkt. Der Krebs athmet auch durch abwechselndes Heben dieses Schildes. Zwischen Herz und Magen befinden sich noch die Geschlechtstheile. Der weiße längliche Testikel besteht aus einer drüsigen Masse und geht in einen vielfach geschlängelten, fadenförmigen doppelten Saamengang über, der sich jederseits an der Basis des letzten Fusses, gleich vor dem Schwanz, öffnet. Auf jeder dieser Öffnungen tritt eine Rute hervor. Der Eierstock füllt dieselbe Gegend aus, ist länglich, nach vorn in zwei Lappen getheilt, und öffnet sich jederseits durch einen kurzen geraden Eierleiter an der Basis des dritten Fusses durch eine Klappe oder Spalte. Die Eier werden unter den Schwanz abgesetzt, wo sie bis zum Auskriechen noch einige Zeit verweilen und haften bleiben.

Alle Krebse häuten sich, d. h. gegen den Sommer hin ist ihr Panzer gänzlich erhärtet und gleichsam absterbend geworden. Der Krebs bildet darunter eine neue, anfangs zarte und weiche Haut durch alle Glieder und Gelenke bis in den Magen hinein. Endlich plazt die Alte auf dem Rücken, und das Thier steigt verjüngt heraus, indem es seine Beine wie aus Stiefeln herauszieht und den ganzen Panzer zurücklässt. Nach dieser Operation verbergen sich die Krebse gern einige Tage, um erst wieder zu erhärten.

Sie wachsen langsam und werden sehr alt. Es sind gefährliche muskelkräftige Thiere, ihr Fleisch ist aber schwer verdaulich. Manche, wie die Languste erreichen eine Länge von anderthalb Ellen, es gibt aber auch mikroskopisch kleine.

#### A. Langschwänzige Krebse.

*Crustacea decapoda macroura.*

#### XXIII. Palaemon.

Der Körper seitlich zusammengedrückt, mit dünner, pergamentartiger Schale; die äußeren Fühler langb vorzig, tiefer

eingefügt als die inneren, der Stiel durch eine spitze, lanzettförmige Schuppe bedeckt. Die inneren Fühler mit drei borstigen Gerten. Das erste und zweite Fußpaar mit Scheeren, das zweite größer, eingeschlagen, mit ungegliedertem Handgelenk.

#### 1. *Palaemon carcinus.*

Glänzend glatt, mit elastischem Schild, perlmutterweiß, mit rosenrotem und blauem Anflug, die langen cylindrischen Scheeren des zweiten Paars schön lasureblau, und kurz bedornt. *Herbst Krabben und Krebse* Taf. XXVIII, Fig. 4. — *Rumph Mus. T. 1, Fig. 18.*

Ein schönes Thier, gegen einen Fuß lang, mit den vorgestreckten Scheeren wohl gegen zwei. Der Stirnschnabel ist zusammengedrückt, säbelförmig aufwärts gebogen, gegen drei Zoll lang, und oben wie unten mit 12—14 spitzen Zähnen bewaffnet. Im indischen Meer zu Hause, aber nicht selten in den Sammlungen. Ihm ähnlich, aber klein, ist *P. jamaicensis*, an den Antillen. Sein Schnabel ist nur oben gezahnt.

#### 2. *Palaemon serratus.*

Bläbrotth, aber lebhafter an den Fühlern und an der Endflosse. Der Stirnschnabel ist länger als die inneren Fühler, aufwärts gehend, und hat oben die Spitze oben 7—8 Zähne, unten fünf. *Herbst l. c. XXVII, 4. — Leach Malac. Brit. tab. 43, Fig. 1—10.*

Nur drei bis vier Zoll lang. An den französischen und englischen Küsten. Wird in Paris häufig zum Markte gebracht. An ihm zumal findet man die Beule an der Schale, in der inwendig, parasitisch, der *Bopyrus Squillorum* (s. vorn) steckt.

#### 3. *Palaemon Squilla.*

*Salicocque.*

Kaum zwei Zoll lang, der Stirnschnabel fast gerade, oder nur wenig aufwärts gebogen, und so lang als der Stiel der Fühler, an der Spitze zweizähnig, oben mit 7—8 Zähnen unten mit drei.

*Leach l. c. 43, 1—13.*

Ebendaselbst und sehr gemein. Liefert wie alle, ein sehr schmackhaftes Gericht, das man als einen wahren Salat zubereitet\*). Die Nika des Mittelmecres sind ihnen sehr ähnlich.

## XXIV. Garnele.

### Crango.

Der Körper zusammengedrückt, mit eingeschlagenem Schwanz, mit gleichfalls dünner Schale, die äusseren Fühler vorstig, die inneren kurz, mit nur zwei Gerten nebeneinander. Das erste Fußpaar dicker als die folgenden, die Scheeren desselben haben statt des Beigefingers nur einen kurzen Haken, auf den sich der bewegliche Daumen einschlägt, und reichen nur bis zur Stirne. Die zweiten Füße sind gefaltet. Der Stirnschnabel sehr kurz.

### Die Grenate.

#### Crango vulgaris.

Gr. Cardon.

Bläß graugrün, grau punktiert und glatt.

Herbst XXIX, 3, 4. — Rösel Insektenbelustigungen III, Taf. 63, Fig. 1, 2.

In Mengen an den nordeuropäischen Küsten, und ebenso schmackhaft wie die vorige, auch hie und da auf ähnliche Weise zubereitet. Zwei bis drei Zoll lang. Schwimmt auf dem Rücken.

## XXV. Astacus.

Mit länglichem Körper, das Schild in einen kleinen Stirnschnabel verlängert. Die inneren Fühler mit zwei Gerten, die äusseren sehr lang und vorstig. Drei Fußpaare mit Scheeren, das vorderste sehr groß.

\*) Ich habe diese schmackhaften Krebschen zu Havre de Grace in Massen gegessen, indem man sie dort in ungeheuren Haufen findet, alsdann am Schwanz und den Fühlern zugleich anfasst und zieht, wo das gesamme Fleisch herausfällt, und diese nackten Thiere dann kalt mit Essig, Del, Pfeffer und Salz aumacht.

## 1. Der gemeine Krebs.

### *Astacus fluviatilis F.*

Fr. Écrevisse. Engl. Craw-fish. Ital. Gambero.

Mit lörnigen Scheeren, die am inneren Rande der Schneide der Zangen fein gekerbt sind. Der Stirnschnabel hat auf jeder Seite einen Zahn, und zwei an der Basis.

Rösel Insektenbelustigungen III, Taf. 54—57. — Brandt u. Raheburg A.Th. II, Taf. X, XI.

Der Krebs, von dem es vielleicht mehrere Arten, wenigstens Spielarten gibt, findet sich in England, Frankreich, Holland, ganz Deutschland, Polen, Ungarn, Griechenland (z. B. beim Berge Athos) und selbst bis Asien: bei Laibach soll er eine außerordentliche Größe erreichen. In der Regel ist seine Länge nur sechs Zoll, und er wird etwa ein halb Pfund schwer. Nach Rösel soll er an zwanzig Jahr alt werden, folglich sehr langsam wachsen.

Die Krebse leben in Flüssen und Bächen in den Uferlöchern, oft eine Elle tief hinein, oder unter den Baumwurzeln, wo sie manchmal nur mit großer Mühe herauszuziehen sind. Des Nachts laufen sie umher, auch wohl an das Land, gehen dem Fackelschlechte nach, und zeigen sich bei schwüler Gewitterluft auch am Tage. Man fängt sie da, oder wenn sie unter Steinen sitzen mit der Hand, nimmt sich aber sehr in acht, daß man nicht von ihren Scheeren gefaßt wird, da die Kneipwunden, welche sie verursachen können, meist böse Geschwüre veranlassen. Außerdem kann man sie in einem flachen, auf den Boden des Baches ausgebreiteten Reß, das man über Nacht ins Wasser legt, und in der Mitte desselben ein Stück faules Fleisch oder einen abgezogenen Frosch befestigt, oder in einem ebenso vorgerichteten Korb, oder selbst einen Reisbündel, in das man Fleisch gesteckt hat, und in das sie hineinkriechen, fangen. Auf diese Art gewinnt man in kurzem große Mengen.

Sie sind überhaupt, wie alle dieses Geschlechts, sehr räuberisch, und gehen schnell tote Thiere, ja alles Nas an, daher manchen Personen der Krebs als unrein erscheint. Gefangen kann man sie einige Zeit, doch nicht sehr lange, mit Kleie und Milch, Hollunderbeeren oder gelben Rüben erhalten; Pflanzen scheinen sie nicht zu frößen. Doch sollen sie besonders gern mit

Brennesseln bedeckt seyn. In Wassertrögen halten sie nur wenige Tage aus, im Keller jedoch mehrere Wochen. Der Geruch von Schweinen soll ihnen nach Obje schnell tödtlich seyn, doch sterben sie nicht, wenn man sie auf den Rücken eines Schweines setzt. Auch leben sie viele stundenlang munter in Weinessig. Todt gehen sie bald in stinkende Fäulniß über, und ein todt Krebs, in Erbsenfledern oder bei Kirschbäumen u. dgl. aufgehängt verscheucht am sichersten die Sperlinge.

Wenn sie besonders groß und fett sind, werden sie höchst schmackhaft, zumal am Fleische ihrer Scheeren und des Schwanzes. Die Kiemen soll man nicht aussaugen, weil sie zu mancher Zeit einen Wurm oder Art Blutigel (*Branchiobdella astaci*) hegen. Manchen Personen ist ihr Genuss zuwieder, andere bekommen einen Ausschlag davon, doch zeigt dieses nur an, daß der Krebs ein besonders reizendes Gericht ist. Daß man ihn nur in den Monaten, die kein R. haben, essen solle, bezieht sich darauf, daß er da, Mitte Sommers, gerade am wenigsten mager ist. Er paart sich im Herbst.

In den Monaten Juli bis September wechselt der Krebs die Schale. Es erscheint unter der alten eine neue, rothe, die man durchschimmern sieht, und die ganz weich ist. Endlich plazt die alte Schale an der Verbindungsstelle des Rückenschildes mit dem Schwanz, und das Thier macht viele Bewegungen, um sich gänzlich herauszuziehen. Mehrere sterben darüber, oder werden von anderen Thieren gefressen; aber der neue Krebs zieht sich bis in die kleinsten Gelenke, ja den Magen selbst, so vollständig heraus, daß man glaubt, zwei Krebse neben einander zu sehen: denn ob schon auch die Scheeren während dieser Operation platzen, damit sich die Hand herausziehe, so schließt sich doch der Spalt wieder. Die so gehäuteten, sind dann ganz weich und erst nach einigen Tagen erhärtet. Um diese Zeit verbergen sie sich auch, da sie den Nachstellungen der Feinde mehr ausgesetzt sind.

Solche Krebse sind besonders schmackhaft. Man erkennt übrigens die lebendig gesottenen daran, daß ihr Schwanz eingeschlagen ist: die, welche schon todt waren, als man sie in den Kessel warf, haben ihn ausgestreckt. Da die Weibchen wegen ihrer Eier unter dem Schwanz schmackhafter sind, so zieht man sie vor, und erkennt sie an dem breiteren Schwanz und den

schmäleren Scheeren: auch an der Geschlechtsöffnung am dritten Fußpaar; die Männchen haben breitere Scheeren, schmälere Schwänze und die beiden einfachen Flossenfüßchen der zwei ersten Schwanzglieder nach vorn gerichtet. Es werden aber gewöhnlich mehr männliche Krebse auf die Tafel gebracht, weil man die Weibchen wegen der Brut wieder zurückwirft.

Um die Zeit der Häutung findet man seitlich vom Magen die Krebssteine, kalkige convexe, innen concave, dicke Scheiben, welche nach der Häutung mit abgeworfen werden (so daß man sie oft in Menge auf dem Boden des Gefäßes findet, worin man Krebse hiebt), und welche sich in einer Höhlung bilden. Sie sollen den Stoff zur neuen Schale liefern, fehlen auch im Winter. Mehrmals waren sie in der Medizin gebräuchlich, doch dienten sie etwa bloß bei Magensäure als ein absorbirendes Mittel, und werden jetzt durch Magnesia weit besser ersetzt.

Der Krebs sieht im Leben schwarzgrün aus, und bleicht im Tode. In der Höhe, ja selbst im Sonnenlicht, wird er roth. Die, welche dieser Farbenwechsel nicht erleidet, nennt man Steinkrebs, und Hrn. Koch hat in den neuesten Heften von Panzer's Fauna folgende zwei als eigene Arten unterschieden.

#### a. *Astacus saxatilis.*

Graugrün mit rostbraunen Flecken, auf dem Schwanz zwei Reihen gelber; die Stirnspitze und die seitlichen Schwanzwimpern sehr kurz.

Panzer Fauna Forts. Heft 140, Taf. 1.

Er ist etwas schlanker als der gemeine Flusskrebs, und hat eine stumpfe Stirnspitze. Die vorderen Ecken des Stirnbeines sind aufrecht, weniger spitz, der Mittelsiel ohne Zähne vor der Spitze; das Schild ist graubläulich, mit rostbraunlichem Schimmer und kleinen braunen Flecken, oder auch nicht selten rostbraulich, und die Räume zwischen dem Vorder- und Hinterleib und der Hinterrandsaum des letzteren grünlichblau, auf dem Rücken in die Grundfarbe vertrieben. Der Schwanz gelblich, mit rostfarbiger Mischung, ein ziemlich breiter Raum am Hinterrande der Ringe und ein Mittelfleck an diesen rostroth, bezgleichen ein

schiefes Streifchen an dem Winkel der Seitenkanten; der erste Ring mit zwei großen dunkelbraunen auf das Blaue ziehenden Flecken; über den Seiten eine Längsreihe gelblichweisser Längsfleckchen, doch nur auf den vier Mittelringen. Die Schwanzflossen sind helllockergelblich, an der Wurzel und an den äusseren Seiten rostroth, einwärts in die Grundfarbe sich verlierend und aus gehäuften Fleckchen bestehend. Die Mittelflossen auf der Mitte der Länge dunkel rostroth. Die Fühler gelb, die zwei äusseren an der Wurzel blau. Auf der Unterseite ist der Körper und die Hüften hornfarbig weiß, ein wenig ins Röthliche ziehend. Die Vorderbeine rothfarbig oder bräunlich, mit starkem bläulichem Anstrich; die Spitzen der Scheeren ins Gelbe übergehend; die übrigen acht Beine weißlich, die Schenkel, Knie und Schienbeine oben unrein bläulich angelaufen.

Bis jetzt wird sein Ausenthalt nur in den kleinen Bächen der bergigen Gegenden der Oberpfalz, auch in der Donau, wo er in großer Anzahl unter Steinen gefunden wird, angegeben, es ist aber wahrscheinlich, daß er auch noch anderwärts vorkomme. Er wird nur dreitehalb Zoll lang.

b. *Astacus tristis* Koch.

Dunkel schwarzbraun, mit weißlichen Flecken an den vorderen Winkeln der Schwanzschilder; der Stirnschnabel kurz; die seitlichen Schwanzwimpern sehr groß.

Panzer Fauna 140, Taf. 2.

Von der Gestalt und Größe des vorigen, aber breiter und stämmiger, die Scheeren etwas kürzer und schwächer. Die Schale ist schwarzbraun, oben etwas heller. Der Hinterrand schwarzblau gesäumt. Der Schwanz etwas heller als der Körper, auf dem ersten Ringe zwei große schwarzblaue Flecken und drei kleinere gelbliche. Unten ist der Körper heller. Die Fühler sind rostgelb. Die dicken Stiele derselben schwarz, in der Mitte mit einem bläulichen Fleck, die folgende mit braunem Schimmer. Die Hüften und die acht Hinterbeine sind unten blau, oben schwarzbraun, mit etwas blaulicher Mischung, die zwei vorderen Glieder an der Seite bläulichweiß. Die Scheeren auf der Mitte mit einem röthlichen Längsstreif und Fleck, an der Spitze ins Gelbe übergehend.

Diese Art wurde in großer Anzahl, und meist unter Steinen, in einem kleinen Bergbache bei Bodenstein im bairischen Regenkreise bemerkt.

c. *Astacus torrentium Schrank.*

Der Steinkrebs

soll wieder von diesen beiden, zumal durch den fehlenden Stirnschabel, verschieden seyn, auch sind die Seiten des Schnabels schmäler, mehr ausgeschweift, und dessen Zähne aufgerichtet. Die Scheeren sind sehr kräftig. Ob er eine wirklich verschiedene Art ausmache, muß neue Untersuchung lehren.

Bügts Mag. der N. K. XI. B., 1. St., Taf. 1.

In Nordamerika gibt es noch eine verwandte Gattung.

2. Der H u m m e r.

*Astacus marinus.*

Fr. Homard. Engl. Lobster.

Der Stirnschnabel jedersseits mit drei Zähnen, und einem doppelten an der Basis. Die Scheeren sehr groß, etwas platt, glatt, ungleich; die größere eiförmig, mit dicken Mahlzähnen; die kleinere länger gestreckt, mit vielen kleinen Zähnen.

Herbst Taf. XXV. — Pennant brit. Zool. V, 10, 21.

Der Hummer gleicht dem gemeinen Krebs, nur in collossaler Form, da er bis Dreiviertel Ellen lang und an fünf Zoll dick wird. Seine Farbe ist kirschroth, ins Braune, bläulich marmoriert. Er findet sich in den nordischen Meeren, zumal der Nord- und Ostsee, wo jährlich über eine Million gefangen werden, welche nach Holland, England und Deutschland auf die Märkte kommen. Sein Fleisch ist trefflich, aber doch für manche Personen etwas schwer verdaulich. In der Lebensart scheint er dem Flusskrebs zu gleichen. Man behauptet, daß er beim Donner die Scheeren abschnelle, und daß daher die englischen Kriegsschiffe, wenn sie einem Boot mit Hummern begegnen, eine Anzahl derselben als Tribut fordern, widerigenfalls sie eine Kanone lösen, wodurch dann jenen vor Schreck die Scheeren abfallen.

## XXVI. L a n g u s t e.

### Palinurus.

Das Schild ohne Stirnschnabel; die äuferen Fühler sehr groß und bedornt, die einfingerigen Scheeren der Borderfüße ganz klein, wie fehlend.

#### 1. Die Languste des Mittelmeeres.

##### *Palinurus quadricornis.*

*Cancer clephas L.* Gr. Langouste. It. Rangosta.

Mit stacheligen Fühlern, bedorntem wolligen Rückenschild, das vor den Augen zwei starke, wiederum gezähnte Dornen hat, und kurzen Borderfüßen.

Herbst XXIX, 1. — Leach l. c. tab. XXX.

Diese Gattung ist gleichsam der Stellvertreter des Hummers im Mittelmeer, doch versteigt er sich auch bis fast zur Nordsee; er wird auch eben so groß, wie jener, ja bis anderthalb Fuß lang, und, wenn voll Eier, zwölf bis vierzehn Pfund schwer. Er schwimmt, den Schwanz eingeschlagen, und wird auch so, diesen an den Leib gebunden, verkauft. Seine Farbe ist lackroth, mit gelben Flecken, die Schwanzschilder haben eine in der Mitte unterbrochene Quersfurche. Die Stirn hat acht Dornen, und seitlich einen langen. Der Schwanz ist der beste Theil zu essen, zumal wie Salat angemacht, in Scheiben geschnitten; doch schwer verdaulich.

An dieser Gattung hat man bemerkt, was wahrscheinlich von allen Krebsen gilt, daß sie sich, Bauch gegen Bauch begatten, wobei das Männchen die Ruthe in die Vulve des Weibchens bringt, wo sie sich dabei so fest umklammert halten, daß man sie nicht auseinanderreißen kann. Man fängt sie in Reusen, mit Stücken Sepiensfleisch und gerösteten Fischchen gefüllt, und versenkt diese an felsigen Stellen des Meeres wohl bis sechshundert Fuß tief. Die Menge, die jährlich gewonnen wird, geht bis an eine Million\*).

\*) *Locustae crusta fragili muniuntur, in eo genere, quod caret sanguine. — — Locustae reptantium modo fluitant: si nullus ingruat*

## 2. Die indische Languste.

### *Palinurus Homarus.*

Unterscheidet sich von dem vorigen durch ein noch stärker bedorntes Rückenschild und erreicht mit den Fühlern wohl eine Länge von sechs Fuß. Sie findet sich in allen indischen Meeren, ihr Fleisch ist aber nicht beliebt.

## XXVII. *Scyllarus.*

Die seitlichen Fühler sind wie Schwanzflosken verbreitert und stellen eine platte, eingelenkte, gezähnte Schuppe vor. Der Leib ist niedergedrückt, der Rücken so breit wie lang.

### 1. Der Bärenkrebs.

#### *Scyllarus actus.*

Fr. Cigale de mer.

Die äußeren blätten Fühler sind stark gezähnt und schaufelförmig; das Brustschild hat drei gezähnte Längskanten. Die Oberseite des Schwanzes ist wie mit Skulpturen versehen und ohne Kerben an den Seitenrändern.

Herbst XXX, 3.

Er hat seinen Namen von der Trägheit, mit welcher er kriecht und sich bewegt, auch hat er im Ansehen etwas plattes, Krötenartiges mit haariger Oberfläche. Wühlt sich auch Gänge im Schlamm. Verfolgt thut er Sähe wie eine Heuschrecke, daher der Name Cicada. Im Mittelmeer. Einen halben Fuß lang.

### 2. Die Orkette.

#### *Scyllarus aequinoctialis Fabr.*

It. Orchetta.

Unterscheidet sich vom vorigen durch den Mangel der Fühler. Zähne und Kanten. Er wird noch einmal so groß und ist

metus, recto meatu: cornibus, quae sunt propria rotunditate praepilata, ad latera porrectis: iisdem erectis in pavore oblique ad latera procedunt. — Vivunt petrosis locis: cancri, mollibus. Hieme aprica littora sectantur: aestate in opaca gurgitum recedunt. *Plin. H. N. IX, 4.*

auch wegen seines Fleisches geschätzt. Die Seitenränder des Schwanzes haben Kerben. Ebendaselbst.

## XXVIII. Einsiedlerkrebs.

### Pagurus.

Der Schwanz ist weich, lang, am Ende gekrümmt und zusammengezogen, und zeigt oben noch die Spuren der sieben Schilde, seitlich die Schwanzanhängsel. Das Bruststück ist eisförmig oder länglich, die Scheeren ungleich.

Die Einsiedlerkrebsen oder Eremiten haben ihren Namen von der eigenen Gewohnheit, sich ein Schneckenhaus zu suchen, den Bewohner herauszubeißen, und sich dann mit dem nackten weichen Schwanz hineinzustecken, um es so dann zeitlebens mit sich herumzuschleppen, daher auch eine Art den Namen Diogenes erhalten hat. Dieser Instinkt ist um so wundersamer, als er, völlig angeboren, entweder voraussetzt, daß diese Verkümmерung des Schwanzes erst in einer späteren Periode der Schöpfung eingetreten sey, und dann das Thier genöthiget habe, sich einen Schuh für diesen Theil zu suchen; oder, was viel mehr mit der Vernunft übereinstimmt, anzunehmen, daß der Bildungsact, der das Thier gleichso schuf, ihm auch den Trieb beigab, sich jenes eigene Haus zu wählen: damit macht sich der Krebs gleichsam wieder zur Schnecke, also zum Mollusk, so wie sich von der andern Seite auch eine gewisse Ahnlichkeit mit der in ihrem Loch siedenden Spinne, oder der Phryganäenlarve zu erkennen gibt. Und noch ist der Umstand bemerkenswerth, daß nun der Einsiedler, da ihm nach der Spindelseite der Schnecke hin die freie Bewegung der Hand benommen ist, diese auch nur sehr unvollkommen entwickelt, und nicht viel größer als das Scheerchen des folgenden Fußes zeigt, während die andere, gewöhnlich rechte, sich vollkommen ausbildet.

Man kannte früher nur sehr wenige Gattungen dieser sonderbaren Thiere, am besten die gemeine unserer Meere. Allmälig hat man aber, fast auf jedem Punkte des Oceans, so viele entdeckt, und jede neue Reise bringt wieder andere, daß man sie nicht nur in mehrere, sehr verschiedene Geschlechter trennen,

sondern sogar diese Gruppe zu einer eigenen Familie erheben muß \*).

Die Griechen nannten sie *Kapiviov*, die Römer *Cancellus*, die Franzosen *Soldat*. Von der indischen Gattung, *Birgus* s. *Thylacenus latro*, welcher auf die Bäume steigen soll \*\*), wird es noch ungewiß gelassen, ob er sich in ein Schneckenhaus begebe: Latreille vermutet, daß er sich vielmehr in Erdlöchern aufhalte. Es gibt andere, die in Seeschwämmen sitzen u. s. w.

Die eigentlichen *Pagurus* haben einen fast nur haufigen Schwanz (Bauch), der um sich selbst gewunden ist, und am vorletzten Segment ein Paar unsymmetrische Anhängsel hat. Die inneren Fühler sind kurz.

Das Geschlecht *Cancellus* (*Milne*) hat einen weichen, nur wenig gebogenen Schwanz, mit am Ende symmetrischen Anhängseln.

Unter dem Namen *Cenobita* trennt derselbe Naturforscher von ihnen noch die, welche die inneren Fühler länger haben.

Die *Birgus* aber zeigen einen nicht gerollten, mehr sackförmigen, auf der Oberseite ganz harten Bauch.

Alle, die in Schneckenhäusern wohnen, verschließen in der Ruhe die Öffnung derselben mit ihrer größeren Scheere wie mit einem Deckel.

### Der Bernhardskrebs.

#### *Pagurus Bernhardus*.

Der vordere Rand des Schildes ist über der Basis der Augenstiele tief ausgeschnitten, und zeigt an der Mittellinie einen hervorspringenden Winkel wie einen kleinen stumpfen Schnabel.

\*) So erzählen Duoy und Gaymard von einer großen Art an den Küsten von Guam, die, in großen Schneckenhäusern lebend, aus Neugierde des Nachts an das Feuer der Reisenden kam, und da gleich in ihrem eigenem Hause gesottern wurde. Einige geben, wenn man sie reizt, einen Schaum von sich.

\*\*) Rumph hat hiervon (Amb. Taf. X, Fig. 5) ausführlichere Nachricht gegeben. Dieser Krebs soll die Cocospalmen erklettern, die Nüsse abknepfen, und dann wieder herabsteigen (natürlicher Weise!); daß er aber die Milch dieser Nüsse aussaugt, ist doch unwahrscheinlich, vielmehr möchte er den Insektenlarven u. dgl. nachgehen..

Die Augenstiele sind kurz und dick; die Borderscheeren sind mit stacheligen Knötzchen besetzt, die rechte ist die grösere; das zweite und dritte Fußpaar ist oben höckerig und dornig, ihr letztes Glied zusammengedrückt; das vierte und fünfte Fußpaar sind sehr klein. Das Rückenschild hat verschiedene Furchen. Findet sich im ganzen Nordmeer bis Island, und ist etwa fünf Zoll lang.

Herbst II, Taf. XIV, Fig. 6. — Degeer VII, 23, Fig. 5. — Leach Mal. XXVII, Fig. 1—4.

### B. Kurzschwänzige Krebse. Krabben.

*Crustacea decapoda brachyura.*

#### XXIX. Matuta.

Die Schale fast kreisrund, und an jeder Seite mit einem starken Dorn bewaffnet. Die Scheeren obenher fämmig gezähnelt, und an der Außenseite mit spitzen Höckerchen besetzt.

##### Matuta victor.

Glasklar, mit rundlicher, zwei Zoll breiter Schale, jederseits von der Mitte ein mächtiger spitzer Dorn. In Indien.

Herbst VI, 44.

#### XXX. Portunus.

Das Brustschild ist vorn breit, bogig, nach hinten verschmäler und abgestutzt. Die Augenstiele sind kurz, in eiförmige Höhlungen versenkt. Das letzte Glied der hinteren Füße ist platt, gewimpert, und zum Schwimmen geschickt.

##### 1. Die Sametkrabbe.

###### *Portunus puber.*

Fr. l'Étrille. Engl. Velvet-crab.

Mit einem rostgelblichen Sammeltaubhaer wie mit Wolle überzogen, und mit acht kleinen Zähnen zwischen den Augen versehen,

wovon die beiden mittleren länger, divergirend und stumpf sind. Die Scheeren gefurcht, mit erhabenen Rippen, an der Innenseite der Hand mit einem starken Bahn versehen.

*Leach* *Malacostraca* *brit.* *T. VI.*

Die Schale dieser schönen Krabbe ist im Leben zinnroth, die Kanten der Scheeren und Füße prächtig lasurblau. Der Rücken sieht aus, als wenn er aus übereinandergelegten Stücken bestände. Sie ist etwa dritthalb Zoll breit. Diese Gattung findet sich im Nordmeer und wieder um Europa und hat ein vorzügliches Fleisch, wird aber sehr von kleinem Ungeziefer geplagt, was sich in die Kiemen setzt.

## 2. Die gemeine Krabbe.

*Portunus Maenas.*

*Cancer Maenas* *L.* ♂ *Granzo.* ♀ *Molecca.* Franz. *Ménade*, *crabe euragé.*

Mit etwas flacher, fein gekörnter und mit verschiedenen Furchen gezeichneter, etwa zwei Zoll lang und breiter Schale. Nach hinten verschmäler mit einer Kante eingefasst, vorn halbkreisförmig, jederseits mit fünf spitzigen Sägezähnen. Auch die Hände kantig, die Hinterfüße zum Schwimmen platt, in ein langes förmig spitzes gewimpertes Glied endigend.

*Leach* *Mal. br.* *T. V.* — *Herbst* *IV*, 7, 46.

In vielen Millionen an den europäischen Küsten, und insbesondere nach v. Martens\*) Bericht, ein starker Nahrungsgegenstand der Bewohner der adriatischen Meeresküsten. Von Anfangs des Frühlings bis spät in den Herbst werden alle Thäler und Lagunen, selbst die Kanäle der Stadt mit diesen postlerischen Thierchen belebt. Nähert man sich einem, so läuft er mit großer Behendigkeit seitwärts, über den weichsten Schlamm weg und vergräbt sich in denselben. Wird ihm die Flucht unmöglich gemacht, so richtet er sich aufrecht in die Höhe, öffnet die Scheeren, und schlägt solche mit Geräusch zusammen. In der Gefangenschaft kneipt er sich in Kurzem alle Füße ab. Daher

\*) Reise nach Benedig II. B., S. 488.

der französische Name. In einem kühlen Zimmer kann man diese Krabbe als Stubenthier halten; in der Sonne stirbt sie aber schnell. Die Farbe ist schmutzig olivengrün, der Schwanz ist dicht an den Bauch gedrückt, und nur bei den Weibchen mit Füßen versehen.

Es ist ein wichtiger Handelsartikel für die Venetianer. Nach Istrien, wo sie zum Köder der Garnelen gebraucht werden, gehen jährlich 154,000 Fäschchen, jedes zu achtzig Pfund; 38,000 Fässer Weibchen mit Eiern, jedes zu siebenzig Pfund, und 86,000 weichschalige (nach der Häutung) werden im Lande verkauft, indem sie, in Öl gebraten, eine Lieblingsspeise des Volks sind. Sie tragen jährlich 500,000 Lire (80,000 Thaler) ein.

### 3. *Portunus depurator.*

Jt. Granzela.

Mit flacher Schale mit erhöhten abgekürzten Querstrichen und Körnchen; jederseits fünf Randzähne: der zweite kürzer, der letzte etwas entfernter stehend. Drei Stirnzähne, der mittlere etwas spitzer; oben an den Händen ein starker Zahns, das Hinterende des Fußgliedes etwas ausgerandet.

Herbst VII, 48. — Leach IX, 1.

Gemein um ganz Europa. Er ist graulichweiß, fast durchsichtig. Nicht ganz zwei Zoll lang. Auch er weiß sich mit grösster Schnelligkeit einzugraben.

## XXXI. Krabbe.

### Cancer.

Die letzten Kinnladenfüße sind quadratisch. Die Fühler treten kaum über die Stirn hervor, haben wenig Geisenke, sind zurückgeschlagen und fast unbehaart. Die Hände abgerundet, ohne alle Kante. Die Schale breit, flach nach hinten verschmäler.

#### 1. Der gemeine Taschenkrebs.

##### *Cancer Pagurus.*

Fr. Tourteau, Crabe poupart. Engl. Pancer.

Kirsch- oder weinroth, mit schwerer, obenher fast glatter Schale und neun Kerben an jeder Seite, welche aus zusammengewachsenen Zahnnungen gebildet werden. Die Scheeren dick, mit schwarzen Fingerspitzen.

Herbst IX, 59.

Er erreicht fast einen Fuß Breite und kann dann bis fünf Pfund schwer werden. Findet sich an den Küsten der Nordsee und des atlantischen Oceans, jedoch nur einzeln. Sein Fleisch wird sehr geschätzt, doch ist er wegen der harten Schale schwer zu behandeln.

#### 2. *Cancer Poressa.*

##### *Cancer marmoratus.*

Mit eisförmiger ausgeschweifter, jederseits vierzähniger dunkelbrauner Schale und gespaltener, vierlappiger Stirn. Die Hände gestreift, warzig, an der Spitze schwarz.

*Olivi Zool. adriatica T. XI, Fig. 3. — v. Martens Reise II, Taf. 5.*

Im adriatischen und Mittelmeer. Häufig auf den Murazzi von Venetien, wo er die Mauern heraufsteigt. Er ist außerordentlich flüchtig und schwer zu fangen.

Ihm sehr ähnlich ist *C. floridus* (*Xantho florida*) an der Südküste von England.

*Leach I. c. XI.*

#### 3. Die Riesenkrabbe.

##### *Cancer gigas.*

Ungeheuer dick, mit etwas höheriger, jederseits mit zehn Zähnen gerandeter Schale.

In den Meeren von Japan und weiter hinauf. Noch wenig bekannt. Nach den Fragmenten aber, die ich gesehen, von gewaltiger Größe; Lamarck sah Vorderfüße, die die Dicke eines

Menschenarmes hatten, und die Schalen sollen über Ellenbreite haben.

Diesen Krabben ist ähnlich eine Gattung des Mittelmeeres, *Eriphia spinifrons* genannt, bei denen die Seitenfühler zwischen den Mittelfühlern und den Augenhöhlen eingefügt sind. Die Schale ist herzförmig, hinten abgestutzt, an jeder Seite mit fünf Bähnen, wovon der zweite und dritte gespalten ist, und glatt; aber Stirn und Hände sind mit Dornen besetzt, wovon die der Stirn drei Reihen bilden.

Herbst XI, 65.

Es ist der *Pagurus* der Alten, und wird geessen. Er ist so stark, daß er eine Hand durch und durch kneipen kann.

### XXXII. *Gonoplax*.

Mit quertrapezoidischem Schild, und langen, in der Mitte der Stirn eingefügten, dünnen Augenstielen, welche bis an die vordere Ecke der Schale reichen. Die Scheeren der Männchen sind lang und cylindrisch.

#### *Gonoplax angulatus*.

Die vorderen Ecken des Rückenschildes sind in eine Spitze verlängert, dahinter ein kleiner Dorn.

Herbst I, 13. — *Leach XIII.*

Bei den Weibchen und den jungen sind die Scheerenfüße nicht länger als die übrigen. Bei den alten Männchen sind aber die Hände noch einmal so lang, schmal, und fast cylindrisch. Findet sich an den westlichen Küsten von Frankreich und England, zumal häufig bei Plymouth, im Seeschlamm.

### XXXIII. *S a n d k r a b b e*.

#### *Gelasimus*.

Die Augen stehen in Gestalt eines kleinen Köpfchens am Ende ihrer Stiele. Das dritte Glied der äußeren Kinnladenfüße bildet ein queres Viereck. Der letzte Schwanzabschnitt ist beim Männchen halbkreisförmig, beim Weibchen fast kreisrund.

Die eine Scheere, bald die rechte, bald die linke, ist bei weitem größer, als die andere. Dies variiert oft bei einer Species. Die Finger der kleinen sind dann spatelförmig.

Sie leben am Meeressufer, in Höhlen, und das Thier verschließt den Eingang seiner Höhle mit seiner größeren Scheere. Diese Höhlen sind cylindrisch, sehr tief, gehen schief, und stehen nahe beisammen. Bosc hat an einer Gattung im südlichen Carolina beobachtet, daß sie die drei Wintermonate in ihrer Höhle verlebt, und erst zum Eierlegen in's Meer geht \*). Wenn sie laufen, halten sie die große Scheere in die Höhe oder schwenken sie, daher sie vocans, Rüfer oder combattans, Fechter genannt worden sind. Sie laufen außerordentlich schnell, wie Spinnen, und vergraben sich auch schnell.

#### 1. *Gelasimus vocans.*

Mit quadratischem, ungeheiltem Schild, mit vertieften Furchen auf dem Rücken. Die große Scheere glatt. Einen Zoll lang. In Ostindien.

*Rumph Mus. T. X, Fig. 1.*

#### 2. *Gelasimus Maracoani.*

*Ocypoda Maracoani Latr.*

Mit etwas convexem, rhombisch-quadratischem Schild, ebenfalls auf dem Rücken gefurcht, und vorn an der Ecke in einen Dorn ausgehend. Die große sehr zusammengedrückte Scheere ist gekörnt, und fast so groß als das ganze Rückenschild, auf welches sie auch die Krabbe bisweilen im Laufen legt. Die kleine Scheere ist behaart. In Südamerika. Unterhalb Zoll im Durchmesser.

*Seba Thes. III, 78, S. — Piso Bras. T. LXXVIII.*

Es gibt noch mehrere Gattungen.

### XXXIV. *Ocypoda.*

Die Augen erstrecken sich über den größten Theil ihrer Stiele und bilden eine Art von Keule. Die Scheeren sind gleich

\*) Also ganz nach Art mancher Amphibien unter den höheren Thieren.

stark, kurz, die Hände wie ein verkehrtes Herz. Das Schild ebenfalls ziemlich quadratisch.

### Der Reiter.

#### O c y p o d a cursor.

Fr. Le Chevalier. Cancer eques. *Ocypoda* *Ippeus*.

Am Ende der Augenstiele befindet sich ein HaarbüscheL Etwa zwei Zoll lang.

*Olivier Voyage dans l'empire ottoman* II, 30, 1.

An den Küsten von Syrien, von Afrika, am Mittelmeer u. s. w. Er ist wegen seiner Schnelligkeit im Laufen Reiter genannt worden, da man sagt, man könne ihn selbst zu Pferd nicht einholen. Wenn man Abends am Meeresufer im Sande ausruht, so kommt er aus den Erdlöchern hervor, und flieht so schnell dahin, daß man nur einen gespenstischen Schatten auf einen Augenblick zu sehen glaubt. Man kann ihn aber aus dem Sande aufgraben. Häufig bei Sour in Palästina\*), doch selbst an den europäischen Küsten.

### X X X V . P i n n e n w ä d h t e r .

#### Pinnotheres.

Die Schale der Weibchen ist kreisrund, sehr dünn, und weich, die der Männchen stark und kugelrund. Die Füße von mittler Länge, die Scheeren gerade.

#### 1. Pinnotheres pisum.

Die Schale der Weibchen kreisrund, dabei etwas quadratisch, weich, ganz glatt, an der Stirn etwas ausgeschweift, ganzrandig. Die Hände länglich, und unten, so wie die Schenkel, in einer Linie gewimpert. Der Daumen etwas gekrümmt.

*Leach T. XIV, Fig. 1—3.*

Diese Krabbe ist so groß wie eine Zuckererbse, schmutziggelb, mit kirschrothen Zeichnungen auf Schwanz und Rücken. Das

\*) *Cārabi cauda a caeteris distant. In Phōnīce ἡωες vocantur tan-tae velocitatis, ut consequi non sit. Plin Hist. nat. IX, 51.*

*Cancri in pavore etiam retrorsum pari velocitate redeunt. Dimicant inter se, ut arietes, adversis cornibus incurvantes. ib.*

Männchen ist noch unbekannt. Findet sich häufig in den Gehäusen der Modiolus und Mytilus. Um Europa.

## 2. *Pinnotheres veterum.*

*Cancer pinnotheres L.*

Die Stirn etwas ausgerandet, die Scheren unten bogig ausgeschweift. Das Männchen hat eine quere, fast quadratische Schale, die ziemlich stark und punktiert ist. Die Hände sind eiförmig, mit gekrümmten Fingern. Das Weibchen ist weniger querquadratisch, ganz fein punktiert, die Hände gestreckt eiförmig, die Finger weniger gebogen. Der Bauch sehr breit, knotig gekielt. *Leach T. XV, Fig. 1—5.*

Findet sich gewöhnlich in dem Mantel der Steckmuscheln, auch der Austern. Rund um Europa.

## XXXVI. T u r l a r a.

### *Gecarcinus.*

Das Schild herzförmig, mit abgerundeten Ecken, gewölbt, nach hinten verschmälert und abgestutzt. Die Augenstiele erreichen nicht völlig das Ende der Schale und werden durch das Stirnschild verdeckt. Die Scheren sind etwas platt, das dritte und vierte Fußpaar das längste.

### Die Erdkrabbe.

#### *Gecarcinus ruricola.*

Fr. Tourlourou, crabe peint, crabe de terre.

Blutroth, bisweilen gelb gescheckt, auf dem Schild mit bogigen Furchen wie ein H. Das Schild fast viereckig, platt, die Stirn der ganzen Breite nach herabgeschlagen. Die Augenstiele kurz, die Tarsen mit sechs sägenartigen Kanten. Etwa sechs Zoll breit.

Herbst III, 36.

Unter mehreren ist dieß die am genauesten bekannte Gattung, welche in Amerika, sowohl dem Festlande als den antillischen Inseln vorkommend, den Tag über in Erdlöchern steckt, um den Abend auf der Jagd und den Wanderungen zuzubringen.

Man sagt, daß sich dieser Krebs während der Häutung verberge, dann aber gerade am schmackhaftesten sey: er wandert zur Laichzeit nach dem Meere, und ebenso kehren die Jungen, nur einen Groschen groß, nach dem Lande zurück. Dann ist die Straße mit vielen Millionen derselben bedeckt. Während ihrer Züge kommen sie in die Häuser, sogar in die Betten, werden aber sehr gerne gesehen und gefangen, da sie denn von trefflichstem Geschmack sind. Bei ihren Wanderungen sollen sie ein Gerassel, wie ein Regiment Kürassiere machen. Sie laufen sehr schnell und quer. Ihre Wanderung dauert bei regnerigem Wetter zehn Tage, ja wohl zwei Monat. Der Bau ihres gewölbten Schildes dient dazu, daß sie das Wasser unter demselben erhalten, daher, ohne ins Wasser zu gehen, atmen können. Man sagt, daß sie, angegriffen, die Scheeren fahren lassen.

Die *Ulea una*, oder eigentlich *Ussa una* ist eine ähnliche Krabbe Brasiliens, die sich nur durch sehr behaarte Füße unterscheidet; ihr Schild ist herzförmig, etwa vier Zoll breit und auch dies Thier zur rechten Zeit höchst schmackhaft.

### XXXVII. Grapsus.

Die Schale ist vorn etwas breiter wie hinten, und die mittleren Fühler stehen tiefer als das Stirnschild.

#### *Grapsus varius.*

#### *Cancer marmoratus.*

Fast viereckig, graugelblich, mit grün, blau und weiß gemischt, und vielen feinen rothbraunen Strichen und Punkten besetzt. An der Basis des Stirnschildes vier flache quergehende Erhabenheiten, und am vorderen Ende jedes Seitenrandes drei Bähne.

Herbst XX, Fig. 114.

An den europäischen Küsten, unter Steinen. Sie klettern aber auch auf die Bäume am Ufer, und verbergen sich unter deren Rinde, auch schwimmen sie auf der Oberfläche des Wassers und machen oft Excursionen aufs Land. Es sind schwache, furchtlose Thiere, die bei der geringsten Gefahr fliehen, und alle mögliche Künste anzuwenden scheinen, um sich sicher zu stellen. Bald stehen sie plötzlich still, drohen mit der Scheere, ziehen sich

wieder zusammen, oder eilen plötzlich in einen Schlupfwinkel. Sie laufen immer nur seitwärts, bald auf der rechten bald auf der linken Seite.

### XXXVIII. *Parthenope*.

Die Schale eiförmig-dreiseitig, höckerig, nach vorn spitz zugehend. Die Füße kurz, die Scheeren sehr groß, horizontal, und bis zur Handwurzel senkrecht auf der Axe des Körpers stehend, sich dann auf sich selbst zurückschlagend, mit im Winkel gebogenen Fingern.

#### *Parthenope horrida*.

Mit bedornter, knotiger Schale, sehr großen Scheeren mit drei dicken Knoten und krummen Fingern.

*Seba* III, T. XIX, Fig. 16, 17. — *Herbst* XIV, 88.

Ein häßliches, spinnenartig ausschendes Thier, oft bis an einen halben Fuß breit, und über und über mit Sertularien und anderen Seeprodukten, wie mit Moos erwachsen. Die Fischer mögen diesen Krebs nicht.

### XXXIX. *Seespinnen*.

#### *Maja*.

Das Schild eiförmig, höckerig, kurz bedornt, die Füße ziemlich alle von gleicher Länge gegen einander, jedoch von hinten nach vorn an Größe zunehmend.

#### *Die Spinnen-Krabbe*.

#### *Maja Squinado*.

*Inachus cornutus* F. Fr. Araignée de mèr. It. Granzone.

Die Schale etwa sechs Zoll lang und vier breit, die Stirn in zwei schnabelförmige Spitzen ausgehend.

*Leach* XVIII. — *Herbst* XIV, Fig. 84, 85.

Gemein an den Küsten um Europa, und schwachhaft. Die Fischer sollen ihn an einem Faden aufgehängt ins Meer hinablassen, um sich seiner zum Fang zu bedienen. Hat an 10,000 Stück Eier, die das Weibchen als eine Masse braunrothen Rosens unter dem Schwanz trägt.

## XL. M i g r a n e.

### Calappa.

Die Schale halbrund; die Füße können sich unter einem Vorprung derselben verbergen; die Scheeren sind dreieckig, zusammengedrückt, und kammartig gezähnt.

### Calappa granulata.

Fr. Crabe honteux. Coq de mer.

Mit röthlichem, mit zwei tiefen Furchen und carminrothen Flecken besetztem Schilde. Die Seitenränder gezähnt. Die Scheeren ebenfalls höckerig, ihr Kamm mit sieben Zähnen. Im Mittelmeer.

Herbst XII, Fig. 75, 76.

Diese Krabben zeigen die Eigenthümlichkeit mancher Käfer, z. B. der Speckkäfer, Pillenkäfer u. a. durch dichtes Einziehen aller Glieder, die dann auch genau anschließen, sich wie tot zu stellen, und umherwerfen zu lassen. Die gegenwärtige Calappe rollt dann wie ein lebloser Ball im Wasser. Merkwürdig ist, daß sich diese Sonderbarkeit in vielen Thierklassen, unter Säugthieren, Vögeln u. s. w. findet.

## XLI. Dromia.

Die Schale ist rundlich, gewölbt, und mit braunschwarzer Wolle überzogen. Die zwei hinteren Fußpaare stehen höher, auf dem Rücken eingefügt, jeder Fuß in eine doppelte Krallle endigend.

### Dromia Rumphii.

It. Facchino.

Mit fünf Zähnen an jedem Seitenrand und drei in der Mitte.

Herbst XVIII, 103.

Im ganzen Ocean, den nordischen ausgenommen. Ergreift mit ihren vier Hintersüßen Muschelschalen und andere Seekörper und trägt sie über sich, wie zum Schutz; doch sagt Risso, daß umgekehrt sich nur die Alcyonien u. dgl. an sie hesteten, da sie ein höchst trüges, kaum bewegliches Thier seyn.



# Spezielle Zoologie.

---

Arachniden.

---

3287

160

---

## Siebente Klasse.

---

### Arachniden.

351.

Die Arachniden sind eine der merkwürdigsten, interessantesten Klassen des Thierreiches.

Lamark trennte sie unter diesem Namen von der großen Abtheilung der gegliederten Thiere, oder der ehemaligen Klasse der Insekten, und gab als Definition den Mangel einer Metamorphose, nicht gesonderten Kopf, Abwesenheit der Flügel und Fühler, und eine Zahl von acht bis zehn, also mehr als sechs Füßen, an. Auch sollen sich diese Thiere mehrmals im Leben begatten, was die eigentlichen Insekten nicht können; und sie sollten durch Tracheen atmen, welches bei den Thieren der vorhergehenden Klasse gleichfalls nicht statt findet. Obwohl nun diese Bestimmungen späterhin einige kleine Einschränkungen erfahren haben, so ist die Klasse selbst doch richtig begründet.

352.

Sie unterscheiden sich nämlich in den angegebenen Punkten so wie in ihrer ganzen Conformation und Wesen gar sehr von den eigentlichen Insekten, wenn schon auch hie und da zu ihnen einzelne Annäherungen statt finden. Denn wenn wir auch die sonderbare, etwas problematische Meinung von Duges, daß

die Abbildungen in dem großen Werke über Egypten\*) Spinnen zeigten, welche mit vier Flügelspuren versehen seyen, nicht weiter berühren wollen, so gibt es doch allerdings kleine Springspinnen, den Ameisen nicht unähnlich, und anderseits in Bernstein eingeschlossene, mit einem vom Rumpfe gesonderten Kopf u. s. w., welche immer auf Uebergänge zwischen beiden Klassen deuten; nur überwiegt die Verwandtschaft mit den Crustaceen noch mehr, denn die Skorpione sind offenbar den langschwänzigen Krebsen am meisten verwandt, die Spinnen den kurzschwänzigen und zum Theil den Entomostraken, und in der Lebensweise findet sich zwischen den Milben und den Lernäen mehr als eine Uebereinstimmung. Was sie aber am vorzüglichsten zu einer eigenen Gruppe macht, ist Folgendes:

Erstlich sind es, im Gegensatz zu den vorigen, Landthiere, denn selbst die paar anomalen Wasserspinnen und Milben verläugnen ihren Ursprung nicht. Alle andere leben in der trocknen Luft, ziehen sich aber gern in dunkle Spalten, Räthen und andere Schlupfwinkel zurück, selbst in der Nähe der Menschen, wo durch sie ihm zu sehr unangenehmem Ungleicher werden, denn so bezeichnet man Thiere, die sich dahin sezen, wo wir es nicht gern sehen, indem sie uns durch ihre Gegenwart belästigen, unsere Sachen verunreinigen oder wohl gar verzehren, und uns durch Stich und Biß verleihen. Rechnet man nun noch hiezu, daß gerade diese Arachniden oft unerwartet, geräuschlos aus ihren Schlupfwinkeln hervorgelaufen kommen, uns durch ihre schwarze, mißfarbige Gestalt, mit dickem falten Bauch und langen, haarigen Beinen, erschrecken, durch ihr grausiges Ausschen reizbaren Personen Schauder, oder durch das plötzliche wie wüthige Dahinrennen über die Hand, bei so leicht zerquetschbarem Leib, Ekel erwecken, so läßt sich entschuldigen, warum der Mensch vor ihrem Anlauf zurückbebt, und aus Idiosyukrasie sie nicht einmal anfassen mag \*\*).

---

\*) Grand ouvrage sur l'Égypte, *Arachnides* pl. VIII, Fig 9.

\*\*) Man hat eine Menge Anekdoten von den übeln Folgen, welche ein beabsichtigtes Erschrecken durch Spinnen auf manche Personen ausgeübt hat. Zu Ende des Jahres 1824 wurde in der Zeitung berichtet, daß eine junge Engländerin an den Folgen des Schreckens gestorben sey, da ihr eine lebendige Spinne ins Gesicht

Sweitens sind es auch, sowohl gegen die vorigen, als im Vergleich zu vielen Insekten, gelstig höher stehende Thiere. Sie zeigen eine zarte, oft ausnehmend weit getriebene Gliederung der Organe, lange, schlanke, höchst reizbare Extremitäten, sonderbare Entwicklungen der Augen, der Haare (die bei einigen sogar beweglich in ihre Haut eingelenkt sind), und zumal der Säfte zu Gift, Giften und Spinnmaterie, und vor allen die Spinnen jene ausgezeichnete Industrie, die sich in diesen kleinen Thieren, als wenn sie mit menschlichem Verstand begabt wären, offenbart. Nicht minder scharf sind ihre Sinne, und zwar auf eigenthümliche Weise. Als meist nächtliche, oder doch im Dunkeln sich aufhaltende Thiere zeigen sie die Feinheiten der Wahrnehmung, wie wir sie bei den nächtlichen Raubthieren der höheren Klassen gefunden haben, ja sie erlauben mit diesen selbst näher Vergleichung. Wie die Fledermäuse in Folge ihres durch geringen Lichtreiz weniger abgehärteten Hautsystems eine feinere Empfindung in ihren peripherischen Theilen entwickeln, so zeigen sich auch die Spinnen gegen die Witterungsverhältnisse empfindlicher, sie gleichen ihnen in der schmutzigbraunen, widerlichen Färbung, der häßlich deformen Gestalt, und dem eckelhaftplumpen Leibe. Scheinbar, Tage hindurch unbeweglich, gehen sie doch plötzlich zur reizbarsten Lebendigkeit über, und zeigen sich hitzig, ja wuthig und grausam. Betrachtet man sie anatomisch nächsthin, so kann man die Arachniden, wie die Krebse, kopflos nennen, da das die Sinnesorgane tragende kleine Kopfstück in das Bruststück wie eingekleilt, und mit ihm fast in Eins verschmolzen erscheint. So könnte sich denn wohl erklären lassen, warum ihr Anblick Entsezen erregt, da ein solches auch in uns hervorgerufen werden müste, wenn wir einen kopflos auf uns zurennenden Menschen oder Thier erblickten: sche dagegen die Fantasie in einer Spinne vielmehr nur einen dahinslaufenden Kopf, gleichsam ohne Rumpf, so wäre ein solcher Anblick nicht minder grausig. Und auch für diese Ansicht lassen sich, unerwartet, Gründe aufführen. Man darf nur das ganze Bruststück der Spinne dafür erklären.

---

geworfen. Ich erinnere mich, einst ein kleines Kind auf dem Schoße seiner Mutter in Convulsionen verfallen gesehen zu haben, weil man ihm eine von Wachs verfertigte Spinne vorhielt.

Um einen Kopf gestellte Extremitäten finden wir auch bei den Seipien, und man möchte, ihrem Zwecke nach, selbst die Arme des Menschen mehr zum Kopf als zum Rumpf gehörig betrachten; der Wirkungskreis des durch Willen und Denkraft Thätigen im Thier ist keineswegs immer auf die bloße enge Schädelhöhle beschränkt, sondern dehnt sich so weit aus, als der Bereich seiner Werkzeuge geht. Ein, zumal kugelig gestalteter Theil des Thieres, der voran steht, und die Organe der Sinne und der Ernährung enthält, kann also der Bedeutung nach so gut als Kopf gelten, wie die Rüsselspitze des Elefanten, oder das Ende eines Greifschwanzes, als Finger\*).

353.

Der herkömmlichen Ansicht nach wäre also bei den Arachniden der Kopf mit dem Bruststück vereinigt und heißt Cephalothorax. Meist sieht man den als Kopf angenommenen Theil wie ein keilförmiges Dreieck dem Rücken vorn eingeschoben. Bei den Skorpionen aber unterscheidet er sich bestimmt als ein Vordertheil, und gerade dieses, hier unbezweifelt als ganzer Kopf geltende Stück ist es, was auch bei der Spinne den sogenannten Cephalothorax bildet. Der Bauch ist entweder durch einen kurzen Stiel von dem Thorax getrennt, oder seiner ganzen Breite nach mit ihm verbunden.

Der Kopf trägt mehrere, verschiedentlich gestaltete Punktaugen, deren Zahl von zwei bis zwölf seyn kann. Oft stehen zwei auf dem Scheitel, die anderen seitlich, wie bei den Skorpionen;

---

\*) Ich habe den Gedanken, die Spinne als einen bloßen Kopf mit Beinen, und daranhängenden Bauch, im poetischen Sinne zu betrachten, schon in meinem System der Natur (S. 557) ausgesprochen. Jetzt kommt Herr Düges in einer schönen Abhandlung über die Arachniden in den neuen Annales des sciences naturelles (Sept. 1856, S. 164) auf eine ähnliche Ansicht, und zwar von andrer, nämlich anatomischer Seite her, indem er darauf hinweist, daß Herz und Respirationsorgane bei der Spinne in ihrem Bauchstücke liegen, folglich der gesamte Cephalothorax als der Kopf betrachtet werden müsse. Man würde die Sache als ausgemacht ansehen können, wenn sie nicht ein zu starkes Paradoxon gegen die Analogie der übrigen Insekten bildete.

bei den Spinnen stehen sie mehr nach vorn, meist in zwei Reihen, aber es gibt auch eine sonderbare Stellung derselben auf einem Träger bei ihnen. In der Nacht leuchten sie bei mehreren, wie bei den Katzen (ob durch bloßen Lichtreflex, ist schwer auszumachen), man hat aber noch keine Versuche, in wie weit sie damit deutlich sehen können, was man leicht ermitteln könnte, wenn man sie einer großen Spinne, etwa durch Betupfen mit einem schwarzen Färbiss, blendete.

Vorn, zum Theil neben den Augen, finden sich bei den Arachniden die kleinen Fühler, welche man früher verkannt, und ihnen deshalb fälschlich abgesprochen hatte. Sie haben nämlich die Gestalt kleiner, zweigliederiger, ein- oder zweifingeriger Scheeren, deren Finger sich senkrecht, von oben nach unten, bewegen. Sie entsprechen den Zwischenfühlern der Krebse, und können daher mit Recht den Namen Fühlerscheeren verdienen. Man hat sie nach Latreille's Meinung, unrichtig genannt. Sie fehlen den Spinnen. Die eigentlichen Kinnbacken oder Mandibeln sind 2 — 4gliederig, mit Einlenkung einer Klaue; ein Paar Kinnladen, oder Maxillen sind blattartig, und erscheinen als die Basis zweier kleiner Füße oder vielmehr Taster (Palpen). Der ganze Bau erinnert an den der moluskischen Krebse unter den Entomostraken. Über und unter jenen Kauwerkzeugen, in der Mitte, liegt eine Oberlippe und eine Unterlippe. Jene Maxillentaster, zumal bei den Spinnen sehr ausgebildet, vertreten oft gleichfalls die Funktion der Fühler. Der Schlund liegt vor einem Vorsprung des Brustbeines, bald als Unterlippe bald als Zunge betrachtet. Die vier Fußpaare sind in einem Halbkreise unten am Cephalothorax befestigt, und gleichen in der Zahl der Stücke denen der anderen Gliederthiere, doch haben sie eine etwas abweichende Phystionomie. Sie endigen gewöhnlich in zwei Haken, ja oft noch einen dritten dazwischen.

Der Bauch ist theils gestielt, theils unmittelbar angeheftet, theils, bei den Phalangien und Milben, ganz mit dem Vorderstück zu einer Kugel verschmolzen: immer aber bemerkst man noch die Gliederungen oder Ringe derselben, wie sie der Skorpion am auffallendsten zeigt. Er öffnet sich hinten in den After und hat meist noch andere Ausführungsorgane.

Das Nervensystem der Arachniden ist von dem der

Krebse und der eigentlichen Insekten gar sehr verschieden. Mit Ausnahme der langgestreckten Skorpione, welche einige Ganglien mehr besitzen, haben die Arachniden nur eine geringere Zahl als jene. Bei den Spinnen bemerkt man ein wahres, bedeutendes Gehirn, als den Verein dreier Ganglien, in der Mitte des vorderen Stückes, von welchem aus sich Fäden in die Augen und Beine verlängern, und man kann dennoch auch wegen dieser Anordnung das Kopfbruststück als einen gesammten Kopf der Spinnen u. a. ansprechen.

Erst im Bauchtheil derselben und demselben, etwas breiteren vorderen der Skorpione, befinden sich die Respirationsorgane. Es sind entweder luftaufnehmende Säcke, oder Lungen (welche man, zusammenfallen und alsdann blätterig-faltig erscheinend, irrig für Kiemen gehalten hat), oder geradezu Tracheen wie bei den Insekten. Unten öffnen sie sich in Stigmen oder Spaltöffnungen.

Das Herz ist ein langer einfacher Kanal mit einer weißlichen Flüssigkeit gefüllt, der seltlich einige Neste abschickt. Bei den Spinnen sieht man es deutlich pulsiren.

Die Muskeln sind im Innern des Leibes sehr zahlreich und kräftig; sie erscheinen in der Gestalt von einzelnen Fasern.

Der Schlund hat meist einige seitliche Blindsäcke, und verlängert sich in einen schlanken Magen bis zum Darm und After. Neben diesem liegen secernirende Säckchen, so wie auch vorw. mehrtheils Speichelgefäß. Auch findet sich ein Fettkörper.

Die secernirenden Säcke sind überhaupt hier sehr zahlreich und bedeutend, wie bei den einzelnen Ordnungen des Weiteren zu sehen ist.

Die Geschlechtstheile, welche stets in zwei Individuen vertheilt sind, liegen eigentlich nur am vorderen Bauchende. Zwei Ruten bei den Männchen, die heraustreten können, und zwei innerliche Bulben nebst Eierstöcken bei den Weibchen. Indes haben die männlichen Spinnen noch ein ganz eigenes lösselförmiges Organ am Ende ihrer Taster, welches bei der Begegnung eine Rolle spielt.

Sie häuten sich nach Art der Raupen und Krebse, und werden erst nach der vierten und fünften Häutung zur Fortpflanzung

fähig. Sie erleiden also früher keine Verwandlung, nur sollen die Milben mit sechs Füßen geboren werden, und das vierte Haar erst mit den späteren Häutungen erhalten. Sie nähren sich fast alle von thierischem Raub, je nach ihrer Anstelligkeit und Stärke; die kleinsten zum Theil mikroskopischen Milben mehr durch Saugen von Säften, und parasitisch auf lebendigen Thieren sich aufhaltend. Doch findet man Arachniden auch auf anderen animalischen wie vegetabilischen Substanzen, Obst, Mehl, Käse u. dgl. Einige leben auf Pflanzen, und die größten, kann man sagen, zwischen Steinen oder in der Erde.

Die wenigsten halten paarweise zusammen: die meisten suchen sich nur zur Zeit der Begattung auf und fliehen außerdem einander.

Man schlägt die Anzahl der bis jetzt bekannten Thiere dieser Klasse schon auf dreitausend an: an Spinnen besitzt Deutschland allein über zweihundert Arten.

#### 534.

Bei der weiteren Eintheilung der Arachniden kommt es doch wohl mehr auf ihren gesammten Charakter als auf ein einzelnes Organ an; die Gruppierung nach der bloßen Respirationsweise in Lungen- und Luströhren-Arachniden, wie sie Lamarck und Latreille annehmen, ist daher nicht ganz genügend, wenn sie verwandte Formen von einander trennt. Um besten ordnen sie sich auf folgende Weise:

I. Krebsähnliche; mit harter Haut, Scheerentastern und vielen Augen. Der Bauch in seiner ganzen Breite an das Kopfbruststück gehetzt. Skorpione.

Sie sind reizbar, zu Zeiten lebhaft, kühn und räuberisch. Ihre vorderen Extremitäten gebrauchen sie wie Hände. Der Leib ist meist lang und gegliedert, sie haben bis zwölf Augen. Unter ihnen die größten dieser Klasse.

Erste Familie. Eigentliche Skorpione.

Der Bauch ist von der Breite des Bruststücks und geht

in einen schmalen gegliederten Schwanz über. Unten an der Brust zwei kammförmige Organe. Atmen durch Lungen.

### Szweite Familie. Asterskorpione.

Der Bauch ist ungeschwänzt, nach vorn verschmälert, und in das Bruststück übergehend. Scheerentaster. Atmen durch Luftröhren. Keine Kämme.

### Dritte Familie. Galeoden.

Der Bauch ungeschwänzt; nur einfache Taster. Große Kinnbacken. Atmen durch Luftröhren.

### Vierte Familie. Spinnenskorpione.

Der Bauch durch eine leichte Verengerung von dem Bruststück getrennt. Atmen durch Lungen.

II. Krabbenähnliche; mit weicher Haut, kleinen Tastern, der Bauch mittels eines Stiels an das Bruststück geheftet. Spinnwarzen beim Aster. Spinnen.

Sie sind reizbar, sehr empfindlich, schnell und räuberisch, dabei reich an Instinkten und Kunstrieben des Fleisches. Ihr Charakter scheint Geduld, Misstrauen und Grausamkeit. Ihr Bauch ist weich, ihre Füße sind im Kreise gestellt, und sie vervollständigen Gewebe, in denen sie wohnen. Atmen durch Lungenfäcke und zum Theil durch Luftröhren.

### Erste Familie. Würgspinnen.

Leben in Erdlöchern und haben nur vier Spinnwarzen, mit denen sie Röhren weben.

### Szweite Familie. Eigentliche Spinnen.

Leben theils in der Erde, theils auf derselben, theils auf Pflanzen. Haben sechs Spinnwarzen und spinnen Fäden, mit denen sie, aber nicht alle, Gewebe bilden. Die Männchen haben im letzten Tastergliede ein Begattungsorgan.

III. Asselähnliche; mit einem dännen, bloß aus einigen Segmenten bestehenden Leib, und acht Lauffüßen. Wasserthiere. *Pycnogoniden*.

Sie atmen durch Luftröhren, und leben, meist parasitisch, auf Seethieren.

IV. Schlangenähnliche; mit Taster scheeren; der Bauch mit dem Vordertheile verschmolzen. *Astertspinnen*.

Atmen durch Luftröhren und haben nur zwei Augen.

V. Parasitische; Brust und Bauch in eins verschmolzen, eigentlich kein Kopf mehr; bald Scheeren-Kinnbacken, bald ein bloßer Saugrüssel. Sehr klein. Milben.

Sie leben theils auf Pflanzen, theils aber auch parasitisch auf Land-Thieren aller Klassen, denen sie Blut und Gäste aussaugen. Viele sind mikroskopisch.

---

## Übersicht der Geschlechter.

### I. PEDIPALPI.

a. *Scorpiones*. Skorpione. Der Bauch in einen gegliederten Schwanz mit Giftstachel ausgehend. Zwei Kämme unten. Scheerentaster.

1. *Scorpio*. Sechs Augen.
2. *Buthus*. Acht Augen.
3. *Centrurus*. Zehn Augen.
4. *Androctonus*. Zwölf Augen.

b. *Pseudoscorpiones*. Asterskorpione. Ungeschwänzt; keine Kämme; Scheerentaster.

5. *Chelifer*. Bücherskorpion. Zwei Augen.
6. *Obisium*. Halbskorpion. Vier Augen.

- e. *Solifugae*. *Solpugen*. Ungeschwänzt; ungestielter Bauch. Einfache Taster.
- 7. *Galeodes*. Große Scheerenspinner und fußähnliche Taster.
- d. *Thelyphoni*. Spinnenskorpione. Der Bauch gestielt, d. h. durch eine Verengerung an das Bruststück gehestet.
- 8. *Phrynus*. Platt; die Taster in eine Klaue endigend.
- 9. *Thelyphonus*. Die Taster in zwei verbundene Finger endigend.

## II. ARANEIDES.

- a. *Mygalides*. Tapezierspinnen. Vier Spinnwarzen; vier Lungen; vier Luftlöcher. Acht Augen.
- 10. *Theraphosa*. Würgspinnne. Die zwei inneren und unteren Spinnwarzen kurz. Acht zusammengehäufte Augen. Das vierte Fußpaar das längste, das dritte das kürzeste.
- 11. *Cteniza*. Das obere Ende der Kinnbacken mit einer Reihe g. erster, an ihrer Basis beweglicher Dornen besetzt.
- 12. *Oletera*. Taster an eine Ausbreitung der Maxillen eingefügt.
- b. *Aranei*. Eigentliche Spinnen. Sechs Spinnwarzen. Sechs bis acht Augen. Nur ein Paar Lungen und Luftlöcher.
- α. *WolfsSpinnen*. Der Cephalothorax vorn verschmäler, mit einem Längskiel. Die Augen bilden ein krummliniges Dreieck oder Oval, oder ein Biereck, dessen Vorderseite schmäler wie der Kopf ist. Kinnbacken gerade, abgerundet.
- 13. *Lycosa*. Augen in drei Querreihen im Biereck, die beiden hinteren weit zurück, auf einer kleinen Erhöhung. Das vierte Fußpaar das längste; die Kinnbacken am inneren Ende schief abgestutzt.
- 14. *Dolomedes*. Augen in drei Querreihen, 4, 2, 2, als Biereck breiter wie lang, die zwei hinteren auf einer Erhöhung. Die zwei mittleren enger als die vier dritten. Das vierte Fußpaar das längste.

15. **Oxyopes.** Augen in vier Querreihen, 2, 2, 2, 2. Die beiden hintersten klein und nahe beisammen, die zweiten am weitesten von einander. Das erste Fußpaar das längste, das dritte das kürzeste.  
β. **Zellesspinnen.** Sechs Augen. Zu seidenen Säcken wohnend.
16. **Segestria.** Vier Augen vorn, zwei dahinter. Das erste und zweite Fußpaar das längste, das dritte das kürzeste.  
γ. **Röhrenspinnen.** Die Füße stark, die Spinnenwarzen cylindrisch, hinten in einen Büschel vereinigt. Bauen seidenartige Röhren.
17. **Drassus.** Augen in zwei krummen Reihen, 4, 4, die hintere länger. Kinnbacken stark, hervorspringend, unten gezähnt. Die vierten Füße die längsten. Beine und erstes Tarsenglied mit Stacheln bewaffnet.
18. **Clubiona.** Die vordere Augenreihe fast gerade, die beiden Endaugen weit von einander. Spinnwarzen von gleicher Länge.  
δ. **Trichterspinnen.** Die vier vorderen Augen in einer nach hinten gekrümmten Bogenlinie. Die beiden oberen Spinnwarzen länger.
19. **Tegeneria.** Beide Augenreihen in einem schwachen Bogen.
20. **Argyronecta.** Vordere Augenreihe geradlinig; beider Endaugen einander sehr nahe stehend, auf einer Erhabenheit.  
ε. **Webspinnen.** Die äußeren Spinnwarzen segelförmig, wenig hervorstehend, convergirend, in ein Röbchen gestellt. Füße schlank, das erste und das letzte Fußpaar das längste. Der Bauch weich, groß, mehr gefärbt. Weben unregelmäßige Netze in Fäden nach allen Richtungen.
21. **Theridium.** Acht Augen, die vier mittleren im Quadrat, die beiden vorderen derselben auf einer Erhabenheit. Zwei auf jeder Seite, ebenfalls auf gemeinschaftlichem Höcker. Cephalothorax fast dreieckig, Bauch kugelig.
22. **Pholeus.** Augen acht, alle auf einem Höcker, in drei Gruppen. Zederselbs eine aus einem Dreieck, die mittlere aus zwei quer stehenden.

23. *Linyphia*. Vier Augen in der Mitte, als Trapezium, die Hinterseite breiter und deren Augen viel größer. Die vier anderen paarweise gruppiert, auf jeder Seite ein schiefstehendes Paar. Das dritte Fußpaar das kürzeste.

ζ. *Radspinnen*. Die äußeren Spinnwarzen kegelförmig convergirend, in ein Röschen gestellt. Das erste und zweite Fußpaar die längsten. Bauch dick, weich und buntfarbig. Weben Nähe in spiralconcentrischen Kreisen, durch Räden getheilt, in deren Mitte sie meist in verkehrter Stellung, sitzen.

24. *Tetragnatha*. Die Augen vier und vier, in zwei fast parallelen Reihen. Kinnladen lang und schmal, Kinnbacken sehr lang.

25. *Epeïra*. Die vier mittleren Augen im Quadrat, die seitlichen sich fast einander berührend. Kinnbacken von der Basis an erweitert.

26. *Nephila*. Ebenso, die seitlichen Augen auf Höckern.

27. *Acrosoma*. Augen wie zuvor, der Leib mit spühen großen Dornen.

28. *Gasteracantha*. Augen wie zuvor, die seitlichen Paare einander berührend, aber weit entfernt von den mittleren; der Bauch querbreit, bedornt, oft viel breiter als das Bruststück.

η. *Krabbenspinnen*. Der Körper platt, krabbenförmig, der Bauch groß, die vier vorderen Füße die längsten, die Kinnbacken klein, der Haken quer eingeschlagen. Laufen seitwärts, rückwärts und vorwärts, sitzen aber meist still, auf Pflanzen, machen kein Gewebe, sondern schießen nur einzelne Fäden.

29. *Micrommata*. Augen vier zu vier, in zwei Querreihen, die vordere nach vorn gebogen, die hintere länger, nach hinten gebogen. Kinnbacken gerade, parallel. Zweites Fußpaar das längste.

30. *Philodromus*. Augen vier zu vier, in zwei Querreihen, beide nach vorn gebogen, die hintere breiter; die seitlichen auf Höckern. Kinnladen auf die Unterlippe geneigt. Kinnbacken verlängert cylindrisch. Alle Füße ziemlich gleichlang.

31. *Thomisus*. Augen wie zuvor, aber die seitlichen auf einem Höcker. Kinnbacken keilförmig, klein. Die vier hinteren Füße auffallend kürzer als die vorderen.

32. *Hüpffspinnen*. Bruststück fast vierseitig, oben flach, seitlich gerad abfallend. Augen ein großes Quadrat bildend, mehr lang als breit, die vorderen mittleren sehr groß. Füße kurz, zum Laufen und Springen. Machen keine Gewebe.

32. *Salticus*. Vorn vier Augen in gebogener Querreihe, die zwei mittleren viel größer; die hinteren an den Seitenrändern, weit zurück. Nur zwei Krallen an den Tastern.

### III. PYCNOGONIDES.

33. *Pyenogonum*. Rumpf cylindrisch, aus vier Segmenten, hinten und vorn in ein Rohr ausgehend. Acht Lauffüße, die Weibchen mit noch zwei falschen.

### IV. PHALANGIDES.

34. *Phalangium*. Weberknecht. Fadenförmige Fühler; Tasterscheeren. Zwei Augen auf dem Scheitel. Lange dünne Beine.

35. *Gonoleptes*. Afterspinne. Ebenso; die Taster doppig, die letzten Glieder eiförmig, mit starker Krall am Ende.

36. *Trogulus*. Platt; das vordere Körperende ein Deckschild bildend, in dessen Vertiefung die Tasterscheeren.

### V. ACARIDES.

a. *Acarides*. Milben. Mit Kinnbacken.

a. *Trombidici*. Zwei Augen, seitlich, vorn. Raubtaster. Die Hüften zusammenstoßend. (Pflanzenmilben.)

37. *Trombidium*. Körper noch deutlich getheilt, aufgetrieben. Zwei gestielte Augen. Taster groß und frei. Kinnbacken mit Krallen. Tasterfüße und ein Schnabel.

38. *Erythraeus*. Ebenso; aber ungeheilter Körper und ungestielte Augen. Lange Lauffüße mit Krallen.

39. *Tetranychus*. Körper ungetheilt; statt der Kinnbacken nur Wülste; Raubtaster kurz, auf dem Schnabel aufliegend. Webfüße.
40. *Raphignatus*. Wie zuvor, Raubtaster ohne Krallen.
  - β. *Hydrachnei*. Körper kugelrund. Zwei Augen vorn, oben. Hüften abstehend, Ankertaster, Kudersüße. (Wasermilben.)
41. *Atax*. Lange Taster; Kinnbacken mit Krallen.
42. *Arrenurus*. Kurze, feulenförmige Taster; Kinnbacken wie zuvor. Körper gepanzert, beim Männchen geschwänzt.
43. *Limnochares*. Mund aus Blättern gebildet, die einen Saugrüssel machen; Taster einfach.
44. *Hydrachna*. Mund ebenso; Taster mit einem beweglichen Anhänger am Ende.
  - γ. *Gamasei*. Platt. Keine Augen. Füße mit Klauen und einer Karunkel. (Schmarotzermilben.)
45. *Dermanyssus*. Kinnbacken der Männchen scheerenförmig, Kralle sehr lang, bei den Weibchen säbelförmig, Lippe spitz.
46. *Gamasus*. Kinnbacken scheerenförmig, mit gezähnelten Fingern. Lippe dreispaltig. Der Körper trägt ein Schild.
47. *Pteroptas*. Kinnbacken undeutlich, auf dem Körper ein rautenförmiges lederiges Schild.
  - δ. *Ixodei*. Körper lederig, mit einem Hornschild beim Schnabel bedeckt. Taster klappig, den Schnabel einschließend. Keine Augen. Füße mit Klauen und Karunkel.
48. *Ixodes*. Holzbock.
  - ε. *Sarcoptei*. Keine Augen. Kinnbacken scheerenförmig, Taster klein, Füße mit Karunkel.
49. *Sarcoptes*. Kräzmilbe. Lippe und Taster durch die Kinnlappen bedeckt, dem Kopf ähnlich. Glockenförmige Fußkarunkeln.
50. *Acarus*. Käsemilbe. Lippe und Taster wie zuvor. Der Körper zwischen dem zweiten und dritten Fußpaar mit einer Furche umgeben. Spitzige Fußkarunkeln.

b. *Ricinei*. Nur zwei lanzenförmige Blätter, nebst Zunge, als Saugrüssel.

a. *Bdellei*. Körper länglich, aufgetrieben; Schnabel kopfähnlich. Augen deutlich, Kinnbacken klauen- oder scheerenförmig.

51. *Bdella*. Vier Augen. Taster lang, eingeknickt. Saugrüssel wie ein kegelförmiger Schnabel.

52. *Seirus*. Zwei Augen, Taster krumm, sickelförmig. Beiderseits eine lange Querborste am Bauche.

β. *Oribatei*. Undeutliche Augen. Körper gepanzert, mit ein bis zwei Furchen umgeben. Taster spindelförmig. Fühlerscheeren.

53. *Oribates*. Der Vorderkörper in eine Schnauze vorstehend. Leib ungetheilt, wie mit Seitenflügeln versehen. Beine kurz.

54. *Damaeus*. Bruststück und Bauch getrennt, wie bei einer Spinne. Beine knotig, lang.

55. *Cheyletus*. Taster dick, armsförmig, in eine Sichel endigend.

---

### Literatur der Arachniden.

J. F. W. Herbst Natursystem ungestügelter Insekten. 4 Hefte m. K. 4. Berlin 1797—1800.

E. W. Hahn, die Arachniden. Nürnberg seit 1832; 8. Fortgesetzt von E. L. Koch bis 4. Band. 1837.

Panzer's Insektenfauna, fortgesetzt von Herrich — Schäfer. Die neueren Hefte enthalten Arachniden, von Koch beschrieben. Diese auch unter dem Titel:

Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden, von E. L. Koch, herausgegeben von Dr. Herrich — Schäffer seit 1835.

Herrmann Mémoire aptérologique. Strasburg 1801, fol.

C. Walckenaer tableau des Aranéides. Paris 1805.

*Dess.* Histoire des Aranéides ib. — Sollen beide nicht mehr im Handel seyn.

*C. J. Sundevall* Conspectus Arachnidum. Diss. 1833. Londini Gothorum. 8.

*F. Dugès*, Recherches sur l'ordre des Acariens. Paris 1834.

*Ehrenberg* Symbolae physicae IV Animalia evertebrata Dec. I. Berol 1828, 1831, fol. Zumal Skorpione.

Und noch viele einzelne Abhandlungen, z. B. in von *Lev Düfour* in den Annales des sciences naturelles, von *Walkenaer* in den Annales de la Société entomologique, von *Lukas* in *Guerin's Magazin de Zoologie* von *Reuß* in den Wetterauer Annalen, *Eichwald* bei der Breslauer Versammlung der Naturforscher, *Kollar* in *Pohl's Reise von Brasilien*, *Perty* in *Spix und Martius Reise (delectus animalium articulatorum 1834)*, *Savigny* in dem großen Werke über Aegypten u. s. w.

Für ihre Anatomie zumal:

*G. R. Treviranus* über den inneren Bau der Arachniden. Nürnberg 1812, 4. m. K.

*M. Herold*, de generatione Aranearium Marb. 1824, fol.

*P. S. Latreille* im IV. Band von *Cuvier régne animal* — deutsch v. *Voigt*, S. 317 u. f.

---

## Erste Ordnung.

### Skorpionähnliche Thiere.

Sie lassen sich wieder in vier Unterordnungen theilen, die zwar dem ersten Anschein nach sehr verschiedenartige, bei genauerer Betrachtung aber doch verwandte Geschöpfe zeigen. Ihr allgemeiner Charakter beruht auf der niederen Stellung ihrer Lebensweise. Sie sind nämlich unter Arachniden das, was die Wanzen und ähnliches Ungeziefer unter den eigentlichen

Insetten sind: platten, lichtscheue, im Dunkeln an der Erde sich aufhaltende Thiere, durch Biß und Stich lästig, ja gefährlich, und ohne weitere Industrie oder geistige Entwicklung. Denn in diesem Sinne stehen die eigentlichen Spinnen weit höher, nehmen auch ihren Wohnort in höheren freieren Regionen, sind bunter gefärbt, und gehen bis zu dem Aufenthalt auf Pflanzen. Auch die Phalangen zeigen sich ausgebildeter in so fern manche hochbeinig, den Leib frei in der Luft schwebend, einherschreiten, und nur die Milben fallen jeder zurück, doch sind dies meist thierische Parasiten, also ebenfalls keine Erdbewohner. Was auch hierbei für einzelne Abweichungen vorkommen mögen, die mehr langgestreckte, einfach gegliederte Organisation der Skorpione, die an die der Crustaceen erinnert, entscheidet für ihre Stellung im Systeme.

### A. Eigentliche Skorpione.

#### *Scorpio L.*

Mit langem, vorn, wo Kopf und Brusttheil angenommen wird, etwas dickeren, hinten in einen dünneren, gegliederten Schwanz übergehenden Körper, dessen letztes Glied, blasig von Gestalt, in einen krummen, am Ende sehr spitzigen Stachel endigt, unter dessen Endspitze zwei längliche Löcher befindlich sind, aus welchen das Gift tritt. Dieses befindet sich innerlich in zwei Säcken, die faltig, und außen mit starken Muskeln umgeben sind, und sich durch die erwähnten Löcher nach außen öffnen.

Die Skorpione haben eine sehr harte, schwer zu durchstoßende, etwas körnige Haut, wie die der Krebs, und nur an den Verbindungsstellen der Gelenke ist sie weich. Am Bruststück bildet sie nur oben und unten Schilder. Der Kopfthell zeigt sich wie zwei in der Mitte verbundene gewölbte Platten, an deren Verbindungsstelle in der Mitte, gleichsam auf dem Scheitel, zwei Punktaugen stehen, so wie vorn an jeder Seite noch einige. Zwei dicke Kinnbacken endigen in eine zweifingerige horizontal sich bewegende Scheere mit eingelenktem Daumen. Diese Finger sind gezähnt und stark; die darunter liegenden Kinnladen sind platt, und an ihrer äußeren Seite befinden sich die zwei großen Arme mit den Scheeren, die man dieser Stellung zufolge allerdings Scheerentaster oder Palpen, eben so gut aber auch vorderes

Fußpaar nennen kann. Denn auch die zwei folgenden Fußpaare haben jedes an der Basis ein dreieckiges Stück, welche Stücke, wenn sie verwachsen wären, eine Unterslippe bilden würden. Von der anderen Seite gleicht also dieser Bau dem der Limulus, so daß man diese in der That als metamorphosirte Skorpione des Meeres betrachten kann. Die beiden hintersten Fußpaare sind wieder größer als die vorhergehenden, haben aber nicht die schönen Proportionen der Füße der höheren Insekten. Dagegen sind die Scheeren des ersten Paars halbherzförmig, sehr groß, und bei einigen zusammengedrückt.

An dem vorletzten Schwanzgliede, d. h. dem letzten vor dem Stachelgliede, öffnet sich der After. Bauch und Schwanz bilden zusammen zwölf Glieder. Das erste ist getheilt, und trägt vorn die Geschlechtstheile, hinten zwei Kämme, deren jeder aus einem eingelenkten Hauptstücke besteht, das unten eine Anzahl länglicher, innen ausgehöhlter, paralleler Blätter, wie Kammzinken hat. Sie scheinen keine Kiemen zu seyn, sondern eher zum Geschlechtsapparat zu gehören, doch kennt man noch nicht genau ihre Funktion. Jeder folgende Leibesring enthält innerlich ein Paar Lungenäste und äußerlich eine Athemspalte (stigma) wie ein Knopfloch gestaltet.

Die Skorpione kriechen platt auf der Erde hin, sind also krötengleiche, niedere Thiere. Sie halten sich meist unter Steinen, Baumrinden u. dgl. auf, in den Häusern unter Papier oder anderen flachliegenden Sachen, auch in Mauerspalten. Da sie sich wie andere Thiere der Art, gern nach der Wärme, auch wohl nach der thierischen Ausdünstung ziehen, so haben Reisende in heißen Ländern die Gefahr, daß sie sich des Nachts in ihr Lager verkriechen (Hamilton sah in Columbia meist einen sehr großen, der sich unter den Sattel seines Maulthieres verkrochen hatte), wie denn Lichtenstein am Kap erlebte, daß man am anderen Morgen einen unter dem Kopfkissen fand, der beim Aufräumen eine junge Sklavin stach, so daß sie schon nach achtzehn Stunden sterben mußte. Auch findet man sie selbst im südlichen Europa, in Italien, Süd-Frankreich und Spanien in den Betten. In Benedig findet man sie, wie v. Martens angibt, in allen Häusern, und bisweilen in den Schlafkammern, wie bei uns die Spinnen; sie kommen da des Nachts, bei feuchtem Wetter, oder bei Gewitterregen, hervor. Doch machen sich die Italiener aus

dem Biß dieser kleinen Gattung nicht viel, zumal da sie den Menschen höchst selten, und ungereizt nie stechen.

Abends und Nachts kommen sie am häufigsten aus ihren Schlupfwinkeln, laufen schnell oder rennen gleichsam wie wüthend mit aufgehobenem geschwenkten Schwanz einher. Finden sie ein Insekt, zumal eine Spinne, aber auch Fliegen, Aaseln, Heuschrecken und andere, so fassen sie es geschickt mit der Scheere, beißen es todt oder stechen es erst mit ihrem Stachel und saugen es aus, fressen es aber nicht. Spinnen und Spinneneier sind ihre liebste Nahrung. Angefaßt suchen sie zu stechen, wovor man sich zu hüten hat, doch stechen sie sich nicht selbst todt, und die Behauptung, daß sie es thäten, wenn man sie in einen Ring von Wasser oder von glühenden Kohlen setze, den sie nicht überschreiten könnten, ist eine Fabel. Der Angabe eines englischen Kapitäns zufolge soll man in Ostindien hellblaue und dunkelblaue zu Gefechten unter Glasglocken, auf Wette, bringen, unter die man etwas Tabaksdampf bläst. Sie fechten dann wie die Teufel, bis einer erliegt. Auch unsere europäischen gehen auf einander los und morden sich, wenn man viele zusammenbringt; auch fressen sie ihre eigenen Jungen.

Die Gefährlichkeit ihres Stichs ist natürlich nach der Größe der Gattung und anderen Zufälligkeiten, z. B. der Temperatur der Luft, verschieden. Der der verschiedenen kleinen unter dem Namen *Sc. europaeus* bekannten Arten ist nicht tödtlich, nur sehr schmerhaft. Das bekannte Mittel, den Skorpion zerquetscht auf den Stich zu legen, beruht wiederum nur auf der Einbildung. Das einfachste ist Oel; welches überhaupt die Schmerzen eines Insektenstiches augenblicklich aufhebt oder doch mildert, wenn man einen Tropfen auf die Wunde bringt; daher denn auch die wandernden Tyroler solches gemeines Olivenöl, in welches ein toter Skorpion gelegt ist, um den Glauben zu erhöhen, verkaufen. Ammonium innerlich und äußerlich, ist ebenfalls wirksam. Mäuse sterben vom Stiche der kleinen Skorpione, Hunde schon nicht; dagegen möchte die Verwundung durch die größeren spanischen\*)

\*) Ich kann die Namen der jedesmaligen Art darum nicht genauer bezeichnen, weil man gegenwärtig eine ganze Menge Species unterscheidet, die bisher unter gemeinsamer Benennung gingen.

schon gefährlicher seyn. Nach den älteren Versuchen von Mau-  
pertuis starb von vielen Hunden und Hühnern, denen man  
mehrfahe Stiche beibrachte, nur ein einziger Hund. Bei den  
Menschen sind die Symptome, die sie erzeugen, verschiedenartig.  
Die Wunde wird bald schwarz, mit Anschwellung und Entzün-  
dung, schmerzt sehr, und es erzeugen sich auch wohl Pusteln dar-  
um. Andere bekommen Schauer, Fieber und Erbrechen, ja  
Erstarrung, Schluchzen und Bittern der Glieder, daher man auch  
behauptet, der Stich des indischen erzeuge Wahnsinn; nach von  
Humboldt macht zu Carthagena und Guayaquil ein Skorpion-  
stich auf der Stelle die Sprache verlieren. Die Zunge bleibt  
sechszehn Stunden lang taub; überhaupt erzeugt er fürchterliche  
Schmerzen.

Das Skorpionengift hat im Ganzen viel ähnliches mit dem  
der Vipern. Es schmeckt aber scharf und heiß, und gleicht darin  
eher dem der Wespen und Bienen.

Es wird behauptet, daß sie sich mehrmals im Jahre begat-  
ten. Gewiß ist es im August, wobei sich das Weibchen auf  
den Rücken legt. Es häutet sich zuvor, ehe es die Jungen bringt.  
Diese werden zu verschiedenen Malen abgesetzt und die Mutter  
trägt sie einige Zeitlang auf dem Rücken herum. Sie soll an  
50—60 erzeugen können, und geht über einen Monat lang nicht  
aus ihrem Schlupfwinkel, um sie so lange zu bewahren. Sie wachsen  
schnell, sind aber unter einigen Jahren nicht zur Begattung fähig.

Man hat sie neuerlich nach der Anzahl und Stellung der  
Augen in eine Menge, vielleicht zu viele, Untergeschlechter ge-  
trennt.

## I. Scorpio.

Scorpius Ehrenb.

Mit sechs Augen, pickem, etwas breitem Bauch, und dünnem  
ziemlich kurzem Schwanz.

Der deutsche Skorpion.

Scorpio germanus.

Kastanienbraun mit braunrothen Scheeren; drei Grübchen  
in der untern Handfläche; der Schwanz ungekleist.

Hahn Arachniden v. Koch III. B., VI. Heft, Taf. CVIII. —  
Schäffer Elem. Entom. T. II, Fig. 3—5 und CXIII,  
1—3.

Die kleinste Gattung. Das Männchen ist schmäler mit etwas längerem Schwanz und viel dickerem Giftstachel, das Weibchen ist an dem dickeren Bauche kenntlich. Beide Geschlechter sind einen Zoll lang und glänzend. Findet sich bis ins südliche Tyrol und in Ober-Italien, aber nicht dießseits der Alpen.

Eine Menge verwandter Arten, als: *Sc. massiliensis*, *aquilegiensis*, *italicus*, *tergestinus*, *nauplius* etc. sind in dem angeführten Werke von Koch unterschieden und abgebildet.

## II. Buthus.

Mit acht Augen, drei auf jeder Seite und zwei mitten auf dem Scheitel, mit dicken, großen Scheerengliedern und dickem, mehrkantigen geflügelten Schwanz. — Die größten.

### 1. Der große afrikanische Skorpion.

#### Buthus afer.

##### *Scorpio afer* L.

Braunschwarz, die Bauchschilder gelbbraun und stark glänzend, das Endglied des Schwanzes kurzeiförmig, braunroth. Die Hände breiter als lang, flach gewölbt, dicht grobkörnig. 15—17 Zähne an den Kämmen.

Arachniden v. Koch, Taf. LXXIX, Fig. 175. — Herbst IV, Taf. 1, Fig. 1.

Wahrscheinlich die größte Gattung aller Skorpione, vom Kopf bis zum Schwanz einen halben Fuß lang und vorn doppeldick. Der Stachel ausnehmend scharf. Die Fußpaare nehmen nach hinten an Größe zu. Findet sich in ganz Afrika, und ziemlich häufig am Cap; sein Stich ist tödtlich, wie oben ein Fall erwähnt wurde. Ob es genau dieselbe Gattung ist, die sich auch in Indien findet, oder ob diese zu den folgenden gehörig, verdient noch genauer ausgemacht zu werden.

Herr Dr. De Haan, Conservator des Museums zu Leyden, hatte vor etwa zehn Jahren einen solchen Skorpion neun Monate

hindurch lebendig. In der Sonne grub er sich schnell in die Erde und warf sie hinter sich. Er lebte in einem Zuckerglase, fraß aber nichts. Seine Kämme waren in unaufförlicher Bewegung.

### 2. Der dunkelblaue indische Skorpion.

*Buthus cyaneus.*

Schwarz mit blauem Schimmer, die Hände breit, flach gewölbt, tief lederartig runzelig; die Schenkel unten gezähnt.

Arachniden I. c. Fig. 225.

Er soll nur vier Zoll Länge erreichen, gleicht aber außer den angeführten Merkmalen dem afrikanischen sehr. Auf Java nicht selten.

### 3. Der großköpfige indische Skorpion.

*Buthus megacephalus.*

Schwarz mit röthlichem Schimmer. Die Hände groß, stark gekörnt, die Schenkel unten glatt.

Arachniden Fig. 224. — Rösel Insektenbel. III, Taf. LXV.

Ebensfalls den vorigen beiden ähnlich und gegen fünfstehalfb Zoll lang. Sein Vaterland ist ungewiß.

Es gibt noch verschiedene, verwandte Gattungen, die man nach der Stellung der Seitenaugen zu noch mehr Untergeschlechtern erhoben hat.

## III. Androctonus.

Mit zwölf Augen, wovon seitlich vier hintereinander und ein fünftes quer neben dem hintersten steht.

### Der große französische Skorpion.

*Androctonus occitanus.*

Braungelb, mit blassig aufgetriebenen vorderen Schwanzgliedern, die oben stark körnig geflekt, und in der Mitte vertieft sind. Die Stachelspitze ist schwarz.

*Leach Zool. Misc. III, CXLIII.*

Diese Gattung kommt mit einigen Verwandten um das mittelländische Meer, zumal in Spanien vor und wird etwa zwei Zoll lang; der Schwanz ist etwas länger als der Körper.

Die gemeinste Gattung amerikanischer Skorpione ist etwa dritthalb Zoll lang, blaßgelb, braun gescheckt, mit sehr langen Armen, Händen und Schwänzen.

### B. *Astero skorpione.*

Die kleinen hieländischen, die man geradehin ungeschwänzte Skorpione nennen könnte. Sie atmen aber durch Tracheen. Ihre Taster bilden lange Hände mit Scheeren, der Körper ist ganz platt, und sie laufen schnell vor und rückwärts, auch seitlich. Mit den Scheeren sollen sie kneipen können und dadurch die kleinen Kinder in den Betten belästigen. Daß die Weibchen ihre gelegten Eier zusammenhäufen und in eine Art Gespinst zusammenbetten, habe auch ich gesehen, da mir ein Naturfreund ein solches Nest einst gebracht hat.

Es gibt eine Menge, nach den Augen in zwei Genera getrennte Arten. Sie leben unter Baumrinde, Moos u. dgl., auch in den Häusern. In England hat man diese Thiere parasitisch an den Beinen mehrerer Arten Fliegen sijzen gefunden, von deren Säften sie sich vielleicht nähren \*).

### IV. *Südherfskorpion.*

#### *Chelifer.*

Mit nur zwei Augen, jedesseits eines; das Kopfbruststück durch eine Querfurche getheilt, die Tarsen eingeschleierig, der bewegliche Finger der Scheeren mit einer Dolchspitze, und die Leibeshaare von spatelförmiger Gestalt.

---

\* ) Ueber sie insbesondere de Theis, in den *Annales des sciences naturelles* T. XXVII., von Leach.

### Der gemeine Bücher skorpion.

#### *Chelifer cancrioides.*

*Chelifer Muscorum* *Leach.* *Scorpio cancrioides*, *ecaudatus*. *Phalangium cancrioides* *L.* *Fr. Pince* — *crabe*.

Rothbraun, das dritte Glied der Scheerenarme cylindrisch, verlängert, das vierte keulensförmig. Der Bauch breit und am Rande wie gezähnt.

*Leach Zool. Misc. III, 142, 2.* — *Rösel Inseltenbelustigungen.*  
*Suppl. LXIV.*

Häufig in Herbarien, alten Büchern, aber auch unter Apfelbaumrinden u. dgl., wo er sich von den Holz- und Papierläusen nährt. Etwa 2 Linnen lang.

Mehrere von ihm durch kleine Charaktere unterschiedene Gattungen finden sich in den Wäldern.

### V. Halb skorpion.

#### *Obisium.*

Unterscheidet sich von den vorigen durch vier Augen, und ein ungetheiltes Bruststück. Die Scheeren sind ohne Dolchspitzen, und die Haare des Leibes borstenförmig.

##### 1. *Obisium sylvaticum K.*

Drei Linnen lang, weißlich, mit schwarzen Rücken- und Bauchschildern, die Arme und Scheeren kastanienbraun; die Füße weiß, die Finger der Scheeren gerade.

*Koch in Panzer's Fauna* *Nro. 132, Taf. 1.*

Die größte Gattung unter allen. In Waldungen bei Regensburg gefunden.

##### 2. *Obisium muscorum.*

Mit langen weißen Seidenhaaren bedeckt.

*Leach Zool. Misc. III, T. 141, Fig. 3.*

Auf den caledonischen Gebirgen in England sehr gemein. Dieser hat wirklich ein kleines Schwänzchen, wie ein Skorpion.

### C. Solpugae.

Unterscheiden sich von den vorigen zumal durch den Mangel der Scheeren und ein mehr spinnenartiges Ansehen. Es sind häßliche Thiere der wärmeren Länder beider Welten, deren Biß gefährlich ist, um so mehr, da sie ziemlich groß sind. Sie atmen durch Luftröhren und fliehen das Helle, wie die meisten Thiere dieser Klasse, daher sie von den Alten Solifugas genannt wurden, woraus man Solpugae gemacht hat. Aber man scheint sie auch vormals mit dem Namen Phalangium, Tetragnatha, Tarantula u. s. w. bezeichnet zu haben.

### VI. Galeodes.

Mit zwei großen Fühlerscheeren oder Kinnbacken, wie die Skorpione. Die Finger senkrecht übereinander stehend, der untere beweglich. Kopfbruststück deutlich vom Leibe geschieden, aber letzterer ungestielt. Die Fäster haben die Gestalt der Füße. Zwei Augen auf dem Rücken.

#### Galeodes araneoides.

Mit ockergelben Beinen, Fresszangen und Kopfbruststück, der Bauch länglich, schwarzbraun, in der Mitte mit einer noch dunklen Fleckenreihe. Die Beine sehr haarig.

Hahn Arachn. Fig. 164, 165. — Pallas Spic. Zool. IX, 3, Fig. 7—9.

An zwei Zoll lang. Die Fäster gleichen ganz den hintersten Füßen, nur sind sie größer als die mittleren, und sollen am letzten Glied ein scheibenförmiges, perlmutterweisses Organ einschließen, was das Thier hervorstreckt, wenn es gereizt wird. Sie laufen in den heißen sandigen Gegenden der alten Welt, von Indien bis Griechenland, mit außerordentlicher Schnelligkeit im Sande umher, und richten, wenn man sie faßt, den Kopf auf. Im Orient sollen sie zumal für die Rameele eine große Plage seyn.

Es gibt auch eine Gattung auf den Antillen \*).

\* ) G. Cubaæ. Lucas in Guérin Magaz. de Zool. Livr. VIII, Taf. 11.

## D. Spinnenskorpione.

Der Bauch ist durch einen Stiel an das Bruststück gehetzt, wodurch sie sich den Spinnen nähern, sie haben aber klauenförmige Kinnbacken und acht Augen. Die Taster sind dornig.

## VII. Thelyphonus.

Die Taster endigen in eine Scheere und sind stark dornig; der Bauch ist lang und endigt in eine gegliederte Vorste, gleichsam einen Skorpionschwanz vorstellend.

### Thelyphonus Proscorpio.

*Phalangium candatum.* Fr. Vinaigrier.

Schwarzbraun, der Rückenschild wie mit Körnern besät.

Pohl und Kollar, Brasiliens lässt. Ins. Taf. 1, Fig. 2.

In Südamerika, bis auf die Antillen. Gibt einen eßigsauren Geruch von sich. Etwa einen Zoll lang.

Andere Gattungen finden sich in Ostindien \*).

---

## S w e i l e   O r d n u n g.

### Spinnen.

Während Linné diesen zahlreichen Stamm noch unter dem Namen Aranea vereinigte, ist man jetzt genöthigt, eine ganze Familie aus ihnen zu bilden, deren Geschlechter und Gattungen von Jahr zu Jahr zahlreicher werden. In der That ist ihre neuere Untersuchung, zumal seit Walkenaer, auch sehr lohnend gewesen, da man nicht leicht eine Gruppe von so entschieden gemeinsamer Verwandtschaft finden wird, die sich so mannigfaltig in einzelne Charaktere, Formen und Gestalten modifizirt zeigte. Man findet gutmütige und grausame, muntere und träge,

---

\*) Ueber die anderen Species s. Lueas in Guerin's Magazin 4. Liefl. Taf. 8—10.

schlaue und wie es scheint, dumme Arten, und so vieles andere, was nicht durch erlernte, sondern durch gleich angeborene Fähigkeiten so gebildet worden ist, wie denn schon Plinius von ihrem Weben sagt: nascitur illa ars, non discitur. Um wie viel klarer tritt also hier nicht jenes große, allgemeine Gesetzesleben der Natur hervor, von welchem diese Organismen nur specielle Formen und Neuerungen, gleichsam Charakterzüge, sind, die sich um so leichter betrachten und anstaunen lassen, je häufiger wir diese kleinen Thiere in unserer Nähe haben. Und in der That, man muß sie beobachten, um zu sehen, welches feine, ja hohe Leben in ihnen waltet, dessen Grund man nicht in ihnen allein suchen darf. Die Intelligenz einer kleinen Spinne, die im Verhältniß noch die eines Pferds übertrifft, kann nicht allein in der Größe und Organisation ihres Gehirns liegen, wenn schon diese Folge davon ist und damit in Zusammenhang steht. Sie ist außer dem Thier begründet, ihm selbst unbewußt, denn gerade durch wiederholtes Anblicken und Beobachten der Spinne verliert diese allmälig von ihrer Unbefangenheit, wird unsicher in ihren Handlungen, und verliert sich am Ende ganz. Und so gesichert und verborgen jede Gattung hie und da auch lebt: immer ist es bewundernswürdig, daß sich alle diese so zahlreichen Arten immerfort erhalten, vielleicht bis in die Zeiten der ersten Schöpfung hinauf, und daß ein und dieselbe Species oft durch alle Länder Europa's verbreitet ist, wo man denn schwer begreift, wie sie in jede Stadt, in jedes Dorf gelangt seyn möge, da man nicht ein sieht, welches Interesse sie zu diesem gleichmäßigen Wandern und Verbreiten veranlaßt haben sollte.

Und dennoch muß ihnen ursprünglich die Bestimmung angewiesen worden seyn, die mannigfaltigsten und verschiedensten Wohnrörter einzunehmen. Es gibt welche, deren Aufenthalt unter der Erde, in eigenem Bauen oder in Löchern ist; andere die in Kellern, an Mauern, Räthen, auf Dachziegeln, in den Zimmern, an schmutzigen niederen Orten oder hoch in der Luft wohnen. Einige leben auf Bäumen, in Hecken, Geesträuch, manche insbesondere am Weinstock, auf Blumen, in den Stoppelfeldern. Und hier wieder einige Gattungen in der Nähe des Menschen und dessen Wohnung, andere im Freien daneben, so dann in Feldern und Gärten, endlich in Wäldern, auf den Alpen, und so immer

weiter in die Ferne, bis zu unbekannten Ländern hin, so daß wir ohne Zweifel noch Hunderte, wo nicht Tausende, neuer Gattungen kennen lernen werden, wenn wir weiter nach ihnen da-selbst forschen. Auch wahrhaft amphibische, am Ufer wohnende, gibt es, ja eine eigene Wasserspinne, deren Abstammung aber von den wahren Winkelspinnen nicht zu verkennen ist, wie die des Fischvitters vom Wiesel\*). Und was das Naturell betrifft, dessen vorhin erwähnt wurde, so läßt sich auch dieses mit dem höheren Thiere vergleichen, wie z. B., nach Dugès Ausdruck, die Atypus die Dachshunde unter den Spinnen vorstellen.

So muthig und grausam die meisten unter ihnen sind, so feig und furchtsam zeigen sie sich auch wieder bei jeder Gefahr durch Geräusch. Man bemerkt nicht, daß eine Spinne vor einem ihr hingehaltenen Gegenstand flieht oder ihm ferne ausweicht, und doch wäre zu verwundern, daß ihr ihre Augen nicht zum Sehen dienen sollten. Ja der ebengenannte Naturforscher macht noch besonders darauf aufmerksam, daß diejenigen, welche wie z. B. die Mauerspinnen, in engen Löchern sitzen, aus welchen sie nach ihrer Beute herauspringen, ihre Augen auf einen Fleck zusammengehäuft, dagegen die Kreuzspinnen und andere in der Höhe, im Freien sitzende, sie mehr vertheilt haben. Wir werden dies nachher genauer beachten.

So viel scheint gewiß, daß selbst ein einer Spinne in ihr Netz hingehaltenes Insekt sie nicht eher zum Losgehen auf dasselbe reizt, als bis dasselbe Versuche, sich zu bewegen, macht, daß es also vielmehr die zarte Gefühlswahrnehmung ist, die sich hier fund gibt. Auch stirbt eine Spinne, ja die größten, sehr schnell bei dreistem Anfassen, sey es nun wirklich vor Schreck darüber, oder nur an den Folgen des Drucks. Auch die Beine gehen ihnen sehr leicht ab, und sie sterben meist kurz nach einem solchen Verluste. Doch können sie wieder sehr lange hungern, und ich habe ehemals Kreuzspinnen in Schachteln und Gläsern halbe Jahre lang lebendig gehabt, ohne ihnen Luft oder Nahrung zu reichen.

Aus dieser so merkwürdigen Conformation entspringt nun

---

\*) Nach der Versicherung Reisender soll es auf Neuholland eine ungeheure Wasserspinne geben, die sich auf dem Boden desselben aufhält.

wohl auch ihre Empfindlichkeit gegen die Zustände der Witterung, welche sie neuerer Zeit als Wetterpropheten wieder berühmt gemacht hat\*).

In der That verdienen sie auch diesen Ruhm, wenn man nur dasjenige nicht von ihnen erwartet, wozu ihre Beschaffenheit nicht tauglich ist, und nicht vergisst, daß fortgesetzte Störungen ihnen ihre Unbefangenheit nehmen und sie so der Natur der Sache nach weniger brauchbar machen. Ich selbst aber habe die Richtigkeit ihrer Anzeigen vielfach, ja oft zum Erstaunen, bestätigt gefunden \*\*).

---

- \* ) Die Veranlassung hierzu geben die französischen Revolutionskriege. Im Jahr 1794 war der Generaladjutant des Generals Pichegrü, Duatremère d'Isjonal, in holländische Gefangenschaft gerathen, als die Revolutionsarmee unter diesem General an der Grenze stand. Die Holländer öffneten ihre Schleusen und setzten ihr ganzes Land unter Wasser, um die Neufranken abzuhalten, die auch schon zum Rückzug Anstalt machten. Da sandte d'Isjonal eine Nachricht aus seinem Gefängniß, in welchem er sich mit Beobachtung der Spinnen beschäftigte, daß ihm diese für sicher eine binnen zehn Tagen eintretende strenge Kälte prophezeihet hätten. Der General erwartete sie also, sie traf ein, und die Republikaner zogen auf dem Eis nach Amsterdam. Duatremère d'Isjonal wurde befreit und im Triumph nach Paris gebracht. Sein Ruhm dauerte so lange, bis ihm einst eine ähnliche Prophezeihung missglückte.
- \*\*) Schon in meinen frühesten Jahren, als die Eroberung von Holland in Folge jener Wetterprophezeihung das allgemeine Gespräch bildete, beobachtete ich die Spinnen in dieser Hinsicht, und hatte in einem unbewohnten Hintergebäude bequeme Gelegenheit dazu. Einst kam an mich, Freitags, beim herrlichsten Wetter, eine Einladung zu einer großen Gesellschaft in einen Weinberg, weit von der Stadt. Ich hatte wenige Augenblicke zuvor alle meine Winkelsspinnen in Ordnung gefunden. Kurz darauf bemerkte ich mit Ueberraschung, daß sich die vorderste in ihrem Loch umgedreht hatte, den Kopf nach innen. Ich sah weiter nach, und fand alle so. Da nahm ich mir die Freiheit, den Rath zu ertheilen, die Gesellschaft aufzuschieben. Man lachte, zumal auch den Sonnabend noch kein Wölkchen am Himmel zu sehen war; allein es erfolgte richtig den Sonntag ein schreckliches Unwetter, welches das Vergnügen störte. Ein anderesmal sah ich, wie eine gewaltig große Kreuzspinne, die in einem verschloßenen Zimmer ein

Der physiologische Grund scheint in dem Doppelverhältniß eines dicken, feuchten Bauchs und zarter, langgestreckter Gliedmassen zu liegen. Wenn die einen Theile, thermometrisch, für Wärme und Kälte empfindlich sind, so sind es die anderen für Trockenheit und Feuchtigkeit. Es ist daher erklärlisch, daß die Spinne bald ihre Beine weit hervorstrecke, bald einziehe, oder daß sie webe, um sich ihres Ueberflusses zu entledigen und umgekehrt nicht webe. Aber auch weiterhin wird sich ihr Gefühl von Hunger und Durst, Ruhe und Thätigkeit hiernach richten, und die schon sich vorbereitenden Veränderungen der Atmosphäre wahrnehmen, um sich danach zu stellen.

Man hat sich bisher nur der gemeinen Eck- und Rabspinnen bedient, ohne genauere Bestimmung der Species, weil sie am leichtesten zu haben sind. Man wählt sie je älter und größer, je besser, beobachtet sie zwar öfter, sorgt jedoch, ihnen nicht nahe zu kommen, daß sie es nicht merken, denn sonst zeigen sie nicht mehr richtig an, und verlassen wohl eher ihren Wohnplatz. Füttern kann man sie aber eigentlich nicht. Ein oder zweimal darf man auch wohl ihr Gewebe zerstören, aber nicht öfter. Gut ist es natürlicher Weise, wenn man mehrere an verschiedenen Orten zur Beobachtung hat, um zu sehen, ob sie übereinstimmen, je älter sie sind, desto besser.

Das Wesentlichste dieses Theiles der Meteorologie ist folgendes:

1) Auf schön Wetter deutet:

Wenn es viele Kreuzspinnen gibt, und wenn dieselben ins Große arbeiten; je größer und mächtiger die Grundfäden ausgesponnen werden, desto beständiger und heiterer bleibt es.

Wenn sie in der Nacht ein neues Gewebe versetzen.

Wenn sie sich häuten.

Wenn man früh um zehn Uhr eine Kreuzspinne mitten in ihrem Gewebe findet und sie dieses stark rüttelt, so ist einer der schönsten Tage zu erwarten.

---

Rad von der Decke bis auf den Tisch herabgesponnen hatte, daß selbe eintrat und sich oben verbarg, worauf ich ebenfalls ein schweres Gewitter für einen der folgenden Tage prophezeiheen konnte, welches auch genau eintrat.

Wenn die Winkelspinnen in den Häusern in ihrem Gewebe den Kopf zeigen und die Füße weit hervorstrecken.

Wenn sie Eier legen, was sie in heißen Jahren sieben-mal thun.

Wenn sie in der Nacht das Gewebe vergrößern und am Tage die Füße sehr weit hervorstrecken. Dann wird das Wetter am schönsten.

2) Auf veränderliches Wetter deutet:

Wenn es nur wenige Kreuzspinnen gibt, oder wenn diese nur schwach und im Kleinen arbeiten.

3) Auf Regen deutet:

Wenn die Kreuzspinnen gar nicht spinnen, oder wenn man gar keine sieht.

Wenn sie die Hauptfäden nur sehr kurz ansetzen.

Wenn sich die Winkelspinnen im Gewebe umkehren und den Hintern zeigen. In diesem Falle folgt anhaltender Regen.

4) Gewitter werden angezeigt:

Wenn die Kreuzspinnen ihr schönstes Gewebe zerreißen und sich oben in einem Winkel verbergen.

Wenn sich die Winkelspinnen in ihrem Loche umkehren, wie zuvor angeführt.

Um. Beide Arten von Spinnen thun dies einige Tage zuvor schon, oft beim noch schönsten Wetter.

5) Wind wird angezeigt:

Wenn die Kreuzspinnen gar nicht spinnen.

Wenn sie nur die Speichen des Rades spannen, ohne die zirkelförmigen Fäden um den Mittelpunkt anzulegen. In diesem Falle legt sich aber der Wind wieder nach zehn bis zwölf Stunden.

Wenn sie ein Drittel oder ein Viertel ihres Nehes plötzlich zerreißen, und in ihre Schlupfwinkel kriechen. Hier wittern sie den Sturm, der aber bald nachlassen, und das schönste Wetter zurückführen wird.

6) Kälte wird im Winter angezeigt:

Wenn die in den Wohnungen überwinternden Winkelspinnen hervorkommen, stark hin und herrennen, und um die bestgelegenen schon fertigen Gewebe kämpfen und sie in Besitz nehmen.

Wenn sie ganz neue Gewebe spinnen, oder wenn sie in der Nacht ein oder mehrere Gewebe über einander versetzen. Dies deutet auf heftige, anhaltende Kälte, die gewöhnlich nach acht bis zehn Tagen eintritt.

Es ist schon oben angegeben worden, daß man das ganze Vorderstück der Spinnen, den Cephalothorax, physiologisch als Kopf betrachten könne, weil das Gehirn gerade im Centrum desselben liegt, und die, die eigentliche Brust charakterisirenden Respirationsswerkzeuge sich vorn im Bauchstücke befinden. Nur ein gewisses Vorurtheil verhindert jene Annahme \*) um so eher, da die Spinne keine zusammengesetzten, sondern nur Punktaugen zeigt, deren verschiedene Stellung, meist vorn, zur Unterscheidung der Genera benutzt wird. Indes geht es auch hier zum Theil noch wie mit den anderen künstlichen, freilich anfangs nicht zu vermeidenden Bestimmungen; denn die nach dieser Augenstellung allein gebildeten Geschlechter reißen manche natürlich verwandte Geschlechter auseinander. Ueberdem möchte man manche Spinnen eher blind als scharfschend nennen.

Das Gehirn der Spinnen besteht aus drei Hauptganglien. Der Hauptknoten gibt die Kinnbacken und Augennerven ab, nur einen für jedes Auge, und nach hinten zurücklaufend, dem sympathischen der höheren Thiere analogen. Duges fand in einer großen Würgspinne noch einen Plexus, der nach dem Magen ging, gleich einem Sonnengeflecht. Um die Speiseröhre schlingt sich, wie gewöhnlich, ein Band vom ersten und zweiten Nervenknoten. Die zweite beträchtliche Anschwellung oder der Hirnknoten ist strahlig und liegt auf dem Brustbein, von wo er die Nerven zu den Fästern und den Füßen schickt. Er verlängert sich nach hinten in zwei Stränge, die in den Bauchstiel dringen und hier einen dritten, aber kleineren Knoten bilden, von welchem die Visceralnerven und die für die Spinngefäß entspringen.

Nur wenige Spinnen haben sechs, die meisten acht Augen, welche in zwei oder drei Reihen, oder, wenn man will, so gestellt sind, daß die mittleren meist ein Dreieck bilden, die seitlichen

\*) Man zeichne sich eine Spinne, und gebe ihr seitlich am Cephalothorax ein paar große Augen, so wird die Phantasie nicht im Stande seyn, sich diesen Theil anders als einen großen Kopf zu denken.

jederseits ein Paar. Bei mehreren Spinnen stehen diese letzteren auf einer kleinen Erhöhung, oder wie auf einem kurzen Cylinder, gleichsam Krabbäugen andeutend, einige, wie *Micryphanes cucullatus* Koch, und *M. camelinus* tragen sogar ihre Augen auf einem zu einem Stiel verlängerten Kopftheil. Ja in der Reise von Freycinet ist eine Stachesspinne (*Aerosoma*), als *Aranea notacantha* abgebildet \*), bei welcher sich hinten auf dem Bauche ein Stachel erhebt, der das vierte Augenpaar an seiner Spitze tragen soll! Wäre es nicht von einem so bewährten Naturforscher wie Herr Gaimard angegeben, so möchte man wirklich eine Täuschung vermuten.

Die Augen der Spinnen sind von verschiedener Größe, welches man ebenfalls zur Charakteristik benutzt. Sie bestehen aus einer Hornhaut mit einer Linse dahinter, und einem Glaskörper den eine Markhaut, als eine napfförmige Erweiterung des Sehnerven aufnimmt. Selbst eine Art Iris, Chorioidee und Pigmentschicht ist vorhanden, so daß das Auge ziemlich schon die Organisation des der höheren Thiere hat. Von den vier mittleren schaut das hinterste Paar nach oben, das andere nach vorn, die übrigen seitwärts, die vorderen mehr nach unten, die hinteren mehr rückwärts. Sie leuchten bei manchen sehr schön im Dunkeln, wie Raubäugen. Diese Bemerkungen hat schon Lyonnart gemacht, und man hat sie noch weiter benutzt, um die Stellung dieser Augen mit der eigenen Lebensweise in Verbindung zu bringen. Doch könnte Manches auch ohne Zusammenhang seyn. So viel ist aber gewiß, daß es wahre Tag- und Nachtaugen gibt, wovon die ersten, bei Tagspinnen, wie *Salticus*, eine grüne, rothe oder braune Iris zeigen, die anderen dagegen, — besonders schön an den Taranteln — kein Pigment haben und darum des Nachts leuchten.

Die Kinnbacken, welche Latreille auch Taster- oder Fühlerscheeren nennt, sind das Hauptwerkzeug des Beißens bei den Spinnen. Sie bestehen gewöhnlich aus einem dicken etwas aufgetriebenen Stück mit einem beweglichen Haken, wie einem Scherenfinger, am Ende, der sich nach innen oder unten einschlägt, und an der Spitze, auf der convexen Seite mit einem feinen Loch.

\*) pl. 82, Fig. 6, 8.

Boigt, Zoologie. Bd. IV.

versehen ist; die Kinnbacke selbst hat an der Unterseite Hörchen, wie kleine Backenzähne, und so kann man in der That den Bau dieser Mandibel der eines höheren Thieres analog finden, indem man den beweglichen Finger wie einen Eckzahn, und insbesondere wie den Giftzahn einer Viper ansieht. Aus seiner Spitze ergiebt sich auch ein, wie es scheint, betäubender Saft in das gebissene Thier, denn man bemerkt, daß jederzeit, sobald eine Fliege oder ein anderes Insekt von einer Spinne mit den Kinnbacken berührt worden ist, es ruhig wird, während es sich zuvor auf alle Weise sträubte. So könnte auch hier die Natur das unvermeidliche Schicksal durch Linderung ausgeglichen haben. Dieses Gif kommt aus einem innen befindlichen Drüsensäckchen, welches spiral gewunden erscheint, wie ein kleiner Strick. Diese Spiralen sind Muskelfasern, und demnach hat die Spinne ihre volle Kraft, das Gif in die gebissene Wunde zu treiben. Die Kinnladen, maxillae, welche unter jenen liegen, sind kleine Blättchen, an denen äußerlich die fünfgliederigen Taster eingefügt sind. Ein ganz kleines Blättchen stellt eine Unterlippe vor, und ein ähnliches eine Zunge. Der Schlund öffnet sich von da zum Magen bis Astor, wie früher schon angegeben worden ist.

Einige Spinnen haben einfachere Kinnbacken, mit einem feststehenden, unbeweglichen Haken am Ende.

zwischen der Ober- und Unterlippe befindet sich eine halbzirkelförmige Querspalte, welches die wahre Mundöffnung ist. Sie ist zu eng, um etwas anderes als Flüssigkeiten aufzunehmen, die die Spinne theils durch Aussaugen, theils durch Berquetschen ihrer Beute gewinnt. Auch die Speiseröhre ist sehr eng, der Magen aber, der in der Mitte des Kopfbruststückes liegt, weiter, und sendet nach jeder Seite fünf Blindsäcke, die sich bis in die Schenkel der Füße und selbst der Taster verlängern. Auch noch nach oben dehnt sich ein eigener Blinddarm aus. Hinten geht der Magen in den Darm über, der innerhalb des Stieles, womit der Leib angeheftet wird, zwar dünn ist, nachmals aber dicker wird, und zumal mit den dicken Galle- und Speichelgefäßen umgeben ist, die in markige Bläschen endigen. Diese Gefäßen und der Fettkörper sind es, welche beim Berquetschen der Spinne als eine ekelhafte, flockigdrüngige bräunliche Masse hervortreten. Ob diese Masse Lebersubstanz sey, wie einige annehmen, oder ein bloßer ernährender Fettkörper,

wie die Meinung anderer, und auch die meinige ist, darüber kann noch gestritten werden. Die wütende Leidenschaftlichkeit lässt allerdings vermuten, daß ein solches Thier Galle habe und bereite, während es anderseits bemerkenswerth ist, daß sich der Bauch bei langem Fasten verkleinert, und die Spinne demnach von diesem Stosse zehrt, so wie sie ihren Bauch nach eingesogener reichlicher Nahrung wieder rasch vergrößert. Duges gab einer solchen abgemagerten Spinne einen großen Mistkäfer, an welchem sie drei Tage hindurch hängen blieb, und ihren Bauch dabei um das Dreifache vergrößerte; daß diese Erweiterung dem Magen allein nicht zuzuschreiben sei, ist klar. Uebrigens vergesse man nicht, daß auf den tiefen Stufen der Thierwelt der Unterschied zwischen Galle, pankreatischem und Nahrungssaft überhaupt nicht so groß ist, als auf den höheren, wo sich diese Secretionen in weit schärfere Gegensätze sondern. Einige feine Kanäle um den Uter herum hält man gegenwärtig für Urengesäße, und glaubt, daß ihre Absonderung zumal es sei, die, in Gemeinschaft mit der Darmausleerung, die schwarzen unauslöschlichen Flecken erzeugt, welche die Spinnen, zumal wenn sie über Wäsche hinweglaufen, zurücklassen.

Das Herz bildet einen spindelförmigen Körper im Bauchthell, und man sieht es durch die Haut pulsiren. Es biegt sich vorn nach dem Bauchbäcker hin, und hat seitliche Gefäße, die sich zwischen die Fettmasse vertheilen. Seine Substanz ist dick muskulös. Das Blut circulirt in der That in ihnen, allein man ist noch nicht ganz im klaren über die Rücklehr desselben durch Venen.

Der Lungen ist schon oben gebacht. Man kann sie auch blätterige Luftkiemen nennen, allein sie verdienen jene Bezeichnung mit mehr Recht. Nach Außen öffnen sie sich durch eine Spalte von dem Ansehen eines Knopfloches, und einige Spinnen wie die Dysdera und Filistata, sollen außerdem noch durch zwei Tracheen atmen, deren Luftpalte hinter jener liegt\*).

Im Bauchstücke, aber auch anderwärts, finden sich bei den

\* Die vertieften Punkte zumal auf dem Rücken mancher Spinnen (Epeira, Theridium) sind keine Luftöffnungen, wie man geglaubt hat, sondern Stellen, wo sich innerlich Muskeln anheften.

Spinnen zahlreiche Muskeln und ziemlich harte, steife Fleischen, welche von einem Punkte des Leibes zum entgegengesetzten gehen, und daher durch ihre Zusammenziehung sehr geschickt sind, die Spinnmaterie herauszupressen; daß sich auch noch andere Muskeln für die lebhafte Bewegung der Extremitäten finden, versteht sich von selbst. Sie heften sich zumal an innerlich hervorstehende Kanten des Kopfbruststücks, deren Furchen man äußerlich bemerkt.

Die Füße sind in der Art der Gliederung denen der höheren Insekten gleich, aber von weniger schönen Proportionen. Ihre Stellung in einem Kreise oder Halbkreis, wo sie bei vielen, wenn sie an einer Wand ausgestreckt sinden, in völlig regelmäßiger Entfernung von einander, einen mathematischen Stern bilden, und dies macht ihr Ansehen grausig; nicht minder schreckhaft ist ihre Zusammenziehung an den Leib, z. B. bei den Krabbenspinnen, wo sie unerwartet wieder hervortreten. Man hat die relative Länge ihrer vier Paare als wichtig zur Bestimmung benutzt: im Ganzen bemerkt aber Düges sehr richtig, daß eigentlich fast immer nur das vorderste und das hinterste Paar die längsten sind. Zene, um nach Art der Kähen das Terrain zu untersuchen, um die Beute desto leichter zu erhaschen, diese um die gesponnenen Fäden festzuhalten und ihnen ihre Richtung zu geben. Die mittleren zwei Fußpaare sind deshalb kürzer und dienen mehr, den Bauch im Gleichgewicht zu halten, und nur bei denen, die keine Gewebe machen, ist dies Verhältniß anders; bei den Springspinnen sind alle Füße kürz.

Die äußere Haut verdient auch noch eine genauere Betrachtung, ehe wir zu den beiden letzten Funktionen, der Fortpflanzung und den Absonderungen übergehen. Man kann sich ihre Betrachtung leicht verschaffen, wenn man eine abgeworfene, wie sie häufig bei den Geweben hängt, zur Hand nimmt.

Unter derselben, an ihrer Innenseite, bemerkt man, zumal am Bauche der Kreuzspinne, viele Körner, welche nichts anderes als Fett zu seyn scheinen; daher sie auch manchmal im Weingeist Deltröpfchen ausschwitzen. Zu äußerst bildet ihre Schicht die Oberhaut, welches zugleich der härteste und festeste Theil derselben ist. An sich ist sie nur wenig gefärbt, aber wenn sie frisch und zart ist, läßt sie die darunter liegenden Farben desto lebhafter durchschimmern. Diese Farben variiren bei manchen

Arten gar sehr, so wie sie auch nach Alter und Geschlecht höchst verschieden sind, und demnach die Bestimmung der Art gar sehr erschweren. Neuerlich ist die Oberhaut oft mit Haaren besetzt, welche verschiedenster Art, und in ihrer höchsten Ausbildung wie ein langer Regel mit kugelig aufgetriebener Basis gestaltet sind, welche in einer Vertiefung der Haut sitzt, bald unbeweglich, bald wirklich wie eingelenkt, beweglich. Die feinsten, zumal die an der großen amerikanischen Würgspinne, gehen leicht ab, und veranlassen ein Zucken, wenn man sie unvorsichtig handthiert. An der gemeinen Winkelspinne (*Aranea domestica*) sind die Haare wahrhaft wie Vogelfedern gestaltet, und nach Düges soll es Spinnen geben, deren Bedeckung ganz die Gestalt der Schuppen der Schmetterlingsflügel hat. Er schreibt diesen selbst die lebhaftesten Färbungen bei den *Salticus*, *Eresus* und *Philodromus* zu \*).

An den Füßen haben diese Haare noch eine ganz eigene Ausbildung erhalten.

Die beiden Krallen nämlich, womit jeder Fuß endigt, sind, nebst bei vielen noch einem unpaarigen Sporn an deren Basis, mit kammsförmigen Bähnen besetzt. Die Karsen der meisten Spinnen noch außerdem mit vielerlei Arten von anderen Stacheln, Dornen oder hornartigen Auswüchsen, welche Theile alle man zu der Klasse metamorphosirter Haare zu bringen hat. An den Füßen bilden sie ihrer Stellung nach wahre Bürsten oder Striegel, wie sich denn auch die Spinne sehr häufig mit ihnen bürstet oder, nach Art der Stubensflege, puzt. Sie müssen aber nicht mit den Quasten verwechselt werden, welche sich an den Sohlen befinden, und es möglich machen, daß die Spinnen an den allerglattesten Körpern dahinlaufen, auch sich an ihren Fäden so gut festhalten können. Diese Quasten sind bisweilen in zwei Lappen getheilt, anderemale dicht wie Sammet.

Der erstere Fall findet sich bei den Hüpffspinnen, der zweite bei den meisten übrigen. Bei den Drassus sollen sie nur an

\*) Derselbe bemerkt auch in Folge hiervon, daß sich alle Färbungen einer Spinne, die von diesen gefiederten Haaren entspringen, besser getrocknet, als im Beingeist erhalten; dagegen die von Pigment unter der Oberhaut besser im Spiritus, während sie in der Luft gänzlich schwinden.

den vier vorderen Füßen befindlich seyn. Die einzelnen Vorsten dieser Quasten erscheinen unter dem Mikroskope keulen- oder spatelförmig, und am Ende platt, so daß sie wie ein Streifchen Leder an glatten Flächen hängen bleiben, auch gewissermaßen die Luft zwischen sich halten.

Die beiden Geschlechter sind oft sehr verschieden. In der Regel sind die Männchen kleiner, zeigen eine deutlichere Gliederung des Bauches, ihre Farben sind lebhafter und von denen der Weibchen sehr verschieden; ihre Gliedmassen sind länger. Um auffallendsten findet man diese Unterschiede bei den Kreuzspinnen, wo z. B. das Männchen der *Epeira sericea* nicht größer wie eine Fliege ist, während das Weibchen so groß wie eine mäßige gemeine Kreuzspinne wird, und einen gelappten Bauch zeigt. Auch sind die Männchen an Anzahl geringer, und man behauptet, auf dreißig weibliche Kreuzspinnen gebe es nur eine männliche, was denn auf Polygamie deuten würde, um so mehr, da sie nicht weben, sondern umherstreifen. In der Jugend sehen sich beide Geschlechter noch öfter gleich, und bei vielen vergrößern sich erst nach der letzten Häutung die Füße, das Kopfbruststück, und zumal die Taster.

Diese schwellen nämlich an ihrem letzten Gliede in eine nüßförmige Erweiterung an, vorn offen, oder wie ein Löffelchen, und sind hornartig, in ihnen findet sich ein, entweder wie ein Pfropfzieher spiral gedrehter, oder ein bloß kegelförmiger Theil, welcher hohl scheint und aus welchem man beim Druck eine klebrige Flüssigkeit drücken kann. Dieses Organ, woran man die reisen Männchen aller Spinnen augenblicklich erkennt, hat den Naturforschern viel zu schaffen gemacht, und noch immer ist es nicht vollständig erklärt. Aber schon Lyomet und andere ältere Beobachter hielten es für das männliche Glied, da diese beiden Taster bei der Begattung auch wirklich auf den Vulven spielen, nur hat sich bei genauerer Untersuchung erwiesen, daß bis jetzt zwischen ihm und den erwähnten Tastern durchaus kein anatomischer Zusammenhang aufgefunden werden kann. Im Bauche sieht man nur zwei lange, vielfach geschlungene Röhren, wie die gewöhnlichen Saamengefäße, die nach außen, in derselben Gegend, wo bei den Weibchen die Vulven sich öffnen, ebenfalls münden sollen. Doch ist es immer das Wahrscheinliche, daß jenes

Lasterorgani das männliche Glied repräsentire, und ein Saamenkanal dahin führe.

Die Begattung dauert ziemlich lange, beide Geschlechter richten sich mit dem Bauche gegeneinander, und wenn die Tasterenden auf den Vulven spielen, so geräth das Weibchen in lebhaftes Zittern der Wollust. Mehrmals hat man die Männchen am folgenden Tage nach der Begattung todt gesunden. Ob natürgemäß, war nicht immer auszumitteln; aber aus vielen andern Beobachtungen ist bekannt, daß beide Geschlechter nur mit Misstrauen einander entgegengehen, sich heftig behandeln, wenig Caresses üben, daß aber, wie schon De Geer erzählt, das Weibchen auch nach vollzogener Begattung das Männchen wirklich aufsässt! auch Duges will öfter Männchen, die nach der Begattung an ihren Gliedern verstümmelt waren, bemerkt haben.

Die Weibchen haben zu Eierstöcken zwei längliche Säcke mit höckeriger Oberfläche, die nach außen in zwei lange Spalten münden. Unter ihnen liegen zwei Spinngefäße, mit deren Seide sie die Eier einhüllen. Diese nehmen nach der Bespinnung fast den ganzen Bauch ein und sollen wie harter Eierdoder schmecken; da die Bespinnung der meisten zu Anfang des Herbstes geschieht, so setzt auch das Weibchen dann ihre Eier, meist in einem umspinnenden Sack, ab, den sie, wie *Lycosa saccata* (aber diese den ganzen Sommer hindurch schon) mit sich herumträgt und, wie Dolomedes mirabilis, tapfer verteidigt, oder in einer Ecke, oder in einem zusammengerollten Baumblatt, oder in einem Seidegewebe unter Steinen, wohl verbirgt und aufhebt. Der der *Epeira fasciata* im südlichen Frankreich ist so groß wie ein Rebhuhnei, der der großen amerikanischen Würgspinne so groß wie ein Hühnerei.

Eine solche leidenschaftliche, ja feurige Liebe zu ihrer noch ungeborenen Nachkommenschaft, die sie nur mit dem Leben fahren läßt, ist doch wohl einer der unbezweifelbaren Beweise der allgemein waltdenden Naturkraft, die auch in das einzelne Geschöpf hinein auf Erhaltung zweckt.

Die jungen Spinnen kriechen, je nach den verschiedenen Species, zu verschiedener Zeit aus, bleiben aber anfangs wie in einem Knäuel versammelt, bis sie sich nach der ersten Häutung zerstreuen. Erschüttert man eine solche Gruppe in jener ersten

Zeit, so laufen sie einen Augenblick vor Schreck auseinander, ziehen sich aber wieder zusammen: abermals ein Beweis, daß das Leben und seine Neuerung auf den niederen Stufen sich nach einem allgemeinen Weltgesetz richtet und davon abhängt <sup>2)</sup>). Viele Spinnen, z. B. die *Lycosa*, tragen ihre Jungen noch einige Zeit auf sich herum, welches dem unaufmerksamen Betrachter wie ein Ausschlag erscheint, daher vormals von einer Spinnenkrankheit gesprochen wurde.

Alle im Freien lebenden Spinnen werden kein volles Jahr alt, sondern sterben zu Anfang Winters; sie wachsen daher ausnehmend schnell; nur die in der Erde lebenden sind vielsährig. Bekanntlich fressen auch die Alten ihre und andere junge Brut, und zehren sich, zumal eingesperrt, einander selbst auf, oder tödten einander, bis nur eine einzige übrig bleibt.

Das Gespinst oder Gewebe der Spinne ist ohnstreitig ihr merkwürdigstes Produkt, und die vorzüglichste Eigenschaft, um verentwischen man sie beobachtet hat.

Es wird aus mehreren Säcken, am Ende des Hinterleibes gelegen, ausgespritzt, und befindet sich in denselben als eine eiweißartige, halbdurchsichtige Masse. Die Säcke, deren Zahl *Brandt* <sup>3)</sup> bei den Kreuzspinnen neun, dreimal drei, fand (während ältere Untersucher weniger angeben), münden in die Spinnwarzen, deren man vier bis sechs zählt, und diese sind am Ende mit einer sehr großen Anzahl von feinen Röhrchen besetzt, aus welchen eine Menge der feinsten Fäden zugleich heraustritt, die aber sogleich zusammenkleben, um sich zu einem gemeinsamen zu vereinigen. Bringt man eine Kreuzspinne in ein enges Glas, und läßt sie lange darin, so wird man dessen Wände zuletzt wie mit Sternchen bedeckt finden, welches die vielen sich anheftenden Fäden sind, die aus Mangel an Raum nicht in einen gemeinsamen Faden ausgezogen werden konnten. Wenn sie dagegen

<sup>2)</sup> Auch darin zeigt sich ein mehr blinder Instinkt, daß die Wolfs-spinnen, welche ihren Eiersack von Gestalt einer Kugel mit sich herumtragen, wenn man ihnen denselben raubt, und eine Baumwollenkugel dafür hinwirft, diese dafür ergreifen und vertheidigen; doch sehen sie meist nachher ihren Irrthum ein.

<sup>3)</sup> *Brandt* und *Raheburg* *Arzneithiere* II. B., S. 90.

Freiheit hat, so sperrt sie die vier Spinnwarzen, welche in der Ruhe zusammengeschlagen sind, so daß sie mit der Afterwarze ein Knöchchen von fünf Einschnitten bilden, auseinander, und treibt die Fadenmaterie durch die Kanälchen heraus. Nach Dagegen sind diese Kanälchen beweglich, so wie sich auch die Spinnwarzen selbst verschiedentlich richten können, weshalb denn die Spinnen bei ihrem ohnedies sehr muskelreichen Bauche im Stande sind, sich in allen Richtungen zu dirigiren, und die Künstlichkeit ihres Gewebes erklärlich wird.

Eine genaue Beschreibung des Verfahrens, wie die Kreuzspinne ihr Netz webt, hat schon Reimarus\*) gegeben. Raheburg beschreibt die Art, wie er sie an Mauern webend beobachtete, mit folgenden Worten: „Hat sie sich eine Stelle ausgesucht, so drückt sie den Hinterleib dagegen, und man bemerkt deutlich, wie sie zwei verschiedene Substanzen absondert: erstens eine klebrig gehäufte, um den Faden anzuleimen, und dann die Fadenmasse selbst, welche sie hinter sich herzieht. Die Auswahl des Orts scheint der Spinne einige Sorge zu machen, denn sie läuft lange unruhig an den Wänden oder anderen Gegenständen umher, ehe sie anfängt zu spinnen. Dann hestet sie ihren ersten Faden in der Höhe an, und läßt sich nun, denselben aus den Spinnwarzen heraußhaspelnd, herab. Nun läuft sie an derselben Wand wieder in die Höhe, befestigt ihren Faden, den sie immer hinter sich her zog, an einer anderen Stelle, läßt sich an demselben wieder herunter, und klettert dann zum Drittenmale in die Höhe, um auch einen dritten Befestigungspunkt zu wählen. Nun kommt das größte Kunststück, denn um das Gewebe freihängend auszubreiten, muß sie den vierten Punkt in einer anderen Ebene aussuchen, was einem Mathematiker Mühe machen würde, durch Berechnung zu finden. Wenn auch dieser gefunden und daselbst ein Faden befestigt ist, auch wohl außerdem noch mehrere sich schneidende (welche nach der Aussicht auf stürmisches Wetter noch vervielfältigt werden können), so zieht sie nun bald einen Faden, dessen Mitte sie nachher wählt, um von da aus die Radien zu ziehen, die aber auch nur durch große Umwege erreicht werden können, indem sie an dem ersten herunter und der

\*) Reimarus über die Triebe der Thiere. Hamburg 1798, S. 54.

Peripherie entlang kriechen muß bis zur Befestigung ihres Fadens. Dann muß sie denselben Weg wieder zurück, und wenn sie deren Faden wieder im Centro befestigt hat, so ist erst der zweite Radius ausgespannt. So folgen auch die übrigen noch. Sind alle Radien gezogen, so geht es an die concentrischen Kreise; in der Mitte wird nämlich wieder der erste Faden befestigt, und nun geht sie spiralförmig herum, bis sie, sich vom Centro immer mehr entfernd, die äußerste Peripherie der Radien verbunden hat. Diesen concentrischen Faden pflegt sie auch wohl noch einmal nachzugehen um dieselben zu verdoppeln. Uebrigens kommen dabei kleine Unregelmäßigkeiten vor, z. B. ein getheilter Faden zwischen je zwei Radien u. s. w.“

Der Spinnsaft in den neuen Säcken scheint auch von verschiedenartiger Beschaffenheit zu seyn. Der der Kreissäden des Gewebes ist nämlich höchst kleberig, was sich leicht beobachten läßt, wenn man sie mit einem Stecknadelknopf berührt, wo sie sich weit hervorziehen lassen, die der Radien dagegen sind es nicht. An jenen bleiben also die Insekten auch leichter hängen. Allein es gibt auch noch eine dritte Sorte, die, welche die Eier einhüllen, und welche, wie ich selbst am 7. November 1821 beobachtet, gleichfalls aus den hinteren Spinnwarzen hervortreten. Diese Fäden sind schön gelb und viel stärker und härter, so daß ein zwei Fuß langer mir ein Gewicht von 54 Gran trug, ohne zu reißen. Auch die gewöhnlichen bestehen, je nach den Gattungen, aus Fäden verschiedener Dichtigkeit, so daß man schon bei uns Gespinnste finden kann, die große Festigkeit zeigen, und in Amerika vergleichen, von größeren Arten, welche selbst dem Menschen Widerstand entgegensehen. Zumal bemerkte Bullock vergleichen in den Klostergängen zu Mexiko \*).

Die Spinnfäden sind im Wasser unauflöslich, und der Regen zerreißt sie nur auf mechanische Weise; daher auch die Argyronecta aquatica sie unter dem Wasser spannt. Sie scheinen etwas Ammonium zu enthalten, weshwegen sie auch wohl ihren Ruf als Fieberarzneimittel erhalten haben.

\*) Six Month's residence and travels in Mexico by *W. Bullock*. London 1824, S. 98. — In der Kunstsammlung der Großherzoglichen Bibliothek zu Weimar befindet sich eine getuschte Landschaft auf Spinnweben gemalt.

Lange hat man darüber gestritten, ob die Spinnen ihre Fäden aussprißen, oder bloß mechanisch ankleben, und sie, durch sich Entfernen davon verlängern. Sie thun beides. Häufig sieht man wie sie mit den Spinnwarzen eine Wand berühren, den Faden ankleben, und dann fortkauen, daß er sich weiter herausziehe; auch eine herabfallende Spinne verlängert ihren Faden auf diese Weise. Allein das oft ohne Grund geläugnete Spritzen findet auf jeden Fall auch statt, und man sieht schon an dem reichen Muskelapparat des Bauches, wie sehr das Thier dazu eingerichtet ist. Schon die leicht zu machende Beobachtung, daß eine große Spinne, die man zum Fenster hinaus wirft, gewöhnlich nicht den Boden erreicht, sondern an der Wand hängen bleibt, beweist es: sie spritzt schnell einen kurzen Faden heraus, mit dem sie sich befestigt. Ebenso mußte es jedes Gespinnst beweisen, welches z. B. von einem Hause zum Andern über die Straße weg, durch welche ein Bach läuft, von der Kreuzspinne gezogen worden, da sie wegen ihrer glattspitzen Zehen nicht auf dem Wasser laufen kann. Ich sah einst ein solches Gespinnst an einem herrlichen Sommernorgen zwischen zwei, achtzehn Fuß von einander entfernten Wänden ausgespannt. Dazwischen lief ein Fußweg und längs diesem ein tief liegender Wassergraben mit hohen buschigen Ufern, so daß gar keine Möglichkeit war, daß die Spinne durch Herabgehen von der einen Wand und über diesen Graben weg hätte hinaufsteigen und an die andere ihren Faden bringen können. Zudem stand das ungewöhnliche Ge- webe so hoch in der Luft, daß ich es mit einem Stock bei weitem nicht erreichen konnte; das colossale Thier saß in der Mitte, war aber bald hernach weg, wahrscheinlich von einem Vogel geholt.

Neuerlich haben nun mehrere Beobachter auch auf direktem Wege gezeigt, was auch ich gesehen, daß viele Spinnen einen Faden aussprißen, durch Fortschieben verlängern; und dann abwarten, daß er durch den Wind gehoben, sich irgendwo gegenüber, z. B. an einem Baumast befestige. Ja man hatte lange über die Behauptung eines Engländers gelacht, daß die Spinnen fliegen, d. h. in der Luft schweben könnten. Und dennoch ist dem so. Ich selbst, nachdem ich es lange bezweifelt hatte, bemerkte, als ich am 21. Oktober 1828 an einem steilen Abhange stand,

eine kleine Spinne vor mir, sich immer höher in die Luft erheben, so daß ich sie, wegen ihrer raschen Bewegung der Füße, anfangs für eine Fliege hielt. Da sie sich immer weiter langsam wegwärts bewegte, nahm ich meinen Stock, und beschrieb einen weiten Kreis um sie, um zu sehen, ob sie nicht irgendwo an einem Faden befestigt sey. Sie befand sich aber völlig frei, und da sie, als Spinne, nicht entfliehen konnte, wie ein geflügeltes Insekt, so gelang es mir, sie noch am Stocke zu erhaschen, aber leider nicht zu erhalten, da sie, als ich sie weiter tragen wollte, sich plötzlich im Grase verlor. Man hat nun späterhin bemerkt, daß dergleichen kleine Spinnen eine Menge höchst feiner kurzer Fäden hinter sich aussprühn, mittels deren sie theils von der Luft fortgetrieben werden, theils sich aber auch durch den Widerstand derselben wie ein Aerostat in die Höhe erheben. Düges bemerkte etwas ähnliches an den ausgekrochenen Jungen der *Epeira virgata* in seinem Studierzimmer.

Indes werden die Fäden in vielen Fällen, wie gesagt, auch sogleich befestigt, und mit den Hinterfüßen weiter herausgezogen und geordnet. Es scheint auch, daß sie mit den Füßen die elegantlichen, dichteren Gewebe zusammenarbeiten.

Der letzgenannte Naturforscher äußert sich über denselben Gegenstand auf folgende Weise. Die *Clubiona*, *Drassus*, *Dysdera*, *Micrommata* und einige *Thomisus* bilden sich seidene Zellen, und nehmen dazu ein zusammengerolltes Blatt oder die Stiele einer Schirmflanze; sie lassen sich ein bis zwei Ausgänge, durch welche sie bei einem Unfall schnell entfliehen. Sie verlassen diese Wohnung auch freiwillig, wenn sie nach Nahrung umherschweifen, da sie sich in weniger als einer Viertelstunde eine neue versetzen können. Bloß während der Häutung schließen sie sich sorgfältig ein. *Argyronecta* bildet sich eine Glocke, die *Epeira virgata* neben ihrem Gewebe ein Schilderhäuschen, und *Epeira scopetaria* ein in der Mitte derselben aufgehängtes Dütchen. *Clotho Durandii* versetzt sich ein wahres Zelt mit Strebepfeilern. Die *Salticus* wohnen in einem länglichen, platten, an einen Stein geklebten Säckchen. Das eine Ende derselben ist gespalten, und die beiden Lippen schließen so genau zusammen wie das Schloß an einer Goldbörse. *Enyo occitanicus*

verfertigt sich unter großen Steinen aus Kies und einigen Seldensäckchen eine Hütte.

Mehrere größere Spinnenarten haben Röhren zum Aufenthalt. *Segestria* verfertigt sie in Mauerröhren so fest und stark, daß wenn man in die sternförmige erweiterte Öffnung ein biegbares Rohr schiebt und fünf bis sechsmal herumdreht; man oft diese ganze Scheide von fünf bis sechs Zoll Länge, nebst dem Nest am Ende, und oft auch die Spinne selbst, herausziehen kann. Ähnliche, aber von grauer Seide, nicht weißer wie die vorige, verfertigt sich ebendaselbst die *Filistata*. Sie verschließt im Winter die Öffnung mit einem Gitter von Fäden. Die Wolfsspinnen (*Lycosa*) wühlen sich dagegen Löcher in die Erde, ohne das geringste Gespinst. *Sauvages* und *Audouin* haben den Kunstreichen Deckel der Mauerspinne, *Cteniza caementaria*, beschrieben. Diese macht sich ein, oft ein Fuß tiefes, mit Seide ausgekleidetes Rohr, was das Männchen selten, das Weibchen vielleicht zeitlebens nicht verläßt, sondern in dem tiefsten Punkte desselben verweilt\*). Die in der freien Luft, oft in beträchtlicher Höhe befindlichen Gewebe der Kreuzspinnen sind weltbekannt. Sie fangen und bestiegen darin oft viel größere und stärkere Insekten als sie selbst sind, z. B. Wespen, Käfer, Heuschrecken u. dgl. Die *Theridion* machen unregelmäßige Nester; die gemeinen Echten Spinnen endigen ihr flaches Gespinst in ein Rohr mit mehreren Ausgängen, befestigen aber auch den vorderen Rand des

\*) In einer (anonymen) Reise eines alten Militärs nach Corfika fand ich den Bau einer Gattung (*Ct. fodiens*) auf folgende Art beschrieben: „Eine böse, schwarze, industriöse Mauerspinne findet sich an sehr trockenen Straßentändern. Sie bohrt ein horizontales rundes Loch in die Erde, so groß wie ein Finger. Diesen Stollen tapeziert sie mit einem feinen Sammet aus. Hierauf baut sie von Erde einen runden, genau hermetisch schließenden Deckel auf die Öffnung, an einem Scharnier, der, wenn er geschlossen, von der Straßenerde nicht zu unterscheiden ist. Die innere Seite hat viele kleine Löcher wie eine Gießkanne. Will nun die Spinne ein Insekt fangen, so öffnet sie halb jenen Deckel, und hat sie ihren Raub, so bläst (?) sie gegen die Wände ihrer Höhle ihren Leib auf, schließt den Deckel und hält sich mit den Füßen in denselben so fest, daß man ihn mit einer Messerspitze nicht öffnen könnte.“

ausgebreiteten Theiles mit verschiedenen Fäden oben an der Mauer o. dgl. Dies thut zumal *A. labyrinthica*, die in Gebüsch an den Landstraßen lebt. Die *Lyniphia* weben sich Bett-himmel, oft ihrer drei übereinander u. s. w. Daß sie das gefangene Insekt noch umspinnen, ist bekannt. Haben sie es durch einen Biss getötet, fortgeschleppt und ausgesogen, so lassen sie das Cadaver oftmals noch wie eine Trophäe (*venationis gloriosa*, wie Lister sagt) hängen; meist jedoch werfen sie es hinaus. Die herumschweifenden Hüpffspinnen springen auf den Rücken ihrer Beute, z. B. eines Insektes, und lassen sich so lange mit ihm herumtreiben, bis es, vom Gift betäubt, ihnen zur ruhigen Beute wird.

Die Spinnen sind aber auch wieder vielen Feinden ausgesetzt, die ihnen als einer sehr lockeren Speise nachgehen. Schon der Mensch gehört in diese Reihe. Die gelehrte Anna Schurmann und der Astronom Lalande waren so erpicht auf diesen Genuss, daß sie überall, und auf Spaziergängen, sie weghaschten und verzehrten. Ich kenne mehrere Personen von dieser Liebhaberei, sie versichern, die Spinne schmecke wie Haselnuß oder Mandelkern mit etwas Citronensaft. Zunächst kommen die Affen. Als ich meine *Simia sabaea* erhielt, ließ ich sie in einem großen Saale, in dessen Ecken und Fenstern eine Menge Spinnen haussten, aus ihrem Käfig, und sah sie in raschen Sägen eine nach der anderen mit der Hand fangen und lüstern verzehren. Viele Vögel, zumal aber die Eidechsen, Frösche und Kröten stellen ihnen nach. Unter den Insekten u. a. sind es zumal die Schlupfwespen (*Sphex albicinctus*) die ihrer für ihre Brut bedürfen, und die Fangheuschrecken (*Mantis*), die auch die größten erhaschen. Ferner die Skorpione und die größeren Scolopendern, ja ihre eigene Gattung, denn die größten Taranteln fallen häufig über kleinere Spinnen her. Auch unzählige Neugeborene gehen auf diese Weise, oder durch Mangel an Nahrung zu Grunde, sonst würde ihre Vermehrung schrecklich seyn. Endlich fegt sie der Mensch in seiner Nähe weg und tödtet sie.

Als eigentlichen Nutzen, abgerechnet den, welchen sie dem allgemeinen Haushalte der Natur leisten, ist etwa nur der medicinische Gebrauch ihres Gewebes und ihre Wetterpropheteiung zu rechnen. Die Versuche, jene wie Seide zu Fabrikaten zu

bemühen, sind Spielerel und ohnedem unausführbar. Neunzig Spinnfäden einer Kreuzspinne geben erst einen Faden, welcher die Dicke eines Seidenfadens hat, und 14,000 Spinnfäden sind erst so dick wie ein Mähdaden. Von einer jungen Spinne gehören nach Scharfenberger vier Millionen Fäden zur Dicke eines Barthaares, ungeachtet ein einzelner Faden das sechsfache Gewicht ihrer Spinne trägt. Zu einem Pfund Seide wären 700,000 Spinnen nöthig. Abgerechnet nur schon die Mühe, so viele an einem reinlichen Orte zusammenzubringen, würde es ihnen bald an Nahrung fehlen, und sie sich untereinander aufzufressen. Ein gewisser Le Blond soll dem König Ludwig XIV. ein Paar Handschuhe und Strümpfe von Spinnseide überreicht und in Deutschland ein Pfarrer Namens Bindseil ähnliche Proben angestellt haben. Ob es jedoch gemeine Gespinnsfäden, oder nicht vielmehr die härteren um die Eiersäcke gewesen, ist mir nicht bekannt.

Einen wichtigen Gebrauch von den letzteren macht man jedoch in den Astronomischen Fernröhren, wo man sie als Mikrometer in ein Kreuz spannt, deren schneidender Punkt zur Bestimmung des Durchganges des Sterns dient. Auch um eine feine Magnetnadel aufzuhängen, können sie dienen, da sie, wie ich selbst erprobt, nicht wie ein Seidenfaden oscillirende Bewegungen verursachen, sondern die Nadel, wie man sie richtet, so gleich ruhig stehen lassen.

Die Spinnen zu fangen und für die Sammlung aufzubewahren, ist schwieriger als bei den eigentlichen Insekten. Mancher, dem sie widerlich sind, und der Scheu fühlt, sie anzufassen, mag das Netz oder fremde Hülse wählen. Viele springen in ein offen hingehaltenes Glas mit Weingeist augenblicklich hinein, auch sterben sie auf der Stelle, wenn man sie mit Branntwein begiebt. Allein nicht bei allen ist dies zu empfehlen, da ihre Färbung leidet. Größere soll man mit der Hand um die Füße herum anpacken, da diese dann nicht abreissen, und so auch eine größere Spinne nicht beißen kann.

Die braunen, missfarbigen Spinnen lassen sich noch am leichtesten in Weingeist aufzubewahren, alle diejenigen aber, die schöne Farbe und Zeichnung haben, nicht. Angespießt, und ohne Weiteres getrocknet, schrumpft ihnen der Bauch ein, oder faulst wohl

gar ab, und es verdrißt auch die Zeichnung. Unter diesen Umständen hat sich denn folgendes Conservationsmittel als das beste bewiesen. Man nimmt ein etwa sechs Zoll langes, an beiden Enden offenes Cylinderglas, und verschließt es an beiden Seiten mit einem Kork, wovon der eine eine Öffnung zum Auslassen der erhitzten Luft erhält. An den anderen wird nun die Nadel mit der noch lebendigen Spinne gesteckt, beide Öffnungen geschlossen, und der Cylinder an den Korkstöpseln über ein Licht oder besser Kohlenfeuer gehalten. So wie die innere Luft heiß wird, spreizt die Spinne ihre Beine, der Leib dehnt sich aus und erhärtet. Jetzt muß man acht haben, es nicht zu weit zu treiben, damit der Bauch nicht zerstehe. Hat man dies aber vermieden, so sieht eine solche getrocknete Spinne ziemlich natürlich aus, und ich habe noch überdem gefunden, daß wenn man sie dann in eine Auflösung von Colophonium in Terpentinöl, oder in mit gebrannten Alaun versetzten Leinöl taucht und wieder abtrocknen läßt, sie sich noch besser hält, ohne daß man das Del bemerkte, da selbst haarige Spinnen es völlig einsaugen.

### VIII. Maurerspinne.

#### Cteniza.

Das obere Ende des ersten Gliedes der Kinnbacken hat eine Reihe gegliederter, an ihrer Basis beweglicher Dornen, die eine Art Rechen bilden. Die Fußkrallen bloß liegend.

#### Die Maurerspinne.

#### Cteniza caementaria.

Fr. l'Araignée maçonne, Araignée mineuse.

Rostroth, etwa acht Linien lang, der Bauch mäusegrau, etwas dunkler gefleckt. An beiden Vorderfüßen ein Sporn.

Walekenaer histoire des Aran. Fasc. III, 10.

Im südlichen Frankreich und Spanien. Es ist die Gattung, deren tief gewundenes seidenartiges, mit einem Deckel verschlossenes Rohr als sehr künstlich bewundert wird, und deren Lebensweise vorn in der Anmerkung von einer verwandten korsikanischen

Gattung (*Ct. fodiens* *Walch.* oder *Mygale Sauvagessii* *Dufour*) angegeben worden ist.

## IX. W o l f s p i n n e.

### Lycosa.

Die Augen stehen in einem Viereck, welches länger als breit ist. Die beiden hintersten auf einer kleinen Erhöhung. Das erste Fußpaar ist etwas länger als das zweite, aber kürzer als das vierte. Die Kinnladen am inneren Ende schief abgestutzt. Der Bauch eugelrund oder länglich.

Sie leben bloß auf der Erde und laufen sehr schnell. Meist sind sie schwarzbraun und erdfarbig. Sie sind sehr gefräsig und vertheidigen mutig den Besitz ihrer Wohnung. Diese wählen sie in Löchern oder Höhlen, die sie selbst ausgraben, die Wände mit etwas Seide verstärken und sie vergrößern, so wie sie wachsen. Sie bringen daselbst einen Winterschlaf zu, nachdem sie die Öffnung verschlossen haben. Auch legen sie darin ihre Eier ab. Wenn sie umherlaufen, tragen sie ihren Eiersack mit sich, den sie mittels einiger Fäden am After befestigen. Die ausgetragenen Jungen klettern auf den Körper ihrer Mutter und halten sich einige Zeit da fest.

### 1. Die Tarantel.

#### Lycosa Tarantula.

Aranea tarantula.

Graubraun, das Kopfbruststück mit helleren Seitenstreifen, der runde Bauch oben erdbraun mit weißlichen, nach vorn zackig erscheinenden Querbinden, dazwischen schwarz; unten ist derselbe safrangelb oder rostroth mit einer schwarzen Querbinde. Die steifen Körperhaare dicht anliegend.

Hahn Arachn. Taf. XXIII.

Sie ist einen bis anderthalb Zoll lang und nebst den Beinen, sehr behaart. Diese sind schwarz geringelt, das Bruststück auf der Unterseite schwarz, Taster und Kinnbacken rostroth. Findet sich im südlichen Italien, zumal Apulien (in Neapel will sie

fast Niemand kennen, noch gesehen haben), bis heraus selbst an die deutsche Grenze, im südlichen Frankreich (L. *narbonensis*), Spanien, Nordafrika (zumal sehr groß bei Algier). Die des südlichen Russlands (L. *Latreillei*, *Hahn* T. XXIV<sup>a</sup>) ist auf der Unterseite ganz schwarz, oben das Bruststück mit schießen strahligen weißen Streifen und der dunkle Bauch mit einigen Querreihen hellern Flecken besetzt.

Man fürchtet sie jetzt nicht mehr, fast sie an, und findet die Folgen ihres Bisses unbedeutend. Der Taranteltanz ist daher eine Fabel. Es scheint auch, daß man ihn bisweilen mit dem Veitstanz verwechselt oder diesen absichtlich dafür ausgegeben hat<sup>\*\*</sup>). Ob sie die Alten gekannt haben, weiß man nicht; der erste Schriftsteller, der ihrer gedenkt, ist Nikolo Perotti, ein Philolog des fünfzehnten Jahrhunderts. Man will drei Sorten nach der Farbe unterscheiden: *alba*, *stellata* und *uvea*. Die erste nennt das Volk *zitella* und sie soll unschädlich seyn. Die zweite, *maritata*, schlimmer, die *vedova* die giftigste. Sie kommt bis Mailand vor, wiewohl selten.

## 2. *Lycosa fabrilis*.

Fast einen Zoll lang, oben aschgrau, das Kopfbruststück mit zwei langen vorn spiken braunen Flecken, der Bauch mit dunkelbraunen welligen Querstreifen, unten sammetschwarz; eine Varietät hat oben nur zwei braune Längsstreifen.

Panzer Fauna 120, Taf. 11. — *Hahn* V, Fig. 15, *Lycosa lugubris* und XXVI 76 L. *melanogaster*.

Fast einen Zoll lang und in den Wäldern nicht selten. Latreille nennt sie unsere hieländische Tarantel.

<sup>a</sup>) Eine russische Dame hat mir erzählt, daß ihre Schwester als Kind einst eine solche, mit Jungen bedeckt, bei Odessa gefunden, und sehr erfreut über diesen ihr unbekannten Fund in ihrem Tuche nach Hause getragen habe, ohne gestochen worden zu seyn.

<sup>\*\*</sup>) Eine ausführliche Beschreibung dieses Taranteltanzes ist zu lesen im *Nouveau voyage en Italie* 3. B., S. 59. — S. auch *Cancelieri* in der *Biblioteca italiana* v. J. 1817. — Anderes über diese Spinnen hat auch noch *Leo Dufour* in den *Annales des sc. nat.* Vol. III, p. 95 mitgetheilt.

### 3. *Lycosa saccata*.

Dunkel erdbraun, auf dem Rücken mit hellerem Längsfleck; auf dem Bauche zwei Reihen schwarzer mit weißen abwechselnden Punkten. Die Beine braun geringelt. 4" lang.

Panzer 120, Taf. 8.

Sie ist gemein in Gärten. Mitte April findet man schon völlig ausgebildete Männchen. Im Mai tragen die Weibchen ihre blaugrünen Eiersäcke mit sich herum.

### 4. *Lycosa riparia*.

Schwarzbraun, das Bruststück fast schwarz, mit einer helleren Mittel- und Seitenlinie. Der Bauch mit zwei Reihen weißer und schwarzer Punkte.

Panzer 120, Taf. 19, 123, 1. — Hahn XXVII, 181.

An Ufern der Flüsse und Teiche; der vorigen sehr ähnlich.

Noch andere, z. B. *L. monticola*, wo das Männchen braun-schwarz mit einfacher heller Mittellinie ist; *L. paladicola*, mit dicken Schenkeln und mehr aschgrauer, schwarz punktierte und gefleckter Oberseite; und *L. lignaria*, einfärbig braunschwarz mit fast schwarzem Bruststück, kommen nicht selten vor.

## X. Dolomedes.

Die Augen stehen in drei Querreihen, unten vier, darüber zwei, dahinter noch zwei, weiter auseinander und auf einer Erhabenheit. Das zweite Fußpaar ist so lang als das erste, das vierte das längste. Der Bauch von Gestalt eines länglichen zuspitzten Ovals.

Die Weibchen bilden sich in den Gipfeln belaubter Bäume oder in Gebüschen ein seidenartiges Nest in Gestalt einer Glocke oder eines Trichters, setzen darin ihre Eier ab, und tragen, wenn sie auf die Jagd gehen oder genüthiget werden ihre Schlupfwinkel zu verlassen, stets ihren Eiersack mit sich herum, wo er auf der Brust befestigt ist.

#### 1. Dolomedes mirabilis.

Das umgekehrt herzförmige Kopfbruststück braungelblich, in der Mitte dunkelbraun mit hellem Mittelskreis; der Bauch länglich, röthlichgelb, an den Seiten rundum mit einem weißen, nach innen schwarz ausgebuchten Streifen. Die Füße sehr lang. 8".

Hahn Fig. 120.

Sie läuft äußerst schnell, und vertheidigt ihren Eiersack auf alle Weise.

#### 2. Dolomedes fimbriatus.

Das Bruststück dunkel olivenbraun, seitlich gelblicher Längsstreif. Der Bauch olivenbraun, seitlich heller, mit weißen Punkten. Auf sumpfigen Wiesen.

Hahn Taf. IV, Fig. 10—12. — Panzer 122, Fig. 9, 10.

### XI. W ü r g s p i n n e.

#### Theraphosa.

##### Bogespinne. Mygale.

Die Taster sind am vordersten Ende der Kinnladen eingesenkt. Die Haken der Kinnbacken nach unten, längs der scharfen Kante derselben eingeschlagen. Acht Augen, auf einer kleinen Erhabenheit vorn zusammengehäuft, jederseits drei, ein verkehrtes Dreieck bildend, quer dazwischen noch zwei. Das vierte Fußpaar, hierauf das erste, sind das längste, das dritte das kürzeste. Die Sohlen sind mit dichten Bürstenhaaren breit besetzt, so daß sie die Klaue verbergen. Die Unterlippe ist klein, fast viereckig, das letzte Tasterglied der Männchen kurz, knopfförmig verschiedentlich gebildet. Die beiden vorderen Schienbeine der Männchen sind mit einem starken Dorn oder Sporn am unteren Ende versehen. Die äußeren Spinnwarzen viel länger als die inneren.

Es sind die größten Spinnen, deren manche in der Ruhe einen Umkreis von sieben bis acht Zoll einnehmen. Das männliche Organ der Taster gleicht einer Glashärde oder einem erhärteten Tropfen Pech, mit einer krummen Vorste am Ende.

Sie leben in Baumspalten, Erdlöchern unter Steinen &c. und weben ein Fuß langes, einige Zoll weites seines Rohr von einer Substanz wie Musselin.

Ihr Biß ist gerade nicht gefährlich oder giftig, allein je nach Umständen doch schmerhaft und aus Schreck oder Vorurtheil die Angst vergrößernd. Ohne Anreizung greifen sie auch nie den Menschen an, ihr Anblick soll aber grausig seyn. Sie bringen an Hundert Jungs. Ihre Nahrung besteht meist aus ungeflügelten Insekten (Mäuseln u. dgl.), die sie auf der Erde finden, Colibri's fressen und fangen sie nicht, wie die Merian erzählt und selbst abbildet, doch gehen sie in der Noth an Fleisch, Melonen u. dgl. \*).

### 1. Die große Würgspinne.

#### *Theraphosa Blondii.*

*Mygale Blondii Latr.*

Rotbraun bis schwarzbraun, der Körper über drei Zoll lang und anderthalb breit, ohne die Beine.

Hahn Arachniden Taf. VII. — Pohl und Kollar Fig. 1.

Wohl die größte Gattung. Kastanienbraun, ganz haarig, aber ohne Stacheln. Findet sich in Cayenne, Surinam, St. Domingo und anderen Antillen, und besucht gern die Schlafstätte der Reisenden. Ihr Biß verursacht Entzündung und Fieber, wogegen Oeleinreibungen helfen.

Das männliche letzte Tasterglied hat bei dieser die Gestalt eines Ohrloßfelschens.

### 2. Die sogenannte Vogelspinne.

#### *Theraphosa avicularia.*

*Mygale avicularia. Aranea avicularis L. Fr. Araignée-crabe.*

Schwarzbraun sehr behaart, das Ende der Palpen, der Füße und der unter dem Mund stehenden Haare rostroth.

Hahn I. c. Taf. XXV. — Kleemann bei Rösel XI, XII.  
Das Männchen.

\* Im Jahre 1834 war eine lebendige solche Spinne mit einer Ladung Campefcheholz nach Stettin gekommen, wo sie noch einige Wochen lebte.

Etwa anderthalb Zoll lang, meine Exemplare fast schwarz, das Geschlechtsorgan der Palpen hohl, wie eine Glashöhle ge-  
staltet und in eine scharfe Spieß endigend. Sie kommt in ganz  
Südamerika in hohlen Bäumen vor.

Eine ähnliche, viel größere (*Th. cancerides*) ist zumal auf  
Domingo zu Hause. *Th. fasciata*, erdbraun mit weißen Gelen-  
ken, ebenso groß, auf Ceylan; noch eine kommt am Cap vor  
und eine fünfte selbst in Spanien.

### XII. Oxyopes.

Die Augen stehen zu zwei und zwei, in vier Querreihen,  
die ein abgestuftes Oval bilden. Das erste Fußpaar das längste.

#### *Oxyopes variegatus.*

Das Männchen dunkelbraun, weiß bestäubt. Das Weibchen  
rostgelb; beide auf dem Kopfbruststück mit einem weißen, nach  
hinten gabeligen Streif, der Bauch oben, nach vorn mit einem  
rhombischen, nach hinten in mondförmige Querstreifen übergehend.  
In allen Wäldern. 4".

Hahn Fig. 121. — Panzer 131, 1, 2.

### XIII. Segestria.

Vier Augen in einer Reihe vorn, hinten zwei, hinter den  
äußersten.

Sie halten die Mitte zwischen Wolfs- und Röhrenspinnen.

#### *Segestria senoculata.*

Mit schwarzbraunem Bruststück, der Bauch grünlichbraun  
punktirt und mit einer Reihe dunkler Querspots über die Mitte.  
Die Füße hellbraun, schwarz geringelt.

Hahn 1, Fig. 2.

Sechs Linien lang, in Mauerlöchern, unter Steinen, in  
einem weißen Rohre verbreitet. Weben sich in den Mauern lange  
zylindrische Röhren, aus denen sie das vorderste Fußpaar strecken.  
Divergirende Fäden am Eingang dienen zum Fang der Insekten.

Sind an ihren sechs Augen, statt acht, leicht kennlich. Sie ist sehr muthig, und bestÄt, auch hat sie ein zÄhres Leben.

## XIV. Drassus.

Die acht Augen in zwei Reihen, ziemlich vorn, die hintere Reihe etwas breiter. Die Kinnbacken stark, sehr hervorstehend, dick, unten gezähnt; die Unterlippe ein unterhalb abgestuftes Oval. Die vierten Füße, sodann die ersten, die längsten. Die Spinnwarzen groß.

Sie leben unter Steinen oder Blättern und weben sich Zellen von einer sehr weißen Seide. Die Cocons einiger sind rund und platt, und bestehen aus zwei Klappen.

### 1. Drassus lucifugus.

Braun, mit schwarzem, seidenglänzenden Bauch. In Häusern. Panzer 137, 4.

Sie schimmert silbergrau, sammetartig und ist etwa einen halben Zoll lang, das Männchen kleiner. Häufig in Häusern oder außen an denselben. Kommt nur in der Dämmerung und des Nachts zum Vorschein.

### 2. Drassus relucons.

Macaria fulgens Walk.

Klein, kaum einige Liniен lang, fast cylindrisch, schimmernd, rothbraun, das Kopfbruststück mit einem hellen sechzstrahligen Fleck, auf dem Bauch hellgelbliche unterbrochene Querflecken. Die Füße ockergelb, die Schenkel der vorderen schwarz.

Panzer 129, 14. — Hahn Fig. 143.

Sie variiert sehr und ist frisch mit einem Goldschimmer versehen, der sich aber durch das Abreißen der Härchen bald verliert. Auch hat sie einige Goldpunkte. Sie läuft auf der Erde und ist im Ganzen nicht selten. Ihr Eiersack gleicht einer Linse.

3. *Drassus murinus.*

*Drassus fuscus* Koch.

Braunröhlich, glanzlos, mit stark behaarten Füßen; der längliche Hinterleib dicht mit mäusefarbigen Härchen besetzt. 4 Linien.

Hahn 141.

Sie lebt unter Steinen in Gebirgswäldern und ist auch nicht selten.

4. *Drassus melanogaster.*

Kopfbruststück dunkelbraun, der Bauch oben mäusegrau, unten weiß. Füße und Kinnbacken sehr haarig, letztere schwarzbraun und glänzend. An 8" lang. Der platte Eiersack hat fast einen Zoll im Durchmesser. In Gebirgsgegenden unter Steinen.

Hahn Fig. 102.

5. *Drassus cinereus.*

Röthlichweiß mit hellaschgrauem Bauch, der dicht mit Härchen besetzt ist. Die Füße hellgelb. An sonstigen Waldsäumen.

6. *Drassus ater.*

*Melanophora subterranea.*

Ganz schwarz, mit Kohlenglanz. Das zweite Tasterglied der Männchen sehr groß, bräunlich. Die Füße haarig, der Bauch fast cylindrisch. Klein, an Feldrainen, läuft sehr schnell.

Panzer 120, Fig. 20, 21.

Eine grasgrüne Gattung, *Dr. viridissimus*, lebt auf Birnbäumen, deren Blätter sie mit einem weißen, zeltdiagrammigen Gewebe überzieht.

XV. *Glubiona.*

Vorn sechs Augen, die äußeren auf einer kleinen Erhöhung; hinter den mittleren zwei andere, die vier Spinnwarzen fast von gleicher Länge.

Sie bauen seidenartige Röhren in Mauerrithen, unter Steinen oder an Blättern wie die vorigen, gleichen aber im Bau schon mehr den folgenden. Ihre Eiersäcke sind kugelig.

#### 1. *Clubiona holosericea.*

*Clubina amarantha.*

Kopfbruststück und Füße weiß-grüngelblich, jenes schwarzgesäumt, der Bauch röthlich-schwarz, dicht mit grauen, hellschillernden Härchen besetzt. Die Kinnbacken schwarz, die Füße sehr haarig. 5".

Hahn Fig. 84, 85. — Panzer 139, 3. — De Geer VII, XV, 43.

Ueberall unter der losen Rinde alter Bäume; auch auf Geesträuch.

#### 2. *Clubiona atrox.*

Kopfbruststück und Kinnbacken rothbraun, der Bauch schwarzbraun, mit einem länglichen, schwarzen, gelb umsäumten Fleck. 7" lang. In Mauerlöchern durch ganz Europa.

Hahn Fig. 87.

#### 3. *Clubiona nutrix.*

*Anyphaena nutrix.*

Kopfbruststück und Kinnbacken röthlichbraun, Bauch und Füße grün, ersterer mit schwarzem Mittelfleck. 6 Linien. Auf Gebüsch.

Hahn Fig. 98.

### XVI. *Tegeneria.*

Die vier vorderen Augen bilden eine nach hinten gekrümmte Bogenlinie. Die beiden oberen Spinnwarzen sind länger.

Sie versetzen sich in unseren Wohnungen, in den Winkeln, auf Pflanzen und in Hecken, auch an Wegerändern (*T. campestris*), bald in die Erde bald unter Steinen, ein großes horizontales Gewebe, an dessen oberem Theil sich ein Rohr befindet, in welchem sie, mit vorgestreckten Füßen, ganz still sitzen.

## 1. Die gemeine Fensterspinne.

### *Tegenaria domesticia.*

*Aranea domesticata* L. *Agelena civilis* Sundevall. Die Hausspinne. Fr. Araignée. Engl. House-Spider. It. Ragno.

Grau ins Bräunliche, mit zwei braunen Strichen über das Kopfbruststück; der Bauch kugelig, aschgrau, etwas wülfelig schwarzgesleckt, die Füße braun geringelt.

Brandt und Raheburg Arzeneith. II, Taf. XVI, Fig. 7—9.

Die Männchen sind kleiner und stärker behaart, oft fast schwarzbraun. Sie ist in mehreren Häusern sehr gemein, und die eine der zu den Wetterbeobachtungen (s. d. Allgemeine dieses Geschlechts) dienenden Arten. Man findet sie durch ganz Europa, vom nördlichsten bis zum südlichsten und vielleicht gibt es auf diesem weiten bevölkerten Raume dieses unseres Welttheils kein Haus, das nicht eine hegte. Sie hält sich nur an schmutzigen Orten oder an ungehörten Winkeln auf, ist da aber auch sogleich zur Stelle, wenn der Raum ihr zugänglich ist. Am liebsten wählt sie einen Winkel, mit irgend einem Spalt oder einer Rieze, in welche sie sich flüchten kann. Ihr Gewebe ist stets horizontal, zwischen zwei Eckwänden, oben offen, oder, wenn dies an der Decke, auch an dieselbe angelegt, und nur seitlich offen. Es ist nie genau in einer Ebene, sondern stets etwas beutelsfmig, und je nachdem es mit vielen Fäden an der Wand befestigt ist, vertieft, und andern Orts wieder erhaben. In der innersten Ecke, im Winkel des Gebäudes, hat es etwa einen halben Zoll großen cylindrischen Kanal oder Rohr, an dem es wie an einem Stiel hängt. Offenbar ist also der flache Theil des Gewebes nur wie der flache Rand einer irregulären Blume zu betrachten, so wie man das Gewebe einer Kreuzspinne einen nach allen Seiten verflachten Trichter nennen kann. In jenem Rohr sitzt die Spinne und geht aus und ein.

## 2. *Tegenaria stabularia.*

*Arenaria domesticata* Schäffer, Clerk, Walk.

Gelbgrau, das Kopfbruststück vorn und hinten mit zwei kurzen dunklen Längsstreifen, und an jeder Seite drei halbrunde

braune Flecken. Der Bauch vorstig, erdgelb, dicht mit braunen Strichen und Pünktchen besetzt. Auf der Mitte ein rostrother Längsstreif und beiderseits an diesem eine gelbe Fleckenreihe auf schwarzem Grunde. Die Beine sehr lang und stachelborstig. In allen Theilen der Gebäude, nur nicht in Kellern.

Panzer 125, 13.

Eine andere ziemlich große, röthlichbraune Spinne, deren Rücken hinten zwei braune Striche hat, mit einen haarigen braunen, rothbraun gesleckten Bauch und langen hesslen Beinen (T. cubicularis Koch 125, 12) kommt jenseits der Alpen in den Gebäuden vor.

### 3. *Tegeneria scalaris.*

Den vorigen sehr ähnlich, aber größer und schlanker, die Beine länger, und, wie die Taster, stets ungeringelt.

Brandt u. Raheburg II, XIV, 6.

### 4. *Tegeneria labyrinthica.*

*Agelena labyrinthica.*

Graugelbröthlich, das Kopfbruststück mit zwei braunen Streifen und Rändern, der Bauch braunroth, mit zwei Reihen schiefer weißer Streifen oder Flecken. Die Füße ziegelroth, dunkler geringelt.

Hahn Fig. 5, 1. — Panzer 125, 23, 24.

Einen, ja anderthalb Zoll lang. Allenthalben auf Feldern, Wiesen und Hainen.

## XVII. *Wasserspinne.*

### *Argyronecta* \*).

Vier Augen quadratisch in der Mitte, zwei schiefe aneinanderstehende jedersorts, auf einer Erhöhung; eine dreieckige Unterlippe.

---

\* ) Nicht *Argyroneta*, wie man den Franzosen nachschreibt.

*Argyronecta aquatica.*

*Argyroneta aquatica.*

Braun, das Kopfbruststück mehr ins Röthliche, der Bauch weiss wie sammetartig, angelaufen, die Füsse schwarzbraun; die vordersten die längsten.

Hahn Fig. 118. — Panzer 134, 21, 22. — Degeer VIII, XIX, Fig. 5.

Sie ist etwa 7—8<sup>mm</sup> lang, das Männchen grösser als das Weibchen. Lebt in allen stehenden Wassern und schwimmt darin, den Leib in eine Luftblase gehüllt, und bildet sich auch im Wasser eine eisförmige mit Luft gefüllte Schale, die mit Seide ausgekleidet ist, und von welcher Fäden nach allen Richtungen ausgehen, die an die benachbarten Pflanzen geheftet sind. Sie stellt da nach Beute auf, befestigt daselbst ihre Eierhülle, die sie unangesezt bewacht, und schliesst sich darin ein, um den Winter zu verbringen.

Auch diese merkwürdige Spinne gibt Anlaß zu Betrachtungen über die Schöpfung. Offenbar ist sie ein Wasserthier einer Landgattung, vielleicht einer Clubiona oder einer Drassus, ebenso wie sich die Wasservögel auf die verwandten Landvögel zurückführen lassen. Wenn aber eine so kleine, schwerlich über Landstrecken hinweg, von einem Weiher zum anderen wandernde, zarte, leicht verleschliche Spinne sich erwiesener Maßen in fast jeder Gegend Deutschlands, Frankreichs, Englands, Hollands, Dänemarks, Schwedens u. s. w. findet, so muß man billig fragen, wie es die Natur angefangen habe, diese Gattung überall hin zu verpflanzen.

Degeer hat sie viel beobachtet und gibt ihr Nest von der Größe eines halben Laubeneies an, welches wie eine Taucher-glocke gestaltet sey. Sie athmet durch den Afters, indem sie denselben aus dem Wasser streckt, um Luft zu holen, und sammelt diese unter dieser Glocke bis sie damit gefüllt ist. Sie streckt die Kinnbacken wie Scheeren vor.

**XVIII. Theridium.**

Vier Augen in der Mitte, im Biereck, wovon die beiden vorderen auf einer kleinen Erhabenheit; zwei auf jeder Seite,

ebenfalls auf einem gemeinschaftlichen Höcker. Das Kopfbruststück umgekehrt herzförmig oder fast dreieckig; der Bauch dick kugelförmig. Sie sind klein und der Vordertheil zumal bei den Weibchen sehr klein gegen den Bauch. Dieser ist meist schwarz, und bei mehreren mit hellen Flecken besetzt.

#### 1. *Theridium benignum.*

*Dictyna benigna* Koch.

Das Kopfbruststück dunkelbraun, der Bauch grauröthlichweiß, vorn mit einem großen dunkelbraunen Fleck, und dahinter kleine Querzeichnungen.  $1\frac{1}{2}''$  lang; überall; zumal an Weinstöcken.

Hahn Fig. 184.

#### 2. *Theridium quadripunctatum.*

*Eucharia bipunctata* Koch. *Aranea nocturna* L.

Braun mit schwarzem Kopf-Bruststück, der Bauch oben mit vier eingedrückten Punkten, und verschiedentlich abändernden Zeichnungen.  $2\frac{1}{2}''$ . In Gebäuden nicht selten.

Hahn Fig. 58. — Panzer 134, 10, 11.

#### 3. *Theridium fuscum.*

*Meta fusca* Koch. *Epeira fusca* W.

Das Kopfbruststück rostbraun, mit drei schwarzen Streifen; der Bauch olgrün, auf dem Rücken mit schwarzen Flecken, in der Mitte einem fleischrothen Streif. Glänzt fettig.

Panzer 134, 12.

In düstern Kesseln und feuchten Gewölben; fast von der Größe einer Hausspinne.

#### 4. *Theridium olivaceum.*

*Micryphantes olivaceus.*

Ganz olivenfarb; nur eine Linie lang; in Wäldern gemein. Panzer 137, 5.

#### 5. *Theridium longipes.*

*Micryphantes longipes.*

Ganz schwarz, das Kopfbruststück etwas heller, die braunen

Beine sehr lang.  $1\frac{1}{4}$  Linien. Unter dem Rasen und an Bäumen gemein.

Panzer 121, 22.

Eine verwandte, *Th. rubripes*, mit zimmtrothem Kopfbruststück und Schenkeln, findet sich nicht selten in Gärten, zumal auf Stachelbeergebüsche; und eine dritte, *Th. galeatum* (*Micyphantes galeatus*, Panzer 121, 23) ist schwarz mit rostgelben Beinen, beim Männchen steigt der Kopf in einen rechten Winkel aufwärts, wie ein senkrechter Cylinder. Sie kommt in Nadelhölzern vor und soll bei Regensburg gemein seyn.

#### 6. *Theridium redimitum*.

*Steatoda redimita* *Sundeval*. *Aranea coronata* *Degeer*.

Wenig behaart, blaßgelb, über das Kopfbruststück eine dunklere Längslinie; der Bauch oben mehr oder minder rosenroth, oder nur mit rosenrothem Einsch und schwarzen Punkten in der Mitte. 3—4" l. Macht ihr Nest aus einem zusammengerollten Blatt. Ueberall.

Hahn Fig. 65.

#### 7. *Theridium lunatum*.

*Theridium sisyphum*.

Rothbraun mit dunklen geringelten Füßen; der sehr bucklige, abwärts geneigte Bauch schwarz, nach hinten mit weißen, gelblich- oder röthlich-geschweiften Querstreifen. Klein.

Hahn 132. — Panzer 131, Fig. 11, 12.

Sie spinnt unter bedeckten Stellen und fällt bei der geringsten Berührungen an einem Faden zur Erde. Ueberall.

#### 8. Die Malmignatte.

*Theridium tredecimguttatum*.

Schwarz, mit dreizehn blutrothen Flecken.

Rossi *Fauna etrusca* II, IX, 10.

Zu Corsika, Toscana und dem südlichen Frankreich. Ihr Biß soll sehr giftig, ja tödlich seyn.

## XIX. Pholcus.

Die Augen stehen auf einem Höcker und sind in drei Gruppen gertheilt. Eine jederseits, aus drei im Triangel gestellten Augen gebildet, und die mittlere dritte, etwas davor, aus zwei anderen, in eine Querlinie stehend.

### Pholcus phalangioides.

Lang, schmal, blaßgelblich oder bleigrau, haarig, mit fast cylindrischem, sehr weichen, gefleckten Bauche. Die Füße sind sehr lang und zart, mit einem weißlichen Ring am Ende der Schenkel und Schienbeine.

Hahn Fig. 119.

Sie findet sich häufig in Häusern und Kesseln und zittert mit den langen Beinen wie die Schnacken. Ihr Gewebe besteht aus wenigen schlaffen Fäden in Mauerecken. Das Weibchen klebt die Eier in einen runden nackten Körper zusammen, und trägt ihn zwischen den Kinnladen. 5" lang.

## XX. Linyphia.

Vier Augen in der Mitte, ein Trapezium bildend, die hinterseite, die breitere, und von zwei viel größeren und weiter abstehenden Augen eingenommen; die anderen paarweise gruppirt, eines jederseits, in schiefer Richtung.

Sie stehen zwischen den vorigen und den eigentlichen Radspinnen in der Mitte. Ihr Gewebe ist dünn, horizontal, nebst einigen anderen darüber gewobenen Fäden. Unten stehen sie in umgekehrter Stellung daran: hat sich ein Insekt gesangen, so beißen sie ein Loch in dasselbe, um es zu holen.

### 1. Linyphia montana.

#### Linyphia triangularis.

Blaß röthlichgelb; über den Rücken eine schwarze, vorn gabelige Linie; der Bauch braun, mit eckigen, braun und weißen Flecken und Binden. Unten ist er schwarz, oben weiß, mit einem

gezähnten violetten Streif beim Weibchen. Die Beine sehr lang, etwas haarig. 3" l.

Degeer VII, Taf. XIV, Fig. 13. — Panzer 127, 17, 18.

Allenthalben in Waldungen, Gärten und Feldern. Meist findet man beide Geschlechter beisammen.

## 2. *Linyphia frutetorum.*

Mit bräunlichem Kopfbruststück und schwarzem Bauch; beim Weibchen mit zwei zerrissenen weißen Binden, beim Männchen schlank. Die Füße rothbraun. Allenthalben auf Gesträuch, zumal am Rande der Wälder.

Panzer ib. 19, 20.

*L. bimaculata* unterscheidet sich nur durch zwei blaßgelbe Flecken auf dem Rücken des Bauches und ist ebenfalls gemein.

## XXI. Ufer spinne.

### *Tetragnatha.*

Die Augen stehen in fast zwei parallelen Reihen; vier und vier, durch gleichgroße Zwischenräume getrennt. Die Kinnbacken sehr lang, zumal bei den Männchen; die Kinnladen lang und schmal.

#### Die gemeine Uferspinne,

#### *Tetragnatha extensa,*

ist gelblichgrün mit langgestrecktem, nach hinten etwas verschmälerstem Bauch, der an den Seiten einen perlblau matten Silberschimmer hat. Die Füße, zumal die vorderen, sehr lang.

Hahn Fig. 129. — Degeer VII, XIX, 1—4.

Sie ist eine Kreuzspinne der Wasserräuber, gleichsam wie die Reiher unter den Vögeln. Sie macht an Flussufern, Teichen und Sümpfen ein senkrechttes Radnetz, zwischen Schilfzweigen, und sitzt ganz still, die zwei vorderen Fußpaare fast geradauß nach vorn, die zwei hinteren geradauß nach hinten gestreckt. Die dicken Kinnbacken stehen weit hervor. 7—9" l.

## XXII. Kreuzspinnen. Epeira.

Die beiden seitlichen Augen sind einander paarweise genähert und berühren fast einander, die vier anderen bilden in der Mitte ein Quadrat. Ihre Kinnladen erweitern sich von der Basis an und bilden ein rundliches Plättchen.

Ihr Bauch ist in der Regel sehr dick, fast kugelrund, oder nach vorn jederseits in einen seitlichen Höcker ausgehend (z. B. *E. bicornis*, in den Wälzern *E. gigas* etc.). Diese Ecke scheint die erste Andeutung jener indischen Formen zu seyn, die mit wirklichen dicken Dornen besetzt sind, und jetzt als eigene Genera abgesondert werden.

Mehrere erreichen auch bei uns eine ansehnliche Größe, ja sind die größten unter den Luftspinnen. Ich habe welche gesehen, deren Bauch nahe die Größe einer kleinen Wallnuss erreichte. Dabei sind viele an diesem Körpertheil sehr zierlich gezeichnet, und von eigentlich angenehmer, perlgrauer oder ockergelber Grundfarbe. Allein ihre Größe und ihr schneller Lauf, wenn sie aus ihrem Gewebe herabgesunken sind, so wie die Eigenheit, sich ganz leise von der Decke herab an einem Faden bis auf den Menschen herabzulassen, ja ihn dann wohl gar zu kneipen, machen sie besonders zum Gegenstand der Furcht und des Widerwillens. Da gegen sind sie es, deren Gespinst die Bitterungszustände anzeigen (s. vorn) und welche für manche Personen ein Leckerbissen sind. Auf der Südsee, zumal Neuholland, soll es nach Cabillardiere eine sehr große Gattung geben, welche regelmäßig von den Einheimischen gegessen wird.

Sie machen, und, wie es scheint, nur die Weibchen, ein senkrechtes Radgespinst; nur *E. eucurbitina* macht es horizontal\*). Sie sitzen in dessen Mittelpunkt, den Kopf nach unten gerichtet; andere machen sich daneben eine von allen Seiten verwahrte, als Rohr oder durch Blätter verbundene, Wohnung, oder

\*) Eine solche wird auch wohl die von Reimarus (über die Triebe der Thiere S. 258) angeführte gewesen seyn, woraus er, sie für eine gewöhnliche haltend, so manche teleologische Folgerung gezogen.

eine oben offene, von Gestalt einer Obertasse oder eines Vogel-nestes. Zu Zeiten sitzen sie auch oben in einer Ecke ihres Ge-spinstes, und kommen, wenn sich ein Insekt gefangen, herabge-laufen. Sind sie fertig, so laufen sie wieder hinauf, kehren sich dann aber jedesmal um, um den Kopf nach unten zu richten: eine Handlung, die wenn man sie sieht, ganz wie die eines verstä-nigen Geschöpfes erscheint.

Sie leben nur einen Sommer, und legen im Spätherbst gegen Hundert rothgelbe, in eine Kugel mit Seide umspinnene Eier, aus denen man die Jungen im nächsten Frühling sich ent-wickeln sehen kann. Diese Eier bestehen fast bloß aus Dotter, wie Herold gezeigt, und die erste Entwicklung ihres Embryo in demselben beschrieben hat \*).

Vielesleicht sagt man nicht zuviel, wenn man an Hundert Species von ihnen rechnet.

#### 1. Die gemeine Kreuzspinne.

##### *Epeira diadema.*

*Aranea Diadema L.* Kreuzkanker. Fr. l'Araignée porte-croix. Engl. Cross-Spider, Hazel-Spider. It. Croceragna.

Rostbraun, sammetartig, der Bauch mit milchweißen, schwarz eingefassten Perlflecken, die vier vordere länglich, und ein Kreuz bildend.

Hahn Fig. 110. — Rösel Insektenbel. IV, Taf. 35, 36.

Bariert in der Grundfarbe von orangegelb bis lila-grau und selbst schwarz. Der Bauch der Männchen ist viel kleiner als der der Weibchen, und zeigt Gliederungen; der der letzteren ist, wenn sie trächtig sind, fast kugelrund mit einem stumpfen seitlichen Höcker vorn, und bisweilen einem dreifachen Kreuz von Flecken. Sie findet sich am häufigsten auf Holzplänen, in Ställen, verlassenen Gebäuden, wie Gartenhäusern, und scheint ihr Gewebe gern da, wo ein Luftzug ist, anzulegen. Sie ver-zehrt alle Arten Insekten, und weiß sogar über eine Hornisse Herr zu werden. Ihr Vaterland scheint ganz Europa, da man

---

\* ) Herold, de Aranearum generatione. Marb. 1824. fol.

sie in Russland, Schweden, Italien, England, Frankreich, Spanien u. s. w. findet.

## 2. Die Fensterspinne.

*Epeira calophylla.*

*Zygia calophylla.*

Der Bauch hellbraunlichgrau, auf der Oberseite mit einem lebhaft silbergrauen, fast viereckigen, seitwärts mit schwarzbrauem Saum eingefaßten Fleck.

Brandt und Raheburg Arzneithiere II, Taf. 14, Fig. 2. —

Panzer 123, Fig. 17—19.

An Gebäuden und Fenstern sehr gemein. Webt ein kleines, mehr horizontales Gespinst in einem Winkel.

## 3. *Epeira pyramidata.*

*Epeira scalaris.*

Das Kopfbruststück rostbraun, die Oberseite des Bauches gewöhnlich weiß, mit einem schwarzen, länglichen, gezähnten Fleck in Gestalt eines verkehrten Dreiecks. Variirt auch mit grünlichem und gelbem Bauche.

Panzer IV, 24 und 124, 17, 18.

Lebt auf Gebüschen, am Rande der Bäche und Sümpfe, in einer selbstgesponnenen Tute neben ihrem Netz.

## 4. *Epeira arundinacea.*

*Aranea apocissa. A. folium.*

Das Kopfbruststück röthlichgelb, mit feinen weißen Härchen belegt; der Bauch braun, mit einer über denselben weggehenden breiten hellen ästigen Blinde, in welcher wieder dunklere Flecken. Die Füße bläß, an der Spitze braun.

Panzer 131, Fig. 18—20.

In Sümpfen und Weihern, in den Rispen des Schilfes.

## 5. *Epeira fasciata.*

Das Bruststück silberfarbig, der Bauch schön gelb, mit abgesetzten gewellten schwarzbraunen Querlinien.

Walckenaer tableau des Aranéides III, T. 1.

Im südlichen Frankreich. Ihr Eiergespinst ist einen Zoll lang, und gleicht einer grauen Birne mit schwarzen Längsstreifen. Es ist mit einem Deckel von Seide verschlossen.

### 6. *Epeira euorbitina.*

*Aranea senoculata* *Fabr.*

Klein, das Kopfbruststück rostbraun, der Bauch eiförmig, eltronengelb bis ins Grasgrüne, mit schwarzen Punkten. 2—3 Linten lang.

*Panzer* 121, Fig. 13, 14.

Webt zwischen Pflanzenstengeln und Blättern ein horizontaler nicht sehr ausgedehntes Gespinst.

### 7. *Epeira sclopetaria.*

*Miranda ceropégia* *Koch.*

Braunroth mit röthlichgrauem, länglichem Hinterleib, mit blendendweißen, geschweiften, dunkel eingefaßten, aneinanderhängenden Längsflecken so gezeichnet, daß diese zwei längliche Einfaße bilden. Dazwischen schwarz punktiert. 7''' lang. An den Rändern der Getreidefelder.

*Hahn* Fig. 131.

## XXIII. *Nephila.*

Vier Augen in der Mitte im Quadrat. Federseits zwei seitliche dicht zusammenstehende, das vordere auf einem bauchigen Cylinder, das hintere auf einer Warze.

### *Nephila clavipes.*

*Epeira clavipes.*

Das Kopfbruststück von schwarzer Grundfarbe, aber dicht mit weißen Haaren überzogen; der lange Bauch gelb, mit fünf bis sechs Paar weißen Punkten. Die haarigen Füße rothbraun, mit aufgetriebenen Gelenken.

*Hahn* Fig. 89. — *Leach Zool. Misc.* II, T. 110.

Unterhalb soll lang. In Südamerika; nicht selten in den Sammlungen.

## XXIV. Dornspinnen.

### *Acrosoma.*

Unterscheidet sich von dem vorzesten Geschlechte durch den hautig-hornigen, mit harten, spißen dicken Dornen besetzten Bauch, was ihnen eine sehr sonderbare Gestalt gibt \*).

#### 1. *Acrosoma bifurcatum.*

Braun, mit gelbem, eilänglichem Bauch, auf dessen Rücken zwei spitze Dornen, und nach hinten seitlich zwei längere, dicke, in einen doppelten endigende, abgehen. 2" l. Brasilien.

Hahn Fig. 158. *A. sexspinosa.*

#### 2. *Acrosoma sexspinosa.*

Rothbraun mit gelbem, fast gleichseitigem, hinten etwas breiterem gefleckten Bauch, auf dessen Rücken zwei Paar zarte, spitze, aufgerichtete Stacheln, und hinten noch zwei dicke, rückwärts gerichtete stehen. 8—10" lang. Ebendaselbst.

Hahn Fig. 107. :

*A. militare* (Hahn Fig. 258) scheint wenig verschleden.

#### 3. *Acrosoma spinosum.*

*Araea spinosa L.*

Schwarz, der Körper mit gelben Seitenrändern; der Bauch oben gelb, schwarz gefleckt, an den Seiten mit vier aufrechten Dornen, hinten mit zwei sehr starken, spitzen, aufgerichteten, von der Länge des Bauches. Auch unterwärts noch zwei kleine. 5 Linien.

Hahn Fig. 210. — Degeer VII, Taf. 39, Fig. 9, 10.

\* ) Vergl. Perty delectus Animalium articulatorum, als Theil des naturhistorischen Werkes über Brasilien von Spix und Martius.

Auch diese, so wie alle verwandte Arten, stammen aus Südamerika. Es gibt noch mehrere kleine, mit einer Menge kleiner Dornen am Seitenrand des Bauches.

## XXV. *Gasteracantha*.

Die Augen wie zuvor, vier im Quadrat, in der Mitte jederseits zwei seitliche, aber weiter abstehend und dichter beisammen. Der Bauch ungeheuer breit, über das doppelte seiner Länge, an den Seiten in Dornen ausgehend.

Das Vaterland der meisten dieser ebenso sonderbar gestalteten Spinnen scheint Ostindien zu seyn.

### 1. *Gasteracantha transversa*.

Das Kopfbruststück schwarz; Bauch und Beine gelbbraun, jener glänzend, doppelt so breit als lang, mit einem Querkiel und vielen nierenförmigen Gruben. Zu jeder Seite ein großer kurmer Dorn, davor noch ein kleiner, hinten ebenso. 3" 1.

Hahn Fig. 259.

Eine ähnliche Gattung, *G. fornicata*, nur mit schwarzen Beinen statt gelben, findet man nicht selten in den Sammlungen. In Ostindien.

### 2. *Gasteracantha caneriformis*.

Kopfbruststück schwarz, Bauch und Füße braungelb, jener quer kreisrund, mit verfesten Gruben rund im Umkreis, und sechs kurzen Dornen. 3" 1.

Hahn 263.

In Amerika.

## XXVI. *Micrommata*.

Die Augen stehen vier zu vier, in zwei Querreihen, wovon die hintere länger, nach hinten gebogen. Die beiden ersten Fußpaare sind die längsten. Die Kinnladen stehen parallel und gerade. Der Körper länglich eisförmig.

### *Micromma smaragdula.*

*Sparassus virescens Walk.* *Aranea viridissima.*

Grasgrün, mit hellgelb eingefärbten Rändern; am Bauche gelbgrün, auf dem Rücken mit einer grünen Längslinie durchschnitten.  $7\frac{1}{2}''$ .

**Hahn** Fig. 89, A, B.

Sie vereinigt drei bis vier Blätter in ein dickes Paket, trapeziert das Innere mit dicker Seide, und legt in die Mitte ihren dicken Eiersack, durch welchen die Eier durchscheinen.

Diese Spinnen laufen an den glattesten Oberflächen hin.

## **XXVII. Thomisus.**

Die sechs vorderen Augen stehen in einem nach vorn gebogenen Halbkreis, in der Mitte dahinter noch zwei. Der Leib ist kurz, mehr herzförmig, wie bei den Krabben, die beiden vorderen Fußpaare sind meist einwärts gekrümmt, und viel länger als die beiden hinteren.

Sie leben auf Blumen, am Gebüsch und führen träge. Unansehn wie im Betragen sind es die wahren Krabbenspinnen (\*). Sie laufen auch seitwärts, wie Krabben.

### 1. *Thomisus calycinus.*

*Thomisus citreus.* Th. *Dauci.* Th. *pratensis.*

Reif schön citronengelb, mit nach hinten breiterem Bauch, an dessen Seiten vorn ein blutrother Streif.

**Hahn** Fig. 32, 27, 33.

Jung ist sie unrein grün, auch weißlich und braun gefleckt. Sie variiert auch ganz weiß. Findet sich sehr häufig auf Blumen, zumal Möhren und anderen Schirmfarnen.

---

\*) Von ihnen oder gewissen Epeira werden die Fäden ausgetrieben, welche abgerissen nachmals in der Lust den fliegenden Sommer bilden. Streck hat eine solche Spinnenart, in den Stoppel der Getreidehalmie sich versteckt haltend, insbesondere beobachtet und dasselbe *Aranea obtextrix* genannt.

2. *Thomisus gryseus.*

*Artamus griseus.*

Weltgrau, dicht behaart, der taschenförmige Bauch vorn je-  
seitlich mit einem oder zwei braunen Strichen. 3".

Hahn Fig. 91.

An Nadelholzgebüsch. Th. laevipes ihm ähnlich, mehr an  
Wänden; Th. pini ist braun mit einem runden fleischrothen Bauch  
über dessen Mitte eine sägeartig gezackte Längsbinde geht.

3. *Thomisus globosus.*

Schwarz, mit blutrothem Bauch, auf dessen Mitte eine  
schwarze blattartige Zeichnung. Auf Rosenstäcken. 2".

Hahn Fig. 28.

4. *Thomisus audax.*

*Xysticus audax.*

Mit schwarzem, hellgeflecktem Kopfbruststück, und graubrau-  
nem mit weißen Querbinden gezeichnetem Bauch.

Panzer 129, 16, 17.

In Gebüschen.

**XXVIII. Springspinnen.**

**Salticus.**

Mit vier Augen, wovon die mittleren größeren nach  
vorn auf dem Bruststück in einer Querreihe stehen, und die an-  
deren an den Seitenrändern, zwei zu jeder Seite. Sie bilden  
so eine große, hinten offene Parabel. Die Tarsen zeigen am  
Ende nur zwei Krallen. Die Taster der Männchen sind groß.

Es sind gedrungene, kleine Spinnen, oft mit viereckigem  
Kopfbruststück; ihre Füße sind kurz; sie laufen nur, springen in  
kurzen Sätzen, auch so auf ihre Beute, und lassen dann allemal  
einen kurzen Faden hinter sich.

*Salticus scenicus W.*

*Aranea scenica L.* *Cailiethra scenica Koch.* Gr. l'Araignée à chevrons.

Das Männchen obenher schwarz, das Kopfbruststück weiß eingefaßt, der Bauch ebenso mit schiefen weißen Fleckenstreifen fast wie gebändert, die Beine weiß geringelt, und mit gewaltig langen Tastern; das Weibchen am Leibe fast ebenso gezeichnet, aber mit ganz weißhaarigen Beinen.  $2\frac{1}{2}''$  lang.

Hahn Fig. 43, 44.

Eine weltbekannte kleine Spinne, die, wenn auch schwierig zu beschreiben, doch überall leicht anzutreffen und folglich zu kennen ist. Sie findet sich zumal häufig auf Dächern und in Fensterkästen, die da hinausgehen, hüpfst, und zeigt am Bruststück einen Metallschimmer. Es gibt noch viele verwandte Gattungen in Hecken, an Breiterwänden u. s. w. Bei einigen ist das Kopfbruststück größer als der Bauch. Eine andere S. s. *Heliophanus auratus*, glänzt ganz kupferig-metallisch durch ihren Überzug von Härchen.

---

Dritte Ordnung.

*Pyenogoniden.*

Eine kleine nur problematisch von Latreille hierher gestellte Ordnung, deren Rumpf aus vier schmalen Segmenten mit acht Lauffüßen besteht. Die Weibchen zeigen außerdem noch zwei falsche, in der Nähe der vorderen sitzend, die zum Tragen der Eier dienen. Der Mund bildet eine Saugröhre

Es sind Seethiere, den Uferspinnen verwandt, aber von ganz schmal liniensförmigem Körper, mit langen, vielgliedrigen Hakenfüßen. Einige Geschlechter haben Taster. Sie finden sich zwischen Seepflanzen, bisweilen unter Ufersteinen, und auf Walsfischen.

## XXIX. Walfischspinnen.

### Pycnogonum.

Ohne Taster noch Fühler, die Füße so lang wie der Leib.

#### Pycnogonum balaenarum.

Eiförmig, etwa vier Linten lang, blaßgelb.

Müller Zool. dan. CXIX, Fig. 10—12. Das Weibchen.

Lebt auf den Walfischen, und gleicht einer kleinen, rundum mit dicken gegliederten Beinen besetzten Spinne.

---

## Vierter Ordenung.

### Asterröpinnen.

Hier bildet der Körper schon ein Ganzes, indem Kopfbruststück und Bauch nur durch eine schwache Quersfurche geschieden sind. Ihre Kinnbacken sind wahre zweifingerige Fühlerscheeren, ihre Taster, an kleinen Kinnladen, sind fadenförmig und bestehen aus fünf Gliedern. Die acht Füße sind sehr lang, dünn, und behalten ausgerissen noch Tage hindurch Reizbarkeit. Sie haben nur zwei Augen, auf dem Rücken.

Um Tage sitzen sie still, mit äußerst regelmäßig ausgespreizten Beinen. Des Nachts dagegen springen sie lebhaft auf ihre Beute, und laufen, den Körper hoch tragend. Man findet sie am Fuße der Bäume, auf Pflanzen und abgefallenem Laub, auch an den Wänden sitzend.

## XXX. Asterröpinnen.

### Phalangium.

Mit hervorstehenden, kurzen Fühlerscheeren, fadenförmigen Tastern, und sehr langen, haarförmig dünnen Füßen.

#### 4. Der gehörnte Weberknecht.

##### *Phalangium cornutum.*

*Opilio cornutus.* Geist. Fr. Faucheur.

Bräunlichgelb, auf dem Vorderleib mit mehreren schwärzlichen Zeichnungen, auf dem Bauche mit einem rautenförmigen oder an den Seiten ausgezackten Längsstreifen. Die niedrigen Augenhügel oben in einem Kranze bedornt. Das zweite Glied der Kinnbacken geht oben in ein kleines Horn aus; sie selbst sind zurückgeschlagen, die Spitzen stehen schnabelförmig vor.

Hahn Fig. 161. — Degeer VII, Taf. X, Fig. 12.

Hie und da noch gemeiner als der folgende, und fälschlich für das Männchen derselben gehalten; übrigens gleichen sich beide. Ich sah einst ein solches Thier, das man angefaßt und wieder losgelassen hatte, das wahrscheinlich gequetschte Bein viemals quer durch das Maul ziehen, als wenn es dasselbe durch seinen Speichel wieder hellen wollte.

#### 2. Der Weberknecht.

##### *Phalangium opilio.*

Hellbräunlich, auf dem Rücken des hellen Bauches eine fast rautenförmige schwarzbraune Zeichnung. Die stark erhöhten Augenhügel bedornt wie bei den vorigen.

Hahn Fig. 160.

Herr Koch hat in dem eitirten Werke, so wie in der Fortsetzung von Panzer's Fauna noch eine Menge neuer Arten beschrieben und abgebildet, von welchen ich auch einige in dieser Gegend gefunden habe.

### XXXI. *Gonyleptes.*

Die Taster sind dornig, und endigen in eine starke Klaue. Das erste Fußpaar ist dünn und kleiner als die anderen.

##### *Gonyleptes horridus.*

##### *Phalangium horridum.*

Braun, borstig, mit rundem schwarzen Bauch und plattem

Kopfbruststück mit drei Streifen; das hintere Fußpaar das längste.  
 $2\frac{1}{2}''$  lang.

Panzer's Fauna.

---

## Fünfte Ordnung.

### Milben.

Die kleinsten aller Landthiere, viele bloß mikroskopisch sichtbar, zart, weich, aber doch widerliche, ekelhafte Parasiten und unter das Ungeziefer zu rechnen. Ungeachtet ihrer ausnehmenden Kleinheit sind sie meist sehr hurtig und lebhaft, und können daher leicht unbemerkt an Menschen und Thiere kriechen, und ihnen lästiges Zucken, Schmerz und andere Uebel verursachen.

Sie bilden eine sehr zahlreiche Gruppe, die wohl mehrere Hundert verschiedene Arten zählt. Obwohl einige seit der Anwendung des Mikroskopes schon näher untersucht waren, so verdankt man ihre genauere Auseländerung doch erst den Forschungen der neuesten Zeit, welche auch eine ganz neue systematische Anordnung derselben zur Folge gehabt haben.

Viele scheinen sich offenbar noch jetzt zu erzeugen, d. h. ohne Eltern zu entstehen. Denn man schneide nur ein ganz reinliches Stück Käse aus der Mitte eines frischen, und bewahre es in einem Schrank, in welchem noch nie Dergleichen gewesen, auf, und man wird es seiner Zeit mit diesen kleinen Geschöpfen bedeckt finden. Auch der weiße, mehlige, für Zucker gehaltene Ueberzug über alten gewekten Pfäulchen und Rosinen aus Milben, lässt sich gleichfalls nicht immer auf dem Wege der Fortpflanzung erklären.

Im Allgemeinen gleichen sie den Phalangen; einige scheinen ein Gewebe zu machen. Sie leben sowohl an und in der Erde, unter Baumrinden und Steinen, im Moos der Wälder\*) oder auf

---

\*) Um diese garten Geschöpfe zu fangen und zu beobachten, kann man sich eine ergiebige Ernte verschaffen, wenn man Moos, Rinden, abgefallene Blätter u. dgl. in die Vetausführbüchse einsammelt, zu

Kräutern, andere dagegen auf thierischen, todten wie lebenden Körpern, und saugen an ihnen wie vollkommene Parasiten. Ja es gibt auch hier einige, auf das Wasser angewiesene Gattungen.

Die sogenannte Läuscsucht soll eigentlich von Milben herühren. Die Kräzmilbe macht sich Kanäle unter der menschlichen Haut. Eine andere Gattung ebenso an den Pferden. Eine kleine Milbe, nicht größer wie eine Nadelspitze, auf den Antillen *bêtes rouge*, in Brasilien *Carabatos* genannt, hängt zu Tausenden an den Gräsern, und geht, wenn Menschen daran streifen, auf diese, wo sie ein Zucken von unerträglicher Pein erregt. Andere Arten quälen auf diese Weise die Singvögel im Käfig, da sie sich am Tage in deren hohlen Springstangen verbergen; mehrere Käfer sind mit Milben geplagt, ja *Acarus Acarorum* soll an den Beinen anderer Milben sitzen. *Acarus farinae* lebt in Mehl, auf Pfauen und Rosinen, andere Gattungen in Löchern, einige überspinnen und tödten die Pflanzen in Gewächshäusern u. s. w.

Sie haben nie einen gegliederten oder gestielten Körper wie die anderen Arachniden, sondern alles ist in eine Masse verschmolzen. Nur hier und da sieht man noch die Furche der Unterscheidung des Cephalothorax. Eine löffelförmige, scheldige Unterlippe schließt die Fresswerkzeuge ein. Nur die Maxillentaster sind frei. Sie haben fünf Glieder und Düges\*) unterscheidet ihrer siebenerlei Gestalten, a) Raubtaster (*palpi rapaces*), welche in der Mitte aufgetrieben sind, das vorletzte Glied mit einem oder mehreren Haken bewaffnet, und das letzte birnförmig oder stumpf haben; b) Ankertaster, den vorigen ähnlich, aber mit spitzem letzten Gliede; c) Spindeltaster, aufgetrieben wie die vorigen, stumpf wie die ersten, aber ohne Kralle am vorletzten Gelenk; d) Fadentaster, parallel liegend, nicht aufgetrieben; e) Fühlertaster, ebenfalls fadenförmig, aber mit in der Länge sehr verschiedenen Gliedern, welche ausgespreizt, aufwärts oder nach hinten gerichtet sind; f) Klappentaster, platt, ausgehöhlt, scheidenartig umfassend;

---

Hause auf Papier ausbreitet und dann sucht. Die gefangenen Thiere bringt man in kleine verschließbare Glasröhren. Auf einem Glasplättchen mit Gummi angeklebt, lassen sie sich sogar aufbewahren.

\*) *Recherches sur l'ordre des Acariens etc. in den Annales des sciences naturelles, par A. Dugès 1834.*

g) Hafttaster, die den größten Theil ihrer Länge nach an der Unterlippe angewachsen und sehr klein sind.

Die Füße bestehen im Allgemeinen aus sieben Gliedern. Palpenfüße heißen die, welche das siebente Glied aufgetrieben haben; Schreitfüße, deren letztes Glied sich nicht von den anderen unterscheidet. Ruderfüße, die, welche bei gleichem Bau noch gewimpert sind; Lauffüße, deren letztes Glied sehr lang und schlank ist; Webefüße, mit sehr kurzen krummen Krallen, deren vorletztes Glied mit, gewöhnlich vier, sehr steifen Borsten besetzt ist, welche über das Ende des Gliedes hinausreichen. Endlich Klunkerfüße, deren Krallen größtentheils in einer Karunkel, oder einer Haut versteckt liegen, welche dazu hilft, daß das Thier auf den aller-glättesten Flächen sich wie ein Blutigel festheften kann.

## XXXII. R o t h e M i l b e.

### T r o m b i d i u m.

Raubtaster; Kinnbacken mit Krallen; zwei Augen, an einem kleinen Stielchen sitzend.

#### T r o m b i d i u m holosericum.

Scharlachroth, der Körper viereckig; nach hinten schmäler, der Rücken flach, hinten mit knopfförmigen Papillen besetzt, daß er wie sammetartig aussieht.

Hahn Fig. 17.

Im Frühling gemein in Gärten; es gibt noch verwandte Arten, und in Ostindien eine andere, viel größere, welche eine rothe Farbe liefert. — Die Larven der hieländischen Arten leben parasitisch an den Beinen der Weberknechte.

## XXXIII. E r y t h r a e u s.

Mit großen Raubtastern; die Mandibeln mit Krallen; lange Lauffüße mit Krallen.

#### E r y t h r a e u s parietinus.

Roth, eiförmig, mit langbehaarten Beinen; läuft über Papier o. dgl. so schnell, daß er wie ein vom Winde fortgewehtes

Staubkörnchen erscheint, und wird im Moose mit nach Hause gebracht. Ebenso ein verwandter Karminrother (E. ruricola, Panzer 133, Fig. 5).

*Herrmann* mémoire aptérologique T. I, Fig. I, 12, und III, T. 1.

### XXXIV. *Tetranychus*.

Raubtaster kurz, auf dem Schnabel aufliegend; statt der Kinnbacken zwei kurze auf einem fleischigen Wulst stehende Spießen. Webfüße.

#### Die gemeine Spinnlaus.

##### *Tetranychus telarius*.

*Acarus telarius* und *tiliarum*. *Gamasus telarius* *Latr.*

Haarig, blaßgelb, röthlich, grünlich u. s. w.

*Herrmann* mém. apt. II, Fig. 12—15. — Das letztere der rechte.

Findet sich lieber nur zu oft auf den Blättern zumal der Malvaceen (Achania, Hibiscus etc.), in den zu sehr geschlossenen Gewächshäusern, aber auch im Freien auf Rosen, Linden u. s. w., deren Blätter sie auf der Unterseite überspinnt, und so die Pflanze krank macht bis sie stirbt. Die Blätter magern ab, und sehen rostiggelb und ziegelroth gefleckt aus. Das Thierchen ist so klein, daß man es kaum mit den bloßen Augen erkennt, und die Fäden kaum mit einem Vergrößerungsglas.

Düges hat sie sich unterwärts auf das Blatt richten, und sie wahrscheinlich die Säfte desselben saugen gesehen; sie lassen dann hinten flüssige gummiartige Exkremeente fahren. Sie legen ziemlich große Eier, aus welchen eine sechsfüßige Larve hervorgeht, die sich nach den Häutungen erst, wie bei allen, in ein achtfüßiges Thier vervollkommen. Es scheint, daß sie den Winter über unter Steinen zubringen. Sie werden aber auch anderen Insektenlarven zur Beute.

Verwandte Gattungen finden sich auf Nesseln, Ulmen und in anderem Gebüsch.

## XXV. Limnochares.

Der Mund besteht aus Blättern, die einen großen vorgestreckten Saugrüssel bilden, die Taster sind einfach.

### Limnochares aquaticus.

*Trombidium aquaticum* *Herm.* *L. holosericeus* *Hahn.*

Blutroth, unregelmäßig eiförmig, fast quadratisch, nach vorn kegelförmig, sehr weich und veränderlich, mit fast durchsichtigen Granulationen bedeckt. Die Augen groß, die Füße unbehaart, der Schnabel groß, cylindrisch, die Augen nahe beisammen.

*Hahn* VI, 24. — *Herrmann* I, Fig. 11 und IX, F.

Schwimmt nicht, sondern läuft nur langsam im Wasser. Die Larve lebt auf dem Lande und sitzt häufig an den Füßen der Wasserwanze, *Gerris lacustris*.

## XXXVI. Wasser milbe.

### Hydrachna.

Die Mundwerkzeuge sind gebaut wie zuvor, nur bilden die langen Taster am Ende eine Art Scheere. Der Schnabel ist lang, der Körper zugerundet. Die Vulva mit einem Schild bedeckt; die Füße behaart.

### Hydrachna cruenta.

Stemlich groß, das Weibchen  $2\frac{1}{4}$ " lang. Sie ist kugelrund, weinroth ins Braune, etwas durchscheinig. Die Augen stehen voneinander ab. Die sechsfüßige Larve lebt parasitisch im Wasser. Die reife Milbe sitzt oft an *Neba cinerea*, *Ranatra*, *Wasserkäfern* u. s. w.

Eine schwarze, scharlachroth gesleckte nannte Müller *H. geographicus*; sie ist gleichfalls nicht selten.

*Hahn* LIX, Fig. 134. — *Müller* *Hydr.* VIII, 3—5.

## XXXVII. Vogelmilbe.

### Dermanyssus.

Der Körper platt; die Taster fadenförmig, eingekrümmt, kurz und frei; Kinnbacken der Männchen scheerenförmig. Keine Augen. Die Füße mit langen Klauen und einer Karunkel.

### Dermanyssus avium.

*Dermanyssus gallinae. Gamasus gallinae et hirundinis. Acarus hirundinis.*

Dunkel weinrot, an der Kopfgegend mit einem hellen, dreieckigen Flecke, dahinter zwei Punkten, und zwei weißen bogenförmigen Flecken auf dem Rücken. Die Füße weiß.

Panzer 137, 14. — Degeer VII, Taf. VI, Fig. 13. — Herrmann Mém. apt. I, Fig. 13.

Der Körper ist hinten sackförmig erweitert und an den Seiten ein wenig eingedrückt. Die Farbe variiert.

Dieses Ungeziefer findet sich zu jeder Jahreszeit in Schwabennestern, Hühnerställen, Taubenschlägen und zumal den Vogelkäfigen, wo sie sich den Tag über in den hohlen Springstäbchen, wenn man nämlich dieselben von Schilfrohr versorgt hat, verborgen. Des Nachts kommen sie hervor, um den schlafenden Vögeln das Blut auszusaugen. Dieses gibt ihnen auch ihre braune Färbung. In jenen Röhren findet man auch ihre Eier, welche sich, wie die der Spinnen, nur allmälig vergrößern und endlich Beine bekommen.

Aehnliche Gattungen auf der Hausmaus (*D. musculi*) der Fledermaus, und, nach Dugès, auch auf den Ratten.

## XXXVIII. Käfermilbe.

### Gamasus.

Die Lippe ist dreispaltig; die Kinnbacken sind scheerenförmig, mit gezähnten Fingern; der Bauch trägt auf der Oberseite ein schuppiges Schild. Meist ist das zweite Fußpaar dicker als die andern.

**Camassus coleopterorum.**

**Acarus coleopterorum.**

Eiförmig, weißlich, gelb, rothbraun, mit weißlichem Astre. Der Rücken mit zwei hellen, durch eine Querfurche gesonderten Schildern, das hintere dreieckig.

**Degeer VII, 6, 15. — Rösel Insektenbelustigungen VI, Taf. IV, Fig. 13, 14.**

Auf den Exrementen der Ochsen und Pferde, von wo er sich in Menge an die darin lebenden Käfer heftet, und sie aussaugt. Oft findet man die großen Mistkäfer und Todtengräber ganz mit ihr besetzt und hat sich vorzusehen, daß man sie nicht an sich bekomme, da sie Zücken erregen. Sie laufen sehr schnell\*).

**XXXIX. F l e d e r m a u s m i l b e.**

**Pteroptus.**

Der Körper flach, mit einem lederigen rautenförmigen Schild bedeckt. Weder Augen noch Fühler.

**1. Pteroptus Vespertilionis.**

Dunkelroth mit einigen schwarzen Flecken und Streifen, hinten in eine Art Schwanz endigend. Die Füße haarig. Eine Linie lang.

**Herrmann Mém. apt. I, 14.**

Auf den Flatterhäuten vieler Fledermäuse in der Nähe der Fingerknochen angeheftet.

**2. Pteroptus abdominabilis.**

Gelblichweiß, mit dicken haarigen Füßen, das Bruststück breit, voller Grübchen.

**Panzer 137, 22.**

Eine der scheußlichsten Gestalten unter den lebenden Wesen.

\* Salzmann hat eine colossale Spezies dieses Geschlechts auf einem großen brasilischen Käfer, *Copris mimas*, gefunden. Sie waren so groß wie unsere Holzböcke.

Die Beine ganz dick wie Würmer und gegliedert, der Leib gegenförmig, ausgeschweift, mit schwarzen Linien. Wahrscheinlich gehört auch *Pteroptus acuminatus* Koch dazu. Auf *Vespertilio noctula*.

## XL. Holzbock.

### Ixodes.

Die Taster bilden Klappen und schließen den Schnabel ein. Die Unterlippe ist löffelförmig und gezähnt; der Körper ist mit einem hornigen Schild bedeckt; keine Augen; die Füße mit Krallen und Karunkeln.

#### Die Zecke.

#### Ixodes Ricinus.

Der gemeine Holzbock. Fr. Louvette. *Ixodes reticulatus*. *Cynorrhæstes pictus*.

Anfangs bleigrau, platt und faltig, so groß wie ein Hanfkorn, vollgesogen dunkelblutroth oder noch grau, und von der Gestalt einer eiförmigen, etwas platten Bohne.

Degeer VII, VI, 2. — Hahn Fig. 152.

Lebt mit den Verwandten seines Geschlechts in den Wäldern, wo sie leicht an Menschen und Thiere kriecht, sich in die Haut einschiebt, und ganz voll Blut saugt, so daß sie die oben angegebene Form, welche der der Samen des Wunderbaumes (*Ricinus communis*) gleicht, annimmt. Hunde, Ochsen und Pferde sind oft mit ihnen besetzt, und sie sollen diese Thiere bis zur Erschöpfung schwächen. Wenn man sich im Walde auf Moos lagert, oder wohl gar daselbst einschläft, kommt man leicht in Gefahr, welche zu erhalten. Ihr Stich ist sehr schmerhaft, da sich ihr mit Widerhaken versehener Rüssel tief in das Fleisch hineinschiebt, so daß man immer etwas davon mit losreißt, wenn man ihn gewaltsam herausziehen will. Öl und Tabakslauge sollen das beste Mittel seyn, daß sie von selbst sich entfernen; doch thun sie dies auch ohnedem, wenn sie satt sind.

Die Zecke heftet sich mit ihren zwei hakigen Vorderfüßen an niederes Gesträuch, und hält die hinteren ausgestreckt. Sie hat zu beiden Seiten des Nahrungskanals Blinddärme wie Säcke, die sich mit dem vollgesogenen Blut füllen, und dann bekommt

sie die violetten Zeichnungen, indem jene durchschimmern. In Weingeist wird sie ganz Kirschroth, und zeigt vorn den Rüssel und die kleinen Beine. Die Geschlechtsöffnung befindet sich unter dem Schnabel; es treten aus ihr eine unsägliche Menge Eier heraus, die sich um die Kopfgegend herum anhäufen.

Ein, wie es scheint, von den Neueren fast vergessener Aufsatz von Pfarrer Müller\*) enthält mehrere interessante Beobachtungen über diese Gattung. M. bemerkte die weibliche Geschlechtsöffnung unterhalb des Mundes. Er entdeckte auch auf einer weiblichen Zecke einen ganz kleinen, nur eine Linie langen, an Gestalt jenem ganz unähnlichen, wie ein Rübsamenkorn ausschenden Holzbock, den er nach Degeer und Chabrier, welche ihn gleichfalls bemerkten, und für das Männchen gehalten, in dieser Hinsicht ferner beobachtete, und jene Vermuthung bestätigte fand. Es senkte dieses Thierchen seinen Rüssel in die weibliche Geschlechtsöffnung, und vollzog so die Begattung. M. prüfte dies bei mehreren Individuen, und es ist merkwürdig, daß sich hier, bei diesen Landparasiten, das merkwürdige Missverhältniß der Größe wiederholt, was wir bei den Lernäen kennen gelernt haben. Der Körper dieses Männchens war eisförmig, platt, schwarzbraun. Die ganze Oberseite bildete eine hornartige, glatte, nur mit zerstreuten Punkten eingestochene Schale, dagegen bei den Weibchen nur ein kleiner Theil, hinter dem Kopf, ein solches Schild zeigt. Rings um den Leib herum tritt ein dicker weißer Rand, wie ein Wulst, hervor.

In wie weit es noch andere, diesen verwandte Species gibt, ist noch nicht hinlänglich untersucht. Hahn bildet noch (143) einen marginatus ab, und Kollar einen crenatus, um Rio de Janeiro, der an Sträuchern lebt, und, so wie man an einem solchen streift, sich zu Tausenden an die Kleider hängt, an die Haut zu kommen sucht, und da große Pein verursacht \*\*).

\*) J. Müller, Bemerkungen über einige Insekten, in German's Magazin der Entomologie II. B., S. 278.

\*\*) Brasilien's lästige Insekten v. Pohl und Kollar Taf. 1, Fig. 7.

Eine kleine rothe, in Frankreich im Herbst an Gräsern gemeine Milbe, von Latreille Leptus (s. Acarus) autumnalis, franz. Rouget oder bête rouge genannt, die sich gleichfalls an Menschen hängt, und durch Zucken belästigt, soll sechs Füße haben, und wäre dennoch nur eine Larve einer anderen.

Wahrscheinlich ist dieß eine von den oben, beim Allgemeinen, erwähnten Arten, die man dort Tiques nennt.

## XLI. Kräzmilbe.

### Sarcoptes.

Lippe und Zäster sind durch die Mandibeln bedeckt, dem Kopf ähnlich; die vier vorderen Füße von den hinteren weit abstehend; die Klunkern am Fussende glockenförmig. Der Körper oben und unten wie mit einem harten Schilde bedeckt.

#### 1. Die Kräzmilbe des Menschen.

##### Sarcoptes scabici.

*Acarus scabici* Deg. *Acarus exulcerans* L.

Mit plattem, rundlichen, aber ungleichen, schildkrötenartigen Körper, auf dem Rücken mit steifen Papillen besetzt; die acht Füße braunroth, die vier hinteren nur in eine einfache Vorste endigend\*). *Raspail* l. c. T. 1, Fig. 1—7.

Schon seit undenklichen Zeiten wußten die südlichen Völker, aber nicht minder auch die Grönländer, daß die Kräze mit einem Insekt vergesellschaftet sey, das auch seinen eigenen Namen hatte, und welches die Weiber mit einer Stecknadelspitze auszuziehen verstanden. Ebenso war erwähnt desselben im zwölften Jahrhundert unter dem Namen Soab. Skaliger späterhin dergleichen, so wie mehrere Aerzte. Die erste bekannte Abbildung desselben befindet sich in den *Actis eruditorum* v. J. 1682, p. 317, Taf. XVII, Fig. E. E. E. Sie ist nicht sowohl unrichtig als vielmehr nur roh.

Im vergangenen Jahrhundert beachtete man dieses Geschöpf weniger, und Einige gingen so weit, gänzlich seine Existenz zu bezweifeln. Ein Hr. Gales machte in seiner Dissertation, im J. 1812, bekannt, er habe es wieder aufgefunden, und lud die berühmtesten Mitglieder des Instituts und der medizinischen Fakultät zu Paris zu einer Versammlung ein, um es ihnen zu zeigen; auch lieferte er eine elegante Abbildung davon. Leider ergab

\*<sup>o</sup>) *Raspail*, Naturgeschichte des Insekts der Kräze. U. d. Franz. mit Ann. v. G. K. Leipzig 1835.

sich nach einigen Jahren, daß G. alle diese Gelehrten absichtlich getäuscht hatte, indem er ihnen, statt der ächten, nur Käsemilben vorgezeigt, die er untergeschoben hatte. Und so wurde denn dieses Insekt abermals abgedäugnet, um so mehr, als man vieler Orten dasselbe bei mit jenem Ausschlage Behafteten nicht auffinden konnte.

Endlich lösten sich die Zweifel. Ein junger Mediziner aus Corsika, Renucci, der in den Vorlesungen zu Paris von den Streitigkeiten darüber hörte, theilte mit, daß man sowohl auf seiner Insel, als auch in Spanien und Neapel dieses Thier wohl zu finden wisse. Es bohre sich nämlich einen Kanal so fein wie ein Menschenhaar, unter der Haut, und wenn man am Ende desselben einen weißen Punkt bemerke, so dürfe man nur mit einer Nadel dasselbst einstechen, um es stets unversehrt herauszuholen \*), da es eine harte Haut besitzt.

Auf diese Angabe haben Raspail und Albin Gras \*\*) dasselbe jedesmal gefunden, so oft sie danach suchten, und es gelang auch Stannius und Köhler es in Berlin zu finden. Es erzeugt und verbreitet die Krähkrankheit.

## 2. Die Pferde-Kräh milbe.

### *Sarcopetes equi.*

Mit Klunkern an sechs Füßen; beim Männchen nur den letzten, beim Weibchen dem vorletzten Paare fehlend.

*Raspail* I. e. T. II, Fig. 7.

Viel größer, mit ebenfalls braunrothen Füßen, das obere Schild glatt. An fröhlichen Pferden.

Es scheint, daß es an vielen räutigen Hausthieren, namentlich Schafen \*\*\*) , Füchsen, Hunden, Katzen, Kaninchen und Rindern, so wie Mäusen, Ringeltauben &c. ebenfalls solche Milben gibt, von denen es noch nicht hinlänglich untersucht ist, ob sie sämmtlich eigene Arten ausmachen oder nicht. Man vermuthet,

\*) Die Kräh soll auf Corsika endemisch seyn. Die Eingeborenen nennen die Krähmilbe pedicello.

\*\*) Recherches sur l'Acarus de l'homme ou Sarcopte de la gâle de l'homme p. Albin Gras Dr. Paris 1834.

\*\*\*) Walz über die Natur und Behandlung der Schafräude. Stuttgart 1809.

daß diese Thiere die Milbe auch auf andere, so wie auf den Menschen übertragen können. Im botanischen Garten zu Paris hatte ein Thierwärter einst ein kräfziges Wombat abgebalgt, und darauf einen Krähausschlag bekommen, der sich durch größere Purpeln, größere Milben, und ganz unerträgliches Jucken bei noch stärkerer Röthe der Haut auszeichnete.

Schwefel ist bekanntlich das Hauptmittel zur Kur dieser ekelhaften Krankheit, indem er die Milben tödtet. Versuche, wo man sich durch Aufsetzen von Kräh milben, oder durch Inoculation des Eiters einen Ausschlag erzeugte, haben erwiesen, daß bloß durch Übertragung trächtiger Weibchen eine dauernde Räude oder beim Menschen eine wirkliche Krankheit erzeugt wurde, außerdem nur eine vorübergehende Entzündung.

## XLII. Milbe.

### Acarus.

Lippen und Läster wie zuvor; der Körper zwischen dem zweiten und dritten Fuß mit einer Furche umgeben, weich und aufgetrieben. Die Füße mit spitzer, häutiger Karunkel.

#### 1. Die Käsemilbe.

##### *Acarus Siro.*

Weiß mit steifen Haaren besetzt.

Degeer VII, T. V, Fig. 4, 10.

In Käse, trockenem Obst, Brod, an Fässern &c.

#### 2. Die Mehlmilbe.

##### *Acarus farinae.*

Kleiner wie die vorige, mit röthlichem Kopf und Füßen.

Degeer VII, V, Fig. 15.

Steht in unsäglichen Mengen in altem Mehl, wo man sie an dessen Beweglichkeit bemerkt, oder daran, daß durch den Staub desselben ganz gerade Linien gezogen sind, wie mit einer Stecknadel. Auch auf dürrrem Obst u. dgl.

A. focnarius K. (Panzer 138, 14) mit zwei schwarzen Rückenflecken, findet sich häufig in Pferdeställen, in vermodertem Heu.

### XLIII. Cheyletus.

Mit zwelfingerigen Scheerenfühlern, und dicken, armförmigen, in eine Sichel endigenden Fästern.

Die Schwäbennilbe.

Cheyletus hirundinis.

Weiß, mit violettschwarzem Körper; ein großer heller kreisrunder Fleck auf dem Bruststück, und ein ließförmiger jederseits zweiflüstiger über den Rücken.

Panzer 133, 20.

In den Nestern der Rauchschwalbe.

Eine andere, von Schrank zuerst beschriebene Milbe, die sich in alten, feuchtstehenden Büchern aufhält, und von ihm Acarus cruditus genannt worden ist, gehört ebenfalls in das gegenwärtige Geschlecht.

---

# Spezielle Zoologie.

---

## Insekten.

---



---

## Achte Klasse.

---

### Insekten.

355.

Die Insekten, in der Bestimmung wie sie von den Thieren der nächst vorhergehenden Klasse unterschieden werden, zeichnen sich durch eine äußerlich bemerkbare Umwandlung oder Metamorphose der Gestalt aus, bei welcher sie aus einem unreifen Larvenzustand in den der Reife übergehen, und dann sechs Beine haben, auch in der Regel mit vier Flügeln versehen sind. Sie werden dann erst fortpflanzungsfähig, und haben noch den für sie entscheidenden Charakter gegen die Vorigen, daß ihre Geschlechtsöffnung am hinteren Leibesende liegt.

356.

Sie bilden eine der zahlreichsten, vielleicht die reichste Klasse der Thiere, sowohl an Arten als an Individuen, und die Entomologen fangen bereits an, zu überrechnen, wie es wohl möglich zu machen sey, die Mengen immer noch ihnen zukommender neuer Species alle zu beschreiben. Swar hat sich neuerer Zeit auch die Zahl der Freunde dieses Zweiges der Naturkunde vermehrt, und sich somit die Arbeit besser vertheilt; für den Einzelnen wird es jedoch immer schwierig bleiben, das Ganze, in gleicher Ausdehnung, zu überschauen, und Viele beschränken sich

daher entweder nur auf eine einzelne Ordnung, Käfer, Schnitterlinge u. dgl., oder sie lassen sich nur auf die Arten ihres Vaterlandes ein, höchstens Europa's, und nehmen von den prächtigen, wundervollen Ausländern nur die merkwürdigsten in den Bereich ihres Studiums auf.

357.

Die Insekten sind aber auch ohne Widerrede diejenige Thierklasse, die auf ihre Weise, d. h. als die Welt im Kleinen, den menschlichen Geist auf das lebhafteste anspricht. Schon der Knabe wird zu ihrem Fang gelockt, einem Vorspiel der künstigen, kräftigeren Jagd. Nicht lange, so zeigt sich ihm die Metamorphose eines Schmetterlings, die er noch anstaunt, ohne sie zu begreifen. Mit wachsenden Jahren lernt der Jüngling und der Mann einsehen, daß ihm hier das raselose Leben der Welt, der innerste Zusammenhang der thätigen Natur, das Wesen der Vorsehung und der Weltregierung deutlich aufgeschlossen sey. Schnell wird er, bei wachsenden Kenntnissen, zur Bewunderung der endlos reichen Form, der äußeren wie inneren Organisation, der Zeichnung und Färbung hingerissen, und kann nun seinen logischen Scharfsinn im Unterscheiden wie im Bestimmen, im Ordnen und im Entwickeln aller der Naturgesetze, die diesen Erscheinungen zu Grunde liegen, in Ausübung bringen. Aus dem bloßen Sammler wird dann der denkende Beobachter hervorgehen; die Erscheinungen des durch Metamorphose bedingten Lebenslaufes werden der vergleichenden Anatomie und Physiologie, selbst der menschlichen, fruchtbar werden, wie sich denn der Philosoph, der Theolog selbst neue Belege seiner Demonstrationen gleich jenen älteren gewinnen kann. Genug, das entomologische Studium hat in unserer Zeit aufgehört, eine angenehme Spielerei zu seyn, weshalb sich denn auch gegenwärtig gereiste Männer ihm mit Eifer zu widmen pflegen.

358.

Möge man indes dabei ja nicht übersehen, daß das Belohnendste mehr als irgend eines der Naturforschung hier ganz besonders auf eigenem, d. h. auf Selbststudium beruht, und

ja nicht durch bloßes Anschauen fremder Sammlungen allein gepflegt werden kann. Diese Thiere sind zu klein und zu zahlreich, als daß eine oberflächliche, wenn auch oft wiederholte Ansicht so vieler, gewöhnlich in engen Raum zusammengesteckter, genug zu lehren vermöchte. Hier ganz besonders ist Selbstsammeln und Untersuchen unerlässlich, und darum dürften auch Anleitungen und genauere Nachweisungen des Verfahrens hier besonders am rechten Platze seyn, so wie die Anschaffung möglichst specieller Werke zum weiteren Nachschlagen und zum Bestimmen nicht genug empfohlen werden kann.

359.

Betrachten wir die Insekten aus dem Gesichtspunkt der allgemeinen Natur, so fällt ihre große Anzahl, Verbreitung und Rührigkeit in die Augen, so wie die schon oben (allg. Einl.) angegebene Eigenheit, daß sie vorzugsweise dem trockenen Lande angehören. Sie stellen die kleinere Thierwelt der Luft dar, wie die Mollusken und Infusorien die des Wassers. Von Seiten der Gestalt grenzen sie zunächst an die Ringelwürmer, zumal die des Meeres; und wenn man erwägt, daß eine ausnehmende Menge dieser Insekten ausschließlich auf Pflanzennahrung, ja die der parasitischen zur Erhaltung ihrer Nachkommenschaft ganz auf die anderer Landthiere angewiesen ist, so wird man immer wieder zu der Annahme gedrungen, daß sie überhaupt erst in Folge solcher Erdkatastrophen, wo Land frei wurde und Pflanzen entstanden, aus jenen ihren Ursprung genommen haben mögen.

360.

Dieser Gedanke findet auch noch eine weitere Stütze in der Vergleichung mit den analogen sich hier und gebenden Naturgeschehen. Wir finden in den Resten der Vorwelt die Spuren gigantischer Akte animalischer Schöpfung. Wie damals die mächtigen Formen der Urthiere, Mastodonten und Riesenkrokodile dem Ocean entstiegen, und ihnen ein Heer schwächerer, von minderem Umfange ans Land folgte, so können auch die gefiederten Luftbewohner nur aus der Metamorphose amphibischer Formen hervorgegangen seyn. Und in solchem Sinne wäre unsere Insektenwelt

in der That eine Wiederholung jenes gewaltigeren Altes. Die im Verhältniß so wenig zahlreichen Anneliden gegen die unermessliche Menge von Mollusken und Landinsekten deutet auch auf einen Uebergang jener in diese, wenn gleich man dabei nicht vergessen darf, daß die Natur nie nach einer einfachen, sondern nach vielen Richtungen und Verbindungen hin schafft. Hemipteren und Parasiten dñrn nach demnach nicht mit Schmetterlingen und Fliegen in eine Klasse geworfen werden.

361.

Alle Speculation aber, so bald sie Hand in Hand mit der Erfahrung geht, muß einen Fortschritt in der Wissenschaft versprechen, so wie jede dieser beiden Verfahrungsarten allein ausgeübt nur stationär bleibt. Die Vorstellungen der Alten oder der dunkelen Denker des Mittelalters, nach welchen Spinnen und Ungeziefer aus faulen Stoffen erzeugt seyn sollten, haben mit Recht keinen Werth, weil sie bloße Hypothesen ohne Beweise sind. Allein eben so schwach ist von der anderen Seite ein bloßes selbstgenügsames Spotten über annähernde Sähe, insofern es nur auf dem Dunkel eines mittelmäßigen, beschränkten Verstandes beruht. Wenn uns scharfsinnige Beobachter unter unseren Landsleuten Genitalien und Eier bei Pilzen und Infusorien gezeigt haben, so werden wir keinen Anstand nehmen, auch diesen Organismen eine Fortpflanzung zuzuschreiben, wenn schon sie gewöhnlich ohne Eltern hervorkommen. Wenn dagegen manche Ausländer, jenseits des Meeres, die originäre Entstehung vieler Organismen dadurch zu vernichten meinen, daß sie sagen: auf diese Weise könnte auch eine Schafherde aus einer Wiese hervorgegangen seyn; oder andere: die Schöpfung müsse denn auch aus Thon geknetet werden können; so erinnern sie damit nur zu schlimm an die eigene Armut ihrer Vorstellungsweise, die gar nicht ahnet, daß die Wirkung des höchsten Geistes hierbei immer mit verstanden sey. Gar gern gibt sich Geschmaclosigkeit das Unsehen von Intelligenz, und ein Auferbauen des Organismus aus Bläschen und Kügelchen, die man willkürlich zusammenholt, ist doch wohl auch nicht viel mehr als eine Selbstzufriedenstellung.

362.

Erfahrung muß sich auf Theorie beziehen, Theorie auf Erfahrung. Wenn wir beobachten, so geschieht es, um zu erkennen, ob das, was wir dachten, richtig war, wie es den Sinnen sich gestaltet, welche Gesetzmäßigkeit in ihm enthalten ist. Nie aber kann ein bloßes nüchternes Zusammentragen von Einzelheiten, so brauchbar es als erster Beitrag auch erscheinen mag, von Anwendung der höheren Geisteskräfte entbinden.

363.

Betrachten wir die Insekten bloß an sich, so werden wir zuerst einen ungeheuren Reichthum an individualisierten Gestaltungen und Zeichnungen gewahr. Nicht leicht erscheint die Spezifikation in der Natur größer wie hier, und dennoch zeigt sich dabei wieder das große Naturgesetz der Selbstbeschränkung. Die Insekten überschreiten nicht eine gewisse Grenze ihres Bau's, und so seltsame Formen, wie die, einer, wie platt getretenen, *Mormolyce phyllodes*, oder eines stäbchenförmigen *Phasma*, treten nur als seltenere Ausnahmen auf. Im Gegentheil sammeln sich die endlos mannigfachen Species in ziemlich einfache, physiognomisch leicht erkennbare Stämme, die zuletzt bis auf die sieben oder acht bekannten Hauptordnungen zusammengehen, wie sie uns als Schmetterlinge, Käfer, Fliegen u. s. w. schon aus dem gemeinen Leben bekannt sind. Diese aber zeigen nie Mittelstufen oder Uebergänge ineinander. Dagegen wiederholen sich bisweilen ein und dieselben Zeichnungen und Farbenvertheilungen in den verschiedenen Ordnungen, wie z. B. den Dipteren und den *Hymenopteren*. So wiederholen auch oft die kleinen hieländischen Species die Zeichnung und Bildung der großen indischen, was man am deutlichsten unter den Käfern und den Nachtschmetterlingen bemerken kann. Und so stellen sich auch in Physiognomie wie Naturell bestimmte Charaktere heraus, die man zumal bei den Käfern ganz denen der Säugethiere und Vögeln parallelisiren kann. Wie unter diesen reisende und milbtere Raubthiere, aasfressende, holznagende, amphibische u. s. w., so finden sich ganz gleiche Gruppen bei jenen, so daß man selbst die hartschaligen, schwerfälligen Rüsselkäfer mit den Elefanten, die Bockkäfer mit

den Wiederkäuern nicht unpassend verglichen hat. Die Buprestis möchte man die Colibri's und Paradiesvögel unter den Räfern nennen.

364.

Diese ganze specifische Ausbildung erreichen sie durch den Weg einer Metamorphose, die, je genauer man sie betrachtet, desto wunderbarer erscheint. Denn in der Larve ist meist noch keine Spur jener Individualität zu erblicken. Die Prachtläfer z. B. entwickeln sich aus einer mißfarbigen, weißen, ungestalteten Made erst zu dem herrlichen Purpur- und Goldglanz ihrer Flügeldecken, ganz so wie sich die schwarzen Scarabäen aus gleichen Larven hervorbilden. Selten zeigt sich die Färbung der Raupen mit der ihres nachmaligen Schmetterlings in Einklang, so daß in der Regel letztere schöner sind als jene, anderemal aber, wie bei den Raupen des Schwalbenschwanzes, des Wolfmilchschwärmers, des Todtenkopfes u. s. w. das Umgekehrte statt findet. Man kann daher schließen, daß hierbei eine sehr tiefe Bildungskraft verborgen wirke, die bald auf den früheren Stufen, bald auf den späteren erst zu Tage tritt. Allerdings sind schon in der Made oder Raupe die künftig zu entwickelnden Organe alle bereits angedeutet, man möchte sagen: entworfen<sup>2)</sup>); durch ein periodisches Ruhen bildet sich dieses Innere aus, und macht sich durch das Abwerfen der peripherischen, irdischen Hülle frei, und die vier Zustände des Eies, der Larve, der Puppe und des vollkommenen Insektes sind mehr einer Systole und Diastole, einem abwechselnd kontrahirten und expandirten, zusammenhängenden Zustande zu vergleichen, als einem getrennten. Es findet hierbei nicht bloß eine feinere Theilung, sondern auch eine Vergesistigung statt, indem mit jeder Verwandlung höhere und edlere Organe an die Reihe der Ausbildung kommen. Das fast ausschließliche Geschäft der Larve ist das der Ernährung und Absonderung, wobei sie ihr Gespinst macht; das des vollkommenen Insektes, die Funktion der Fortpflanzung, der reichlichsten Bewegung, der Sinnenthätigkeit, allein je nach den besonderen Familien

<sup>2)</sup> S. zumal in der Darstellung von Herold Entwicklungsgeschichte des Schmetterlings. Kassel 1815. 4. m. K.

theils auch des Verzehrens und Verwüstens, theils der kunstreichen Produktionen. Und so zeigt sich hier ebenfalls die ganze Poesie der Welt in aller Mannigfaltigkeit der Schöpfung. Neben unübertrefflich zierlichen Gestalten, prächtigen Färbungen und Besäßen von Gold, Purpur und Perlen, auf der anderen Seite häßliches Ungeziefer, lichtscheu, platt, weich, missfarbig und skinkend, bald einsam und in seltenen Individuen, bald in verheerenden Scharen lebend, peinigend, und unsere Ruhe störend, unsere Kleider, Wohnungen und Nahrungsmittel verderbend, bald wieder als lustig umherschwebende Lustläser oder Schmetterlinge eine Unterhaltung bei Tag und Nacht gewährend.

365.

Man weiß, wie das menschliche Ungeziefer durch Vernachlässigung sich in einem Grade vermehren kann, daß es selbst Abzehrung zur Folge hat. Auch der Flech ist jetzt über den ganzen Erdball verbreitet (wenn schon erst durch die europäischen Reisenden nach Otaheiti und andern Südseelinseln \*) verschleppt), aber in Afrika manchen Orts, so wie auf südeuropäischen Schiffen, so häufig, daß es dem Menschen nicht möglich ist, da auszuhalten, und er es vorzieht, die Nacht Fieber unter freiem Himmel zu verbringen. Der gefährlichen Folgen des amerikanischen Sandfloh's wird weiterhin gedacht werden. Auch eine Bremse (*Oestrus hominis*) legt ihr Ei an den Menschen, so daß die Made sich in dessen Fleisch einbohrt. Der Pein der Wanzen nicht zu gedenken, die oft in unsäglichen Mengen überhand nehmen; der Mücken in Indien, der größten Dual der Tropenländer, so wie auch unserer europäischen Mücken, zumal der Rheinschnaken, deren wührende Stiche schon Fieber erregen, und ein Gesicht verunstalten können. Von einer Sandfliege, zu St. Patras, so klein daß sie das Auge nicht sieht, spricht *Basil Hall* \*\*). Man fühlt bloß ihre heftigen Stiche. Sie fliegen massenweise ins Gesicht, wie wenn man eine Hand voll Sand in dasselbe würfe, und die Dual, die sie verursachen, soll unbeschreiblich seyn. Nur

\*) v. Chamisso in D. v. Kohebue's Reise 3. B., S. 145. — S. auch *Blumenbach de quorundam animantium coloniis* p. 15.

\*\*) *Travels in Mexico by Basil Hall.*

*Voigt, Zoologie.* Bd. IV.

däätetisch lebende und Wassertrinker bleiben besreit von ihnen, Säuer leiden dagegen unendlich.

Wer hat nicht über die Unbequemlichkeit, ja die Unverschämtheit der Stubenfliegen zu flagen; eines für uns in jeder Hinsicht unnützen, lästigen Insekts, gegen das kein Verjagen hilft, das zudringlich wie dreiste Bettler, sich immer wieder dahin setzt, wo man es nicht haben will. Und dieses Heer von Pelzigern des Menschen wird noch vermehrt durch die lichtscheuen, alles verzehrenden und verwüstenden Schaben\*) und Termiten, so daß der Mensch oft unmittelbar der Macht dieser Insekten, oder richtiger: der durch sie allmächtigen Naturkraft unterliegen muß. Nach v. Humboldt ermangelt Mexiko darum aller älteren Geschichte, weil gewisse kleine Insekten alle Dokumente nach einem Jahrhundert unwiderbringlich zerrungen, und gleiches soll auch in Ostindien oft mit den musicalischen Instrumenten u. a. Dingen der Fall seyn, so daß sich dort die höheren Künste um so schwerer verbreiten können.

Und nun vollends die Feinde des Landwirths und des Forstmanns, so wie des Naturaliensammlers! Die Pelzmotte \*\*), der Speck- und Pelzfäser, der Dieb, die Termiten, Schaben und Ameisen, zerstören ihm Borräthe und Geräthe; das Getreide verwüstet der rothe, der schwarze und der weiße Kornwurm; im Freien die Larven von Fliegen, Käfern und Schmetterlingen, die Maulwurfsgrille und Heuschrecke; dem Obst den Feldfrüchten, den Waldungen schaden gleichfalls viele, so wie auch fast alle Säugetiere und Vögel ihr eigenes parasitisches Ungeziefer, oft mehrere Species haben. Und so sind die Insekten selbst zum Theil wieder durch welche geplagt, indem namentlich die Raupentödter und Schlupfwespen ihre Eier an Raupen u. a. legen, daß

\*) Sie verzehrten Hrn. Bory de St. Vincent die Sohlen seiner neuen Stiefeln während er beim Gouverneur von St. Helena zu Tische saß.

\*\*) Durch einen Gedächtnissfehler habe ich S. 45 d. h. Num. angegeben, daß die Pelzmotten sich in den ersten Revolutionskriegen vorzüglich verbreitet hätten: es soll aber vorzüglich im siebenjährigen Kriege gewesen seyn, wo sie sich durch Matrizen der Soldaten in Frankfurt am Main eingestet, wie ich schon in meiner Uebersicht d. N.G. S. 501 solches richtig angegeben habe.

die auskriechenden Maden sich im Inneren von deren Leibern nähren und verpuppen, und dieß, wenn man Rosander glauben soll, bis ins Dreisache gehend. Denn so soll die Raupe der *Phalaena strobilella*, die in Tannenzapfen lebt, vom Ichneumon *strobilella* angefallen werden, der seine Eier wieder in sie absetzt; und gegen diese sey wieder der Ichneumon *moderator* erschaffen, eine ganz kleine Gattung, die ihre Eier wieder an die Larven des *I. strobilella* legt, wodurch diese verzehrt werden.

Eine Larve, wahrscheinlich eines zweiflügeligen Insektes, lebt eigens an einem Luftröhrenbläschen im Bauche einer Biene, der *Andrena aterrima*. Eine andere, der *Ocyptera bicolor* angehörig, setzt sich an das Luftholz einer *Pentatoma* (Wanze). Über beide hat *Leopold Dufour* im Jahr 1836 der Pariser Akademie v. W. berichtet.

Raupen fressen einander auf, daher man ihrer nicht zu vielerlei in einen zu ihrer Zucht bestimmten Kästen bringen darf; so die des *Cossus ligniperda* und der *Noctua trapezina* ihres Gleichen \*).

---

\* ) Als eine, wenigstens relativ vollständige (denn absolut könnte man am Ende jedes verzehrende Insekt hierher ziehen) Uebersicht der schädlichsten Insekten kann etwa folgende gelten:

Hymenopteren: schaden:	<i>Anobium tessellatum,</i> <i>pertinax</i> den Büchern, <i>panicum</i> den Harbarien, <i>Plinus</i> für den Büchern und Hausgeräthe
<i>Hylotoma rosarum,</i> enodis, pini zumal den Kiefern,	<i>Nitidula aenea,</i> <i>Dermestes lardarius</i> Pelzwerk, <i>pellio</i> Naturaliensammlungen,
<i>Tenthredo Pinastri ebenso,</i> Juniperi, crythrocephala, cineta, Cerasi, flava, Grossulariae,	<i>Cetonia aurata,</i> <i>Melolontha Fullo</i> den Fichten, <i>vulgaris</i> Wurzeln, <i>Hippocastani</i> Eichen, Pappeln,
<i>Sirex gigas</i> dem Holze;	<i>Amphimalla solstitialis,</i> <i>Anisophia horticola,</i> fruticola,
Käfer:	<i>Tenebrio molitor</i> dem Mehl, <i>Apate capucinus,</i>
<i>Zabrus gibbus</i> dem Getreide. (Ge- doch nach Erichson zweifel- haft.)	
<i>Agriotes segetis</i> ebenso, <i>Agrilus viridis,</i>	

Dagegen kann man auch die unmittelbare Nützlichkeit der Insekten für den Menschen nicht verkennen.

<i>Bostrichus typographus</i> den alten	<i>Pontia rapae,</i>
Fichten und Kiefern,	<i>Crataegi</i> den Obstbäumen,
<i>micrographus</i> ebenso,	<i>Sphinx pinastri,</i>
<i>chalcographus</i> "	<i>Cossus ligniperda,</i>
<i>polygraphus</i> "	<i>Casteropacha processionea</i> den Ei-chen,
<i>testaceus</i> "	<i>Liparis monacha</i> den Kiefern,
<i>pinastri</i> "	<i>pini</i> den Fichten,
<i>laricis</i> "	<i>salicis</i> den Weiden,
<i>abietiperda</i> "	<i>Plusia gamma</i> der Saat,
<i>villosum</i>	<i>chrysitis</i> ebenso,
<i>Hylesinus piniperda</i>	<i>Fidonia defoliaria</i> den Obstbäumen,
<i>ligniperda</i>	<i>piniaria</i> den Fichten,
<i>Lytta vesicatoria,</i>	<i>piniperda,</i>
<i>Bruchus pisi,</i>	<i>Acidalia brumata</i> den Obstbäumen,
<i>Rhynchites Bacchus</i> dem Weinstock,	<i>Phalaena piniaria,</i>
<i>betuleti,</i>	<i>sylvatica,</i>
<i>Thylacites geminatus,</i>	<i>catenata,</i>
<i>Apion aeneum,</i>	<i>seticornis,</i>
<i>pomonae</i> dem Obst,	<i>testacea,</i>
<i>frumentarium</i> dem Getreide,	<i>resinorum,</i>
<i>Balaninus nucum</i> den Haselnüssen,	<i>exclamatoria,</i>
<i>Magdalitis pruni,</i>	<i>Trachea piniperda,</i>
<i>violacea,</i>	<i>Tortrix turioniana</i> den jungen Kie-fern,
<i>Anthonomus pomorum,</i>	<i>Buoliana ebenso,</i>
<i>rubi,</i>	<i>Tinea granella</i> dem Getreide,
<i>Otiorhynchus sulcatus,</i>	<i>triticella,</i>
<i>Hylobius abietis</i> den jungen Fichten,	<i>secalis,</i>
<i>Pissodes pini,</i>	<i>margaritalis;</i>
<i>Calandra granaria</i> dem Getreide,	
<i>Saperda linearis</i> den Haseln,	
<i>Rhagium inquisitor</i> den Fichten,	
<i>mordax,</i>	<b>Zweiflügler:</b>
<i>Chrysomela populi,</i>	<i>Culex pipiens,</i>
<i>Lema merdigera</i> dem Gemüse,	<i>Stomoxys calcitrans,</i>
<i>asparagi,</i>	<i>Cecidomyia pini</i> den Kiefern,
<i>dnoddecimpunctata,</i>	<i>salicina</i> Weiden,
<i>Haltica oleracea</i> den Kohlpflanzen;	<i>destructor</i> dem Getreide
<b>Schmetterlinge:</b>	(in Amerika),
<i>Pontia brassicae</i> den Kohlpflanzen,	<i>Tipula oleracea</i> dem Gemüse,

Honig, Purpur und Seide werden uns durch diese kleinen Thiere geliefert. Das feine Schellack (Gummi lacca) ist das Produkt einer anderen Schildlaus. Als Heilmittel zeichnet sich vor allem die spanische Fliege aus, so wie der Säure, die die Ameisen liefern, wohl zu gedenken ist. Auch die Gastäpfel können als nützliches Produkt betrachtet werden, so wie ähnliche kleine Wespen zur Zeitigung der Feigen dienen. Weniger bedeutend ist die

**Bibio hortulanus** den Wurzeln der

Gartenbeete,

**Simulium reptans** dem Bieh,

**Merodon narcissi** den Zwiebeln der

Narcissen und Tazetten,

equestris,

**Authomyia ceparam** den Zwiebeln,

brassicarum den Kohl-

feldern,

lactucarum dem Salat,

**Psila rosae** den Möhren,

**Musca domestica**,

vomitoria,

**Tabanus bovinus**,

**Chrysops caecutiens**,

**Haematops pluvialis**,

**Oestrus ovis**,

bovis,

**Gastrus equi**,

nasalis;

**Netzflügler:**

**Termes fatale** in heißen Ländern,

u. a. Arten;

**Orthopteren:**

**Forficula auricularia** den Blumen ic.

**Gryllotalpa vulgaris** den Wurzeln  
der Feldfrüchte,

**Acheta campestris** ebenso,

**Gryllus migratorius**,

**Blatta orientalis**;

**Hemipteren:**

**Tettigonia rosae**,

**Cercopis spumaria**,

**Lygaeus nassatus** den Rosentrieben,

**Acanthia lectularia**,

**Phylla abietis**,

**Thrips haemorrhoidalis**,

**Aphis pruni**,

ribis,

dianthi,

Cerasi,

mali,

rosae,

brassicae,

sambuci,

Viburni,

pini,

hordei,

abnobaee,

**Chermes bursarius**,

abietis,

ulmi,

Lecanium,

bromeliae,

vitis,

ilicis,

persicae,

**Coccus adonidum**,

**Aspidiotus rosae**,

lauri,

nerii,

**Porphyrophora polonica**;

**Siphonopteren:**

**Pulex irritans**,  
penetrans in Amerika.

Eßbarkeit einiger \*) und mehr negativ der Nutzen, den die Schlupfwespen und Raupentöchter, oder die Bissstenameisen zur Vertilgung manches Ungeziefers thun. Die Maden der Schmeißfliege, welche sich häufig in den Wunden der französischen Soldaten in Egypten einfanden, verzehrten die Eiterung derselben so vollständig, daß sie dadurch eine unglaublich schnelle Heilung derselben bewirkten \*\*). Und dieser Fall möchte demnach zur Bestätigung der Annahme dienen, daß auch andere faulende Stoffe, Weser u. dgl. in der freien Natur durch dergleichen Thiere schnell verzehrt, und damit schädliche Lustinfektionen verhindert werden.

Ja man hat sogar als etwas Nutzbares gerechnet, daß Speckläfer ganz feine anatomische Knochenpräparate, welche nicht gut mit dem Messer darzustellen waren, durch Abnagen der weichen Theile gleichsam versorgten \*\*\*).

Die Wilden und selbst manche Europäer und gebildete Indianer verzehren Insektenlarven aller Art, Heuschrecken, Ameisen, Käfer u. s. w.

Die Käferlarve, welche die Alten Cossus nannten, und die vielleicht einem großen Cerambyx v. dgl. angehört, wird noch jetzt in beiden Welten als angenehme Speise gebraucht, genossen.

\*) Käferstein (Gerichtsamtmann) über den unmittelbaren Nutzen der Insekten. Erfurt 1827. 4.  
\*\*) Larrey Mémoires de Chirurgie militaire T. II, p. 310.  
\*\*\*) Hebenstreit de Insectis, anatomicorum administris. Viteb 1780.

---

Als besonders nützliche Insekten wären demnach zu nennen :	
<i>Apis mellifica</i> Honigbiene in Europa und Nordamerika,	<i>Lytta marginata</i> ,
<i>ligustica</i> im südlichen Europa und Egypten,	<i>Meloe proscarabaeus</i> ,
<i>Melipona amalthea</i> in Brasilien,	<i>violaceus</i> ,
<i>Formica rufa</i> ,	<i>majalis</i> ,
<i>fuliginosa</i> ,	
<i>Cynips rosae</i> ,	<i>Mylabris cichorii</i> ,
<i>Brandtii</i> ,	<i>Coccinella septempunctata</i> ,
<i>gallaes tinctoriae</i> ,	<i>Gasteropacha mori</i> ,
<i>Lytta vesicatoria</i> ,	<i>Attacus paphia</i> in Japan,
<i>ruficeps</i> ,	<i>Tettigonia orni</i>
<i>violacea</i> ,	<i>Coccus cacti</i> ,
	<i>ilicis</i> ,
	<i>polonicus</i> ,
	<i>lacea</i> .

Wenn man daher von vielen Insekten bedrängt wird, und sich selbst vor den nützlichen, den Ameisen und Bienen, schützen oder in Acht nehmen muß, so ist es desto erlaubter, sich auf jede Weise der lästigen und schädlichen zu entledigen. Die besonderen Schuhmittel sollen demnach unten, bei den einzelnen Gattungen, angezeigt werden. Sie kommen auf dreierlei hinaus: die mechanischen, die chemischen und die dynamischen. Erstere bestehen im Tödtschlagen und Verjagen so gut es gehen will, und es ist unglaublich, wie viel sich selbst auf diese Weise, um ganz reine Bahn zu segen, hierdurch letzten läßt; die chemischen Mittel sind Vergiftungen oder simple Tödtungen und Verjagungen durch Hitze, Dämpfe oder ihnen tödtliche Stoffe; die dritte Klasse begreift diejenigen Mittel, wo Lebendiges, durch wieder lebendig Wirkendes oder wenigstens durch Immaterielles vertrieben und abgehalten wird \*).

\* ) Von allen dreien Klassen nur einige Beispiele. Folgendes kann man schon ein psychisch dynamisches Mittel der letzten Klasse nennen.

Wenn man in einem Zimmer, dessen Fenster jedoch nur an einer Wand sind, eines derselben offen läßt, und einen Rahmen einsetzt, den man der Länge wie Quere nach mit Zwirnfäden, so weitläufig, daß sie einen Zoll und mehr von einander stehen, bespannt, so werden die im Freien befindlichen Fliegen alle davor zurückfahren, als wenn sie dieselben für Spinnengeweb hielten, und man kann sich dadurch sein Zimmer bei frischer Luft ganz von ihnen frei erhalten, indem sogar die darin befindlichen eher noch hinaus fliegen. Ich bediene mich dieser Einrichtung schon seit länger als zwölf Jahren, und wunderte mich, sie vor nicht lange erst im Entomological Magazine als etwas ganz Neues beschrieben zu finden. Doch war dort die Notiz beigegeben, daß sich dieses Mittels schon die Alten Römer bedient, indem sie die Fischernehe dazu angewandt hätten.

Ein anderes solches dynamisches Mittel, sich die Insekten vom Leibe zu halten, ist Reinlichkeit verbunden mit Ordnung und Rührigkeit überhaupt. Wo diese herrscht, werden sich niemals welche einschleichen oder erhalten können.

Unter den mannigfachen chemischen Mitteln haben sich chlor-saure Dämpfe, in verschlossenen Räumen angewandt, häufig sehr wirksam bewiesen. So räuchert man die untern Schiffsräume nach langen Seereisen aus, um das sonst unbesiegbar dort

Bei der vielseitigen Berücksichtigung, die man der lebendigen Insektenwelt neuerlich gewidmet hat, und worin das zwar

---

angewachsene Heer der Skolopendern, Spinnen und Flöhe mit Einem-male zu vernichten. Auch Lazarethe können auf diese Weise ge-säubert werden. Auflösungen von Quassia und anderen an das Marktische grenzenden Bitterkeiten sind, wie bekannt, den Fliegen tödlich, oder betäuben sie doch so, daß man sie hinwegkehren kann.

Gegen die Feinde des Obstes im Freien sind dergleichen che-mische Mittel aber immer, wie es scheint, unzulänglich geblieben.

Zur Erhaltung der Naturaliensammlungen ist Arsenik in den Thierbälgen das sicherste Mittel (vergl. I. B. S. 24) für die Insektensammlungen hat sich als sehr nützlich bewiesen, in jeden Kasten ein Kückelchen Quecksilber zu werfen, und es zu Seiten dar-in herumrollen zu lassen. Etwas Quecksilber auf die Dielen ver-streut, tödtet auch die Flöhe und anderes Ungeziefer der Schlaf-zimmer.

Beiderlei Klassen von Vertilzungsbarten dispensiren indeß nicht von der dritten, dem mechanischen Wirken. Nur wer den Feind in Person auffucht und ihn tödtet, kann ganz sicher vor ihm seyn. So hat man in der That ganze Gärten von schädlichen Raupen durch unmittelbares Ablesen derselben befreit, und ebenso einst in unserem Lande ein Gehölz auf diese Weise gerettet, wo die Kosten für die Raupenvertilgung achthundert Thaler be-trugen.

In früheren Zeiten hatte man von solchen Maßregeln sehr irrige Vorstellungen, und hat sie hie und da noch. Man sollte in die Bäume schießen, damit die Spannraupen vor Schreck zer-platzten; oder man sollte die insektenfressenden Vögel schonen, da-mit sie die Raupen verzehrten. Allein es fand sich, daß diese viel-mehr die zahllos um die Gipfel der Waldbäume schwärzenden Schlupfwespen und Raupertödter wegsonnappten, daher man einst in einem benachbarten Lande wieder auf das mechanische Abklopfen und Berteilen der Raupen zurückkam, und eine eigene dieses Ge-schäft dirigirende Komission deshalb niedersezte, deren Sekretär den Titel „Waldraupenzertretungskommissionssekret.“ wirklich geführt hat.

Eine sehr nützliche Schrift in dieser Hinsicht ist:

P. Fr. Bouché Naturgeschichte der schädlichen und nützli-chen Garteninsekten und die bewährendsten Mittel zur Vertilgung der ersten. Berlin 1855. 8.

weitläufige, aber höchst schäbige Werk von Kirby und Spence\*) alle anderen hinter sich läßt, hat man auch die Thätigkeit der Insekten nach allen Seiten hin betrachtet. Indes ist die philosophische Ansicht dort sehr veraltet, und selbst düstig. So sind z. B. die äuferen Zusätzl.keiten, nach Art der älteren Theologie unter die Mittel der Selbsterhaltung und Vertheidigung aufgenommen worden, welche aber eigentlich gar nichts beweisen, und sich als ein Rest altmodischer englischer Lehrart in unsere Zeit fortschleppen. Daß ein paar Käfer unter tausend anderen, auf der Landstraße laufenden, grau sind, und deshalb nicht so schnell unterschieden werden, oder daß, unter allen Schildkäfern ein bis zwei Spezies grün, wie der Stengel, an dem sie sitzen, sind, ist doch wohl als Schutzmittel so unbedeutend, daß es nicht als ein Gesetz für das Ganze gelten kann. Was haben denn die anderen verbrochen, denen diese Vortheile nicht geworden? Die Selbsterhaltung der lebendigen Natur liegt bei weitem tiefer, und ihren Gesetzen, zu denen jene Paar Neuerlichkeiten vielleicht nicht einmal gehören, ist noch gar nicht genug nachgeforscht. Unter die größten Mittel der Erhaltung möchte wohl die so zahlreiche Brut und Vermehrung, wonach ein einziges gerettetes Paar in einigen eben so geschützten Generationen in die Millionen erzeugt, und dann vielmehr die Einrichtung gehören, daß bei weitem die meisten Insekten ihre Larvenzustände unterirdisch, vor Nachstellungen mehr gesichert, verbringen. Denn auch die starke Lebensfähigkeit einzelner\*\*) würde nicht schützen, und ist wiederum keine allgemeine Eigenschaft.

### 369.

Indem wir daher von allen solchen Accidenzen abssehen, bleibt uns als die wichtigste Betrachtung des Insektenlebens die Berücksichtigung ihrer Metamorphose, als der sichtbaren Form

\*) W. Kirby et W. Spence's introduction to Entomology. London 1818, 4. B. — Uebers. v. Oken. Stuttgart 1819, 4. B.

\*\*) So ward ein Käfer, *Apis acuminata*, einst von einem Franzosen in Spanien im November angespiest, und von da nach Berlin gebracht, wo er im folgenden März noch lebendig war. Diese Spezies ist aber deshalb gar nicht zahlreich.

ihres Lebenslaufes, und alle Stufen derselben sind auf das Ge- naueste zu verfolgen, und an sie die weiteren Betrachtungen zu reihen. Nirgends auf Erden scheint die Natur so weit in Verflüchtigung der Materie gegangen zu seyn als hier. Wer kann einen Stunden lang in der Luft schwebenden Mückenschwarm betrachten, ohne sich selbst dabei zu sagen, daß hier fast alle irdische Schwere aufgehoben sey! Wo ist eine unermüdlichere Beweglichkeit zu finden, als bei diesen so höchst zarten Wesen, deren Leben doch schon der leiseste FINGERDRUCK vernichtet! ja manche Insekten besitzen so zarte Mundtheile, daß sie vielleicht gar keine Nahrung, viele gewiß nur die allerfeinste zu sich nehmen, und ihr ganzes letztes Seyn ein bedürfnissfreies, geistiges Umherschweben ist. Erwähnt ist schon worden, daß die meisten den größeren Theil ihres Lebens im roheren Larvenzustande verbringen. Allein auch in dieser Periode offenbart sich, und gerade in dieser am häufigsten, ihr sogenannter Kunstrieb.

370.

Man hat Kunstrieb diejenige Ausübung des Instinktes\*) genannt, bei welcher ein Thier, ohne freie, auf Uebung und Erfahrung gegründete Handlung, sich Baue zu seiner Erhaltung bildet. Dieser Trieb wäre demnach nur eine Form des allgemeinen Instinktes, des Lebenserhaltungstriebes, der sich eigentlich überall im Organischen zeigt, denn auch das Kriechen der Pflanzenwurzel nach der Feuchtigkeit hin, ist ein solcher Instinkt, so gut wie die Industrie des Menschen, der sich zu wärmen sucht, wenn ihn friert, und sich dem Feuer nähert oder unter die erste beste Hütte versteckt. Die älteren Philosophen und Naturforscher, noch nicht so bekannt mit dem allgemeinen Seelenleben und dessen durchgängigen Zusammenhang wie es uns neuere speculative Denker aufgezeigt haben, faßten jene Begriffe nach damaliger Art mehr isolirt, als gewisse vorhandene Eigenschaften oder Vermögen der Natur, und kamen im vergangenen Jahrhundert in Folge der immer schäaleren metaphysischen Vorstellungen endlich so weit herunter, daß sie die

---

\*) Vergl. B. I, §. 123, 124.

allerschlechtesten Ansichten davon aussstellten \*). Die Alten hatten hierin weit edlere Begriffe, und verkannten die Vernunft der Natur nicht, die sie auch bei den Thieren gelten ließen \*\*); nachdem

\*) So sagte ein gewisser Mr. *Guer* in seiner *his'oire critique de l'âme des bêtes* (Amst. 1749): „*l'Instinct est une espèce d'enfant trouvé; c'est un sentiment purement populaire; c'est le sentiment des Ignorans, des gens qui n'ont aucune teinture, aucun principe de philosophie!*“

Christoph Mylius erklärte sich im Hamburger Magazin so: „Ueberhaupt glaube ich, daß die rundliche und hohle Figur der Raupengespinste daher entsteht, wenn sich die Raupen bei den Schmerzen, die ihr das Drücken des Sastes verursacht, nach allen Seiten krümmt; da nun zu der Zeit beständig Fäden aus ihrem Maule herausgehen, so muß, ihr unwissend, um sie herum ein Gespinst aus diesen Fäden entstehen.“ —

\*\*) Aristoteles im VIII. B. 4 E. seiner *Thiergeschichte* (Uebers. v. Streck S. 393) spricht sich folgendermaßen aus: „So viel von der übrigen Beschaffenheit und der Erzeugung der Thiere: allein sie zeigen auch rücksichtlich ihrer Errichtungen, ihrer Lebensart, ihrer Sitten und Nahrungsmittel noch manche Eigenthümlichkeiten. Sie zeigen nämlich alle gewisse Spuren von einer Seele, die jedoch nur bei den Menschen sich durch deutliche Charaktere hervorhebt. Denn offenbar besitzen viele Zähmheit und Wildheit, Gutmuthigkeit und Bosheit, Tapferkeit und Feigheit, Furcht und Uner schrockenheit, Fähzorn und Verschlagenheit, und eine durch Nachdenken erworbene Art von Klugheit in gewissen Gradeen. Sie unterscheiden sich also hierin vom Menschen nur durch das Mehr oder Weniger, so wie im Gegenverhältniß der Mensch sich von ihnen unterscheidet: denn manche dieser Eigenschaften finden sich überwiegend im Menschen, andere im höheren Grade in den Thieren. Andere stehen mehr in dem Verhältniß der Lehnllichkeit mit einander; denn so wie sich in dem Menschen Kunst, Weisheit und Klugheit findet, so trifft man dieselben Kräfte, wenn auch in anderer Form, in einigen Thieren. Am deutlichsten tritt dieses hervor, wenn man das jugendliche Alter ins Auge faßt; denn hier lassen sich die künftigen Charaktere gleichsam im Keim und den ersten Spuren wahrnehmen. Und eben in dieser Periode unterscheidet sich die Seele des Menschen, so zu sagen, gar nicht von der Thierseele, und die Vergleichung paßt daher recht wohl, in so weit man manches ganz, manches weniger übereinstimmend, manches den Thieren wenigstens analog findet. So steigert sich jenes Prinzip des Lebens in unmerklichen Stufen bis zur Thierseele herauf, so daß man in dem

aber im Mittelalter durch die Scholastik eine völlige Scheidung Gottes und der Welt zu Stande gebracht worden war, gingen sie für eine Zeitlang ganz unter, und die Philosophie erholte sich erst spät wieder von dieser Niederlage. Cartesius, der den Thieren alle Seele absprach, erklärte auch ihre Handlungen als rein mechanisch; Leibniz fasste zuerst wieder das Höhere auf, bis es dann durch Kant und seine neuesten Nachfolger in seinem alten Werth wieder hergestellt wurde.

371.

Wir nehmen demnach die Begriffe von Instinkt und Kunstrieb wieder höher und geistiger, und möchten jene Bezeichnungen lieber ganz verbannt wissen, ehe sie falsche Vorstellungen fort erhalten. Es ist kein Zweifel, daß es die gewaltige Weltkraft ist, welche auch in diesen kleinen Thieren auf individuelle Weise handelt, und das allgemeine Gesetz der Vernunft: Zusammenhalt, nach jemaligen Stufen vollzicht. Von den niedrigen Attraktionskräften an, bis zu den rein organischen der Selbsterhaltung durch Ernährung, gehen die einfachen Triebe in den höheren oder feineren Organisationen in die Formen der Bewegung, Empfindung und Fortpflanzung hinüber. Daß so viele und gerade die ausgebildeten Insekten nach der Lichtflamme eilen und sich in den Tod stürzen, hat gewiß seine allerfeinste Bedeutung in der Verwandtschaft des Lebens mit dem Lichtprinzip: ob aber die einzelnen Arten aller Insekten besondere Seelen von schon vorzeitlichen Zuständen besitzen, deren Kunstscherkeiten demnach, wie Plato dergleichen vom Menschen annimmt, nur in einem Wiedererinnern bestehen könnten; oder ob sie nach Art der Leibniz'schen Vorstellung nur geringere Vereine von Monaden seyen; oder endlich nur Emanationen der Weltseele — das weiter zu untersuchen, möge vorerst den Philosophen überlassen bleiben;

---

Bersolg jener Reihen das Nächstverwandte und das in der Mitte Liegende kaum zu scheiden vermag.“

S. auch: H. S. Reimarus allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptsächlich über ihre Kunstrieb. Hamburg 1762. — Dieser ist jedoch noch ganz Mechaniker, nach dem Charakter seiner Zeit.

so viel ist gewiß, und höchster Beachtung werth: entweder baut die Seele ihren Körper, und dann muß es eine Menge der feinsten Seelen geben, die so kunstreiche, schön und wundersam ge- staltete Insekten wie eine Amelie, Biene, Wespe, Ichneumon oder Sphex, eine thätige Seidenraupe oder einen Herkuleskäfer, zu bilden vermögen; oder die Zufälligkeiten der Natur gestaltet diese Thiere, und ihre Eigenschaften gehen aus ihren relativen Formen hervor: welches Spiel von Zufälligkeiten muß das nicht seyn, welches dritthalbtausend Species Laufkäfer, oder viertehalbtausend Rüsselkäfer, deren Formen, Eigenheiten und Le- bensart sich überall auf dem Erdboden gleich sind, zusammen- würfelte! Gewiß ist eine Lehre letzterer Art nicht weit vom Unsinne entfernt, und so sind wir von selbst auf die erstere hin- gewiesen.

372.

Der sogenannte Kunstrieb vieler Insekten ist also nichts anderes als der Trieb ihrer Seele, nachdem sie sich ihren Orga- nismus gebaut, um auch den überschüssigen Stoff über ihn hinaus zu bauen, d. h. in eine mehr oder minder regelmäßige Form zu gestalten. Beides erregt bei näherer Betrachtung Er- staunen; Und in dieser Art von Beobachtungen muß man aller- dings den Engländern und den Franzosen die Palme zutheilen, und ihnen Lob zollen, daß sie schon seit dem alten Raumur hier am aller aufmerksamsten und einsichtigsten geforscht haben. Vorliebe für Anthropomorphismen war hier der Sache günstig; und wenn man auch hie und da eine Nehnlichkeit erst hineinge- legt, so war doch der Anlaß geistreich.

373.

Es würde langweilig seyn, alle hierher gehörigen Beobach- tungen zusammenzutragen und der Reihe nach herzuerzählen; besser finden sie bei dem jedesmaligen Geschöpf, das sie ausübt, ihre Angabe. Nur Folgendes deute auf die hier zu beachtende Einheit der Ausbildung.

Wenn man die Baue der Bienen und Wespen genauer be- trachtet, so findet man nicht nur eine große Regelmäßigkeit

sondern auch eine höchst sorgfältige Raumbenutzung in ihren Anlagen. Dieses deutet darauf, daß die höchste organische Form sich stets mit der geometrischen vereinigt; dieses: daß der vollendete Künstler immer den Raum auf das weiseste eintheilt, wovon uns die geschnittenen Steine der antiken Künste das Beispiel geben.

Untersucht man die mechanische Einrichtung der arbeitenden Instrumente bei den Insekten, so findet man ferner eine Kunst, wie sie die höchste Technik nicht vollkommener ausgedacht hat, und in der That noch von jener lernen könnte. So zeigt sich z. B. der Kegelstachel mehrerer Blattwespen, womit sie in die Rinde schneiden, unter anderen der Fichtenblattwespe (*Hylotoma pini*), als eine platte, krumme, zugespitzte Säge von deren gezähnten Rändern jedes Zähnchen wiederum gezahnt ist, so daß Mechaniker auch, ohne diesen Bau früher gekannt zu haben, diese Einrichtung des Instrumentes als die zweckmäßigste sich erfan- den\*). Gleicher Gestalt ist selbst der Bau der zernagenden Mundwerkzeuge, die spitze feine Mündung der Spinnorgane der Seidenraupe, und der Bau der Hintersüße der pilzendrehenden Mistläscher, so genau der zu verrichtenden Funktion anpassend, daß er fast alle menschliche Erfindungen gleicher Art hinter sich läßt, wie denn auch noch immer keinem Menschen gelungen ist, mittels Vorrichtungen zu fliegen, oder an glatten Wänden auf und abzulaufen.

Betrachtet man ferner die Ausübung mancher Handlungen der Insekten selbst, so wird das Erstaunen noch höher gesteigert. Nur zwei Beispiele aus eigener Erfahrung. Der Ameisenlöwe wirft bekanntlich mit seinem Kopfe den Sand aus dem Boden seines Trichters in die Höhe, um durch den herabfallenden Regen desselben das Insekt vom Rande herabzubringen und dann zu

---

\* Reaumur (*Histoire des Insectes* T. V, p. 108, Tab. V) sagt: „dieses ist eine wahre Säge, welche sich von den unserigen nur dadurch unterscheidet, daß sie von Horn und noch viel künstlicher gearbeitet ist, als unsere von Stahl. Unsere gewöhnlichen Sägen sind viereckig geschnittene Blätter, an deren einen Seite abwechselnd nach rechts und links gerichtete Zähne stehen. Bei sehr feinen sind sie nur wenig gebogen, so auch bei unseren Insekten u. s. w.“ — Eine längere Mittheilung s. bei diesem Insekt.

erfassen. Will es nicht senkrecht gehen, so schlägt er links und rechts umher, um von dieser oder jener Seite desto sicherer seinen Raub zu gewinnen. Als ich nun einstmals eine schon etwas gelähmte Ameise so am Rande des Trichters angebracht hatte, daß sie sich gerade hinter dem Thiere befand, und es sich deshalb vergeblich mit Schlagen und Sandwerfen nach links und rechts abarbeitete, sah ich ihn plötzlich aus seinem Trichter heraus, oben an den Rand desselben gelaufen kommen, und sich genau, in einem Viertelumkreis, schnell wieder eingraben, und nun den Sand ebenso links und rechts schmeißen, wodurch notwendig die Ameise ihm in die Zangen fallen mußte. Ich gestehe, daß ich über diese Industrie wie erschrocken war; nach vielen Jahren habe ich das Experiment wiederholt, und mehrmals ganz dieselbe Handlung von diesem Thier ausüben sehen.

Herner: als ich erst in einem Gartenhause wohnte, brachte mir der Gärtner ein Wespennest voll Maden, unreifen und zum Theil schon ganz reifen Puppen; auch waren viele Wespen bereits ausgekrochen. Ich zerlegte dasselbe in einem Fenster des unteren Stockes, in dessen Rahmen sich ein Loch zum Durchgang eines Schellenzuges, aber jetzt frei befand. Kaum war ich einige Zeit beschäftigt, die Maden zu untersuchen, als zu dieser Öffnung Wespen hereingeslogen kamen, woron jede eine Larve wegtrug, um sie, wie es schien, an der Stelle eines neu anzulegenden Baues in Sicherheit zu bringen. Ich bemerkte zumal eine etwas dunkler gefärbte Wespé, und da ich die Uhr zu Hülfe nahm, ergab sich, daß diese gerade siebenmal in fünf Minuten kam und ging. Ich zerschnitt eine Puppe. Wie groß war meine Überraschung, zu bemerken, daß eine Wespé zuerst den Kopf derselben wegtrug, und sodann — denn ich muß freilich annehmen, daß es dieselbe war — wieder kam, um unter einer Menge Maden richtig auch das andere Stück, den Hinterleib, wegzutragen, dies geschah mit vielen so. Es liegt freilich in der Natur der Sache, daß meine stundenlangen, bis zur Müdigkeit fortgesetzten Beobachtungen und variirten Berichtungen immer noch keine juristische Gewissheit geben konnten; allein mir schienen doch gewisse Wespen der Reihe nach immer wieder zu kommen, und, wenigstens jene braune, sich in regelmäßigen Zeitpunkten immer wieder einzustellen, bis das Meiste der Wabe fortgetragen war.

Ich würde auf diese Erfahrung nicht so viel Gewicht legen, wenn sie nicht durch ähnliche, von Anderen angestellte, ihre Bestätigung erhielt. In Germar's Magazin der Entomologie III. B., befindet sich eine interessante Notiz über die Erkennungszeichen der Bienen<sup>\*)</sup>), welche, mit Obigem zusammengehalten, sehr für die Vermuthung spricht, daß hier schärfere Geisteskräfte thätig sind, als man nach gemeiner Ansicht anzunehmen pflegt<sup>\*\*)</sup>). Auch die anderen bekannten Beobachtungen über Bienen und Hornissen<sup>\*\*\*)</sup>), so wie über Ameisen, sprechen

---

- <sup>\*)</sup> Aus dem Cultivateur des Abeilles des Pfarrers Jonas von Gœlieu zu Colombier. Der Beobachter behauptet, daß die Bienen eines Stockes Mittel besäßen, sich zu erkennen, und ihre Kameraden von allen Fremden zu unterscheiden. Er will dieses daraus beweisen, daß er einst einen seiner besten Schwärme von den Bienen eines dem Nachbar zugehörigen beraubt sah, wobei die fremden Räuber aus- und eingingen, ohne erkannt zu werden. Dies dauerte eine ganze Woche hindurch, als er plötzlich eines Abends seinen Schwarm sehr unruhig fand, und bemerkte, wie seine Bienen nach allen Richtungen auf dem Flugbrette umherliefen, und sich abwechselnd berochen und bestasteten, als wenn sie einander etwas zu sagen hätten. Am folgenden Morgen wurden alle sich eirasselnden Raubbienen angehalten und getötet.
- <sup>\*\*) Gegenwärtig zeigt auf der Frankfurter und Leipziger Messe ein gewisser Bertolotto abgerichtete Flöhe, über deren Gelehrigkeit mir selbst solide Männer, die sie gesehen, ihre Bewunderung ausgesprochen haben. Er hat sie mit einander Fechten, Tanzen u. dgl. gelehrt, als Musikanten spielten sie beim Ball auf, und schweigen auf Kommando &c. Zu ihrer Abrichtung bedarf er sechs Wochen.</sup>
- <sup>\*\*\*) Beiträge zur Naturgeschichte der grossen Hornisse u. von P. W. G. Müller, ref. Pfarrer zu Odenbach. Ebenfalls in Germar's Mag. III. B. S. 56. — Dieser Aufsatz ist außer der Beschreibung des Nestbaues und der Entwickelungen der Hornisse vorzüglich dadurch interessant, daß der B. diese Thiere wahrhaft zahm machte, so daß sie sich streicheln ließen u. s. w., ohne sich in ihren Arbeiten stören zu lassen, und daß er sie gewöhnte, ihnen das Futter fast aus der Hand zu nehmen.</sup>

Ali dies schließen sich mehrere in Kirby und Spence gesammelten Beobachtungen, so wie die schon älteren, daß auch die Ameisen einander zu benachrichtigen scheinen, wenn irgendwo eine Süßigkeit für sie vorhanden ist, oder die Überlegung, die man selbst an Käfern bemerkt. Wenn man den Todtengräbern

dafür, und das was Latrelle und Huber hierüber mitgetheilt haben, wird seines Orts, unten, weiter angeführt werden.

374.

Vom Instinkt bis zur unmittelbaren Sinnlichkeit ist nur ein Schritt, d. h. viele sogenannte Handlungen, die man jenem zuschreibt, sind nur Folge sehr feiner Sinneswahrnehmungen, wenn wir auch noch nicht immer das Organ dafür kennen. Es ist bekannt, daß Zuckerraffinerien die Bienenstücke mehrere Stunden im Umkreis schwächen, und ich selbst sah einst solche Syrupküpen, jede mehrere Zoll hoch mit todtten Bienen angefüllt. Der Nasgeruch, selbst der Stapelien, zieht auf weite Ferne Schmeißfliegen herbei, und man versuche nur, im heißen Sommer ein todes Thier wohin zu legen, ob sich nicht fast augenblicklich ein solcher Gast einstellen wird. Ich hatte einst ein noch halbvolles Kistchen Cigarren, die mir zu stark waren, auf die obere Repostur einer Kammer gestellt, an deren Wänden und auch außerhalb ich den Ptinus fur in Menge bemerkte. Nach Jahr und Tag fand ich eine solche Menge dieser Käfer todt in jenem Kistchen, daß ich davon eine ganze Tasse voll sammeln konnte, und sie in dem ganzen Quartier verschwunden waren.

Diese Beispiele sollen beweisen, daß der sogenannte Instinkt, der das Thier treibt, seine Bedürfnisse zu befriedigen, auch trügerisch, ihm zum Schaden seyn kann, daher man denn auch, umgekehrt, gar manche Fälle bemerkte, wo ein Insekt durch Erfahrung klüger wird, und die Gefahr zu vermeiden sucht. Dies kann zumal der Insektenfänger beobachten, wenn er einem seltenen Individuum lange nachstellt.

375.

Es wäre schon aus Analogie zu folgern, daß die eigentlichen Sinneswahrnehmungen bei den Insekten \*) sehr hoch

---

(*Necrophorus Vespillo*), welche ein todes Thier verscharrten, dasselbe an einem, an ein Stäbchen befestigten Faden so aufhängt, daß es nicht in die Grube fallen kann, so vereinigen sich mehrere dieser Käfer, erst die Grube zu wühlen, dann aber das Stäbchen zu unterminieren, daß es umfalle.

\*) *M. Chr. G. Lehmann, de sensibus externis animalium exsanguium, Insectorum scilicet ac Vermium etc. Gott. 1798. 4.*

gesteigert seyn müssen, wenn es auch nicht die Erfahrung bestätigte. Indes war und ist noch gegenwärtig manche Meinungsverschiedenheit über die Organe, welche der Sitz derselben sind, ob schon auch hierin zumal die vergleichende Anatomie vieles aufgeklärt hat. Mancher Zweifel ist aus bloßem Vorurtheil entstanden, da man meinte, Sinneswerkzeuge von der Gestalt derer des Menschen oder der Säugethiere finden zu müssen, was wohl in keiner Hinsicht auf den rechten Weg führen dürfte, und manche andere vergebliche Forschung daraus, daß man nicht genug berücksichtigte, daß diese metamorphosirten Insekten Lustthiere seyen, bei welchen, wie bei den Vögeln, Gesicht, Gehör, Geruch ausgezeichnet scharf sind, dagegen Geschmack, Gefühl und Tastsinn weniger, dagegen diese mehr bei den Wassergeschöpfen ihre Entwicklung finden. So wollte man z. B. die Antennen als Fühl-Hörner bezeichnen, da sie viel wahrscheinlicher Hör-Hörner genannt zu werden verdienen — ja jener Name ist leider der eingeführte Kunstausdruck geblieben, wer aber die Insekten genauer betrachtet, muß überzeugt werden, daß sie kein zartes Gefühl besitzen.

376.

Der Gesichtssinn ist am ersten zu erkennen, und schon vorlängst untersuchte man den merkwürdigen Bau der Augen, und wußte, daß viele Insekten deren zweierlei besitzen: die großen sogenannten zusammengesetzten, und die kleinen Punktaugen. Letztere erkannte zuerst La Hire \*) dafür, und wollte deshalb sogar den anderen ihre Funktion abstreiten. Man erkennt in diesen aber vielmehr verbundene solche kleinen, und findet bei den anderen Klassen der Gliederthiere auch Mittelgrade zwischen beiden.

Daß nun diese beiderlei Augen dem Insekt zum Sehen dienen, ist durch viele direkte Versuche erwiesen. Swammerdam \*\*) und Réaumur \*\*\*) überzogen sie mit Pigmenten, und fanden, daß Bienen dann unstät nach ihren Waben suchten oder

\*) Journal des Savans p. Jan 1578, Nr. 29. — Réaumur Mém. p. 1. Ins. T. IV, p. 242.

\*\*) Swammerdam Biblia naturae p. 501.

\*\*\*) Réaumur histoire des Insectes Vol. V, p. 388.

sie gar nicht finden konnten, ja das völlige Ausschneiden dieser Augen, wie es Hook u. a. vornahmen, hatte ganz gleiches Resultat. Göthe aber fand noch genauer, daß eine Wespe, der er die großen Augen mit einem undurchsichtigen Firnis überzog, nur nach der Decke und überhaupt aufwärts flog, ja ihm ganz aus dem Gesicht kam, dagegen seitlich anstieß; verdunkelte er dagegen die Punktaugen, so geschah das Umgekehrte; sie stieß an die Decke an, flog aber mit Sicherheit seitwärts.

Ob hingegen diese beiderlei Augen, und welche, verschiedene Schweiße haben, ist zwar wahrscheinlich, möchte aber wohl nicht gut auszumachen seyn. Daß die Punktaugen den Spinnen zum Sehen dienen, ist schon oben bei ihnen bemerkt worden: allein bei den meisten geflügelten Insekten die dergleichen besitzen, stehen sie auf dem Scheitel, und würden dann mehr negativen Werth haben, nämlich nur den, vor einer zufällig von oben kommenden Gefahr zu warnen. Die großen Augen reichen gewöhnlich auch bis nach oben. So viel bemerkt man deutlich, daß die mit sehr großen Augen versehenen Insekten, wie Libellen, Fliegen, Schmetterlinge, am allerschnellsten davoneilen, wenn man sich ihnen nähert, dagegen kleinaugige, wie Wanzen u. dgl. weniger schnell.

377.

Weit mehr Ungewißheit herrscht über den Sitz des Gehörs. Da man beim Krebs das Ohr kennt (S. oben S. 71), so ist schon zu vermuthen, daß es z. B. die Käfer, die Heuschrecke, auch besitzen werden, allein noch kann man es als solches nicht entschieden nachweisen. Neuerlich hat man mit Wahrscheinlichkeit die Fühler dafür erkannt, und so manche einzelne Zweifel dagegen auch noch erhoben werden können, so spricht doch sehr Vieles hierfür. Man bemerke nur wie viele Käfer, z. B. die Bockkäfer oder Heuschrecken, bei plötzlichem Laut ihre Fühlhörner auf- und nach hinterwärts recken, etwa wie es das Pferd oder der Hund zu thun pflegt, und man stelle sich diese Fühler nur nach Art der trocknen Darmsaiten vor, die durch die Schwingungen der Luft afficirt werden, so hat die Annahme wenig Anstößiges.

Daß die Insekten hören, ja genau hören, und man selbst mit Musik auf sie (selbst auf das Ungeziefer des Menschen)

wirken kann, ist unlängsam. Schon Nellian wußte, daß die Krebse die Musik lieben und durch sie gelockt werden können, und ein Gleicher behauptet *Valvasor* \*), indem er ansagt, daß man sie in Krain durch musikalische Töne aus ihren Höhlen locke. Die grünen Grashüpfer (*Locusta viridissima*) schweigen beim mindesten Geräusch \*\*) und fahren wieder fort, sobald alles ganz still wird. Brunelli, ein Italiener setzte an das eine Ende eines Gartens, in welchem sich keine solche Thiere befanden, ein Männchen, und an das andere Ende desselben ein Weibchen; so oft jenes zwitscherte, kam dieses quer durch den Garten herbeigehüpft \*\*). Wenn man eine Biene rasch vom Bienenstocke wegnimmt, daß sie sich nicht bewegen kann, so kann dies ohne alle Gefahr geschehen: so wie sie hingegen dabei summt, so ruft sie damit gleichsam Hilfe herbei, und man hat sich eilig vor den heranstürmenden Kameraden zu flüchten.

Daß übrigens die so mannigfach gestalteten Fühler auch manche Töne, für die wir selbst vielleicht gar kein Wahrnehmungsvermögen besitzen, vernehmen, und sich damit untereinander Beschen geben können, möchte auch nicht zu bezweifeln seyn.

### 378.

Eben so wenig aufgefunden ist das Organ für den Geruch. Einige nehmen es in der Stirngegend, andere an der Mündung der Tracheen an, aber beides ohne beweisende Versuche. Und doch riechen die Insekten in ganz außerordentlicher Ferne. Schon zuvor ist der Bienen †) Erwähnung gethan, so wie der Fliegen.

\*) *Ehre des Herzogthums Krain*, . III, Kap. 36.

\*\*) Doch muß ich bei dieser Gelegenheit bemerken, daß sie in der Nacht wie Nachtwandler taub und blind zu seyn scheinen, indem man sie sodann mit einer Blendlaterne im Gebüsch leicht auffischen und erfassen kann. So wie sie indeß bei unvorsichtigem Hinzutreten erwachen, fliehen sie, wie am Tage.

\*\*\*) *Comment Instit. Bonon.* T. VII, p. 199.

†) Ein amerikanischer Pflanzer verschaffte sich mittels dieser Eigenschaft den Honig wilder Bienen. Er ging in die Wälder, zündete ein Feuer an, tropfelte etwas geschmolzenes Wachs und Honig auf einen Stein, und umgab jenes mit Mennige oder Zinnober. Schnell wurden durch den Duft Bienen herbeigelockt, die sich dabei

Es lassen sich hierzu die Speckläfer, die Pelzmotten, die vielerlei Mist- und Maskäfer fügen, welche augenblicklich bei der Hand sind, wo ihre Nahrung aufgethan wird. Am wunderbarsten aber erscheint die Feinheit dieses Sinnes, wenn man bemerkt, daß der kleine weiße Tagschmetterling *Pontia Rapae*, eine im dritten Stock eines offenen Fensters stehende Resedepflanze zu finden weiß, um seine Eier daran zu legen. Ob man den Eifer, wo mit männliche Schmetterlinge ihre Weibchen zur Begattung aufsuchen, auch mittels dieses Sinnes erklären könne, bezweifle ich übrigens: allein von den Wanzen ist es leider nur zu gewiß, daß sie aus den Räthen oft jahrelang unbewohnter Zimmer hervorziehen, so bald sich ein Mensch in demselben schlafen legt, und ich habe mehrmals gesehen, wie dergleicher, wenn man, vom Gehen erhitzt, seinen Hut offen wohin gelegt hatte, wo dieses Ungeziefer zu Hause war, ein solches an der Decke bis an den wahrscheinlich von diesem Hute aufsteigenden Luftstrom hinlief, und sich dann hörbar in denselben hineinfallen ließ.

Ueberhaupt ist wahrscheinlich, daß zahllose Insekten ihre gewöhnlichen Aufenthaltsplätze auf Blumen (so die Nachschwärmer an Gelsblatt, der Seidenpflanze, dem Stechapfel), oder an thierischen Substanzen, mittels dieses Sinnes suchen, welches der Sammler für seinen Fang benutzen kann, indem er dergleichen Röder wohin legt.

379.

Der Geschmackssinn scheint den Insekten gleichfalls nicht abzugehen. Man kann leicht bemerken, mit welchem Behagen z. B. die Hirschläfer oder die Goldläfer den Saft eines nassen Stück Zuckers mittels ihrer Zunge schlürfen. Wer sich mit einem Absud von Wermuth, oder auch nur von Salbei, Gesicht und Hände bestreicht, ist vor Mückenstichen ziemlich geschützt. Daß

---

roth anfärbten, und dann fortflogen. Mittels eines Compasses bemerkte er sich nun ihre Richtung, und mittels der Uhr die Zeit ihrer Rückkunft und somit ihrer Entfernung, da er sie an dem roth gefärbten Pelz wieder erkannte. Auf diese Weise machte er eine reiche Ernte. (Letters from an American farmer by St. John p. 34.) Angeführt in obiger Schrift von Lehmann.

die Raupen nur ihr bestimmtes Futter suchen, und frisches dem alten vorziehen, hängt wohl auch mit diesem Sinne zusammen.

380.

Wenig Besonderes läßt sich dagegen wohl von den Sinnen des Gefühls und Getasts sagen. Puppen sind sehr empfindlich, auch viele Raupen und Larven. Viele Insekten scheinen mit ihren Antennen und Palpen Gegenstände zu tasten. Auch untersuchen die bauenden Bienen, Wespen und Ameisen genau; allein im Ganzen scheinen diese Sinne hier weniger ausgebildet, und man nimmt selbst an, daß ein angespitztes Füßchen wenig oder keinen Schmerz fühle, wenn die Nadel nicht zufällig den Nervenstrang berührt hat.

381.

Uebrigens ist schon im Vorigen bemerklich gemacht worden, daß die Sinnesorgane, so wie die ganze Organisation der Insekten, indem sie im Bau so viel von dem unserigen abweichen, auch in einer von der unserigen etwas verschiedenen Weise wahrnehmen mögen. Die besonderen Bitterungsempfindungen, wonach bisweilen die Mücken stechen, anderemale nicht, die Ameisen nicht hervorkommen u. dgl. m.; daß fliegende Insekten rasch durch eine enge Deffnung entweichen, all' dieses sind Nuancen, die noch zu ferneren Untersuchungen Anlaß geben werden.

382.

Nicht minder merkwürdig wie ihre Empfindungen ist die ausgezeichnete Muskelkraft dieser so kleinen Geschöpfe. S zwar beruhte es auf einer Täuschung, wenn Lyonnet bei der Weidenraupe über 4000 Muskeln zählte, während der Mensch deren viel weniger hat, da hier ein sogenannter einzelner Muskel aus vielen vereinigten Fasern besteht, die dort alle zertheilt erscheinen: allein auch abgesehen hiervon, ist doch die Energie bei den Insekten unendlich viel größer als bei den höheren Thieren. Man rechnet, daß ein Floh zweihundertmal so hoch, als er lang ist, zu springen vermöge daß eine Fliege in der Sekunde 600 Flügelschläge macht, und wenn sie gejagt wird, noch 6—7mal mehr; und daß Bremsen und Bienen Wagen und Reiter, die im

schnellsten Gallop dahin jagen, mit gleicher, ja noch größerer Schnelligkeit begleiten, indem sie selbst noch in Kreisen um sie herumschwärmen. Züge der *Libellula quadrimaculata* scheinen über ganz Deutschland weggegangen zu seyn, und man verschert, daß die Borkenkäfer, die einst auf dem Harz allein anderthalb Millionen Stämme verwüstet hatten, plötzlich in großen Schwärmen davon geflogen seyen, und sich in Franken niedergelassen hätten. Ein Mistkäfer ist so stark, daß er, unter einen silbernen Leuchter gesetzt, diesen fortzuschieben vermag, auch darf man nur an die kräftigen Bisse mancher Laufkäfer oder an die Beißkraft des *Bruchus nucleorum*, der steinharte Nüsse durchbohrt, erinnern. Es scheinen selbst zarte Insekten, wie die Schmetterlinge meilenweite Wanderungen, ohne zu ermüden, unternehmen zu können.

383.

Bekanntlich fehlt den Insekten die Lungenstimme der höhernen Thiere: allein da sie verschiedentliche Töne, und zwar auch durch Austreibung der Luft, von sich geben, so wäre ihnen eigentlich eine Stimme nicht abzusprechen. Das Summen der Bienen, Hummeln, Schwebfliegen und Mücken beruht auf einem solchen Luftausblasen durch die Stigmen; ähnlich ist der Gesang der Cicaden und das Schwirren der Heuschrecken zu erklären, wovon weiter unten; das Quicken der Bockkäfer und anderer, so wie es auch *Reduvius personatus* thut (wie ich erst dieser Tage es von ihm hörte), beruht aber auf mechanischer Reibung der Bruststücktheile.

384.

Der Flug selbst, das Schwimmen vieler, so wie das bereits erwähnte Springen, Klettern, Laufen und eigene Kriechen und Bohren mancher Larven sind Formen der Bewegung, die sich auf die mannigfaltige und zugleich so reiche Organisation dieser Thiere beziehen.

385.

Das Atmen ist für die Insekten eine höchst bedeutende Funktion, und wird durch die Tracheen oder Lufttröhren,

welche nach Außen in die Luftröhre oder Stigmen münden, ausgeübt. An den Luftröhren der Hymenopteren, zumal der Bienen, hat man blasige Erweiterungen, wahre Lungensäcke bemerkt, daher auch wohl durch diese die sumsenden Töne hervorgebracht werden. Die so wesentlich in der Luftröhre lebenden Thiere müssen für dieses Element eine ganz besondres ausgebildete Organisation haben, daher man auch das Atmen bei den Wasserinsekten und ihren Larven so mannigfaltig und mittels verschiedenartigen Vorrichtungen vollzogen findet \*), und eine Raupe stirbt sogleich, wenn man ihr die Luftröhre sämmtlich mit Öl betupft. Viele Wasserlarven der Insekten haben in diesem Zustande ihres Daseyns blätterige Kiemen, die sich bei der Verwandlung verlieren.

386.

Einfacher ist dagegen der Blutlauf der Insekten, wenn man ihn anders so nennen darf. Man kannte bisher ein einfaches langes, Blutsaft enthaltendes Rückengefäß, welches arteriell pulsirt, und so ziemlich allen Insekten zuzukommen scheint, allein man wußte keinen Zusammenhang desselben mit dem übrigen Körper zu finden, der hintere Theil desselben kann das Herz genannt werden. Strauß hat zuerst darin deutliche Klappen und Seitenöffnungen gesehen, und Carus in den Larven der Ephemeriden und anderer Dictyopteren eine strömende Saftbewegung entdeckt, so daß man diese auch für den ganzen inneren Körper vermuthen kann, wie denn auch ein auskriechendes Insekt seine Flügel dadurch entfaltet und glatt ausbreitet, weil der Saft in die Adern derselben hineingetrieben wird.

Will dann ein Insekt fliegen, so pumpt es sich erst den Mund voll Luft, und treibt dann auch sie in die nachmals leeren

---

\*) So führen die Wasserkäfer, wenn sie untertauchen, immer eine Luftblase am Astre mit sich. Die Libellenlarven atmen durch den Astre, und haben auf der Innenfläche des Mastdarms einen zierlichen blattähnlichen Apparat zur weiteren Einführung derselben. Die gemeinen Mücken atmen als Larven durch ein verlängertes Stigma beim Astre, als Puppen durch zwei Hörnchen vorn am Hals u. s. w.

Übern der Flügel. Zugleich geht sie aber auch durch die Stigmen heraus, wie oben bereits angeführt worden ist<sup>2)</sup>).

387.

Das gesammte Ernährungssystem ist bei den Insekten überaus mannigfaltig, so daß es sich kaum in eine allgemeine Uebersicht zusammenfassen läßt. Es variiert zuerst nach den verschiedenen Lebenszuständen, wie denen der Larve, Nymphe und des ausgebildeten Insekts, und obschon, wie bereits oben gezeigt worden, die Fresswerkzeuge sämmtlich auf ein und denselben Typus zurückzuführen sind — so daß man die beißenden Kinnladen &c. für metamorphosirte Füßchen (S. oben beim Krebs &c.) erkennt, die Saugrüssel und Röhren wiederum für verwandelte Kinnladen u. dgl., — so kann man doch für das besondere Vorkommen sagen, daß oftmals die einen Organe völlig verschwinden, und dafür anderen Platz machen. So hat die Schmetterlingsraupe andere Fresswerkzeuge als der Schmetterling selbst u. s. w.

Ferner variiert dieser Typus der Ernährungsorgane nach den verschiedenen Insektenordnungen, so daß man unter den geflügelten drei mit bloß beißenden, drei mit bloß saugenden Organen, und eine siebente findet, welche beides hat. Sie stellen sich so:

mit saugenden Mundtheilen:      mit beißenden Mundtheilen:

Hemiptera,

Orthoptera,

Diptera,

Dictyoptera,

Lepidoptera,

Coleoptera,

mit beiderlei:

Hymenoptera.

Letztere sind zugleich die höchsten und ausgebildetsten unter den Insekten, so wie jene drei Stufen sich einander auch parallel gegenüber entsprechen, wovon weiter unten. Man sieht daher, daß die Insekten, theils auf mechanisches Zerbeißen, theils auf bloßes Saugen von Säften angewiesen sind, und wiederum bald dieses bald jenes nach ihren verschiedenen Lebenszuständen thun.

<sup>2)</sup> *Chabrier*, sur le vol des Insectes etc. In den Mémoires du Muséum d'hist. naturelle.

So saugen manche Hymenopterenlarven, während das Insekt beißt, bei den Schmetterlingen ist es umgekehrt.

388.

Als Nahrung selbst scheint den Insekten schier alles diesen zu können. Die Termiten verzehren alles, selbst den Lackfurniß der englischen Blechkästen; man hat Schaben Zinnober, andere Zinkvitriol fressen sehen; das festeste Holz, Rinde, Saamen und alle anderen Pflanzentheile, lebende Thiere aller Art und ihre Residuen und Säfte, Wasser, Erde, so wie unzählige menschliche Kunstprodukte werden von ihnen angegriffen. Viele sind auf eine ganz bestimmte Nahrung angewiesen, so noch insbesondere die Parasiten und Schneumonien, die ihre Eier in die Raupen und Larven anderer Insekten absetzen.

389.

Diese Nahrung wird durch einen Schlund zum Darmkanal geführt, der bei den Larven dick und weit, bei den ausgebildeten Insekten in der Regel dünn und zart ist. Viele Käfer, zumal die Wasserläufer, besitzen auch noch einen inneren, zum Kauen eingerichteten Magen. Die saugenden Insekten haben daneben noch eine eigene Saugblase, zum Einpumpen oder Schlürfen der Säfte. Zur weiteren Verarbeitung der aufgenommenen Nahrung dienen dann noch die sogenannten Gall- oder Speichelgefäße, und viele stechende Insekten, wie die Wanzen und Mücken, ergießen einen brennenden Speichel in die Wunde, woher dann die so schmerzhafte Stiche dieses Ungeziefers<sup>\*)</sup>). Mittels Durchschwüng wird der bereitete Nahrungssatz in den um den Darm liegenden Fettkörper abgesetzt.

390.

Da die ausgebildeten Insekten, wie es scheint, nicht weiter

<sup>\*)</sup> Es wird zwar, und auch in Amerika bei den Moskiten, als Regel angegeben, daß man die stechende Mücke nicht eher wegjagen solle, als bis sie sich ganz vollgezogen hat und von selbst wegfliege, wo dann die Wunde kaum schmerzen werde: ich kann jedoch versichern, daß bei den italienischen Mücken mir diese Vorschrift nicht geholfen hat.

wachsen, so bedürfen sie auch nicht so reichlicher derber Nahrung, wie ihre Larven, deren Freßgier dagegen auch ungeheuer ist. Denn außer den oben angeführten Beispielen darf man sich nur der Heuschrecken und ihrer Verwüstungen erinnern. Man hat berechnet, daß eine Raupe binnen 24 Stunden das Dreifache ihres Gewichtes verzehrt, was für einen Menschen gegen vier Centner betragen würde. Dafür wachsen sie aber auch außerordentlich schnell.

Einige vollendete Insekten, wie die Uferaase, scheinen in diesem Zustand gar keine Nahrung mehr zu sich zu nehmen; die interessanten kleinen Claviger, Käferchen, welche als Gäste in den Wohnungen der gelben Ameisen leben, sind ebenfalls wegen des weichen Baues ihrer Mundtheile ungeschickt sich selbst zu ernähren, und müssen zeitlebens durch jene Ameisen gefüttert werden, welche demnach ihre natürlichen Ammen sind.

391.

Die Insekten haben auch mannigfache Secretionen und eigene Organe dafür. Des Speichelsaftes, der bisweilen als wahres Gift wirken kann, ist schon gedacht. Andere spritzen hähende Gässe aus Mund oder After (z. B. *Carabus granulatus*); andere geiern, oder secerniren Schaum\*); am häufigsten ist jedoch die Secretion des Gespinnstes, welches aus zwei langen, beim Munde sich öffnenden Schläuchen abgesondert wird, die zumal bei der Seidenraupe besonders groß und schön zu sehen sind.

Vieler anderen Absonderungen wird ihres Orts gedacht werden. Als Seltenheit verdient unter andern der eigene Geruch mancher Insekten angesührt zu werden, z. B. des *Hemerobius perla* wie Abtritt, des *Cerambyx moschatus* wie Rosen, des *Papilio Archidamas*, wie süßer Moschus, der der Wanzen u. s. w. Die Prozessionsraupe soll auf ihrer ganzen Oberfläche einen scharfen Saft absondern, wie denn auch in Chili eigene Gift-raupen entdeckt worden sind; manche, selbst hieländische, Puppen sind mit einem blauen Duft, wie die Pfauen überzogen, und

---

\* So selbst, Hrn. v. Langsdorff zufolge, *Papilio Catilina*.

mehrere Insekten, vornehmlich Käfer, leuchten des Nachts, mittels eines wahren, durch die Haut scheinenden Phosphors. Des Purpursaftes der Coschenisse u. a. wird seines Orts gedacht werden.

392.

Alle Insekten haben doppelte Geschlechter, und ihre Geschlechtertheile sind oft sehr schön und mannigfaltig ausgebildet. Man hat nie bemerkt, daß sie vor der letzten Verwandlung irgend einen Geschlechtstrieb äußern, desto lebhafter, ja heftiger aber nach derselben. Nur der alte, von Rösel erzählte Fall wäre in seiner Art merkwürdig, wo er männliche Schmetterlinge der Pontia Crataegi leidenschaftlich um eine Schachtel mit Puppen flattern sah, und fand, als sie ausgekrochen, daß diese lauter weiblichen Individuen angehört hatten. Dagegen ist die Geilheit, ja Wuth, der männlichen Seidenschmetterlinge auffallend, mit welcher diese, oft aus weiter Entfernung, auf die trügsinnenden Weibchen losgehen, sie heftig umschwirren, und sich dann mit ihnen zu begatten streben. Auch angespäßt gewesene Schmetterlinge thun dies noch, überhaupt die meisten, und zeigen, daß dieser heftige Trieb von der thierischen Wärme unabhängig ist. Mit gleicher Hinglichkeit begatten sich viele Käfer, ja oft ganz verschiedene Species, wie *Cantharis melanura* mit *Elater niger*, *Chrysomela aenea* mit *Galleruca alni* u. s. w.

Bei einigen gesellig lebenden Insekten finden sich auch geschlechtslose, natürlich castrirte Individuen, so u. a. bekanntlich bei den Bienen und Ameisen.

393.

Nach der Begattung setzt das weibliche Insekt seine Eier ab, und auch dies geschieht auf die mannigfaltigste Weise. In der Regel geschieht es an den Stellen, wo die sich entwickelnde Larve ihre beste Nahrung findet, und man hat diesen wunderbaren bis jetzt physisch noch unerklärten Instinkt mit Recht als eines der größten Zeichen einer Prädetermination angesehen. Am überraschendsten zeigt er sich bei den zahllosen Räupentötern und Schlupfwespen (*Sphex* und *Ichneumon* mit ihren

Untergeschlechtern), welche entweder gesunde Raupen oder Fliegenmaden anslechen, und ihrer Larve einen Lebensaufenthalt im Innern jener auf Kosten derselben, bereiten, oder eine Raupe, Spinne u. dgl. erst halb todt beißen, und sodann in ein gescharrtes Loch neben das abgesetzte Ei legen. So pflegen auch die Bremsen (Oestrus) ihre Eier an die Nase und Lippen der wiederfauenden Säugetiere abzuscheiden, von wo die auskriechenden Larven im Innern dieser Thiere ihre weitere Nahrung und Verwandlung finden. Die Schmetterlinge wissen ihre Eier mit einem wasserdichten Lack anzuheften, und die den Naturaliensammlungen so schädlichen Käfer oder Spinnen ihr Ei an die feinste Rinde des Kastens zu legen, von wo das kleine neugeborene Geschöpf sich ins Innere begeben kann; Mücken u. a. setzen ihre Eier im Wasser ab, andere in die Erde, manche Schmetterlinge legen ihre sämtlichen beisammen, wie der Ringelvogel, andere schwärmen weit umher, um hier und da nur einzelne an eine Pflanze zu geben. Sonderbar ist der ganz individuelle Instinkt vieler Mistkäfer (Scarabaeus L.) Mistkugeln zu drehen, in deren Inneres sie ihr Ei legen. Eben so wundersam ist der Lebenslauf vieler Rüsselkäfer, z. B. der des Balaninus oder Rhynchaenus nucum, der sein Ei an die jungen Pistille der Haselnussblüthen legt, wo sich dann die Larve einbohrt, mit der Nutz fortwächst, sich im Innern endlich verpuppt, und sich dann als vollendetes Insekt einen Ausweg durch die harte Schale beißt.

### 394.

Man pflegt die Insekten in solche mit vollständiger oder ganzer, und in solche mit unvollständiger oder halber Verwandlung zu unterscheiden. Man hat jene Insecta metabola, diese ametabola genannt. Es gibt aber Zwischenstufen; bei den niedersten, eigentlich nur den Hemipteren oder Orthopoden, z. B. den Wanzen, Blattläusen und Heuschrecken findet eigentlich gar keine Verwandlung statt, sondern sie erhalten bei ihrer letzten Häutung nur erst ihre ausgebildeten Flügel, welches im Grunde nicht mehr besagt, als daß der Mensch erst bei der Reife den Bart bekommt u. s. w. Bei den höheren Insekten hat aber das Insekt bei seinem Auskriechen aus dem Ei eine von der nachmaligen verschiedene Gestalt, gleicht einem füglosen

Wurm, oder einer Skolopender, Aassel, einem Krebs oder einer Nereide und anderen Seeraupen, und Niemand würde vermuthen, daß ein solches Thier in solch' ein Anderes übergehen könnte, wenn es ihn nicht die Erfahrung lehrte. Auch sind diese Zustände nach den Ordnungen äußerst mannigfaltig. Die der untersten metabolen, der Neßflügler (Libellula, Ephemera) und vieler Zweiflügler (Musca, Culex) sind zum Theil noch auf das Wasser angewiesen; andere der letzteren, wie Tipula u. a. auf die Erde; gleicherweise die Larven vieler Käfer; einige derselben zeigen sich aber schon frei am Tage, und dieses Leben am offenen Lichte ist dann vorzugsweise der Charakter der Schmetterlingslarven. Die der Hymenopteren (Apis, Vespa) leben dagegen zwar wieder verborgen, allein in eine künstliche von der Mutter verfertigte Hülle gleich einem Vogelnest, eingeschlossen, wodurch sie sich dann deutlich als die höchste Insektenordnung manifestiren.

395.

Das unreife Insekt, sowohl der niederen Ordnungen ohne Verwandlung, als das der höheren, wo es wirklich nur Larve ist, frisbt, und scheint sich vorzugsweise nur dem Geschäfte des Nährens und Wachsns zu widmen. Nach mehrmaligem Abwerfen der Haut, womit immer Stufen einer inneren Veredlung parallel gehen, zieht es sich bei den höher organisierten endlich zur Ruhe zusammen, und frisbt nicht mehr. Nur unter den Neßflüglern und einigen Zweiflügler ist dieser Uebergang in so fern unvollkommen, als dann auch die Nymphe noch frisbt und sich bewegt (Libellula, Culex etc.) bei den anderen, wie Käfern, Schmetterlingen, Bienen u. s. w. wird die Larve dann fast unbeweglich und heißt nun Puppe, Nymphe, Chrysalide. Aus ihr tritt, nach einem nochmaligen Abwerfen der Haut, das vollendete, in der Regel geflügelte Insekt hervor.

396.

So verschiedenartig nun also auch, z. B. an einem Schmetterling, diese vier Zustände äußerlich erscheinen, so daß das kleine, runde, oft gar zierlich gerippte oder gegitterte Ei durch Abwerfen seiner harten Schale als ein langer Wurm

hervortritt, der oft in den herrlichsten Farben, mit Hörnern, Warzen, Stacheln oder Borstenbündeln besetzt, als Raupe voru sechs spiñe, hinten noch meist fünf Paar ganz anders gestaltete Füße zeigt, und so viermal seine Haut abwirft; so verschieden von dieser die mit der letzten, als Inbegrifflich des Eies eigentlich fünften Häutung nun wieder als eine braune, glänzende, oder zackige, matte, gelbe, oder noch anders gestaltete Puppe erscheint, die bald frei und nackt hängend, bald in eine zierliche Hülle eingeschlossen, verborgen liegt, und nur selten (z. B. bei *Papilio Proteus*) die Gestalt eines zusammengeschlagenen Schmetterlings hat — und nun aus dieser wieder ein ganz anders gestaltetes und gefärbtes Thier hervortreten läßt: so zeigt doch die Untersuchung des Inneren, daß die Anfänge aller dieser letzten Organe schon in dem kleinsten Raupen angefangen, vorgebildet sind, und sich nur innerlich ganz stetig fortentwickeln, so daß von hier aus jene so auffallende Metamorphose ganz einfach und regelmäßig erscheint. Der weite Magen und Schlund der Raupe, welcher noch Nahrung in Massen aufzunehmen hat, zieht sich allmälig bis zum Schmetterlingszustand in feinere abgetheilte Säcke mit zarter Mundröhre zusammen \*); die Muskeln vereinfachen sich, dem Scheine nach, ebenfalls durch engere Verbindung, und werfen dabei die dann überflüssigen Fußtheile ab; die Sinnesorgane treten immer deutlicher hervor, während die in der Raupe mehr gleichmäßig vertheilten Knoten des Hauptnervenstranges nach vorn in gemeinschaftliche Hirnknoten zusammenrücken; und aus kleinen, kaum sichtbaren Kugelchen und Fäden, welche die Anlage der Testikeln und Eierstücke anzeigen, treten diese mit der letzten Verwandlung als die größten und am complicirtesten ausgebildeten Organe auf \*\*).

397.

Die Lebensepochen dieser Zustände sind auch sehr verschiedentlich,

\*) Vergleiche deshalb die drei Zustände derselben bei der Wespe auf unserer ersten Tafel.

\*\*) Vieles zur Erläuterung dieser Angaben dienende bieten die zoologischen Abbildungen bei Rösel, Reaumur, Swammerdam, Ramböhr, Suckow, Strauss — Türkheim, Herold u. s. w.

aber immer gefährlich. Man weiß, wenn die Seidenraupen sich verpuppen, auskriechen u. s. w. und kennt auch von anderen Insekten diese Stufen. Zwar lassen sie sich durch Kunst bei einigen retardiren oder beschleunigen, auch gibt es eigene Irregularitäten \*) im Ganzen sind diese aber sehr selten, und die Insektenfänger kennen ungefähr die Zeiten, wenn sich die ersten Käfer, Schmetterlinge u. s. w. zeigen, welche andere Species auf sie folgen, und wo man sie auffinden muß. So sind die meisten Insekten nach Art der Sommerpflanzen einjährig, viele Schmetterlinge haben in einem Jahr einen zweimaligen Lebenslauf, andere perenniren den Winter hindurch \*\*). Die Blumen und a. sind vieljährige Insekten, manche Raupen oder vollkommene Insekten sind animalia nocturna, indem sie nur des Nachts fressen und lebhaft sind, bei einigen ist das Larvenleben lang \*\*\*) bei anderen nur kurz u. s. w.

---

\*) Bisweilen verwandeln sich die Seidenraupen beim vierten Häuten unmittelbar vor dem Einspinnen sogleich in einen Schmetterling. Majoli (Giornale di Fisica di 1813. Bimert. V, p. 399), sah es im Jahre 1792 und 1811. Diese haben einen kleinen Kopf und Raupenbauch, die Oberflügel sind lang und schmal.

Die Puppe eines schwedischen Käfers, *Buprestis splendida* hatte zwanzig Jahre in England in dem Holze eines Schrankes verweilt, als sie endlich auskroch (Marsham in den Transactions of the Linnean Society, Vol. X).

Derselbe erwähnt bei dieser Gelegenheit, daß ihm einst ein Freund Eier von *Bombyx mendica* brachte, wovon er 36 Raupen aufzog. Sie verpuppten sich alle: aber zu gehöriger Zeit kamen nur zwölf aus, im nächsten Jahre wieder zwölf, und im folgenden die letzten zwölf. — Etwas Aehnliches bemerkten auch De Geer und Düreril an *Bombyx Vinula*.

Mir ist einst eine schöne *Lithosia Jacobaeae* aus einer alten harten Puppe, die ich seit Jahren in meiner Puppensammlung liegen hatte, noch ausgekrochen.

\*\*) *Noctua pteridis* durchwintert als Raupe im Cocon.

\*\*\*) *Cicada septendecim* in Nord-Amerika lebt sechzehn Jahre als Larve unter der Erde.

Manche Raupen liegen mehrere Monate in der Ruhe, ehe sie sich zur Puppe verwandeln. Ihre Entfaltung geschieht in 3—4 Wochen. *Bombyx lanestris* kann aber auch bis vier Jahr liegen, *Sphinx Euphorbiae* hatte der Abbate Mazzola fünf Jahr, und so gehört hieher auch die eben erwähnte *Lithosia Jacobaeae*.

Da der anatomische Bau der Insekten im Allgemeinen schon im Vorigen angegeben ist, in seiner feinsten Ausführung aber nicht für das gegenwärtige Werk paßt, und besondere Auszeichnungen in demselben besser ihres Orts angeführt werden, so sey über ihn nur nochmals Folgendes zusammengefaßt.

Die Insekten besitzen einen doppelten, längs des Bauches hinlaufenden Nervenstrang, wie zwei zarte weiße Fäden, welche von Ring zu Ring in ein Knöthchen vereinigt sind, von welchem aus, Nerven zu den Organen abgehen. Vorn sind zwei dieser Knöthchen als eine Art Gehirn zusammengerückt, und man bemerkt von ihm aus zumal starke Nerven nach den Augen, den Fühlern und den Fresswerkzeugen abgehen. Die Muskeln sind zahlreich, und die der Raupe liegen in schönen parallelen und schiefen Bündeln, wie sie Lyonet vor Zelten schon abgebildet hat. Ein einfaches langes Rückengefäß, einen blaulichen Blutsaft enthaltend, gilt als Arterie und Herz. Es besitzt innerlich Klappen, und seitlich Öffnungen. Das Blut selbst umspült, wie man annimmt, die Organe des Leibes frei. Durch diesen ziehen zarte feine Röhrchen, längs jeder Seite in ein großes einfaches Rohr mündend, welche Stränge mit übersponnenen, aber hohlen Seiten verglichen worden sind, von denen sie auch in der That unter dem Mikroskop das Ansehen haben, und welche Tracheen oder Lufttröhren genannt werden. In ihnen circulirt die Luft. Sie bestehen, wie die Arterien der höheren Thiere (welche eigentlich auch Luft, nur mit Blut gemischt, führen), aus einer zarten äußeren und inneren Haut, zwischen welchen die knorpelige, einem Spiralfaden gleichende Zwischenschicht liegt, häufig erweitern sie sich zu kleinen Blasen oder Luftsäcken. Nach außen münden diese Tracheen in die Stigmen oder Luftlöcher, spiracula, stigmata, rundliche, elliptische oder wie ein Spalt gestaltete Mündungen seitlich an den Leibesringen, deren Ansehen man mit einem Knopfloch verglichen hat, da sie nach innen durch einen haarigen Blätterkranz wie geschlossen erscheinen. Gewöhnlich befindet sich zu jeder Seite eines Leibesringes, oder zwischen zweien, ein solches Luftloch, vorn und hinten fehlen sie bisweilen, oder sind am Bruststück am bedeutendsten.

Bei mehreren Wasserlarven treten sie am Leibe als mit Haaren eingefaßte Blätter heraus, und bilden dann wahre Kiem'en. Der Darmkanal ist ein mehr oder minder einfacher, vom Munde bis zum After reichender Schlauch, bei den vollkommenen Insekten aber ihren Zuständen mit mehreren Einschnürungen oder Quersulzen versehen, wodurch er sich deutlicher in Schlund, Speiseröhre, Wormagen, Magen, Darm, Kloak u. s. w. unterscheidet. An den Einschnürungsstellen dieses Nahrungskanals finden sich mehr oder minder zahlreiche, blind endigende Gefäße, bei den Raupen und anderen Maden, als einfachere, dicke Stränge, bei den vollendeten höheren Insekten zumal um den Magen als zahllose feine geschlängelte Fäden. Man erkennt sie jetzt zwar ziemlich allgemein für Gallengefäß, doch lassen sich die vorderen am Munde bei mehreren wohl auch Speichelgefäß nennen, wie denn im Grunde auch beiderlei Flüssigkeiten zur Verdauung dienen, was auch hier ihre Funktion ist. Im Besonderen kann man sie noch als Geißergefäß, Spinnengefäß, auch als Giftgefäß benennen und unterscheiden, da sie hier und da so zu bezeichnende Säfte aussondern.

Die Geschlechtstheile der Insekten sind stets auf zwei Geschlechter vertheilt, und nur als merkwürdige Ausnahmen findet man halbseitige Zwölfer unter ihnen, d. h. Individuen, bei denen die eine Seite männlich, die andere weiblich ist\*). — Die männlichen Geschlechtsorgane sind zwei sehr verschiedenartig gestaltete Hoden, die bald das Aussehen von einfachen Fäden, bald von Säcken, Kämmen, Büscheln oder Kugeln haben und beim Schmetterling im Larvenzustand, aus zwei getrennten, jedoch aus mehreren in einer Reihe liegenden Kugeln bestehen, die allmälig in eine gemeinsame Kugel zusammenrücken. Ihr Saame geht durch Saamenleiter in die Saamenbläschen über,

\*). Bemerkt bei einer Menge von Tag-, Abend- und Nachschmetterlingen, wo man es theils anatomisch untersucht hat, theils an der verschiedentlichen Gestalt der Fühler u. dgl. gewahr worden ist. Unter anderen Insekten ist es nur einmal an einem Hirschschroter und einem Maikäfer gefunden worden. Vollständig sind alle Fälle zusammengestellt in Burmeister's Entomologie I. B., S. 538. — Auch hat man Fälle, wo die Fühler und Oberschlügel eines Schmetterlings männlich, Bauch und Hinterschlügel weiblich waren.

und wird durch eine sehr vollkommen gestaltete Rute ergossen. Auch finden sich noch Nebenhoden, Vorsteherdrüse u. s. w. Die weiblichen Organe sind zwei Eierstöcke, die am häufigsten aus nach dem Ende hin spitzen Schläuchen bestehen, welche der Reihe nach längs mit Eiern gefüllt sind. Unten vereinigen sich diese Schläuche jederseits zu einem gemeinschaftlichen, in den Uterus führenden Eierleiter, von wo durch die Scheide die Eier nach außen, durch noch mancherlei complicirte äußere Geschlechtstheile, Schaamfalten, oder einen durch Verlängerung derselben gebildeten Legestachel u. dgl. abgesetzt und während dieses Aktes erst befruchtet werden. Bei manchen Käfern, Bienen u. dgl. haben die zusammengeschlagenen Eierstücke Aehnlichkeit mit Schoten oder anderen vielsachen Pflanzenfrüchten. Als accessorische Organe finden sich noch Leim- und Giftbläschen u. dgl. m.

Um den Darmkanal und die Geschlechtstheile herum liegt (am reichlichsten bei den Schmetterlingsraupen und anderen Larven) der sogenannte Fettkörper, eine weiße oder gelbe, flockige, mit vielen Tracheen durchzogene Masse, welche den ganzen Bauch ausfüllt. Genauer betrachtet besteht diese Masse aus Körnchen oder Läppchen von verschiedener Gestalt, auch Säckchen, die deutlich Fett enthalten, welches auch auf dem Papiere Flecken macht. Es scheint also doch nichts weiter als eine noch unverbrannte Nahrungsmasse, wenigstens ist er nicht die Leber, richtiger ist er dem Nähr der höheren Thiere vergleichbar, auch hat das vollendete Insekt nur noch wenig davon.

### 399.

Die äußere Haut der Insekten bildet sich in dem gereiften Zustande sehr aus. Bei den aus dem Ei kriechenden Larven, die sich nachmals verwandeln, zumal denen der Hymenopteren, Dipteren und Schmetterlinge, zeigt sie sich ganz wie das Hautgebilde der Thiere überhaupt, nämlich als eine Oberhaut, eine gefärbte Mittelschicht und eine innere Muskelhaut, an die sich auch die zahlreichen Muskelbündel befestigen \*), und so allein die Bewegung der Insekten vermitteln. Es ist aber der Charakter

\*) Vergl. I. B., S. 65.

dieser ganzen Thierklasse, daß sich diese Haut in Ringe theilt\*), welche in der Mitte etwas härter, an den Verbindungsstellen aber weich sind, und sich dadurch ineinanderschieben, oder wenigstens ausdehnen und zusammenziehen können, woher denn die wurmförmige Bewegung. Im Puppenzustand verhärtet diese Haut fast gänzlich (nur am Bauchtheile der Schmetterlingspuppen zeigen sich noch diese bewegliche Ringe); mit dem gereiften Zustande lehrt aber, und am ausgezeichnetsten zumal bei den Käfern und Bienen, diese Bildung von Schleifenringen wieder zurück. Die des Bauches schieben sich seitlich wie an einem Panzerhandschuh übereinander, und decken die weiche, meist ungefärbte Verbindungshaut; die des Bruststückes und des Kopfes sind dagegen zu einem (nur bei den Käfern zu zwei) festen Stücke verwachsen, und zeigen nach innen Verlängerungen u. dgl., die man das innere Hornskelet genannt hat\*\*). Bei den saugenden Insekten bildet der Kopf nur eine ungetheilte hohle Blase; eben so einfach ist das Bruststück der Fliegen; die übrigen zeigen dagegen innere Vorsprünge und Abtheilungen an diesen Theilen.

Da nun der Körper der Larven, zumal der Raupen, deutlich aus dreizehn Ringen zu bestehen scheint, und von diesen der Bauch des verwandelten Insektes noch neun zeigt, so muß man von den übrigen drei für den Brustkorb und einen für den Kopf rechnen. Es scheint aber, daß diese Zählung nicht immer haltbar ist, da theils bei manchen Insekten mehrere dieser Ringe zu fehlen, theils so verschmolzen zu seyn scheinen, daß man sie nur noch in der Idee wieder findet. Ja in dieser philosophischen Betrachtung muß man sogar ihrer noch viel mehr, selbst bei den Larven schon vereinte, annehmen, indem ja, der Consequenz nach, auf jeden Ring ein Paar Füße oder Gelenkgane kommen, deren Zahl also auch am Kopf, als in Mundtheile verwandelt, sich dann vergrößern muß. Indes nimmt man hier von in praktischer Hinsicht keine Notiz.

#### 400.

Das Insekt besteht, äußerlich betrachtet, aus einem

\*) S. vorn III, S. 10, §. 355 und 11, §. 356.

\*\*) Chemisch ist die Substanz derselben Chitine genannt worden.

gesonderten Kopf (caput), einem Bruststück oder Brustkorb (thorax) und einem Bauch (abdomen). An dem Kopfe sind die Sinnes- und die Freßwerkzeuge befindlich, am Bruststück die Bewegungswerkzeuge, Beine und Flügel (pedes et alae), am Bauche der vollkommenen Insekten findet sich aber nichts der Art, und nur die Legestacheln u. dgl. sind eine Art von, aber aus den inneren Theilen erklärlichen, Extremitäten\*).

401.

Der Kopf trägt zwei große, zusammengesetzte Augen (oculi compositi), und bei den ausgebildeten Zuständen der oberen Ordnungen zugleich noch auf dem Scheitel drei Punktaugen (stemmata, ocelli). So dann ohne Ausnahme zwei Fühlhörner oder Fühler (antennae), welche, wenn es sich völlig bestätigt, daß es die Hörorgane sind, ihren gewöhnlichen Namen dann sehr uneigentlich führen würden. Vorn, meist nach unten gerichtet, befindet sich der Mund. Es zeigt bei den beißenden Insekten (Käfern, Elbellen und Heuschrecken) deutlich eine Oberlippe (labrum), eine Unterlippe (labium), die aus dem Kinn (mentum) und der Zunge (ligula) zu bestehen scheint, und aus den zwei Paar Beißzangen. Von diesen nannte man die beiden größeren, stärkeren, an der Basis der Backen eingelenkten, die Kinnbacken oder Oberkiefer (mandibulae), und diese sind es, die bei den genannten Insekten, so wie auch bei den Wespen u. c. empfindlich beißen können; so dann die etwas darunter liegenden, kleiner und zarter, oft nur wie Blättchen gestalteten, Kinnladen oder Unterkiefer (maxillae). Sie bestehen nicht aus einem, wie die oberen, sondern aus vier Stücken. Die beiden ersten hängen unter sich, so wie mit dem Kopfe und auch der Unterlippe, durch weiche Bänder zusammen. Das unterste, neuerlich auch die Angel (cardo) genannt, ist schmal, liegt quer, und bildet mit dem folgenden einen rechten Winkel. Dieses zweite hat man den Stiel (stipes) genannt. Hierauf kommt das dritte, und endlich das vierte, mehr hakenförmige Stück. Es ist an der Innenseite

---

\* S. für diese und die vorigen wie die folgenden Organe unsere später erscheinenden Kupfertafeln.

ausgehobelt, mit kurzen steifen Borsten besetzt, und hat auch den Namen Maxillarlappen erhalten\*).

An den Kinnladen und der Unterlippe sitzen noch kleine, selten einfache, sondern meist mehrgliederige, den Fühlern nicht unähnliche, sehr bewegliche Organe, T a s t e r (palpi), auch Fr e s h s p i e g e n genannt. Letzterer Ausdruck ist verwerflich, da sie vielmehr im erstenen ihre wahrscheinliche Funktion ausdrücken. An den Kinnladen sitzt ein, bisweilen auch zwei Paar derselben (z. B. bei den Laufkäfern), an der Unterlippe noch eines. Sie heißen daher palpi maxillares, diese labiales.

Alle diese Organe verdienen darum eine so genaue Bestimmung, weil auf sie die Unterscheidung ganzer Familien, ja der Genera selbst, gegründet wird.

Die Kinnbocken wie die Kinnladen bewegen sich stets horizontal, und der genetische Ursprung derselben, so wie der Unterlippe lässt sich aus einer Vergleichung mit den zu Frischwerkzeugen verwandelten Füßchen der Krebse sehr gut auffinden. Sie untergehen aber bei den anderen als den oben angeführten Ordnungen, nämlich den saugenden Insekten, noch weitere Verwandlungen.

Schon bei den Bienen sind die Kinnluden nebst der Unterlippe so verdünnt und verlängert, daß sie die Gestalt eines Saugrüssels annehmen. Bei den Wanzen und verwandten Homopteren findet sich eine aus zwei Klappen bestehende, mehrgliederige Scheide, die verwandelte Unterlippe mit ihren Tastern, in welcher vier feine Borsten, die hierzu umgebildeten Ober- und Unterkiefer, liegen. Mit diesen sicht das Insekt, nachdem sich die Scheide nach der Wunde hin geknickt, und schiebt sie dabei in dem Kanale vor; zugleich saugt es damit, während des Zurückziehens derselben. Hier heißt dann das gesammte Organ der Schnabel (rostrum).

Bei den Dipteren findet sich theils dieselbe, theils eine abweichende Verwandlung. Bei den stechenden Mücken ist der Bau ziemlich wie zuvor; in einer Unterlippe schieben sich eine, auch

---

\* Bei den Heuschrecken und verwandten Orthopteren theilt sich dieser Lappen in zwei, und der äußere deckt den inneren wie ein Helm, und ist daher auch galea genannt, aber vormals irrig als ein eigenes Organ angesehen worden.

bis fünf Borsten hervor, wovon vier die Ober- und Unterkiefer sind, die fünfte, der eigentlich stehende Theil, die zu einer Lanzette ausgebildete Zunge. Oft ist letztere nur allein vorhanden und heißt dieses alles **Rüssel** (proboscis). Bei den Fliegen dagegen ist die Unterlippe weich, bildet einen **Schäppfrüssel** (haustellum), der gerade herabsteigt, sich kniesförmig nach vorn umschlägt, und in eine klappige Saugfläche, die verwandelten Lippentaster, endigt.

Bei den Schmetterlingen ist der letzte Lappen der Kinnladen oder Unterkiefer in einen langen, stielrunden, quergerunzelten Faden verlängert, der mit seiner inneren Leiste sich so mit dem andern verbindet, daß eine spirale hohle Röhre gebildet wird, die der Rollrüssel (lingua spiralis) genannt worden ist. Kinnbacken, Ober- und Unterlippe, und Taster sind gleichfalls in Spuren vorhanden\*).

Die zusammen gesetzten Augen nehmen bisweilen den ganzen Kopf ein, wie z. B. bei den Libellen, und man will an ihnen an 12.000 Facetten gezählt haben. Die Larven haben zum Theil noch gar keine Augen, bei den Raupen der Schmetterlinge erscheinen sie wie noch verhüllt.

Die Fühler bestehen in ihrer Grundform aus Gliedern, von verschiedener Zahl (1—40) die unter den mannigfachsten Gestalten vorkommen, und deshalb auch besondere Namen erhalten haben. Die, welche denen unseres Krebses am ähnlichsten sind, heißen **borstenförmige** (antennae setaceae) und haben sehr viele kleine Glieder. Sie verjüngen sich nach der Spitze hin. Dagegen heißen **fadenförmige** (filiformes) solche, die durchweg von gleicher Dicke bleiben, und aus cylindrischen Gliedern bestehen. **Borstenartige** (setiformes) heißen die, welche einer kurzen steifen Borste gleichen, die aus einem dickeren Grundgliede hervorsteht, wie bei den Libellen. **Pfriemenförmige** (subulatae) sind ähnliche Fühler, die dicker, kürzer, und dabei sanft gebogen sind. Ferner heißen sie **schnurförmige** (moniliformes), wenn ihre Glieder kugelrund sind. **Gezähnte** (dentatae) heißen Fühler mit kleinen spizigen Dornen besetzt. **Gesägte**

---

\* Eine noch viel spezieller ausgeführte Terminologie findet man bei Kirby und Spence, Burmeister u. a.

(*serratae*) dagegen sind welche mit dreieckigen Gliedern, die so aneinandergesetzt scheinen, daß eine Ecke jedes Gliedes nach vorn und unten steht, wie bei den Schnellläfern. Doppeltge sagt (*biserratae*) werden sie dann genannt, wenn auch nach oben eine solche Ecke vorsteht. Sind dabei die Glieder an der Grunfläche tief ausgehöhlt, so nennt man sie dachziegelig (*imbricatae*). Kammförmig (*pectinatae*) sind sie, wenn jedes Glied nach der einen Seite in lange Fortsätze ausläuft; doppelt kammförmig (*bipectinatae*) wo zu jeder Seite des Gliedes ein solcher Fortsatz entspringt, und zweidoppelt kammförmig (*duplicato-pectinatae*), wenn zu jeder Seite des Gliedes zwei Fortsätze herabhängen. Gekräuselt (*cirratae*), wo die Neste solcher Fühler lang und gekrümmmt sind. Es gibt auch ästige Fühler (*ant. ramosae*), an welchen einzelne Glieder Fortsätze nach oben ausschicken, wie bei Cladius. Sie sind den gabeligen (*furcatae*) verwandt, wo ein Fühler seiner ganzen Länge nach in zwei gleiche Neste getheilt ist. So bei Schizocerus.

Bei vielen Fühlern ist zumal das zweite, so wie die letzten Glieder anders gestaltet, jene nämlich viel länger, und das dritte in einem Winkel eingelenkt. Dies sind die gebrochenen (*antennae fractae s. geniculatae*), an denen man dann den Schaft (*scapus*) und die Geißel (*flabellum*) unterscheidet.

Man nennt unter dieser Abtheilung keulenförmige Fühler (*antennae clavatae*) die, deren Glieder nach und nach breiter werden. Geknöpft (*capitatae*), deren Endglied, oft auch mehrere, einen runden Knopf bilden. Durchblätterte (*perfoliatae*) heißen sie, wenn die Glieder des Knopfes rundum etwas abstehen (bei *Hydrophilus*); gelappt (*lamellatae*) wenn diese sich nach einer Seite hin zu breiten Blättern verlängern, wie beim Maikäfer u. s. w. Es gibt auch borstentragende Fühler (*ant. setigerae*), deren letztes Glied auf der oberen Seite eine feine Borste trägt, die einfach oder federartig seyn kann, welches bei mehreren Fliegen vorkommt. Dolchspitig (*mu-cronatae*) sind sie, wenn das letzte dicke Glied plötzlich in eine Spitze ausläuft. Endlich gibt es noch ganz unregelmäßige (*irregulares*), von denen mehrere oder alle Glieder eine ganz abweichende Gestalt angenommen haben.

402.

Das Bruststück (thorax), auch Mittelleib, Brustkorb\*) genannt, besteht aus drei Ringen. Der vorderste wird jetzt Vorderbrustring (prothorax), der zweite Mittelbrustring (mesothorax), der dritte oder hinterste Hinterbrustring (metathorax) genannt. Jeder dieser drei Ringe trägt unten ein Fußpaar, die beiden hinteren jeder oben noch ein Paar Flügel. Bei den Dipteren trägt nur der mittlere welche, bei den Schmetterlingen liegen auch noch davor ein Paar, wie kleine Schuppen gestaltet, die man bei vielen Abend- und Nachschmetterlingen leicht emporheben, und selbst wie die anderen Flügel ausbreiten kann. Diejenigen Theoretiker hätten demnach nicht ganz Unrecht, welche sagen, daß auch oben drei Paar, den drei unten befestigten Fußpaaren entsprechende, nur für den Flug entwickelte, Bewegungswerze vorhanden seyen, wovon jedoch nicht alle gleichmäßige Entwicklung erhalten haben.

Jeder jener oben angegebenen drei Ringe besteht nun bei den vollkommenen Insektenformen aus verschiedenen Stücken, denen man selbst wieder eigene Benennungen gegeben hat. Eigentlich hat jeder ein Rückenstück, ein Brustbeinstück, und jedersseits ein weich-seitliches, das ein Luftloch besitzt. Der Rücken verlängert sich nach hinten in eine Spitze, die beim ersten und letzten Ring meist klein und verborgen, am Mesothorax aber groß und nach hinten überragend ist, und schon längst als das Schildchen (scutellum), unterschieden wurde. Bei den Käfern sieht man es an der Basis der Flügeldecken, da wo sie zusammenstoßen.

Bei diesen zeigt sich auch von oben nur der Prothorax, und er wird da gewöhnlich allein der Thorax genannt.

403.

Auch die Flügel (alae) gehören zu den wichtigsten Organen. Gewöhnlich sind ihrer vier, welche an dem mittleren und dem

\*) Nicht Brust-Kasten. Man hat auch stethidium statt thorax gesagt. Die Terminologie dieses Theils ist sehr complicirt und verworren gemacht worden; ich halte mich an die, welche von Latreille, Müll und Kirby gebraucht wird.

hinteren Brustringe befestigt sind. Die Dipteren (Fliegen) zeigen nur zwei, am Mittelringe, manchmal noch dahinter die Spuren der anderen, als zwei Schüppchen; allein die sogenannten Schwingstangen (halteres), wie man sie als gestielte Knöpfchen zumal deutlich an den Schnaken sieht, gehören nicht hieher, die ungeflügelten Insekten haben, wie ihr Name angibt, gar keine.

Die verschiedene Beschaffenheit der Flügel wird besser erst bei ihren relativen Ordnungen angegeben: Im Allgemeinen zeigen sie eine obere und untere Haut, mit Zwischensubstanz, zumal aber bei den Durchsichtigen, mit Adern (venis) durchzogen. Diese Adern, da sie, wie die ganzen Flügel, trocken sind, hat man auch, wiewohl uneigentlich, Rippen genannt, und auf ihre Stellung, zumal bei den Hymenopteren, eine eigene Terminologie gebaut. So ist zumal die vordere Randrippe mit der hornigen Erweiterung, die man den Flügelpunkt nennt, leicht bemerkbar, die Adern bilden Zellen und Felder (cellulas et areolas), und danach lassen sich die Untergeschlechter genau bestimmen.

Die Flügel erhalten, ihrer Form nach, wie die Fühler, verschiedene Benennungen, die sich jedoch leicht von selbst verstehen.

#### 404.

Die Beine (pedes) sind nicht minder wichtig, ja nebst den Fresswerkzeugen und Flügeln die wichtigsten Stücke für die Systematik. Ihrer sind bei den ausgebildeten Insekten stets sechs.

Jedes Bein ist mittels einer Hüfte (coxa) in eine Gelenkgrube (fovea coxae) des Brustringes eingefügt. Mit dieser Hüfte steht ein kleineres Hornstück, der Schenkelring (trochanter), in beweglicher Verbindung. Man kann ihn an den Laufkäfern und den Wasserkäfern als ein zusammengedrücktes, schief abgesetztes Stück erkennen. Auf diesen Theil folgt das größte Glied, der Schenkel (femur), der stielrund, oft etwas keulensförmig, und wie ein sehr muskelfrästiges Organ erscheint. An ihn ist das vierte, das Schienbein (tibia), mittels einer Querrolle eingelenkt, die sich jedoch in der entgegengesetzten Richtung wie der Trochanter bewegt. In seinem Bau erscheint es nicht ganz gerad, selten bogig, röhlig, auch drei- und viereckig, und häufig

bedornt. Die Endstacheln werden Sporn (calcaria, spicula) genannt.

An dieses Schienbein fügt sich nun der Fuß (tarsus). Er besteht aus mehreren hinter einander liegenden Gliedern, davon das letzte groß ist und eine doppelte Kralle (unguis) bildet. Die Zahl dieser Fußglieder ist eins bis fünf, daher die Benennungen Pentamera, tetramera etc., welche zur Bezeichnung von Ordnungen dienen.

Auch hier hat man die Terminologie sehr lästig vermehrt. Springfüße, Schwimmfüße und dgl., sind aber leicht verständliche Bezeichnungen.

Zwischen den beiden Endkrallen befindet sich oft noch eine kleine Asterklaue (pseudonychia, empodium). Die Fußsohle (planta pedis) bildet meist Ballen oder Kissen.

#### 405.

Der Bauch oder Hinterleib (abdomen) kann auf höchstens zehn Ringe angenommen werden, wovon aber einige bisweilen innerlich sind. Gewöhnlich besteht jeder Ring aus einem Rückenstück und einem Bauchschielenstück. Bei den Insekten mit freiem Bauch sind entweder diese Schienentheile hart, und schließen sich, wie bei den Bienen, übereinander, oder sie sind weich. Bei den Käfern ist die Oberseite weich, weil sie von den Flügeln bedeckt wird. An den Seiten befinden sich die Luftlöcher.

Bei den höchst ausgebildeten Insekten zeigt sich der erste Leibesring von der Gestalt eines dünnen Stieles oder Rohrs, und man nennt dann den Bauch gestielt (abdomen petiolatum).

Bei allen Insekten befindet sich hinten der Astert, und bei vielen weiblichen noch eine hervortretende Egeröhre, welche entweder nur aus verengten Leibesringen, oder aus den verlängerten Schamfßen und dgl. besteht. Als Stachel (aculeus), der entweder frei hervorsteht, oder verborgen steckt, zeigt sie sich wie eine feine, zugespitzte, mehrklappige Röhre. Als Scheide (vagina) bildet sie zwei lange, zusammenpassende, Stücke, wie bei den Heuschrecken.

Die Blattläuse zeigen noch auf der oberen Seite des vorletzten Gliedes eigene Honigröhren, aus welchen Tröpfchen süßen Saftes ausschießen.

Die systematische Anordnung der Insekten ist zwar, ungeachtet ihrer so ungeheuren Menge und Mannigfaltigkeit, nicht so verwickelt wie die in manchen anderen Thierklassen, und dieß zumal aus dem Grunde, weil die Insekten so hoch und folglich so bestimmt, ja entschieden ausgebildet sind, allein sie ist doch ebenfalls auf mancherlei Weise versucht, und zumal im Einzelnen sehr ausgesponnen worden. Eine Menge Linne'sche Geschlechter sind jetzt zu ganzen Familien erhoben, und die Nomenklatur fast unüberschbar geworden. In gleichem Maße hat sich eine große Literatur angehäuft, und viele kostbare, wenn auch schöne Werke, haben das Studium durch ihre Theurung vielen Liebhabern erschwert. Man beschränkt sich daher häufiger auf die vaterländischen, die sich der Freund der Entomologie durch eigenes Sammeln leichter verschafft, da dieß zu den unterhaltendsten Beschäftigungen, zumal der Jugend gehört \*).

\*) Einige Nachweisungen zum Fang, der Sucht und der Aufbewahrung der Insekten werden hier um so mehr an ihrem Platze seyn, als sie auch bei den anderen Klassen mitgetheilt worden sind. Das eigentlich Praktische dabei erfährt wohl jeder Ansäger von einem Geübteren; es ist aber gut, auf den ganzen Umkreis dieses Geschäftes aufmerksam gemacht zu seyn.

Drei der neuesten und besten Anleitungen hiezu sind:  
*Mémoire sur la chasse aux Coléoptères, et sur la manière de les conserver.* In *Silbermann's Revue entomologique* Cah. 1, 2.  
*Hülfsbuch für Schmetterlingssammler* von Fr. Treitschke. Wien 1834.

Ein Aufsatz im *Hauslexikon*, von Prof. Künze.  
 Die Zahl der in Deutschland lebenden Insektenarten schlägt man jetzt auf etwa 14.000 an.

Zu ihrem Fang gehören verschiedene Geräthschaften, Instrumente, und vor Allem gute Nadeln.

1) Der Köfcher, Schöpfer, oder das Fangnetz besteht aus einem Drahtring von etwa einem Fuß Durchmesser. An diesem befindet sich ein Griff von Blech, drei Zoll lang, um einen etwa drittehalb Fuß langen Stock hineinzustecken. An den Ring ist ein Sack von sehr weicher, weißer Leinwand angeheftet, 15 bis 18 Zoll tief, nach unten etwas enger. Er wird oben mit Leder oder Althaut umnäht, und ist in der Masse nicht brauchbar.

Mit diesem fegt man, wie sichelnb, über Blumen und Kräuter weg, oder hält ihn unter Baumzweige, die man sacht schüttelt,

Die erste systematische Anordnung versuchte der Engländer **Bray** (Rajus), nach ihm **Linné**. Die des letzteren ist im

und erhält so eine Menge seltener Insekten. Im ersten Frühjahr-  
sonnenschein oder an warmen Abenden erheben sie sich gern in  
die Luft, und dann fängt man sie auch im Fluge.

2) Ein anderes Netz, von starker Gaze, dient für die Wasser-  
insekten. Seine Einrichtung ist dieselbe, man braucht aber einen  
längerem Stab dazu, und sorgt, diesen durch einen Vorstecker noch  
am Griffe zu sichern, da sonst das Netz wohl durch seine Schwere  
im Wasser abfallen und untersinken kann.

3) Ein Regenschirm, inwendig mit weißer oder grauer  
Leinwand ausgeschlagen. Man legt verkehrt ihn unter Bäume,  
an die man mit einem derben Stocke klopft, worauf manches sel-  
tene Insekt hineinfällt.

4) Ein weitmaschiges, schlaffes Deckenetz, für Schillervögel ic.

5) Die Klappe. Von Holz, die Schalen vorn abgestutzt, um  
sie an Mauern gebrauchen zu können. An den Seiten werden  
ihre Neize mit Leinwand umnäht.

Man hat sie von grösserem und kleinerem Format, eine ganz  
kleine ist gut, um die Insekten aus dem grossen Schöpfer oder  
Hamen zu nehmen. Man theilt sie auch in Felder von seidenen  
Schnürchen.

Es versteht sich, daß die Verfertigung dieser Geräthschaften  
nach guten Mustern geschehen muß, daher weitere Beschreibungen  
unnütz sind. Auch kann man seinen Apparat ins Unendliche aus-  
dehnen, wenn man z. B. noch Wasserhamen, Rechen, Spaten,  
eine Keule u. a. mit sich führen, auch einen kurzen grünen Rock  
mit vielen Taschen sich machen lassen will. Ferner kann man  
auch eine Patronetasche mit vielen Gläsern, theils leer, theils  
halb mit Weingeist, oder auch mit Papierschnitzeln gefüllt, damit  
sich die hineingehabanen Insekten vor den räuberischen verstecken  
können, sehr vortheilhaft brauchen. Sodann führt man mit sich  
einen Stock mit einer kleinen Hacke und einem Haken, um Erde  
aufzukrahen oder Baumäste herabzu ziehen. Nicht minder Messer  
und Meissel, vor allem aber bequem zu öffnende, mit Kork  
ausgepolsterte Schachteln zum Einsticken der angespisteten  
Insekten, und andere, nämlich Raupenschachteln, für die ge-  
fangenen Raupen.

Endlich bedarf man noch zweier Fäzzangen (pincette), ei-  
ner kleineren zum Anfassen der Insekten beim Anspießen, und  
einer stärkeren, mit etwas breitem Ende, um die Angespisteten  
an die Korktafel zu befestigen. Und nun.

Ganzen sehr naturgemäß, und bedurfte nur einiger Verbesserungen. Sie war auf den Gesamtbau gegründet, welche

---

ein kleines Nadelpolster, in verschiedenfarbige Felder getheilt, worauf die Nadeln nach ihren Größen vertheilt werden.

Die Nadeln selbst müssen wenigstens anderthalb Zoll lang, wo möglich gut versilbert, und so stark und steif seyn, als es ihre Länge verträgt. Ihr Knopf ist möglichst klein, ihre Spitze von den schärfsten.

Die besten erhält man jetzt in Berlin, Wien, Carlsbad und Augsburg. Die Französischen sollen nicht so vorzüglich seyn.

Man hat sie von vier Größen. Auf dem Fang steht man die Insekten seitlich an, und erst zu Hause mit mehr Sorgfalt senkrecht.

Alle Insekten von weniger als zwei Linien Länge werden mit etwas Gummi an die Spitze eines länglichen Dreieckes von weißer Karte, etwa drei Linien lang und zwei Linien breit, befestigt, an dessen Basis die Nadel gesteckt wird. Man befestigt das Insekt am Ast, damit man die Füße und die Untertheile frei sieht.

Alle größere Insekten hält man in  $\frac{2}{3}$  der Höhe der Nadeln, auch wohl noch höher an, um sie mit der Linse genauer betrachten zu können.

Eine sehr lange Pfeilspitze zum Ordnen der Füße und Fühler, und verschiedene härtere und weichere Pinsel zum Reihthalten der Insekten sind nothwendig.

Man wählt schöne Tage zum Ausgehen. Nebel, Regen und Wind sind dem Insektenfang ungünstig. Man gehe früh aus, um gleich nach dem Thau an Ort und Stelle zu seyn.

Käfer, die man in Weingeist werfen kann, thut man da hinein, und spießt sie bei erster ruhiger Gelegenheit an, wobei man sie jedoch auf Fließpapier abtrocknen lassen muß. Indess ist dieses von Manchen beliebte Verfahren (die Franzosen behaupten, man könne außer Schmetterlingen alle Insekten in Weingeist werfen, was aber durchaus nichts taugt), sehr mit Vorsicht zu empfehlen. Denn selbst viele Käfer verlieren dabei etwas von ihrer natürlichen Schönheit und Farbe. Für Fliegen und Schmetterlinge ist dies gar nicht anwendbar. Am besten ist es für die räuberischen Käfer, die sonst die andern im Glase verstümmeln.

Zu Hause wirft man die starken noch lebendigen Käfer in kochendes Wasser und lässt sie dann auf Fließpapier abtrocknen. Andere Insekten stellt man in eine Schachtel mit Glasdeckel der Sonne aus, noch besser aber hält man die Angespießten in kochende Wasserbämpfe, wovon sie bald sterben.

Auch das Insektenglas kann man mit denen darin befindlichen beim Nachhausekommen in kochendes Wasser tauchen.

Berücksichtigung stets vor der eines oder nur einiger Merkmale den Vorzug verdient, so schätzbar auch eine weitere Ausbildung seyn

Die Insekten in die Ofenhitze stellen, um sie zu tödten, ist nur dann zu rathen, wenn man nicht vergibt, sie bald wieder hinwegzunehmen.

Man führt auch ein Glas mit weiter Öffnung und Stöpsel, in welchem ein Glasrohr oben wiederum mit Stöpsel angebracht ist. In diese kleinere Öffnung wirft man die kleineren Insekten, die dann nicht herauskriechen können. Bringt man etwas Bitriolnaphtha hinein, so sind die meisten schnell gestötzt; doch leben viele nachmals wieder auf, und diese Tödtungsart ist demnach unsicher.

Der Frühling ist die günstigste Zeit zum Insektenfang. Um reichsten der April und Mai, denn die meisten Insekten leben um diese Zeit. Indes haben auch die folgenden Monate ihre Eisernen. Zumal bemerkt man, wie dieses Dr. Heer in Glarus noch weiter verfolgt hat, eine gewisse Succession, so daß im Frühling die meisten Raub- und Dungkäfer, im Hochsommer mehr die Rüssel- und Bockkäfer, im Spätsommer die Coccinellen am häufigsten sind. Auch findet man viele Fliegen und Hymenopteren alsdann noch auf Blumen. Ende September verschwinden aber die meisten Insekten. (In heißen Ländern ist der Anfang und das Ende der Regenzeit die ergiebigste; außerdem findet man fast nichts.)

Der Winter ist indes keinesweges bei uns ganz unergiebig. Unter Steinen, Moos, Rinden, Wollkrautblättern findet man Käfer und Raupen, oft recht seltene. Auf der Unterseite beider Blätter finden sich zusammengerollte Eulenraupen, welche man dann mit diesen Pflanzen oder ihren hervorkeimenden Trieben füttet.

Auch gehe man gleich nach weggeschmolzenem Schnee an sonnigen, windstilten Tagen über die Wiesen, wo Bärenraupen und andere unter flachen Steinen sitzen.

An den Stellen vorjähriger Ausbente in Laubwäldern durchsuche man das mit einem Rechen umzuwendende Laub. Auch an abgefallenen Weidenkätzchen finden sich Raupen.

Im Oktober dagegen gräbt man um die Waldbäume und die der Alleen nach Puppen. Sie liegen meist nach Süd und Ost; um Ulmen, Eichen, Pappeln, Linden zumal.

Die Raupen der Schilfseulen findet man in den Halmen der Rohre. Auch die Blattscheiden derselben liefern Insekten im Frühjahr.

So die hohlen Stengel der Wasserschirmypflanzen.

Man untersuche das Holz und die Unterseite der Steine in Bließbächen. Sie enthalten zumal seltene Käfergattungen.

muß. Während nun einige die Zahl und Gestalt der Fußblätter, andere die der Flügel mehr als Eintheilungsgrund hervorhuben,

Bei Ueberschwemmungen sammelt man rasch das Gestöhrde in einen Sack, und untersucht es zu Hause auf einem weißen Tuche.

Im Frühjahr wie im Herbst sind Steine rasch umzuwenden, so auch Baumrinden und faules Holz zu untersuchen.

Auch frische Bäume untersuche man im Sommer wie im Winter, und breite ein weißes Tuch darunter.

Ferner das Moos der Wälder, was man in Massen aufgerafft, zu Hause durchsucht.

Man untersuche die Schwämme.

Was, Dünger, Koth aller Art. Man kann ihn in ein Gefäß Wasser werfen, wo er untersinkt, und die Insekten heraufsteigen. Auch grabe man unter diesen Stoffen in die Erde.

Man lege große Fleischstücke aufs Feld oder in den Wald. Nach zwei bis drei Tagen werden sie von Insekten wimmeln.

Man untersuche deshalb auch die Töpfe mit Wasser, welche die Landleute in die Erde graben, um die Feldmäuse zu tödten. Man findet oft sehr seltene Insekten darin.

Die Ameisenhaufen enthalten sehr seltene.

Die großen Wespennester enthalten Schmarotzer-Käfer.

Man kann auch ein Glas mit dünnem Gummi vor ein Gartensfenster über Nacht stellen, wo sich nicht selten schöne Insekten darin fangen. So hat man auch vorgeschlagen, einen Rahmen mit gefirnißtem Papier überzogen, unter Bäumen anzubringen, an welches sich dann Insekten kleben. Dies, und daß bei Illuminationen, in Gärten und Parks in den Lampen tote Schmetterlinge gefunden werden, kann zwar hie und da zu einer Seltenheit verhelfen, allein solche Exemplare sind fast nie gut.

Die Nachtinsekten fängt man besser durch Laterneu Licht, auf ausgehängter Wäsche, in Tümpeln im Mondschein oder an hellen Wänden.

Überhaupt aber untersuche man, selbst am heißen Mittag, Lehmwände, Gartenthüren, Pfosten und Blumen. Gegen Abend die Zäune nach der Abendsonne hin, die Baumstämme, die sogenannten Bretterschränke (auseinandergeschichtete Bretter) in den Wäldern, die Dekomischöpfe der Mühlen, und alle Fluß- und Teichufer, Sumpfstellen, und deren Wasser selbst.

Selbst die betretensten Wege und Stege, staubige Fahr- und Landstraßen enthalten ihre eigenthümlichen Insekten.

So wie der Gärtner oft die besten Früchte aus Samen zieht, so auch der Insektsammler seine schönsten Exemplare aus dem Ei: die Schwierigkeiten sind aber bei manchen so groß, daß bekanntlich nur die Zucht der Schmetterlinge aus Raupen

wählte Fabricius die Mundtheile, und gründete auf ihren verschiedentlichen Bau ein System, welches, so wie seine

---

wesentlich betrieben wird, und es auch verdient, da man oft nur auf diese Weise ganz unverletzte Exemplare erhält.

Man kann Raupen fast das ganze Jahr hindurch finden, wie zuvor schon erwähnt, selbst im Winter unter großen Blättern und Steinen. In den anderen Jahreszeiten erhält man viele durch Abklopfen der Bäume.

Im Frühjahr lassen sich unbekannte Raupen am besten mit Mäusedarm (*Stellaria s. Alsine media*) füttern; überwinternde Raupen füttet man mit Salat, oder jener *Stellaria*, die man sich in Geschirren zieht, an gelinden Tagen.

Man vermische so wenig wie möglich fremde Raupenarten; denn mehrere begeifern einander, oder fallen sich feindlich an. Man bringt daher solche sogenannte Fressraupen in besondere Schachteln. Auch ist es gut, unbekannte Raupen einzeln zu erziehen.

Der alte Bonnet empfahl eine Einrichtung, die mehr artig aussieht, als daß sie bequem wäre. Er bedeckte ein kleines rundes Postament, mit Beinen wie an einem Fußschemel, mit einem großen Glaszyylinder. Jenes Postament hatte in der Mitte ein Loch, durch welches das Futter der Raupen gesteckt, und unten in ein Gefäß mit Wasser gebracht wurde. So blieb es frisch und man konnte die Raupen unter der Glasglocke zugleich beobachten.

Allein die Ausdüstung der Pflanzen und Raupen, der Mangel an gehöriger Luft, und die Mühe des Abräumens machen diese Einrichtung sehr unzweckmäßig. Um besten schafft man sich Puppenkästen, mit dichtem Flor überzogen, an. Der Deckel muß an ihnen zwei Zoll höher gehen als der Falz, weil sich viele Raupen oben im Winkel verpuppen, und man sonst ihr Gespinst zerreißt; zudem soll auch das Zertrennen der Puppenfäden auf viele Schmetterlinge tödtlich wirken.

Ein Drittheil Höhe wird ein solcher Kasten mit Erde, mit Sand vermischt, bedeckt, und in dieses 2—3 Gläser mit frischem Futter gesteckt. Man faßt die Raupen nicht gern mit bloßen Händen an.

Die meisten Raupen verpuppen sich zu Ende der Fruchtzeit. Manche liegen mehrere Monate in der Ruhe, ehe sie sich verpuppen. Die großen Schwärmeraupen können bisweilen aus zu großer Trockenheit ihrer Haut nicht zu dieser Operation gelangen, und dann muß man helfen. Ich riette einst einem Knaben, der seit lange eine schon ganz frank gewordene Totenkopfraupe in einer leeren Schachtel hatte, sie mit frischem Laub zu bedecken; er holte so eben vom Regen durchnähtes Kartoffelkraut herbei, und nach

Werke überhaupt, eine große Erweiterung und Verbesserung  
der Entomologie zu Wege gebracht haben\*). Indes ist es nur

\*) Seine Werke, sind noch jetzt klassisch, ja unentbehrlich. Freilich  
sind sie hier und da noch mangelhaft, die Definitionen oft so kurz,  
dass sie so gut wie nichts sagen, auch Angaben, wie „habitat in  
Europae Corylo“ ans Lächerliche grenzen — allein diese affektirte  
Klassicität war im Geschmack damaliger Zeit.

---

einer Viertelstunde schon war die Häutung zu einer schönen Puppe  
vollendet.

Deshwegen muss man auch die unter der Erde gefundenen  
Puppen mit zwei bis drei Lagen Fließpapier bedecken, was man  
wöchentlich einmal befeuchtet. Auch habe ich zu Zeiten mit  
Vortheil nasses Gras hineingelegt. Doch können die Gespinnste  
anderer trocken bleiben.

Im Winter hebt man seine Puppen in kalten Zimmern oder  
auf Böden auf. Bei Eintritt der milden Jahreszeit bringt man  
sie allmälig in die geheizten Zimmer, und so entwickelt sich bis  
Mai und Junius gewöhnlich Alles.

Indes gebe man nicht jede unbeweglich und hart gewordene  
Puppe auf, da sich manche noch unerwartet nach Jahren wickelt,  
wie oben bereits Beispiele erwähnt waren.

Im Winter frieren auch alle Puppen glasartig, bis zum Zer-  
brechen, hart, und klingen, wenn man sie auf einen Stein fallen  
lässt. Sie thauen allmälig wieder auf. Bei Ueberschwemmungen  
liegen manche auch Wochenlang unter Wasser, ohne Schaden.

Dass der auskriechende Schmetterling Raum haben müsse,  
seine Flügel gehörig zu entfalten und sich zu reinigen, ist bekannt.  
Wie mancher schöne Vogel geht aus Vergessen dieser Vorsicht zu  
Grunde. Die Puppenkästen seyen daher geräumig, auch ist es  
gut, kleine Reiser ic. anzubringen, an denen die ausgekrochenen  
Schmetterlinge hinankriechen können.

Man bedient sich beim Anspießen der Schmetterlinge gern  
recht langer Nadeln, um das Flattern unschädlicher zu machen.  
Die meisten tödtet man, mit einem Druck unter den Flügeln. Große mit einer langgestreckten, glühenden Nadel, die man durch  
ein Kartenblatt steckt. Man vertauscht diese Nadel nachmals mit  
einer frischen, denn die geglühte erhält eine sehr weiche Spitze,  
die sich beim Einstechen des Schmetterlings umbiegt.

Die Tafeln der Spannbretter seyen von Linden- oder Weiden-  
holz: tannenes hat ungleiche, harte Streifen. Zum Aufbreiten  
empfiehlt man jetzt Streifen von Silberpapier; kleine Glastafeln  
sind ebenfalls gut, und brauchen nur bei den grösseren etwas be-  
schwert zu werden.

im Einzelnen an seinem Platze, indem nach richtiger, logischer Rangordnung die Freßwerkzeuge, als besondere Organe, nicht zum

Die grünen Spanner soll man, nach Treitschke, sogleich ausbreiten, und das Spannbrett mit auf die Excursion nehmen!

Trockene Schmetterlinge bringt man in einen steinernen Topf, der mit nassem Sand gefüllt ist. In diesen steckt man Hollunderstäbchen, und den Schmetterling darauf. Oben wird der Topf zudeckt. Doch gestehe ich, daß mir viele Stücke auf diesem Wege mißlungen sind.

Was von den Schmetterlingen gilt, läßt sich auch auf die übrigen Insekten anwenden. Man sorge bei allen, daß die Fühler gut ausgebreitet werden, um sichtbar zu seyn, und die Beine zumal die Fußblätter, so viel wie möglich. Indes pflegt man diese heutzutage meist hängen zu lassen, oder nur schwach auszubreiten, da man sie so leicht abstößt.

Ueber die Aufbewahrung der Insektsammlung sind die Ansichten und Liebhabereien verschiedener wie irgendwo. Vieles ist Vorurtheil. Wer von Kindheit an seine Schränke und Kästen lieb gewonnen, wird deren Einrichtung anempfehlen, ein anderer die seines Lehrers vorziehen, ein dritter vorzüglich seine besonderen Zwecke dabei ins Auge fassen. Eine vollkommen gute Einrichtung ist theuer, zumal wenn man die erste große Anschaffung erwägt.

Die Einrichtung, jedes Insekt in ein eigenes Kästchen, oben und unten von Glas, mit Holzrahmen eingefasst, zu bringen, ist wohl nur bei sehr ausgezeichneten oder sehr großen Stücken zu empfehlen, und in größerer Menge nur da, wo sie zum Lehrunterricht umhercirculiren sollen. Außerdem ist sie gewiß die schlechteste von allen. Ich habe solche Sammlungen gesehen, bei denen fast alle Hymenopteren und Schmetterlinge durch Anfressen zu Grunde gegangen waren, andere verschimmelt, oder die Glästafeln von Innen beschlagen, und immer war eine Betrachtung solcher Stücke mit dem Vergrößerungsglas unbequem, ja oft unmöglich, nicht zu gedenken der Schwierigkeit, alte sehr trockene Stücke zu dieser Vorrichtung von ihrer Nadel zu befreien und sie durch keinen zu großen Tropfen Leim auf dem Glase zu befestigen. Auch wird man es schwerlich aushalten, eine sehr große Sammlung auf diese Weise aufzustellen.

Es wird daher immer die zweite Methode, viele Insekten in größeren Kästen zu vereinigen, den Vorzug behalten, und für den eigenen Besitzer besonders, da sie ihm den Ueberblick erleichtert. Nur eine Unbequemlichkeit wird dabei nicht zu vermeiden seyn: entweder viele leere Räume für künftige Ausfüllung lassen, oder von Zeit zu Zeit ganze Kästen umstecken zu müssen.

Gewöhnlich wählt man wagerechte Kästen, etwa achtzehn

allgemeinen Einteilungsprinzip erhoben werden dürfen, wenn schon ihr Bau häufig mit dem Gesamtbau zusammenstimmt.

Soll lang und breit, und wenig höher, als die einzustechenden Nadeln. Der untere Theil der Kästen hat in der Mitte der Seitenrahmen eine schmale Leiste, auf welche ein Falz des Rahmens genau paßt, und dieser wird noch von beiden Seiten mit Messinghäckchen, wie bei den Futteralen verschlossen. So ist es allerdings einem Raubinsekte fast unmöglich einzubringen, und man kann doch den Kästen jederzeit bequem öffnen. In den Boden dieser weiß auspapirten oder angestrichenen Kästen werden Leistchen von weichem Holz (junzen Linden, Weiden, Pappeln, Espen &c.) 4—5 Linien hoch, 2—3 Linien dick, eingesetzt, und an den Enden mit Stiften befestigt. Diese kann man dann nach Belieben enger und weiter von einander stellen, auch ganz herausnehmen und anderswohin versetzen; auf sie werden die Insekten gesteckt, und ihre Namen darunter, oder auf dem Boden angebracht. Der obere Deckel ist von Glas.

Hierbei ist mir nur mehrmals der Nachtheil eingetreten, daß sich jene Leisten krumm gezogen, oder beim Herausheben Widerstand geleistet haben, wodurch mir einzelne Stücke beschädigt wurden.

Dagegen haben allerdings andere Einrichtungen auch wieder ihre Uebel. Steckt man die Insekten in den bloßen Boden des Kästens, so muß man sehr gerade Linien ziehen, wenn die Sammlung nicht häßlich aussehen soll, und das Einordnen neuen Zwachs ist unbequem. Auch sind die Meinungen darüber verschieden, woraus der Boden bestehen solle. Ich finde Linden- oder Pappelholz sehr gut, und auch wohlfeil nur muß man erst mit einer Pfrieme die Stelle vorbohren; die Behauptung, daß jene Holzarten mit der Zeit die Nadeln wieder heraustrieben, habe ich bis jetzt noch nie bestätigt gefunden. Den Boden mit Korktafeln, Mulm oder Toß anzufüttern, ist müßsam, und gewährt Unsicherheit, da diese Stoffe ungleich locker, oder zu hart sind. Doch stecken sich die Nadeln gut in Rasentorf. Die Einrichtung endlich, jede Stelle mit einem Würfelchen Kork zu bekleben, sieht nicht schön aus, ist zeitspielig, und leicht fällt ein solcher Würfel einmal ab. Doch kann man es bei Schmetterlingen anwenden, deren Kästen dann Boden wie Deckel von Glas haben müssen, wodurch man den Vortheil erhält, die Stücke von oben wie unten betrachten zu können.

Noch erwähne ich einer Einrichtung, die ich zwar kaum empfehlen will, die sich mir jedoch seit fast zwanzig Jahren, wo ich sie versuchte, ohne wesentlichen Nachtheil erwiesen hat; nämlich senkrechte, wie Bücher in einen Schrank einzuschiebende, ziemlich hohe Kästen anzuwenden. Ich habe auf diese Art eine Sammlung

Man ist daher fast allgemein zu einer verbesserten Linné'schen Anordnung und Benennung zurückgekehrt, die sich dann nur

---

aller Ordnungen Insekten, und sowohl die Schmetterlinge als Käfer u. a. erhalten sich vortrefflich, ob schon nicht einmal Glas über den einzelnen Kästen ist. Der Mulfstaub, der sich hier und da einstellt, kommt auch bei den waagerechten Kästen vor, und betrifft vorzüglich Schmetterlinge, die dann und wann verderben.

Jene horizontalen Kästen pfelegt man übereinander geschoben in einem mit Thüren verschlossenen Schrank zu bewahren, und diesen am besten im Winter an einem geschützten Orte, etwa seinem Wohnzimmer, aufzustellen, um Schimmel zu verhüten.

Demungeachtet wird man nie so glücklich seyn, eine Insekts-sammlung völlig ohne alle Angriffe der Verderbnis immerfort zu bewahren.

Viele Orthopteren, mehrere Käfer und Dictyopteren verziehen ihre Gestalt.

Manche Schmetterlinge bekommen einen feuchten, wie mit Del getränkten Bauch, der endlich das ganze Stück angreift und verdorbt. Döbner vermutet, daß zurückgehaltener Geschlechts-trieb eine spermatische Gährung, und somit dieses Uebel erzeuge. Das leidlichste Gegenmittel bleibt, das Exemplar mit Bitriol-naphtha zu benetzen oder darein für einige Zeit einzutauchen, da diese wieder völlig verdunstet. Andere rathen, den Schmetterling in Kreide- oder Thonpulver zu vergraben, was mir nicht wohl-gehan scheint.

Die gefährlichsten Feinde sind aber die wirklichen Raubin- sekten, Papierläuse, Milben, kleine Spinnen und Käferlarven, welche letztere, indem der Käfer sein Ei an den nur etwas klaffen-den Rand eines Kastens legte, sich einen Weg in denselben zu bahnen wissen.

Die Papierläuse und Milben, dem Auge fast unsichtbar, erzeugen das mulmige Pulver, was man bald unter dem schadhaften Stücke, oder an den Ecken der Kästen gewahr wird, und von einem Verzehren der haarigen u. a. Oberfläche der Insekten herkommt. Der Vorzug der senkrechten Kästen soll eben darin bestehen, daß diese Raubthiere nicht so gut ankommen können, und bei jeder Erschütterung des Kastens herabfallen. Gegen sie ist am bewährtesten, zu Seiten in den Ecken der Kästen etwas Cajeputöl auf Schwammstückchen, und diese befestigt, oder Stückchen Campher in Baumwolle, anzubringen. Jene kleinen Thiere sollen zumal vom Papier und vom Kleister kommen.

Der März und der August sind die gefährlichsten Monate für die Sammlungen. Hier ist öfters Nachsehen unumgänglich nothig. Ist der Bauch eines Stückes angefressen (wo oft die Made

entweder berichtigender Bestimmungen, zumal in der Nomenklatur bedient, oder sich dadurch unterscheidet, daß sie die Ordnungen in einer anderen Reihenfolge aufstellt.

408.

Wer über die Prinzipien einer natürlichen Anordnung wirklich mit sich im Klaren ist, wird wissen, daß das bloße Gefühl, oder ein ästhetischer Grund, auf diesem Gebiete niemals die Entscheidung geben. Mancher meint, die Schmetterlinge müßten die vollkommensten, folglich höchsten Insekten seyn, weil

---

noch darinnen steckt), so werfe man einen solchen Käfer vierundzwanzig Stunden in Weingeist, oder sehe andere dem heißen Ofen aus.

Ueberhaupt aber bringe man in jeden Kasten ein Kugelchen Quecksilber; zumal in die Schachteln des täglichen Gebrauchs, wo man seinen neuen Fang einstweilen aufbewahrt.

Manche Insekten, zumal Käfer, die Holzwespen, auch einige Schmetterlinge, erzeugen oben an der Nadel Grünspan in Fett. Diese unangenehm aussehende Masse bringt man leicht durch Schmelzen hinweg; nur muß man die glühend gemachte Nadel schnell in kaltes Wasser tauchen, damit sie wieder erhärte.

Staubig gewordene Insekten kann man theils mit einem trockenen Pinsel reinigen, theils mit einem in Weingeist, Naphtha oder auch Campherspiritus getauchten. Ich habe einst aus einer fast zertrümmerten, schmutzigen Sammlung amerikanischer Insekten eine große Menge durch vorsichtiges Reinigen und Anleimen der Beine ic. mit Haufenblase, so schön wieder hergestellt, daß man diese Stücke für frisch und neu hält.

Nie aber sehe man, um ein Stück vervollständigen zu wollen, von einem anderen etwas an dasselbe. Oft wird solcher Betrug bei käuflichen Insekten ausgeübt.

Zur Versendung der Insekten bedient man sich am liebsten der Schachteln, deren Boden und Deckel mit Kork ausgefüttert und wieder mit Papier überklebt ist, ohne einen Spalt zu lassen. Hier werden die Insekten fast eingesteckt, und dann versucht, ob sie haltbar sind. Neuerlich verklebt man für weitere Sendungen diese Schachteln dann rundum mit Papier, und versenkt sie in eine größere, oder eine Kiste, mit Werk ausgefüllt.

Man kann auch die Schmetterlinge, in Baumwolle gepackt, versenden.

sie die schönsten sind; oder darum, weil ihre Larven am Tageslicht leben; andere schen die Käfer zu höchst, weil sie im Bau als die am Kunstreichsten gebildeten, oder an Arten die zahlreichsten seyen; bei wieder anderen kommen die Zweiflügler an die höchste Stelle, weil sie die zäresten, fast verflüchtigten Arten aufzuweisen haben; eben so verführerisch ist für diesen und jenen eine scheinbare Verwandtschaft, z. B. zwischen Käfern und Orthopteren gewesen, so daß sie diese nebeneinander stellten.

Aber es muß doch das Leben selbst, der Geist in der Natur, als das Höchste anerkannt werden. Die Form ist ja nur das Produkt, das Resultat davon, und schlägt auch auf untergeordneten Stufen hie und da in dieselbe höhere Nehnlichkeit aus. Diejenigen Insekten daher, welche in ihrer Lebensweise die höchste thierische Intelligenz, Industrie, Kraft und Lebendigkeit, verbunden mit hoch ausgebildeter Organisation zeigen, werden ohne Zweifel die vollkommensten und höchsten seyn, und dieses sind ohne Widerrede die Ameisen, Schlupfwespen und Bienen.

Diese genannten gehören zu den *Hymenopteren*. Im Bau ihrer Mundwerkzeuge verbinden mehrere sogar die beißenden Kinnbacken mit den saugenden Kinnladen, und grenzen damit einerseits an die Käfer, anderseits an die *Schmetterlinge*. Diese beiden großen Ordnungen zeigen aber, ungeachtet ihres Gegensatzes, wonach man die einen mit harten Nüßfrüchten, die anderen mit Blumen vergleichen möchte, doch eine sehr bedeutende Verwandtschaft und Ueberinstimmung. Ihnen ordnen sich zunächst an: als beißende die *Dictyopteren*, als saugende die *Dipteren*, ebenfalls nur als untergeordnete Gegensäthe eines Gemeinsamen. Und auf sie folgen zuletzt noch die beißenden *Orthopteren* einerseits, die saugenden *Hemipteren* anderseits, welche einander dergestalt verwandt erscheinen, daß sie Kinn noch nicht einmal zu trennen wagte.

Die achte Ordnung, welche als einziges Geschlecht den ungeflügelten Floh begreift, läßt sich zwischen die Vorigen nirgends naturgemäß einschieben, wenn man sie nicht, etwas gewaltsam, mit unter die Ordnung der Zweiflügler bringen will. Es ergibt sich hieraus wiederum, daß weder die Metamorphose, noch das Daseyn oder die Gestalt der Flügel allein, die natürliche Anordnung bedingen.

Wir ordnen daher die Insekten folgendermaßen:

**I. Intelligente, lebhafte, unermüdliche, freie.**

Sie zeigen die höchste Emsigkeit, Beweglichkeit, Reizbarkeit mit Muskellkraft verbunden, und häufig eine ausgezeichnete Industrie, selbst mit Spuren von Überlegung. Kopf, Brust und Bauch sind scharf getrennt, oft nur durch einen zarten Stiel verbunden. Vieraderige Flügel stehen frei, die Beine sind selbst oft zu besonderen Geschäftchen gebildet. Der Kopf ist zierlich, bildet ein wahres Gesicht mit großen Augen, dazwischen noch Punktaugen, die Fresswerkzeuge sind vollständig vorhanden. Am After tritt oft noch ein Legestachel als langes, besonders ausgebildetes Organ hervor. Ihr innerer Bau zeigt sich als von den am höchsten gebildeten, die Tracheen zeigen selbst Lungenbläschen. Die meisten spinnen Seide, wie die Schmetterlingsraupe, und viele sorgen mit Überlegenheit für ihre Nachkommenschaft, und bereiten ihr Wohnungen und bequemen Aufenthaltsort.

**Erste Ordnung. Bienen. Hymenoptera.**

Mit vier durchsichtigen Flügeln, wovon die vorderen breiter und länger, und mit einigen längsverzweigten Adern durchzogen sind. Kinnbacken und Kinnladen, letztere die Lippe umschließend. Die Metamorphose vollkommen. Die Larve eingeschlossen lebend, die Puppe unbeweglich.

**II. Wenig intelligente, mehr ruhige, schwefällige, mit sehr hoher Metamorphose.**

**Käfer und Schmetterlinge.**

So verschiedenartig diese gegeneinander betrachtet auch erscheinen mögen, so vielfache Beziehungen zeigen sie doch, so daß man sie nur als sehr extreme Gegensätze ein und desselben Typus betrachten muß. Weder Käfer noch Schmetterlinge äußern, etwa einige Maskäfer oder Cicindelenlarven abgerechnet, die Industrie der vorigen; beide zeigen aber auf ihrer Oberfläche oft metallisch glänzende Schüppchen (z. B. die Juwelenkäfer und die

Plusien), beide überhaupt die prächtigste Zeichnung und Färbung der Flügel; beide haben eine regelmäßige Metamorphose. Die Larve ist bei beiden mit Füßen versehen, laufend (in beiden Ordnungen kommen einzelne Ausnahmen vor) und sich selbst ernährend, die Puppe unbeweglich; die Species sind sehr zahlreich und ihre Organisation vollständig. Merkwürdig, daß gerade auch diese beiden Ordnungen die meisten Liebhaber und Sammler gefunden haben.

### Zweite Ordnung. Käfer. Coleoptera.

Mit vier Flügeln, wovon die oberen hartschalig, hornartig und undurchsichtig sind, die unteren durchsichtig, weich, quergefaltet und geaderd, und von den oberen in der Ruhe bedeckt. Vollkommene Kinnbacken und Kinnladen zum Beißen, zweierlei Augen. Die Metamorphose vollkommen. Die Larve meist mit sechs Füßen, die Puppe unbeweglich, verschlossen.

### Dritte Ordnung. Schmetterlinge. Lepidoptera.

Mit vier großen, oft sehr breiten Flügeln, welche selten nackt, gewöhnlich mit farbigen Schuppen besetzt sind. Der Leib ebenfalls dicht behaart v. dgl., der Bauch weich. Die Fresswerkzeuge sind bis auf die, nebst der Unterlippe zu einer Spiralszunge verlängerten Kinnladen verkümmert, und jene dient nur zum Saugen. Die Metamorphose vollkommen. Die Larve mit Füßen in verschiedener Anzahl, frei lebend; die Puppe in einer, die künftige Gestalt nur wenig andeutenden Hülle, oder mit noch einem Gespinst darum.

### III. Sehr empfindliche, umherschweifende, leichte, mit schon unvollkommener Metamorphose.

#### Fliegen und Neßflügler.

Auch sie bilden eine bezügliche Verbindung: jene als die saugenden, diese als die bissenden. Beide sind größtentheils missfarbig, nähren sich viel von thierischen Substanzen, erscheinen oft in Schwärmen und fangen bereits an, Parasiten zu seyn. Beide haben ihren Larvenzustand theils im Trocknen, theils schon im Wasser, in diesem Falle mit einer unvollkommenen Metamorphose.

Beide haben große Augen, aber kleine Fühler. Ihre Larven sind theils fußlos, theils mit Füßen versehen, auch der Puppenzustand verschiedentlich. Die Puppe frisst nicht.

#### Vierte Ordnung. Zweiflügler. Diptera.

Mit nur zwei vollkommenen Flügeln, das hintere Paar meist noch in einer Spur sichtbar. Kinnladen und Kinnbacken verkümmert oder in Stechborsten verwandelt, die Unterlippe in einen Schlürfrüssel.

#### Fünfte Ordnung. Neßflügler. Dictyoptera.

Mit vier sehr vollkommenen Flügeln, deren Adern gewöhnlich neßartige Maschen bilden. Kinnbacken und Kinnladen bei einigen vollkommen und zum Beissen tauglich, bei anderen unvollkommen, ja fast fehlend.

#### IV. Verwüstende, belästigende, oft nächtliche, platte, lichtscheue; ohne eigentliche Metamorphose. (Insecta ametabola).

##### Sirpen und Wanzen.

Sie zeigen sich beide einander so ähnlich, daß sie nur der Unterschied der beißenden oder der saugenden Nahrungswerkzeuge in zwei Ordnungen getrennt hat. Bei ihnen findet eigentlich keine Verwandlung mehr statt, nur Häutung, bei deren letzter die Flügel und Geschlechtsteile erst vollendet erscheinen. Sie sind offenbar die niedersten Insekten, Verwüster und Schmarotzer, die nichts hervorbringen, sondern vielmehr sich vom Hervorgebrachten nähren. So von den zerstörenden Heuschrecken an bis zu den Schaben, Wanzen, Blattläusen und Schildläusen. Ihre Farbe ist häufig grün, ihre Zeichnung und Gestalt oft grotesk, selten schön, mehrere sondern Schaum oder stinkende Gässe ab.

#### Sechste Ordnung: Sirpen. Orthoptera.

Mit vier Flügeln, wovon die oberen etwas hart, aberaderig, die unteren durchsichtig, neßartig und längsgefaltet sind. Vollkommene Kinnbacken und Kinnladen zum Beissen. Sie grenzen deutlich an die Libellen der vorigen Abtheilung.

### Siebente Ordnung. Hemiptera.

Mit vier schmalen Flügeln, die oberen am Außenrande meist hart. Kiefer und Unterlippe in einen stechenden, Säfte aussaugenden Schnabel umgebildet. Sie sitzen oft unbeweglich parasitisch, und sind wahres Ungeziefer. Unter ihnen die unvollkommenen Insekten.

### V. Wirkliche Parasiten, aber mit vollständiger Metamorphose.

### Achte Ordnung. Suctoria.

Ungeflügelt, blos auf Säugetieren und Vögeln lebend. Ein stechender Saug schnabel. Die Larve Käferartig, die Puppe liegt unbeweglich.

---

### Literatur der Entomologie überhaupt.

*Jo. Raji*, Historia Insectorum. Lond. 1710. 4.

*C. a Linné*, Fundamenta Entomologiae. Ups. 1767.

*J. Chr. Fabricii*, Philosophia entomologiae. Kiel 1778.

Dessen Entomologia systematica. IV. Vol. et Suppl. Hafn. 1794. 8.

*J. B. Lamarck*, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. T. III—V. Paris 1818. — Neuer Abdruck ib. 1835.

*P. S. Latreille*, Genera Crustaceorum et Insectorum. Vol. I —IV. Paris 1806.

Dessen Histoire naturelle générale et particulière de Crustacés et des Insectes. Vol. I—XIV. Paris 1802.

Ders. in *Cuvier* règne animal. 2. édit. Vol. IV et V. 8.

*G. J. Schönherr*, synonymia Insectorum. T. I—III. Holm. 1806.

*J. W. Panzer*, Faunae Insectorum Germaniae initia. fasc. 1—109 mit ill. Kpfrn. Nürnberg seit 1795. — Fortgesetzt von *Herrich-Schäfer*, Hest 110—144. Regensburg.

Dessen Kritische Revision der in der Fauna abgebildeten Insekten. Nürnberg.

*F. Curtis*, *British Entomology*. Vol. I—XII. with pl. London 1824.

*A. Ahrens et E. F. Germar*, *Fauna Insectorum Europae*. Hal. 1813. Bis jetzt 19 Hefte.

*M. F. E. Guérin*, *Iconographie du règne animal de Mr. le Baron Cuvier*. Paris 1830. Bis jetzt 35 Hefte.

*A. Rösel von Rosenhof*, *Monatliche Insektenbelustigungen*. Nürnberg 1746—61. IV. B. m. R.

*Ch. Fr. Kleemann*, *Beiträge dazu*. Ebd. 1791.

*Fr. Schwarz*, *Nomenklatur über die in Rösel's Insektenbelustigungen und Kleemanns Beiträgen abgebildeten Insekten*. Nürnberg 1793—1831. 4.

*Ch. de Geer*, *Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes*. Stockholm 1752—1778. VII. B. m. R. Uebers. von Göthe.

*R. A. de Réaumur*, *Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes*. Paris 1734. VI. B. m. R.

*J. Swammerdam*, *Biblia naturae* Lugd. Bat. 1737. c. t. II Vol. — Auch deutsch. Leipzig 1732.

*P. Fr. Bouché*, *Naturgeschichte der Insekten, besonders in Hinsicht ihrer ersten Zustände als Larven und Puppen*. Berlin 1834. Erste Liefl.

*W. Kirby et W. Spence*, *An introduction to Entomology or elements of the natural history of Insects*. London 1818. — Uebers. von Oken, Stuttg. 1823.

*Heinr. Burmeister*, *Handbuch der Entomologie*. Berlin 1832. 2 Theile.

*Jakob Illiger*, *Magazin der Insektenkunde*. Braunschweig 1801. VII. Bde.

*G. Fr. Germar*, *Magazin der Entomologie*, Halle 1815. IV. B.

*E. Guérin*, *Magazin d'Entomologie*. Paris 1830. X Cah. m. R.

*The Entomological Magazine*. London 1833.

*Fr. Klug*, *Jahrbücher der Insectenkunde*. Berlin 1834.

Und noch eine Menge schätzbarer anderer Werke, welche nicht alle hier aufgezählt werden können. Mehrere neue sind noch nicht beendigt, und einige scheinen es auch nicht werden zu wollen.

## Erste Ordnung.

### Hymenopteren. Hymenoptera.

(Hautflügler.)

Unstreitig die höchsten und ausgebildetsten unter den Insekten.

Ihr Unsehen ist angenehm, bei vielen zierlich, sie sind schlank, gewandt, in einem fort unruhig, thätig und beweglich, und weder so träge wie viele Käfer und niedere Insekten, noch so breitflatternd wie die Schmetterlinge. Kopf, Bruststück und Bauch haben ein gleichmäßiges Verhältniß, ersterer ist zumal groß, mit sehr ausgebildeten Sinneswerkzeugen, nämlich großen Augen und Fühlern, welche in beständiger Unruhe sind, und die geistige Thätigkeit dieser Thiere anzeigen. Das Bruststück besteht aus drei, ja bei vielen eigentlich aus vier Ringen, so daß also ein Bauchthell mit zu dem Systeme der Bewegung geschlagen worden, abermals ein Zeichen einer höheren Bildungsstufe. An diesem Mittelstück befinden sich vier Flügel, mit mehreren Längsaderen, die sich in der Mitte verbinden und runde Hellen bilden, worauf man ein eigenes Klassifikationssystem gegründet hat. Unten befinden sich die drei Paar sehr ausgebildeten, und bei vielen ziemlich hohen Füße, so daß diese Insekten nicht nur einen leichten, lebhaften Flug haben, sondern auch mit großer Beweglichkeit laufen können, und sowohl auf der Erde, als auf Kräutern und Blumen, in unermüdlicher Thätigkeit erscheinen.

Nur selten steht man sie still sitzen oder faul in den Blumen liegen, meist sind sie beschäftigt und offenbar mehr als, im Ganzen genommen, die der anderen Insektenordnungen<sup>\*)</sup>). Ihre Thätigkeit ist aber auch auf etwas Höheres gerichtet, sie bauen oder suchen für ihre Nachkommenschaft lebende andere Insekten zur ersten Erhaltung, und zeigen darin eine hohe, bewunderungswürdige Industrie und Geschicklichkeit, wie man sie in dieser Weise bei keinen anderen Geschöpfen von dieser Kleinheit bemerkt.

<sup>\*)</sup> Denn daß die Raubkäfer, z. B. die Cicindelen, oder die Mücken und nächtlichen Schaben hurtig und beweglich genug sind, läßt sich nicht auf ihre Ordnungen im Ganzen anwenden.

Ja die Biene ist eigentlich allein dasjenige Insekt, welches dem Menschen ein wichtiges Produkt aus einem fremden Stoffe bereitet, während die andern nutzbarer nur Stoffe liefern, die Theile ihrer selbst sind.

Auch darin deutet sich eine höhere Vollkommenheit dieser Ordnung an, daß viele Weibchen einen ausgebildeten Legapparat am Ende des Leibes, also noch besondere Organe daselbst haben, worunter ein sägeartiger Stachel zumal bemerkenswerth, mit welchem sie den Feind verwunden und ihm Schmerz zufügen können, eine Einrichtung, welche mehr ist, als das bloße Beißen der Wehre, oder das Stechen, welches die niederen nicht aus Rache, sondern um ihrer Nahrung willen ausüben.

Sie legen kleine, glatte, farblose Eier auf verschiedene Weise. Die intelligentesten bauen erst für sie Zellen aus Pflanzenstoffen, die sie entweder zu Wachs ausarbeiten, oder aus gekauften Pflanzenstoffen zusammensezten. Die zunächst an sie grenzenden, die wahren Raubthiere, suchen sich ein lebendiges Insekt, welches sie anstechen, um ihr Ei hineinzulegen. Andere, mehr den aasfressenden Raubthieren vergleichbar, legen ihr Ei neben ein halbtodt gebissenes Insekt, das sie in eine dazu verfertigte Höhle schleppen. Die noch mildesten gehen nur Vegetabilien an. Sie stechen oder sägen in die welche grüne Rinde von Bäumen, Sträuchern und Kräutern eine Wunde, innerhalb welcher ihr Ei sich ausbildet, und diese zum Theil zu einem apfelsähnlichen Auswuchse entwickelt. Die letzten endlich, und dieses sind die am wenigsten industriösen, und zum Theil durch plumpen Bau äußerlich schon so charakterisiert, sorgen am wenigsten für ihre Nachkommenschaft; ihre Larven leben wie die Schmetterlingsraupen äußerlich, frei und fressen Blätter; hier ist also die bei den vorigen auf den höchsten Lebenszustand gesteigerte Energie bis zu dem niederen der Larve herabgesunken.

Die Larven aller jener höheren Geschlechter sind fußlose Maden mit einem kleinen, hornigen Kopf, doppelten Kiefern und einer Unterlippe, an deren Spitze sich eine Öffnung als feines Spinnorgan befindet. Sie spinnen damit aus zwei inneren Speichelgefäßen eine feine Seide wie die Schmetterlinge, mit der sie kurz vor der Verwandlung ihre innere Höhlenwand austapezieren, oder auch wohl äußerlich einen feinen Cocon bilden. Die ver-

letzten Familie jedoch, welche frei leben, gleichen in fast Allem den Schmetterlingsraupen, nur daß sie statt fünf hinteren Fußpaaren deren sechs, auch sieben, ja acht Paar haben; vorn aber die sechs spitzen Füßchen jener. Sie sind auch bunt gefärbt.

Die ersten untergehen aber von einer formlosen Gestalt aus eine ungeheure Verwandlung: Sie verändern sich mittelst einer Häutung in eine unbewegliche Puppe (chrysalis), welche der Käfer gleicht, und ebenfalls farblos ist. Auch sie hält sich noch im Verborgenen auf. Man unterscheidet an ihr aber schon alle, nur noch zusammengeschlagenen Theile des vollkommenen Insekts, Augen, Fühler und Taster, Fresswerkzeuge, Flügel und Füße, und beim Auskriechen durchbreist sie die ihr etwa noch hinderliche Hülle und eilt dann sogleich zur Thätigkeit.

Man unterscheidet an dem vollkommenen Insekt (imago) zwei sehr große zusammengesetzte Augen und auf dem Schelten drei Punktäugen. Die Fühler sind in dieser Ordnung sehr vielseitig, wie bei den Käfern; bald fadenförmig, bald geknickt &c. Der Mund besteht aus Kinnbacken und Kinnladen zum Beißen, letztere meist schwach und hautig; einer Ober- und Unterlippe, nebst Tastern, und oft sind jene Organe, nämlich Unterlippe und Kinnladen, in eine saugende Röhre gestreckt.

Der Thorax besteht eigentlich aus vier Ringen, insofern sich zu ihm ein Leibesring gefügt hat. Darum setzt sich bei mehreren auch der Bauchstiel an dem dritten, oder dem eigentlichen Metathorax an. Er hat viele Luftlöcher und oben vier Flügel, wovon die obren größer, in der Ruhe kreuzweise übereinandergeschlagen, und mit den schon erwähnten Längsaderen durchzogen, welche man als radius und cubitus, und die von ihnen abgehenden Zellen als Radial- und Cubitalzellen bezeichnet hat. Die Füße lassen deutlich eine Hüfte, einen Trochanter, dicken Schenkel, Schienbein mit ein Paar Sporn am Ende, und einen fünfgliederigen Fuß (wie bei den vollkommensten Käfern) mit zwei Krallen am Ende, unterscheiden. Bei den, Honig eintragenden, Bienen, ist das erste Glied dieses Tarsus wieder noch besonders entwickelt und zu einem eigenen Gebrauche eingerichtet.

Der Bauch besteht aus etwa neun Ringen, ist bald schlank, bald cylindrisch, bald sogar kugelig, und bei den meisten nur durch einen zarten Stiel (wie auch der Kopf so) an das Bruststück

geheftet. Der Legestachel besteht aus drei langen dünnen Stücken, wovon bei denen, die eine Säge haben, zwei dem dritten zur Schelde dienen.

Diese Insekten sind nicht sehr groß, ja viele äußerst klein. Außer den Hummeln und Bienen sind nur wenige behaart, aber die Härchen jener zeigen oft die Gestalt wirklicher Federn. Einige indische sind von prächtigem Metallglanz, wie Stahl, die meisten aber zwischen gelb und schwarz gefärbt.

Sie leben am liebsten auf Blumen, viele zumal an den Rachenblumen, mehrere auch an Lehms- und Bretterwänden, die sie anbohren.

Die systematische Anordnung in Familien ist zwar in so fern nicht schwer, als man es hier mit sehr entschiedenen Gestalten zu thun hat; indes gibt es doch auch Zwischen- und Uebergangsglieder, so daß es eigentlich nur auf das Princip ankommt, welches man als leitendes vorzieht. So wie nun dem Einen die bloße äußere Form, dem Andern die ganze Lebensweise als Höchstes erscheint, kann auch die Stellung der einzelnen Gruppen etwas abweichen; im Ganzen wird sie jedoch auf beiden Wegen zu dem nämlichen Ziele gelangen.

Wir berücksichtigen die gesammte Lebensthätigkeit dieser Insekten, und finden demnach, daß, sowie sie als Hymenopteren überhaupt die kunstreichsten unter allen enthalten, auch diejenigen unter diesen wieder, die es hierin am höchsten treiben, an die Spitze zu stellen seyn werden. Man kann sie nach diesem Princip mit den Thieren oberer Klassen parallelisiren, und demnach folgendermaßen ordnen:

### I. Verständige, reflectirende, sensible, Wohnungen bauende.

Sie zeigen die meiste Intelligenz, vielleicht wirklichen Verstand, Ueberlegung und Berechnung, leben zum Theil in Gesellschaften in der Form eines Staats, führen Krieg, vertheidigen Stadt und Haus und füttern ihre Jungen.

Bei allen ist Kopf, Brust und Bauch durch einen dünnen Stiel gesondert. Die Fühler sind eingeknickt. Bei den gesellschaftlichen finden sich meist unvollkommene Weibchen, welchen die

Sorge für Ernährung und Aufziehung der Brut, sowie der Bau und die Reinigung der Wohnung obliegt.

Ihre Fußlosen Larven leben in den von den Eltern verfestigten Wohnungen und werden von der Mutter oder den Sterilen gefüttert. Sie erhalten animalische wie vegetabilische Nahrung. Ihre Verwandlung geschieht innerhalb des Nestes.

#### Erste Familie. Bienen. *Apiaria*.

Leben einsam oder in Schwärmen und bauen thells einzelne einfache Zellen in Erde oder Holz, theils vielfache von Wachs, und füllen diese mit von ihnen bereitem Honig. Die Begattung geschieht im Freien.

Die Larven werden mit Honig ernährt.

*Apis*, *Bombus*, *Andrena* etc.

#### Zweite Familie. Wespen. *Vesparia*.

Leben einsam oder in Schwärmen und bauen papiereue Wohnungen mit inneren Zellen, frei oder in die Erde. Die Begattung geschieht innerhalb des Nestes. Ihre Flügel sind längsgefaltet.

Ihre Larven werden von ihnen mit geraubten, meist animalischen Stoffen gefüttert.

*Vespa*, *Polistes*, *Eumenes*. ♦

#### Dritte Familie. Ameisen. *Formicaria*.

Leben einsam oder in Schwärmen, und die Sterilen sind ungeflügelt. Sie bauen sich theils Gänge in faulem Holz, theils in die Erde, theils tragen sie Spreu und Splitter zu Haufen zusammen. Sie laufen mehr als daß sie fliegen. Die Begattung geht in der freien Luft vor sich.

Ihre Larven nähren die Sterilen mit animalischen und vegetabilischen Säften.

*Formica*, *Atta*, *Mutilla*.

#### II. Reizbare, muskelschnelle, räuberische, ja reisende, von lebendigem Raub lebend.

Sie sind ebenfalls intelligent, unermüdlich umherspürend, unruhig, zweckmäßige Orte aufsuchend, aber Raubthiere, welche

andere Insekten und ihre Larven anfallen, und für ihre Brut benutzen. Ihre Gestalt ist schlank und zierlich.

#### Vierte Familie. Raupentödter. Fossoria.

Sie ergreifen Spinnen, Fliegen, Heuschrecken, Schmetterlingsraupen und selbst Larven ihrer eigenen Verwandtschaft, die sie halbtodt kneipen, beißen oder stechen, in ein eigens gegrabenes Loch oder eine vorgefundene Höhlung schleppen, und ihr Ei darauf legen.

Die fußlose Larve verzehrt das neben ihr liegende Cadaver, verwandelt sich aber außerhalb desselben.

Sie leben einsam, viele laufen mehr als daß sie fliegen.  
Sphex, Pompilus, Crabro.

#### Fünfte Familie. Schlußwespen. Pupivora.

Sie überfallen Spinnen, Insektenlarven aller Art, ja ihrer eigenen Gattung, Puppen und vollkommene Insekten, stechen sie an und legen ein oder mehrere Eier unter ihre Haut, welche innerhalb dieser angestochenen Insekten auf deren Kosten weiter leben.

Die fußlose Larve ernährt sich von der Fettmasse dieser Raupen &c., welche dabei scheinbar gesund fortleben und sich verpuppen. Jene aber verwandelt sich gleichfalls darin, und kriecht zuletzt statt des Schmetterlings &c. dgl. aus.

Ihr Leib ist sehr schlank und oft dünn gestielt, und trägt bei manchen am Ende sehr lange Legeborsten.

Sie leben einsam und fliegen auf Blumen und an Pflanzen herum.  
Ichneumon, Bracon, Ophion, Microgaster.

#### III. Ruhige, schwerfällige, als Parasiten, oder von Pflanzen lebende.

Ihr Bauch ist mehr breit, senkrecht oder quer zusammengedrückt, und meist unmittelbar mit dem Bruststück verwachsen.

#### Sechste Familie. Goldwespen. Chrysidae.

Der Bauch der Weibchen hat einen Stachel. Er ist zwar noch gestielt, scheint aber mit seiner ganzen Breite am Bruststück zu liegen. Sie zeigen metallische Färbung.

Ihre Larven leben parasitisch in den Nestern der Bienen und Verwandter, in deren Larven sie sie einbohren.

**Chrysis, Hedychrum.**

#### Siebente Familie. Gallwespen. *Cynipsaria.*

Sind sehr klein, mit zusammengedrücktem Bauch, an dem ein sehr langer, haarsförmiger, spiral zusammengewundener Legestachel. Das Weibchen sticht damit Pflanzen an, um ihr Ei hineinzulegen; diese Wunde erwächst zu einem Gallapfel.

Die fühllose Larve lebt von den Säften dieses Gallapfels oder Auswuchses (nur einige noch in Schmetterlingseltern), verwandelt sich darin, und schließt endlich aus.

Die Unterflügel dieser Wespen haben nur einen Nerv.

**Cynips, Diplolepis, Chalcis.**

#### Achte Familie. Holzwespen. *Urocerata.*

Kopf und Bauch dicht an der Brust; letzterer lang, etwas platt cylindrisch, am Ast eine Hornspitze, und darunter ein langer freistehender Legebohrer, womit sie ihre Eier in Holz legen.

Die Larve hat sechs Füße und lebt im Holz.

**Sirex, Xiphydria.**

#### Neunte Familie. Blattwespen. *Tenthredina.*

Der Bauch in seiner ganzen Breite an das Bruststück gewachsen, cylindrisch-platt, mit einer verborgenen Legesäge, womit sie ihre Eier in Rinden einbohren.

Die Larve ist raupengleich, aber mit mehr als sechzehn Füßen, und lebt frei an Blättern, die sie verzehrt.

**Cimbex, Hylotoma, Lyda, Tenthredo.**

---

#### Uebersicht der Geschlechter.

##### I. APIARIA.

###### a. Gesellschaftliche.

1. **Apis. Biene.** Kinnladen, Unterlippe und Lippentäster borstenartig verlängert. Das erste Tarsenglied der Sterilen

(Arbeitsblättern) in ein längliches Viereck ausgedehnt, an der Innenseite mit Bürstenhaaren besetzt. Fühler geknickt.

2. *Melipona*. Amerikanische Honigbiene. Wie zuvor; das erste Tarsenglied verkehrt dreiseitig.
3. *Bombus*. Hummel. Körper dick dicht behaart; Kinnbacken vorn breiter, außen gefurcht. Tarsen wie zuvor. Fühler geknickt.
  - b. Einzeln lebende.
4. *Saropoda*. Kinnbacken unter der Spize mit einem starken Zahn. Kinnladentaster viergliedrig. Der Körper gedrungen, wenig behaart.
5. *Megilla*. (*Anthophora Latr.*) Kinnbacken mit einem Zahn oder mehreren. Kinnladentaster sechsgliedrig. Körper gedrungen, dicht behaart. Fühler fadenförmig.
6. *Eucera*. Kinnbacken mit starkem Zahn. Kinnladentaster sechsgliedrig. Die seitlichen Schuppen (Taster) der Unterlippe so lang als diese. Die Männchen mit sehr langen Fühlern. Hinterbeine der Weibchen mit zottigem Schienbein und Ferse. Leib gedrungen, dick.
7. *Nomada*. Oberlippe halbkreisförmig oder quer elliptisch. Kinnbacken ganzrandig, Kinnladentaster in eine sechsgliedrige Borste verlängert. Bauch eiförmig, fast unbehaart.
8. *Epeolus*. Wie zuvor; Kinnbacken am Innenrande mit einem kleinen Zahn. Kinnladentaster klein, eingliedrig.
9. *Melecta*. Kinnbacken mit starkem Zahn. Kinnladentaster sechsgliederig. Der Körper gedrungen, dicht behaart.
10. *Coelioxys*. Kinnbacken stark, mit drei deutlichen Zähnen. Kinnladentaster kurz, zweigliedrig. Zwei Spiken am Schildchen. Bauch kegelförmig zugespitzt, wenig behaart.
11. *Stelis*. Kinnbacken stark, unter der Spize mit zwei Zähnen. Keine Dornen am Schildchen. Bauch halbeyndrisch, nach oben convex.
12. *Anthidium*. Kinnbacken breit, an der schräg abgesetzten Spize mit 3—5 Zähnen. Bauch breit, oben convex, eingekrümt, unten zottig, beim Männchen am After gezahnt.
13. *Osmia*. Kinnbacken stark, mit 3—4 Zähnen. Kinnlader-taster 3—4gliederig. Bauch breit, gewölbt, beim Weibchen dichtzottig.

14. *Megachile*. Rosenbiene. Kinnbacken mit 3—4 Zähnen. Kinnladentaster kurz, zweigliedrig. Bauch länglich, oben convex, hinten abgerundet, beim Weibchen aufwärts gebogen. Vorderbeine des Männchens verdickt, mit kurmmen Schenkeln.
15. *Panurgus*. Kinnbacken zugespitzt. Lippentaster länger als die Zunge. Kopf dick, Fühler kurz, keulenförmig, spitz, in der Mitte der Stirne eingesetzt, nur beim Weibchen gebrochen. Bauch eirund, gedrückt.
16. *Xylocopa*. Holzbiene. Kinnbacken löffelförmig, am Ende dreizähnig. Kinnladentaster sechsgliedrig; Lippentaster borstenförmig. Augen groß, der Bauch zottig, die Flügel violet gefärbt oder metallisch glänzend. Vorderfüße verbreitert und gewimpert.
17. *Hylaeus*. (*Prosopis Jur.*) Kinnbacken des Männchens oben ganzrandig, des Weibchens unter der Spitze mit einem Zahne. Kinnladen und Unterlippe noch einmal so lang als der Kopf. Körper fast nackt, länglich, Hinterfüße der Weibchen zottig.
18. *Colletes*. Kinnbacken außen gesurcht, Lippe tief dreieilig; Bauch schlank, stark behaart. Gesicht behaart.
19. *Andrena*. Kinnbacken unter der Spitze mit einem Zahne. Lippe dreieckig, spitz, lanzettförmig.
20. *Dasypoda*. Wie zuvor; aber das erste Tarsenglied der Hinterfüße bei den Weibchen sehr lang und lang behaart.

## II. VESPARIA.

21. *Vespa*. Wesp. Fühler gebrochen, spitz. Unterlippe mit vier Drüsen. Kinnladen schief abgestutzt. Bauch dick, cylindrisch, mit gerade abgestutzter Basis.
22. *Polistes*. Ebenso; Bauch gestielt, eisförmig.
23. *Eumenes*. (*Odynerus*.) Kinnbacken schmal, nach vorn wie schnabelförmig. Unterlippe dreieilig, mit drei Drüsenpunkten. Der Bauch theils eisförmig oder kegelförmig, kurz gestielt, theils der Stiel birnförmig verlängert, und das folgende Glied glockenförmig.

### III. FORMICARIA.

24. *Formica*. Ameise. Kinnbacken stark, dreieckig. Kinnladen klein. Bauchstiel eingesiedrig, mit aufrechter Schuppe. Weibchen und Sterile nur mit einem Giftbläschen statt Stachel.
25. *Ponera*. Wie zuvor; aber Weibchen und Sterile mit Stachel.
26. *Myrmica*. Wie zuvor; Bauchstiel zweiknotig, Weibchen und Sterile mit Stachel.
27. *Mutilla*. Fühler borstenförmig, etwas gebrochen. Bauchstiel kurz, ohne Knoten. Weibchen mit Stachel, ungeflügelt.

### IV. FOSSORIA.

28. *Tiphia*. Fühler kurz, nach der Spize verdickt; Kinnbacken langgespitzt. Kiefertaster lang, mit ungleichen Gliedern. Bauch kurz gestielt; Hinterbeine dicht beisammen, etwas dick. Prothorax groß, hinten wenig ausgebuchtet.
29. *Scolia*. Wie zuvor; Hinterbeine von einander entfernt, Prothorax hinten tief ausgerandet. Kiefertaster kurz, mit gleichen Gliedern.
30. *Pompilus*. Fühler fadenförmig, beim Weibchen gerollt; Kinnbacken fast ungezähnt. Tasler herabhängend. Bauch kurz gestielt. Beine verlängert.
31. *Ammophila* (*Sphex*). Wie zuvor; Kinnladen und Lippe mehr schnabelförmig; Bauch langgestielt.
32. *Bembex*. Fühler gebrochen, nach außen dicker. Unterlippe schnabelförmig, in der Ruhe auf die Brust zurückgeschlagen. Bauch kurzgestielt, verlängert kegelförmig.
33. *Trypoxylon*. Fühler fadenförmig, fast gerade, viel länger als der Kopf. Bauch eilegelförmig gestielt; Beine kurz.
34. *Crabro*. Siebwespe. Kopf breit, Fühler neben dem Mund eingefügt, kurz, etwas keulenförmig. Kinnbacken schmal, zweispaltig. Stirnschild silberglänzend. Beine stark, mit dicken gezähnten Schienbeinen.
35. *Cereoris*. Kopf breit; Fühler genähert, länger als der Kopf; die Bauchringe an ihrer Basis eingeschnürt, daher der Bauch wie knotig.

36. *Philanthus*. Kopf breit; Fühler kurz und dick, auf der Stirn eingefügt, weit von einander. Bauch länglich eirund.

## V. PUPIVORA.

37. *Foenus*. Fühler fadenförmig, 13—14gliederig. Ein Hals. Der Bauch lang, schmal, hinten etwas breiter, unter dem Schildchen am Metathorax eingefügt. Die Legeborste so lang als der Körper. Hinterbeine mit keulenförmigen Schleifen.

38. *Ichnaeumon*. Fühler borsten-fadenförmig, gerollt, 16gliederig. Kinnbacken vorgestreckt; Kinnlidentaster fünfgliederig, borstenförmig verlängert, herabhängend. Bauch lang, schlank, gestielt; Legestachel sehr kurz, wie verborgen.

39. *Alysia*. Kinnbacken breit, dreizähnig; Kinnlidentaster sechsgliederig. Erstes Bauchglied runzlig, die übrigen dicht, als zusammengedrängter Bauch.

40. *Braccon*. Kopf rund; Fühler borstenförmig, vielgliederig. Kinnladen und Lippe schnabelförmig. Bauch mit fünf Ringen. Legeborste lang.

41. *Microgaster*. Fühler borstenförmig, vielgliederig, lang. Bauch kurz, eiförmig, fast ungestielt. Legebohrer stark, verborgen. Füße stark.

42. *Chelonus*. Fühler borstenförmig, mit 25 und mehr Gliedern. Bauch oben ungegliedert. Legeborste lang.

43. *Ophion*. Fühler faden-borstenförmig. Bauch gestielt, sichelförmig gekrümmmt, seitlich zusammengedrückt, hinten abgestutzt. Legeborste wenig vorstehend.

44. *Cryptus*. Bauch eiförmig, gewölbt, gestielt, der Stiel lang, dünn und gebogen. Weibchen meist ungeflügelt, oder doch sehr klein. Legeborste kurz.

45. *Pimpla*. Bauch cylindrisch, langgestreckt, hoch gewölbt, fast feststellend, Legeborste so lang wie der Leib.

## VI. CHRYSIDIDA.

46. *Chrysis*. Goldwespe. Der Bauch breit, unten ausgehöhlt, mit kurzem Legestachel.

## VII. CYNIPSARIA.

47. **Cynips.** (*Diplolepis Geoffr.*) **Gallwespe.** Fühler fadenförmig, gerade. Bauch kurz gestielt, keilsförmig zusammengedrückt, mit spiralem Legebohrer.
48. **Ibalia.** Ebenso; der Bauch messerförmig zusammengequetscht.
49. **Figites.** Ebenso; Fühler förmig; Bauch eirund - spitz, unten keilsförmig zusammengedrückt, oben abgerundet.
50. **Chaleis.** Fühler gebrochen. Bauch rundlich, eindreieckig, gestielt, mit Legestachel, metallisch glänzend. Hinterschenkel groß, Schienbeine gekrümmmt.

## VIII. UROCERATA.

### a. Holzwespen.

51. **Sirex.** **Holzwespe.** Fühler fadenförmig; die Legesäge steht weit vor.
52. **Oryssus.** Fühler fadenförmig. Die Legesäge ist spiral im Inneren des Leibes verborgen.
53. **Xiphidria.** Fühler borsteförmig. Die Legesäge steht vor.

### b. Blattwespen.

54. **Cimbex.** Fühler keulenförmig, 5 — 7gliederig. Bauch dick, groß.
55. **Hylotoma.** Fühler dreigliederig, mit langem Endgliede.
56. **Tenthredo** (*Allantus*, *Dolerus*, *Nematus*). Fühler 9gliederig.
57. **Pteronus** (*Lophyrus Latr.*). Fühler vielgliederig, kammförmig oder sägeförmig.
58. **Lyda** (*Pamphilus*). Fühler vielgliederig, lang, einfach.
59. **Cephus.** Fühler zwanziggliederig; Legesäge etwas vorstehend. Hals verlängert.

---

### Literatur der Hymenopteren.

- L. Jurine, nouvelle méthode de classes les Hymenoptères et les Diptères. Geneve 1807. 4.**

*G. Dahlbom*, *prodromus Hymenopterologiae Scandinavicae.*  
Lundae 1836. 8. (Nur erst der Anfang.)

— — *Clavis novi Hymenopterorum systematis, adjecto syn-*  
*opsi larvarum ejusdem ordinis cruciformium.* ib. 1835.  
4. (Ebenfalls erst nur die Blattwespen.)

*J. Ch. Fabricii*, *systema Piezatorum.* Brunsv. 1804.

*J. L. C. Gravenhorst*, *Ichneumonologia europaea III.* Vol.  
Vrat. 1829.

*C. G. Nees ab Esenbeck*, *Hymenopterorum Ichneumonibus*  
*affinium monographiae.* II. Vol. Stuttg. 1834.

*F. Klug*, *monographia Siricum.* Berol. 1834.

*P. A. Latreille*, *histoire naturelle des Fourmis.* Paris 1802.

*F. Huber*, *recherches sur les moeurs des Fourmis indigènes.*  
Paris 1810.

Und vieles in einzelnen Societäts- und Zeitschriften.  
¶

---

Erste Familie.

B i e n e n.

(*Mellifera. Anthophila.*)

Tragen mittels ihrer Hinterfüße den Pollen der Blüthen ein, daher denn das erste Tarsenglied sehr groß, und stark zusammengedrückt ist.

Ihre Kinnbacken sind stark. Ein enger Schlund führt in einen muskelreichen Vormagen, in welchem der aus dem Nektar der Blüthen eingesogene Honig verwahrt wird. Nach einer Verengerung erweitert er sich zu dem zweiten, eigentlichen Magen, in welchem man stets nur Blüthenstaub findet. Die Larven werden mit diesem, so wie mit dem Honig ernährt: die ausgebildeten Immen leben nur von letzterem.

Die Thiere dieser Familie haben einen mehr gedrungenen, man möchte sagen, bärenartigen Bau, und sind meist stark behaart. Die Bären hegen auch besondere Zuneigung zu ihrem Honig, und brummen wie sie: bei den Bienen, Hummeln u. a. kommt dies Gern aber, wie bereits vorn schon erwähnt, von

den Lungenbläschen der Tracheen, wovon zwei große, an der Basis des Bauches gelegen, sich nach vorn jederseits in ein Luftloch nach außen münden; diese Insekten haben demnach in der That eine Stimme wie die höheren Thiere, und es wäre nicht unmöglich, daß sie ihnen auch als eine wirkliche Sprache, durch welche sie sich allerlei zu verstehen geben, diente.

Alle besitzen eine gewisse Industrie, zumal im Nestbau. Sie nähren sich ausschließlich von Vegetabilien und vermeiden in der Regel unreinliche Dörter<sup>2)</sup> und ekelhafte Substanzen.

Man theilt sie in zwei Unterfamilien: gesellschaftlich lebende und einsam lebende, d. h. nur paarweise.

\* Gesellschaftliche.

Bestehen aus Männchen, Weibchen und Sterilen, d. h. unfruchtbaren Weibchen.

## I. Eigentliche Bienen.

### Apis.

Die Männchen, Drohnen genannt, sind die größten, mit einem breiteren, dickeren Bauch, ohne Stachel, grau behaartem,

<sup>2)</sup> Schon die Alten haben bemerkt, daß sich die Bienen nie auf einen schmußigen Ort, oder auf Gegenstände, die einen übeln Geruch verbreiten, niederlassen. Wenn man daher im alten Testamente (Buch der Richter XIV), einen Gegenbeweis hat finden wollen, wo von Simson erzählt wird, daß er einen jungen Löwen erschlagen und „nach etlichen Tagen,“ als er wieder dahin gekommen und „das *Was*“ des Löwen besiehen, einen Bienenschwarm darinnen gefunden und selbst von dem Honig gegessen habe: so hat schon Bochart in seinem Hierozoicon hiergegen eingewendet, daß „Was“ hier so viel als Skelet, und „etliche Tage“ in der dortigen Ausdrucksweise wohl ein ganzes Jahr bedeuten könne. Diese Auslegung ist viel natürlicher als Kirby's, der hier Fliegen vermutet. In jenen Ländern trocknen Leichname sehr schnell aus, und so konnte auch Herodot's Fall sich erklären, der erzählt, daß ein Bienenschwarm seine Zellen in einem ausgetrockneten menschlichen Leichnam angelegt hatte.

Legt man irgend ein todtes Thier in einen Bienenstock, so schaffen es die Bienen sogleich heraus, oder umbauen es, wenn jenes nicht zu bewerkstelligen ist.

großen Rücken, und mit dreizehn Gliedern an den Fühlern versehen. Ihre Kinnbacken sind haarig und etwas gezahnt; ihre Augen stoßen oben zusammen; die zwei vorderen Füße sind kurz, und etwas krumm.

Die Weibchen, Weisel oder Königin genannt, deren eigentlich in einer jeden Vereinigung (dem Schwarm) nur eine geduldet wird, zeichnen sich durch einen schlanken, viel längeren über die Flügel herausragenden Leib, gelbbehaarte Füße, und zackige, haarige Kinnbacken aus. Sie haben einen Stachel.

Die Sterilen, sogenannten Arbeitsbienen (neutra), sind die zahlreichsten und unter allen die kleinsten. Aber auch unter ihnen gibt es, nach Hubers Beobachtung, größere und kleinere.

Ihr Bauch hat nur sechs Ringe und hinten auch einen Stachel, die Fühler bestehen nur aus zwölf Gliedern, und das erste Tarsenglied der Hinterfüße ist in ein längliches Quadrat, oder vielmehr wie in ein zugespitztes Ohr ausgedehnt, und an der Innenseite mit acht bürstenförmigen Reihen feiner Haare besetzt. Außen hat der Schenkel der Hinterfüße eine glatte Vertiefung. Ihre Kinnbacken sind glatt und ungezahnt.

Die größeren dieser Arbeitsbienen beschäftigen sich mit dem Herbeiholen der Nahrungsmittel, die kleineren und schwächeren mit der Pflege der Jungen.

Die Unterlippe der Bienen verlängert sich, wie schon oben gesagt, in einen Saugrüssel, welcher bei den Arbeitsbienen länger ist als bei den vollkommenen Geschlechtern. Ihn begleiten die verlängerten Tasler und Unterkiefer. Der Mund führt zu einem engen, zarten Schlund, der durch das ganze Bruststück geht, und sich erst im Bauche zu einer Blase, dem Vormagen erweitert, welcher mit Honig gefüllt wird, den die Biene aus dem Nektar der Blüthen saugt. Gleich dahinter beginnt, ebenfalls mit enger Mündung, der eigentliche, darmartige Magen, wie man ihn nennt, — denn man könnte ihn schon als Darm ansehen, — welche sehr viel länger und mit Querfalten und Runzeln versehen ist. Er enthält den wachsartigen Blüthenstaub, und dient, so wie der Honig, zur Ernährung der alten und jungen.

Das Wachs bildet sich an der Innenseite der unteren Bauchschleifen, die erste und die letzte ausgenommen, in zwei Taschen,

aus dem Honig, und schwitzt dann, nach Huber's Entdeckung, zwischen den Leibesringen in dünnen Plättchen aus, wo es die anderen Arbeitsbienen abnehmen und zur Anlage der Zellen verwenden\*). Der Pollen wird bekanntlich in Klümpchen, welche man Hosen nennt, an den Hinterfüßen eingetragen.

Hinter dem Magen verengert sich der Nahrungskanal wieder in einen dünnen, ein paarmal gewundenen Darm, der sich dann zuletzt nochmals sackförmig erweitert, und eine Cloake bildet.

Das Atemungssystem der Biene besteht in zahlreich verzweigten Tracheen wie bei den anderen Insekten. Allein vorn am Bauche befinden sich die zwei zuvor erwähnten weißen Lungenblasen, woron jede nach vorn durch den Bauchstiel sich in einen dünnen Faden verlängert, welcher sich unter dem Flügel in ein Luftholz öffnet.

Das Nervensystem ist sehr zierlich gestaltet. Im Kopfe zeigt es ein Hirn, von dem zahlreiche Fäden zu den zusammengesetzten Augen, einige andere zu den Punktäugchen, den Fühlern und den übrigen Organen abgehen. Im Thorax bilden die beiden Hauptnervenstränge gleichfalls einen großen Knoten, und es entspringen von ihm aus die Bewegungsnerven für die Flügel und die Füße. Im Bauche zeigt es nur wenige Seitenäste.

Dieser hohen Organisation zufolge bemerkt man dann auch an den Bienen sehr ausgezeichnete geistige Fähigkeiten. Eine unermüdliche, längst als Sprichwort gebrauchte Arbeitsamkeit, Rührigkeit und Thätigkeit; ein ausgezeichneter Sinn für Ordnung und Zusammenwirken in ihrem kleinen Staate, eine Art von Fühlersprache, durch welche sie sich Aufträge mitzuteilen oder Vorgefallenes anzugeben wissen; ihr Gehörchen der Königin; sie begleiten, Wache halten, einen Feind anklügeln und sich zu dessen Vertreibung zweckmäßig vereinigen; ja eine Erinnerungs- und wechselseitige Erkennungskraft — diese so erstaunlich hohen Seelensfähigkeiten sind durch die mühsamsten, unverdrossensten Beobachtungen unbefangener Männer erwiesen, und von allen späteren Naturforschern bestätigt worden.

Auch der Geschlechtsapparat ist sehr ausgebildet. Die

---

\* Auf ähnliche Weise auch bei den Hummeln.

männlichen Geschlechtstheile bestehen aus zwei Hoden, welche mittels zweier Saamenleiter in die Saamenbläschen münden, von wo ein gemeinsamer Kanal zu einer Rute führt. Diese ist im Leben ins Innere zurückgezogen, läuft sich aber bei der Begattung aus einem Schlauch durch die Clavae hervor; drückt man eine männliche Biene stark am Bauche, so treten diese Geschlechtstheile heraus und lassen sich gut unterscheiden, die Biene stirbt jedoch fast augenblicklich davon. Diese Theile haben auch noch einige horngige Anhänger.

Die weiblichen Geschlechtstheile der vollkommenen Bienen zeigen sich als zwei sehr schöne, üppige Eierstöcke, die aus zwei Büscheln länglicher Schläuche, jeder etwa 15—17 Eier enthaltend, gebildet werden. Bedenkt man die Menge der Eier, welche eine solche Königin absetzt, so kann man schon auf ihre Anzahl schließen. Diese zwei Büschel vereinigen sich in eine Gebärmutter und Ausgangscheide; an dieser liegt seitlich ein rundes Leimbläschen, mittels dessen Stoff wahrscheinlich die Eier angeklebt werden. Damit verbunden, — eigentlich als der wahre Schleidenapparat — ist der Stachel, der bei der Königin gekrümmt, und an der einen Seite mit etwa einem Dutzend rückwärts gerichteter Bähnchen versehen ist. Auch die Sterilen haben ihn, aber gerade, und nur mit wenigen Bähnen versehen. Er ist sehr hart und hornartig, und läßt sich bei diesen und anderen Hy-menopteren am besten untersuchen, wenn man sie auf einen rauhledernen Handschuh stecken läßt, wo er hängen bleibt. An der Basis desselben befindet sich das birnförmige Giftbläschen, das sich jederseits in geschlängelte Kanälchen verliert. Man kann also sagen, die sterile Biene, welche ein unvollkommenes Weibchen ist, wolle eigentlich nur, wenn sie sticht, ein Ei legen, sie habe aber statt dieses fruchtbaren Körperchens nur den scharfen, viperngiftähnlichen Saft.

Schon Schirach stellte in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die Meinung auf, daß die Arbeitsbienen nur unvollkommene Weibchen seyen; seine auf Beobachtungen gestützte Behauptung errichten aber den damaligen nüchternen Erfahrungsläutern (namentlich dem damals viel gelebten Schweizer Naturforscher Bonnet) so kühn, daß er sogar auf völlige Ignorirung derselben antrug. Erst später, zu Ende des Jahrhunderts, fäste

sie der geistreiche ältere Huber (er war zwar blind, selle aber mit seinem Diener Burnens eine Menge trefflicher Untersuchungen an) wieder auf, und fand auch wirklich die verkümmerten, ganz welken Eierstücke in den Arbeitsbienen, und sein Sohn bildete sie ab<sup>\*)</sup>). Da sie jedoch nachmals von anderen wieder nicht aufgefunden werden konnten, so versuchten Raheburg und Brandt, ob dies nicht vielleicht von der Jahreszeit u. dgl. abhinge, und ersterer fand diese Vermuthung auch bestätigt. Jener Streit ist also jetzt abgethan, wie man denn auch einzelne Eier wirklich hie und da in diesen verkümmerten Eierstücken findet<sup>\*\*)</sup>).

Im Winter ruhen die Bienen oder sind doch nur selten, bei sehr milder Witterung, thätig. Man muß sie sogar füttern, wenn sie keine Vorräthe mehr haben. So wie jedoch das Frühjahr herannaht, oft schon Anfang März, beginnen sie einzutragen, und ein starker Schwarm — der bei einer Königin 800—1000 Drohnen, und 20—30.000, ja bis 60.000 Arbeitsbienen hält — kann einen Stock in drei bis vier Tagen vollbauen. Das erste Geschäft dieses Bauens ist die Anlage und Ausführung der Waben, welche aus den Wachszellen zusammengesetzt werden. Jede solcher Zellen, Alveolen genannt, besteht aus einem langen sechsseitigen Priema, so daß, da der Halbmesser eines Kreises sechsmal in dessen Umfang enthalten ist, sämmtliche Zellen einander mit ihren Wänden berühren, daher die vollkommenste Raumersparniß darstellen. Indess ist die Verstellung derer unrichtig, welche meinten, es seyen diese Zellen eigentlich cylindrische Röhren, welche nur durch den wechselseitigen Druck sechsseitig würden: die Bienen legen sie vielmehr gleich mit geraden flachen Seitenwänden an, wie man sich leicht durch die Anschauung

<sup>\*)</sup> Fr. Huber *nouvelles observations sur les Abeilles*. Paris et Genève 1814, T. II, pl. XI.

<sup>\*\*) G.</sup> J. C. G. Raheburg, Untersuchung des Geschlechtszustandes bei den sogenannten Neutris der Bienen und über die Verwandtschaft derselben mit den Königinnen. In den Verhandlungen der k. l. Akad. d. Naturforscher XIV. B., 2. Thl., S. 613.

Ueberhaupt aber über die Anatomie der Biene die meisterhaften Abbildungen derselben Naturforschers im zweiten Band seiner und Brandt's medicinischen Zoologie, Taf. XXV.

überzeugen kann. Mehr aber noch ist zu bewundern, daß, da diese Waben aus zwei Schichten-Waben, welche an ihrer Basis zusammenstoßen, bestehen, die Basis einer jeden Zelle nicht auf die gegenüberstehende, sondern vielmehr immer so gesetzt ist, daß sie auf drei sich berührenden ruht, und noch überdem in der Mitte pyramidal vertieft ist, so daß ihre drei Grundflächen rhombisch erscheinen; alles dieses, mit der bewundernswürdigsten Regelmäßigkeit ausgeführt, ohne daß irgend eine Biene die andere bei ihrer Arbeit störe, ihr zuvorkomme, oder sie nicht unterstützt, und mit der vollkommensten Berechnung der zweckmäßigen Form, gibt immerfort von Neuem zu den Betrachtungen Anlaß, welche wir in der Einleitung aufgestellt haben.

Die Waben sind am Rande abgerundet, und stehen alle senkrecht, so daß die Zellen ihrer beider Seiten sämmtlich genau horizontal gerichtet sind. Zwischen je zweien ist ein Raum nicht weiter als höchstens vier Linien, gerade so viel und nicht mehr, als nöthig ist, daß sich die Bienen dazwischen ungehindert bewegen können. Sie werden von reinem Wachs verfertigt, welches die Bienen, nachdem sie es einander abgenommen, kueten, ansehen, und so puhen, daß es gehörig die Zelle hilde. Sind die Waben fertig, so werden die für den Hwug bestimmten, mit selbigem gefüllt, und alsdann die für den Vorrath, mit einem flachen Deckel verschlossen; andere, und die für die Brut sind etwas weiter, und bleiben einstweilen offen.

Sie dienen für Drohnen und Arbeitsbienen. Für die Königin wird eine besondere Zelle gebaut. Diese ist länglich oder etwas birnsförmig, etwa so groß wie eine große Haselnuss, mit schmälerem Halse, und dieser offen, nach unten gerichtet. So steht sie an einen kurzen Stiel befestigt, frei an einer Wabe. Man bemerkt an ihr eckige Eindrücke, wie unvollkommene Zellen, als wenn sie diese noch andeuten wollte. In diese Zelle wird das Ei für die künftige Königin gelegt.

Nicht immer begnügen sich aber die Bienen, nur eine solche zu bauen; ein üppiger Stock bildet ihrer mehrere, ja bis an vierzig. Die daraus entstehenden Königinnen haben aber ein schlimmes Los, indem sie untereinander nicht geduldet werden.

Ist im Gegenteil ein Stock seiner Königin verlustig gegangen zu einer Zeit, wo die Bienen schon mit Bauen zu Ende

stnd; so nagen sie an den Kanten ihrer Waben solche, aber unvollkommene, Königszellen aus, ebenfalls mit einer Öffnung nach unten. In diese tragen sie eine etwa drei Tage alte Made einer Arbeitsbiene, und diese erwächst dann zu einer neuen Königin.

Die Befruchtung der Königin geht Ende Mai oder Anfang Juni vor sich, außerhalb des Stockes, hoch in der Luft. Huber bemerkte, in Gesellschaft anderer Mitbeobachter, daß eine junge, etwa fünf Tage alte Königin sich immer gegen elf Uhr Vormittags gegen das Flugloch hin begab. An einem sonnenhellen Tage trat sie heraus, und promenirte erst einige Zeit auf dem Flugbrettchen; Arbeitsbienen und männliche traten zugleich heraus und flogen davon, ohne von ihr Notiz zu nehmen, endlich flog auch sie, nachdem sie sich vorher gepuzt, kehrte aber erst einmal wieder zurück, wie wenn sie sich die Richtung hätte merken wollen. Hierauf stieg sie hoch in die Luft, daß man sie aus dem Gesichte verlor. Nach sieben Minuten erschien sie wieder auf dem Flugbrett; man nahm sie in die Hand, untersuchte sie, fand aber kein Zeichen der Befruchtung. Sie puzte sich nun von Neuem, verweilte etwa eine Viertelstunde, und flog dann abermals auf, nachdem sie gleichfalls zuerst wieder einen Augenblick umkehrte. Diese zweite Abwesenheit dauerte länger, sie kehrte erst nach siebenundzwanzig Minuten zurück. Als sie aber nun untersucht wurde, befand sie sich in einem ganz anderen Zustande. Der Hintertheil ihres Bauches strozte von einer weißlichen Materie, die Vulven klafften, und man fand, daß die männlichen Geschlechtstheile der, welche sie befruchtet, abgerissen darin steckten.

Eine solche Befruchtung wirkt auf die Königin zwei völle Jahre, ja, nach der Behauptung Einiger, auf ihr ganzes Leben. Sie beginnt hierauf schnell Eier zu legen, nach Réaumur in den ersten zwanzig Tagen an zwölf Tausend. Sie irrt sich nicht in der Wahl der Zellen, sind jedoch deren zu wenig, so legt sie auch wohl drei bis vier Eier in eine. Die Arbeitsbienen sondern diese sodann. Nachdem die Königin mehrere Monate lang Eier, aus welchen Arbeitsbienen entstehen, abgesetzt hat, soll sie die männlichen legen, und sodann erst solche Eier, aus welchen Königinnen werden.

Nach Huber's Versicherung legt eine Königin elf Monate hindurch Eier, und ruht nur in den tiefsten Wintermonaten;

übrigens variiert dieses, wie er sagt, sehr, je nach dem sie früher oder später befruchtet worden ist; theils legt sie auch männliche und weibliche Eier zu gleicher Zeit, und die Arbeitsbienen wissen erstere genau zu unterscheiden, indem sie diesen *convexe Deckel* geben\*). Die Eier für Königinnen werden nach einer anderen Behauptung schon drei Wochen nach der Befruchtung gelegt, wo alsdann die Königszellen kaum erst einige Minuten lang sind. Denn bei ihrer Vollendung sind sie so eng am Halse, daß die Königin nicht würde in sie hinein kommen können. Diese Eier aber werden besser gefüttert als die anderen.

Die Eier der Drohnen und der Arbeitsbienen kriechen am dritten oder vierten Tage aus, und die Made wächst hierauf fünf Tage lang, wo sie mit dem als Honig und Pollen bestehenden Speisebrei gefüttert wird. Hierauf werden ihre Zellen ~~zweideckelt~~, die der Arbeitsbienen mit einem flachen, die der Drohnen mit einem convexen Deckel. Die Made darin schickt sich zur Verwandlung an, und spinnt sich eine seldene Hülle, welche den inneren Zellenraum austapeziert. Diese Arbeit dauert 36 Stunden. Die Larve einer Königin umhüllt sich nur Kopf und Brust mit diesem Gewebe. Drei Tage nachher sind sie in den Puppenzustand übergegangen, in welchem sie noch achthalb Tage verharren.

Mit dem zwanzigsten Tage, nachdem das Ei gelegt war, kriecht die Arbeitsbiene aus, und die Königin soll schon mit dem sechzehnten erscheinen, die Drohne dagegen am vierundzwanzigsten. Eine putzt sich sogleich und geht an ihre Arbeit, und die vorhandenen Arbeitsbienen sind bemüht, die Zellen zu reinigen und zu neuem Gebrauche wieder herzustellen. Mit der Zeit werden sie aber doch enger, und zumal schwarz von Farbe. Die Zellen der Königinnen puhen sie aber nicht aus, sondern vernichten sie, um, wenn es nöthig ist, wieder ganz neue zu bauen.

Diese immerfort sich wiederholenden Bruten bilden die neuen Schwärme, welche ausfliegen, wenn ihnen der Stock zu eng wird,

\*) Die in den Huber'schen Briefen angegebenen Erfahrungen sind indes so complicirt und zum Theil wunderbar, daß ich lieber auf sie verweise (T. 1 von Anfang an) als sie hier wiederholen mag. Sie verdienen doch erst noch die Bestätigung eines anderen Beobachters.

um neue Kolonien zu gründen. Man rechnet ihrer vier jährlich auf einen Stock, die letzten sind aber immer schwach. Man kann auch durch künstliche Theilung eines zu vollen Schwarmes mehrere bilden (Ableger), doch gelingt es nicht immer. Ein starker Schwarm hält auch einen kalten Winter besser aus, indem die Bienen zusammen eine beträchtlich höhere Temperatur annehmen (24° R.); schwache erfrieren deshalb.

Da es die alte Königin ist, welche mit dem Schwarm auszieht, so kann eine junge hierauf sogleich für die zurückgebliebenen ihre Stelle einnehmen. Wird hingegen jene, etwa durch schlechtes Wetter, von Schwärmen abgehalten, so sucht sie die jungen Königszellen wohl auf, beißt ein Loch hinein, und ermordet die Puppe ihrer künftigen Nebenbuhlerin mit einem Stich. Ist diese aber bereits ausgekommen, so geht sie mit ihr einen wüthenden Kampf ein, den Huber genau beschreibt\*). Nachdem sie beide zornig aufeinander losgegangen, trennen sie sich gewöhnlich erst wieder, aus wechselseitiger Furcht, werden aber auch wohl von den dabei sehr aufgeregten Arbeitsbienen zurückgeführt, und an den Beinen festgehalten, denn diese wollen das Resultat haben, um zu wissen, wem sie gehorchen sollen. Endlich fuhr die eine wie H. sah, auf die andere unversehens los, packte sie mit den Kinnbacken am Flügelgelenk, und stach ihr den Stachel zwischen die Bauchschiene in den Leib, auf den sie geklettert war, und ermordete sie auf diese Weise.

Auch den Drohnen ist ein gewaltsames Ende bestimmt. Nachdem sie bis Anfang Sommers ihre Pflicht, die Königinnen zu befruchten, ausgeübt, werden sie, etwa Ende Juli oder Anfang August, in der sogenannten Drohnen Schlacht sämmtlich umgebracht und herausgeworfen.

Beim Schwärmen eines Stocks bemerkt man als Vorbote eine ungewöhnliche Unruhe und ein eigenes, scharfes wie flötendes Pfeifen. Fängt man einen Schwarm, der sich gewöhnlich um seine Königin an einen Baum setzt, nicht ein, so fliegt er davon und verwildert.

Weisselose und andere unordentliche Bienen pflegen auch wohl nicht selbst einzutragen, sondern aus fleißigen Stücken zu

---

\* Sur les combats des Reines. T. I, p. 169.

schlen. Man nennt sie Raubbienen. Sie schwächen die guten Stöcke sehr, und die Bienenwirthe sind eifrig hinter sie her.

Auch andere Feinde haben die Bienen. Spechte und Meisen fangen viele weg, um sie zu verzehren; auch der Grimenwolf (*Merops Apiaster*) passt ihnen auf. Ratten und Mäuse gerathen in die Bienenkörbe; von Inseln sind ihnen die Honig- und Wachsmotten (*Galleria cerella* u. a. s. unten) schädlich, deren Raupen oft in Masse in den Waben hausen; auch der Todtenkopfschmetterling. Die Bären sind bekanntlich schlimme Honigdiebe. Sie selbst können im Winter auf den Schnee gerathen und erfrieren, oder sie fliegen nach den Küpen in den Zuckerraffinerien, oft zwei Stunden weit, und ich habe selbst vergleichen, händehoch mit ersoffenen todtten Bienen erfüllt gesehen, wodurch alle Bienenstücke der Umgegend sehr geschwächt wurden.

Wegen aller dieser Gefahren, so wie aber anderseits auch des großen Nutzens, den sie gewähren, sind sie ein Gegenstand besonderer Wartung und Pflege, die in zahllosen Schriften angegeben wird. Nebst der Seidenraupe ist die Biene das einzige Insekt, welches vom Menschen als Hausthier gehalten wird und daher in den Bereich der Landwirthschaft gehört.

Der Nutzen der Bienen ist beträchtlich. Hundertundfünzig Stöcke sollen einen reinen Gewinn von 1000 Gulden abwerfen und mancher Gutsbesitzer hat an 1000 Stöcke. Im Hannover'schen schätzt man den jährlichen Ertrag auf 300,000 Thaler \*).

Eine Hunigtafel von einem Quadratfuß kann in einem honigreichen Jahre über 12 Pfund wiegen, davon das Wachs nur 8—10 Poih. Gewöhnlich rechnet man 10mal so viel Honig als Wachs, am ersten aus einem guten Stock 20—50 Pfund. Wenn es auch seit einigen Jahrhunderten im Zucker ein reichliches Surrogat gefunden hat, so bleibt es doch immer noch im Preis, und hat den Werth eines eigenthümlichen Stoffs. Wichtiger ist aber allerdings das Wachs, wegen der Wachslerzen, die bis jetzt noch durch nichts anderes in gleicher Güte sind ersetzt worden.

In Russland, Polen und anderen Ländern hat man noch

\* ) Brandt und Naheburg med. Zool. II, S. 199.

vielen Waldbienenzucht, wo die Bienen in der Wildnis in hohle Stämme bauen, anderwärts herrscht die gewöhnliche Gartenbienenzucht vor. Ihr Vaterland ist jetzt das ganze Europa und Nordamerika, und schon die alten Deutschen trieben Bienenzucht, als die Römer mit ihnen bekannt wurden. Die Egypter hatten sie schon im höchsten Alterthum, und noch jetzt transportieren die Araber ihre Stöcke zu Seiten nördlichwärts, um ihnen immer frische Weide zukommen zu lassen.

Nach Latreille sollen aber die Bienen des südlichen Europa, und schon die von Genua einer anderen Spezies angehören (*Apis ligustica*).

Eine noch andere, *Apis unicolor* Latr. auf Isle de France und Madagaskar, gibt einen sehr geschätzten, grünen Honig; eine andere (*A. indica*) einen dem unseren gleichen.

## II. Amerikanische Biene.

### Melipona.

Das erste Tarsenglied ist an der Basis schmäler, wie ein verkehrtes Dreieck, und ohne Bürsten an der Innenseite. Nur zwei vollständige Cubitalzellen der Oberflügel.

### Melipona amalthea.

Schwarz, mit bläulichen Flügeln; so groß wie eine Staubfliege.

#### v. Humboldt Obser. de Zool. pl. X.

In Surinam, Cayenne und Brasilien. Verfertigen oben an den Bäumen ein Nest von Gestalt eines Dudelsacks, fast eine Elle lang. Der Honig ist von dunkelrother Farbe, und sehr schmackhaft und süß, geht aber bald in Gährung über.

## III. Hummel.

### Bombyx.

Die Oberlippe ist schmal, querviereckig, der Saugrüssel kürzer als der Leib, das zweite Glied der Lippentaster spitz, und an der Außenseite mit noch zwei anderen Spießen besetzt.

Sie sind dick behaart, von plumpem Bau, und haben in ihrem Wesen etwas Bärenartiges, ihr Brummen ist bekannt. Man findet unter ihnen ebenfalls dreierlei Individuen, Männchen, Weibchen und Arbeiter; erstere sind die kleinsten, ihr Kopf ist etwas kleiner, die Kinnbacken sind schmäler, behaart, und mit zwei Zähnchen versehen; die Weibchen sind die größten, und ihrer stets mehrere in einem Nest; ihre Kinnbacken sind wie bei den folgenden, löffelförmig, und an der Außenseite gefurcht. Die Arbeiter sind von ungleicher Größe, und halten zwischen beiden etwa die Mitte; die Kleinsten unter ihnen sind die lebhaftesten.

Es gibt viele Gattungen, welche sämlich in unterirdischen, selbst verfertigten Wohnungen, zu 50—60 Stück, selten mehr, (nach Latreille bis 200—300) leben, die man vorzüglich zwischen Steinen, auf Wiesen oder auf Kleefeldern antrifft. Sie sind gewölbt, wie eine flache Halbkugel, außen mit Moos oder Sand bedeckt, innen mit einer rohen wachsartigen Substanz überkleidet. Die Hummeln tragen das Moos dazu, rückwärts ziehend, zwischen den Beinen herbei. Der Eingang ist entweder ein einfaches Loch, oder ein geschlängelter, oft zwei Fuß langer Gang im Moos. Die Weibchen sezen zuerst schwarzbraune Wachsklumpen darin ab, wie Trüffeln ausschend, in deren Innern sich die Larven entwickeln. In diese Brutmasse werden nämlich viele Eier zusammengelegt, welche nach fünf Tagen ausschließen, wo sich dann die Larven trennen, um jede sich eine besondere Höhle in der Brutmasse auszubohren. Es ist nicht wahrscheinlich, daß sie ihnen zur Nahrung diene, sondern sie nur vor der Kälte schütze; sie werden vielmehr wie die der Bienen von Blüthenstaub, mit etwas Honig benetzt, ernährt, welchen ihnen die Arbeiterinnen reichen. Hierauf spinnen sie sich einen Cocon, wie ein regelmäßiges Oval, und ruhen darin als Puppen bis Anfang Juni. Außerdem findet man in den Hummelnestern noch drei bis vier, von derselben Wachsmasse verfertigen, kleine fast cylindrische Becher, mit Honig gefüllt.

So bald die Puppen zum Ausschlüfen reif sind, nehmen die Arbeiterinnen das Wachs der Brutmasse weg, und die Puppenhülsen stehen dann frei da, einander nur berührend. Sie öffnen sich unten. Die ausgekrochenen bauen im nämlichen

Sommer noch ebenso wieder, so daß man spächerhin mehrere Stockwerke übereinander antrifft.

Das Wachs der Hummeln erzeugt sich ebenso aus dem Honig wie das der Bienen, durch Ausschwühen zwischen den Leibesringen. Auch haben sie ebenso wie diese, einen mit Honig gefüllten Vormagen. Sie begatten sich im Freien, auf den Blumen, und sterben mit dem Herbst größtentheils. Nur einige Weibchen, welche sich verbergen und den Winter überleben, legen im nächsten Frühling neue Nester an, die sich bald mit junger Nachkommenschaft füllen, und so ferner vermehren.

Sie sind zwar nicht so bösartig als die Bienen und deshalb weniger zu fürchten, ihr Stich schmerzt aber doch sehr heftig.

#### 1. Die Erdhummel.

##### *Bombus terrestris.*

*Apis terrestris* L. Fr. Bourdon.

Schwarz, Bruststück und Bauch vorn mit einer gelben Binde, am After weiß.

Panzer Fauna I, Taf. 16. — Réaumur Ins. VI, Taf. 3, Fig. 1.

Nistet tief in der Erde. Sie kommt von sehr verschiedenen Größen vor, zumal nach dem Geschlechte.

#### 2. Die große Mooshummel.

##### *Bombus hypnorum.*

Das Bruststück fuchsroth, der Bauch schwarz, hinten am After weiß.

Panzer I. c.

#### 3. Die kleine Mooshummel.

##### *Bombus muscorum.*

Das Bruststück rothgelb, der Bauch schwefelgelb.

Réaumur Ins. VI, T. 2, F. 3, 4.

Nistet im Moos.

4. Die Heidehummel.

*Bombus erectorum.*

Dunkelgelb, mit weißer Stirn und Aster. Um den Bauch eine bis zwei schwärzliche Binden.

Panzer I. c.

5. Die Schlaghummel.

*Bombus saltuum.*

Schwarz; die Brust vorn und hinten weiß, so wie die hintere Bauchhälfte.

6. Die Steinhummel.

*Bombus lapidarius.*

Schwarz mit rost-rothem Aster; die Flügel glashell.

Réaumur VI, T. 1, F. 1—4.

Die größte hieländische. Baut ein Nest von Sand in Steinhaufen. Auch von sehr verschiedenen Größen.

Die Sandhummel, *B. arenarius*, unterscheidet sich durch schwärzliche Flügel.

7. Die Feldhummel.

*Bombus campestris.*

Schwarz, der Rücken gelb mit schwarzer Querbinde, der Bauch nackt, glänzend, mit hervorgezogenem weißhaarigem Hintertheil; die Flügel schwärzlich.

Panzer I. c.

Auf Waldrändern; von der Größe der Vorigen.

8. Die Waldhummel.

*Bombus sylvarum.*

*Apis sylvarum L.*

Schwarz, mit hellgelbem Borderrücken und rothgelbem Aster; über die Mitte des Bauches eine gelbe Binde.

Panzer I. c.

Auf waldigen Hügeln.

9. Die Feldhummel.

*Bombus agrorum.*

Schwarz; der ganze Rücken und der After rostgelb.

Panzer I. c.

Einzelne lebende.

IV. Hornbienen.

*Eucera.*

Die Kinnbacken nach vorn schmal, in einen starken Zahn endigend. Die Paraglossen sehr lang und borstensförmig. Die Fühler der Männchen fast länger als der ganze Körper.

*Eucera longicornis.*

Schwarz, Rücken und die ersten Bauchringe graubraun. Die Hinterfüße der Weibchen zottig.

Panzer I. c. LXIV, Taf. 21.

Etwa von der Größe einer männlichen Biene. Sie leben einsam und bauen in Mauerrithen, wo sie ein Nest von Erde bilden, und Honig eintragen. Im Sommer sieht man sie ziemlich häufig auf Blumen.

*Eucera linguaria* (Panzer ib.) unterscheidet sich durch ganz schwarzen Bauch.

V. Wespenbienen.

*Nomada.*

Trauerbiene.

Die Oberlippe quer elliptisch, die Kinnbacken schmal und ganzrandig. Die Kinnlidentaster lang, die Paraglossen kurz. Fast unbehärt, mit schmalem, eisförmigem Bauch.

Sie sammeln keinen Blüthenstaub, und legen ihre Eier in fremde Nester.

#### 1. *Nomada fucata* Pnz.

Schwarz, mit rostgelben Fühlern und Füßen; der Bauch mit fünf rothgelben Binden zwischen vier schwarzen. Nicht groß.  
Panzer I. c.

#### 2. *Nomada ruficornis*.

Kopf und Rücken schwarz, mit braunrothen Flecken und Längsstrichen; der Bauch gelb, mit rostrothen Querbinden und schwarzer Basis; Fühler und Beine rostroth. Auf Blumen.  
Panzer I. c. LV, 18.

### VI. K e g e l b i e n e.

#### *Coelioxys*.

Die Kinnbacken mit drei Zähnen; der Bauch kegelförmig, hinten zugespitzt, wenig behaart.

#### *Coelioxys conica*.

Schwarz, der Bauch mit schmalen weißen Binden. Auf den Nachenblumen.

### VII. H o l z b i e n e.

#### *Xylocopa*.

Die Kinnbacken löffelförmig, mit drei Zähnen am Ende.  
Die Kinnladentaster sechsgliederig.

#### *Xylocopa violacea*.

Schwarzhaarig, mit dunkelblauen Flügeln.  
Réaumur Ins. VI, Taf. 5. — Panzer I. c.

So groß wie eine Hummel. Gerade nicht häufig. Sie bohrt Höhlungen in alte Baumstämme, um ihre Brut darin abzusetzen, und man findet dergleichen manchmal in Sammlungen, die irrig für die Arbeit von Ameisen gelten. Sie gehen erst horizontal, dann senkrecht, in lauter Abtheilungen mit Scheidewänden.

## VIII. Blumenbiene.

### Anthidium.

Die Kinnbacken breit, mit schräg abgestufter Spitze mit einigen Zähnen. Kinnladen mit eingliederigem gedehnatem Taster. Der Bauch breit, eingekrümmt, beim Männchen hinten gezähnt, beim Weibchen unterhalb zottig.

#### Die Esau-Biene.

##### Anthidium manicatum.

Schwarz, am Kopf mit gelben Flecken, der Bauch mit zwei Reihen dergleichen. Das Männchen am After mit fünf krümmen Dornen.

Panzer I. c.

Im Spätsommer häufig auf Blumen, zumal der Labiateen.

## IX. Duftbiene.

### Osmia.

Die Kinnbacken mit drei scharfen Sägezähnen; der Bauch fast kugelig, kurzottig.

#### 1. Osmia chrysomelina Pnz.

Rostgelb behaart, mit weißhaariger Stirn und Füßen; das größere Weibchen schön rostroth behaart, die hintere Bauchhälfte aber schwarz.

Panzer I. c. Taf. 45—17.

Panzer bildet zwei Zellen dieser Biene wie offene Nestchen gestaltet, ab. Ich besitze sie aber in einer harten Steinmasse, reihenweise, wo sie durch Abschlagen eines Gypsblocches hervorlamen, und noch Larven und Puppen in einem seidenartigen Gespinnst enthielten, aus dem mir mehrere auskrochen. Wie sie da hinein fertiget wurden, konnte ich nicht mehr ausmitteln, da meine Begleiter, ohne es zu wissen, den Block zertrümmert hatten.

Eine andere, von Robineau — Desvoidy *Osmia helicola* genannt, baut in die leeren Schneckenhäuser von *Helix aspersa* und *nemoralis*, und schließt die Mündung mit einem Deckel von vegetabilischen Stoffen, der eine mit gelblichem Honig gefüllte Kammer bedeckt, in der sich die Larve befindet. Hinten waren papierene Zellen.

## 2. Die Mohnbiene.

*Osmia papaveris.*

*Megachile papaveris.*

Graulichschwarz; unten und um den Rücken mit silbergrauen Haaren.

Panzer CV, Taf. 16, 17. — Réaumur VI, Taf. 11.

Lebt nach Art und Weise der Rosenbiene, nimmt aber zu ihrem Neste Abschnitte von den Blumenblättern des Käfers mohnes der Felder, und tapeziert damit Erdhöhlen an den Rändern der Wecker; ihre Brut versorgt sie darin auf gleiche Weise.

## X. Rosenbiene.

*Megachile.*

*Anthophora Fabr.*

Die Kinnbacken stark, scharfschneidend mit drei Zähnen. Die Oberslippe länger als breit. Der Bauch länglichrund, obenher flach gewölbt, beim Weibchen aufwärts gebogen. Die Vorderbeine des Männchens verdickt, mit krummen Schenkeln.

## 1. Die eigentliche Rosenbiene.

*Megachile centuncularis.*

Schwarz, graugelb behaart, mit kleinen weißen Flecken an den Seiten des Bauches.

Réaumur Ins. VI, Taf. 10, Fig. 3, 4. — Panzer I. c.

Nicht ganz so groß wie eine Biene, ihr aber sonst ziemlich gleichend. Sie fliegt auf Rosenstöcken, Eschen, u. a. und schnellt mit mathematischer Genauigkeit freisrunde Stücke aus den

Blättern, die sie, zusammengefaltet, zwischen den Vorderbeinen in ein Erdloch, z. B. am Boden von Blumentöpfen, oder an Fenstergesims, oder auch in Höhlungen von Holzstämmen (denn ich besitze von diesen drei Arten Exemplare) trägt, diese röhrligen Räume mit diesen Blattstücken höchst zierlich ausstapziert, und in den so gebildeten, oft mehrere Zoll langen Cylinder ihr Ei mit etwas Honig legt, um es sodann mit einem runden Blattdeckel genau zu verschließen. Meist sind innerlich mehrere solcher Deckel übereinander, jede Abhöhlung mit einer Larve und Brutteig. Sie berechnet dabei genau die Größe der Blattstückchen, und verläßt einen Ausschnitt in der halben Arbeit, wenn er nicht recht gerathen ist. Die Puppen schlüpfen erst im nächsten Frühjahre aus.

## 2. Die Maurerbienen.

### *Megachile muraria.*

*Xylocopa muraria F.*

Schwarz; das Männchen röthlich behaart, das Weibchen ganz schwarz, mit dunkelvioletten Flügeln.

Réaumur VI, Taf. 7, 8, Fig. 1—8.

Bildet aus Sand und Mörtel Nester an Mauern und Steinen wie kleine Schwalbennester, in deren Zellen die Larven liegen. Daneben trägt sie in einige Honig.

## XI. Blumenbienen.

### *Hylaeus.*

Ziemlich unbehaart, mit walzenrunden Fühlern, die der Männchen länger. Kinnladen und Lippe noch einmal so lang als der Kopf.

#### 1. *Hylaeus arbustorum.*

Aschgrau schwärzlich, mit cylindrischem langen Bauch mit sechs weißen Ringen. Die Fühler gelb, am Ende schwarz, die Füße gelb.

Panzer I. c.

Auf Blumen, wie die folgende. Liegt oft ganz schlafrig darin.

### 2. *Hylaeus cylindricus*.

Schwarz, die Bauchringe mit weißen Rändern, die Spitze der Lippe und die Fußgelenke weiß.

Panzer ib.

*Colletes* unterscheidet sich zumal durch das stark behaarte Gesicht.

## XII. *Dasypoda*.

Die Kinnbacken unter der Spalte mit einem Zahn. Die Unterlippe lanzenförmig gestreckt.

### *Dasypoda hirtipes*.

Grauhaarig mit schwarzem Bauch, die Ringe weiß oder gelb; die Hinterfüße sehr behaart, zottig rostgelb.

Panzer l. c.

## XIII. *Er a u e r b i e n e*.

### *Andrena*.

Die Kinnbacken am Ende zweizähnig; die Unterlippe dreieckig, dreilappig, der mittlere Lappen in der Ruhe nach oben gerichtet.

#### Die Aschenbiene.

### *Andrena cineraria*.

Schwarz, der Rücken mit schönen weißen Haaren besetzt, querüber eine schwarze Linie; der Bauch bläulich schillernd, die Füße braun behaart.

Panzer l. c.

So groß wie eine gemeine Biene.



Zweite Familie.

W e s p e n.

(*Vesparia, Diploptera, Masarides.*)

Ihre Flügel sind längsgefaltet. Sie leben in Schwärmen, vom Raube, und füttern ihre Larven in selbstgebaute Nestern von einer papiernen Substanz.

Die Fühler sind gebrochen, bei den Männchen mit 13, bei den Weibchen mit 12 Gliedern. Die Unterlippe lappig geheist, mit vier Dräsenpunkten. Der Bauch durch einen Stiel an das Bruststück gehestet. Die Färbung meist gelb und schwarz.

XIV. W e s p e.

V e s p a.

Die Kinnbacken schief abgestutzt; die Unterlippe dreiltheilig. Das Käpfsschild viereckig und groß.

Die Wespen bilden gleichfalls Schwärme wie die Bienen, und bestehen wie diese aus dreierlei Individuen: Männchen, Weibchen und Sterilen. Letztere beiden versetzen aus abgezägter Baumrinde, Holzfasern oder selbst Blättern, die sie kauen und zu einem Teig kneten, eine Substanz wie dünnes Löschpapier oder Pappe, und bauen damit Scheiben, auf der Unterseite mit Zellen, wie die der Bienen, besetzt, und in der Mitte etwas gestielt, so daß mehrere solcher Scheiben übereinander stehen können. Sämtliche sind dann bei den meisten noch mit einem allgemeinen, mehr oder minder kugeligen Nestle umgeben. Diese Alveolen dienen nur für die Brut, und es werden keine Vorräthe darin aufbewahrt.

Einzelne Weibchen, welche überwintern, fangen im Frühling allein an, einige Zellen zu bauen und Eier daren zu legen, aus welchen Sterile kommen, die dann helfen das Nest weiter zu vergrößern und die nachfolgenden Jungen zu pflegen. Erst im Spätsommer kommen aus den folgenden Brutten junge Weibchen und Männchen hervor, und alles, was bis zum November

an Larven noch vorhanden ist, wird dann von den Arbeitern herausgerissen und getötet. Auch diese nebst den Männchen sterben bald nachher, nur einige Weibchen fristen das Leben.

Die Wespen sind fleissige, thätige, muthige Thiere, mit höchst schmerhaft verwundendem Stachel, den sie jedoch ungereizt nie gegen den Menschen brauchen. Sie sind dreist, gehen nach süßem Obst, zumal Birnen und Weintrauben, nähren sich aber auch von Insekten und Fleisch, und holen es oft von den Fleischläden. Mit dieser Nahrung füttern sie auch ihre Larven, die sich dann auf die gewöhnliche Weise einspinnen und verpuppen.

#### 1. Die gemeine Wespē.

##### *Vespa vulgaris.*

Schwarz, der Vorderkopf gelb mit einem schwarzen Punkt in der Mitte, mehrere gelbe Flecken auf dem Rücken, vier davon auf dem Schildchen, eine gelbe Binde und drei schwarze Punkte am hinteren Saume der Ringe.

*Réaumur VI, 1, 7.*

Sie ist etwa acht Linien lang und baut in die Erde. Ihr Nest hat von einem halben bis ganzen Fuß Durchmesser und besteht aus mehreren bis zu einem Dutzend, Scheiben mit Zellen unterhalb, und mit einer gemeinsamen kugeligen aus mehreren Schichten gebildeten Hülle umgeben. Diese hat oben und unten ein enges Loch, zum Ein- und Ausgang, und auch die Scheiben sind in ihrer gesielten Mitte zu diesem Zwecke durchbohrt.

Eine verwandte, grössere Gattung (*V. media*) baut ihr ähnliches Nest an die Bäume, und die, deren meist gelbe Nester man an den Dachsparren innerhalb der Häuser findet, soll wieder von der erstern etwas verschieden seyn.

#### 2. Die Hornisse.

##### *Vespa Crabro.*

Braungelb mit gelber Stirn; der Rücken schwarz, braungelb gespckt, die Bauchringe gelb, schwarz und braun gescheckt.

*Réaumur ib. T. 18.*

Über einen Zoll lang. Sie schnurrt stark, ist aber friedlich,

und darf nur nicht gereizt werden, da ihr Stich sonst so heftig ist, daß ihrer vier, wie man behauptet, selbst ein Pferd tödten können.

Ihr Nest besteht aus einer braungelben brüchigen Masse und wird in hohlen Bäumen, seltener in Gebäuden angelegt. Interessant sind die Beobachtungen des Pfarrer Müller über dasselbe\*). Er bemerkte Anfangs Mai eine große Hornisse, welche in einem leeren Bienenkorbe ihr Nest anzulegen beabsichtigte. Der Anfang bestand in einer runden Schale von der Größe eines Kronenthalers, in dessen Mitte schon das erste Bruttäschchen, an einem Säulchen hängend, befestigt war. Sie hatte es oben an der Decke eines umgekehrt stehenden Bienenkorbes angebracht. Der Beobachter sah sie nun alle 6—10 Minuten aussliegen und zurücklehren, wo sie einen Ballen abgebissenen faulen Holzes von der Größe einer Wicke zwischen Kopf und Brust eingeklemmt trug. Sie lief damit zum Neste, stand still, nahm den mitgebrachten Ballen zwischen die Knie der Vorderschenkel, und bis nun, indem sie denselben zu gleicher Zeit herumrollte und an den Bau andrückte, Stückchen los, die im Munde geknetet und mit zäher Feuchtigkeit vermischt, den Zellen oder der äußeren Schale angesetzt, mit den Kinnbacken von beiden Seiten angedrückt und geebnet wurden. Alles dieses mit einer ausnehmenden Geschwindigkeit, und so, daß die abgebissenen Stückchen nicht ganz losgetrennt, sondern durch das Herumrollen des Ballens aneinanderhängend, wie ein Faden von einem Knaul abgewunden wurden. Auf diese Weise wurde die äußere Hülle des Nestes täglich immer mehr vergrößert, wobei die Hornisse gegen sich baute, und an dem Rande, wo sie aufgehört hatte, wieder anfangend und unter der Arbeit zurückweichend, den über eine Linie breiten neu angesetzten Streifen in einer Schneckenlinie nach und nach herumführte. Nach Verlauf von 1—2 Minuten war der jedesmalige Vorrath verbraucht.

Mr. gewöhnte sie allmälig so an sich, daß er sie anfassen und streicheln durste. Auch beobachtete er sie beim Eierlegen. Sie machte es gerade so wie die Bienenkönigin, indem sie zuerst mit Kopf und Fühlern die Zellen untersuchte, sich

\*) German's Magazin der Entomologie III. B., S. 56.

sodann umwandte und die Spitze des Bauches tief in dieselben hineinsetzte, um das Ei abzusehen. Zu dieser Operation brauchte sie 8—10 Sekunden.

Als die Würmchen ausgekrochen waren, brachte sie nicht immer Baumaterialien zurück, sondern auch Speiseballen. Hiermit setzte sich die Hornisse vor dem jedesmaligen Füttern auf die Bruttafel hin, knetete den in den Mund gebrachten schon zerbissenen Klumpen Speise unter beständigem ~~Herumrollen~~ zwischen den Knieen der Vorderbeine noch einmal tüchtig durch, bis so dann ein Stück ab, und legte es dem in der Zelle aufgerichteten Wurm auf den Mund, der es auffaßte und mit heftiger Begierde in kurzer Zeit verzehrte: so fuhr sie von Zelle zu Zelle fort, bis der Ballen ausgetheilt war. Er bestand jederzeit aus zerbissenen weichen Theilen verschiedener weichflügeliger Insekten; einmal aus zerbissenen Bienen oder von den Bienen herausgeworfenen Drohnen oder aus Arbeitsbienenbrut. Als ihr P. M. Honig oder Bienenbrut selbst reichte, nahm sie ihm dieselbe augenblicklich ab und verwandte sie zur Fütterung. Ja sie wurde dabei endlich so zutraulich, daß sie sich schon von fern aufrichtete und auf die Hinterbeine setzte, wenn der P. M. sich mit der Hand, in der er Futter hatte, ihr näherte \*).

Um 15. Juni schlüpften die ersten jungen Hornissen aus, und halfen dann der Alten auf gleiche Weise.

Das erste Geschäft einer jeden ausgekrochenen Hornisse war, sich zu puhen, dann aber in die so eben verlassene Zelle mit dem Kopfe zu schlüpfen und sie von dem darin befindlichen Unrathe zu reinigen; die leeren Zellen wurden nach einigen Tagen wieder mit Eiern belegt.

## XV. Polistes.

Der Bauch ist gestielt, schlank, oft kurz und nach der Basis hin verschmäler.

\*) Doch ein hinlänglicher Beweis, daß diese keine bewußtlosen, rein mechanischen Handlungen sind, wie Cartesius u. a. meinten.

1. Die Pappwespe.

*Polistes chartaria.*

*Polistes nidulans F.*

Schwarz, selbenglänzend, mit gelben Flecken und Hinterrand der Bauchringe. Klein.

*Réaumur VI, T. 20—24.*

Ihr Nest ist einer der wunderbarsten Baue in der Insektenwelt. Es besteht aus einer dicken, festen, außen glatten, grauen Pappe, bisweilen fast einen Fuß lang, unvollkommen cylindrisch oder von Gestalt eines Kruges, oben segelförmig wie mit einem Deckel versehen, an dessen Spitze das Eingangstloch. Inwendig enthält es die gestielten Zellenscheiben übereinander, welche rund um an den Wänden des Nestes befestigt sind. Unten ist es um einen Baumast so innig befestigt, als wenn es zu dessen Ueberzug hätte dienen sollen.

Es scheint, daß es mehrere, wenigstens zwei verschiedene Spezies gibt. Ein solches Nest, was ich vor mir habe, ist von der Küste von Malabar und viel baudiger als die, welche ich in anderen Sammlungen gesehen, und so wie sie Réaumur abbildet, wo sie mehr einem abgestutzten Kegel gleichen, und in Capenne oft die Länge von dreiviertel Ellen erreichen sollen. Sie finden sich auch in Brasilien und hängen sämtlich frei, an den Bäumen.

2. Die Tatua-Wespe.

*Polistes morio.*

Ganz glänzend schwarz.

Gleichfalls in Südamerika. Die Substanz des Nestes von dieser Gattung ist eine größere Pappe und hat einen platten Deckel mit einem Loch in der Mitte.

3. Die Baumwespe.

*Polistes gallica.*

*Vespa gallica.*

Schwarz, das Stirnschild zwei Punkte auf dem Rücken, sechs Linien auf dem Schildchen, zwei Flecken auf dem ersten

und zweiten Bauchringe, der obere Rand derselben, und die übrigen gelb. Der Bauch eiförmig, kurz gestielt.

Panzer Fauna XLIX, 22.

Etwas kleiner als die gemeine Wespe. Das Nestchen steht frei an Sträuchern, z. B. Rosenbüschchen, auf Bergen, und besteht aus zwanzig bis dreißig Zellen, ohne Hüsse.

## XVI. Eumenes.

Die Kinnladen schmal, fast schnabelförmig; die Unterkippe in drei drüsige Spitzen getheilt.

### 1. Die Maurerwespe.

#### *Eumenes muraria.*

##### *Odynerus murarius Latr.*

Schwarz, das Bruststück mit zwei gelbrothen Flecken, der Bauch mit vier gelben Streifen.

Réaumur VI, T. 26, F. 1—10.

Macht im Sand oder an Mauern ein mehrere Zoll tiefes Loch, an das sie außerhalb aus ziemlich fest zusammengekitteter Erde ein ansangs gerades, dann wurstförmig gekrümmtes Rohr setzt, das auch wohl Längsspalten hat. Innen in dem Loch häuft sie acht bis zwölf grüngesärbte Larven, wie fuglose Räupchen gestaltet, an, die sie kreisförmig übereinander legt. Hat sie sodann ihr Ei beigefügt, so verschließt sie das Loch und zerstört das äußere Rohr wieder.

### 2. *Eumenes coaretata.*

Der Bauch ist länger gestielt, das erste Glied desselben birnsförmig, das zweite glockenförmig, schwarz, mit gelben Seitenflecken.

Panzer I. c. LXIII, 12.

Nicht selten auf Blumen. Das Weibchen baut an Pflanzstengeln, besonders gern auf Heide, ein kugeliges Nest aus feiner Erde, das sie mit Honig füllt, und ein Ei daneben legt.

Die Masariden sind nicht in Deutschland zu Hause.

Dritte Familie.

A m e i s e n.

(*Formicariae, Myrmicidae.*)

Kopf, Brust und Bauch sind stark abgesondert und nur durch zarte Stiele verbunden. Viele Individuen sind flügellos. Sie zeigen Männchen, Weibchen und Sterile, und leben meist in Haufen, die sie aus kleinen Körpern zusammenträgen. Sie fliegen selten, und laufen mehrentheils.

Von Charakter sind sie mutig, fleißig, unverdrossen, und selbst kriegerisch.

Sie theilen sich in die eigentlichen Ameisen und die Muttillen; letztere leben einsam.

XVII. A m e i s e .

*Formica.*

Fr. Fourmi. Engl. Ant.

Ein zahlreiches Geschlecht, gegenwärtig in mehrere getrennt, und nur den nachbenannten noch dieser Geschlechtsname übrig.

Sie leben alle in großen Vereinen.

Die Männchen sind viel kleiner als die Weibchen; sie sind, wie diese, geflügelt. Sie erscheinen nur im hohen Sommer, fliegen dann aus, und bilden Schwärme hoch in der Luft, oder auch wahre Säulen, die sich im Abendroth wie feurig ausgenommen haben\*). Nach der in den Lüften vollzogenen Begattung gehen ihnen die Flügel los, welche überhaupt weniger Adern als die der anderen Hymenopteren zeigen. Beide Geschlechter kehren dann nicht wieder in ihre alte Wohnung zurück, sondern die Weibchen, nachdem sie sich mit Hülse ihrer Füße von ihren Flügeln vollends befreit haben, gehen aus, eine neue zu gründen. Nach Huber's, von Latreille unterstützten Behauptungen

\*) Gleditsch in den Mémoires de l'Academie des sciences de Berlin 1749, S. 209, T. 2. Von *Lasius niger*.

sollen jedoch eine Anzahl derselben, nämlich die, welche sich gerade in der Nähe des Ameisenhaufens befinden, von den Arbeitern desselben gewaltsam zurückgehalten und in die Wohnung geschleppt werden, wo sie ihnen die Flügel vollends ausreißen und sie nöthigen, Eier zu legen; erst nachdem dieses geschehen, werde ihnen die Entfernung gestattet.

Die Männchen haben einen kleineren Kopf und Kinnbacken, aber größere Augen als die Weibchen; beide Geschlechter haben auch größere Punktaugen. Bei den Sterilen ist der Kopf im Ganzen größer und ziemlich dreieckig, aber die gewöhnlichen Augen sind viel kleiner und stehen auch mehr seitlich; ihre Punktaugen sind so klein, daß man sie kaum wahrnimmt. Die Kinnbacken sind bei ihnen sehr stark, die Brust zusammengedrückt und knotiger gestaltet, und ihre Füße im Verhältniß länger und stärker.

Alle Gattungen haben den Bauch an die Brust mittels eines Stiels von Gestalt eines, oder einer doppelten Schuppe befestigt, welche zweite einen Leibesring mehr anzeigt. Ihre Fühler sind stark gebrochen und ihr erstes Glied länger als alle übrigen. Die Weibchen und die Sterilen, welche auch hier nur unvollkommene Weibchen sind, haben entweder einen Stachel, oder statt dessen zwei Drüsen, welche die starke Ameisensäure absondern.

Ihre Nester oder Haufen sind verschieden. Theils bestehen sie aus zusammengeschleppten Spänen von Grashalmen, Holz, Tannennadeln u. dgl. nebst Stücken von Fichtenharz; theils aus Erde, die mit ihrem Speichel fester zusammengekittet wird; theils aus fest zusammengefilitztem Moos oder Pflanzenwolle (Amadou des fourmis in Amerika, der als Feuerschwamm gebraucht wird), theils höhlen sie alte Baumstämme aus, und machen sich gitterartige Gänge darin. In den Tropenländern findet man Gebäude von ihnen aufgeführt wie feste Pyramiden oder Halskugeln<sup>4)</sup>. Ueberhaupt tragen sie Alles zusammen, was ihnen in den Weg kommt, oft Dinge viel größer und schwerer als sie selbst sind, ja nach Kirby sollen ihrer vier selbst eine kleine Schlange fortzerrern können. Sie sind in unaufhörlicher Thätigkeit und

<sup>4)</sup> Burchell travels to southern Africa T. 1. Bignette.

Bewegung, man sieht sie nie ruhen, ja sie arbeiten sogar, was schon Aristoteles wußte, im Mondschein. Sie bilden sich zu ihren Geschäften regelmäßige Gänge und Wege, die sie von allen fremden Körpern rein halten, und die nach verschiedenen Diertern führen. Auf dem einen gehen sie hinaus, z. B. in den Wald, auf einem anderen kehren sie, beladen zurück, und keine hört dabei die andere, es darf aber auch keine jenem Strome in den Weg treten.

Nach Huber<sup>\*)</sup>), sollen sie sich durch ihre Fühler wirklich gewisse Nachrichten mittheilen, wie denn allerdings merkwürdig ist, daß wenn einige Wenige, aus weiter Entfernung, irgendwo Fleisch oder Süßigkeiten entdeckt haben, bald der ganze Schwarm hintendrein kommt. Jener Beobachter behauptet auch, es gebe unter den Sterilen eine eigene Klasse von Räubern und Soldaten, während friedlichere, oder gar Gefangene, die Brut besorgen müßten. Diese letztere Bahrnehmung, daß nämlich die Ameisen förmlich ausziehen, um andere Haufen (von einer anderen Art) zu übersetzen, zu plündern, ihre Puppen und sie selbst zu rauben und ihnen Schlachten zu liefern, wird auch von Latreille bestätigt<sup>\*\*)</sup>), und ich selbst habe es einst im hiesigen botanischen Garten mit angesesehen. Diese Soldaten oder Amazonen, wie er sie nennt, ziehen mehrere Tage hintereinander, jeden Nachmittag in einem dichten Strome aus, dringen in den fremden Ameisenhaufen, und kämpfen mit den daselbst Widerstand leistenden. Die geraubten Larven, ja selbst vollkommene Ameisen schleppen sie in ihre Wohnung, wo sie, zumal jene ausgewachsene, Sklavendienste thun müssen.

Uebrigens finden sich in den Ameisenhaufen vielerlei andere Insekten, die sie aber ungestört unter sich wohnen lassen; so zumal Käferlarven, häufig von *Cetonia aurata* u. a., und ich habe zu Zeiten verschiedene solche Fremdlinge bemerkt; auch der kleine Käfer *Claviger*, der so unvollkommene Fresswerkzeuge hat, daß er sich nicht selbst ernähren kann, sondern von ihnen gefüttert werden muß, lebt in ihren Wohnungen.

Die Eier der Ameisen, selbst der größeren, sind äußerst klein,

<sup>\*)</sup> Recherches sur les fourmis indigènes, par Fr. Huber. Paris 1810.

<sup>\*\*) Latreille Histoire naturelle des fourmis, Paris 1812.</sup>

wie weiße Punkte; ihre Puppen aber fast so groß wie die Ameise selbst, und ein angenehmes Futter für Spechte und Singvögel, zumal Nachtigallen. Man kann sie vier bis fünfmal im Jahre einsammeln, welches mehrmalige Bruten beweist.

Im Winter liegen sie träge in ihren Wohnungen, mit den ersten warmen Frühlingstagen kommen sie aber hervor.

Sie sollen in ihrer Nähe keine Raupen dulden, das heißt wohl, sie alle wegfangen. Deshalb werden sie als nützlich geschätzt und zumal in den Wäldern gern gesehen; auch berichtet man in Amerika von einer sogenannten *Visite ameise* (wahrscheinlich *Atta cephalotes*), welche in ungeheuern Schwärmen zu Zeiten in die Plantagen und Wohnungen der Menschen einfällt und dann alles Ungeziefer vertilgt. Von der *Zuckerameise* aus Neu-Granada wird aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts Aehnliches berichtet, ihre zahllosen Schwärme tödten Ratten, Mäuse und Amphibien. Indes erzählt *Boyer-Preyteau* \*), daß diese Ameisen auch wohl *Regerkinder* in der Wiege übersalten und zu Schande gerichtet haben.

Als Speise und durch Versetzung des obenerwähnten Zunderschwammes, sowie durch ihre eigenthümliche, wenn auch der Essigsäure ähnlichen Säure werden sie gleichfalls schätzbar. Jene von *Atta s. Myrmica cephalotes* (s. weiter unten). Die zum Feuerschwamm dienende Wolle (die, welche ich sah, gleich dünnem, bräunlichem, sehr leicht zerreibbarem Schafleder) wird von zweierlei Gattungen bereitct. Der beste, braungelbe kommt von der sehr weichen Wolle einer *Melastoma*, und wird von der smaragdgrünen *Formica spinicollis* \*\*) verfertigt; diese ist weit feiner als die vom Nid des *fourmis de Cayenne*, welchen *Formica fungosa* aus dem Filze eines *Bombax* macht. Auch hier zu Lande habe ich ähnliche, nur gröbere solche Filzgewebe von Ameisen gefunden, zumal einst zwischen einem Dache.

Die Ameisensäure wird vornehmlich von *Formica rufa* gewonnen, wiewohl alle Arten ohne Stachel welche liefern können. Sowle man sich solchen Ameisenhaufen nähert, biegen sie den

\*) Les Antilles françaises, particulièrement la Guadeloupe, par le Colonel *Boyer-Preyteau*. Paris 1823.

\*\*) *Al. v. Humboldt*, zoologische Beob. Bd. II, T. XXXVIII, S. 101.

Bauch einwärts, indem sie sich zugleich gegen den Menschen zur Wehre stellen, und spritzen ihnen diese kräftig riechende Säure entgegen, die man an der hingehaltenen Hand spürt, auch als seinen Regen, gegen das Licht hin, erkennen kann. Sie wird arzneilich als ein wirksames Mittel gegen hartnäckiges rheumatisches und gichtisches Gliederreizen empfohlen, aber von Unwissenden auch wohl sehr falsch angewandt. So hatte man einst einem solchen Leidenden gerathen, vierundzwanzig Stunden lang ein Hemd in einen solchen Ameisenhaufen zu vergraben und es dann vor Schlafengehen anzuziehen. Er that es, es hatte auch sogar den Erfolg, er kam aber vor entsetzlichen Schmerzen dem Wahnsinn nahe. Auch die Procedur, eine mit etwas Zuckerwasser gefüllte Flasche voll Ameisen laufen zu lassen sie dann zu verschließen und in Lehm oder Brotteig gehüllt, der Hitze des Backofens auszusehen, worauf man in der Flasche nichts als eine braune, stechend riechende Flüssigkeit finden werde, welche dann als Einreibung auf schmerzhafte Glieder zu gebrauchen, soll nicht ohne Vorsicht angewendet werden dürfen.

Die Ameisen sind da, wo sie nicht gern gesehen werden, oft schwer zu vertilgen \*). Feuer und Wasser hilft nicht, üble Gerüche, etwa von todteten Fischen oder Unrathe noch am ersten. In Amerika hatte einst ein Reisender einen getödteten Alligator zu seinem Fenster hinaus gehängt, aber aus Unachtsamkeit so, daß dessen Schwanz den Boden berührte. Ameisen fanden an diesem den Weg hinauf schaarenweise ins Zimmer und peinigten ihn in der Nacht aufs Fürchterlichste.

---

\*) Der berühmte ehemalige hiesige Professor, Geh. Kirchenrath Griesbach hatte in seinem, hinter dem botanischen gelegenen Garten Säcke mit Waldameisen ausschütten lassen, um den Nachtigallen, die er sehr liebte, Nahrung in die Nähe zu schaffen. Nach einigen Jahren wanderten aber Colonien dieser Ameisen aus, und siedelten sich unter den Fichtenbäumen des botanischen Gartens an, von wo aus sie in ein neues Warmhaus drangen, dessen Balken dergestalt zerfraßen, daß die ganze Vorderwand neu gebaut werden mußte, und sogar den Heizkanal durch große Massen hineingeschleppter Körper verstopften. Sie stellten sich Federmann so mutig zur Wehre, daß die daselbst Arbeitenden nur mit wohlverwahrten Kleidern ihre Geschäfte besorgen konnten.

Die eigentlichen Ameisen, *Formica*, haben nur eine Schuppe am Bauchstiel und keinen Stachel, sondern nur die Drüsen für die Säure. Die Fühler sind an der Stirn eingefügt, die Kinnbacken daran eckig und gezahnt.

### 1. Die große rothe Waldameise.

#### *Formica rufa.*

Die Arbeiter schwärzlich, ein großer Theil des Kopfes, das ganze Bruststück und die Schuppe braunroth, herzförmig.

*Latreille* Hist. des fourmis pl. V, f. 28. — *Panzer* I. c. LIV, 1. ♀ — *Brandt* und *Raheburg* Arz.Th. II, T. 22.

Die Arbeiter sind etwa vier Linnen lang, die Weibchen unterscheiden sich außer der Conformation durch den oben meist schwarzen Rücken, die Männchen sind ganz schwarz und etwas größer. Beide Geschlechter gesäßig.

Es ist die gemeine rothe Ameise, welche zumal in den Radholzwaldungen die bekannten Ameisenhaufen aufführt, die aus aller Art Stückchen von Vegetabilien, zumal Splittern bestehen. Sie ist kühn und trohig, wenn sie angegriffen wird, und heißt blutig. Ja der abgerissene Kopf heißt noch.

Von ihr gewinnt man in den Apotheken hauptsächlich die vorerwähnte Ameisenässe und die Vogelfreunde die Puppen zum Füttern der Nachtigallen. Sie vertilgt vieles Ungeziefer und wird daher in den Forsten gehetzt.

### 2. Die große schwarze Holzameise.

#### *Formica fuliginosa.*

#### *Formica herculeana. F. ligniperda.*

Bräunlichschwarz, nur die Geißel der Fühler und die Füße biswellen röthlich. Die Bauchschuppe eiförmig, ungekerbt.

*Latreille* I. c. V, f. 27. — *Brandt* und *Raheburg* I. c.

Wird bis acht Linnen lang und ist unsere größte. Sie zerstört das Innere aller Bäume bis zu einem Netzwerk von schwarzer Farbe, indem sie Gänge nach allen Richtungen darin aushöhlt.

3. Die schwarzgraue Ameise.

*Formica fusca.*

Die Sterilen aschgrau-schwarz, glänzend, die Basis der Fühler und der Füße röthlich. Die Schuppe groß, fast dreieckig.

*Latr. VI, F. 32.*

Sie gibt zerdrückt einen Citronengeruch, und findet sich zu- mal an und in Bäumen.

4. Die kleine schwarze Ameise.

*Formica nigra.*

*Lasius niger.*

Schwarz, glänzend, mit braunem After und röthlichen Beinen.

*De Geer Ins. II, Taf. 42, Fig. 16.*

Nur zwei Linien lang, unter der Erde, wo sie lange Gänge bildet \*).

## XVIII. *Myrmica.*

Die Weibchen und Arbeiter haben einen Stachel, und beide Geschlechter eine doppelte Schuppe am Bauchstiel.

1. Die kleine rothe Ameise.

*Myrmica rubra.*

*Formica rufa L.*

Röthlich; wie gerunzelt oder chagrinirt, mit glänzend glattem Bauch. Der erste Siielknoten hat unten einen Dorn; der dritte Bauchring ist bräunlich.

*Latr. T. X, F. 62.*

Sie findet sich sehr häufig in den Wäldern, wo man ihren Bau in der Erde, unter Steinen und im Moose findet. Sie ist scharf. Ihre Länge ist  $2\frac{1}{2}$  Linien.

\* ) Trotz der vielen Bearbeitungen ist die Bestimmung der Arten doch noch nicht hinlänglich vollendet. Es kommt dies von der Schwierigkeit, sie alle gut aufzubewahren und vergleichen zu können.

## 2. Die kleine gelbe Ameise.

### *Myrmica flava.*

Gelb, die Augen schwarz, die Punktaugen fehlen den Sterilen.  
De Geer II, Taf. 42, Fig. 24.

Ist die kleinste Gattung, kaum über eine Linie lang. Fin-  
det sich fast überall unter Steinen, in ausgehöhlten Gängen, in  
denen sich zumal der Claviger aufhält. Dringt in die Speise-  
schränke und Borrathskammern, wo Eingemachtes u. dgl. verwahrt  
wird. Sie soll keinen Stachel haben.

## 3. Die kleine Rasenameise.

### *Myrmica cespitum.*

Braunschwarz, Kopf und Rücken gestreift, der Rücken hin-  
terwärts mit zwei Dornen; Fühler und Kinnbacken rothbraun.

Latr. X, F. 63.

Sehr gemein unter dem Rosen. Etwa zwei Linien lang.

## 4. Die amerikanische Besitenameise.

### *Myrmica Cephalotes.*

#### *Atta Cephalotes Fabr.*

Die Arbeiter glänzend braun, mit sehr großem dreieckigem  
Kopf. Weibchen und Männchen mattschwarz, mit kugelrundem  
Bauch, am Bruststück mit vier Dornspitzen; am Kopfe zwei.

Latr. T. VII, F. 9. — De Geer III, Taf. 31, Fig. 11—13.

Dieses ist die große, in ganz Südamerika vorkommende Gat-  
tung, mit der jedoch, wie es scheint, auch noch andere vermengt  
werden. Sie lebt eigentlich in den Wäldern, in der Erde, er-  
fleckt aber Bäume, um das Laub abzunagen, und soll in einer  
Nacht einen ganzen Orangenbaum entblättern können. Die herab-  
gefassenen zerbissenen Stücke ergreifen die unten befindlichen und  
tragen sie in geschlossenen Reihen wandernd in ihre Bäume, was  
einen artigen Anblick gewährt, indem jede ein solches grünes  
Blättchen, wie eine Fahne, hoch trägt. Dieses nun soll auch

dieselbe Gattung seyn, welche zu Seiten in die Häuser dringt, und alles daselbst befindliche Ungeziefer tott beisst. Man freut sich ihrer Ankunft aber auch noch aus einem anderen Grunde. Alljährlich in den Monaten August, September, Oktober, November, wenn die größte Hitze ist, kommen die Ameisen in großen Schwärmen aus ihren unterirdischen Höhlen hervor, wobei sie einige Wochen vorher das Erdreich um ihren Haufen schon von allem Grünem gereinigt haben. Die Einwohner geben dann Achtung, daß ihnen ein Leckerbissen, ja ein Erwerbszweig nicht entgehe. Gewöhnlich brechen die Ameisen nach einem Nachmittagsregen und einer darauf folgenden heiteren Nacht und warmen Morgen von zehn bis drei Uhr hervor. Nun holen die auslauernden Einwohner schnell ein Faß Wasser und stellen es nahe dem Orte, wo die Ameisen herausbrechen; unter diesen sind mehrere von fast zwei Zoll Länge, nämlich die trächtigen geflügelten Weibchen. Erreichen sie das Freie, so erheben sie sich in die Luft. Doch ehe sie solches thun, werden sie von dem Ameisenfänger, welcher in dem Fasse mit Wasser steht, vermittelst eines gespaltenen Rohrstäbchens gefangen; der Hinterleib an Form und Farbe einer kleinen Olive gleich, wird abgerissen und in einen Kessel geworfen, wo man sie langsam am Feuer röstet, und so ein köstliches Gericht, Ameisenpastete genannt, bereitet.

Sie beißen bei diesem Fang bis aufs Blut. Diejenigen, welche in die Luft gelangen, kommen selten zurück, weil eine Menge Vögel auf sie Jagd macht. Die übrigen begeben sich nach einem stundenweiten Fluge wieder herunter, beißen sich selbst die Flügel ab, und wühlen sich in die Erde ein.

## XIX. Mutilla.

Die Männchen geflügelt und mit Punktaugen. Die Weibchen ungeflügelt, ohne Punktaugen, mit einem Stachel. Die Beine dicht besamten. Der Bauch eisförmig, zugespitzt.

Ihre Larven leben in den Nestschen der Erdhummeln und Bienen. Die vollkommenen laufen meist nur auf der Erde, und zeichnen sich durch bunte, schwarz, weiß und rothe Färbung, zumal viele durch das schön rothe Bruststück aus.

Die Spinnenameise.

*Mutilla europaea.*

Schwarz, der Rücken roth, Bauch mit drei haarigen silberweissen Binden.

Panzer LXXVI, 20.

In Wäldern. Einen halben Zoll lang.

---

Vierte Familie.

R a u p e n t h ö d t e r.

(*Fossores, Sphegidae, Scoliidae, Larratae.*)

Ihr Körper ist schlank, der Bauch gestielt. Ihr Kopf hat mäßige Fühler, starke Kinnladen, und die Flügel sind ausgebrettet. Die Beine ziemlich hoch.

Es sind lebhafte, zierliche, emsige Thiere von meist schwarz und rother oder schwarz und gelber Färbung. Das Weibchen hat einen Stachel.

Sie graben Löcher, in welche sie ein halbtodtes Insekt zur Nahrung für ihre Larve legen.

XX. T i p h i a.

Die Kinnbacken sind langgespitzt, die Kiefertaster lang, die Fühler fadenförmig, dick; die Beine kurz, dick, stachelig, dicht beisammen.

*Tiphia femorata.*

Glänzend schwarz, grau behaart, die hinteren Schenkel und oft auch die Schienbeine, rothbraun.

Panzer I. c. LXXVII, 14.

Sie tragen in ihre Erdlöcher für die Larven Honigbret.

## XXI. Scolia.

Der Prothorax mit tief ausgekerbtem Hinterrand; die Hinterbeine von einander entfernt; zwischen ihnen das Hinterbrustbein breit. Die Fühler entfernt von einander, zwischen den eingekerbten Augen eingesetzt.

### Scolia quadripunctata.

Schwarz, auf dem Bauch mit vier gelblichweißen Flecken, bisweilen auch noch zwei auf dem dritten Ringe. Die Flügel braun, violet schimmernd.

Panzer I. c.

Einen halben Zoll lang, auf Blumen.

## XXII. Grabwespe.

### Pompilus.

Die Fühler der Weibchen gerollt, und mit verlängerten, schlaffen Gliedern; die Oberlippe ist unter dem Stirnschild verborgen. Die Vorderbrust erreicht die Höhe der Mittelbrust.

Es sind lebhafte, meist auf der Erde laufende Wespen mit langen, racheligen Beinen und eisförmigem, gestieltem, etwas eingebogenem Hinterleib; ihre Flügel sind meist etwas gefärbt.

#### 1. Die gemeine Grabwespe.

##### Pompilus viaticus.

*Sphex viatica* L.

Schwarz, vorn etwas behaart, der Bauch braunroth, jeder Leibesring schwarz eingefasst.

De Geer II, Taf. 28, Fig. 46. — Grisch Ins. Taf. 1, Fig. 13. — Panzer I. c. LXV, 16.

Überall, in sandigen Gegenden am häufigsten; gräbt Gänge in die Erde, schleppt eine oft sehr große Raupe oder eine Spinne herbei, die sie einzigemal sticht, daß sie halb todt wird, trägt sie in ihren Gang, und legt ein Ei daneben. Hierauf verschließt sie ihn oftmals mit Fichtennadeln. Sie ist einen halben Zoll lang.

2. Die braune Grabwespe.

*Pompilus fuscus.*

Schwarz, glatt, die vordere Hälfte des Bauches gleichfarbig braunroth.

Panzer LXV, 45. — De Geer I. c. 28, Fig. 6, lebt auf gleiche Weise.

XXIII. Sandwespe.

*Ammophila.*

Kinnladen und Unterlippe sind schnabelförmig verlängert, mit gestreckten Fästern. Der Bauch langgestielt.

1. Die gemeine Sandwespe.

*Ammophila sabulosa.*

Schwarz, haarig, mit langgestieltem, in der Mitte braunrothem Bauch.

Panzer I. c. LXV, 42. — De Geer 28, 7.

Sie ist einen Zoll lang, der Bauch lang gestielt, der Stiel schwarz, der zweite und dritte Bauchring roth, das Hintertheil wieder schwarz. Das Männchen hat silberige Haare am Vorderkopf.

Diese gräbt sich gleichfalls mit den Vorderfüßen einen Gang wie ein Hund, holt dann eine Raupe, noch öfter eine Spinne herbei, die sie weit umher aussucht, kneift und flicht diese matt, schleppt sie in das Loch, und legt ihr Ei darauf. Das Loch verstopft sie mit kleinen Sandsteinchen, ja selbst mit einem großen Kiesel wieder. Die austriebende Made zehrt erst das Fett des gebissenen Thieres auf, sodann das Uebrige und verpuppt sich endlich.

2. Die Flugsandwespe.

*Ammophila arenaria.*

*Pepsis arenaria* F. *Sphex arenaria* L.

Haarig, schwarz, mit eiförmigem, kurzgestieltem Bauche, dessen vordere Hälfte braunroth ist.

Panzer LXV, 43.

Ihre bräunlichen Flügel sind so lang als der Leib. Sie lebt auf gleiche Weise.

### 3. Die Leh m - Grabwespe.

#### *Ammophila lutaria.*

Glatt, mit langgestieltem Bauche, dessen zweites und drittes Glied roth; die Lippe silbern. Drei mal kleiner als die Sandwespe. *Panzer* ib. 14.

Die Gänge aller dieser sollen am Ende verzweigt seyn, und in jeden ein Ei gelegt werden.

Eine verwandte, *Pelopaeus spirifex* *Fabr.*, schwarz, mit einem langen gelben ungegliederten Bauchstiel, soll an Wänden, oder unter den Dächern der Häuser spirale Cylinder von Erde für ihre Brut anlegen. (*Panzer LXXVI*, 15.) Die Unterseite dieser Cylinder hat verschiedene Reihen Löcher, welches lauter Eingänge für verschiedene Brutzellen sind. Sie findet sich im südlichen Europa.

In Indien gibt es große, goldgrüne Gattungen.

## XXIV. Sch n a b e l w e s p e.

### B e m b e x.

Von Gestalt der Wespen, mit eikugelförmigem, fast ungestieltem Bauch. Die Oberlippe lang, schnabelförmig; Kinnladen und Unterlippe verlängert, gekrümmmt.

#### Die gemeine Schnabelwespe.

##### *Bembex rostrata.*

Die Unterlippe schnabelförmig, auf die Brust zurückgeschlagen, die spitzen Kinnbacken sich vor derselben kreuzend. Schwarz, mit stahlblauem Schiller, vorn grau behaart, der Bauch mit sechs vorn getrennten Binden, die Beine gelb.

*Panzer* I. c. I, 10.

Sie findet sich im Sommer, meist in sandigen Gegenden und zeichnet sich durch ein scharfes abgesetztes Summen und einen auffallenden Rosengeruch aus. Das Weibchen gräbt Löcher

In den Sand, und stopft sie voll todtter Fliegen für ihre Brut, worauf sie sie wieder verschließt.

## XXV. Siebweisse.

### Crabro.

Der Kopf ist breiter als das Bruststück, der Leib eisförmig, glatt. Die Oberlippe silberglanzend, die Kinnbacken am Ende zweispitzig. Die Vorderfüße der Männchen sind in ein Schüsselchen erweitert.

#### Die gemeine Siebbiene.

##### Crabro cribrarius.

Schlank, schwarz, der Bauch mit gelben vorn unterbrochenen Binden. Einen halben Zoll lang.

Panzer XV, T. 18, 19.

Die Vorderfüße der Männchen dieser und anderer Gattungen sind am Schienbein und am ersten Tarsenglied, in ein hohles Näpfchen erweitert, welches, gegen das Licht betrachtet, durchlöchert erscheint, daher sie vormals von den beschränkten Teleologen als ein Mittel der Vorsehung dargestellt wurden, bestimmt, den Blüthenstaub der Pflanzen auf die Narben der Pistille zur Förderung von deren Befruchtung zu sieben. Allein erstens hat Göhe \*) gezeigt und abgebildet, daß jene durchlöcherten Scheiben noch mit einer Haut überzogen sind, zweitens hätte man wissen sollen, daß der Blüthenstaub keineswegs ein trockenes Mehl, sondern vielmehr eine Masse klebriger Bläschen sey, die auf diese Weise gar nicht ihren Weg hätten finden können; der Abschmacktheit nicht zu gedenken, daß diese Siebbienen im Verhältniß viel zu selten sind, um ein solches mechanisches Geschäft überall auszuüben.

Alle diese Gattungen bohren sich Löcher in altes Holz, und man findet im Sommer fast jederzeit welche an alten bretternen Gartenthüren und deren Pfosten. Sie sind leicht kenntlich an ihrem großen breiten Kopf und der silbernen Oberlippe. Ihre Farbe ist immer gelb und schwarz.

\*) Naturforscher II. Stück.  
Bolat, Zoologie. Bd. IV.

## XXVI. Blumenwespe.

### Cerceris.

Die Fühler auf der Stirn stehend, kurz, dick, einander genähert, der Bauch länglich; die ersten Bauchringe eingeschnürt.

### Cerceris laetus.

Schwarz mit gelben Flecken und Beinen; der erste Bauchring mit zwei gelben Punkten, die übrigen mit einer gelben Binde eingefaßt.

Panzer I. c. LXIII, 44.

Auch diese graben sich Höhlungen für ihre Brut, für deren Nahrung sie aber bienenartige Insekten wählen. Sie selbst gleichen an Gestalt den Vorigen.

## XXVII. Philanthus.

Unterscheiden sich von den vorigen nur durch ihre von einander entfernt stehenden Fühler.

### Philanthus pictus.

Schwarz mit gelben Flecken und Füßen; der Bauch gelb, die hinteren Ringe schwarz gesäumt, die zwei vorderen mit schwarzem Fleck in der Mitte.

Panzer I. c.

---

## Fünfte Familie.

### S ch l u p f w e s p e n.

#### (Pupivora, Ichneumonides.)

Ihr Bauch ist mittels eines Stieles angeheftet, und in der Regel lang und schlank; er bewegt sich an der Anheftung auf- und abwärts; hinten hat er einen Legebohrer, mit welchem diese Thiere, wenn er sehr lang und borstenförmig ist, bis in die

tieffsten Nihen der Baumrinden ihre Eier an dort verborgene Larven legen. Ihre Fäher sind in unaufhörlicher zitternder Bewegung und auch sie selbst sehr unruhig und lebhaft.

Ihre Fortpflanzung hat das Merkwürdige, daß sie mit ihrem Legestachel die Larven anderer Insekten, theils Schmetterlingsraupen, theils welche von Bienen, Fliegen u. dgl. anstechen, und an oder in die Haut derselben ein oder auch mehrere Eier legen. Die aus diesen auskriechenden Larven bohren sich bald in das Innere jener Larven ein und leben mit diesen, gleichzeitig, zumal von deren Fettmasse fort, so daß sie sich beider zugleich verpuppen. Die der Schlupfwespe in eine seidene Hülle, innerhalb jener, welche zu Grunde geht, und diese dafür ausschließen läßt.

Sie bilden ein außerordentlich zahlreiches, von Linné unter dem Namen Ichneumon zusammengebrüffenes Geschlecht, dessen Arten wohl bis auf zweitausend angeschlagen werden können <sup>9)</sup>.

## XXVIII. G i c h t w e s p e.

### F o e n u s.

Der Kopf steht an einem deutlichen Halse; der Bauch ist sichelförmig, und am oberen Theile des Rückens, unter dem Schildchen mittels eines ganz dünnen Stiels angeheftet, zusammengedrückt, und schmächtig. Die Schienbeine der hinteren dicht, keulenförmig.

### F o e n u s jaculator.

Schwarz, an der Mitte des Bauches und am Legebohrer roth. Schienbeine und Tarsen an der Basis weiß.

Panzer XCVI, T. 16. — Degeer I, 36, Fig. 10.

Einen halben Zoll lang, die drei Legeborsten ebenso lang. Ein zierliches Thier, das den Leib im Fluge in die Höhe gerichtet hält, und nicht selten auf Blumen, zumal der Schirmpflanzen, angetroffen wird.

Es legt seine Eier an die Larven von Bienen.

<sup>9)</sup> L. C. Gravenhorst, Monographiae Ichneumonidum pedestrium Lips. 1815 und dessen Ichneumonologia europaea III. p. Vratist. 1829.

Chr. G. Nees ab Esenbeck Hymenopterorum, Ichneumonibus as-  
finium, Monographiae II, Vol. Stuttgart 1830.

## XXIX. Schlußwespe.

### Ichneumon.

Die Legeborsten sind kurz oder gänzlich verborgen; der Bauch eisförmig, der Bauchstiel am Ende breit, gewölbt. Der Kopf ist breit, die fadenförmigen Fühler gerollt.

Ihre Larven verpuppen sich entweder innerhalb der Raupen, oder auch außerhalb, an deren äußerer Haut.

Die Zahl ihrer Species geht in die Hunderte.

#### 1. Ichneumon saturatorius.

Schwarz, mit weißem Schildchen und Bauchende; auch die Mitte der Fühler weiß. Die Beine roth, ins Braune.

#### 2. Ichneumon flavatorius.

Rotgelb, die letzten Bauchringe schwarz, das Schildchen und die Mitte der Fühler weiß.

Bisweilen ist auch der Astor weiß. Findet sich nicht selten auf Waldblumen.

#### 3. Ichneumon sarcitorius.

Schwarz, der zweite und dritte Bauchring roth, der schwächer oben weiß. Die Beine röthlich. Vorkirt sehr in der Färburg.

## XXX. Braccon.

Der Kopf kugelig, auf einem Halse sitzend; die Fühler borstenförmig, in der Mitte der Stirn eingefügt. Bruststück rundlich, der Bauch fast ungestielt, mit langen Legeborsten.

### Braccon impostor.

Schwarz, behaart, mit feuerrotem Bauche; die Flügel schwarz, mit zwei hellen halbmondförmigen Flecken. Der Legestachel am Ende umgebogen.

Panzer, Fauna XLV, 14. Ichneumon denigrator.

## XXXI. Microgaster.

Der Bauch kurz, oft kürzer als die Brust, ungestielt. Das erste Glied breit, segelförmig, die letzten pfugshaarhaftig verwachsen. Die Beine dick, der Legebohrer eingekrümmt, oder gänzlich verborgen.

Es sind ganz kleine Schlupfwespen, die in den Schmetterlingslarven in Mehrzahl leben, aber noch bei deren Leben wieder heraustreten und sich schöne seidene Cocons zum Verpuppen spinnen.

### 1. Microgaster glomeratus.

*Cryptus glomeratus F.*

Schwarz, mit gelben Beinen.

De Geer I, 16, Fig. 6. — Réaumur II, T. 23, F. 2, 7, 8.

Er ist nur anderthalb Linsen lang, und sticht zumal häufig die gelben Kohlraupen an. Die in dieser in Menge lebenden Larven sind graulich, mit einigen Borstenhaaren. Beim Ausstreten spinnt sich jede in einen kleinen goldgelben Cocon ganz wie der einer Seidenraupe im Kleinen, deren Haufen man dann gewöhnlich an Gartenhauswänden mittels einiger Fäden befestigt erblickt. Man hat sie manchmal irrig für Raupenlarven gehalten und vertilgt, während man sie schonen muß.

### 2. Microgaster globator.

*Cryptus globator F.*

Schwarz mit rothbraunen Beinen.

De Geer II, 29, Fig. 12, 13. — Réaumur-II, 35, Fig. 5, 6.

So groß wie der vorige und nur durch die dunkleren Beine zu unterscheiden. Die Larve lebt in verschiedenen Grasraupen, und verpuppt sich auf gleiche Weise; sie umspinnen aber ihre Hülse noch mit einer weißen Seide in Gestalt einer Kugel, die wie ein Spinnennest oder eine Kugel gelblichweisser Baumwolle aussieht, und nicht selten auf Wiesen, an einem Grashalm befestigt, angetroffen wird.

### 3. *Microgaster aphidum.*

Schwarz, die Basis des Bauches, die Vorderbeine, und die Knie der hinteren gelb.

Nur eine Linie lang. Die Larve lebt einzeln in Blattläusen. Diese so begabten schwellen stark auf, werden braungrau, und sterben bald darauf, wo man sie nicht selten noch so sitzend findet.

### XXXII. *Chelonus.*

Die Fühler borstenförmig, der Bauch oberhalb ungeringelt. Die Gegeborene lang.

#### *Chelonus Oculator.*

Schwarz, der Bauch des Weibchens an der Basis jederseits mit einem runden helleren Fleck.

### XXXIII. *Bassus.*

Mit langen fadenförmigen Fühlern, der Bauch ungestielt, aufstehend, gedrückt, flach gewölbt.

#### *Bassus laetatorius.*

Schwarz, der Bauch des Männchen in der Mitte roth, der zweite bis vierte Ring mit eingedrückter Querlinie; das Schildchen, einige Flecken des Rückens, der innere Augenrand, der Mund und die Schenkel gelb.

Panzer I. c.

Etwa vier Linien lang. Gemein auf Blumen.

### XXXIV. *Ophion.*

Fühler borsten- oder fadenförmig, lang, der Bauch gestielt, stark zusammengedrückt, schelfförmig gebogen und am Ende schief abgestutzt. Die Gegeborene etwas hervorstehend.

#### 1. *Ophion luteus.*

Hell ziegelroth, mit grünen Augen.

Schäffer. Iaon. Ins. T. 1, F. 10.

Etwa neun Linien lang, sehr häufig auf Blumen.

## 2. *Ophion nidulator.*

Schwarz, mit sickelförmigem, in der Mitte rothem Bauch.  
Panzer I. c.

Neun Linien lang, in Wälvern.

## XXXV. *Pimpla.*

Der Bauch lang gestreckt, fast cylindrisch, oben gewölbt, das erste Glied länger als breit. Die Legeborsten meist von der ganzen Länge des Körpers und darüber.

### 1. *Pimpla manifestator.*

Schwarz, mit rothen Beinen.

Panzer Fauna I. c. (XIX. 21.)

Ein großes schönes Thier, mit dem Schwanz wohl am weitesten lang.

### 2. *Pimpla persuasoria.*

Schwarz, alle Bauchringe jederseits mit einem weißen Fleck. das Schildchen weiß; die Beine rothbraun.

Panzer ib.

Noch etwas größer als der vorige, und wohl die größte hieländische Gattung. Ich traf ihn mehrmals an Weidenbäumen und Obstbäumen, wo er wahrscheinlich den Raupen nachstieß.

---

## Gehste Familie.

*Goldwespen.*

(*Chrisidida.*)

Ihre Unterflügel sind ohne Adern; der Legestachel wird aus den letzten Leibesringen gebildet, welche sich wie ein Teleskop aus- und einschieben können, und endigt in einer Spize. Der

Bauch ist ungestielt, bei den Weibchen oben gewölbt, unten hohl oder platt, und kann sich gegen die Brust schlagen.

Auch sie legen, nach Art der vorigen, ihre Eier an Insektenlarven, die da auskriechen und ferner in ihnen leben.

## XXXVI. Goldwespe.

### Chrysis.

Der Bauch meist goldgrün, die Brust kupferroth. Kinnladen und Unterlippe bei vielen rüpfelförmig.

#### 1. Die gemeine Goldwespe.

##### *Chrysis ignita.*

Kopf und Bruststück spangrün, der Bauch kupfergoldig, mit vier Zähnen am Ende.

Panzer I. e. V, 22.

Häufig an Gartenthüren und Holzwänden.

#### 2. Die glänzende Goldwespe.

##### *Chrysis fulgida.*

Glänzend glatt, Brust und erstes Bauchglied metallisch-blau, die übrigen rein goldig, am Ende mit vier Zähnen.

Panzer V, 15.

Ist demnach wenig von der vorigen verschieden, aber schöner.

---

### Siebente Familie.

## Gallwespen.

### (*Cynips*era, *Diploleparia*, *Gallicolae*.)

Klein, mit zusammengedrücktem oder niedergedrücktem, gestieltem Bauch, der unten scharfkantig gestielt ist. In einer Spalte

daselbst verbirgt sich der spiralgerollte Legestachel, zwischen zwei Borsten.

Sie bohren in die Rinde der Eichen, an allen Stellen derselben, oder der Rosenstücke u. s. w. mit ihrem gezähnten Legestachel Wunden, in welche sie ihre Eier absetzen. Durch die so bewirkte Reizung schwelten die verwundeten Stellen zu apfelförmigen, auch knopfähnlichen Auswüchsen an, in welchen die Made die Stufen ihrer Verwandlungen durchläuft.

### XXXVII. Gallwespe.

#### Cynips.

Der Bauch eiförmig-rundlich, etwas dreieckig, seitlich zusammengedrückt. Die Fühler fadenförmig, beim Männchen mit 15, beim Weibchen mit 14 Gliedern, nach vorne etwas dicker.

##### 1. Die Rosen-Gallwespe.

###### Cynips rosae.

Diplolepis Bedegnaris Geoffr.

Das Männchen glänzend schwarz, das Weibchen mit glänzendem rostrotem Bauch, und hellrothen Beinen.

Brandt und Raheburg A. Th. II, 21, Fig. 5—7. — Réaumur III, T. 46, 47.

Das zierliche Insekt sticht an die Neste der wilden Rosen, zumal *R. canina*, *villosa* und *sepium*, mit seinem Legestachel Wunden, um seine Eier hineinzulegen, die durch ihren Reiz die moosartigen, unter dem Namen Rosenäpfel oder Schlafäpfel bekannten Auswüchse erzeugen, in deren Innerem die Larve ihr Leben verbringt und ihre Verwandlungen besteht. Man nennt sie auch Bedeguar\*), und sie bestehen aus einem holzigen Kern, mit borstigen verzweigten Fortsähen von gelbgrüner bis rother Farbe, in welchen Raheburg Spiralfasern fand.

\*) Aus dem Arabischen (s. obiges Werk II, S. 151). Ehemals waren sie unter dem Namen *Fungus rosarum*, *Spongia Cynobatis* etc. officinell, haben aber nicht die geringste eigenthümliche Wirkung.

Die Weibchen sind sehr träge und laufen langsam die Neste auf und ab, um eine passende Stelle für ihre Eier zu suchen. Die Larven findet man fast jederzeit beim Durchschneiden jener, durch ganz Deutschland vorkommenden Rosenäpfel.

In diese Larven legt eine ganz nahe verwandte Wespe, *Diplolepis Bedeguari* *Fabr.* *s. obscura N. ab Esenbeck*, ihre Eier, deren Larven wieder auf Kosten jener als Schmauscher leben.

C. Brandtii *Ratzeburg* (ib.) unterscheidet sich dadurch, daß beide Geschlechter ganz schwarz sind. Beide sind nur einige Linten lang.

## 2. Die Galläpfel-Wespe.

### *Cynips quercus tinctoriae.*

Glänzend gelblichbraun, mit schwärzlichbraunem Bauche.

Brandt und Raheb. I. c. Fig. 14—15.

Auch nur zwei bis drei Linten lang. Lebt zumal in Kleinasien bis Bagdad einerseits, anderseits bis in die europäische Türkei und Istrien herüber, und verursacht die weltbekannten, mit Knoten besetzten Galläpfel, deren beste, härteste Sorten deshalb levantische heißen. Indes scheint diese Wespe auch, entweder an anderen Eichenarten, oder an anderen Stellen der gemeinen, auch andere, meist für schlechter anerkannte Galläpfel zu erzeugen, wie denn überhaupt deren Sammlung, als wichtiger Handelsartikel, in jenen Ländern als eine jährliche Ernte, deren Güte man schätzt, behandelt wird. So sollen selbst die in großen Massen ausgeführten Knöpfern, welches durch solche Inselstielchen monströs ausgewachsene Näpfchen oder Kelche von Eicheln sind, nach Hayne auch von dieser Gattung stammen, was ich jedoch bezweifeln möchte, die, welche ich besitze, sind an Quercus Carris gestochen. Ueberhaupt ist dieser Gegenstand noch nicht hinlänglich aufgeheftet, in so fern man noch nicht genug beobachtet hat, ob ein und dieselbe Spezies mehrere Eichenarten und mehrere Stellen derselben benutzt, oder umgekehrt verschiedene Spezies ein und denselben Baum.

### 3. Die deutsche Gallwespe.

#### *Cynips Quercus folii.*

Braungelb mit glänzend schwarzem Bauch, der Rücken gestrichelt, die Beine rothgrau.

Panzer Fauna 88, Taf. 14.

Erzeugt die großen runden Galläpfel an der Unterseite der Eichenblätter.

Eine verwandte (*C. Quercus inferus*) wird von Panzer (l. c. T. 12) als ganz schwarz unterschieden und soll gleichfalls die runden schwammigen, frisch roth ausschenden Gallen erzeugen.

Wieder eine andere (*C. psenes*) sicht die Feigen an, welche durch diesen Reiz größer und süßer schmeckend werden.

---

#### Achte Familie.

### H o l z w e s p e n.

#### (*Urocerata, Uroceridae.*)

Der Bauch ungestielt, flach, gleichbreit, mit hervorstehender Legesäge, in Scheiden verborgen.

Das Weibchen sägt ein Loch in alte Bäume, um seine Eier abzusetzen, welche zu sechsfüßigen Maden erwachsen. Sie nähren sich von Holz, nach Art vieler Käferlarven.

### XXXVIII. H o l z w e s p e n.

#### S i r e x.

Die Fühler fadenförmig, vielgliederig. Die Kiefertaster klein, die Lippentaster länger, behaart. Der erste Brustring vorn abgestutzt.

#### 1. Die große Holzwespe.

##### *Sirex gigas L.*

Schwarz, der Bauch vorn und hinten, Flecken auf dem Rücken, Augen und Beine dunkelgelb.

Panzer l. c. LII, 15. — Rösel II, 8, 9.

An zwei Zoll lang. Häufig in Nadelwäldern, von wo sie auch mit dem Holz in unsere Nähe kommt, und sich durch ihr Schnurren bemerklich macht, aber nicht sieht.

Das Weibchen bohrt für jedes Ei, das sie legt, mit ihrem Stachel ein Loch in die Borke der Fichtenstämme. Sieben Wochen nach dem Eierlegen ist sie vollkommen, und gräbt sich dann sechs Zoll tief in das Holz ein, um sich zu verpuppen.

## 2. Die schwarze Holzwespe.

*Sirex spectrum.*

Schwarz, die Brust haarig, mit gelbem Strich vor den Flügeln, der Schwanz so lang als der Körper.

Panzer I. c. 16.

Im faulen Holz. S. juvencus, etwas kleiner und mit kurzen Schwanz, hat keine gelben Striche.

---

## Neunte Familie.

B l a t t w e s p e n.

(*Tenthredina*, *Tenthredineta*, *Securifera*,  
*Phytophaga*.)

Der Bauch ist breit, an das Bruststück angewachsen, hinten mit einer wenig sichtbaren, sägeartig gezähnten doppelten Legesäge versehen, welche in einer doppelten Scheide versteckt ist. Der Kopf ist kurz, quergehend, die Fühler zwischen den Augen angeheftet, die Kinnbacken stark, die Unterlippe dreithellig.

Es sind träge, fliegenartige Thiere, deren Flügel wie verdrückt erscheinen. Die Weibchen bohren mit ihrer schelfförmigen krummen, gezähnten Säge, deren Zähne oft wieder gezahnt sind, Löcher in Zweige oder andere Pflanzenteile, sägen ihre Eier hinein, und dann einen klebrigen Schaum dazu. Diese Eierlöcher schwellen an, und gewinnen selbst bei einigen die Gestalt kleiner, weicher krautiger Galläpfel. Bei den meisten Arten treten die

Larven frei heraus, haben achtzehn bis zweihundzwanzig Füße, einen glatten hornigen Kopf, und zehren wie Raupen von den Blättern. Sie unterscheiden sich aber doch schon durch jene Charaktere, so wie ihr übriges mehr wurmartiges Ansehen von den ächten Raupen, auch fressen sie das Laub auf andere Weise an; gewöhnlich verwüsten sie es stark. Mehrere rollen sich auch spiral, oder strecken den Hintertheil empor. Zur Verwandlung begeben sich die meisten in die Erde, andere spinnen sich eine papierene Hülle im Freien. Da mehrere dieser Raupenarten überwintern gesellig in einem gemeinschaftlichen Gespinnste.

### XXXIX. Cimbex.

Dick mit dickem Bauch; die Fühler keulensförmig.

#### 1. *Cimbex variabilis* Kl.

*Cimbex lutea, femorata* etc.

Groß, schwarz und braun, der Bauch bisweilen roth oder gelb, die Fühler am Ende keulensförmig, gelb; die Hinterschenkel des Männchen dick.

Panzer I. c. Fig. 14. — Degeer II, Taf. 33, 34. — Rösel II, 43.

Eine der größten hiesändischen Gattungen. Variirt sehr in der Farbe; die Bauchringe haben oft violetten Einfass. In Wäldern.

Die Larve lebt an der Birke, Weide u. s. w. und ist gelb oder dunkelgrün, blaugestreift u. s. w. Sie bleibt zwei Winter hindurch in dem Gespinnst, ehe sie sich zur Puppe umwandelt.

#### 2. *Cimbex Amerinae*.

Schwarz, der Bauch unten und am After aschgrau behaart, die Flügel braun, der Kopf dick mit großen Augen.

Panzer LXV, 1. — Rösel II, Taf. 1, 2.

So groß wie eine Biene. Die Larve lebt auf aller Art von Weiden, ist glatt, grün, und hat eine schwarze Rückenlinie.

## XL. *Hylotoma*.

Die Fühler dreigliederig, mit langem, nach der Spitze hin verdicktem Endgliede. Der Bauch eiförmig, dick.

### 1. *Hylotoma enodis*.

*Tenthredo violacea* L.

Schwarzblau, mit kleinem Kopf. Die Flügel ebenso.

Panzer I. c. 13. — Degeer II, 40, 6.

Im Frühjahr, häufig auf Weiden.

*Hylotoma ustulata* unterscheidet sich dadurch, daß die Enden der Flügel rauchbraun sind.

### 2. *Hylotoma rosae*.

Rothgelb, Kopf und Rücken und der äußere Flügelrand schwarz.

Panzer I. c. 15.

Die Larve häufig auf wilden Rosen. Die reife Fliege, wie die vorige, sehr träge.

## XLI. *Pteronus*.

*Lophyrus Latr.*

Die Fühler sind vielgliederig gesägt, beim Männchen doppelt kammförmig. Der Körper dick und gedrungen.

Die Fichtenblattwespe.

*Pteronus pini* Jur.

*Lophyrus pini* Latr. *Tenthredo pini* L. T. dorsata.

Das Männchen schwarz mit dunklen Flügeln, gelben Beinen und federartig-kammförmigen Fühlern; — das Weibchen an Brust und Bauch hell gefleckt, oft ganz blaßgelb mit braunen Flecken. Die Fühler einfach.

Panzer LXXXVII, 17 und CXIX, 5. — Degeer II, Taf. 36, Fig. 1—20.

Die Larve, von den Förstern Asterraupe genannt, verwüstet zu Zeiten die Kiesewälder, indem sie gesellig lebt. Sie

ist gelblichweiss mit grünen Streifen. Die so zierlich gebaute Säge, mit welcher die Wespe ihre Eier einbohrt, ist mehrmals, und zumal genau von Réaumur beschrieben und abgebildet worden.

Dieses Insekt erscheint Mitte Mai, und legt in jede Rotefernadel 15—20 Eier, zusammen aber an Hundert. Die Larven fressen dann die Nadeln bis zum Oktober.

### XLII. Tenthredo.

Die Fühler meist fadenförmig, 9—11gliederig. Der Leib schmal.

#### 1. Tenthredo viridis.

Allantus viridis *Klug.*

Gelbgrün, obenher schwarz, grün gescheckt; die Fühler längter als Kopf und Brust.

Panzer CXV, 19, 20.

Im Sommer auf Doldengewächsen; die gewöhnlich für *T. viridis* genommene Art, *T. scalaris Klug*, hat einen braunen Rücken bei grünem Bauch.

#### 2. Tenthredo atra *F.*

Schwarz, mit rothen Füßen; die Fühler siebengliederig.

Panzer I. c. 7.

Häufig in Gärten.

---

## S e i t e   O r d n u n g.

### Käfer.

Unter allen Insektenordnungen die am meisten bearbeitete und in sofern am besten bekannte, in welcher Hinsicht ihr nur noch die Schmetterlinge nahe stehen.

Die Käfer verdanken diesen Vorzug ohnstreitig ihrer Beschaffenheit. Sie sind so zahlreich, daß Latreille schon vor Jahren die Menge der bereits bekannten auf 30,000 anschlug, jetzt aber bis auf 60,000, so daß für ihre Kenntnis allein ein Mensch kaum ausreicht\*), — sind in der Regel nicht so flüchtig wie die der anderen Ordnungen, daher leichter zu fangen; fast nie verwundend oder mit Ekel anzufassen, lassen sich bequem aufbewahren und nehmen sich aufgestellt gut aus — ja es läßt sich auch nicht verkennen, daß sie im Urschen etwas Kräftiges haben, was zu ihnen einlädet, daher wohl auch überhaupt ihr Studium die Männer mehr anzieht, und man selbst unter dem Stande der höheren Miliärs ausgezeichnete Coleopterologen findet.

Überall lassen sich Käfer sammeln, selbst im Winter unter Baumrinden, Moos und Steinen. Mit dem ersten Frühling zeigen sie sich auf der Erde, in den Lüften, im Wasser, unter der Erde, aber immer mehr einzeln und nie in solchen Schwärmen wie bei den anderen Insektenordnungen vorkommen\*\*). Denn die Millionen Maikäfer, die oft zahlreichen Raubkäfer unserer Bibliotheken und Herbarien, die Speckkäfer im Pelzwerk und die Kornwürmer der Speicher oder die Erdflöhe sind doch im Grunde nur in Folge der Kultur dieser Vorräthe oder Nahrungspflanzen so weit vermehrt.

Sie verschmähen fast keine Dertlichkeit. In Blumen, auf Blättern, an Stämmen, zumal aber in mulmigem Holze und unter der Rinde, an den Wurzeln, in Pilzen, Schilfstengeln und Erdlöchern; im Moose, unter altem Laub, Steinen, dem Dünger, dem As, an Flussufern, in den Teichen und selbst unter Meerwasser\*\*\*) finden sich welche. Zu Anfang des Frühjahrs machen die Raub-, Mist- und Rastkäfer die Mehrzahl aus; mit zunehmendem Sommer stellen sich die Blumen-, Blatt- und Holzkäfer häufiger

\* ) Der Generalleutnant Graf Déjean besitzt blos vom ehemaligen Linné'schen Geschlechte *Carabus* über drittehundert Spezies.

\*\*) Nur einige kleine Staphylini und Carabi, die im Dünger leben, erscheinen auf diese Weise, höchstens noch der Borkenkäfer.

\*\*\*) *Bleabus fulvescens*. Er sitzt unter Steinen am Gestade, das während der Ebbe trocken liegt, während der Fluth aber vom Meere bedeckt wird. (Zuerst von Ström als *Cicindelamarina* beschrieben, neuerlich von Audouin wieder aufgefunden.)

ein; mit dem Hochsommer erscheinen mehr Bock- und Bohrkäfer, endlich die nussfressenden Rüsselläfer, welche auch dadurch sich als die letzten und vollendetsten zu erkennen geben. Im Oktober sind fast alle Käfer wieder verschwunden.

Ihre geographische Verbreitung ist ebenso charakteristisch, und hier gibt es noch ein weites Feld zu bearbeiten, denn bis jetzt sind nur einzelne Beiträge geliefert und noch nicht vollständig zusammengestellt. Nicht allein findet man, so wie man Sands-, Kalk- und Thonboden-Pflanzen unterscheiden kann, auch Käfer diesen Lokalitäten besonders eigen, und seltener daselbst vermisst, — was jedoch der ihnen dort vorzufindenden Nahrung zugeschrieben werden könnte — sondern sie haben auch, was mehr sagt, eine charakteristische, mit diesen Gebieten zusammenhängende Phystognomie. Waldinsekten unterscheiden sich schon von den verwandten Arten der Felder und Ebenen, sie sind meist größer, kräftiger gefärbt und gestaltet, kurz, auch hier ein Wild gegen das zahme Thier; die Alpen zeigen andere Käfer als die Tiefen\*). Nach Heer sind die meisten der obersten Alpenregion ungeflügelt, und die Farbe vieler modifizirt sich mit der Höhe: namentlich geht dann der metallische Glanz in dunkelblau und schwarz über. In Bezug auf die Längen- und Breitengrade oder die Welttheile überhaupt bemerkt man in den verschiedenen Ländern die Stellvertreter anderer und in der heißen oder tropischen Zone die Colosse gegen die kleinen ihnen entsprechenden hiesändischen, denn unser *Chlorimus viridis* ist ganz der brasilische Juwelenkäfer im kleinen, so wie die Goliath und Herkules die Riesen unserer Mistkäfer sind.

Wenn aber die vollendeten Käfer größtentheils zu Tage vorkommen (denn einzelne animalia nocturna gibt es auch hier, wie unter allen Thieren), so thun es desto seltener ihre Larven, wie denn die Zustände dieser bei gar vielen immer noch unbekannt sind\*\*). Es ist dieses ein Beweis für die hohe Stellung

\*) Sehr interessante Beobachtungen, hierüber hat Dr. Oswald Heer (Über die geographische Verbreitung der Käfer der Schweizeralpen) in seinen und Fröbel's Mittheilungen der th. Erdkunde. Heft 1—2 mitgetheilt.

\*\*) Nachdem was die älteren, namentlich Réaumur, De Geer und Rösel hierüber bekannt gemacht haben, sind aus neuester Zeit Beigt. Geologie. Bd. IV.

dieser und der vorhergehenden Ordnung im System, denn je vollkommener, d. h. früher vollendet die erstere Lebenszustände eines organischen Geschöpfes sind, desto tiefer steht es in der Reihe der Wesen und umgekehrt. Die Larven der Hymenopteren leben meist ganz eingeschlossen, die der Käfer leben großenthells tief in der Erde oder im Holze u. dgl., die der folgenden Insektenordnungen kommen schon mehr zu Tage, bis endlich bei den Heuschrecken und Wanzen gar kein Unterschied der Lebensweise der verschiedenen Stände mehr wahrgenommen wird.

Bei den Larven der Käfer gibt es indes verschiedene Grade. Schon Kirby hat ihre Gestalten mit der der niederen Gliedertiere, indes doch nur mit Hülfe der Phantasie, verglichen, und wurmförmige, aßelförmige, Krebsförmige u. c. unterschieden.

Das Richtige an der Sache ist, daß allerdings einige Käferlarven ohne alle Füße zeigen, die deshalb den Würmern ähnlich genannt werden können; andere ganz kurze, noch andere längere, wahre Lauffüße haben, und daß die der Wasserkäfer große Beißzangen entwickeln. Letztere sind indes nur sehr unechtlich deshalb den Krebsen vergleichbar (die gar keine Beißzangen haben), so wie die platten, mit Zackig an den Seiten ausgehenden Leibesringen, wohl einige Ähnlichkeit mit einer Aassel zeigen, aber doch nur etwa so viel wie ein Aal mit einer Schlange. Die Käferlarven haben sämmtlich einen runden, hornigen, meist braunen Kopf mit Augen und Fühlern, große Kinnbacken zum Zernagen, und, mit Ausnahme der fußlosen, stets sechs Füße. Bei den Bock- und Springkäfern (*Cerambyx*, *Elater* u. dgl.) sind diese kurz und kegelförmig, bei anderen, wie dem Engerling des Maikäfer's, schon zum Kriechen geschickt, endlich bei den übrigen (*Silpha*, *Coccinella*), wirklich zum Laufen auf der Erde und an Pflanzen eingerichtet. Auch nur diese sind gefärbt.

Die Maiwürmer (*Meloe*) und einige andere Käfer haben parasitische Larven; wenn sie im Grase aus dem Ei geschlüpft

find, hängen sie sich an Wespen und Bienen und leben dann mit ihnen in deren Nestern, auf Kosten der Larven derselben, bis zur Verwandlung.

Die Nymphe der Käfer liegt unbeweglich, zeigt aber schon alle ihre nachmaligen Theile, nur mumienartig zusammengefaltet. Sie ist wohl stets vor dem Tageslichte verborgen, und bisweilen in einer gesponnenen oder ausgearbeiteten Höhle ruhend.

Das Leben im Larvenzustande dauert oft mehrere Jahre, und selbst von den Nymphen hat man das Beispiel einer fast zwanzigjährigen ungestörten Lebensruhe. (So die einer *Buprestis splendida*, welche zwanzig Jahre lebend im Holze eines Schreibtisches verweilte.)

Der vollendete Käfer ist in der Regel hart, und zeigt einen vollständigen Apparat aller äußeren Organe. Man unterscheidet stets Kopf, Brust und Bauch an ihm, doch sind diese schon nicht so zart von einander durch Stiele gesondert wie bei den Vögeln, sondern stoßen meist in ihrer ganzen Breite aneinander oder schieben sich in einander hinein. Der Bauch ist eigentlich der weichste Theil, zumal oberhalb, wo er von den Flügeln bedeckt ist. Dieser sind vier, an den ersten Brustring angefügt. Die unteren sind hautig, wie mit einem Gelenk quer eingeschlagen, und unter den oberen, den steifen Flügeldecken (*elytris*) verborgen. Diese Flügeldecken, stoßen in der Mitte durch eine Längsnah. genau zusammen und sind oft, z. B. bei vielen Rüsselkäfern, so hart, daß sie kaum mit einer Nadel durchstochen werden können. Die Brust oder das Bruststück (*thorax*), besteht, wie bekannt, aus drei Leibesringen, der Hinterbrust *metathorax*, der Mittelbrust *mesothorax* und der Vorbrust *prothorax*. Die beiden ersten, oder hintersten Brustringe, liegen unterhalb der Flügeldecken und erscheinen wie mit dem Bauche ein Ganzes bildend; sie tragen das zweite und dritte Fußpaar. Der mesothorax bildet nach oben einen kleinen Keil, der zwischen der Vereinigung der Flügeldecken an deren Basis sichtbar ist, und das Schildchen (*scutellum*) genannt wird.

Es ist herkömmlich, nur den ersten Brustring, die Vorbrust, Thorax (Hals oder Brustschild, auch Rücken) zu nennen. Er ist hart, oft noch härter als die Flügeldecken, frei am zweiten beweglich, und trägt unten das erste Fußpaar. Manchmal

hat er vorn oder an den Seiten Dornen, Spiken oder andere Verlängerungen.

Die Füße der Käfer bestehen aus der vollständigen Zahl ihrer Theile, wie sie bereits in der Einleitung angegeben worden sind. Die Schenkel sind stark, und manche Käfer haben große Kraft in ihnen. Die Schienbeine sind oft bedornt oder unten 'in scharse Spiken endigend; der tarsus oder Fuß besteht aus mehreren Fußblättern, und endigt in ein Glied mit doppelterem Haken, daher auch die Käfer oft sehr fest an Baumrin- den u. dgl. haften.

Bisher nahm man als ausgemacht an, daß die Käfer theils fünf Fußblätter an allen Füßen besäßen, Pentamera; theils nur an den vorderen fünf, an den übrigen vier: heteromera; theils an allen nur vier: tetramera; ja nur drei an allen Füßen: trimera, und wohl noch weniger. Letzteres wurde bald als Irrthum eingesehen; allmälig findet sich aber bei genauer Untersuchung, daß auch die vorgenannten größtentheils pentamerisch sind, indem die ersten Glieder nur in der Schienbeinhöhle verborgen stecken, oder sich verkümmert zeigen.

Wenn nun in Folge dieser Entdeckung jene Bezeichnung allerdings nicht mehr als Eintheilungsprincip in der Art, wie sie Latreille hierzu benutzt hat, angewandt werden kann, so ist doch nicht zu übersehen, daß für den äuferen Anblick dieser Unterschied noch immer sichtbar, folglich benutzbar bleibt, ebenso wie man auch im Pflanzenreiche mitunter vorzieht, verwachsene Vielzahl für Einzahl zu nehmen. Aus der erwähnten Untersuchung ist aber der wichtige Vortheil hervorgegangen, daß man nun nicht mehr genöthiget ist, naturgemäß zusammengehörende Käfer weit von einander zu ordnen.

Im Einzelnen sind die Fußblätter nach der besonderen Gesetzmässigkeit modifizirt. So haben manche Rüsselkäfer sehr breite, bei vielen Bockkäfern sind sie mit Pinseln und Bürstchen versehen; bei den Mistkäfern (Hister etc.) oft an den Vorderfüßen so klein, daß sie zu fehlen scheinen; bei den Wasserläfern dagegen oft groß, gewimpert, und zum Schwimmen zu brauchen. Einige Käfer können springen, andere graben, noch andere mit den Füßen Kugeln drehen u. s. w.

Merkwürdig, daß man mehrmals Käfer gefunden hat, die

an einem, zumal dem Hintersufse, noch einen zweiten und dritten, vollständig ausgebildeten zeigen. In keiner der darüber handelnden Betrachtungen, die mir bekannt geworden, habe ich eine mir genügende Erklärung dieser Erscheinung gefunden. Ich suche dieser Exuberanz in der, jedem Bauchringe insliegenden Fähigkeit, ein eigenes Fußpaar zu bilden, so daß ein normal steriler Leibesring der Larve, nun eines mehr entwickelt hat, was durch die Metamorphose zum vollkommenen Insekt mit hinüber gegangen ist\*).

Der Kopf zeigt ein Stirnschild (clypeus), und zwei, nicht sehr große Augen, aber wohl keine wahre Punktaugen. Neben jenen sind die Fühler eingefügt, die bei den Käfern am mannigfachsten und ausgezeichnetesten gebildet sind. Die Zahl ihrer Glieder variiert, meist sind es elf. Sie sind sehr wichtig zur Bestimmung. Die Fresswerkzeuge sind vollkommene Beißorgane. Sie bestehen aus einer Ober- und Unterlippe, starken, zum Zerbeißen dienenden Kinnbacken, und schwächeren, mehr hautigen Kinnlappen darunter, und an diesen letzteren ein bis zwei Paar kleine gegliederte Taster. Manchmal befindet sich noch ein drittes Paar derselben an der Unterlippe. Auch tritt bisweilen noch eine Zunge hervor. Die Terminologie dieser Kopftheile ist neuerlich bis ins Unendliche vervielfältigt worden.

Manche Käfer zeigen einen schönen Metallglanz, andere Haare. Schüppchen u. s. w. Mehrere haben einen eigenthümlichen Geruch, aber wohl gar eine freie Saftsekretion.

Da nun die bildende Natur stets auf Individualität hinarbeitet, so tragen ihre vollkommenen Geschöpfe auch stets diesen Charakter. Vor vielen die Coleopteren. Sie sind physiognomisch so scharf gezeichnet, daß man bei einiger Übung die Hauptgenera auf den ersten Blick erkennen, und auch die Gruppen, wie schon in der Einleitung erwähnt, mit den Ordnungen

\* ) Hr. Senator von Heyden in Frankfurt a. M. besitzt einen *Prionus* aus Paraguay, mit einem solchen überzähligen Schenkel; eine *Meloe proscarabaeus*, an welcher der rechte Hinterschenkel drei Tibien trägt; eine *Rutela* mit drei Hinterschenkeln hat neuerlich Hr. M. Spinola beschrieben. So kennt man auch Fälle vom Maikäfer u. s. w.

der höheren Thiere gewissermaßen paralleliren kann. Es verdienen diese höchsten Bezüge um so mehr festgehalten zu werden, als man bei der jetzt außerordentlich großen Spaltung der *Linné'schen* und *Fabricius'schen* Geschlechter in mehrere, in Gefahr gerath, allen Überblick zu verlieren\*), und wer sich nicht ganz speziell mit diesem Zweige beschäftigt, thut besser, sich zuerst nur an die allgemeinere Nomenklatur zu halten; auch ist, obwohl die Unterscheidungscharaktere sicher sind, ihre Untersuchung, zumal was die der Mundtheile der kleineren betrifft, doch für den Anfänger sehr schwierig, da selbst der Geübtere hierzu der Zerlegung an lebenden Individuen und der Hülfe des Mikroskopes bedarf.

Die Zahl der Käferarten ist schon für Deutschland sehr ansehnlich, man schlägt die Gesammtsumme derselben auf 14,000 an\*\*).

Ihre naturgemäße, nämlich physiologisch begründete Anordnung zu einem System ist schwerer als bei der vorigen Ordnung. Hier gab eine ausgezeichnete geistige Thätigkeit einen bequemen Maßstab: bei den Käfern dagegen findet sich fast keine Spur einer solchen, denn die Anstelligkeit einiger wenigen ist gegen das Ganze nur unbedeutend.

Man muß sich daher zu anderen Berücksichtigungen wenden. Nach dem oben ausgesprochenen Gesetz, daß, je entwickelter schon der Larvenzustand eines Insektes, desto tiefer es im reifen stehe und umgekehrt, müssen diejenigen Käfer, deren Larven schon sehr ausgebildet sind, niedriger erscheinen als die, wo letzteres nicht der Fall ist\*\*\*). Nun zeigen sich unter allen die Larven

\* ) Audinet-Serville hat neuerlich die Familie der Cerambiciden (*nouvelle classification des Longicornes — Annales de la Soc. ent. T. IV*) oder des *Linné'schen* Geschlechts *Cerambyx* in nicht weniger als zweihundertundzehn Genera zerpalten!

\*\*) In dem Kataloge des Grafen Dójeau sind 20,000 Species seiner Sammlung verzeichnet.

\*\*\*) Die Sucht der Käfer aus Larven ist in dieser Hinsicht interessant, und auch nicht unergiebig. Man sammelt sie in angegriffenen Bäumen der Wälder und füttert sie mit ihrem eigenen Holze (d. h. dem, worin man sie gefunden), weil sie das gleiche mancher, z. B. schwammhaltiger Stämme vermeiden und davon zu Grunde gehen. Nur einige, wie *Rhagium*, leben unter verschiedenen Baumrinden. Man darf auch nicht zu viele Larven in

der Rüsselkäfer als die unformlichsten, oft ganz fußlosen Maden, wie wahre Würmer, und durchlaufen in erstaunlicher Schnelligkeit die Metamorphose bis zu den harten, zierlich gestalteten reifen Zuständen. An sie grenzen in dieser Hinsicht die Borkenkäfer und die Bockkäfer; diese so wie die Rüsselkäfer, zeigen als Käfer ein deutliches, senkrecht herabgehendes Gesicht (facies) (wie die Wespen *sc.*), und bekräftigen, daß die höchsten Thiere in jeder Klasse eine etwas menschenähnliche Physiognomie annehmen; ja bei den Rüsselkäfern entsteht noch ein Schnabel, eine wahre Nase.

Betrachten wir ferner den wesentlichen Charakter eines Käfers, so liegt er offenbar in der äußeren Härte, der Starrheit seiner Haut, die wie die des Krebses fast an Verknöcherung reicht: so werden dann die härtesten Käfer die vollkommensten, die weichsten die unvollkommensten seyn müssen. Die spanische Fliege dürfte nur noch durchsichtige Flügeldecken haben, und man würde sie gar nicht mehr für einen Käfer halten mögen. Endlich spricht auch noch der gewölbte Bau für die höhere Stellung, während die platten Laufkäfer schon etwas Schabenartiges verrathen. Alles dieses bestimmt mir die Klassifikation.

In Rücksicht der Nahrungsweise zeigt sich in den verwandten Gruppen keine so auffallende Uebereinstimmung, wie bei anderen Ordnungen. Ja es scheint sogar, als wenn einige größere Geschlechter — z. B. *Scarabaeus Linn.* — recht eigentlich alle Mannigfaltigkeit der Lebensart an sich darstellen wollten. Denn einige unter ihnen leben im Mist, andere im faulen Holz, wieder andere als Larve in der Erde, als Käfer auf Laub, noch andere als Larve in Ameisenhaufen und reif auf Blumen u. s. w.

Wollte man aber auch hierin Geschmägigkeit aufsuchen, so könnte man behaupten, daß die eigentliche Nahrung der Käfer, wie die der Schmetterlinge, die vegetabilische sey, da sie der bei weitem größten Mehrzahl zukommt. Und wenn man nun schon anderwärts Beispiele hat, wo Thiere selbst im freien Naturzustande

---

einem Behältnisse zusammen erziehen. Sämtliche Larven von *Cerambyx*, *Leptura*, *Cucujus*, *Pyrochroa*, *Clerus*, *Helops*, *Elater* etc. sind Räuber ihrer eigenen Art, dagegen die von *Buprestis*, *Meleandrya*, *Bostrichus* und *Lymexylou* friedliebend sind. Bemerkenswerth ist auch, daß man durch Larvenzucht gerade die seltensten, und fast nie die gewöhnlich vorkommenden Arten erhält.

sch nach der Lokalität gefügt und eine andere Nahrungsweise angenommen haben \*), so hat es nichts Verwunderliches, so etwas auch bei Insekten zu vermuthen. Es scheint überhaupt ein Irrthum, der sich von den französischen Naturforschern herschreibt, die Raubthiere \*\*) überall als die ersten anzuschreiben, wie wenn man auch beim Menschen eine solche Ernährungsart für die primitive halten wollte.

Findet sich im Gegentheil, daß die gesammte Insektenwelt überhaupt nicht ohne Pflanzenwelt denkbar ist, und betrachtet man als das höchste Ziel des vegetabilischen Lebensprozesses die Holzbildung \*\*\*), so wird man die auf Holz und Nussfrüchte angewiesenen Käfer wiederum als die obersten, die Raubkäfer und Weichläfer mit parasitischen Larven als die untersten anzusehen haben.

Man kann daher die Käfer in folgende zehn Familien bringen:

### I. Harte, kräftige, still sijende.

Sie sind zum Theil groß, von kräftigem Bau, und meist auf Bäumen zu finden. Ihre Fußblätter sind breit, die Fühler ausgezeichnet. Ihre Larven sind meist ganz füglos, weich, und leben im Inneren der Bäume oder der grasartigen Gewächse, deren Mark oder Holz sie verzehren.

### Erste Familie. Rüsselkäfer. Rhynchophora.

Ihr Kopf ist mehr oder minder in einen Rüssel verlängert, an dessen Ende die Beißwerkzeuge, und in dessen Mitte die Fühler sijen, deren erstes Glied sehr lang ist. Brust und Bauch sind gewölbt, oft fugelig. Die Füße sind stark. Vier Tarsenglieder mit Spur eines fünften. Das dritte meist zweilappig.

\*) Vergl. die Lebensart der Nashornvögel II. B., S. 168.

\*\*) Schon der berühmte Chateaubriant bemerkt, daß, als er nach beendigter Revolution nach Frankreich zurückgekehrt sei und das Museum der N.G. besucht habe, ihm zuerst nichts als Krallen, Schnäbel und Zähne von reißenden Bestien entgegen getreten seyen. Die Franzosen schienen unter Bonaparte diesen Thierordnungen eine besondere Vorliebe bezeigten zu wollen.

\*\*\*) S. mein System der Botanik 2. Aufl., S. 46.

Ihre Haut und Flügeldecken sind sehr hart. Sie sind träge, schwerfällig. Mehrere sind mit glänzenden Schüppchen wie die Schmetterlinge bedeckt. Sie fliegen fast nie.

Ihre Larven sind entweder ganz fußlos, oder nur mit kurzen Fußwärzchen versehen, und leben größtentheils im Holz oder harten Früchten, die sie bei der Verwandlung durchbohren. Für ihre Puppe spinnen sie eine Hülse. Curelio, Bruchus etc.

### Zweite Familie. Holzkäfer. *Xylophaga*.

Ihr Kopf ist klein und in das größere Bruststück zurückgezogen. Die Fühler sind kurz, nach dem Ende hin dicker, keulenförmig oder durchblättert, der Bauch meist cylindrisch. Bier Fußblätter deutlich.

Es sind sämmtlich kleine harte Käfer, die durch ihre Menge den Wäldern sehr gefährlich werden.

Ihre Larven sind fußlos und leben zumal in den Stämmen der Nadelhäume, die sie durchbohren und dadurch tödten. Einige leben in Hölzpilzen. Bostrichus, Cis etc.

### Dritte Familie. Bockkäfer. *Longicornia*.

Ihr Kopf steht senkrecht herab und zeigt ein wespennartiges Gesicht. Die Fühler sind sehr lang, schön gebogen, und knotig. Die Augen nierenförmig. Das Bruststück ist so breit als lang. Der Leib lang, flach gedrückt, auch bisweilen cylindrisch, unterhalb stark gewölbt. Die Beine sind ziemlich lang, das dritte Tarsenglied zweilappig. Die Welschen haben eine Legeröhre am After.

Es sind oft große, auffallend aber angenehm gebildete Käfer, selten von schöner Färbung. Ihr Kopf mit den schnurrenartigen Fühlern gibt ihnen ein bockähnliches Ansehen. Die meisten geben durch Reiben des Kopfes an das Bruststück einen quäkenden Laut. Sie sind träge, sitzen meist still und haften fest, und zeichnen sich durch ihre breiten viergliederigen Tarsen aus.

Ihre Larven leben fast alle im Innern der Bäume, unter deren Rinde oder im Holze, sind entweder ganz fußlos oder nur mit kurzen Füßchen versehen, weich, nach dem Kopf hin dicker, und unsymmetrisch. Sie bohren tiefe Gänge in das Holz. Einige verzehren Wurzeln. Cerambyx, Rhagium etc.

## II. Harte, glänzende, meist auf Gesträuch sijende Käfer.

Auch sie sind zum Theil noch stark und kräftig gebaut, einige schon schlanker, viele mit langgestrecktem Leibe. Ihre Fühler sind von gleicher Dicke. Die Larven leben gleichfalls von trockenen vegetabilischen Theilen.

### Vierte Familie. Prachtkäfer. Sternoxi.

Ihr Kopf geht senkrecht herab und steckt im Bruststücke. Die Fühler sind gleichförmig, theils fadensförmig, theils sägeartig. Der Leib ist lang, die Flügeldecken schmal.

Viele sind prächtig metallisch gefärbt, oder haben wohl gar leuchtende Flecke. Bei der Berührung stellen sie sich leblos und lassen sich herabfallen. Man findet sie auf Gesträuch, an Blättern; einige noch am Holz.

Ihre Larven sind auch noch zum Theil füßlos, mehrere aber haben sechs Füße. Einige leben im Holze, in welches sie Gänge bohren; andere in den Halmen der Gräser oder an deren Wurzeln. Buprestis, Elater etc.

### Fünfte Familie. Kugelkäfer. Cyclica.

Zeigen sich oberhalb meist halbkugelig, so daß das Bruststück nicht von den Flügeldecken abgesetzt erscheint. Der Kopf steckt im ersten. Die Fühler sind schnurförmig, die drei ersten der vier Tarsenglieder schwammig, unten gepolstert. Auch sie stellen sich bei der Berührung leblos.

Es sind mehr kleine, an Pflanzen lebende träge Käfer, oft von prächtigem Glas- und Metallglanz, und ohne alle Haare.

Ihre Larven haben sechs Füße, sind weich und gefärbt, mit einem klebrigen Schleim überzogen, und leben frei an Pflanzen. Manche bauen sich Röhren, oder leben im Innern der Blätter.

Cassida, Chrysomela, Cryptocephalus, Altica.

### Sechste Familie. Schattenkäfer. Melasomata.

Theils rundlich, theils, und zwar die meisten, von länglicher Gestalt. Der eisförmige Kopf versieckt sich in das Brustschild.

Die Flügeldecken sind mäßig hart; die Füße nur mit einer Kralle endigend, und am hintersten Fußpaar nur mit Tarsengliedern.

Es sind theils nächtliche und dann dunkel gefärbte, flache Käfer, theils leben sie auf Blumen und haben dann bunte Flügeldecken.

Die Larven derer, die man kennt, haben sechs Füße und nähren sich von trockenen Vegetabilien.

*Pyrochroa, Tenebrio, Anisotoma.*

III. Harte, kräftige, an der Erde in Mulf, Roth oder Yas umherwühlende.

Siebente Familie. Rindkäfer. Lamellicornia.

Ihre kurzen Fühler stehen in einer tiefen Grube, und endigen in eine blätterige oder fächerförmige Keule.

Ihr Körper ist eiförmig, plump, dick, mit großem, gewölbtem Brustschild, oft breiter als der Leib. Die vorderen Schienbeine sind außen gezahnt. Die Männchen sind vor den Weibchen durch größere Entwicklung einiger Brust- und Kopftheile ausgezeichnet.

Unter ihnen kommen zum Theil große, ja die größten Käfer vor. Sie sind stark, schwerfällig und unbeholfen, doch nicht ohne Industrie; zumal Abends mit Geschnurr umherfliegend.

Mehrere leben im Miste der wiederfăuenden Thiere und der Pferde, diese sind in der Regel dunkel gefärbt; andere auf Bäumen an Blättern und Blumen, und diese sind bunter. Einige sind metallischglänzend.

Ihre Larven sind wurmförmig, weich und gefästet, mit hartem, glänzendem Kopf, und sechs Beinen. Sie liegen krumm und können nicht gestreckt laufen. Mehrere verwandeln sich erst nach Jahren in eine, in einer rohen Puppenhülse liegende Nymphe. *Geotrupes, Scarabaeus, Melolontha, Lucanus.*

Achte Familie. Maaskäfer. Clavicornia.

Ihre Fühler sind gegen das Ende hin dicker, und keulenförmig. Der Kopf ist im Brustschild versteckt. Der Körper ist verschiedentlich geästet und lässt mehrere Gruppen unterscheiden. Bei den einen ist er stark, fast vierseitig, oben flach,

in das Brustschild übergehend. Die Füße ziehen sich an den Leib, die Schienbeine sind gezähnt, die Fühler hinten abgestutzt. *Hister, Silpha, Claviger.*

Bei anderen ist der Bauch obenher convex. *Ips, Nitidula, Byrrhus.*

Wieder andere sind länglich, mit ganz eingezogenem Kopf. *Dermestes.*

Und noch andere sind konvex, aber Wasserkäfer. *Hydrophilus.*

Sie leben von verfaulten thierischen und vegetabilischen Substanzen oder in alten Schwämmen, so wie auch ihre Larven.

Diese sind theils schmal und platt, mit sechs Füßen und hinten zwei gegliederten Anhängseln versehen, theils sind sie cylindrisch und behaart.

**IV. Halbweiche, sich animalisch, zum Theil von lebendigem Raub, nährende; auf der Erde und unter Steinen lebend.**

Neunte Familie. Raubkäfer. *Carnivora.*

Mit plattem gestrecktem Leib, deutlich abgesetztem Kopf und Bruststück, und sechs Tastern an den Fresswerkzeugen. Die Kinnbacken stark, spitzig, die Beine lang.

Sie sind lebhaft, rasch und behende laufend, wild und räuberisch. Mehrere glänzen schön metallisch, viele aber sind dunkel schwarz oder braun gefärbt, stinkend, und alle halten sich gern wie die Schaben im Dunkeln, zumal unter Steinen auf. Sie geiern bei der Berührung und schwitzen scharfe Säfte aus.

Auch ihre Larven sind fleischfressend, sechsbeinig, meist langgestreckt, cylindrisch, der Leib aus zwölf Ringen bestehend, der Kopf groß mit starken, spitzen, krummen Beißzangen und gabeligen Kinnlappen.

Mehrere gehen auf Raub aus oder sitzen still im Sand mit vorgestrecktem Kopf, um auf denselben zu lauern. Die Nymphe verwandelt sich in der Erde. *Carabus, Staphylinus, Cincindela, Dytiscus.*

**V. Weiche Käfer, mit frei lebenden, räuberischen oder parasitischen Larven.**

**Behnte Familie. Weichkäfer. Malacodermata.**

Die meisten mit rundlichem Kopf und Bruststück, und länglichen, weichen Flügeldecken; die Fühler meist faden- oder keulenförmig.

Diese Käfer sind träge, weich anzufühlen, und mit blasenziehenden Giften erfüllt. Sie sitzen, nicht ohne Beweglichkeit, meist auf Blumen, einige im Grase.

Ihre Larven sind die ausgebildetsten unter allen, bunt gefärbt, mit sechs Füßen und großen Beißzangen und leben räuberisch von Blattläusen und andern, frei an Pflanzen, oder parasitisch unter den Larven anderer Insekten, zumal der Bienen, in deren NESTERN.

---

**Uebersicht der Geschlechter.**

**I. RHYNCHOPHORA.**

a. Mit gebrochenen Fühlern; der Rüssel lange.

1. **Calandra.** Rüssel vorstehend, lang. Fühler neungliederig, an der Basis des Rüssels eingefügt. Apter nacht.
2. **Cionus.** Fühler zehngliederig, wenig gebrochen, kurz; der Leib fast kugelig.
3. **Balaninus.** Rüssel lang, dünn, fadenförmig, gebogen. Flügeldecken ei-herzförmig, Beine lang.
4. **Anthonomus.** Rüssel lang, dünn, etwas gebogen. Flügeldecken länglich.
5. **Lixus.** Rüssel nicht sehr lang, vorstehend, wenig gebogen. Fühler kurz. Leib und Flügeldecken schmal, walzenrund.
6. **Pissodes.** Rüssel rund, wenig gebogen, abwärts geneigt. Bruststück vorn schmäler. Leib länglich, sparsam mit Haarschuppen besetzt.

b. Mit gebrochenen Fühlern; der Rüssel kurz, dick.

7. *Hylobius*. Rüssel noch einmal so lang als der Kopf; etwas gefurcht, an der Spitze verbreitert. Fühler am Mundwinkel eingefügt. Die Augen querlänglich. Körper länglich. Schenkel keulensförmig, mit starkem Zahns.
8. *Cleonus*. Rüssel dick, stielrundlich, oben gefurcht, abwärts geneigt. Augen querlänglich, Körper länglich, Schenkel unbewehrt.
9. *Phyllobius*. Rüssel fast so lang als dick, rund. Fühler lang, dick, der Schaft über die Augen hinausreichend. Der Leib gestreckt, etwas weich.
10. *Brachyderes*. Rüssel sehr kurz; Fühler sehr lang und dünn; Augen vorstehend, Körper walzenförmig, ungeflügelt.
11. *Curculio*. Rüssel kurz, stark, seitlich schief gefurcht. Brustschild rundlich. Flügeldecken gewölbt, oft mit vorstehenden Schultern.
12. *Cneorhinus*. Rüssel vorgestreckt, mit fast flachem Rücken. Fühler kurz, mit steifen Borsten besetzt. Der Leib gewölbt, eisförmig oder kugelig.

c. Mit geraden Fühlern.

13. *Magdalais*. Rüssel stielrund; Augen nahe beisammen; Fühler in der Mitte des Rüssels, kaum gebrochen, das erste Glied lang. Leib fast walzenförmig, hinten stumpf, vorn zugespitzt.
14. *Brentus*. Körper liniensförmig; Bruststück und Rüssel sehr langgestreckt.
15. *Apion*. Rüssel vorgestreckt, lang, rücklich, spitz gebogen. Fühler unter die Brust gelegt. Bruststück nach vorn schmäler. Leib gewölbt, eisförmig. Die Flügel bedecken den ganzen Leib.
16. *Rhynchosites*. Rüssel lang, rund oder etwas gedrückt. Die Flügeldecken erreichen den After nicht.
17. *Apoderes*. Rüssel dick, kürzer als der Kopf. Kopf vom Bruststück gesondert; Körper breit; die Flügeldecken erreichen den After nicht.

- d. Rüssel kurz und breit. Fühler faden- oder keulenshormig; Körper eiförmig, Steiß nackt.
- 18. *Anthribus*. Fühler keulenshormig. Körper länglich.
- 19. *Bruchus*. Fühler fadenhormig, etwas gesägt, dicht vor der Bucht nierenförmiger Augen eingefügt. Körper eirund.

## II. XYLOPHAGA.

- a. Fühler keulenshormig.
  - a. Flügel den ganzen Leib bedeckend.
  - 20. *Apate*. Fühler sägeförmig; Augen kugelig, Bruststück kugelig. Schienbeine lang.
  - 21. *Hylurgus*. Fühler sehr kurz, mit eirunder spitzer Keule. Bruststück nach vorn schmäler; Schienbeine zusammengedrückt, der Außenrand gezähnt.
  - 22. *Hylesinus*. Wie zuvor, die Keule kreisrund, zusammengedrückt.
  - 23. *Bostrichus*. Fühler mit dichter, kaum gegliederter Keule. Kopf klein, Bruststück groß, den Kopf fast ganz überdeckend. Schienbeine mit gezähntem Außenrand.
  - 24. *Cis*. Fühler länger als der Kopf, die Keule dreiblätterig. Leib eiförmig länglich.
- b. Flügel nicht bis zum After reichend.
- 25. *Ecoptogaster*. Fühler mit eiförmiger, solider, zusammengedrückter Keule. Schienbeine zusammengedrückt, ganz an der Spitze hafig.
- b. Fühler fadenhormig; Kopf herabsehend.
- 26. *Trogosita*. Fühler nach vorn etwas dicker, die drei letzten Glieder in einen Zahn erweitert. Kinnbacken vorstehend, gezähnt. Bruststück von den Flügeln gesondert. Leib flach länglich.
- 27. *Ptilinus*. Fühler beim Männchen lammförmig, beim Weibchen sägeförmig; Leib cylindrisch. Taster fadenhormig, spitz.
- 28. *Anobium*. Fühler fadenhormig, die drei letzten Glieder

lang. Bruststück gesäumt. Leib cylindrisch. Taster feu-  
lensförmig.

29. **Ptinus.** Fühler fadenförmig, sehr lang, mit fast gleich-  
langen Gliedern. Bruststück schmäler als der Leib. Dieser  
beim Männchen fast cylindrisch, beim Weibchen eisförmig  
gewölbt.

### III. LONGICORNIA.

a. Fühler borstenförmig, meist knotig gegliedert.

30. **Prionus.** Fühler borstenförmig, bisweilen dick und säge-  
zähnig, neben den Kinnbacken eingefügt. Brustschild scharf-  
randig; der Leib groß, lang, mit abgerundeten Flügeldecken.

31. **Cerambyx.** Das Untergesicht klein, die Fühler so lang  
oder länger als der Leib, die Endglieder gedrückt eckig. Das  
Bruststück uneben oder höckerig, meist seitlich bedornt. Flü-  
geldecken lang und schmal.

32. **Callidium.** Untergesicht klein, Fühler kürzer als der  
Leib, Bruststück scheibenförmig, unbewehrt. Leib schmal  
und flach.

33. **Clytus.** Wie zuvor; aber das Bruststück kugelig. Die  
Flügeldecken oben etwas gewölbt.

34. **Lamia.** Untergesicht groß, senkrecht; Fühler im Halbkreis  
gebogen. Bruststück oft seitlich bedornt, mit abgerundeten Sei-  
ten. Leib gedrungen, Flügeldecken etwas gewölbt.

35. **Saperda.** Untergesicht groß, senkrecht; die Augen aus-  
gebuchtet. Bruststück cylindrisch, unbewehrt. Leib schmal,  
lang cylindrisch.

36. **Rhagium.** Fühler halb so lang als der Körper, dicht  
beisammen und vorgestreckt. Kopf hinter den Augen auf-  
getrieben. Bruststück mit seitlichem Dorn, Flügeldecken  
breiter, mit starken Schultern, flach.

37. **Leptura.** Kopf hinter den Augen rasch verengt. Brust-  
stück vorn enger, unbewaffnet. Flügeldecken mit Schultern  
und nach hinten verschmälernt.

38. **Molorchus.** Leib lang und schmal; Flügeldecken ganz  
kurz, die Unterflügel nicht bedeckend. Beine lang, mit feu-  
lensförmigen Schenkeln.

b. Fühler fadenförmig oder schnur förmig.

39. *Donacia*. Fühler fadenförmig, Augen halbkugelig, ganz. Flügeldecken nach hinten zugespitzt, Schenkel keulenförmig.

40. *Lema*. Fühler schnur förmig, Augen vorgetrieben, tief ausgebuchtet. Bruststück schmal, hinten eingeschnürt. Flügeldecken hinten abgerundet.

#### IV. STERNOXI.

41. *Elater*. Fühler säge- und kammförmig, von einander abstehend. Kopf klein. Bruststück hinten jederseits in eine Spitze ausgehend. Leib lang und schmal.

42. *Buprestis*. Wie zuvor; Bruststück hinten zugerundet; Flügeldecken nach hinten zugespitzt, flach.

#### V. CYCLICA.

43. *Chrysomela*. Fühler schnur förmig, nach der Spitze verdickt, weit von einander, vor den Augen eingesetzt. Bruststück an die Flügeldecken grenzend, nach vorn gesondert. Leib gewölbt, länglich oder fast kugelrund.

44. *Helodes*. Die fünf letzten Fühlerglieder eine verdickte Keule bildend. Bruststück viereckig, vorgespannt. Leib länglich, flach.

45. *Cryptoccephalus*. Fühler fadenförmig, ziemlich lang. Kopf herunter gesenkt; Bruststück hoch gewölbt. Flügel nicht bis zum After reichend.

46. *Eumolpus*. Die letzten Fühlerglieder breiter, zusammengedrückt. Bruststück schmäler als die Flügeldecken, hoch gewölbt.

47. *Clythra*. Fühler gesägt, hervorstehend. Körper walzenförmig, vorn und hinten stumpf.

48. *Haltica*. Hinterschenkel Springbeine.

49. *Galeruca*. Fühler zwischen den Augen dicht beisammen eingesetzt; Vorderbeine dicht beisammen. Leib länglich, eiförmig.

50. *Cassida*. Bruststück und Flügeldecken breit gerandet, schildförmig, convex.

51. *Hispa*. Körper mit Stacheln besetzt.

## VI. MELASOMATA.

- a. Fühler keulenförmig; Leib länglich oder kugelig.
- 52. **Agathidium.** Fühler mit drei bis viergliederiger Keule. Leib kugelt sich zusammen.
- 53. **Anisotoma.** Fühler mit fünfgliederiger Keule; Flügeldecke vorn abgestutzt.
- b. Fühler verschiedentlich.
- α. Leib kegelförmig, zugespitzt; Kopf übergebückt.
- 54. **Anaspis.** Fühler fadenförmig nach vorn etwas verbickt; vorletztes Tarsenglied der Vorderfüße zweilappig; Leib spitz.
- 55. **Mordella.** Wie zuvor; der Leib hinten in einen Stachel endigend.
- β. Mund vorgestreckt, bisweilen rüpfelförmig; Flügel weich, Beine lang und dünn.
- 56. **Cistema.** Fühler fadenförmig oder borstenförmig; Krallen gesägt. Flügel nach hinten schmäler.
- 57. **Helops.** Wie zuvor; letztes Tarsenglied groß schief abgestutzt, sichelförmig. Das letzte Tarsenglied cylindrisch.
- γ. Fühler faden-, säge- und lammförmig.
- 58. **Pyrochroa.** Bruststück flach und klein, Flügel flach, nach hinten etwas breiter.
- δ. Fühler kurz, schnurförmig, unter dem Kopfrande eingefügt.
- 59. **Tenebrio.** Bruststück fast quadratisch; Flügel schmal, gleichbreit, hinten abgerundet.
- 60. **Blaps.** Das dritte Fühlerglied viel länger als das vierte; Fühler keulenförmig; Leib länglich, gewölbt, Flügeldecken hinten zugespitzt.
- 61. **Pimelia.** Fühler schnurförmig; Leib aufgetrieben, fast kugelig, kurz; Flügeldecken verwachsen, nach unten umgeschlagen.
- 62. **Akis.** Fühler fadenförmig; Leib länglich, platt. Flügeldecken verwachsen.

## VII. LAMELLICORNIA.

### a. Fühler mit lammförmiger Keule.

63. *Lucanus*. Kinnbacken sehr groß, vorgestreckt, verschiedentlich gezähnt, weit länger als der Kopf. Leib breit.
64. *Platycerus*. Ebenso; Kinnbacken aber nicht länger als der Kopf. Leib breit, flach.
65. *Sinodendron*. Kinnbacken kurz, Leib cylindrisch.
66. *Passalus*. Fühler kurz, mit dreiblätteriger Keule. Leib länglich, gleichbreit, niedergedrückt.
67. *Lamprima*. Fühler gebrochen, mit dreiblätteriger Keule. Kinnbacken hervorstehend, groß, gezähnt. Lippe mit zweihaarigen Lappen. Brustbein in ein Horn vorgezogen.

### b. Fühler mit fächerförmiger Keule.

- α. Leib flach, metallischglänzend, Brustbein in einen Dorn vorgezogen. Steig nackt. Schildchen groß.
68. *Cetonia*. Flügeldecken hinter den Schultern ausgerundet, vor den Schultern ein dreieckiges Blatt eingekleilt.
69. *Goliathus*. Ebenso, das Stirnschild der Männchen zweilappig.
70. *Trichius*. Kopf und Bruststück klein, Flügeldecke flach, Leib breit.
- β. Leib dick, Kopf und Bruststück unbewaffnet, Kinnbacken hornartig.
71. *Melolontha*. Oberlippe zweilappig. Fühler zehngliederig, beim Männchen mit siebenblätteriger, dem Weibchen sechsblätteriger Keule.
72. *Amphimalla*. Ebenso; Fühler neungliederig, mit dreiblätteriger Keule. Krallen gleich.
73. *Anisoplia*. Ebenso; Fühler neungliederig, Keule dreiblätterig; Krallen ungleich, eine jede der vorderen gespalten.
74. *Hoplia*. Ebenso; Hintertarsen mit einer einzigen dicken Klaue; Leib mit glänzenden Schüppchen besetzt, kurz, breit,
75. *Scarabaeus*. Kinnbacken an der Außenseite ausgebuchtet oder gezähnt. Leib dick, convex.
76. *Oryctes*. Füße von gleicher Länge, die vier hinteren

Schienbeine dick, stark ausgeschnitten, wie mit sternförmigen Enden. Leib dick.

77. *Geotrupes*. Kinnbacken sickelförmig; an der Spitze hornig und zweizähnig. Leib dick, convex.
78. *Lethrus*. Die Keule der Fühler verkehrt kegelförmig mit trichterförmig in einander geschobenen Blättern; Kinnbacken inwendig sägeartig gezähnt; Leib sehr kurz, fast halbkreisförmig.
79. *Aphodius*. Fühler neungliederig; letztes Tasterglied cylindrisch; Kinnbacken hautig, ganzrandig; Oberlippe hautig, unter dem breiten Kopfschild versteckt; Unterlippe zweithellig. Leib länglich, hoch gewölbt.
80. *Copris*. Kopfschild groß, halbmondförmig, in der Mitte eingelenkt. Kinnbacken mit langer, ganzrandiger, lanzettförmiger Spitze. Lippentaster dicht vorstig; Mittelbeine an der Basis weiter von einander stehend. Schienbeine an der Spitze verbreitert; Leib dick, After nackt; das Schildchen fehlt.
81. *Onthophagus*. Wie zuvor; aber das Kopfschild spitz, oder abgerundet, das Endglied der Lippentaster sehr klein. Das Schildchen fehlt.
82. *Sysiphus*. Fühler achtgliederig, Leib dreieckig, gedrungen.
83. *Ateuchus*. Kopfschild dreilappig, mit sechs Zähnen; Schienbeine und Tarsen der vier Hinterfüße lang behaart; Leib gedrungen, flach convex.

### VIII. CLAVICORNIA.

#### Platte.

84. *Hister*. Fühler gebrochen, Keule zusammengedrückt. Flügeldecken kurz, gestreift.
85. *Silpha*. Fühler allmälig keulenförmig; Brustschild breit, hinten etwas abgestutzt. Flügeldecken hinten abgerundet, den ganzen Leib bedeckend.
86. *Necrophorus*. Fühler kaum länger wie der Kopf, rasch in eine kugelige viergliederige Keule endigend. Brustschild breiter nach vorn; Leib lang vierseitig, Flügeldecken rechtwinkelig abgestutzt.

87. *Necrodes*. Fühler länger als der Kopf, in eine längliche fünfgliederige Keule endigend. Brustschild fast kreisrund, Flügeldecken schief abgestutzt.

88. *Pselaphus*. Fühler eifgliederig, Tarsen dreigliederig, Flügeldecken abgestutzt, nicht so lang wie der Leib. Klein.

89. *Claviger*. Fühler sechsgliederig; übrigens wie zuvor.

Convere.

90. *Nitidula*. Fühler kurz, zwischen die Augen und Kinnbacken eingefügt, mit großer, dichter, dreiblätteriger, durchbohrter Keule. Leib klein, flach, breit, eisförmig, stumpf, gerandet.

91. *Ips*. Fühler mit durchblätterter dreigliederiger Keule. Leib länglich-eisförmig, convex, After unbedeckt.

92. *Dermestes*. Fühler kurz, mit dreigliederiger durchblätterter Keule; Leib länglich, convex, behaart; der Kopf eingezogen, das Brustschild hinten ausgeschweift.

93. *Anthrenus*. Die Keule der Fühler umgekehrt kegelförmig; sich in eine Grube unter dem Borderrande des Brustschildes verborgen; Leib klein, rundlich, flach gedrückt, mit bunten Schüppchen besetzt.

94. *Byrrhus*. Fühler zusammengedrückt, durchblättert. Leib eisförmig kugelig, oben hoch gewölbt. Die Füße zusammen gedrückt, sich dicht an den Leib anschließend.

95. *Sphaeridium*. Fühler kurz, neungliederig, mit durchblätterter länglicher Keule. Schienbeine seitwärts an der Spitze mit Dornen bewaffnet. Leib rundlich.

96. *Hydrophilus*. Fühler ebenso; Brustbein keilsförmig, nach hinten in einen spitzen Dorn verlängert. Schwimmfüße. Leib länglich eisförmig, hoch gewölbt.

97. *Elophorus*. Fühler ebenso; Bruststück mit fünf Längsfurchen. Leib länglich, fast linienbreit, wenig gewölbt.

IX. FERA.

a. Mit kurzen Flügeldecken, und vier Tastern.

98. *Staphylinus*. Oberlippe ausgerandet; das Endglied der Taster kaum oder gar nicht verdickt; das Endglied der

Fühler parabolisch ausgeschnitten. Kopf groß, scheibenförmig, Flügeldecken sehr kurz.

99. *Oxyporus*. Wie zuvor; Endglied der Lippentaster sehr breit, fast halbmondförmig.

100. *Omalium*. Oberlippe ganzrandig; Fühler fadenförmig oder an der Spitze dicker; Bruststück breit gerandet; Flügeldecken meist weich, mehr oder minder verlängert. Leib gedrungen, Beine unbewehrt.

101. *Tachinus*. Fühler vor den Augen eingesetzt; Leib etwas breit, nach hinten zugespitzt; Beine bedornt.

102. *Tachyporus*. Endglied der Bordertaster klein, fein zugespitzt; Fühler wie zuvor; Leib schlank. Beine bedornt.

103. *Lomechusa*. Fühler vorn neben dem Innenrande der Augen eingesetzt. Brustschild breit, mit einer Längsrinne, breitem aufgerichtetem Rande und scharfen, meist verlängerten Hinterecken.

104. *Allochara*. Bordertaster mit pfeilenshäftigem Endglied; Fühler nach der Spitze verdickt; Hinterecken des Halsschildes abgerundet.

105. *Paederus*. Drittes Glied der verlängerten Bordertaster keulenshäftig. Fühler vor den Augen eingesetzt, nach der Spitze allmälig dicker. Viertes Tarsenglied zweilappig.

106. *Stenus*. Bordertaster sehr lang, mit keulenshäftigem Endgliede. Fühler fein, die drei Endglieder verdickt. Augen weit hervorgetrieben; Zunge weit hervorstreckbar.

107. *Oxytelus*. Kinnladen gerade, kaum vorstehend, innen mit zwei Zähnchen. Endglied der Bordertaster kegelförmig. Fühler vor den Augen, unter einer Ecke des Vorkopfes eingesetzt. Tarsen 5—4gliederig.

b. Mit langen Flügeldecken und meist sechs Tastern.

a. Die Tarsen der Hinterfüße zusammengedrückt und gewimpert. Wasserläfer.

108. *Gyrinus*. Fühler kurz, keulenshäftig; vier Augen. Leib elförmig, gewölbt; der Steiß unbedeckt.

109. *Dytiscus*. Fühler borstenförmig; Oberlippe ausgerandet; die vorderen Tarsenglieder der Männchen schlüsselshäftig.

Brustschild breit, kurz, hinten breiter. Leib eiförmig, gewölbt.

110. *Hyphydrus*. Fühler kurz, fadenförmig. Vorderrand des Kopfschildes vorstehend, kein Schildchen. An den Vorderbeinen vier Tarsenglieder. Leib rundlich, länglich, auf der Unterseite hoch gewölbt, klein.

111. *Noterus*. Fühler kurz, in der Mitte dicker. Endglied der Taster kegelförmig. Hinterschenkel frei. Alle Tarsen fünfgliederig.

112. *Haliphus*. Fühler kurz, fadenförmig; Endglied der Taster kegelförmig. Hinterschenkel unter einer Doppelplatte verborgen. Alle Tarsen fünfgliederig. Flügeldecken punktiert.

β. Hintertarsen gerundet oder gedrückt, mit meist verlängertem, mit zwei Krallen bewaffnetem Endgliede.

113. *Bembidium*. Der Kopf schmäler als das Bruststück; Endglied der Taster kurz, fein und zugespitzt; vorletztes grösser, nach vorn dicker.

114. *Elaphrus*. Fühler kurz; Augen gross, hervorgetrieben; würfelige Gruben auf den Flügeldecken.

115. *Nebria*. Kopf und Bruststück hinten abgestutzt; das Kinn dreizähnig, der mittlere Zahn zweispitzig.

116. *Omophron*. Kinnbacken sehr spitz, vorstehend; Kinnladen innen mit kammförmigen Borsten. Kinn dreizähnig, der mittlere Zahn viel kürzer. Kopf und Bruststück in der Mitte nach hinten verlängert. Leib rundlich-eiförmig, mit tief eingefügtem Kopfe.

117. *Calosoma*. Oberlippe etwas zweilappig; Kinnbacken ohne Zahn, stark. Kinn dreizähnig; Kopf und Hals-schild klein, letzteres mit abgerundeten Seiten. Flügeldecken breit, flach.

118. *Carabus*. Oberlippe zweilappig; Kinnbacken in der Mitte mit kurzen Zähnen. Endglied der Taster schief abgestutzt. Kinn mit drei gleichlangen Zähnen. Leib länglich elliptisch, gewölbt. Keine Unterflügel.

119. *Procrustes*. Wie zuvor; Flügeldecken verwachsen.

120. *Loricera*. Kopf nach hinten plötzlich in den Hals verengert, mit grossen vorstehenden Augen. Fühler von

halber Körperlänge; das erste Glied groß, die folgenden knotig, quirlförmig mit Borsten besetzt.

121. *Panagaeus*. Kopf mit kugelig hervorstechenden Augen, hinten in einen Hals verengt. Endglied der Taster keilförmig, Bruststück gerundet.

122. *Chlaenius*. Endglied der Taster walzenförmig, gerade abgestutzt. Hinterecken des Bruststückes spitzig. Flügel breit, etwas gewölbt, fein gefränt und behaart.

123. *Anchomenus*. Endglied der Taster walzenförmig, gerade abgestutzt; Bordertarsen unten mit dichter Bürste besetzt; Bruststück abgestutzt herzförmig.

124. *Agonum*. Ebenso; Bruststück kreisrund.

125. *Mormolyce*. Kopf sehr lang, schmal, fast cylindrisch; Leib ganz platt, wie breit getreten, fast blattartig.

126. *Cephalotes*. Fühler halb so lang als der Körper, mit kurzen Gliedern; das zweite kürzer als die beiden folgenden zusammen. Kinnbecken gerade, innen mit starkem Zahns, Oberlippe ganz. Kopf groß. Bruststück nach hinten verengt, Leib länglich, vorn zusammengezogen.

127. *Amara*. Endglied der Taster spitz; Bruststück nach hinten breiter, von der Breite der Flügeldecken. Tarsen der Hinterbeine mit dichtem Polster. Leib eisförmig, gewölbt.

128. *Harpalus*. Bruststück von der Breite der Flügeldecken, mit spitzen Hinterecken. Bordertarsen des Männchens erweitert, mit schuppigem Polster. Leib länglich-eisförmig.

129. *Clivina*. Fühler schnuriformig; Flügeldecken hoch gewölbt, abgerundet, vom Brustschild durch einen Zwischenraum getrennt.

130. *Dromius*. Taster verlängert; Bruststück herzförmig, mit stumpfen Hinterecken. Flügeldecken schlank, nach hinten kaum breiter, ziemlich flach, abgestutzt.

131. *Brachinus*. Bruststück länglich-herzförmig, wenig breiter als der Kopf. Flügeldecken viel breiter, etwas gewölbt, abgestutzt.

132. *Anthia*. Bruststück umgekehrt herzförmig, hinten sehr schmal. Leib eisförmig, convex.

133. *Cicindela*. Kopf mit eingedrückter Stirn; Bruststück

vorn und hinten eingeschnürt; Kinnbacken innen mit mehreren Bähnen; am Ende der Kinnladen ein eingelenkter Bahn.

## X. MALACODERMATA.

a. Fühler keulenförmig, Flügeldecken hart.

134. *Clerus*. Fühler allmälig dicker werdend. Bruststück nach hinten stark eingeschnürt.
135. *Notoxus*. Fühler allmälig dicker, Endglied schräg abgestutzt. Bordertaster beiförmig. Leib schlank, schmal.
136. *Trichodes*. Fühler mit dicker dreigliederiger Keule; Endglied der Bordertaster allmälig dicker, am Ende abgerundet. Bruststück dicht vor dem Hinterrande eingeschnürt. Erstes Tarsenglied undeutlich.
137. *Coccinella*. Fühler kurz, keulenförmig, stumpf. Leib länglich oder kreisrund, oben kugelig, unten flach.

b. Fühler faden- oder schnurförmig, Flügeldecken weich.

α. Krallen gewöhnlich.

138. *Melyris*. Fühler fadenförmig, etwas gesägt, kaum so lang als das Bruststück. Kopf herabgeneigt; Flügeldecken groß, den länglichen Leib bedeckend.
139. *Cantharis*. Fühler faden- fast borstenförmig; Endglied der Taster beiförmig; vierter Tarsenglied zweilappig. Leib lang, schmal.
140. *Malachius*. Fühler faden- oder borstenförmig, etwas sägeartig; Endglied der Taster zugespitzt. Viertes Tarsenglied ungetheilt. Leib länglich, an den Seiten Fleischbläschen hervortreibend.
141. *Lyceus*. Fühler faden- oder schnurförmig, zusammengedrückt, dick; Fresswerkzeuge schnabelförmig; Leib gedrückt, lang.
142. *Lampyris*. Fühler kurz, Bruststück rundlich, den Kopf bedeckend; Flügel des Männchen lang, flach; Leib flach.
143. *Lymexylon*. Leib fast cylinderisch.

β. Krallen gespalten, scheinbar vier.

144. *Cerocoma*. Fühler kurz, neungliederig, mit verdicktem

Endgliede; beim Männchen ungewöhnlich gestaltet. Tasche, Leib und Füße lang.

145. *Mylabris*. Fühler fadenförmig, eiförmig, nach vorn allmälig fast keulenförmig verdickt. Kopf hervorstehend, abwärts geneigt; Flügeldecken groß, dachförmig, abgerundet.

146. *Lyta*. Fühler fadenförmig, gerade. Leib lang, fast cylindrisch, mit convex-langen Flügeldecken.

147. *Meloë*. Fühler schnurförmig, bei den Männchen in der Mitte unregelmäßig. Kein Unterflügel. Flügeldecken kurz, mit gebogenem Innenrand, die eine an der Basis die andere deckend. Leib eiförmig, dick, weich.

---

### Literatur der Käfer.

Die Hauptwerke von Linnae, Fabricius, Latreille, Germar, Sturz, Panzer, Guerin, Herbst u. a. siehe vorn.

*J. Chr. Fabricii, systema Eleutheratorum.* Kil. 1801. II Vol.  
*L. Gyllenhal, Insecta suecica, Classis I. Coleoptera.* Scaris 1808—1827, IV. Vol.

*C. J. Schönherr, Synonymia Insectorum.* Holm. 1806—1817, 1834. 4 Bde.

*K. Duftschmied, Fauna Austriae etc.* Linz und Leipzig 1825, III Bände.

*Catalogue des Coléoptères de la collection de Mr. le Comte Déjean.* Paris 1836.

*Ders. Species general (?) des Coléoptères.* Paris 1834. V. Vol.  
*Iconographie ou Histoire naturelle des Coléoptères d'Europe*

*par Mr. le Comte Déjean et M. J. A. Boisduval.* Paris.  
*Boisduval et Lacordaire, Fauna entomologique des environs*  
*de Paris.* Paris. Drei Bände; bis jetzt nur der erste  
erschienen.

*Entomologie, ou Histoire naturelle des Insectes par Mr. Olivier.* Paris 1789—1795, V. Vol. 4.

*J. F. W. Illiger, Verzeichniß der Käfer Preußens.* 4 B.  
Halle 1798.

*B. C. Erichson, die Käfer der Mark Brandenburg.* Berlin 1837.

---

### Erste Familie.

#### R ü p e l t ä f e r \*).

#### (*Rhynchophora, Curculionida.*)

Ihr Mund steht am Ende eines zu einem Schnabel verlängerten Gesichts und ist sehr klein. Sie bedienen sich desselben, um Löcher in Saamen, Früchte, Knospen oder Rinden zu nagen, in welche sie sodann ihre Eier legen. Manche werden dadurch unseren ökonomischen Gewächsen sehr verderblich.

Der Kopf selbst ist klein, aber mit oft groß hervortretenden Augen. Das Bruststück verschmälert sich bei den meisten nach vorn hin, so daß es dann wenig breiter als der Kopf selbst ist, dagegen zeigen fast alle convexe, zugerundete Flügeldecken, theils einen großen, kugeligen oder eiförmigen, theils einen mehr cylindrischen Leib bildend; bei diesen letzteren sind die Flügeldecken bisweilen auch zugespitzt. Sie sind hart, und erreichen bei mehreren das Ende des Leibes nicht.

Ihre Füße sind stark, mitunter bedornt, mit breiten Fußblättern; sie haften fest an dem Körper, auf den sie sich setzen.

Im Ganzen sind sie nicht ausgezeichnet, eher düster gefärbt; nur einige, zumal ausländische, zeigen goldgrüne, kupferroth oder blaue Schüppchen und Härchen, die ihnen ein schönes, ja juwelenhaftes Ansehen verleihen.

In ihren Bewegungen sind sie träge, viele sind auch ungeflügelt; ihre Larven theile sind füglos, theils nur mit ganz kurzen Füßchen versehen, leben im Inneren der Pflanzen.

### I. Calandra.

Fühler neungliederig, gebrochen, an die Basis des langen dünnen Schnabels gefügt. Leib eiförmig, die Flügeldecken erreichen den Steiß nicht.

\* ) *C. J. Schönkerr Curculionidum dispositio methodica.* Lips. 1826  
— 1835. IV. Vol.

1. Der Palmwurm.

*Calandra palmarum F.*

*Cureulio palmarum L.*

Schwarz mit längsgefurchten, hinten abgestutzten Flügeldecken.  
*Olivier Col. pl. 2, F. 17.*

Der Käfer ist ziemlich groß, bis zwei Zoll lang, matt-schwarz. Die gebogenen Furchen der Flügel sind seitlich kürzer und hinten zusammentretend. Die Fühler endigen in eine quer abgestutzte Keule.

Er findet sich im südlichen Amerika, zumal Surinam, Cayenne, Brasilien, wo seine Larve im Inneren verschiedener Palmen, zumal der dortigen Kohlpalme lebt. Sie gleicht einem Baumendicken und langen unsörmlichen, fußlosen Wurm mit braunem Kopf, und sieht wie ein Stück Fett, mit Haut überzogen, aus. Man spaltet die Palmen, wo man ihrer in Menge erhält, und an einem hölzernen Spleiß oder in einer Pfanne brät, und sie mit geröstetem Weißbrot und Gewürz genießt. Man lobt dieses Gericht als äußerst lecker.

In Surinam heißt die Larve **Kabisch-wurm**.

2. Der schwarze Kornwurm.

*Calandra granaria F.*

*Cureulio granarius L.* Brauner Kornwurm.

Braunroth, mit grob punktiertem Bruststück, welches so lang als der Leib ist.

**Panzer Fauna XVII, 11.**

Er ist zwei Linten lang und eine der größten Plagen der Kornböden. Der Käfer frisst die Schale der Getreidekörner an, und legt sein Ei in dieselbe, worauf die Larve alles Mehl des Korns verzehrt, so daß nur die leeren Hülsen bleiben. Sie stecken in der Tiefe und sind auf der Oberfläche des Getreides nicht leicht sichtbar. Sie erscheinen mit Anfang Sommers, und da ihr Lebenslauf nicht über einen Monat beträgt, so vermehren

sie sich oft sehr und verbrüsten viel. Im Winter findet man die Käfer erstarrt, in Röhren\*).

### 3. Der Reiswurm.

#### *Calandra Oryzae.*

Braunroth mit punktiertem Bruststück von der Länge der Flügeldecken: auf diesen zwei rothbraune Punkte.

*Olivier T. VII, F. 81, a, b.*

Wird oft mit dem Reis nach Europa gebracht, den er nach Art des vorigen zerstört.

## II. *Cionus.*

Rügel lang, nach unten gebogen; der Leib fast kugelig, hoch gewölbt.

### 1. *Cionus Serophulariae.*

#### *Rhynchaenus Verbasci Fabr.*

Schwarz, Kopf und Brustschild mit gelblichen Härdchen besetzt, die Flügel braun, mit abwechselnd erhöhten Zwischenräumen, die schwarz und weiß gewürfelt sind. Auf der Flügelnahrt zwei große schwarzseidenglänzende Flecken hintereinander, die durch etwas Weißes verbunden sind.

*De Geer V, Taf. 6, Fig. 17—25. — Herbst Col. T. LXXIII, F. 1.*

So groß wie eine kleine Erbse. Häufig an *Serofularia nodosa*, die er zeragt.

### 2. *Cionus thapsus.*

Rothbraun, überall graugrün dicht behaart, auf den Flügeldecken einige Reihen heller und sammelschwarzer Würfel, die zwei schwarzen runden Flecken auf der Flügelnahrt einfach.

*Herbst Coleopt. T. LXXIII, F. 3. — Réaumur III, T. II, F. 9—12.*

\* ) Er scheint auch den Alten schon bekannt gewesen zu seyn:

Populatque ingentem farris acervum

Curculio.

Virg. Georg. I, 185.

Etwas größer als der Vorige, und zumal häufig am Wollkraut, auf deren Blättern die Larve lebt, die Wolle abhebt, und auch die Blüthenknospen anbohrt und sich daselbst einspirnt.

### III. *Balaninus.*

Der Schnabel sehr lang und dünn, etwas gebogen. Fühler lang, der Schaft bis an die Augen reichend. Leib eiförmig mit fast herzförmig gestalteten Flügeldecken. Die Beine lang, gezähnt.

#### Der Haselnußwurm.

##### *Balaninus nucum.*

##### *Rhynchaenus nucum F.*

Eiförmig, dicht mit graubräunlichen Härchen bedeckt; der Rüssel von der Länge des Körpers, rothbraun.  $2\frac{1}{2}''$  l.

*Panzer XLII*, Taf. 51. — *De Geer V*, Taf. 6, Fig. 14—16.  
— *Rüssel III*, Taf. 67.

Mit dem Rüssel 5'' lang. Er legt im Sommer seine Eier an die unreifen Haselnüsse, welche die ausgekrochene Larve so dann anfrisst und sich hineinbohrt, um bis zu ihrer Verpuppung vom Kerne zu zehren. Es ist die bekannte Made, die man beim Verbeißen solcher Haselnüsse findet. Im Oktober schlüpft sie heraus, um sich in der Erde in einer Hülse zu verpuppen. Der Käfer kommt erst im folgenden Jahr zum Vorschein.

### IV. *Anthonomus.*

Der Schnabel dünn und lang; die Augen hervorgetrieben; Flügeldecken länglich. Vorderbeine länger, gezähnt.

#### Der Apfelschlüpfkäfer.

##### *Anthonomus pomorum.*

Braun, mit dicht anliegenden grauen Härchen bedeckt; Flügel schwarzbraun und rostroth gescheckt, gestreift, hinter der Mitte mit einer breiten, vorn und hinten schwarz gesäumten Binde. Das Schildchen schneeweiss.

*Panzer XXXVI*, 17.

Mit dem nach unten gerichteten Schnabel kaum drei Linien lang. Legt seine Eier in die Blüthenknospen der Apfelbäume, die dann von der Larve durchnagt werden, daß sie absfallen. Der Käfer überwintert unter der Rinde der Apfelbäume.

Ihr ähnlich sind verwandte Gattungen an den Pfauen, Vogelfirschen u. s. w.

## V. Lixus.

Der Rüssel vorgestreckt, der Leib walzenförmig, schmal.

### Lixus paraplecticus.

Grünlich graubraun behaart und bestäubt, jede Flügeldecke hinten in eine abstehende Spitze ausgehend.

Panzer VI, 15. — De Geer V, Taf. VII, Fig. 3—9.

Um Wasserschalen, in deren hohlen unter Wasser stehenden Stengeln die Larven nach Art der vorigen leben\*). Dass er den Pferden Lähmung verursache, ist eine Fabel.

## VI. Pissodes.

Schnabel nur wenig gebogen. Fühler hinter dessen Mitte eingefügt. Brust nach vorn schmal, hinten so breit wie die Flügeldecken. Schenkel keulenförmig, unbewehrt; Leib länglich, sehr hart, sparsam mit Haaren besetzt.

### Der kleine Fichtenrüsselkäfer.

#### Pissodes pini.

Röthlich pechbraun ins Schwarze, auf der Unterseite dicht mit rundlichen Schuppen, oben mit länglichen, haarsförmigen sparsam besetzt, die auf den tief punktiert gestreiften Flügeldecken zwei blaße Binden bilden.

Panzer XLII, 1. — Herbst LXX, F. 2.

\*) Man findet zwar fast in jedem Stengel des *Oenanthe Phellandrium* Spr. (*Phellandrium aquaticum L.*), den man spaltet, in den Internodien Käferlarven, diese sind aber nicht immer von obigem, sondern oftmals auch vom *Helodes phellandrii*.

Auf frisch gefälltem Nadelholz, in der Spitze der jungen Triebe der Fichten, wo auch die Larve schädlich wird. 4" lang, größer und kleiner; Bechstein hielt ihn irrig für das Männchen des folgenden.

## VII. *Hylobius*.

Die Fühler gebrochen, hinter dem Mundwinkel eingesetzt; der Schnabel gefurcht und am Ende etwas verbreitert. Die Augen querlänglich. Leib länglich, sehr hart, die Schenkel linsenförmig, mit starkem Zahne.

Der große Fichtenrüsselkäfer.

*Hylobius abietis*.

Matt pechschwarz, gelb behaart, das Bruststück nach vorn zusammengezogen, die Flügeldecken fein gitterig gestreift, dazwischen runzelig, einige Querbinden von gelben Haaren.

Panzer XLII, 14. — De Geer V, Taf. 6, Fig. 11—13. —

Herbst LXX, 3.

Dreimal so groß als der Vorige, bis über einen halben Zoll lang. Die früheren Zustände dieses Rüsselkäfers, seine Larve und Verwandlung sind noch ziemlich unbekannt; Bechstein gibt nur das Gewöhnliche an, daß die Puppe sich in einer dünnen Haut eingeschlossen zeige. Der Käfer nagt die Borke der jungen Fichten in den Pflanzungen ab. Bei der ungeheuren Ueberhandnahme dieses Insektes in den sächsischen Fichtenpflanzungen und den daselbst angerichteten großen Verheerungen hat man indes nicht bemerkt, daß er die Triebe der Bäume angreife\*). Charakteristisch ist es übrigens daß er nur die Rinde junger verpflanzter Fichten benagt, und nur höchst selten die aus Sammen an Ort und Stelle verwachsenen berührt.

## VIII. *Cleonus*.

Schnabel dick, lang, oben gefurcht; Fühler kurz, gebrochen.

\*) E. A. Rossmässler (Prof. zu Tharand) Forstinsekten. Leipzig 1854. S. 70.

Augen länglich; Bruststück wenig schmäler als die Flügel. Schenkel unbewehrt, Leib länglich.

#### 1. *Cleonus sulcirostris.*

Schwarz, dicht aschgrau behaart, die Flügeldecken fein punktiert gestreift, mit nackten schiefen Binden, der Schnabel mit drei Furchen.

Herbst LXIV, 7.

In sandigen dürren Gegenden häufig, auch auf Disteln. Einen halben Zoll lang. *Cl. nebulosus*, mit spitzen Flügeldecken, ist ihm ähnlich.

#### 2. *Cleonus albidus.*

Schwarz, weißlich behaart, der Rücken des Brustschildes, eine Flügelbinde und vier Flecken daselbst nackt. Der Schnabel mit zwei Furchen, der Mittelkiel vorn gespalten.

Panzer XIX, 2.

Ebendaselbst; etwas kleiner. Ihm ähnelt der größere *C. glaucus*.

### IX. *Phyllobius*.

Der Schnabel wenig länger als dick, fast rund. Leib gestreckt, etwas weich, geflügelt.

#### 1. *Phyllobius pyri.*

Länglich, schwarz, mit schmalen seidengrünen und goldigglänzenden Schüppchen bedeckt; Fühler und Füße rostbraun, die Schenkel dick, mit starkem Zahn.

Panzer CVII, Taf. 4.

Häufig im Frühling auf Obstbäumen, Erlenblättern &c., 4—5" lang.

#### 2. *Phyllobius argentatus.*

Länglich schwarz, mit rundlichen silbergrünen Schüppchen bedeckt und einzelnen aufrechtsstehenden Härchen; die Fühler dick, die Schenkel stark gezahnt, Schienbeine und Tarsen gelb.

Herbst LXXIX, Fig. 4.

Um die Hälfte kleiner als der vorige. Häufig auf Obstbäumen, Sträuchern u. a. Kräutern.

## X. Brachyderes.

Schnabel sehr kurz, breit; Fühler lang, der Schaft weit über die Augen ragend, die Keule schmal und lang. Augen hervorstehend; Leib länglich, fast walzenrund, ungeflügelt.

### Brachyderes incanus.

Länglich, schwarz, braun behaart, mit zarten rostbraunen Fühlern, kurzem Brustschild, was oben flach ist.

#### Panzer XIX, 8.

In Fichtenwäldern häufig, im Winter unter dem Moos. 4 Linien lang. Oft sind die Flügeldecken abgewetzt, und dann ganz schwarz.

## XI. Curculio.

Schnabel kurz, Fühler eifigföderig, vorn gegen das Ende desselben eingefügt; Bruststück klein; Flügeldecken hart, gewölbt.

Schnabel gleichbreit, Flügeldecken mit eckigen Schultern, nach hinten spitz verlaufend. Entimus.

### 1. Der Juwelenkäfer.

#### Curculio imperialis.

Entimus imperialis.

Schwarz, mit goldgrünen Schüppchen; Schnabel mit goldgrünen Rinnen und einer solchen über das Bruststück weg; Flügeldecken mit Reihen goldgrün besetzter Grübchen. Füße behaart.

Olivier T. 1, F. 1. — Herbst Taf. LXXVI, Fig. 1.

Über zwei Zoll lang; der bekannte und vormals so berühmte Juwelenkäfer, dessen in allen Vertiefungen stehende Schüppchen zumal im Sonnenschein wie Edelsteine glänzen und dessen Flügeldecken man deshalb in Amerika auch zu Ohrringen u. a.

Schmuck benutzt. Brasilien ist sein hauptsächliches Vaterland, wo er träge auf Gebüschen sitzt, und jetzt nicht sehr theuer mehr zu haben ist. Den ersten jedoch, der nach England kam, kaufte eine Herzogin von Portland für hundert Karolin.

Es gibt noch mehrere, ihm ähnliche schöne Arten, so *C. (Entimus) splendidus* oder *fastuosus* (*Olivier T. V, F. 51*) mit hinten aufgetriebenen, goldgefleckten Flügeldecken, ebendaselbst; den *C. sumptuosus* (*Olivier I, F. 13*) mit erhabenen Punkten, in Cayenne zu Hause, und den *C. regalis* (*ib. 1, 8*) blaugrün, mit goldigen geschweiften Binden; auf Domingo.

Der Schnabel nach vorn etwas verdickt; die Füller länger als der Kopf, das Bruststück und der Leib eirundlich, gewölbt. *Cureulio*.

### 2. *Cureulio germanus L.*

*Molytes germanus* *Schönherr*. *Cureulio fusco-maculatus* *F.*

Schwarz, mit einzelnen Bürstchen anliegender gelber Haarsparsam besetzt. Die Schenkel mit undeutlichem Zahn.

Herbst LXXXVI, 2.

Ziemlich groß, über einen Zoll lang, und der größte deutsche Rüsselkäfer. Er ist sehr kräftig und seine Flügeldecken außerdem ordentlich hart.

### 3. *Cureulio coronatus Latr.*

*Cureulio germanus* *Fabr.* *Molytes coronatus* *S.*

Wie der vorige, aber nur halb so groß. Die Schenkel mit starkem Zahn.

Herbst ib. Fig. 1. — Panzer 86, s.

## XII. *Cneorhinus*.

Der Schnabel vorgestreckt, mit flachem Rücken; Fühler kurz, mit steifem Borsten besetzt. Leib hoch gewölbt, länglich oder eisförmig.

### *Cneorhinus geminatus S.*

Schwarz, dicht braun behaart, aschgrau gestreift, mit breiten, fast kugeligen, weißborstigen Flügeldecken. Der Schnabel flach.

Herbst LXXXVII, Fig. 7.

Auf sandigen dürren Stellen.

### **XIII. Brentus.**

Der Kopf nach vorn verlängert, in einen sehr langgestreckten Rüssel übergehend; die Fühler fadensförmig, eisgliederig, gerade, nach dem Ende etwas verdickt; der Leib lang, cylindrisch.

#### *Brentus Anchorago.*

Braunglänzend, mit gestreiften Flügeldecken, längs einer jeden eine gelbe Linie. Das Männchen ist an dritthalb Zoll lang, Kopf und Rüssel gleichen einer langen Nadel, das gleichfalls einen Zoll lange Bruststück ist flaschenförmig, die Flügeldecken ragen über den Astor hinaus. Das Weibchen ist nur halb so groß, mit viel kürzerem Kopf. Das mittlere Fußpaar ist beträchtlich kleiner als die anderen.

Olivier pl. 1, F. 2, a, b.

Eine der wunderbarsten Gestaltungen in der Natur. Dieser Räher lebt im südlichen Amerika und auf den Antillen und wird unter Baumrinden zwischen Ameisen angetroffen; eine ähnliche Gattung gibt es auf Neuseeland und eine noch andere in Italien. Welche Naturkraft diese ungewöhnliche Streckung in die Länge veranlaßt haben möge, ist wohl zur Zeit noch nicht zu errathen.

### **XIV. Apion.**

Der Schnabel rund, vorgestreckt, ziemlich lang und spitz. Fühler unter die Brust zurückgelegt, mit dichter dreigliederiger Keule, in der Mitte oder Basis des Schnabels eingefügt. Leib birnsförmig, nach vorn schmäler.

#### 1. *Apion pomonae.*

Mattschwarz, ganz feinhaarig, mit dictem nach vorn verdünnem Schnabel; die Flügeldecken gestreift punktiert, ins Blaue gefärbt, groß, nach hinten verbreitert, gewölbt.

Panzer XX, 12.

Auf Obstblüthen, Gebüsch, im Grase u. s. w.; 2<sup>11/12</sup> l. Ihm ähnlich ist der, noch einmal so große, *A. Craceae*, auf Wicken und Haselgesträuch; er frisst die Wickenköpfchen aus.

#### 2. Der rothe Kornwurm.

##### *Apion frumentarium.*

Bläß blutroth, matt, bloß die Augen schwarz, der Schnabel etwas gebogen, die Flügeldecken gesprenkelt gestreift. 1 $\frac{1}{2}$  " lang.

Panzer XX, 14.

Auf Blumen oder Pflanzen und in Feldern häufig. Golenhall bezweifelt, daß er ans Getreide gehe.

### XV. *Rhynchites.*

Der Schnabel rund oder etwas zusammengedrückt, lang, vorn breiter; der Kopf länglich. Fühler mit dreigliederiger Keule. Leib breiter als das Brustschild; After nackt.

#### 1. Der Birkenstecker.

##### *Rhynchites Betuleti.*

*Attelabus Betuleti.*

Obenher grün seldenglänzend, glatt; Leib, Füße und Schnabel goldgrün, die Stirn etwas eingedrückt.

Panzer XX, 6.

Ein Paar Linien lang; variiert auch blau. Das Weibchen dieser und der folgenden Arten hat an jeder Seite des Bruststückes eine Dornspitze. Auf Birken, Erlen etc.

2. Der Pappelstecher.  
*Rhynchites populi.*

Obenher goldgrün, glänzend, glatt, Füße und Leib untenher violblau, die Stirn tiefer gesurrt.

Panzer ib. 7.

Größer und kleiner, nur zwei Linien lang, häufig auf der Bitterpappel\*).

3. Der Rebenstecher.  
*Rhynchites Bacchus.*

Fr. Béche, Lisette.

Goldig, kupferroth, glänzend, behaart; Fühler und Tarsen schwarz; die Flügeldecken punktiert und gestreift.

Panzer ib. 5. — Herbst Taf. CIV, Fig. 1.

Weit größer als die vorigen, 4—5" lang. Variirt auch grün und schwarzblau.

Einer der schädlichsten Käfer für den Weinstock, aber auch, nach Schmiedelberger\*\*), für den Apfelbaum. Der genannte Pomolog bemerkte Anfangs Juli einen solchen Käfer, wie er binnen einer Viertelstunde auf einem Apfel ein Loch bohrte, um hernach sein Ei hineinzulegen. Er schob sodann das Ei mittels seines Schnabels in die Tiefe einer Linie hinab, und schloß die Öffnung, anfänglich durch Wiedervereinigen der Oberhaut mittels der Kinnbacken, und setzte hierauf mit klebriger Materie aus dem After die Wunde zusammen, indem er mit dem Hinterleib wiederholst darüber hinführte, um das Ganze zu glätten. Diese Arbeit dauerte eine ganze Stunde.

Nach einer kurzen Ruhe wiederholte das Weibchen diese Operation, bald auf dem nämlichen Apfel, bald auf einem anhegen, immer aber auf der glattesten Seite desselben. Bisweilen werden vier Eier auf einem Apfel abgesetzt.

Nach wenig Tagen tritt aus dem Ei ein weißes Würmchen

\*). Diese Arten sind nicht mit den mattschwarzen und schwarzblauen Obststräfekäfern: *Magdalis pruni*, *pyri*, *cerasi* etc. zu verwechseln.

\*\*). Beiträge zur Obstbauymzucht 1. B., S. 172.

mit schwarzem Kopf hervor, welches sich nun immer tiefer einfrischt, zuletzt bis in's Kernhaus. Nach drei bis vier Wochen ist die Larve ausgewachsen, tritt aus dem Apsel hervor, fällt zur Erde, um sich in derselben zu verpuppen, und kriecht im folgenden Jahre als Käfer aus.

Nach Latreille's und vieler anderen Naturforscher Zeugniß findet er sich auch am Weinstock, in deren Augen und Blüthenknospen er sein Ei einsticht und dadurch höchst schädlich wird. Jener Naturforscher sagt, die Larve halte sich dann in den zusammengerollten Blättern desselben auf, und bringe sie sämmtlich zum Abfallen. Man soll in manchen Weinländern diese Käfer buchstäblich scheffelweise gesammelt haben. Daß auch der vorige, Rh. Betuleti, gleichen Schaden thue, mag möglich seyn, Latreille hätte aber diesen ächten gewiß nicht verkannt. Es gibt kein anderes Vertilgungsmittel gegen ihn, als ihn auf der Unterseite der Blätter, wo er sich aufhält, abzulesen.

## XVI. Apoderes.

Der Schnabel dick, kürzer als der Kopf; Fühler zwölfgliederig, mit dichter viergliederiger Keule. Der Kopf hinten in einen Hals verdünnt. Steiß nackt, die vorderen Schienbeine am Ende bedornt.

### Apoderes Coryli.

Schwarz, glatt, der Hinterrand des Bruststückes und die gerbst gestreiften Flügeldecken lackroth.

Panzer C, Fig. 8. — De Geer V, Taf. 8, Fig. 3, 4.

Variiert mit einem schwarzen Fleck auf dem Brustschild. Auf Haselgesträuch nicht selten. 3 — 4 Linien lang, größer und kleiner.

## XVII. Anthribus.

Fühler eilsgliederig, die letzten drei keulenförmig. Der Rüssel platt, kurz. Leib eiförmig länglich, mit nacktem Steiß. Das vorletzte Tarsenglied zwieflappig. —

#### 1. *Anthribus latirostris.*

Länglich, schwarz, etwas flach; mit runzeligem Rüssel; das Ende der Flügeldecken grauhaarig, weißlich; das Bruststück eckig, hinten mit einem erhobenen Querstrich.

Panzer XV, 12. — Herbst CVI, Fig. 3.

Nicht selten in alten Holzstücken. Etwa fünf Linien lang.

#### 2. *Anthribus albirostris.*

Schwarzbraun, länglich, Rüssel und Ende der Flügel weiß, letztere darauf schwarz gescheckt.

Panzer ib. 13. — Herbst ib. 4.

Ebendaselbst; zumal an Birken und Weiden.

#### 3. *Anthribus albinus.*

Länglich, graubraun behaart; Rüssel, Stirn, Ende der Flügel, und ein Querstrich vorn auf denselben weiß behaart; auf dem Bruststück drei sammetschwarze Höcker in einer Querreihe. Fühler weiß und schwarz gescheckt, beim Männchen länger.

Panzer III, 16. — Herbst ib. 1, 2.

Zu altem Holze; 4—5" lang.

### XVIII. Bruchus.

Kopf herabgezogen; Fühler fadenförmig, selbst kamsförmig und etwas gesägt, in die Ausbucht der Augen eingefügt, nach vorn dicker. Steiß nackt; Hinterschenkel dick, gezahnt. Vier Larsenglieder.

Die Weibchen dieser Käfer legen ihre Eier an die zarten Keime verschiedener Pflanzen, zumal der Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, Wicken, aber auch des Getreides, der Dattelpalme u. a. Palmen, des Kaffeestrauches, die Saamen des Cacao u. s. w., in welchen die Larve den Winter zubringt, sie aushöhlt und sich darin verpuppt. Man erkennt solche Saamen an den darin befindlichen Löchern.

#### 1. *Bruchus nucleorum.*

Aschgrau mit gestreiften Flügeldecken; die Hinterschenkel sehr dick, mit einem Zahn.

*Olivier* IV, T. 1, F. 1. — *Germar* in s. Mag. der Entom.

B. III, Taf. 4. *Br. ruficornis*, als verwandte Art.

In den großen Palmenüssen des wärmeren Amerika. Einen Zoll lang. Die gekrümmte, einem Engerling ähnliche Larve kommt nicht selten in den Bactris-Früchten nach Europa.

#### 2. *Bruchus granarius.*

Schwarz, eirund, Vorderbeine und erste Fühlerglieder röthlich, das Bruststück und die Flügel mit weißbehaarten Flecken. Hinterschenkel mit einem Dorn.

*Panzer* LXI.

Auch der Steiß und die Stelle vor dem Schildchen sind weiß. 2<sup>1/2</sup> lang. In Sämereien, zumal der Hülsenfrüchte; der Käfer soll an *Orobus tuberosus* häufig sitzen.

#### 3. Der Erbsenkäfer.

##### *Bruchus pisi.*

Schwarz, weiß gefleckt; der Steiß weiß, mit zwei großen schwarzen Flecken.

*Panzer* ib. 14.

In Erbsen und Bohnen, die er zerstört. 3<sup>1/2</sup> lang.

---

#### Zweite Familie.

#### B o r k e n k ä f e r.

(*Xylophaga*, *Bostricida*, *Corticicola*.)

Die Käfer dieser zweiten Ordnung sind sämtlich nur klein, hart, und in altem oder auch frischem Holz der Bäume lebend. Sie und ihre Larven bohren diese an, und veranlassen das Ausstreuen des Nahrungssafes, wodurch sie absterben. Sie richten dadurch ganze Wälder zu Grunde.

Ihr Kopf ist klein, mit keulen- oder fadenförmigen Fühlern versehen, und in das Bruststück zurückgezogen. Der Leib ist cylindrisch, selbst gewölbt oder kugelig, von Farbe sind die meisten braun.

Die Larven sind füßlos und fressen sich Gänge in verschiedener Art theils unter der Rinde hin, die sie mit ihrem mulmigen Unrat erfüllen, theils tief in das Holz. Auch in holzigen Schwämmen gibt es welche; die mit keulenförmigen, durchblätterten Fühlern finden sich mehr in den Waldbäumen, die mit fadenförmigen häufiger in Herbarien, Büchern und Hausgeräthe (Schränken, alten Stühlen &c.), wo sie oft in beträchtlicher Länge einen geraden Kanal bohren.

### XIX. Apate.

Fühler zehngliederig, kurz; die Keule lammförmig gesägt. Augen hervorstehend, rund. Bruststück kurz, erhaben, fast kugelig, rauh. Schienbeine lang und schmal.

#### Apate capucina.

Mattschwarz, etwas behaart, mit unbewehrten etwas nehartig punktierten braunrothen Flügeldecken.

Panzer XLIII, 18. — Herbst XLVI, 7.

In altem Holze. Sechs Linien lang, oder auch kleiner. Zeigt Verwandtschaft mit Anobium.

### XX. Hylurgus.

Fühler kurz, die Keule viergliederig, eirund-kugelig, spitz. Bruststück nach vorn schmäler; Schienveine mit gezähntem Außenrand. Leib länglich, cylindrisch.

#### 1. Hylurgus ligniperda.

Scolytus ligniperda Oliv. — Bostichus elongatus Herbst. — Bostichus flavipes Panzer.

Pechschwarz, ziemlich lang behaart, die Fühler braunroth, mit stumpfer Keule, die Flügeldecken punktiert gestreift, mit hockig-rauen Zwischenräumen.

Panzer XLI, 9. — Herbst LXVIII, 17.

Einer der Holzverwüstenden, aber doch nicht so zahlreichen Käfer dieser Gruppe.

## 2. Der Fichtenborkenkäfer.

*Hylurgus piniperda.*

*Dermestes piniperda* L. — *Bostrichus piniperda* Fabr. — *Ips piniperda* Degeer.

Pechschwarz, kurz behaart, mit ziegelrothen Färsen und Fühlern; die Flügeldecken zart punktiert gestreift, mit höherig rauhen Zwischenräumen.

Panzer LXVI, 14. — Herbst XLVIII, 8.

Drittelhalb Liniен lang, walzenförmig, schlank, mit vorn übergebogenem, den Kopf fast ganz versteckendem, gewölbtem, nach vorn verschmälertem Bruststücke. Er ist kleiner und schlanker als der ächte Borkenkäfer.

Man findet ihn zwar hier und da häufig an den Kiefern (*Pinus sylvestris*), aber doch nur an franken Bäumen, zumal solchen, die schon vom Borkenkäfer angegangen sind. Seine Lebensart und Verwandlung ist übrigens wie bei diesem. Die Larve lebt unter der Rinde, der Käfer selbst mehr in den obersten jungen Trieben, welche dadurch auch verderben.

## XXI. *Bostrichus*.

Die Fühler kurz, mit runder, zusammengedrückter, viergliedriger Keule. Das Bruststück kugelig, groß, den Kopf bedeckend. Leib cylindrisch, die Flügeldecken hinten gezahnt.

### 1. Der Borkenkäfer.

*Bostrichus typographus.*

Der Buchdrucker.

Pechschwarz, walzenförmig, etwas glänzend und weichgelblich behaart; der Kopf fast ganz im vorn rauhen, hinten glatten Bruststück versleckt; Fühlerkeule gesb. Der Leib weniger länger als das Bruststück, die Flügeldecken grob gestreift, hinten

In Form eines hohlen Kreises abgestutzt, mit sechs Zähnen, wovon der vierte der größte.

**Panzer XV, 2. — Herbst XLVIII, 1, a.**

Dieses ist der so gefährliche Borkenkäfer, welcher einst im Jahr 1783 auf dem Harze anderthalb Millionen Stämme zerstörte, und noch jetzt hier und da große Verwüstungen anrichtet. Er wird drei Linien lang, kommt auch kleiner vor, und die noch nicht der Lust ausgesetzten, unter der Rinde befindlichen, sind braun-roth. Seine Lebensweise ist die der übrigen Gattungen dieser Familie, daher sie zugleich für diese als Muster gelten kann <sup>a)</sup>.

Er erscheint mit dem ersten warmen Frühlingswetter, indem er aus den Rühen der Borken und anderer Schlupfwinkel, wo er überwintert hat, hervortritt, und dann in die Rinde stechender Eichen oder der Kiefe ein senkrechtes Loch bis auf die Basthaut, von einer Linie Durchmesser, gräbt. Hierauf bohrt das Weibchen allein stammauswärts einen 2—4 Zoll langen und zwei Linien breiten geraden Kanal, zu dessen beiden Seiten es in kleine Grübchen einzeln die kleinen weißlichen glänzenden Eier, zusammen 60—80, legt, und mit dem Wurmmehl, seinen Exrementen, bedeckt. Aus ihnen kommen nach 8—14 Tagen die kleinen fußlosen Maden, welche zugleich zu beiden Seiten des Mutterkanals geschlängelte Gänge nagen, die nach ihrem Ende hin mit dem zunehmenden Wachsthum der Larven gleichfalls an Weite zunehmen. So zeigt sich dann die Innenseite der dann leicht abzulösenden Borke mit solchen, dergestalt parallel dicht aneinanderstossenden, mit Mulf erfüllten Kanälen bedeckt, die wie gefiedert, beiderseits vom Mutterkanale ausgehen, daß der Platz auf das Sparsamste benutzt erscheint, und auch die von entgegengesetzter Seite herankommenden Larven sich bis an die Grenze der andern fortsetzen. Wenn nach 3—4 Wochen die Larven zur Verwandlung bereit sind, so gräbt jede am Ende ihres Ganges eine etwas erweiterte Höhle, um sich darin zu verpuppen. Nach etwa 14 Tagen schlüpft der Käfer aus der Puppenhülle, bleibt noch einige Zeit unter der Borke und gräbt da ohne Ordnung Gänge, die er wiederum hinter sich mit seinem Unrat und Holzmehl

<sup>a)</sup> Vergl. Rossmässler Forstinsekten S. 71. — Graf C. Sternberg in der Isis 1830. — Bechstein Forstinsekten u. s. w.

ausfüllt. Endlich kommt er heraus, um sich zu begatten, und neue Kolonien anzulegen.

Man wird seine Anwesenheit bald an den Löchern der Rinde, oder an dem durch die Weibchen ausgeworfenen Holzmehle gewahr, welches nebst Harztropfen und Spinnengewebe zu außen an dem Baume bemerkbar ist. Durch die Zerstörung des Bastes wird nun der Baum abständig, die Nadeln fallen ab, werden roth und zulezt ist ein solcher Stamm kaum zu Brennholz, und gar nicht mehr zu Bau- und Nutzholz zu brauchen.

In der Regel gehen indeß die Borkenkäfer nur die schon kränklichen Bäume an, und besetzen erst die gesunden, wenn ihre Anzahl zu groß wird. Der ganze Verwandlungsverlauf umfaßt einen Zeitraum von acht Wochen; in der Regel zwei Bruten im Jahr, im Juni bemerkt man aber die meisten. Ein Stamm kann 80,000 Stück Larven enthalten.

*B. pinastri* ist ihm sehr ähnlich, aber fast um 1" größer.

## 2. Der Kupferstecker.

### *Bostrichus chalcographus.*

Pechschwarz, glänzend, Fühler und Füße rothbraun, die Flügeldecken pechbraun, an der Basis schwarz, an der Spitze stumpf, jede mit drei undeutlichen kleinen Zähnen besetzt.

Panzer XXXIX, 20. — Herbst XLVIII, 2.

Eine Linie lang, schlank, vollkommen walzenförmig, wenig behaart; findet sich unter der Borke der Fichten, mit dem Borsten vermischt. Seine Muttermöhre ist aber nicht senkrecht wie bei diesem, sondern zieht sich in schräger Richtung um den Stamm herum. Die Gänge der Larven dringen auch tiefer in das Holz hinein als jene. Er greift zumal die Äste und oberen Stamm spitzen an. Man soll ihn sehr häufig im Klafterholze finden. Seine Anwesenheit verräth sich an den kleinen Löchern, die nur eine halbe Linie im Durchmesser haben.

## 3. Der Lärchenborkenkäfer.

### *Bostrichus laricis.*

Pechschwarz, etwas glänzend, blaßhaarig, mit längeren,

gestreift punktierten Flügeldecken, am Ende rundum ausgeschnitten, mit unregelmäßig gezähntem Rand.

**Panzer XV, 5. — Herbst XLVIII, 13.**

Er ist nur anderthalb Linien lang, im Verhältniß zu seiner Länge ziemlich breit. Auch seine Gänge gehen gleichlängig um den Stamm herum. Unter Fichten- und Lärchenrinden.

## XXII. Cis.

Fühler fast doppelt so lang wie der Kopf, zehngliederig, mit dreigliederig großer, durchblätterter Keule. Augen kugelig, hervorstehend. Bruststück quergehend, gerändert, nach vorn etwas erhöhen und vorgezogen. Der Leib eiförmig, flach.

### Cis boleti.

*Anobium boleti* Fabr.

Pechbraun, etwas behaart, Fühler und Füße rothbraun, das Brustschild ungleich, vorn zurückgebogen, hinten stumpfwinkelig.

**Panzer X, 7.**

Überall in den Holzpilzen der Bäume; zumal in dem Pulver derselben, nachdem sie zerfallen sind, zu finden. 2" lang.

Es gibt noch verwandte Gattungen.

## XXIII. Ptilinus.

Fühler so lang wie der Körper, beim Männchen kammförmig, beim Weibchen tief sägeförmig. Leib walzenförmig, lang; Bruststück breit, convex.

### 1. *Ptilinus pectinicornis*.

Schwarz, länglich-cylindrisch, mit fast kugelrundem Bruststück. Fühler und Füße gelb, ins Ziegelfarbige. 2" lang.

**Panzer III, 7. — Herbst XLVI, 11, 12.**

In altem wurmstichtigem Holze, an Weiden- und Pappelstämmen, hie und da auch in Häusern; er vorzüglich bohrt die Löcher in die Bücher, die in denen alter Bibliotheken oft mitten quer durch ganze Reihen Bände gehen.

## 2. *Ptilinus costatus.*

Schwarz mit braunen Flügeldecken mit drei schwachen Längsstichen; das kugelige Bruststück mit einer Längsrinne.

Gleicht sehr dem vorigen, doch ist er größer, dritthalb Ei-  
nien lang. Findet sich an Pappel- und Weidenstämmen, in welche  
die Weibchen senkrechte Löcher bohren.

## XXIV. *Anobium.*

Fühler fadenförmig, die drei letzten Glieder lang. Der  
Leib länglich, cylindrisch, das Brustschild breit, quergehend,  
breit gerandet.

### 1. *Anobium pertinax.*

Todtenuhr. Fr. Vrillette. *Ptinus pertinax L.* *Anobium striatum F.*

Dunkel schwarzbraun, matt, das Brustschild mit erhöhten  
wie handförmigen Rundzeln, an der Basis jederselbs ein gelber  
behaarter Fleck.

Panzer VI, 4. — Herbst XLVII, 4, c.

In altem Holze, zumal veralteten Möbeln, Tischen, Stühlen u. dgl. Gibt durch Anklopfen der Kinnladen auf die Wand  
einen wie eine Taschenuhr pickenden Ton, der dem Überglauben  
ängstlich ist. Dieser Käfer hat auch besonders die Eigenheit sich  
trotz zu stellen, und sich eher in einem Löffel über dem Feuer  
braten zu lassen, als daß er ein Lebenszeichen von sich gäbe.  
2½ Eiinen lang.

*A. striatum*, braun, mit weißen Härtchen, findet sich auch  
in Häusern.

### 2. *Anobium paniceum.*

Länglich, eiförmig, rostrot, behaart, mit gleichförmig con-  
vexem Brustschild, die Flügeldecken zart gestreift.

Panzer LXVI, 6.

Der gefährlichste Feind der Herbarien, dessen Larve viel in denselben zerstört. Findet sich auch in Insektsammlungen, altem  
Brod, und sonst in Häusern. 1—2" lang.

3. *Anobium tesselatum.*

*Ptinus pulsator.*

Rostbraun, ganz fein rauh, durch gelbliche Härchen wie würfelig gezeichnet.

Panzer LXVI, 3.

Ebenfalls im alten Holz, und gleichfalls einen pickenden Ton veranlassend.

XXV. *Ptinus.*

Fühler so lang wie der Körper, fadenförmig, einfach, zwischen den Augen eingefügt; Leib eiförmig länglich; Bruststück schmäler als die Flügeldecken, etwas aufgetrieben, kappenförmig. Ein Schildchen. Der Leib der Männchen fast walzenförmig, der der Weibchen converter.

Der Dieb.

*Ptinus fur.*

Rostbraun, etwas haarig, das Bruststück hinten stark zusammengeschnürt, über die Mitte mit vier Haarbüschen; die Flügeldecken unterbrochen weiß gebändert, die Schenkel keuliformig und etwas verlängert.

Panzer XCLIX, 4. — De Geer V, Taf. 9, Fig. 1—7.

Oft unendlich häufig in Häusern, an Bretterwänden, Gebälk &c. und zumal den Naturaliensammlungen furchtbar. Geht langsam und scheut das Licht, 2—3" l. Er weiß seine Eier an die allerfeinsten Nischen, z. B. der Glasdeckel über Insektenkästen, zu legen, so daß die höchst kleine Larve ihren Weg beim Auskriechen hinein findet, und zur Zeit der Verwandlung aus den zerstörten staubartigen Thellen der Insekten ein spinnwebenartiges klebriges Gespinnst verfertigt.

---

Dritte Familie.

B o c k ä f e r.

Eine schöne Ordnung oft sehr großer ausgebildeter Käfer, welche man auch wohl an die Spitze dieser Klasse stellen könnte, wenn die vorn angeführten Gründe nicht noch mehr für die Rüsselkäfer sprächen.

Die Käfer dieser Familie sind meist lang, mit parallelen Seiten, und etwas schmalen Flügeldecken, das Bruststück meist cylindrisch, und nicht selten mit Dornen bewaffnet; im reibenden Bewegen veranlaßt es einen quigenden Laut, wie ein nicht eingeschmiertes Rad. Der Kopf geht senkrecht herab, und zeigt ein Gesicht; die Augen sind nierenshäftig, die Unterlippe ausgeschweift.

Ausgezeichnet sind ihre borstenförmigen, langgliederigen Fühler, die oft die Länge des ganzen Körpers und noch mehr erreichen. Sie scheinen für den Gehörssinn empfindlich. Die Füße sind mäßig lang, mehr eingezogen, und zeigen vier breite Tarsenglieder, wovon das dritte zweilappig, die Unterseite aller schwammig-polsterig ist.

Ihre Larven leben sämmtlich im Holze, in welches sie tiefe Gänge längs desselben bohren, mit Holzmehl erfüllen, und sich darin verwandeln. Sie sind meist ohne alle Füße, oder nur mit ganz kurzen versehen.

In den heißen Ländern beider Welten befinden sich die größten Gattungen; bei uns erscheinen sie gewöhnlich erst im hohen und im Spätsommer.

XXVI. *Prionus*.

Kinnbacken groß und stark, Kinnladen kurz, cylindrisch, einfach, behaart; Fühler borstig, bisweilen gesägt, dick, halb so lang als der Körper. Bruststück quer, flach, an den Seitenrändern bedornt oder gezähnt. Flügeldecken flach.

#### 1. *Prionus giganteus.*

Schwarz, mit rostbraunen Flügeldecken; das Brustschild jederseits mit zwei Zähnen; die Fühler kurz.

*Olivier Col. VI, F. 21.*

Einer der größten Käfer; an vier Zoll lang. Er lebt in Cayenne und man ist seine Larve wie die mehrerer anderer amerikanischen.

#### 2. *Prionus scabricornis.*

Schwarz, ins Simumetbraune; etwas behaart, das Brustschild nach vorn schmäler, mit nur einem kleinen Zahn; die Fühler an den ersten fünf Gliedern mit kleinen Dornspitzen besetzt.

*Olivier IV, XI, 42.*

Gegen zwei Zoll lang; bei uns nicht häufig; mehr im südlichen Deutschland an morschen Rosskastanien und Linden.

#### 3. *Prionus cervicornis.*

Braun, das Brustschild gerandet, jederseits mit drei Zähnen, die Kinnbacken wie kurze Geweih aussehend, hervorstehend, an der Außenseite mit einem Dorn; die Fühler kurz.

*Rösel II, Taf. 4. — Olivier II, F. 8.*

Ebenfalls sehr groß, über drei Zoll lang. Seine baumen-dicke fußlose Larve lebt im Käsebaum (Bombax) in Südamerika, und wird wie der Palmwurm, am Spieße gebraten, gegessen.

#### 4. Der Zimmermann.

##### *Prionus faber.*

Flach, groß, pechbraun, mit ebenem und höckerigem, am Rande gekerbtem Brustschild, die Flügeldecken lederartig genarbt.

*Panzer IX, 5.*

Das Männchen hat sägezähnige, zwölfgliederige Fühler, die länger als der Körper sind; auch die Vorderbeine sind länger, und am Ende der helleren Flügeldecken findet sich ein Spitzchen; beim Weibchen sind die Fühler dünn, kürzer als der Leib, das

Bruststück höckerig runzlig, und hat hinten einen spitzen Dorn, die Flügeldecken sind fast schwarz. 2" lang.

Die Larve lebt in Eichen und Buchen.

### 5. Der Gerber.

#### *Prionus coriarius.*

Pechbraun, mit dicken Füßen und Fühlern, beim Männchen etwas gewölbt, das Bruststück breit, kurz, schmäler als die Flügel, jederseits mit drei Zahnspitzen; die Flügeldecken mit undeutlichen Längslinien.

Panzer IX, 7.

Anderthalb Zoll lang. Nicht so selten als der vorige.

## XXVII. Cerambyx.

Kopf vorstehend, etwas geneigt; Fühler fadenförmig, langgliederig; Augen nierenförmig; Bruststück etwas kugelig, runzlig-höckerig, meist bedornt. Leib und Flügeldecken lang, schmal.

### 1. Cerambyx heros.

Länglich, convex, nach hinten verschmälert, schwarzbraun, das Brustschild runzlig, glatt, jederseits mit einer Dornspitze, die Flügel am Ende pechbraun.

Panzer LXXXII, 1.

Nicht ganz zwei Zoll lang. In Eichbäumen.

### 2. Cerambyx cerdo.

Schmal, schwarz, das Bruststück querunzlig, glatt, an jeder Seite mit einer Spitze, die Flügeldecken nach dem Ende zu verschmälert, runzlig.

Panzer ib. 2.

Einen Zoll lang; in Buchen.

### 3. Cerambyx alpinus.

*Callichroma alpina D.*

Schmal, aschblau, das Bruststück mit zwei Spitzchen und vorn einem schwarzen Fleck; die Flügeldecken vorn und hinten

mit seidenschwarzem Fleck, in der Mitte mit eben solcher Querbinde, die Knoten der Fühlerglieder mit einem schwarzen Haarbüschel.

*Olivier IX, 58.*

Auf Gebirgen. Einen starken Zoll lang. Er hat einen eigenen Geruch.

4. *Cerambyx moschatus.*

*Callichroma moschata D.*

Schmal, stahlgrün, mit stahlblauen Fühlern.

*Olivier IV, 2, 7.*

Häufig auf Weiden. Sein eigenthümlicher Geruch wird bald mit dem von Rosen, bald mit Moschus verglichen. 4" l. In der Krimm findet sich ein ihm fast ganz gleichender (*C. ambrosiacus*), nur mit blutrothem Brustschild.

**XXVIII. Callidium.**

Flach, mit scheibenförmigem unbewehrtem Bruststück; Fühler borstenförmig, kürzer als der Leib.

1. *Callidium bajulus.*

Bräunlich oder schwarz, mit langen weichen weißen Haaren; auf dem Bruststück zwei Höcker; auf den Flügeln zwei bis vier weißliche Flecken.

*Panzer LXX, 1.*

An Kiefern, Fichten &c. 9" l.

2. *Callidium violaceum.*

Breit, niedergedrückt, obenher violettblau, mitunter ins Grüne. 7 Liniен lang.

**XXIX. Clytus.**

Fühler sadensförmig, Bruststück kugelig, unbewaffnet, der Leib cylindrisch, dicht anliegend, behaart.

#### 1. *Clytus arietis.*

Schwarz, Fühler und Beine rostgelb; Bruststück abgerundet, vorn und hinten gelb gerandet; Schildchen gelb, Flügeldecken mit vier gelben streifenförmigen Querbinden, wovon die zweite schief.

Panzer LXX, 1.

Auf Waldwiesen.

#### 2. *Clytus mysticus.*

Schwarz, schmal, die Flügel an der Basis rothbraun, in der Mitte mit drei gekrümmten weißen Linien, auch die Spitze der Flügeldecken weisshaarig.

Panzer LXXXII, 9.

Acht Linien lang. Häufig im Frühjahr in den Obstblüthen, und besonders in denen des Weißdorns.

### XXX. *Lamia.*

Fühler borstenförmig, sehr lang mit langen Gliedern. Brustschild abgerundet, dornig. Flügeldecken flach. Das Gesicht grossenförmig herabgehend.

#### 1. *Lamia longimana.*

*Aerocinus longimanus.* — Fr. Arlequin de Cayenne.

Die Fühler länger als der Leib, die Vorderfüße sehr lang und groß, mit an der Innenseite dornigen Schienbeinen; das Bruststück kurz, an jeder Seite mit einer in eine Spitze endigenden eingefügten Kugel; die Flügeldecken flach; etwas breit, gesäumt, in vier Spitzen endigend, und wie das Bruststück ungleich, mit vertieften Furchen und vorn wie eingestochenen Löchern; die Farbe erdbraun mit schwarzen Flecken und gelben und rothen Zeichnungen.

Rösel II, Taf. 1.

Fast dritthalb so lang und einen breit. In Südamerika.

2. Der Schreiner.

Lamia aedilis.

*Acanthocinus aedilis Déj.*

Die Fühler des Männchens vier bis fünfmal so lang als der Körper; die Flügel flach, ockergelb ins Erdbraune, etwas nebelig gewellt. Das Weibchen mit hervorstehender Legeröhre.

Panzer 119, 22.

Etwa 8" lang. Auf Holzplättchen und in den Häusern der Tischler sc. gar nicht selten.

3. Lamia oculator.

Groß, die Fühler aschgrau, anderthalbmal so lang als der Leib; der Körper gedrungen, stark. Oberseite pechschwarz, glänzend, das Bruststück schmal, vorn und hinten mit weißen Linien gesäumt, jederseits mit einem Höcker; die Flügeldecken gesurkt, jede mit vier weißen in der Mitte rostgelben Flecken, wovon die dritten quer gehend.

Olivier 67, II, 2.

Anderthalb Zoll lang; ein schöner Käfer. Um Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hause.

4. Lamia tristis.

Mórimus tristis.

Ashgrau, die Flügeldecken fein schwarz gefleckt, mit vier großen schwarzen Flecken. Die Fühler länger als der Leib, das Brustschild jederseits mit einem Dorn.

Olivier IX, 62.

Soll im südlichen Frankreich im Cypressenholt leben. Der Käfer ist so groß wie der vorige, wohl noch gestreckter, kommt aber auch kleiner vor.

5. Der Weber.

Lamia textor.

*Doreadion textor Dalm.* *Pachystola textor Déj.*

Mattschwarz mit feingeführten Flügeln; die Fühler mehr

als halb so lang als der Leib, dick, das Bruststück seitlich mit einem spitzen Dorn.

Panzer XIX. 1.

Dieser Käfer ist dick, gedrungen, gewölbt, wie die vorigen 4"---15" lang, größer und kleiner. Findet sich an Weidenbäumen, Buchen und Birken oft ziemlich häufig.

6. Der Schlotfeger.

*Lamia fuliginator.*

*Dorcadion fuliginator.*

Schwarz, mit etwas vornigem Bruststück; die Flügeldecken aschgrau mit dem Alter (?) ganz schwarz.

Panzer 21.

Einen halben Zoll lang. Die ganz schwarze, weit häufiger vorkommende Art scheint doch von der aschgrauen, die man deshalb auch als *L. morio* unterscheidet, specifisch verschieden.

XXXI. Saperda.

Fühler borstig, so lang wie der Körper, in einen Ausschnitt der Augen eingefügt. Fäster fadenförmig. Kopf herabgeneigt. Brustschild unbewehrt, wie der Leib cylindrisch.

1. *Saperda carcharias.*

Graugelblich behaart, die Flügeldecken glänzend schwarz gefärbt; die Glieder der Fühler mit schwarzer Spitze, nicht zu lang.

Panzer LXIX. 1.

Über und unter einem Zoll lang, stark. Zumal an Pappeln.

2. *Saperda oculata.*

Das rothgelbe Bruststück mit zwei schwarzen Punkten, die Flügeldecken schwarz.

Panzer I. c. 18.

Lang und schmal fast cylindrisch; sieben Linten lang.

### 3. *Saperda scalaris.*

Schwarz, behaart, längs der Flügelsnaht ein gelber, sechsmal mit schwarzen Querstufen unterbrochener Streif.

Panzer ib. 3.

Ebenfalls lang und schmal, 7" lang. Hat auch noch mehr schwefelgelbe Flecke. Man kann auch die Flügeldecken wie gelb, mit zwei schwarzen rechtwinkeligen Zackenlinien gezeichnet, ansehen.

### 4. *Saperda tremula.*

Blaugrün, zwei schwarze Punkte auf dem Brustschild, und vier schwarze Flecke längs jeder Flügeldecke.

Panzer Taf. 7.

Auf Linden und Obstbäumen. 8—9 Linien lang, etwas breiter wie die vorigen.

## XXXII. *Rhagium.*

Stencorus.

Fühler kürzer als der Körper. Kopf groß, bei den Augen aufgetrieben. Flügel etwas breit und flach, nach hinten wenig schmäler. Bruststück mit seitlichem Dorn.

### 1. *Rhagium mordax.*

Schwarz, dicht punktiert und mit kurzen ockergelben Härchen besetzt, die Flügeldecken mit zwei verkürzten, von einander entfernt stehenden Binden.

Panzer LXXXII, Taf. 3 (schlecht).

In Wäldern; die Larve bohrt unter der Rinde der Fichten eine schneckenförmige Vertiefung, in der sie sich verwandelt, und kriecht durch ein Loch in der Mitte heraus.

### 2. *Rhagium inquisitor.*

Schwarz, punktiert, dicht gelblichgrau behaart, die Flügeldecken mit zwei ziegelfarbigen einander nahe stehenden Binden, zwischen welchen ein großer glatter, glänzender Fleck.

Panzer ib. 4.

Etwas kleiner als der vorige; ebendaselbst. Eine dritte Gattung, *Rh. indagator*, ist schwarz mit aschgrauen Haaren und erhabenen Längslinien auf den mit Binden versehenen gefleckten Flügeln. Beide auf Waldwiesen.

### XXXIII. *Leptura*.

Fühler borstenförmig, neben den Augen eingefügt. Bruststück nach vorn kegelförmig verjüngt; Flügeldecken nach hinten schmäler.

#### 1. *Leptura rubrotestacea*.

*Leptura rubra*.

Schwarz, das Weibchen mit ziegelrothen Flügeldecken und Bruststück; das Männchen mit schmutziggelben Flügeln.

Panzer LXIX, 42.

Nicht selten an Bretterwänden. 9" l.

#### 2. *Leptura quadrifasciata*.

Schwarz, glänzend, die Flügeldecken mit vier breiten gelben Querbinden, wovon die vorderste unterbrochen.

Panzer CXVII, 8.

Acht Linien lang, hinten schmal. Häufig auf Waldblumen.

#### 3. *Leptura melanura*.

Schwarz, grauhaarig, mit rothen Flügeldecken; die Naht und Spitze schwarz.

Panzer LXIX, 19.

4" lang. Häufig auf Schirmplanten.

Unter dem Namen *Pachyta* sind die etwas breiteren und kürzeren *Lepturen* mit mehr rundlichem Bruststücke gesondert, z. B. *P. collaris* und *virginea*, schwarz mit rotem Bruststück, (Panzer CXVII 5 und 6) jene braunhaarig und schmäler, diese glatt und breiter. Beide auf Blumen.

*Pachyta quadrimaculata* mit braungelben Flügeln und vier fast vierseitigen Flecken trifft man auch in unseren Wäldern.

## XXXIV. Molorchus.

### Necydalis.

Die Flügeldecken kaum so lang als das Bruststück; die Unterflügel bedecken den Leib. Die Schenkel keulensförmig.

#### 1. Molorchus abbreviatus.

##### Necydalis major L.

Schwarz, mit rostbraunen ungefleckten Flügeldecken, Fühlern und Füßen. Die Hinterkeulen dunkelbraun, die Fühler kurz.

Panzer XLI, 20.

Einen Zoll lang. An Erlengebüsch u. a.; selten.

#### 2. Molorchus dimidiatus.

Schwarz, welch behaart, die Flügeldecken hellbraun mit einem schiefen weißen Strich. Die Fühler des Männchen länger als der Körper.

Panzer XLI, 21.

5" lang. Nicht selten auf Blumen im Walde.

#### 3. Molorchus umbellatarum.

Schwarz, behaart, die Flügeldecken braun, schwarz eingefasst. Die Schenkel dick, an der Basis weiß. Die Fühler der Männchen sehr lang.

Panzer CXIX, 24.

Ebenso klein wie der vorige; an gleichen Orten.

## XXXV. Donacia.

Fühler fadenförmig; Kopf vorgestreckt, durch einen Hals vom Bruststück unterschieden. Flügeldecken fast dreieckig, hinten schmäler und abgestutzt. Die Schenkel keulensförmig, bisweilen gezähnt.

Diese Käfer finden sich blos an Wasserpflanzen, zumal Schilfzstengeln, Seerblumenblättern &c., in denen sie, wie es scheint,

ihre Verwandlung bestehen. Sie sind bronzeartig metallisch schimmernd. Ihre Gäfte scheinen sehr scharf zu seyn, da sich die Nadel, an die man sie sticht, sehr bald mit Grünspan an der Basis besetzt.

1. *Donacia sagittariae.*

*Donacia aquatica, aurea, collaris.*

Etwas flach, obenher seidenglänzend, grün unten goldig behaart, das viereckige Bruststück runzlig punktiert, die Flügeldecken punktiert-gestreift, mit Eindrücken. Die Hinterschenkel mit einem Zahn.

Panzer XXIX, 7, 8.

An Wasserpflanzen. 5" l.

2. *Donacia lemnae.*

*Donacia marginata, vittata.*

Flach, bronzebraun, untenher aschgrau seidenartig glänzend, Bruststück runzlig, Flügeldecken mit Eindrücken, und einem purpurfarbigen Streif; die Schenkel unbewaffnet.

Panzer XXIX, 12. *D. limbata.*

Von gleicher Größe und ebendaselbst.

3. *Donacia nympheae.*

Kupferroth, mit aschgrau behaartem Leibe; die Schenkel hinten gezähnt.

Panzer ib.

Den Donacien verwandt sind die ostindischen und afrikanischen Sagra, deren Kinnbacken aber ungespalten sind. Ihr Leib ist auch dicker, gedrungen, höher, und die Schenkel stärker, dabei sind sie vom prächtigsten blauen und grünen Metallglanz. So z. B. *S. femorata*, goldgrün, und *S. punctata* violet-kupfergoldig, mit ungeheuer dicken Hinterschenkeln.

**XXXVI. L e m a.**

Fühler schnurförmig, das erste Glied kugelig, dick; die Augen hervorstehend, das Bruststück viel schmäler als die Flügeldecken.

#### 1. *Lema merdigera.*

*Crioceris merdigera. Chrysomela merdigera.*

Schwarz, Bruststück und Flügel braunroth, ungefleckt.

#### Panzer XLV, 2.

Das Bruststück hat auf jeder Seite einen tiefen Eindruck. 4" l. Häufig an der weißen Lilie, Kaiserkrone u. a. Die Larve schleift ihren schmuckiggrünen klebrigen Unrat über sich, so daß sie zuletzt ganz darunter versteckt ist.

#### 2. *Lema asparagi.*

Länglich, schwarzblau, das rothe Bruststück mit zwei schwarzen Punkten. Die Flügeldecken gelb mit einem gemeinschaftlichen schwarzblauen dreifachen Kreuz, zuweilen verlossen.

#### Panzer LXXI, 12.

Auf Spargel häufig.

Es gibt noch verwandte Gattungen, auf den Convallarien, Gräsern u. s. w.

---

#### Vierte Familie.

#### P r a c h t k ä f e r.

#### (*Sternoxi, Serricornia.*)

Das Brustbein verlängert sich unten bis fast an den Mund als eine Platte, und hinterwärts in eine Spieze als ein stumpfer Dorn, oder gabelförmig.

Diese Käfer sind schmal, manche fast eisförmig oder mit nach hinten zugespitzten Flügeln versehen; ihr Kopf geht herab und steckt in dem nach vorn verschmälerten Bruststück. Die Fühler sind oft sägeartig.

Sie haben einen harten Körper, oft schön metallisch glänzend, und leben bloß von und auf Vegetabilien. Bei der Berührung stellen sie sich tot.

Ihre Larven stecken im Holze oder in Pflanzenwurzeln.

## XXXVII. Schnellkäfer.

### Elater.

Die Hinterwinkel des Brustbeines spitz; das Brustbein in eine Spalte der Mittelbrust passend, aus der es sich herausheben und wieder hineinschnappen kann. Der Leib parallel lang und schmal.

Diese Käfer haben die bekannte Eigenschaft, sich, wenn sie auf den Rücken gefallen sind, durch das Einschnappen des Brustdornes in die Höhe zu schnellen und so wieder auf die Füße zu bringen, welche ihnen zu kurz sind, um sich mittels derselben allein aufzuhelfen. Bedenkt man, daß auch diese so charakteristischen, leicht kennlichen Käfer sich fast überall auf Erden als die verschiedensten Species finden, die gewiß nicht durch Ausartung und Wanderung dahin verbreitet worden, so muß man sich abermals überzeugen, daß der Erdball auf allen Punkten seiner Oberfläche gewisse Formen hervorzubringen im Stande gewesen ist.

Ihre Larven sind sehr lang und schmal, und haben sechs Beine.

#### 1. Elater flabellicornis.

*Melasis flabellicornis.*

Braun, das Männchen mit einem fächerförmigen Büschel an den Fühlern.

Olivier T. III, F. 28.

In Ostindien.

#### 2. Der Cucuju.

*Elater noctilucus.*

*Pyrophorus noctilucus.*

Graubraun, auf jeder Seite des Bruststückes ein langer, gelber, des Nachts leuchtender Fleck.

Olivier T. II, F. 14. — Herbst CLVIII, 4.

Der bekannte Leuchtkäfer Westindiens und Nordamerika's, dessen Wirkung aber doch sehr übertrieben worden ist. Er ist etwas über 1" lang, und unscheinbar dunkelbraun gefärbt. Die

Larve soll in Zuckerrohr leben. *Elater phosphoreus* in Surinam ist ihm ähnlich, aber kleiner. Der leuchtende Stoff findet sich am Bruststück und Bauch und scheint durch jene Flecke hindurch.

3. *Elater furcatus.*

*Pericallus sulcatus.*

Gelb, die Flügeldecken mit drei braunen Längskreisen.  
In Guyenne. Ein schöner Käfer; schmal, 1" 4" l.

4. *Elater murinus.*

*Agrypnus murinus.* Schmid. Gr. taupin.

Erdfarbig, durch kurze Härchen wie schwarz, weiß und braunlich gewölkt, Fühler und Tarsen rostgelb.

Olivier II, T. 2, F. 9.

Sehr gemein auf Wiesen und zumal Fahrwegen. Er fliegt viel und zeigt dabei seinen rothgelben Bauch. Ist ziemlich breit und etwa 6" lang.

5. *Elater rufus.*

*Athous rufus.*

Rostroth, Kopf und Mitte des Brustschildes dunkler, die Augen schwarz.

Panzer X, 41.

Einer der größten hiesigen Landes. An Fichtenstämmen.  
Der E. (*Steatoderus*) *ferrugineus* ist ihm ähnlich.

6. *Elater pectinicornis.*

*Ludius pectinicornis.*

Metallisch, bronzegrün, schmal, die Fühler der Männchen fämsförmig.

Panzer LXXVII, 4.

Auf Wiesen. 8" lang.

7. *Elater aeneus.*

*Ludius aeneus.*

Etwas breit, metallischglänzend grün oder violettblau, glatt,

die Flügeldecken hinten etwas breiter, Fühler und Füße einfach, letztere roth.

Im Grase, unter Steinen; häufig. 7<sup>'''</sup> l.

### 8. *Elater niger.*

*Ampedus niger.*

Länglich, schwarz, glänzend, braun behaart, mit schwach gestreiften an der Basis gesurchten Flügeldecken; die Fühler sägeähnig.

Herbst X, XLII, 48.

Häufig auf Waldwiesen. 7 Linien lang. Professor Rossi zu Pisa hat ihn meist in der Begattung mit *Cantharis melanura* gefunden.

### 9. *Elater segetis.*

*Agriotes segetis.* *Elater lineatus L.* *Elater striatus Fabr.*

Länglich, schmal, braun, grau behaart, die Flügeldecken grau, braun liniert, Fühler und Füße ziegelroth.

Panzer XCIII, 43.

In Saatfeldern und Gärten überaus häufig. Die Larve ist schmal, glatt, gelb, und verwüstet die Keime der Getreidesaat und die jungen Kartoffelknollen. Sie lebt mehrere Jahre. Der Käfer ist schmal, 5<sup>'''</sup> lang.

## XXXVIII. *P r a c h t k ä f e r.*

### *Buprestis.*

Mit fadenförmigen, kurzen, oft sägeartigen Fühlern; Bruststück quergehend; Leib eiförmig-länglich, flach, nach hinten bisweilen verschmälert oder gezahnt.

Unter ihnen sind die prachtvollsten aller Käfer, wie Gold und Edelstein schimmernd, doch auch einige unbedeutend gefärbte; sie laufen langsam, fliegen aber schnell, zumal in der heißen Sonne. Die Tropenregionen haben die schönsten aufzuweisen.

Ihre Larven leben im Holz, in welches sie Längsgänge, mit

Mulm ausgefüllt, bohren, und Jahre lang darin verwandelt liegen, ehe sie ausschliefen.

1. *Buprestis gigantea.*

*Euchroma gigantea.*

Kupferroth, in der Mitte grün, metallisch glänzend, mit runzeligen, am Ende zweizähnigen Flügeln; das Brustschild glatt.

*Olivier* II, T. 1, F. 1. — *Merian* Taf. 50.

Die größte Art, an 2 Zoll lang, das Weibchen hinten mit langer Egeröhre. In Südamerika und Westindien.

2. *Buprestis rutilans.*

*Lampra rutilans.*

Schön metallisch grün, an den Seiten etwas rothgoldig, die Flügeldecken gestreift und am Ende sägeähnig.

*Panzer* LVIII, 8.

Sechs Linien lang; etwas breit; in Laubwäldern.

3. *Buprestis vittata.*

*Chrysochroa vittata.*

Schön metallgrün, die Flügeldecken mit einem goldrothen Seitenstreif, drei erhabenen Rippen, und punktiert, an der Spitze zweizähnig.

*Sulzer* Kennzeichen der Insekten Taf. VI, Fig. 14. — *Olivier* III, 17.

Eine der schönsten; in Indien; fast anderthalb Zoll lang.

---

Fünfte Familie.

K u g e l k ä f e r.

(*Cyclica.*)

Größtentheils kleine, obenher halbkugelige oder convex längliche, glatte Käfer, ebenfalls häufig von schönem Metallglanz,

und mit breiten, fast aussichenden Fußblättern versehen. Der Kopf steckt im Bruststück, und dieses grenzt ziemlich genau an die Flügeldecken, ohne Absetz. Die Fühler sind faden- oder schnur- förmig, nach Außen etwas dicker.

Ihre Larven unterscheiden sich von denen der vorigen, daß sie am Tage auf Pflanzen leben und gefärbt sind. Sie haben sechs Füße, sind meist mit Schleim überzogen, und im Ganzen träge. Einige indes halten sich im Inneren der Pflanzen- stengel auf.

### XXXIX. *Chrysomela*.

Fühler schnur förmig, vor den Augen eingefügt, nach Außen dicker. Kinnbacken kurz, Kinnladen zweilappig; Brustschild und Kopf abwärts geneigt. Leib kugelrund oder eiförmig, sehr convex.

#### 1. *Chrysomela populi*.

Eiförmig, dunkelblau, mit großen, punktierten, ziegelrothen Flügeldecken; ihre Enden schwarz.

Panzer C, Taf. 3.

An Weiden, Pappeln und Eichen, zumal in Wäldern sehr gemein. 5—6 Linnen lang.

#### 2. *Chrysomela sanguinolenta*.

Eiförmig, blauschwarz mit runzlig-punktierten schwarzen, rundum blutroth eingefassten Flügeldecken.

Panzer XVI, 10.

Im Gras. 5" lang.

#### 3. *Chrysomela coriaria*.

Fast kugelig, ungeflügelt, schwarz, ungleich lederartig punktiert, auf der Unterseite violet.

Panzer XLIV, 2.

Im Grase, auf Wegen. 5—6" l.

4. *Chrysomela haemoptera.*

*Chrysomela hottentotta* *Fabr.*

Fast kugelig, ganz schwarzblau, die Fühler an der Basis rothbraun, die Punkte der Flügeldecken tiefer, in unregelmäßigen Reihen.

Mehr auf Bergtriften, unter Steinen, im Frühling. Etwas kleiner als die vorige.

5. *Chrysomela staphylaea.*

*Chrysomela cuprea.*

Conver-eiförmig, braun, obenhin bronzenfarbig, der Rand des Brustschildes wulstig.

*De Geer V, VIII, 24.*

Im Frühling unter Steinen u. a.

6. *Chrysomela graminis.*

Länglich-conver, glänzend grün, in der Mitte blau; die Flügeldecken grob punktirt, rothgoldig.

Auf Bergtriften. 5" l.

7. *Chrysomela cerealis.*

Eiförmig, fein punktirt, rothgoldig, das Brustschild mit drei, die Flügeldecken mit fünf dunkelblauen Streifen.

*Panzer* 44.

Im Frühling, auf Bergtriften, unter Steinen. 5" l.

8. *Chrysomela fastuosa.*

Eiförmig-conver, prächtig goldgrün, das Brustschild in der Mitte blau glänzend, die Naht der Flügel, und ein kurzer Streif auf der Mitte derselben, dunkelblau.

*Panzer* XLIV, 42.

5" l. Ebendaselbst; auch an Gemüsepflanzen sc.

9. *Chrysomela aenea.*

Glänzend grün oder blau, dicht punktiert, mit rostgelbem Ast. Das Brustschild quer viereckig. 4" l.

Panzer XXV, 9.

Zumal auf den Erlen, deren Blätter sie zerstört. 4" l.

10. *Chrysomela vitellinae.*

*Chrysomela vulgatissima L.*

Glänzend dunkelgrün oder blau bis ins Schwarze, auch wohl kupferroth, mit fein gestreift punktierten Flügeldecken.

Panzer XLIV, 16. (*Galleruca vit.*) CII, Fig. 4. (*Galleruca betulae*).

Auf Weiden, Pappeln u. dgl. in unendlicher Menge, die Blätter zerfressend. 2" l.

**XL. Helodes.**

Länglich, mit vorgestrecktem Kopf und Bruststück. Die letzten fünf Fühlerglieder eine verdickte Keule bildend.

*Helodes phelandrii.*

Schwarzgrün, der Rand des Brustschildes ausgeschweift, gelb, die Flügeldecken punktiert-gestreift, gelb, mit einem kupferbraunen Mittelstreif.

Panzer LXXXIII, 9.

An Wasserpflanzen. Die Larve findet sich im Inneren aller Stengel des Wasserschens.

**XLI. Cryptocephalus.**

Gr. Gribouri.

Fühler fadenförmig, halb oder ganz so lang als der Körper, der Kopf senkrecht herabgehend. Das Bruststück sehr convex. Leib eisförmig-cylindrisch; Steiß nackt.

Die Larven dieses Geschlechtes sollen Sackträger, wie manche Schmetterlingsraupen seyn.

### **Cryptoccephalus sericeus.**

Goldgrün oder kupferroth, auch blau, punktirt. Flügeldecken etwas runzlig.

#### **Panzer CII, 43.**

Auf Blumen, zumal Eichoraceen. 3<sup>mm</sup> l.

Die metallglänzenden prächtigen Eumolpus der heißen Zone sind diesen Käfern verwandt, nur größer und mehr vom Bau der Chrysomelen. Auch bei uns gibt es einen schönen, Eumolpus pretiosus, der selbst auf den jenaischen Bergen gefangen worden ist.

### **XLII. Erdloch.**

#### **Haltica.**

Mit verdickten, zum Springen eingerichteten Hinterschenkeln.

#### **Der gemeine Erdloch.**

##### **Haltica oleracea.**

Länglich-eisbärmig, convex, grünblau mit schwarzen Fühlern.

#### **Panzer XXI, 4.**

2<sup>mm</sup> lang. Auf Ueckern, zumal der Rübsaat, und in Mistbeeten, wo er oft alle Kohlpflanzen, Radieschen u. s. w. zeragt. Zu seiner Vertilgung hat man theils Biegen der Pflanzen mit Kalkwasser, theils das mechanische Mittel vorgeschlagen, die Wände der Mistbeete mit Theer zu bestreichen und sodann mit einer feinen Brause die Pflänzchen zu begießen, worauf jene Insekten alle am Theer haften bleiben.

Er findet sich auch auf Haselgesträuch. Es gibt noch eine Menge anderer Species, auf verschiedenen Pflanzen.

### **XLIII. Galeruca.**

Unterscheidet sich vom vorigen durch den Mangel der Springfüße und daß die Vorderbeine dicht zusammen stehen. Das Bruststück ist klein und kurz, die Flügeldecken eisbärmig, groß.

### 1. *Galeruca Tanaceti.*

Schwarz, ungesleckt, etwas glänzend, grob und dicht punktiert, die Flügeldecken mit schwachen erhabenen Linien.

Panzer CII, 2.

Auf Wiesen und Bergtriften. 4<sup>mm</sup> l. Kommt auch grau vor. Ein träger Käfer. *Galeruca rustica* ist wenig verschieden.

### 2. *Galeruca capreae.*

Länglich-eiförmig, schwarz, oben glatt, gelbgrau, der Kopf und zwei Brustschildflecken schwarz, die Fühler ziemlich lang.

Panzer CII, 7.

In Unzahl an den Weidenruthen, deren Blätter sie zernagt.

### 3. *Galeruca alni.*

Eiförmig, violettblau, glänzend, mit violetrothen dicht punktierten Flügeldecken; Fühler und Füße schwarz.

Panzer CII, 3.

Un Erlenblättern. 4<sup>mm</sup> l.

## XLIV. Schildkäfer.

### Cassida.

Der Leib unter dem breiten, schildförmigen Bruststück und Flügeldecken verborgen.

Sonderbar gestaltete, längliche, kreisrunde, flach oder in der Mitte pyramidal erhöhte Käfer, die wie eine kleine Schildkröte unter ihrem viel breiteren Oberpanzer stecken. Dieser ist mit einem Rande eingefasst.

Ihre Larven leben gleichfalls offen wie die anderen dieser Familie. Sie sind breit, kurz und platt, und am Rande mit verzweigten etwas dornigen Anhängseln besetzt. Sie haben sechs Füße, und treiben mittels ihres aufgerichteten gabelförmigen Schwanzes ihre Excremente hervor, welche sich auf dem Rücken anhäufen.

Man trifft sie auf Disteln, Quirlpflanzen u. a., jedoch in

Europa nur wenige und kleine. Dagegen haben die heißen Länder viel größere, und von den alterssonderbursten Formen aufzuweisen.

1. *Cassida gibbosa.*

Schwarz, fast kreisrund, auf dem kleinen Brustschild zwei gelbe haarige Flecken.

*Olivier* 97, 1, 6.

In Brasilien; fast einen Zoll lang.

2. *Cassida bidens.*

Schwarz, die Flügeldecken nach vorn breit, in zwei Ecken mit scharfer Kante hervorgezogen, die Mitte grob punktirt, erhaben, und in einen langen aufrechten, am Ende zweitheiligen Dorn ausgehend.

*Olivier* ib. 2, 20.

Ebenfalls in Brasilien zu Hause. Etwa 6" l. Die Flügeldecken verschmälern sich nach hinten und haben die Form eines Wappenschildes; der gerade Dorn auf ihrem Rücken ist etwa zwei Linien lang.

3. *Cassida murraea.*

Eiförmig, schwarz, das Bruststück eckig, die Flügeldecken punktirt gestreift, an der Naht stark, in der Mitte weniger schwarz gefleckt.

*Herbst* VIII, 130, 42.

Etwa 4" l. Obenher röthlich, seltener grün, im Tode braun. Auf Disteln u. a. Pflanzen.

4. *Cassida equestris.*

Schwarz, obenher grün, die Ecken des Brustschildes abgerundet.

*Panzer* XCVI, 5.

Breit eckig, 4" l. Häufig auf Kräutern, zumal der Minze. Sie soll sich von der kleinen *C. viridis* durch einen Silberstreif unterscheiden, der jedoch nach dem Tode verschwindet.

### 5. *Cassida ferruginea.*

Länglich-eisförmig, obenher braun, etwas goldig, die Flügeldecken mit erhabenen Rippen.

Panzer ib.

Raum 3" lang. Auf Kräutern oft häufig.

### XLV. *Hispa.*

Fühler cylindrisch, hervorstehend. Kopf senkrecht herabgehend; Leib länglich-eisförmig, nach vorn schmäler. Bruststück trapezisch-viereckig.

Der Stachelkäfer.

#### *Hispa atra.*

Mattschwarz, am ersten Fühlerglied ein Dorn, am Bruststück paarweise Stacheln, an den Flügeldecken zahlreiche kleinere.

Panzer XCVI, 8.

2" l. An Graswurzeln, zumal an Mauern und Planken.

---

Gehste Familie.

Schattenekäfer.

(*Melasomata.*)

Längliche, seltener rundliche Käfer mit weichem Bauche und nicht sehr harten, biegsamen Flügeldecken. Der Kopf steckt im Brustschild; die Füße endigen nur mit einer Kralle.

Sie sind theils Nachtkäfer, die erst in der Dunkelheit hervorkommen, theils sitzen sie auf Blumen.

Ihre Larven haben sechs Füße und nähren sich von trockenen Pflanzenteilen.

## XLVI. Anisotoma.

Fühler mit fünfgliedriger Keule, der Körper glatt, convex, eirund oder kugelig, wie ein Hanfkorn.

### Anisotoma abdominalis.

Halbkugelig, glänzend, schwarz, untenher pechbraun, die Flügel sehr regelmäig punktirt-gestreift.

Panzer XXXVII, 9. A. glabrum.

In fauler Baumrinde, Pilzen u. s. w. 2<sup>mm</sup> l.

## XLVII. Mordella.

Fühler fadenförmig; Körper länglich, nach hinten schmäler; der Bauch in einen Stachel endigend.

### Mordella aculeata.

Schwarz, mit seidenartigen dicht anliegenden Härchen besetzt; der Stachel so lang als der Bauch.

De Geer V, 25, 1.

3<sup>mm</sup> l. Auf Blumen häufig; stellt sich beim Fangen leblos, entchlüpft aber sehr schnell durch die Finger.

## XLVIII. Cistela.

Fühler fadenförmig, Augen mondförmig. Leib eiförmig länglich.

### Cistela sulphurea.

Gelb, mit schwefelgelben Flügeldecken.

Olivier III, 1, F. 6.

Auf Blumen, zumal der Schirmfarnen; in Waldwiesen; auch am Getreide.

## XLIX. Pyrochroa.

Fühler fadenförmig, etwas sägeähnig, ja sammförmig, lang. Fäster lang. Brustschild klein, schelbenförmig, Flügeldecken nach hinten etwas breiter.

1. *Pyrochroa rubens.*

Schwarz, Kopf, Bruststück und Flügeldecken blutroth.

Panzer XIII, T. 1, F. 2. — Panzer XIII, 5.

Auf Blumen, an Holzwänden. 7" lang.

2. *Pyrochroa coccinea.*

Schwarz, bloß Bruststück und Flügeldecken blutroth.

Panzer XIII, 11.

Ein Weniges größer und dunkler roth als die Vorige. An gleichen Orten. 8 Linien lang.

L. Schattenkäfer.

*Tenebrio.*

Fühler kurz, schnurformig, unter dem Kopfrande eingefügt. Das Bruststück gerandet; Leib länglich, parallel, mit flachen Flügeldecken.

Der Mehlwurm.

*Tenebrio molitor.*

Pechbraun, fast schwarz, mit gestreiften Flügeldecken. Die Unterseite nebst den Beinen rothbraun.

Panzer XLIII, 13.

Die Larve lebt im Mehl, Kleie, altem Brod und ist da häufig genug, zumal in Bäckerläden und Mühlen zu finden. Sie ist etwa 1" lang, schmal, glänzend gelb mit sechs kurzen Füßen. Der kleine platte Kopf ist mit kurzen Fühlern versehen. Der Schwanz endigt in zwei hornartige Spiken. Sie heißen Löcher in das Holz, und sind daher da, wo sie sich eingenistet haben, schwer zu vertilgen, zumal sowohl sie als die Käfer nur im Finstern thätig sind. Sie häutnen sich viermal im Jahr, und die Puppe entwickelt sich Ende Juli. Der Käfer sieht Anfangs hellgelb aus.

Sie geben das bekannte, nothwendige Nachtligallenfutter ab, ihre künstliche Erziehung habe ich im II. Bande, S. 198 bei der Nachtligall angegeben.

## LI. Blaps.

Leib länglich, nach hinten zugespitzt. Die harten Flügeldecken sind am Rande umgeschlagen, verwachsen, und gehen in eine Spitze aus.

### Der Todenkäfer.

#### Blaps mortisaga.

Schwarz, mattschimmernd, sein punktiert, die Spitze stachelig.  
Panzer III, Fig. 3.

1" l. In Häusern; gibt einen stinkenden Gaft von sich.



## Siebente Familie.

### Rindkäfer.

#### (Lamellicornia.)

Größe, dicke, ja plump Käfer; die weniger geschickt scheinen auf glattem Boden zu laufen. Ihr Leib ist stark, die Flügeldecken hart und stark, das Bruststück meist groß, gewölbt; der Kopf ist klein, die Fühler endigen bei allen in drei bis sieben Blätter, die sich wie die eines Fächers öffnen und schließen können.

Viele leben im Miste der wiederkäuenden Thiere und der Pferde, und graben sich Löcher in den Boden darunter. Andere leben auf Bäumen.

Ihre Larven sind groß, dick, weich und wurmsförmig, haben zwölf Ringe, einen glatten Kopf, mit großen Kinnbacken und sechs Beine. Sie verpuppen sich in einer eigens verfertigten Höhlung, die sie aus Erde oder Spänen zusammenkleben.

## LII. Hirschkäfer.

### Lucanus.

Die Fühler zehngliederig, das erste Glied sehr lang. Die Keule kammförmig, aus drei bis vier Kammzähnen bestehend.

Die Kinnbacken hervorstehend, groß, hornig, innen gezähnt, bei den Männchen viel größer. Die Unterlippe und Kinnladen behaart. Die Flügeldecken eisförmig.

#### 1. Der Schröter.

##### *Lucanus Cervus L.*

Feuerschröter. Fr. Cerf volant. Engl. Stag-beetle.

Dunkelbraun, auch schwarz. Die Kinnbacken der Männchen über einen Zoll lang, am Ende gabelig, in der Mitte mit einem starken und vielen kleineren Zähnen. Die Kinnbacken der Weibchen nur einige Linien lang.

*Olivier I, T. 1, F. 1. — Rösel II, Taf. 4, 5.*

Der größte deutsche Käfer, vorzüglich in Eichenwäldern zu Hause, wo er im Sommer fliegt. Seine Larve soll sechs Jahre bis zu ihrer Vollendung brauchen; sie ist vier Zoll lang, und lebt im faulen Eichenholz. Einige halten sie für den Cossus der Alten.

Ein etwas kleinerer *L. hircus s. capreolus* (*Lucanus dorcas* *Panzer LVIII, 11*) hat keinen großen Zahn in der Mitte der Kinnbacken.

#### 2. *Lucanus parallelipipedus.*

##### *Dorcus parallelipipedus.*

Schwarz, flach, Kinnbacken kaum so lang als der Kopf, beim Männchen mit einem in der Mitte aufgerichteten Zahn.

*Panzer II, 49.*

Ebendaselbst; auch in Buchen- und Weidenbäumen. 4" l.

#### LIII. *Sinodendron.*

Oberlippe herausstehend; Leib cylindrisch, convex.

##### *Sinodendron cylindricum.*

Schwarz, das Brüststück vorn abgestutzt, fünfzähnig, das Kopfhorn zurückgebogen.

*Panzer I, 4, II, 9.*

In faulen Baumstämmen. 6" l.

## LIV. Passalus.

Fühler kurz, mit dreiblätteriger Keule. Der Körper länglich, parallelipipedisch, niedergedrückt. Bruststück vierseitig, vom Leibe abstehend.

### Passalus interruptus.

Pechschwarz, glänzend, mit in Furchen gestreiften Flügeldecken; der Scheitel in der Mitte mit einem nach vorn gekrümmten Horn.

Olivier I, T. 3, F. 5.

Auf den Antillen. 15" lang; das Brustschild ist glänzend, wie lackirt, mit einer Längsfurche in der Mitte. Eine ihr sehr ähnliche Gattung, *P. cornutus*, soll etwas kleiner seyn. Die Larve lebt im faulen Zuckerrohr.

## LV. Lamprima.

Fühler gebrochen, mit dreiblätteriger Keule; Kinnbacken bei den Männchen länger als der Kopf, senkrecht. Leib eisförmig-länglich, convex, prächtig glänzend. Das Brustbein in ein Horn verlängert; die Vorderfüße der Männchen schüsselförmig erweitert.

### Lamprima aenea.

Goldgrün mit goldener Stirn, und bärigen Kinnbacken; die Flügeldecken mit kleinen vertieften Linien.

v. Schreibers in den Transactions of the Linnean Society  
Vol. VI, 1.

Einer der prachtvollsten Käfer, und doch mit den Schrötern verwandt. Glänzt wie grünes, rothes und gelbes gearbeitetes Gold. Es gibt auch einige eben so schöne, verwandte Gattungen, und man hat das Stück noch neuerlich mit vier Friedrichsdor bezahlt. Sie leben auf Neuholland und den benachbarten Inseln der Südsee.

## LVI. Rosenkäfer.

### Cetonia.

Fühler kurz, in eine dreigliederige Keule endigend. Kinnbacken klein, hautig. Die Seitenstücke der Mittelbrust ragen vor den Flügeldecken hervor. Körper breit, flach.

#### 1. Der grüne Goldhahn.

##### Cetonia aurata.

Metallisch grün, ins Goldgelbe und Kupferrothe ziehend, auf der Unterseite lang behaart. Auf den Flügeldecken einige weiße Querstriche.

Panzer XLI, 15. — Rössel II, Taf. 2.

Der weltbekannte Rosenkäfer, zumal in den heißen Mittagsstunden auf den Blumen sijend. Seine Larve lebt in den Ameisenhaufen, ohne belästigt zu werden, und ernährt sich von dem Holzmulm derselben. Er kommt von verschiedener Größe vor, und man hat ihn, mit nasser Brodrinde gefüttert, acht Jahre lang lebendig erhalten <sup>a)</sup>). Cetonia fastuosa hat ganz glatte Flügeldecken.

#### 2. Der braune Goldhahn.

##### Cetonia marmorata.

Bronzeglänzend, olivengrün; die Flügeldecken mit gestreuten weißen Strichen und Linten.

Panzer XLI, 17.

Einen Zoll lang. Zumal auf Blüthen der Waldbäume im Frühling.

#### 3. Der haarige Goldhahn.

##### Cetonia hirtella.

Schwärzlich metallisch schimmernd, ins Olivengrüne, überall mit langen graubraunen Haaren besetzt. Die Flügeldecken

<sup>a)</sup> Blumenbach Handbuch der N.G., S. 276.

gefurcht, mit einigen weissen Strichen und Querlinien; das Brustschild gekielt.

**Panzer I, 3.**

Auf Bergen, auf Blumen scheinb. 5''' l.

Unter den Cetonien gibt es so viele prachtvolle ausländische, zumal tropische, daß sie Percheron in einem eigenen Kupferwerke\*) beschrieben hat. Eine solche, *Cetonia Orpheus*, auf Port Jackson, gleicht einem Smaragd, und trägt eine goldene regelmäsig gezeichnete Leyer auf den Flügeldecken.

**LVII. Goliath.**

Kopf gerade, mit gabelförmigem oder zweispaltigem Bruststück; Brustschild groß, rund, etwas dreiseitig. Flügeldecken seitlich ausgeschweift.

*Goliath giganteus.*

*Cetonia goliata Fabr.*

Schwarz, mit weißgestreiftem Brustschild.

**Olivier I, T. V, F. 33, T. IX, F. 33.**

In Afrika. Alle Arten dieses dem vorigen verwandten Untergeschlechtes sind sehr groß, und kommen in der heißen Zone beider Welten vor.

**LVIII. Trichius.**

Der Leib flach, groß, das Bruststück klein, kreisrund. Das Brustbein nicht erweitert.

**1. Der Eremit.**

*Trichius eremita.*

Pechschwarz, ins Kupferlige; das Brustschild in der Mitte gefurcht, mit zwei Höckern; das Stirnschild vorn abgestutzt, beim Männchen gerandet.

**Panzer XLI, 12.**

\*) Monographie des Cétoines par Percheron et Gory. Paris 1838, 8. in Lieferungen.

Der größte hieländische, 15" l. An den Wurzeln der Waldbäume, zumal der Eichen.

2. *Trichius nobilis.*

Goldgrün, ins Kupferige, mit runzeligen Flügeldecken.  
Panzer ib. 13.

Auf Blumen. Von der Färbung des Goldhahns.

3. *Trichius hemipterus.*

Schwarz, mit verkürzten Flügeldecken. Der nackte Hinterleib mit weißgrauen Schüppchen. Das Weibchen hat einen Legestachel.

Auf Baumblüthen, 4—5" lang.

**LIX. Laubkäfer.**

**Melolontha.**

Fühler zehngliederig, die Keule des Männchens siebenblättrig, des Weibchens sechsblättrig. Oberlippe zweilappig; Kinnbäden dick und stumpf, kurz. Bauch dick.

1. *Der Wallker.*

*Melolontha fullo.*

Braun, mit weißen Flecken besprengt, das Schildchen mit doppeltem weißem Fleck; Bruststück mit drei Längslinien.

Herbst III, Taf. XXII, 1. — Panzer Cl, 8.

Die größte hieländische Gattung, gegen anderthalb Zoll lang. Die hellen Zeichnungen bestehen aus feinen Schüppchen. Die Larve findet sich in Kieferwäldern, und der Käfer soll schon ganze Striche daselbst abgefressen haben, er entlaubt aber auch andere Bäume.

2. *Der gemeine Maikäfer.*

*Melolontha vulgaris.*

Fr. Hauneton.

Schwarz mit braunen Flügeln und spitzem Schwanz; das Brustschild zottig.

Rösel II, Taf. 4.

Dieser Maikäfer wird einen Zoll lang und muß von dem folgenden unterschieden werden. Er erscheint mit den ersten Tagen des Mai an den Bäumen unserer Spaziergänge und Gärten, fliegt des Abends und sitzt den Tag über still. Im Mai und Junius gräbt sich das Weibchen in die Erde, um 20—30 Eier zu legen, aus welchen die sogenannten Engerlinge (Fr. Ver blane) kommen, welche im ersten Jahr nur einige Enten lang werden. Mit Ende des folgenden Jahres haben sie einen Zoll erreicht, und so bedürfen sie noch ein bis zwei Jahre, ehe sie auf anderthalb vollkommen ausgewachsen sind. Man kennt sie als eingekrümmte halbdurchsichtige Würmer, welche, zumal beim Pflügen der Felder, häufig herausgeworfen werden. Sie haben einen gelbbraunen, hornigen Kopf, sechs Füße, und deutliche Atemlöcher zur Seite ihrer zwölf Ringe. Diese Larven thun den Feldfrüchten und den Gartenpflanzen unendlich viel Schaden, indem sie ihnen die Wurzeln abnagen. Endlich verpuppen sie sich in der Tiefe der Erde, und der Käfer selbst schließt auch dort aus, um aber erst im Frühling sich heraus an das Tageslicht zu bohren.

Seine Anzahl ist oft ungeheuer, alle Zahlenberechnung übersteigend. Man hat in einer Gegend oft mehrere hundert Millionen berechnet. Ich sah einst rund um die Stadt Frankfurt zahllose Haufen durch Feuer getöteter, und man kann Obstbäume finden, die oft ganz wie mit ihnen bedeckt sind. Sie dienen höchstens um das Hausgeflügel, zumal Enten und Hühner, damit zu füttern; auch sah ich Personen, welche ihnen mit großem Appetit den Kopf und das Bruststück abbissen, laufen, und dessen reizenden Geschmack rühmten.

Auf Java erscheint *Melolontha hypoleuca* als Stellvertreter dieser Gattung, oft ebenso zahlreich.

### 3. Der Schornsteinfeger.

*Melolontha hippocastani.*

Der Türke.

Wie der vorige, aber mit schwarzem glänzendem Brustschild,

Flügelrande und Beinen. Die Schwanzspitze kurz, schnell sich verdünnend; der Bauch breiter und höher.

Panzer XCV, 8.

Mit den vorigen.

## LX. *Amphimalla.*

Die Fühler neungliederig mit dreiblätteriger Keule. Die Schienbeine der Männchen fast unbewehrt; die Krallen gleich, unten an der Basis mit einem Zahne.

Der Brachkäfer.

*Amphimalla solstitialis.*

*Melolontha solstitialis Fabr.*

Bläß gelbroth, langbehaart, die Flügeldecken mit vier Längsrippen.

De Geer IV, X, 45.

Gleichfalls sehr bekannt, im Junius des Abends häufig umherschwärzend. 8" lang.

## LXI. *Anisoplia.*

Die Fühler neungliederig, mit dreiblätteriger Keule. Die Krallen der Füße ungleich.

*Anisoplia horticola.*

Eiförmig, flach, behaart, blaugrün, die Seiten des Brustschildes ausgebuchtet, die Flügeldecken braunroth.

Panzer XLVII, 45.

Ebenfalls oft häufig, an Getreide und Obstbäumen, denen er schädlich ist. 5" lang.

## LXII. *Geotrupes.*

Die Kinnbacken schelfförmig, an der Spitze zweizähnig; das Kopfschild eckig. Der Leib dick, nach oben sehr convex.

Boigt, Zoologie. Bd. IV.

#### 1. *Geotrupes typhoeus.*

Behaart, schwarz, das Bruststück nach vorn mit drei geraden Hörnern, das mittlere kurz, zugespitzt; die Flügeldecken gestreift. **Panzer III, 22.**

Nur das Männchen hat die drei Hörner; das Weibchen kleine Spitzen; findet sich zumal auf Ackeru, in Schaf- und Kuhmist, und gräbt, wie die Folgenden, tiefe Löcher in die Erde. 8—9" lang.

#### 2. *Der Mistläfer.*

##### *Geotrupes stercorarius.*

Schwarz, ins Grüne, auf der Unterseite stahlblau, oder violblau, das Brustschild oben ganz glatt, die Flügeldecken tief gefurcht.

**Sturm Fauna I, 22, 4, Taf. 6.**

Gleichfalls unten sehr behaart. Häufig im Mist auf den Landstraßen. Sein Umherschnurren des Abends verkündet einen schönen darauffolgenden Tag. 1" lang.

#### 3. *Der Frühlingsläfer.*

##### *Geotrupes vernalis.*

Schön schwarzblau, auch grün, violet, kupferroth, mit dicht punktiertem Brustschild und fein gestreift-punktierten Flügeldecken. **Panzer XLIX, 2.**

Mehr in Wäldern; etwas kleiner als die vorige. *Sc. sylvaticus* (Panzer ib. 3) gleicht ihm, ist aber ganz schwarz.

#### 4. *Geotrupes mobilicornis.*

Obenher schwarz, untenher rostroth. Das Bruststück mit vier Zähnen, auf dem Stirnschild ein rückwärts gerichtetes bewegliches Horn.

**Panzer XII, 2.**

Von der Gestalt des vorigen, aber viermal kleiner. Frösche und Kröten sollen ihn besonders gern aussuchen, daher men sich ihn aus dem Magen derselben verschaffen kann.

## LXIII. Naschornkäfer.

### Oryctes.

Fühler zehngliederig, mit dreiblätteriger Keule. Oberlippe fast fehlend. Leib dick, convex. Das Ende der hinteren Schienbeine sternförmig.

#### Der Lohkäfer.

##### *Oryctes nasicornis.*

##### *Geotrupes nasicornis F.*

Kastanienbraun, glänzend, das Stirnschild des Männchens mit einem kurvigen Horn, das des Weibchens mit kurzer Spitze. Sturm Fauna I, Taf. 4, 5.

Im faulen Holze und zumal häufig in den Lohbeeten der Gerber oder der Gewächshäuser, wo sich die Larve ernährt. 1" 4" lang.

## LXIV. Scarabaeus.

Fühler kurz, zehngliederig, die Keule knopfförmig dreiblätterig. Das Stirnschild vorgezogen; die Kinnbacken gezahnt, oder gelappt. Der Leib dick, eiförmig, convex.

Es sind sehr große, ja die größten aller Käfer, und meist in heißen Ländern zu Hause, die Männchen sind am Brustschild und Kopf gehörnt.

#### 1. Der Herkuleskäfer.

##### *Scarabaeus Hercules.*

Schwarz, mit graugrünen gefleckten Flügeldecken. Das glatte Bruststück des Männchens verlängert sich nach vorn in ein langes unten bartiges Horn, dem ein rückwärts gekrümmtes und gezahntes vom Kopfe aus entgegentritt.

Olivier I, 1 das Männchen; und XXIII, 1 ♀ — Abb. II, Taf. A und IV, Taf. 5.

Der größte bekannte Käfer, der mit dem Horn über fünf Zoll lang, und dritt:halb dick ist. Es gibt zweierlei, einen mit

grüngrauen und einen mit braunen Flügeldecken, die aber nur Varietäten seyn sollen. Er findet sich vornehmlich in Südamerika, wo ihn die Reisenden wohl für ein Paar Karolin kaufen.

*Sc. alcides* ist nicht ganz so groß, und das Kopfhorn un-gezahnt. (Olivier I. c., F. 2.)

## 2. *Scarabaeus Actaeon.*

Glatt, das Bruststück mit zwei Hörnern, am Kopfe ein einzähniges, zweispaltiges Horn.

Rösel II, A, Fig. 2.

In Südamerika.

## 3. *Scarabaeus Gideon.*

Kastanienbraun, glänzend glatt, das Bruststück in ein großes, am Ende zweispaltiges, herabgebogenes Horn ausgehend, vom Kopf ihm entgegen ein ebenso gespaltenes, mit einem Zahn.

Rösel I. c., Fig. 5.

In Ostindien. Viel kleiner, etwa dritthalb Zoll lang.

## 4. *Scarabaeus Atlas.*

Groß, pechbraun, das Bruststück mit zwei großen seitlichen vorwärts gerichteten gebogenen Hörnern und einem kurzen in der Mitte; ein vom Kopf zurückgebogenes gezahnt.

Olivier III, 28, F. 242.

Über drei Zoll lang und ziemlich breit. In Südamerika.

## 5. *Scarabaeus claviger.*

Braunroth; das Horn des Bruststückes an der Spitze dreilappig, einwärts gebogen; das des Kopfes pfriemensförmig, zurückgebogen.

Olivier I, T. 5, F. 40.

In Ostindien.

## LXV. *Lethrus.*

Die Fühlerkeule abgestutzt; die Kinnbacken sickelförmig, hervorstehend, innen sägezähnig, beim Männchen unten mit einem langen dicken Zahn.

Der Schneider.

*Lethrus cephalotes.*

Schwarz, mit vorgestrecktem Kopf, sehr breitem, vorn tief ausgeschnittenem Bruststück, und kleinem, kurzen Leib.

Panzer XXVIII, 4.

Im südlichen Deutschland, Ungarn, Russland, auf dünnen Feldern sc. 1" lang. Er soll die jungen Triebe der Weinstecke mit seinen scharfen Zangen haarscharf abschneiden, daher sein deutscher Name.

LXVI. *Aphodius.*

Fühler neungliederig, der Leib länglich, cylindrisch, hoch gewölbt. Ein Schildchen.

1. *Aphodius fossor.*

Schwarz, hie und da mit etwas roth auf den Flügeln, auf dem Stirnschild drei Höckerchen; das Bruststück vorn eingedrückt; der Leib hochgewölbt, kurz, gedrungen, walzenförmig; die Flügeldecken gestreift.

Panzer XXVIII, 4.

Im Kuhmist, auf Wegen, in Wäldern sc. 6" lang.

2. *Aphodius fimetarius.*

Schwarz, das Stirnschild mit drei Höckerchen; die Flügeldecken tief punktiert gestreift und nebst den vorderen Ecken des Bruststückes roth.  $3\frac{1}{2}$ " lang.

3. *Aphodius prodromus.*

Länglichflach, schwarz, mit ebenem Stirnschild, die Flügeldecken behaart, braungrau mit einem großen braunen Fleck.

Sturm Fauna I, 113, Taf. 13, Fig. A, B.

Einer der vielen braungefleckten Mistkäfer des Kuhdüngers.

## LXVII. *Copris*.

Stirnschild groß, halbmondförmig, in der Mitte eingelenkt; Bruststück gewölbt, breit; Leib halbkugelig.

### 1. *Copris lunaris*.

*Bousier capuciu.*

Glänzendschwarz; das Männchen mit einem langen aufrechten Horn auf dem halbrunden Stirnschild; das Brustschild dick, mit zwei tiefen Gruben, seitlich in eine Dornspitze ausgehend; die Mitte zwischen den Gruben ein scharfkantiger Höcker, beim Weibchen nur eine unterbrochene Querleiste oder ganz eben. Flügeldecken gestreift.

*Olivier I, V, 36.*

Im Kuhmist der Wälder. 9" lang.

### 2. *Copris festivus*.

Metallgrün, das Brustschild kupferroth, dick, mit zwei Höckerchen, die Flügeldecken gestreift.

*Rösel II, 4, B, 3.*

Von gedrungenem Körper. 6" lang. In Amerika.

## LXVIII. *Onthophagus*.

Stirnschild spitzig oder abgerundet; Bruststück dick, aufgetrieben; Leib kurz, dick.

### 1. *Onthophagus taurus*.

Schwarz, das Stirnschild des Männchens mit zwei auswärts gebogenen feinen Hörnern.

*Panzer XII, 3.*

Im Kuhdüniger, auf Sandboden. 4" lang.

### 2. *Onthophagus nuchiornis*.

Schwarz bronzeglänzend, die Flügeldecken vorderseitig, schwarz gesprengt.

*Panzer IV, 1.*

Das Männchen hat ein kleines blattförmiges Hörnchen auf dem Brustschild; das Weibchen nur zwei Querleisten dasselb. Die Zeichnung variiert. Sehr gemein im Dünger, zumal im Frühjahr. 4" lang.

### 3. *Onthophagus coenobita.*

Kopf und Brustschild grünlich kupferroth; die Flügeldecken schmutziggelb, fast ungespeckt; das Kopfhörnchen wie beim Vorigen. Panzer XLVIII, 6.

Zumal im Menschenkoth. 4" lang.

## LXIX. *Sisyphus.*

Die Fühler achtgliederig, der Leib dreieckig, nach hinten spitz. Hintersüße lang, dicht beisanmen.

### *Sisyphus Schäfferi.*

Mit rundem Bruststück, ohne Schildchen, die Hinterbeine verlängert und krumm.

Panzer XLVIII, 9.

Im Miste nicht häufig. 6" lang. Er fehlt dem nördlichen Europa.

## LXX. *Ateuchus.*

Das Kopfschild groß, dreilappig, mit sechs Zähnen.

### *Ateuchus sacer.*

Schwarz, das Kopfschild sechszähnig, das Brustschild etwas gekerbt, die Hinterbeine gewimpert.

Panzer I. c. Fig. 7. — Olivier III, T. 8, F. 59. — De Geer VII, Taf. 47, Fig. 8.

In Egypten bis durch das südliche Europa, ja sogar im südlichen Deutschland. Unterhalb soll lang, etwas flach.

Er und verwandte (z. B. der *A. volvens* in Nordamerika) drehen mit den Hinterbeinen pilzenförmige Kugeln aus Thier-

und selbst Menschenloth, in welche sie ein Ei legen, und zu zweien, wahrscheinlich Männchen und Weibchen, mit vieler Mühe wegwälzen, um sie zu vergraben. Man sieht sie in Egypten häufig des Abends so beschäftigt.

Die alten Egypter verehrten diese Gattung und noch eine zweite, *Ateuchus aegyptiacus Latr.* \*), von goldgrünem Schimmer, die höher hinauf häufiger ist. Sie betrachteten das Drehen einer solchen Kugel wie ein Symbol der Weltbewegung, in deren Inneren gleichfalls ein befruchteter Keim niedergelegt ist. Ferner erschien ihnen dieser Käfer als ein Bild der Stärke, da er sich selbst aus der geschlossenen Hard herauszudrängen weiß, und die Soldaten banden sich ihn deshalb als Amulet um den Hals. Nachmals versorgte man vergleichenden Käfer zu diesem Gebrauch aus gebranter Erde (*terra cotta*), zumal einer grünen, aber auch erdbraunen, und bohrte quer ein Loch durch, um eine Hals schnur durchzuziehen. Dieser Zierrath wurde dann später von edleren Steinarten, Carneolen, Onyx &c. versorgt, und als die Römer und Griechen diese erhielten, schliffen sie die Unterfläche und gruben ihre schönen Intaglio's hinein. Daher der Name derselben: *Scarabaeen*. Die römischen Großen und andere trugen sie sodann als Siegelringe, und aus ihnen und ihrer eiförmigen Gestalt sind unsere Petschäste entstanden.

Zoega gibt über die Hieroglyphen an den altegyptischen Obelisken, wo diese Käfer und ihre Kugeln verschiedentlich abgebildet sind, unten stehende Nachricht \*\*):

---

\*) *S. Caillaud Voyage à Meroë etc.* T. IV, p. 272.

\*\*) *De Origine et usu Obeliscorum ad Pium Sextum P.M. auctore Georgio Zoega Dano Romae 1797, fol.*

P. 446: Clemens exemplum sistit Scarabaeum solis symbolum, a multis scriptoribus memoratum. Rotundam enim figuram effingens e stercore bubulo, vulfo averso convolvit: neque ad gignendum foemina indiget, siquidem in eo genere nullum existit sequioris sexus animal, sed semine in ipsum illum globum immisso procreat: praeterea sex mensibus super terram degit, reliquo sub terra \*).

---

\*) *Plin. L. XXX, cap. II.* „Scarabaeum, qui pilulas volvit. Propter hunc Aegypti magna pars Scarabaeos inter numina colit, curiosa Apionis interpretatione,

Achte Famille.

A s t ä f e r.

(*Clavicornia, Histeroidea.*)

Der Kopf ist im Brustschild versteckt, die Fühler sind feulenförmig.

Horapollinem autem si audiamus, non solem primitus denotat scarabaeus, sed substantiam natura sua unicam et incomparabilem, insimulque patrem et creatorem atque omnia quibus mascula vis gignendi inest, ipsum demiurgum et mundi animum, inde solem quem mundi animum et mundanarum rerum patrem tum Aegyptii tum Graeci venerati sunt. Sistam verba ejus ex Hieroglyphicorum libro primo capite decimo quae et Aegyptiorum Aenigmatum modum egregie declarant, et Symbolum nobis explicant in illo gente celeberrimum\*) praecipuis Apides Tauri notis accensitum, atque in Campensis Obelisci cuspide summum locum tenens: „μονορετες δε δηλωντες, η γενεσιν η ιδατερα, η κολμον, η ανδρα, κανδαρον Σωζραφσι π. τ. λ.“

„Rem sua natura unicam significare volentes, aut ortum, aut patrem, aut mundum, aut virum, scarabaeum pingunt. Rem quidem

qua colligit solis operum similitudinem huic animali inesse, ad excusantes gentis suae ritus.“ — V. Plut. de Is. p. 497, Tom II, p. 380. — Eadem sententia est Porphyrii de abst. Lib. IV, p. 376. Caeterum de Scarabaeis pilulariis, quorum rariae species occurunt in Aegypto, Graecia, Italia, Hispania inque Americae Provinciis Pensylvania et Carolina vide *Aelian* anim. hist. Lib. X, Cap. XV. — Plut. de Is. p. 399, T. II, p. 355. Plin. L. XI, Cap. 28. — Degeer Catherby.

\*) Frequenter recurrit Scarabaeus in Anaglyphis Aegyptiis atque inter notas hieroglyphicas, tum in obeliscis atque templis, tum in Sarcophagis, Mumiis, statuis, annulis signatoriis aliisque monumentis. Sed et innumera fere sigilla et amuleta Aegyptia ad hujus animantis figuram expolita, quae frequenter inveniri in medicatis cadaveribus supra adverti. Quo in genere, ut reliqua taceam, in Museo Borgiano prostant plus quinquaginta, quae, exceptis undecim, in basi incisae habent inscriptiones hieroglyphicas aut Symbola Aegyptiorum. In his unus est scarabaeus omnium quos compéri maximus, longus uncias 3 9/10, lat. 2 8/10 e lapide ex quo nullum praeter hoc monumentum Aegyptium conspexi hactenus porphyrite viridi durissimo et accurate caque elegantia scalptus, ut praeter eos qui sunt in Campensis obelisci vertice nullus ei possit comparari; et hieroglyphicorum lineis decem horizontalibus pulcherrime inscriptus in basi, alio praeterea eorundem characterem versu marginem baseos ambiente. Per latitudinem ejus foramen transactum est, ut fere esse solet in scarabaeis, quo possent funiculo immisso de collo suspendi aut brachio adalligari, aut vero aureo clavo infixo includi in annulum. Caeteri qui sunt in hoc museo atque in Caylianiano, Naniano, Kircheriano, molis diversitate descendant a longitudine Unciarum 3 1/2 usque ad semiuncialem: maxima pars magnitudine sequant gemmas signatorias vulgares.

Sie theilen sich in mehrere Gruppen, theils von flachem, theils convexem, theils cylindrischem Körper.

Einige aber leben im Miste, Roth oder Was, andere in Pilzen oder auf Blumen; einige sind Wasserkäfer.

## LXXI. Stu ß k ä f e r.

### Hister.

Fr. Escarbot.

Fühler gebrochen, mit zusammengedrückter Keule; Leib rundlich, platt; Flügeldecken kurz, gestreift, Steiß nackt.

#### 1. Hister unicolor.

Schwarz, glänzend, die Flügeldecken mit drei ungetheilten Streifen, die vorderen Schienbeine mit drei Zähnen, wovon der äußerste zweispaltig.

Sturm I, 3, Taf. 16.

Im Miste; ziemlich groß, 5''' lang.

---

quae unica est, ideo quod per se gignatur hoc animal, utpote in utero foeminae non gestatum: ejus enim solius, hujuscemodi ortus est. Cum mas sobolem procreare vult, bovis simum nactus sphaericam figuram ex eo fingit mundo similem: quam dum ab ortu in occasum aversis pedibus volutat, ipse rursus ortum aspicit, ut mundi effigiem exprimat. Mundus enim a subsolano in africum circumagit: at siderum cursus est ab africo in subsolanum. Hanc itaque pilam in terra defossam reponit in dies octo et viginti quot diebus luna duodecim signa perlustrat: ubi permanens vivificatur scarabaeorum genus. Nono autem et viceimo die, ubi pilam aperuit, in aquam conjicit. Eum enim diem existimat esse congressum solis ac lunae, insuperque mundi generationem. Pila inde aperta in aqua, prodeunt animalia, scilicet Scarabaei. Ortum vero hac imagine significant, propter jam dictam causam. Patrem, quod ex solo patre ortum habent scarabaeus. Mundum, quod ad mundi figuram accedat generatio ejus. Virum denique, quod in ipsis non inveniatur sexus muliebris \*). Sunt porro Scarabaeorum species tres etc.“

---

\*) Inde quoque factum ut Scarabaeus fortitudinis Symbolum esset, et milites in Aegypto patrio more in annulis scalptum gestarent etc.

2. *Hister cadaverinus.*

Glänzend schwarz, die Flügeldecken auswärts mit fünf Streifen, das Brustschild an den Seiten mit zwei Streifen, die vorderen Schienbeine mit sechs Zähnen.

Panzer IV, 2 (*H. unicolor*).

Häufig im Mist, Was oder ausgelaufenen Baumsäften. 4" lang.

**LXXII. Silpha.**

Fr. Bouclier.

Fühler allmälig keulenförmig verdickt. Brustschild breit; Flügeldecken hinten abgerundet.

1. *Silpha atrata.*

Eiförmig, convex, schwarz, glänzend, mit halbkreisförmigem Brustschild; die Flügeldecken runzlig punktiert, mit drei erhabenen Rippen.

Panzer CV, 4.

Die platte, braune, an den Seiten vierzackige Larve lebt in Wesen; der Käfer findet sich häufig auf Wegen, in Gärten u. s. w. Er geifert einen stinkenden Gast aus dem Maule. Barsirt auch braungelb, ganz oder an einzelnen Stellen. 6" l.

2. *Silpha laevigata.*

Eiförmig, convex, schwarz, etwas glänzend punktiert, das rundliche Bruststück nach vorn verschmälert, die Flügeldecken eben. Herbst V, Taf. LI, Fig. 3.

Ebendaselbst. 6" lang.

3. *Silpha thoracica.*

Eiförmig, schwarz, flach, seidenglänzend, das Bruststück rothgelb und haarig, die schwarzen Flügeldecken mit drei erhabenen Linien.

Panzer XL, 16.

Im Vase; häufig auch im Menschenkoth. 6" lang.

## LXXIII. Todtengräber.

### *Necrophorus.*

Fühler mit dicker, schief durchblätterter Keule. Brustschild scheibenförmig, Flügeldecken nicht bis zum After reichend, abgestutzt.

#### 1. *Necrophorus germanicus.*

Schwarz, der umgeschlagene Rand der Flügeldecken und das Kopfschild in der Mitte röthlich.

##### Panzer XLI, 1.

Die größte Gattung; über einen Zoll lang; selten. *N. humator* und *mortuorum* sind etwas kleiner, und häufiger.

#### 2. *Necrophorus Vespillo.*

Schwarz, mit rothgelben Querbinden auf den Flügeldecken und rothen Fühlerköpfen. Bruststück vorn goldgelb, behaart.

##### Panzer II, 21. — Rösel IV, 1.

Häufig im Ause. Man hat die Bemerkung gemacht, daß er sich richtig jedesmal da einstellt, wo man einen toten Maulwurf hingelegt hat. Er ist etwa 10" lang und flinkt. An der Unterseite findet man ihn durch Milben (*Gamasus coleopterorum*) sehr geplagt. Er fliegt wie ein Maikäfer.

Von ihm und den Verwandten berichtet man die Industrie, daß ihrer drei, vier oder mehr sich zusammenthun, um ein, oft ziemlich großes Thier tief zu verscharren, ja es zuvor an die dazu passende Stelle hinzuschaffen.

## LXXIV. *Pselaphus* \*).

Fühler eisförmig, keulenförmig; Flügeldecken kürzer als der Leib, abgestutzt; drei Tarsenglieder sichtbar.

\*) *L. Reichenbach Monographia Pselaphorum.* Lips. 1816, c. tbb. — *H. M. Schmidt diss. de Pselaphis Faunae pragensis.* Prag. 1836, c. tbb.

Die Pselaphen, jetzt in mehrere Geschlechter zertheilt, sind ganz kleine Käfer, welche im abgefallenen Laube, unter Moos und Steinen oder Baumrinde leben, und am besten gefunden werden können, wenn man jene Abfälle durch ein Sieb schüttelt, und das gröbere Pulver zu Hause auf Papier durchsucht. Es sind Raubinselten, die sich von Milben nähren.

#### 1. *Pselaphus sanguineus R.*

*Euplectus sanguineus Kirby.* — *Bryaxis sanguinea Illiger.*

Schwarzbraun, die Fühler von halber Körperlänge. Das Brustschild abgerundet, hinten mit einer Querfurche, seitlich und in der Mitte mit tiefer Grube. Die Flügeldecken eben, braunroth. *Panzer LXXXIX, 11.* — *Reichenbach Taf. II, Fig. 16.*

Unter Baumrinden, Steinen, Moos und im Grase.  $1\frac{1}{2}$  l.

#### 2. *Pselaphus Heisei.*

Mit langen Maxillartastern, deren letztes Glied in der Mitte schmal, am Ende keulenförmig ist; kastanienbraun, glänzend, mit länglich-eiförmigem convexem Brustschild, und langen dicken Fühlern.

*Reichenbach I. c. Taf. I, Fig. 2.*

Häufiger als andere; an gleichen Orten, doch mehr unter Steinen.  $1\frac{1}{2}$  lang.

Diese und andere Spezies, deren schon über sechzig beschrieben sind, laufen sehr schnell, nach Art der Staphylinen, und gehen, zumal des Abends, auf Raub aus, doch bisweilen auch am Tage.

### LXXV. Claviger.

Kopf länglich, nur mit drei unvollkommenen Punktaugen. Fühler so lang wie der Kopf, kurz, dick, sechsgliederig, das Endglied walzenförmig. Bruststück kugelig-herzförmig; Flügeldecken dreieckig, kurz, hinten mit Büscheln. Tarsen scheinbar zweigliederig.

Sehr kleine Käfer, von denen es höchstens zwei Spezies

gibt. Sie sind zumal durch die Monographie des Pfarrers Müller \*) berühmt geworden, der zuerst nachwies, daß sie zeitlebens von Ameisen gefüttert werden müssen, um sie zu erhalten. Sie leben auch nur in den Nestern, zumal der gelben kleinen Ameisen, und man kann sie daselbst am ersten erhalten, wenn man diese mit einer Schaufel auf ein weißes Tuch auswirft, worauf die Ameisen davoneilen, jene träge Käfer aber zurückbleiben.

Da sie sich, den Faunen zufolge, in verschiedenen Ländern Europa's, und in einer Menge Gegenden finden, so gibt dies wieder einen Gegenbeweis gegen die Lehre von einer vermeinten Wanderung und Verbreitung aus einem einzigen Stammpaare ab.

### Claviger foveolatus.

#### Claviger testaceus.

Glänzend braunroth, mit langem, fast cylindrischem Kopfe, das Bruststück hinten mit einer elliptischen Grube, die Flügeldecken kaum ein Dritttheil so lang als der breite Leib, und hinten mit einem kleinen Haarbüschel.

Panzer XLIX, 3. — Germar Magazin III, Taf. II. —  
Schmid Diss. I. c., T. I.

Er ist wenig über 1" lang, und bereits in Deutschland (auch bei Jena), in Frankreich, Holland, Schweden, Böhmen, Schlesien &c. aufgefunden worden. Pastor Müller gibt seine Naturgeschichte auf folgende Weise:

Man findet diesen Käfer, wenn man die Steine aufhebt, unter welchen sich die gelben Ameisen eingebettet haben. Oft sieht man ihn dazwischen herumlaufen, anderemale, wie ihn die Ameisen in ihrem Gebiß weg und in Sicherheit tragen. Anfangs April zeigt er sich zuerst, häufiger im Mai. In diesem Monate hat auch die Begattung statt, bei welcher das Männchen auf dem Rücken des Weibchen fest angeklammert sitzt. Pfarrer Müller sammelte mehrere dieser Käfer nebst Ameisen in ein Glas, und bemerkte nun, daß so oft eine Ameise einem solchen Keulenkäfer begegnete, sie ihn mit den Fühlern sanft

---

\*) Beiträge zur Naturgeschichte der Gattung Claviger. In Germars Magazin der Entomologie III. B., S. 69.

betastete und liebkoste, und ihn, während er dies mit seinen Fühlern erwiederte, mit sichtbarer Begierde auf dem Rücken beleckte. Die Stellen, wo dies geschah, waren jedesmal zuerst die am äußeren Hinterwinkel der Deckschilde (Flügeldecken) emporstehenden gelben Haarbüschel. Die Ameise öffnete ihre großen Fresszangen sehr weit, und saugte alsdann vermittelst der Maxillen, der Lippe und der weit hervorgestreckten Fäster den ganz in den Mund genommenen Haarbüschel mehreremale mit großer Hestigkeit aus, indem sie ihn wiederholt durch den Mund zog; beleckte sodann auch noch die ganze vordere Fläche des Oberleibes, und insbesondere die daselbst befindliche Grube. Diese Operation wurde alle 8 — 10 Minuten, selbst von mehreren Ameisen an demselben Käfer wiederholt. — Dadurch wurde es dem Beobachter klar, warum ihn jene so schonen.

Ferner aber machte er die Entdeckung, daß die Keulenkäfer von den Ameisen auch förmlich gefüttert werden. Er brachte nämlich in das Glas einige Tropfen Honig, Zuckerkörnchen &c. und bemerkte, daß die Käfer, ohne sich hierum zu kümmern, darüber wegliesten, dagegen die Ameisen bald diese Nahrung entdeckten und aufnahmen, sodann aber den Käfern etwas davon abgaben. Jedesmal wenn eine gesättigte Ameise einem noch hungernden Käfer begegnete, lenkte dieser, gerade als wenn er die Speise witternd, Futter von ihr begehrte, Kopf und Fühler aufwärts nach dem Munde jener hin, und nun blieben sie beide still stehen. Nach vorhergegangenem gegenseitigem Berühren und Streicheln mit den Fühlern, Kopf gegen Kopf gerichtet, öffnete der Käfer den Mund; ein gleiches that die Ameise, und gab aus ihren weit hervorgestreckten inneren Mundtheilen dem erstern von der so eben genossenen Nahrung, welche dieser mit der Lippe und den weitgeöffneten Kinnladensappen begierig einsog. Beide reinigten sodann ihre inneren Mundtheile durch wiederholtes Ausstrecken und Einziehen derselben und setzten dann ihren vorigen Weg wieder fort. Eine solche Fütterung dauerte gewöhnlich 8! — 12 Stunden, nach deren Endigung auch die Ameise noch die Haarbüschel des Käfers auf die oben beschriebene Weise abzulecken pflegte.

## LXXVI. *Nitidula*.

Kopf zurückgezogen, Fühler kurz, mit dreigliederiger runder Keule. Leib klein, eisförmig, nach unten etwas gewölbt.

### 1. *Nitidula aenea*.

Eisförmig-länglich, etwas flach, glänzend metallgrün und stark punktiert, die Fühlerkeule groß und stumpf.

Panzer LXXXIII, 6, 7.

In Blumen, fast den ganzen Sommer hindurch überall anzutreffen. 2<sup>1/2</sup>" lang.

### 2. *Nitidula varia*.

Länglicheisförmig, rostgrau, das Bruststück und die Flügeldecken schwarz gestrichelt und zumal hinten gefleckt.

Herbst V, 53, 4.

Eine der größeren Arten. 2—3<sup>1/2</sup>" lang. Im ausgelaufenen Gaste der Eichen und Weiden.

### 3. *Nitidula bipustulata*.

Eisförmig-flach, schwarz, auf jeder Flügeldecke ein rother Punkt.

Panzer III, 40.

Im Nase, Rehricht, Schwämmen, Baumsaft sc. 2<sup>1/2</sup>".

## LXXVII. *Ips* s.

Fühler mit durchbohrter Keule. Leib länglich-eisförmig, convex, glatt.

### 1. *Ips quadripustulata*.

Linealisch-länglich, etwas flach, schwarz, auf jeder Flügeldecke zwei rothe Flecken, der vordere ausgeschwefelt.

Herbst IV, 42, 1.

An Baumstämmen, zumal im Birkenstaft. 3<sup>1/2</sup>" lang.

2. *Ips nigripennis.*

Braunroth, Flügeldecken, Brust und Fühler schwarz.  
Panzer III, 7.

In Baumpilzen. 4" lang.

**LXXVIII. Speckäfer.**

**Dermestes.**

Fühler kurz, mit großer, langer, gezähnter Keule; Leib länglich-risörmig, convex, behaart. Kopf zurückgezogen, Bruststück hinten ausgeschweift.

1. Der gemeine Speckäfer.

**Dermestes lardarius.**

Länglich, schwarz, vorn auf den Flügeldecken eine breite aschgraue Binde, jederseits mit drei Punkten.

De Geer IV, 7, 1—17.

Der leider nur zu bekannte Käfer ist vier Linien lang und findet sich in den Borrathskammern, wo Fleischwaaren sind, noch mehr aber in vernachlässigten Naturaliensammlungen oder Präparatsälen, in allem getrockneten Fleische oder Knochentheilen, die er benagt, ja verzehrt, und aus welchem man ihn oft in Menge herausklopfen kann.

Die Larve ist sieben Linien lang, schlank, cylindrisch und geringelt, jeder Ring mit zwei Reihen brauner glänzender, anliegender Haare besetzt, nach dem Kopfe hin verdickt, hat sechs Füße, und endigt in zwei Spangen und einen Haarbüschel. Sie benagt fast noch mehr animalische Theile aller Art \*), zerstört aber vornehmlich das Pelzwerk durch Abrasten aller Haare, oder Wollen-Kleidungsstücke auf gleiche Weise. In Kleiderschränken oder auf der Erde, wo man dergleichen längere Zeit

\*) Der merkwürdige ehemalige Professor Weireis in Helmstädt behauptete, wenn man in eine Naturalien- und Kunstsammlung einige Vögel stelle, und diesen Käfern preisgebe, so blieb alles Uebrige von ihnen verschont, und übte dies wirklich praktisch aus.

ununtersucht liegen gelassen, ist man sicher, welche anzutreffen. Ihr Koth bildet durch Fäden verbundene Körner.

Im August verwandeln sie sich in den Käfer.

## 2. *Dermestes murinus.*

Schwarz, obenher aschgrau marmoriert, untenher silberweiß; das Schildchen braungelb.

Panzer XL, 11.

In Kas, Unrath ec., aber auch auf Blumen häufig. 4<sup>mm</sup> l.

Ein ihm sehr ähnlicher, nur an den Seiten des Brustschil-  
des stärker aschgrau behaarter, *D. vulpinus* (Panzer XL, 10)  
findet sich häufig in den Särgen der alten egyptischen Mumien,  
und wird deshalb als Merkwürdigkeit gezeigt; man trifft ihn  
auch in Europa, unter andern in den Seestädten, und glaubt,  
dass er mit dem Pelzwerk aus fremden Ländern hereingeführt sey.

## 3. *Der Pelzfäfer.*

*Dermestes pellio.*

*Megatoma pellio.*

Eirund, etwas flach, schwarz, auf jeder Flügeldecke ein  
weisser Punkt.

Herbst IV, Taf. 39, Fig. 2.

Der Käfer ist dritthalb Linnen lang, und findet sich im  
Sommer in Menge auf Blumen (insbesondere des Weißdorns),  
aber auch leider in den Häusern, wo seine Larve alles Pelzwerk,  
oder wollene Kleidungsstücke zernagt, indem sie die Haare abnagt,  
wodurch nackte Stellen und Löcher entstehen. Sie gleicht auf  
den ersten Blick einem abgerissenen Stückchen schwarzen Tuchs  
oder Filzes, genauer betrachtet ist sie rundlich, hinten spitz, mit  
braunschwarzen Haaren bedeckt, und hat hinten eine Art Schwanz.  
Sie läuft rückwärts.

## LXXIX. *Anthrenus.*

Fühler mit Keule. Leib eisförmig, gerundet, flach, mit  
Schüppchen besetzt. Kopf abwärts geneigt, im Bruststück

verborgen. Die Fühler in der Ruhe unter eine Grube des Brustschildes verborgen.

#### 1. *Anthrenus Serofulariae.*

Schwarz, mit weißen Binden gefleckt; die Mittelsnaht roth.  
Panzer III, 11.

Unendlich häufig auf Blumen, zumal Schirmblättern.  $1\frac{1}{2}$ " lang. Die Flügeldecken und das Brustschild sind mit weißen Schüppchen wie Schmetterlingsflügel besetzt. Die Larve kommt nach Art der vorigen in die Naturaliensammlungen \*) und verwüstet sie. Sie ist kurz, und hat vorn schön sächerförmig gefestigte Haarbüschel, die sie abwechselnd ausbreitet und schließt, und hinten einen Borstenschwanz.

#### 2. *Anthrenus Verbasci.*

Schwarz, mit drei weißen welligen Binden auf den Flügeldecken.

Panzer C, Fig. 3, 2. — De Geer IV, Taf. 8, Fig. 4.

Etwas kleiner. Ebendaselbst.

### LXXX. *Pilleenkäfer.*

#### *Byrrhus.*

Fühler zusammengedrückt, durchblättert, nach vorn keulenförmig verdickt. Die Fäster gleich, etwas keulenförmig. Letz eiförmig-kugelig, oben sehr convex. Füße zusammengedrückt, dicht an den Letz schließend.

#### 1. *Byrrhus pilula.*

Länglich-eiförmig, filzig behaart, heller oder dunkler braun, mit vier zottigen sammetschwarzen, gelb unterbrochenen Längsstreifen der Flügeldecken.

Panzer IV, 3.

\*) *Anthrenus museorum* ist eine Varietät dieser oder der folgenden Gattung.

Er variiert ganz schwarz, auch mixtgelb, und findet sich oft mit abgewetzten Haaren. Häufig im Frühling auf steinigen, dünnen Bergen oder den Straßen unter Steinen und Moos. 4" lang. *B. fasciatus* ist ihm ähnlich.

### 2. *Byrrhus varius L.*

Eisförmig, schwarz, obenhin metallisch, mit dunkelgrün gestreiften Flügeldecken, deren Zwischenräume glänzend schwarz gewürfelt sind.

### Panzer XXXII, 3.

Nur dritthalb Linien lang. In dünnen sandigen Gegenden, an den Ufern der Sümpfe daselbst, nicht selten.

### 3. *Byrrhus aeneus.*

Länglich-eisförmig, obenhin bronzefarbig, grauhaarig, mit unregelmäßig punktierten Flügeldecken und weißlichen Schildchen.

### Panzer XCI, 3.

Von der Länge des vorigen, aber viel schmäler. In dünnen Sandgegenden häufig.

## LXXXI. *Sphaeridium.*

Fühler keulenförmig, das erste Glied so lang wie die übrigen zusammen. Das Knöpfchen der Fühler zusammengezogen, länglich. Vordertaster nicht so lang, als die Fühler. Leib eiförmig-rundlich, oben convex, glatt. Die Schienbeine bedornt. Das erste Tarsenglied das längste.

### 1. *Sphaeridium scarabaeoides.*

Eisförmig, ganz schwarz, die Flügeldecken überall gleichmäßig punktiert, an der Schulter mit einem großen rothen Fleck und hinten einem halbmondförmigen gelben.

### Panzer VI, 2.

Nur drei Linien lang. Lebt, wie die übrigen, häufig im Miste.

## 2. *Sphaeridium haemorrhoidale.*

Schwarz, die gestreiften Flügeldecken am Ende rostgelb; die Füße schwarz. 2" lang.

Panzer LXI, 1.

## 3. *Sphaeridium atomarium.*

Girndlich, schwarz, sehr convex, die Flügeldecken tief gekerbt-gestreift, am Ende, so wie die Füße rostbraun.

Panzer XXIII, 3.

Nur eine Linie lang; aber häufig im Miste.

## LXXXII. *Hydrophilus.*

Fühler durchblättert, mit länglicher Keule. Bordertäster länger als die Fühler, das zweite Glied das längste. Der Leib eisförmig, länglich, convex, mit fielförmigem hinten in einen Dorn ausgehenden Brustbein. Die Schienbeine am Ende mit zwei langen, ungleichen Dornen; das erste Tarsenglied klein, das zweite sehr groß; die Krallen unten mit einem starken Zahne.

Diese Wasserkäfer sind die amphibische Form der vorigen; sie sind räuberisch, und fressen selbst den Fischen Löcher in den Leib. Man findet sie in stehenden und fließenden Wassern, Abends kommen sie wohl nach dem Lichte geflogen. Ihre Larven sind lang, schmal, mit zarten Beinen und einem großen aufgerichteten Kopf mit großen sickelförmigen Kinnbacken; auch sie leben im Wasser.

### *Hydrophilus piceus.*

Länglich-eisförmig, glänzend schwarz, das Brustbein gekielt, hinten in eine Spitze ausgehend, die Fühler braunroth, die Füße dünn.

Panzer LXVII, 12. — De Geer Ins. IV, Taf. 14.

Die größte Gattung, fast zwei Zoll lang, convex, und mit schwach punktierten und gestreiften Flügeldecken. Die Larve verpuppt sich im Februar in der Erde.

### LXXXIII. Elophorus.

Fühler sehr kurz, mit rundlicher Keule; das erste Glied groß. Leib länglich, schmal, wenig erhaben. Schienbeine mit Borsten besetzt.

#### Elophorus grandis Ill.

Dunkel kupferbraun, das Brustschild mit fünf Furchen, hinten verschmäler; die Flügeldecken grau, punktiert-gestreift.

Panzer XXVI, 6.

In stehenden Wassern, nicht häufig.  $3\frac{1}{2}$ " lang. Ruge-  
mann sah ihn an einem Abend in solcher Menge an einem Sumpf-  
schwärmen, daß er mit einem einzigen Handgriff über 20 fing.

---

### Neunte Familie.

#### R a u b t ä f e r.

(Fera, Carabida, Cicindeleta, Dytiscea, Mi-  
croptera, Brachyelytra etc.)

Mit plattem, gestrecktem Leib, abgesetztem Kopf und Brust-  
stück, und sechs Füßen. Die Kinnbacken stark, spitzig, scharf,  
die Beine lang.

Sie sind äußerst lebhaft, kühn und tapfer, wehren sich ge-  
gen den Angriff heftig, und beißen scharf. Auch laufen sie  
schnell. Sie geiern einen stinkenden braunen Speichel, und  
spritzen auch ätzend scharfe, stinkende Säfte aus zwei Bläschen  
am Hinter. Ihre Nahrung besteht in lebendigem Raub, so auch  
der ihrer Larven. Im heißen hellen Sonnenlicht laufen sie  
mäher, auch fliegen viele des Abends. In der Regel halten sie  
sich aber unter Baumrinden und Steinen verborgen, und zeigen  
dadurch ihre niedrige Stellung an.

\* *Brachyelytra*: mit kurzen Flügeldecken; die Zahl der Tarsenglieder sehr verschieden.

## LXXXIV. *Staphylinus*.

Fühler schnur förmig, nach außen dicker; das Endglied parabolisch ausgeschnitten. Leib gestreckt, Brustschild hinten ausgerandet.

### 1. *Staphylinus erythropterus* L.

Mattschwarz, feinhaarig, die Basis der Fühler, die Flügeldecken, und die Füße braunroth. Der Rand des Brustschildes und der Bauchringe goldgrün schimmernd.

#### Panzer XXVII, 4.

Nicht selten in Misthaufen und unter Steinen. Eine etwas kleinere Abart, *St. castanopterus* genannt, wird häufiger angetroffen. 6" lang.

### 2. *Staphylinus olens*.

Schwarz, ungesleckt, oben dicht matt punktiert, fein weichhaarig, der Kopf breiter als das Bruststück.

#### Panzer XXVII, 1.

Häufig im Miste und an Wegen. 8" lang.

### 3. *Staphylinus maxillosus*.

Schwarz, glänzend, Flügeldecken und Bauch mit aschgrauen, schwarz gesleckten Binden, der Bauch silberweiß.

#### Panzer XXVII, 2.

Im Miste, Kehricht, Ras. 8" lang.

### 4. *Staphylinus marinus*.

Schwarz, behaart, Kopf, Rücken und Flügel bronzenfarbig gewölkt, die Fühler an der Basis roth.

#### De Geer III, Taf. VI, Fig. 51.

Ebendaselbst; 6" lang.

### 5. *Staphylinus hirtus.*

Schwarz, haarig, Kopf, Rücken und die hintere Hälfte des Bauches gelb behaart, die Flügeldecken mit einer breiten aschgrauen Binde. Das Bruststück vorn breiter.

Panzer IV, 19.

Gegen 4" lang. Im Kuhdüniger. Variirt in der Größe.

### LXXXV. *Oxyporus.*

Taster ungleich; die vorderen fadenförmig, die Lippentaster breit, sickelförmig. Der Leib mehr eisförmig.

#### *Oxyporus rufus.*

Glatt, braunroth, glänzend; Kopf, Brust, Astern, die Basis der Schenkel und der Hinterrand der Flügeldecken schwarz.

Panzer XVI, 19.

In Pilzen, Schwämmen, im Mist. 5'" lang.

### LXXXVI. *Omaliu m.*

Der Leib eisförmig, kurz; das Bruststück quer, breit gerandet; die Flügeldecken fast den ganzen Leib bedeckend, weich.

#### *Omaliu m rivulare.*

Schwarz, etwas glänzend, punktiert, die Flügeldecken dunkelbraun mit helleren Schultern, Basis der Fühler und die Füße röthlich. Das Brustschild mit vier Längsgruben.

Panzer XXVII, 15.

In Blumen, auf Sträuchern u. s. w. sehr häufig. 2'" lang. Bei dieser Gattung sind die Flügeldecken zwar etwas länger als das Brustschild, aber viel kürzer als der Bauch.

### LXXXVII. *Tachinus.*

Fühler vor den Augen eingesetzt; nach außen dicker. Füße bedornt. Flügeldecken hart. Der Kopf klein, zurückgezogen; der Leib eisförmig, kegelförmig, breit, hinten vorstig.

### Tachinus pullus.

Pechschwarz, glänzend glatt, dicht punktiert, der Hinterrand der Flügeldecken rothbraun, das erste Fühlerglied und die Füße braunroth.

### Panzer XXVII, 20.

Häufig im Miste u. dgl.  $2\frac{1}{2}$  Linien lang. Variirt in der Färbung.

### LXXXVIII. Tachyporus.

Der Kopf klein, zurückgezogen; das Bruststück hinten abgestutzt, von der Breite der Fühler; der Bauch kegelförmig, schlank, hinten vorstig.

#### Tachyporus chrysomelinus.

Convex, glänzend schwarz; Bruststück, Füße und Fühlerbasis rothgelb, die Flügeldecken braunroth, an der Basis und am Schulterrande schwarz.

### Panzer IX, 14.

2<sup>1/2</sup> lang. Unter Steinen, Moos, abgefallenem Laube &c. sehr häufig.

### LXXXIX. Lomechusa.

Die verlängerten Vordertaster viergliederig; Brustschild breit, mit einer Längsfurche. Der Leib kurz und breit, die Flügeldecken kurz.

#### Lomechusa emarginata.

Glänzend, fein punktiert, röthlich; Brustschild und Mitte des Bauches braun. Die hinteren Winkel des Brustschildes sowie die der Flügeldecken dornspitig.

### Olivier Ent. III, T. II, F. 12.

Im Frühjahr unter Steinen an trockenen Stellen, stets in der Gesellschaft der rothen Ameisen. 2<sup>1/2</sup> lang. — Einige verwandte Arten finden sich ebendaselbst.

## **XC. Aleochara.**

Die Fühler nach außen dicker; die Bordertaster lang, viergliederig, das dritte Glied keulenförmig, das vierte zart, pfriemenförmig. Die hinteren Ecken des Brustschildes abgerundet.

### **Aleochara canaliculata.**

Schlank, ziegelroth, Kopf und eine Binde in der Mitte des Hinterleibes schwärzlich; Bruststück länglichrund, mit einer tiefen, hinten breiteren Furche.

**Panzer XXVII, 43.**

Unter Steinen, im Moose &c. sehr häufig.

## **XCI. Paederus.**

Der Leib schmal, lang, gewölbt. Kopf freirund, hervorstehend; Bruststück rund, etwas viersichtig. Das vierte Tarsenglied zweilappig.

### **1. Paederus riparius.**

Braunroth, glänzend, Kopf, Brust, Bauchende und Knie, schwarz. Die Flügeldecken punktiert, blaugrün.

**Panzer IX, 44.**

Im Grase, in der Nähe des Wassers, gemein.  $5\frac{1}{2}''$  lang.

### **2. Paederus ruficollis.**

Schwarz, glänzend, das ganze Bruststück ziegelroth, der Kopf und die Flügeldecken schwarzblau.

**Panzer XXVII, 22.**

## **XCII. Stenus.**

Die Fühler sein keulenförmig; die Augen sehr hervorgehoben; die Bordertaster sehr verlängert, die hinteren sehr kurz, beide mit verdicktem Endgliede.

**Stenus cicindeloides.**

Greuschwarz, etwas glänzend, tief punktiert, mit blassen Fühlern und Tastern; die Füße ziegelroth mit schwarzen Gelenken.  
An Gewässern und schattigen Orten. 3" lang.

**XCIII. Oxytelus.**

Die Kinnlappen fast gerade, kaum hervorstehend, innen mit zwei Zähnchen. Das Endglied der Bordertaster kegelförmig; die Fühler kaum gebrochen. Der Leib schmal, flach; auf dem Brustschild gebogene Rinnen.

**Oxytelus carinatus.**

Schwarz, etwas glänzend, Mund und Füße pechbraun; das Brustschild nach vorn breiter, mit fein gezähneltem Rande.

Panzer LVII, 24.

Häufig an Gewässern. 2" lang.

\*\* **Amphibia.** Eisförmig, gewölbt, mit Schwimmfüßen. Wasserkäfer. (Gyrinida, Hydrocanthara.)

**XCIV. D o r l e r.**

**Gyrinus.**

Mit scheinbar vier Augen; Fühler sehr kurz, zwischen die Augen einfügbar, keulenförmig. Füße kurz, die hinteren sehr zusammengedrückt; Leib eisförmig - länglich gewölbt, mit nacktem Steif.

**Gyrinus natator L.**

Der Radschläger, Drehkäfer.

Eisförmig, blauschwarz, sehr glänzend und glatt, mit ganz fein punktiert gesägten Flügeldicken; der untere Rand derselben und die Füße gelbbraun.

Panzer III, Fig. 5. — Uhrens Fauna, 2 Fasc. Taf. 5. — Rösel III, Taf. 31.

Die Vorderbeine dieser und anderer Gattungen sind viel länger. Diese Käferchen schwimmen mit unglaublicher Schnelligkeit auf stehenden Wassern im Kreise herum, und sehen wegen ihres fettigen Glanzes bewegten Deltropfen gleich; am Ufer tragen sie eine Luftblase, mit der sie bei der geringsten Gefahr in die Tiefe fahren, und sie dann atmen; sie stinken bei der Berührung. Ihre Larven gleichen kleinen sechsfüßigen Skolopendern. Diese gemeinste Gattung ist 3 Linien lang, es gibt aber auch noch kleinere wie etwas größere.

## XCV. Schwimmkäfer.

### Dytiscus.

Fühler borstenförmig; Leib eiförmig, länglich, oben und unten convex oder etwas flach, mit borstigen Schwimmfüßen. Die Vordertarsen des Männchens schüsselförmig erweitert.

Auch diese nebst den verwandten Geschlechtern leben im Wasser und meist in der Tiefe desselben, verlassen es aber an schönen Abenden und fliegen dann umher. Wenn man die vorigen als Wasser-Staphylinen ansehen will, so kann man diese und die Folgenden als amphibisch verwandelte Laufkäfer betrachten, denen sie in ihren übrigen Sitten sehr gleichen. Sie zeigen sich weniger wie die vorigen auf der Oberfläche, meist nur um sich zu sonnen oder zu atmen, und führen gleichfalls am Ufer eine Luftblase wie eine Perle mit sich, wenn sie untertauchen.

Ihre Spezies sind sehr zahlreich.

Ihre Larven sind lang, etwas schmal und spindelförmig, hinten spitz, mit Stachelborsten, einen runden flachen Kopf mit großen Beißzangen und zarten haarigen Füßen. Sie sind sehr räuberisch, und ihre Kinnbacken sollen vorn eine Öffnung haben, wie die der Spinnen.

#### 1. *Dytiscus latissimus L.*

Groß, die Flügeldecken an der Seite eiförmig, zu einer breiten Kante erweitert und platt, schwärzlich, vor der Kante und rundum das Brustschild gelb gesäumt, die Füße gelb.

Das Männchen hat glattebene Flügeldecken und die Vorder-  
tarsen schildförmig erweitert; das Weibchen hat tief gefurchte  
Flügeldecken.

Panzer LXXXVI, 1, 2.

Die größte hieländische, aber seltene Gattung, über andert-  
halb Zoll lang und einen breit. In tiefen Gräben. Fischt den  
Fischen Löcher in den Leib.

2. *Dytiscus marginalis*.

Olivengrün-schwarz, der Umfang des Brustschildes und der  
Flügeldecken gelb gesäumt. Das Brustbein nach hinten gabelig,  
mit lanzettförmigen Spizien.

Männchen und Weibchen wie beim vorhergehenden gebildet.

Panzer LXXXVI, 3, 4. — De Geer IV, Taf. 16. — Rö-  
sel II, Taf. 1, Fig. 9.

Die gemeinste Gattung, in allen stehenden Gewässern, auch  
in Bächen. Nicht ganz so groß als der vorige. Auch er soll  
den Fischen schädlich seyn.

3. *Dytiscus sulcatus*.

Eiförmig, flach, schwärzlich, der Rand des Brustschildes und  
eine an beiden Enden breitere Querbinde gelb. Am Kopf drei  
gelbe Flecken.

Das Männchen mit glatten dicht punktierten Flügeldecken,  
und vorn schüsselförmigen Tarsen; das Weibchen mit vier tiefen,  
breiten, graubraun behaarten Furchen.

Panzer XXXI, 9, 10. — Rösel II, Taf. III, Fig. 1—8.

Auch die Flügeldecken sind gelb eingefasst, doch variiert diese  
gelbe Zeichnung und fehlt bisweilen ganz. Er ist etwa einen  
halben Zoll lang, eirund, und findet sich in tiefen Gräben, auch  
im Winter. Die Larve ist schlank, der Kopf an einem schmalen Halse.

4. *Dytiscus Hübneri*.

*Hydatiens* Hübneri.

Eiförmig, schwarz, das Bruststück vorn und an den Seiten  
rostbraun, die Flügeldecken mit gelbem seitlichen Streif.

Olivier III, T. IV, F. 33.

Das Männchen mit ebenem Brustschild, und schlüsselförmigen Vordertarsen; das Weibchen mit gestricheltem Brustschild. Einen halben Zoll lang; im Sommer nicht selten im Wasser, im Winter unter Moos.

### 5. *Dytiscus abbreviatus.*

*Colymbetes abbreviatus.*

Eisförmig, länglich, schwarz, der Kopf und Saum des Brustschildes rostroth, auf jeder Flügeldecke vorn eine zackigwellige Querbinde, dahinter einen halbmondförmigen Fleck, und einen Endpunkt. Die Flügeldecken dabei sein punktiert.

### Panzer XIV, 1.

Die drei ersten Glieder der Vorder- und Mitteltarsen sind etwas breiter und unten mit Haarborsten besetzt. Findet sich auch im Wasser und im Winter unter Moos wie der vorige.  $3\frac{1}{2}$  " lang.

### XCVI. *Hyphydrus.*

Fühler kurz, fadenförmig. Leib unten sehr convex; die Basis der Hinterschenkel frei. Die vier Vordertarsen viergliederig, die hinteren fünfgliederig. Kein Schildchen.

*Hyphydrus ovatus.*

Rundlich eisförmig, unten hoch gewölbt, rostgelb mit dunkleren Flügeldecken, oben tief punktiert, seidenglänzend.

### De Geer IV, Taf. 15, Fig. 17—20.

Zwei Linien lang. Gemein in stehenden Gräben.

### XCVII. *Noterus.*

Fühler kurz, in der Mitte dicker; Bruststück in der Mitte in eine Ecke erweitert. Schildchen fehlend. Alle Tarsen fünfgliederig, das erste Glied größer.

### *Noterus crassicornis.*

Eisbrmig, convex, rostgelb mit kastanienbraunen Flügeldecken, auf welchen drei unordentliche Reihen eingedrückter Punkte.

*Olivier III, IV, 34.*

Das sechste Fühlerglied des Männchen ist nach außen in ein Läppchen erweitert. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lang. Gemein in allen Gewässern.

\*\*\* *Elaphrina.* Leib länglich, breiter wie Kopf und Brustschild. Die Augen stark hervorgequollen.

## **XCVIII. Bembidium.**

Kopf schmäler als das Brustschild; Fühler fadenförmig, länger als dieses. Das vorletzte Glied der mittleren und hinteren Taster größer, keulenförmig, das letzte klein und pfriemenförmig.

### 1. *Bembidium biguttatum.*

Obenher messinggelb, ins Grüne, glänzend, mit flachen, zart punktiert-gestreiften Flügeldecken und zwei tiefen Gruben in der Mitte. Die Beine roth.

*Olivier III, XIV, 163, a, b.*

Variert auch violet und blau. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lang. Am Wasser im Frühling, wie die Folgenden.

### 2. *Bembidium rupestre.*

Länglichflach, metallgrün ins Schwarze; die Basis der Fühler und die Beine rostgelb; die Flügeldecken punktiert-gestreift, mit zwei schleifen blaßrothen Flecken.

*Panzer XL, 6.*

Auf Ackeru, unter Steinen, am Ufer der Gräben. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lang. Nicht selten.

### 3. *Bembidium Doris.*

*Elaphrus squatilis III.*

Schwarz, metallischglänzend, die Basis der Fühler und die

Füße pechbraun; die Flügeldecken punktiert gestreift, zwei weiße Punkte an der Spitze und zwei dahinter.

Panzer XXXVIII, 9.

## XCIX. Elaphrus.

Fühler kurz; Augen groß, hervorgetrieben; Flügeldecken mit mattfleckigen Gruben.

### 1. *Elaphrus riparius*.

Kupferfarbig, ins Graugrüne, matt punktiert; das Brustschild in der Mitte gesurcht, die Flügeldecken mit vier Reihen runder violetter Ocellengruben, in deren jeder ein Höcker.

Sturm VII, 133, 3. — Panzer XX, 4.

Um Wasser sehr häufig. 3" lang.

### 2. *Elaphrus multipunctatus*.

*Blethisa multipunctata* Déj. — *Nebria multipunctata* Gyll.

Dunkel metallischglänzend, mit punktiert-gestreiften Flügeldecken; die zwei Reihen Grübchen tragen.

Panzer XI, 5. — Sturm VII, 181.

Die Flügeldecken haben große kupfergrüne Gruben; sie und das Brustschild sind am Rande grün und kupfergoldig. Letzteres breit. 5" lang. Im Sommer auf feuchten Wiesen, im Winter unter Moos.

## C. Calosoma.

Der Leib groß, breit, flach, fast vierseitig; Brustschild klein, kurz, quer, mit abgerundeten Seiten. Rinnbacken fast ungezähnt.

### 1. Der Puppenräuber.

#### *Calosoma Sycophanta*.

Moschuskäfer.

Dunkel violet, metallischglänzend, mit gold- oder kupferschillernden grünen, tief punktiert gesurchten Flügeldecken, auf welchen drei Reihen vertiefter Punkte.

Panzer LXXXI, 7. — Sturm III, 36.

Bis über einen Zoll lang; ein schöner Käfer. Man findet ihn im Sommer in Nadelwäldern, wo er auch, gegen die Art der andern dieser Familie, auf die Bäume klettert. Seine schwarze Larve nährt sich zumal von den Prozessionstraupen, deren sie täglich mehrere Stück fressen soll.

## 2. Der kleine Raupenjäger.

*Calosoma inquisitor.*

Schwärzlich kupferroth, untenher grün, mit quergerunzelten, punktirigekreisten Flügeldecken mit einer dreifachen Reihe eingedrückter Punkte.

Panzer ib. 8.

Beträchtlich kleiner als der vorige, nur etwas über einen halben Zoll lang. Mehr in Gärten und Laubwäldern.

## Cl. Laufkäfer.

*Carabus.*

Ungeflügelt, mit länglich eiförmigem Leib, herzförmigem Brustschild mit verlängerten Hinterwinkeln, und bogenförmig-spienen Kinnbacken. Das Kinn mit drei Zähnen, die Vordertarsen der Männchen breiter.

Die Arten sind ziemlich groß, räuberisch, und geifern durch das Maul, so wie zum Apter heraus einen schwarzgrünen stinkenden, sehr ätzenden und blasenerregenden Saft. Sie sind unter Moos, Baumrinden, Steinen häufig, und laufen mehr des Abends als am Tage umher. Auch stinken sie bei der Berührung.

## 1. Die Delmutter.

*Carabus auratus.*

Goldhahn.

Obenher metallgrün, ins Kupferrothe, die Flügeldecken jede mit drei erhabenen Längsrippen; dazwischen eben; Basis der Fühler und Füße braunroth.

Panzer LXXXI, 4.

Brigit. Beobieg. Bd. IV.

Einen Zoll lang. Dieser bei uns im mittleren Deutschland so gemeine, in allen Gartenwegen und Ackerwegen anzutreffende Käfer soll jenseits der Elbe höchst selten seyn.

### 2. *Carabus auronitens.*

Länglich-eiförmig, obenher goldgrün, jede Flügeldecke mit drei violettschwarzen erhabenen Längsrippen, dazwischen rauh; Fühlerbasis und Füße rothbraun.

Panzer ib. 7.

Von der Größe des Vorigen, aber nur in Gebirgswäldern, nie in der Ebene. Seine Flügeldecken sind rein grasgrün.

### 3. *Carabus nitens.*

Länglich, obenher goldgrün, mit grünen am Rande goldigen Flügeldecken, mit sechs schwarzen Längsrippen und eben solcher Naht.

Panzer ib. 2.

Nur halb so groß als der vorige; auf Feldern. Die äußeren Rippen sind einigemale unterbrochen.

### 4. *Carabus hispanus.*

Lang und schmal, indigblau, mit rein goldig metallischen, durch Gruben genarbten Flügeln.

Einer der schönsten Käfer. In Spanien, dem südlichen Frankreich u. a. zu Hause.

Seine Flügeldecken sind am Rande purpurroth gesäumt, und schillern in Grün und Roth. Er ist  $1\frac{1}{4}$  Zoll lang, und schmal, gestreckt.

### 5. *Carabus purpurascens.*

Schwarz, länglich, der Rand der Flügeldecken und des Brustschildes violblau.

Panzer I. c. 5.

Die Flügeldecken sind sein gestreift. 10" l. In Wäldern, zumal unter Moos und Steinen, doch scheint er nicht bis ins nördliche Deutschland zu gehen.

6. *Carabus violaceus.*

Schwarz, mit lang-eisförmigem Hinterleibe und Flügeldecken, diese so wie der Rand des Brustschildes glänzend violetroth.  
Panzer ib. 4.

Er ist viel größer und gestreckter wie der vorige, mit dem er bisweilen verwechselt wird. Einen Zoll lang, die Flügeldecken wenigstens noch einmal so lang als Kopf und Bruststück zusammengenommen, während sie beim vorigen nur dieselbe Länge erreichen. Sie sind gewölbt und fein geförmnt.

7. *Carabus glabratus.*

Länglich, schwarz, die eisförmigen Flügeldecken sehr gewölbt und fast glatt.

Panzer LXXIV, 4.

Das Brustschild ist breit. 10" l. Gleichfalls in Wäldern.

8. *Carabus cyaneus.*

*Carabus intricatus.*

Gestreckt, etwas platt, obenher berlinerblau, die Flügeldecken nach hinten etwas breiter, und von Längsreihen erhabener Knöbchen und Körnchen rauh.

Panzer LXXXI, 2.

In Hochwäldern, unter Steinen. 1" lang. Gesten.

9. *Carabus convexus.*

Schwarz, mit blauem Einsaß, die Flügeldecken kürzer, eisförmig convex, zart geflebt-gestreift und mit drei Reihen vertiefter Punkte.

Panzer LXXIV, 5.

Kürzer und kleiner als die vorigen, 6—8" lang. In Wäldern, an Wegen, unter Steinen.

10. *Carabus nemoralis. G.*

Eisförmig, schwarz, mit purpurnem Einsaß, obenher ins bräunlich Erzfarbene; die Flügeldecken etwas gerunzelt, wie in

Längsstreifen, mit drei Reihen eingedrückter Punkte. Rücken des Brustschildes schwarz.

Panzer V, 2.

In Gärten. 10" lang.

11. *Carabus hortensis.*

Länglich, schwarz, mit dicht gestreiften Flügeldecken, die Flügeldecken bräunlichschwarz, purpurroth gesäumt, mit drei Reihen herzsförmiger, kupferglänzender, eingedrückter Punkte.

Panzer LXXIV, 2.

In Wäldern; 1" lang.

12. *Carabus granulatus.*

Länglich, flachgedrückt, obenher bronzenfarb, manchmal ins Blaue oder Grüne, die Flügeldecken mit erhabenen Längsrippen, dazwischen kettenförmige Reihen erhabener Punkte.

Panzer LXXXV, 4.

Sehr häufig unter Moos, Baumrinden, Steinen, in alten Weiden &c. 8" lang.

13. *Carabus cancellatus.*

Eisförmig, convex, obenher bronzegrün, auch kupferroth, die Flügeldecken mit sechs kettenförmig körnigen Reihen zwischen glatten Längsrippen. Basis der Fühler und Beine braunroth.

Panzer LXXXI, 6.

Fast 1" lang, an den Aufenthaltsorten des vorigen.

14. *Carabus clathratus.*

Länglich, convex, obenher bronzenfarb schwarzgrün, jede Flügeldecke mit drei Längsrippen, dazwischen eine Reihe goldiger Gruben.

Panzer LXXV, 1.

Ebendaselbst. 1" lang.

## CII. Procrustes.

Die Unterlippe dreilappig, der mittlere Zahn breit, abgestutzt. Die Kinnbacken in der Mitte mit drei starken Zahnen; das Endglied der Fäster etwas sickelförmig. Die Vordertarsen der Männchen stark verbreitert, unten gepolstert. Die Flügeldecken verwachsen.

### Procrustes coriaceus.

Eisförmig-länglich, convex, mattschwarz mit runzlig punktiertem Brustschild und Flügeldecken.

#### Panzer LXXXI, 1.

Die Flügeldecken sind verwachsen. Er wird über  $1\frac{1}{2}$  Zoll lang und ist daher einer der größten deutschen Käfer. *Procerus scabrosus* Meg. (*Procrustes seabr.* F.), in Kärnthen ist aber noch größer, auch breiter eisförmig. Beide finden sich an Graswegen und in Wäldern, nicht selten, zumal im Spätsommer.

## CHI. Loricera.

Der Kopf hinten in den Hals zusammengezogen; Augen groß, hervorstehend; die Fühler borstenförmig, gebogen, die unteren Glieder knotig, alle langborstig behaart, in Quirlen.

### Loricera pilicornis.

Kupfergrün, etwas glänzend, die Flügeldecken punktiert-gestreift, jede mit drei tiefen Gruben; die Schienbeine und Fäster braunroth.

#### Panzer XI, 10.

An feuchten Plächen, in Gräben unter Steinen;  $3\frac{1}{2}''$  lang.

## CIV. Panagaeus.

Der Kopf hinten in einen Hals zusammengezogen; die Augen hervorstehend, kugelig; Kinnladen sehr spitz, bogenförmig, ohne Zahn, innen gewimpert.

### Panagaeus Crux.

*Carabus Crux major* Fabr.

Weich behaart, schwarz, die Flügeldecken punktiert-gestreift, ziegelrotbrah, mit einem schwarzen Kreuz gezeichnet und hinten schwarz. Das Brustschild kreisrund.

#### Panzer XVI, 1.

Drei und eine halbe Linie lang; unter Steinen an Waldrändern, auf Bergen, selten. Ein artiger Käfer, dessen Kreuzzeichnung durch eine breite schwarze Mittelnah und schwarze nach hinten breitere Querbinde etwas hinter der Mitte der Flügeldecken hervorgebracht wird, die man aber noch richtiger durch vier große rothe Flecken auf denselben, schwarz gedachte, erklären kann.

### CV. Chlaenius.

Brustschild herzförmig, hinten mit spitzen Ecken. Flügeldecken länglich, breit, wenig gewölbt, fein gekörnt und etwas behaart.

#### Chlaenius vestitus.

Grasgrün mit gelbem Grifffuß der Flügeldecken und des Brustschildes, gelben Fühlern und Beinen.

#### Panzer ib. 5.

An Flüssen.  $\frac{5}{6}$  lang. Das rumzelige Brustschild glänzt schön stahlgrün. Die Flügeldecken sind gestreift, am Ende ockergelb.

### CVI. Anchomenus.

Kopf und Bruststück schmal, letzteres mit hinten ~~angespitzten~~ Ecken. Flügeldecken breit, etwas flach, gesurcht.

#### Anchomenus prasinus.

*Harpalus prasinus* Gyll.

Schwarz, Kopf und Brustschild schön grasgrün; die Flügeldecken rostbraun, hinten mit einem großen einrunden schwarz-blauen Fleck. Basis der Fühler und Füße gelbbraun.

#### Panzer ib. 6.

4" lang. Bei Zena einer der gemeinsten Käfer, im Frühling unter allen Steinen, dagegen er anderwärts, und namentlich jenseits der Elbe, sehr selten ist.

### **CVII. Agonum.**

Bruststück scheibenförmig, hinten zugerundet. Flügeldecken länglich, flach.

#### **Agonum marginatum.**

Glänzend grasgrün, die Flügeldecken gestreift, jede mit drei eingedrückten Punkten, am Saume gelb.

Panzer XXX, 14.

Von der Größe des vorigen; auf feuchten Wiesen.

### **CVIII. Mormolyce.**

Der Leib ganz platt, dünn wie ein Blatt, Kopf und Bruststück sehr viel schmäler.

#### **Mormolyce phyllodes Hagenb.**

Schwarzbraun, mit langem schmalem Kopfe und eisförmigem an beiden Enden abgestutztem Bruststück.

Déjean et Boisduval Iconogr. T. II, pl. 113, F. 1. — Guérin Iconogr. 2<sup>me</sup> Livr., pl. VI, F. 7.

Ein wunderbar gestalteter, ganz platter, gleichsam wie zertritten aussehender Käfer, der an die Blatta erinnert und auf Java gefunden wird. Er ist über 1" lang, die Flügeldecken sind sehr ausgedehnt und nach Außen bogig, mit einem tiefen Einschluß an der Innenseite.

### **CIX. Cephalotes.**

Kopf dick, mit großen hervorstehenden Kinnladen; Bruststück herzförmig, nach vorn breiter. Leib und Flügeldecken schmal, länglich, an der Basis eingezogen.

### *Cephalotes vulgaris.*

Schwarz, glatt und eben, mit schmalen feingestreiften parallelrandigen Flügeldecken.

*Sturm Fauna IV*, Taf. 99. *Broscus ceph.* — *Panzer LXXXIII*, 1.

Nicht selten auf feuchter Erde, in die er sich eindringt. 9 Linien lang.

### **CX. Amar a.**

Eisförmig, mit kleinem hervorstehendem Kopf. Das Brustschild hinten von der Breite der Flügeldecken.

#### *Amar a communis.*

*Harpalus communis.*

Schwarz, mit metallisch-grünlichem Glanze; die Schienbeine und Basis der Fühler gelblich; die hinteren Schienbeine der Männchen dicht behaart.

*Panzer XL*, 2.

Nebst mehreren Verwandten einer der gemeinsten Käfer, auf Feldern, unter Steinen sc. 3''' lang. Von der eisförmig gewölbten Form eines *Dermestes*.

### **CXI. Harpalus.**

Länglich, das Brustschild so breit als die Flügeldecken, hinten etwas schmäler, mit spitzen Hinterdecken.

#### **1. *Harpalus ruficornis.***

Länglich, pechbraun, Fühler und Füße rothbraun, die Flügeldecken gestreift, matt und behaart, in den Zwischenräumen stark punktiert.

*Panzer XXX*, 2.

Häufig auf der Erde und unter Steinen. 7 Linien lang.

## 2. *Harpalus gibbus*.

*Zabrus gibbus*.

Länglich, ziemlich convex, obenher glänzend schwarz, unten pechbraun, Mäul und Fühler rosobraun, die Flügeldecken mit geraden Seiten, punktiert-gestreift.

Panzer LXXIII, 8. *Carabus tenebrioides*. — Germar Mag. I. c., Taf. 1.

Auf Acker- und Saatfeldern; 6—7" lang, das Brustschild gerandet, so breit wie die Flügeldecken, nach vorn abgerundet.

Dieser Käfer hat sich durch eine Verhandlung der naturforschenden Gesellschaft zu Halle im Jahr 1811 berühmt gemacht \*), welche Larven desselben zugeschickt worden waren, die in der Gegend von Halberstadt die Getreidesprößlinge und deren Wurzeln zerstörten. Auch in Italien hat man einmal ähnliche Verwüstungen durch ihn bemerkt \*\*).

Die Larve braucht, wie man vermutet, drei Jahre bis zur Verwandlung. Ausgewachsen beträgt ihre Länge einen Zoll, sie ist platt und schmal, überall gleichbreit, und besteht aus 13 Abschnitten, deren erster den Kopf bildet. Dieser ist ganz glatt, mit starkem Zangengebiss, und hat oben zwei Längsfurchen. Er ist mit Haaren besetzt, und hat zwei kurze viergliederige Fühler. — Sie lebt am Tage sechs Zoll tief unter der Erde, geht aber Abends und Nachts heraus, frisst sich an der Oberfläche der Erde in den Stengel des Getreidehalms ein, und wühlt bis auf das Mark herunter. Diese Raupen zerstörten mehrmals den selbst nachgesäten Weizen, gingen dann auf gleiche Weise den Roggen, und endlich die Gerste an. Bei der Verpuppung bildeten sie senkrecht niedergehende Röhren von sechs Zoll bis zwei Fuß tief, die sich in eine eisförmige ausgeglättete Höhlung endigte,

\*) Naturgeschichte des *Carabus gibbus*, eines saatverwüsten Insekts. Germar Magazin der Entomologie I. B., 1 Heft.

\*\*) Hrn. Dr. Erichson meint zwar (die Käfer der Mark Brandenburg I. B., S. 78), daß es die Larve der *Anisoplia fructicola* gewesen seyn könne, welche jenen Schaden verursacht, und die Larven dieses Laufkäfers nur jene verfolgt hätten, die Berichte der bewährten hallischen Entomologen sind jedoch zu genau, um eine solche Vermuthung hinlänglich zu begründen.

in welcher die gekrümmte Puppe lag. Diese war gelblichweiß mit schwarzen Augen, der Kopf vierseitig mit langen hervorragenden Fästern und untergeschlagenen Fühlern. Die Flügeldecken sind nach unten geschlagen. Die Puppe selbst war äußerst weich und empfindlich, so daß sie bei der geringsten unvorsichtigen Bewegung verletzt und getötet ward.

Die Larve verpuppt sich Anfangs Juni, und schon zu Ende dieses Monats erscheint der Käfer. Dieser aber führt noch fort schädlich zu seyn, indem er in ungeheuren Heerschaaren des Nachts hervorkam, an den Halmen heraufkletterte, und die Körner der Mehren ausfraß, womit er sich, auch in einer Schachtel eingeschlossen, füttern ließ. Um Tage verkriecht er sich unter Steinen. Seine Eier scheint er in großen Massen zu legen.

### 3. *Harpalus aeneus.*

Länglich, metallischglänzend, grasgrün, flaschengrün, kupferroth, auch blau und schwarz; Fühler und Beine ziegelroth. Die Flügeldecken an der Spitze tief eingekerbt oder ausgeschweift, gestreift, und an den äußeren Zwischenräumen punktiert.

#### Panzer LXXV, 3.

Ueberall den ganzen Sommer hindurch auf Feldern und unter Steinen.  $4\frac{1}{2}''$  lang.

## CXII. *Clivina.*

Fühler kurz, schnurförmig; die vorderen Schienbeine außen mit zwei Zähnen, die mittleren außen vor der Spitze mit einem Dorn bewaffnet.

### *Clivina fossor.*

Schmal, gleichbreit, mit rundlich-quadratischem, convexem Bruststück; Fühler und Füße rothbraun.

#### Sturm 188, 2. — Panzer XLIII, 41.

Ein kleiner, aber in feuchten Gegenden häufiger Käfer, von nur  $3''$  Länge. Auf dem dritten Streife der Flügeldecken sind vier größere Punkte.

## CXIII. Brachinus.

Flügeldecken breit, gewölbt; Brustschild viel schmäler, länglich herzförmig; Kopf noch schmäler wie das Brustschild.

### 1. Der Bombardirkäfer.

*Brachinus crepitans.*

Fleischroth, mit blaulich-schwarzen gestreiften Flügeldecken; der Bauch schwarz.

Panzer XXX, 5. — Sturm VII, Taf. 176.

Unter Steinen und abgefallenem Laube häufig.  $5\frac{1}{2}''$  lang. Diese Gattung zumal ist merkwürdig, daß sie theils von selbst, theils wenn man den Käfer unter den Flügeldecken hält, wie verholt einen blauen ätzenden Dampf mit kleinem Knall hervorstößt.

### 2. *Brachinus explodens.*

Ziegelroth, mit ziemlich glatten blauen Flügeldecken, Brust und Bauch schwarz.

Sturm I. e. 177.

Um die Hälfte kleiner als der vorige, die Flügeldecken flacher, gewölpter, und ausgezeichnet blau oder grün. Nicht so häufig wie der andere, aber an gleichen Orten.

## CXIV. Cicindela.

Flügeldecken länglich-quadratisch, etwas gewölbt. Brustschild vorn und hinten eingeschnürt. Kopf mit flach eingedrückter Stirn; Augen groß, hervorgetrieben. Beine zart. Am Ende der Kinnlappen ein eingelenkter Bahn.

Diese Käfer haben sämtlich einen metallischen Kupferglanz und seidenartig matt-schimmernde grüne Flügeldecken, einerseits bis ins Blaue, anderseits in das Violettrotse und Bronzebräune ziehend, und mehr oder minder mit weißen, auch bogigen Flecken versehen. Auch bei Ihnen ist merkwürdig, daß sich Arten fast über den ganzen Erdkugel, im Allgemeinen vollkommen einander

gleichend, vorfinden, wie z. B. *C. chinensis* in China, *analis* in Java, *festiva* am Senegal, *cayennensis* in Südamerika, *marginella* am Cap, *Durvillei* auf Neu-Guinea, *pulchra* in Nordamerika u. s. w. Auch die europäischen Länder haben fast jedes seine eigene Species, die sich bis ins südliche Russland, Griechenland, Arabien und Kamtschatka fortsetzen.

Es sind schnellaufende Raubkäfer, die bei der geringsten Annäherung auffliegen, sich aber bald wieder setzen. Sie fassen Raupen und andere kleine Insekten an.

So häufig sie auch sind, so hat man doch bis vor Kurzem ihre früheren Zustände noch nicht recht gekannt. Der Engländer Westwood hat sie von *Cicindela campestris* beschrieben \*). Seinen Beobachtungen zu Folge, ist die Larve einen Zoll lang, hat einen großen, dreieckigen, oben wie eine Tasse vertieften Kopf, und mächtige Beißzangen. Diese Aushöhlung ihres Scheitels benutzt die Larve, um den ausgewählten Sand ihrer Höhle herauszuschaffen und seitwärts abzuwerfen. Die Höhle besteht aus einem fast senkrechten Kanal, 18 Zoll tief, nach Art der vorigen Käfer, von  $\frac{1}{6}$  bis  $\frac{1}{3}$  Zoll Durchmesser, und W. fand vergleichen im Sande, im Monat April. Hier lauert die Larve, den Kopf oben an der Mündung, so daß sie dieselbe mit ihm verschließt, auf ihre Beute, und schnickt, sobald sie ein Insekt ergriffen, dabei mit dem Kopfe sehr lebhaft zurück. Ist es gestötet, so zieht sie es in ihre Höhle hinab, um es auszusaugen. Man findet dieselben den ganzen Sommer hindurch.

#### 1. *Cicindela campestris* L.

Grün, Brust und Füße kupferroth, die Flügeldecken mit fünf weißen Randpunkten, und einem sechsten, vorn schwarzen, auf der Mitte.

Sturm VII, Taf. 103, 1.

Die gemeinste Art, im Sommer auf trockenen Grasplächen und Wegen. 6" lang. Nur das Weibchen soll einen schwarzen Punkt auf jeder Flügeldecke, nicht weit von der Basis und Naht derselben haben.

\*) Ueber die Familie der Cicindeleten. A. d. Engl. in den Annales de sc. naturelles, Mars 1831, S. 299. Mit Abbildungen. Taf. 8.

## 2. *Cicindela germanica*.

Schmal, fast cylindrisch, schön spanggrün oder blau und schwärzlich, mit zwei weißen Punkten am Rande, und einem weißen Halbmond an der Spitze. Die Lefze weiß.

Sturm 1. c. 106, 3. — Panzer 5.

Auf Feldern; 4" lang. Die Flecken fehlen bisweilen.

## 3. *Cicindela hybrida*.

Kupferbraun ins Graue, jede Flügeldecke vorn und hinten mit Mondfleck, in der Mitte mit wellenförmigem Zackenfleck. Die Lefze weiß.

Sturm 109, 5. — Panzer LXXXV, 4.

Etwas breiter als die vorige und schmäler als die folgende Art; 6" lang. Die Unterseite ist purpurgrün. Mehr in Wäldern.

## 4. *Cicindela sylvatica*.

Schwarz, mit Kupferschimmer, die Flügeldecken mit Grübchen, an der Basis mit einem Halbmond, an der Spitze mit einem unvollkommenen oder nur einem Punkte, in der Mitte mit Zackenfleck. Die Lefze schwarz, die Taster grün.

Sturm 180. — Panzer LXXXV, 5.

Die größte; 7 Linsen lang. Die Taster sind schwarz. Zumal in Kiefernwäldern.

---

Behnte Familie.

W e i ß k ä f e r.

(*Malacodermata, Cantharida, Clerida* etc.)

Mit rundlichem Kopf und meist weichen Flügeldecken, theils rund, convex oder schildförmig, theils lang. Die Fühler schnur- oder keulenförmig.

Ihre Larven sind räuberisch und leben theils offen am Tage, theils sind sie Parasiten,

Die vollkommenen Käfer sind träge, schwerfällig, weich anzufühlen, und enthalten öhrende, blasenziehende Gässe, die mehrere bei der Berühring aus den Gelenken fahren lassen.

## CXV. Coccinella.

Halbkugelig oder eisförmig-kugelig, unten platt. Fühler feulensförmig.

### 1. Der Siebenpunkt.

#### *Coccinella septempunctata.*

Marienkäfer, Sonnenkäfer.

Halbkugelig, schwarz, das Brustschild an den Seiten weiß, die Flügeldecken roth, mit sieben Punkten.

Brandt und Räzeburg *Arzneithiere* II, Taf. 20.

Ein älter Welt bekannter, artiger Käfer, der wie die anderen dieses Geschlechts aus den Gelenken einen dunkelgelben, wie Opium riechenden, bitterschmeckenden Saft ausschwitzt, den der Hahnarzt Hirsch vor etwa vierzig Jahren zuerst als ein probates Mittel gegen das Hahnweh empfahl, da man einen solchen Käfer nur zwischen die Fingerspitzen zu nehmen braucht, und diese, wenn sie von jenem Saft benetzt sind, an den leidenden Hahn zu halten hat.

Man findet den Siebenpunkt oft sehr häufig im Spätsommer auf den Feldern <sup>2)</sup>). Seine Larve, die sich zumal gern an den Getreideähren aufhält, ist länglich, schwarzbraun mit kurzen Borstenhaaren und kleinen schwarzen, auch fleischrothen und weißen Höckerchen besetzt. Sie hat sechs Füße. Ihre Nahrung besteht in Blattläusen. Bei der Verwandlung klebt sie sich mit dem Schwanzende an eine Pflanze, krümmt sich, platzt endlich, und stellt verkürzt die Puppe dar. Wird diese

<sup>2)</sup> In England sollen sie sich in manchen Jahren so vermehren, daß man nicht vor ihnen gehen kann. Kirby et Speyce *Ent.* II, p. 9.

beunruhiget, so hebt sie den Vordertheil wie einen Hammer auf und nieder, der Käfer tritt nach 6—10 Tagen daraus hervor.

### 2. *Coccinella bipunctata.*

Schwarz, mit rothen gerandeten Flügeldecken, auf jeder ein schwarzer Punkt, das Halsshild mit weißen Flecken.

Panzer 106, 4.

Gemein in Gärten, auf Blumen &c. Variirt in der Fleckung sehr.

### 3. *Coccinella ocellata.*

Schwarz mit braungelben Flügeldecken, auf denen fünfzehn schwarze, weiß gerandete Flecken; das Halsshild blaß gelb gesäumt.

Panzer 106, 6.

Fünf Linien lang; zumal auf Weiden. Kommt auch ungesleckt vor.

### 4. *Coccinella vigintipunctata.*

Halbkugelig; die Flügeldecken schön grünlichgelb, mit zwanzig schwarzen Punkten; das Halsshild mit deren fünf,

Panzer I. c. 2.

Nur zwei Linien lang. Eines der zierlichsten Käferchen. Man kann auch 22 Punkte auf ihm zählen. Auf Blumen, und nicht selten an den Fenstern der Gartenhäuser.

### 5. *Coccinella bisbipustulata.*

Schwarz, auf den Flügeldecken vier große eiförmige braunrothe Flecke.

Panzer ib. 5.

Raum zwei Linien lang. Ebenfalls auf Blumen.

Zur medicinischen Anwendung können diese und viele andere zahlreichen Gattungen gebraucht werden.

## CXVI. Clerus.

Fühler nach dem Ende hin verdickt, mit dreigliederiger Keule. Die vordereen Taster fadenförmig.

### Clerus formicarius F.

Haarig, roth, Kopf und Flügeldecken schwarz, letztere an der Basis roth, querüber mit zwei welligen weißen Querstreifen.

Panzer IV, 8.

In Baumstümpfen und an frisch gefälltem Holze, oft in den Häusern. 4 — 5" lang. Man findet ihn fast das ganze Jahr hindurch.

### CXVII. Trichodes.

Fühler mit dicker dreigliederiger Keule; Brustschild vor dem Hinterrande eingeschnürt. Leib walzig, weich.

#### 1. Der Immenvolfs.

Trichodes spiarius.

Fr. Clairon.

Stahlblau, langhaarig, die Flügeldecken mit drei zinnoberrothen Binden.

Panzer XXXI, 13.

Sehr gemein auf Blumen. 6" lang. Seine Larve lebt in den Bienenstöcken und ist diesen durch das räuberische Verzehren der Bienenlarven nachtheilig.

#### 2. Trichodes alvearius.

Unterscheidet sich von dem vorigen leicht dadurch, daß die Endspitze seiner Flügeldecken roth, und nicht blau ist.

Panzer ib. 14.

Mit dem vorigen an gleichen Orten, ist aber seltener; die Larve lebt in den Nestsystemen der Mauerbienen.

### CXVIII. Notoxus.

Taster beiförmig, groß. Fühler nach vorn keulenförmig, schief abgestutzt. Leib lang, schmal, etwas gedrückt.

### **Notoxus mollis.**

Länglich, braun, etwas behaart, das Ende der Flügeldecken und zwei Querbinden blässer, der Bauch rothlich.

Herbst VII, 210.

Im frischen Holz. 6<sup>mm</sup> lang.

## **CXIX. Cantharis.**

Fühler borstenshormig; Taster beilsformig; das vierte Tarsenglied zweilappig. Leib schmal, lang, Flügeldecken weich.

### **1. Cantharis fusca.**

Schwarz, mit braunrothem punktiertem Halsschild, nach vorn mit einem schwarzen Fleck; der Hinterleib oben roth gesäumt, und mit rother Spieze.

De Geer IV, Taf. 2, Fig. 5—15.

Im Sommer unsäglich häufig, allenthalben. 7<sup>mm</sup> lang.

### **2. Cantharis melanura.**

Rostgelb; das Halsschild lang, vorn schmäler; Fühler, Tarsen und die Endspieze der Flügeldecken schwarz.

Panzer LXXXV, 6. — De Geer ib. 71, Fig. 3.

Oft ebenso häufig als die vorige. Ebenso groß.

## **CXX. Malachius.**

Fühler fadenhormig, schwach sägezähnig. Leib flach, mit weichen Flügeldecken, aus den Seiten des Körpers bei der Berührung rothe fleischige Bläschen hervortreibend.

### **1. Malachius aeneus.**

Behaart, kupfergrün, die Flügeldecken an den Seiten und am Ende zinnoberroth; am Munde bloß.

Panzer X, 2.

Häufig auf der Brennnessel und anderen Pflanzen, 4—5<sup>mm</sup> lang. Das Männchen hat das zweite Fühlerglied mit einer

Boigt, Zoologie. Bd. IV.

verlängerten Spieze und das dritte mit einem rückwärts gebogenen Stachel.

### 2. *Malachius bipustulatus.*

Behaart, lüpfergrün mit gelbem Mund, die Flügeldecken an den Enden roth.

Panzer X, 3.

Das Männchen hat das zweite Fühlerglied breit, fast beilförmig erweitert. 4<sup>1/2</sup> lang. Ebendaselbst; nicht selten.

## CXXI. *L e u c h t k ä f e r.*

### *Lampyris.*

Fr. Ver luisant. Engl. Glow-worm. Ital. Lucciola.

Fühler fadenförmig, zusammengedrückt, am Ende spitz. Der Kopf unter dem Halschild versteckt. Dieser und der Leib flach, länglich.

Die bekannten Käfer, aus deren durchsichtigen Leibesringen unten eine phosphorartige leuchtende Substanz durchschimmert. Diese, in Wasser lösliche Substanz lässt sich von dem Thiere absondern und leuchtet dann, zumal mit warmem Wasser befeuchtet, noch längere Zeit fort, dagegen sie in kaltem oder getrocknet, erlischt. Auch der Käfer lebt ohne sie fort, es scheint daher nur eine Absonderungsmaterie zu seyn, dagegen allerdings, wie man bemerken kann, der Wille des Insektes einen Einfluss darauf äußert.

### 1. *Das Johanniswürmchen.*

#### *Lampyris splendidula.*

Länglich, platt, obenher braun, das Halschild oben mit zwei etwas durchsichtigen Mondflecken; das Weibchen ungeflügelt. Panzer XLI, 8.

Etwa 4<sup>1/2</sup> lang. Das Männchen deutlich durch die zwei halbmondförmigen Flecken vorn am Halschild ausgezeichnet, hat die Beine und die zwei letzten Bauchringe gelb. Das Weibchen ist ungeflügelt, gelblich und gesleckt, und findet sich im Grase, unter

Gebüsch oder an den Bäumen, und leuchtet sehr stark. Es zeigt eine Spur von Flügeldecken.

## 2. Das Leuchtkäferchen.

### *Lampyris noctiluca L.*

Länglich, platt, obenher braun, der Rand des Halschildes aschgrau. Das Weibchen ungeflügelt.

Panzer XLI, 7 \*).

Länger und schmäler als die vorige Art, 6" lang. Hier zu Lande seltener.

## 3. *Lampyris italicica*.

Das Halschild den Kopf nicht ganz bedeckend, schwarz; beide Geschlechter geflügelt.

Olivier Col. II, T. XXVIII, F. 11, 12. — De Geer IV, XVII, Fig. 9.

Nur 4" lang, das Halschild ist röthlich. Sie leben auf Bäumen und leuchten sehr schön \*\*). In Frankreich und Italien.

## CXXII. Cerocoma.

Fühler kurz, neungliederig, mit keulenförmigem Ende. Bei den Männchen die drei ersten Glieder breiter, in einander gedrückt; Beine lang, Leib lang, schmal, nach hinten etwas breiter, Flügeldecken weich.

### *Cerocoma Schäfferi*.

Seidenglänzend, grasgrün, ins Blaue; mit feinen Haaren besetzt; Fühler und Beine gelb.

Panzer XL, Taf. 11. — Olivier T. I, F. 1.

5—6" lang. Auf den Blumen der Waldwiesen; selten.

\*) Gyllenhal vermutet mit Wahrscheinlichkeit, daß das auf dieser Tafel abgebildete Weibchen nicht das rechte, sondern eher die Larve einer *Silpha* sey.

\*\*) Eine vierte Gattung, L. hemiptera, mit ganz kurzen Flügeldecken, kommt im südlichen Frankreich, aber auch schon in der Rheinpfalz, in den Kartoffelfeldern vor. Olivier T. III, F. 25 a, b.

### CXXIII. *Mylabris.*

Fühler schnur förmig, nach vorn etwas keulen förmig. Kopf hervorste hend überhängend; Leib länglich, die Flügeldecken groß, hinten zugerundet, dach förmig herabhängend.

#### *Mylabris Cichorii L.*

Schwarz, die Flügeldecken mit drei gelben Binden.

Brandt und Raheburg *A. Th. II*, Taf. XVIII, Fig. 17.

Über einen Zoll lang, in China und Ostindien, wo sie statt unserer spanischen Fliegen im allgemeinen Gebrauch ist. Europa besitzt diesen Käfer nicht, und was früher dafür ausgegeben war, ist M. Fuesslini (*Panzer XXXI*, 18), der vor den drei gelben Binden noch zwei gelbe Punkte auf den Flügeldecken hat, und kleiner ist. Dieser findet sich sogar im südlichen Deutschland schon auf der Wollmilch, auch dem Wegwart, und es scheint, daß es dieser nebst ein paar verwandten Arten ist, dessen sich die Alten zum Blasenziehen bedienten; wie ihn deen schon Diokides und Hippokrates erwähnt.

### CXXIV. *Lytt a.*

Fühler faden förmig, halb so lang als der Körper. Kopf herzförmig, herabhängend. Leib lang, dick, weich. Flügeldecken so lang wie der Leib, weich, etwas an den Seiten herab gehend.

Die gemeine spanische Fliege \*).

#### *Lytt a vesicatoria F.*

*Cantharis vesicatoria L.* Cantharide.

Behaart, goldgrün, der Scheitel mit einem tiefen Eindruck. Brandt und Raheburg *I. c. Taf. XVIII*, Fig. 1—6.

Fast einen Zoll lang, in manchen Jahren überaus häufig, zumal auf Eschen, Flieder, Geißblatt, Rainweide, selbst Pappeln u. dgl., die sie durch ihre Gefräsigkeit oft ganz entlaubt, und sich schon von fern durch ihren übeln Geruch zu erkennen gibt. Beide Geschlechter sind sehr hurtig und lebhaft, zumal im Sonnenschein, auch fliegen sie dann um ihre Bäume. Sie finden sich durch ganz Europa, bis nach Schweden hinauf, die Kenntniß ihres Gebrauches kam uns aber zuerst aus Spanien. Sie werden vor Sonnenaufgang von den Bäumen abgeschlagen, auf Tüchern aufgesangen und getrocknet, wo sie dann wohl verschlossen aufbewahrt werden müssen. Ihre blasenziehende Eigenschaft ist aller Welt bekannt. Der Siz derselben soll in einem

\* Ich ziehe diesen allgemein bekannten Namen doch dem neuerlich versuchten anderen, wie Siehkäfer u. dgl. vor, da sie nicht nach dem Genius unserer Sprache gebildet sind.

eigenen, kamferartigen Prinzip, Canthariden liegen, welches noch mit einem grünen und einem gelben Oel, so wie andern Stoffen im Körper verbunden ist. Diese wirksamen Stoffe befinden sich vorzüglich im Hinterleib, zumal dem Eierstocke. Neuerlich auf die Haut gebracht, erregen sie bekanntlich Entzündung und Blasen, innerlich in kleinen Gaben im Grunde dasselbe, nämlich Reizung des Schlämthaus des Magens und zumal der Urinblase, daher die davon entstehenden ~~Wunden~~ <sup>Blasen</sup> und Entzündungen, so wie die Wirkung auf die benachbarten ~~Wunden~~ <sup>Blasen</sup> und Entzündungen.

Die Weibchen steigen zur Erde herab, wenn sie Eißen wollen, graben ein Loch, und setzen ihrer einen Haufen von walziger Form ab, aus welcher in Kurzem die kleinen Larven kommen. (Raheburg I. c.) Diese leben dann parasitisch an den wilden Bienen.

Es gibt noch eine Menge anderer Arten, die sich von obiger nur durch die Größe und Färbung unterscheiden, in Nord- oder Südamerika, in Indien, Afrika u. s. w. zu Hause sind, und dort völlig als die Stellvertreter der unserigen gelten, und so gebraucht werden.

## CXXV. Maiwürm.

### Meloe.

Fühler schnurformig; Kopf rundlich, herabhängend; Halsstück schmäler. Hinterleib dick; Flügeldecken verkürzt, lederartig, weich.

Ein zahlreiches Geschlecht, welches wohl am natürlichsten die Reihe der Käfer beendigt, da es sich am meistten unter allen von deren gewöhnlichen Form und Ansehen entfernt. Es sind langsame, welche Thiere, welche man deshalb mit Würmern verglichen, und welche noch die, schon bei einigen der Vorhergehenden bemerkte, Eigenthümlichkeit zeigen, daß ihnen bei der Berührung aus jedem Gelenke, zumal der Füße, ein schöner honiggelber Tropfen ausschwitzt, dessen Entstehung man noch nicht kennt, da man kein eigenes Organ dafür findet. Dieser gelbe Saft ist cantharidenartiger Natur, schmeckt scharf, hat einen ekelhaften Geruch, und erregt auf der Haut Blasen. Die medicinische Anwendung desselben, oder mit dem ganzen Käfer, ist empirisch und jetzt wohl mit Recht veraltet.

Das Geschlecht der Maiwürmer ist zahlreich, selbst in Deutschland gibt es mehrere Spezies \*). Es finden sich aber

\*) Und zwar an vielen Orten, obgleich Panzer von einigen nur *habitat Brunsvigiae* sagt.

Repräsentanten von ihnen in allen Ländern der Erde, nur Australien bis jetzt ausgenommen. Man findet sie in den ersten schönen Frühlingstagen im Grase, auf Hügeln und Triften, oder auch in den Wäldern am Wege, und zwar alljährlich immer wieder an denselben Orten. Bei der Begattung hocken sie aufeinander. Das Weibchen legt gelbe, walzenrunde Eier in die Erde, in welches es zuvor mit den Vorderräumen ein zottiges Loch gräbt; nach fast vier Wochen sind die jungen Larven in zahllosen Mengen herum. Sie sind länglich, haben sechs große Beine, welche mit Haarbüschen besetzt. Sie kriechen nun an den Pflanzenstengeln in die Höhe und suchen auf verschiedene Hymenopteren und Fliegen zu gelangen, an die sie sich festklammern und so mit ihnen in deren Nester getragen werden, wo sie sich auf Kosten von ihren Eierlarven weiter ausbilden. Leo Dufour, der sie auf wilden Bienen fand, hielt sie anfangs für ein eigenes Thiergeschlecht, bis er seinen Irrthum erkannte. Sie nähren sich auch von Fliegen.

Der reise Käfer frisst Blätter mit vieler Geschicklichkeit. Fliegen kann er nicht.

#### 1. Der blaue Maiwurm.

##### *Meloë proscarabaeus L.*

Bläulichschwarz, mit violblauem und violenrothem Schimmer, stark punktiert, die Fühler in der Mitte verdickt, daselbst wie geknickt. Brandt und Raheburg l. c. Taf. XVIII, Fig. 4, 5.

Das Weibchen über einen Zoll lang, das Männchen etwas kleiner. Die Flügeldecken in der Regel kurz, so daß zumal beim ersten der dicke Bauch fast bloß liegt, manchmal aber auch so lang als derselbe (*Meloe tectorius*). Die gemeinste Gattung.

#### 2. Der grüne Maiwurm.

##### *Meloë variegatus Donovan.*

##### *Meloe majalis F. Meloe scabrosus Marsham.*

Gelbgrün, mit Kupferroth, zumal zwischen den Ringen. Die Flügeldecken grob gerunzelt.

Brandt und Raheburg l. c. Fig. 5, 6.

Die grösste hieländische Gattung, weit über einen Zoll lang. Findet sich durch das ganze mittlere Europa, aber häufiger auf Bergtriften, oft schon an warmen Märztagen. Er wurde vorzüglich als *Meloe majalis* gegen die Hundswurth empfohlen, doch hat sich seine Anwendung nicht bewährt.

# In h a l t

## des

### v i e r t e n B a n d e s.

#### Dritte große Abtheilung des Thierreiches.

	Seite		Seite
<b>Gliederthiere</b>	5	Tracheliastes	56
<b>Spezielle Zoologie.</b>		Lernaeocera	56
<b>Geschste Klasse.</b>		S zweite Ordnung.	
Crustaceen . . . . .	23	Isopoden oder Usseln	57
Uebersicht der Geschlechter	31	Kellerassel (Porcellio)	58
Literatur	37	Kellerwurm .	59
<b>Erste Ordnung.</b>		Mauerassel (Oniscus)	59
<b>Kiefenfüße</b>	38	Wasserassel (Asellus)	60
Cypris . . . . .	40	Bopyrus .	60
Wasserfloh (Daphnia)	42	Dritte Ordnung.	
gemeiner	45	Limnodiopoden . . .	61
dorniger . . . . .	45	Walfischlaus (Cyamus)	61
Großauge (Polyphebus)	46	Vierte Ordnung.	
Cyclops . . . . .	46	U mphipoden	62
Kiefenfuß (Triophthalmus)	48	Corophium .	62
Krebsartiger . . . .	50	Talitrus . . . . .	63
Molukkischer Krebs (Limulus)	51	Wasserlaus (Gammarus) .	63
<b>Parasiten</b>	55	Flohpireß	63, 64
Argulus . . . . .	55	Fünfte Ordnung.	
Fischlaus (Caligus)	54	Stomatopoden . . . .	64
Barschlaus (Achtheres)	55	Seehuschrecke (Squilla)	63
Lernaeopoda	56	Phyllosoma .	66

Seite		Seite	
<b>S e c h s t e   O r d n u n g .</b>			
Dekapoden	67	Buthus	117
Palaemon . . .	72	Androctenus . . . .	118
Garnele (Crango)	74	Bücherstorpion (Chelifer)	119
Granate .	74	Halbstorpion (Obisium)	120
Astacus . .	74	Solpuge .	121
gem. Krebs .	75	Galeodes . . .	121
Steinkrebs	79	Spinnenstorpion . . .	122
Hummer . . . .	79	Thelyphonus	122
Languste (Palinurus)	80	<b>Z w e i t e   O r d n u n g .</b>	
Bärenkrebs (Scyllarus)	81	Spinnen . . . .	122
Orkette . . . .	81	Maurerspinne (Cteniza)	144
Einsiedlerkrebs (Pagurus) .	82	Wolfsspinne (Lycosa)	145
Bernhardskrebs	83	Tarantel .	145
Matuta	84	Dolomedes . . . .	147
Portunus . .	84	Würgspinne (Theraphosa)	148
Sammtkrabbe .	84	Vogelspinne	149
gem. Krabbe	85	Oxyopes	150
Krabbe (Cancer)	86	Segestria	151
Taschenkrebs	87	Drassus .	151
Riesenkrabbe	87	Clubiona .	153
Gouoplax . . . .	88	Tegeneria .	153
Sandkrabbe (Gelasimus)	88	Fensterspinne	154
Ocypoda	89	Wasserspinne (Argyronecta)	155
Reiter . . . .	90	Theridium	156
Pinnenwächter (Pinnothetes) .	90	Pholcus .	159
Turluru (Gecarcinus)	91	Linyphia . . . .	159
Grapsus .	92	Uferspinne (Tetragnatha)	160
Parthenope . . .	93	Kreuzspinne (Epeira)	161
Seespinne (Maja)	93	Fensterspinne	163
Spinnenkrabbe	93	Nephila . . . .	164
Migrane (Calappa)	94	Dornspinne (Acrosoma)	165
Dromia	94	Gasteracantha .	166
<b>S p e z i e l l e   Z o o l o g i e .</b>			
<b>S i e b e n t e   K l a s s e .</b>			
A r a c h n i d e n .			
Übersicht der Geschlechter	105	Pycnogoniden .	169
Literatur	111	Walfischspinne (Pycnogonum)	170
<b>E r s t e   O r d n u n g .</b>			
Skorpionthiere	112	<b>D r i t t e   O r d n u n g .</b>	
Skorpion	113	Asternspinnen . . .	170
Scorpio	116	Asternspinne (Phalangium)	170
<b>V i e r t e   O r d n u n g .</b>			

	Seite		Seite	
Beberknecht	171	Wespenbiene (Nomada) . . .	280	
Gonyleptes . . . . .	171	Kegelbiene (Coelioxys) . . .	281	
Fünfte Ordnung.				
Milben . . . . .	172	Holzbiene (Xylocopa) . . . .	281	
Rothe Milbe (Trombidium)	174	Blumenbiene (Anthidium) . . .	282	
Erythraeus . . . . .	174	Esanbiene . . . . .	282	
Tetranychus . . . . .	175	Duftbiene (Osmia) . . . . .	282	
Spinnlaus . . . . .	175	Mahnbiene . . . . .	283	
Limnochares . . . . .	176	Rosenbiene (Anthophila) . . .	283	
Wassermilbe (Hydrachna) . . . . .	176	Maurerbiene . . . . .	284	
Bogelmilbe (Dermanyssus) . . . . .	177	Blumenbiene (Hylaeus) . . . .	284	
Käfermilbe (Gamasus) . . . . .	177	Dasytopoda . . . . .	285	
Fledermausmilbe (Pterop-		Träuerbiene (Andrena) . . . .	285	
tus) . . . . .	178	2. Fam. Wespen . . . . .	286	
Holzbock (Ixodes) . . . . .	179	Wespe (Vespa) . . . . .	286	
Zecce . . . . .	179	Hornisse . . . . .	287	
Kräzmilbe (Sarcoptes) . . . . .	181	Polistes . . . . .	289	
Pferdekräzmilbe . . . . .	182	Pappwespe . . . . .	290	
Milbe (Acarus) . . . . .	183	Tatuanwespe . . . . .	290	
Käsemilbe . . . . .	183	Baumwespe . . . . .	290	
Cheyletus . . . . .	184	Eumenes . . . . .	291	
Spezielle Zoologie.				
Achte Klasse.				
Insekten.				
Uebersicht der Ordnungen	248	4. Fam. Raupentödter . . . . .	301	
Literatur	251	Tiphia . . . . .	301	
Erste Ordnung.				
Hymenopteren . . . . .	253	Scolia . . . . .	302	
Uebersicht der Geschlechter	259	Grabwespe (Pompilus) . . . .	302	
Literatur der Hymenopteren	264	Sandwespe (Ammophila) . . . .	303	
1. Fam. Bienen . . . . .	265	Schnabelwespe (Bembex) . . . .	304	
Biene (Apis) . . . . .	266	Siebwespe (Crabro) . . . . .	305	
Melipona . . . . .	276	Siebbiene . . . . .	305	
Hummel (Bombus) . . . . .	276	Blumenwespe (Cerceris) . . . .	306	
Erdhummel . . . . .	278	Philanthus . . . . .	306	
Moosbummel . . . . .	278	5. Fam. Schlupfwespen . . . . .	306	
Heidebummel . . . . .	279	Gichtwespe (Fonus) . . . . .	307	
Schlagbummel . . . . .	279	Schlupfwespe (Ichneumon) . . .	308	
Steinhummel . . . . .	279	Bracon . . . . .	308	
Feldbummel . . . . .	279	Microgaster . . . . .	309	
Waldbummel . . . . .	279	Chelonus . . . . .	310	
Hornbiene (Eucera) . . . . .	280	Bassus . . . . .	310	
		Ophion . . . . .	310	
		Pimpla . . . . .	311	
		6. Fam. Goldwespen . . . . .	311	

	Seite		Seite
<b>Goldwespe (Chrysis).</b>	312	<b>Lärchenborkenkäfer</b>	366
<b>7. Fam. Gallwespen.</b>	312	<b>Cis</b> . . .	365
Gallwespe (Cynips)	313	Ptilinus	366
<b>8. Fam. Holzwespen.</b>	315	Anobium	367
Holzweile (Sirex)	315	Ptinus	568
<b>9. Fam. Blattwespen.</b>	316	Dieb	368
Cimbex . . . . .	317	<b>z. Fam. Borkenkäfer.</b>	369
Hylotoma . . . . .	318	Prious . . . .	369
Pteronotus . . . . .	318	Zimmermann	370
Tenthredo . . . . .	319	Gerber	371
<b>S e w i t z e r O r d n u n g .</b>			
<b>Käfer.</b>		<b>Cerambyx</b>	371
Uebersicht der Geschlechter	319	Callidium . . .	372
Literatur der Käfer	333	Clytus . . . .	372
<b>1. Fam. Rüsselkäfer.</b>	346	Lamia . . . .	374
Calandra . . . . .	347	Schreiner	354
Palmwurm . . . . .	348	Weber	375
Schwarzer Kornwurm	348	Schlotfeger	375
Reißwurm . . . . .	349	Saperda . . . .	377
Cionus . . . . .	349	Rhagium . . . .	376
Balaninus . . . . .	350	Leptura . . . .	377
Haselnuswurm	350	Molorchus . . . .	378
Anthonomus . . . . .	350	Donacia . . . .	378
Apfelrüsselkäfer	350	Lema . . . . .	379
Lixus . . . . .	351	<b>4. Fam. Prachtkäfer.</b>	380
Pissodes . . . . .	351	Schnellkäfer (Elater)	381
kleiner Fichtenrüsselkäfer	351	Cucujus . . . .	381
Hylobius . . . . .	352	Prachtkäfer (Buprestis)	383
großer Fichtenrüsselkäfer	352	<b>5. Fam. Kugelkäfer</b>	384
Cleonus . . . . .	352	Chrysomela . . .	385
Phyllobius . . . . .	353	Helodes . . . .	587
Brachyderes . . . . .	354	Cryptocephalus	387
Curculio . . . . .	354	Haltica . . . .	388
Juwelenkäfer	354	Erdstöh	588
Cneorhinus . . . . .	355	Galeruca	389
Brentus . . . . .	356	Cassida . . . .	389
Apion . . . . .	356	Schildkäfer	390
rother Kornwurm	357	Hispa . . . . .	391
Rhynchites . . . . .	357	Stacheldkäfer	391
Birkenstecher	357	Anisotoma . . . .	391
Pappelstecher	358	Mordella . . . .	392
Rebenstecher	358	Cistela . . . .	392
Apoderes . . . . .	359	Pyrochroa . . . .	392
Anthribus . . . . .	359	Schattenkäfer (Tenebrio)	393
Bruchus . . . . .	360	Mehlwurm . . . .	393
Erbsenkäfer	361	Blaps . . . . .	394
<b>2. Fam. Borkenkäfer.</b>	361	Zobtenkäfer	394
Apate . . . . .	362	<b>7. Fam. Rindkäfer.</b>	394
Hylurgus . . . . .	362	Hirschkäfer (Lucanus)	394
Fichtenborkenkäfer	363	Schröter	395
Bostriechus . . . . .	363	Sinodendron	395
Borkenkäfer	363	Passalus	396
Kupferstecher	365	Lamprima	396
		Cetonia . . . .	397
		Rosenkäfer . . .	397

	Seite		Seite
Goldhahn	397	Aleochara	426
Goliath .	398	Paederus	426
Trichius	398	Stenus . . .	426
Eremit . . . .	398	Oxytelus . . .	427
Laubkäfer (Melolontha) .	399	Dorler (Gyrinus)	427
Walter .	399	Radschläger . . .	427
Maikäfer .	399	Schwimmkäfer (Dytiscus) .	428
Schornsteinfeger	400	Hyphydrus . . .	430
Amphimalla	401	Noterus .	430
Brachkäfer	401	Bembidium .	431
Anisoplia	401	Elaphrus .	432
Geotrupes .	401	Calosoma . . .	432
Mistkäfer . . .	402	Puppenräuber .	432
Frühlingskäfer . . .	402	Raupenjäger . .	433
Nashornkäfer (Oryctes)	403	Laufkäfer (Carabus) .	433
Kohlkäfer . . .	403	Delmutter .	433
Scarabaeus .	403	Procrustes .	437
Herkuleskäfer	403	Loricera .	437
Lethrus .	404	Panagaeus .	437
Schneider .	405	Chlaenius .	438
Aphodius	405	Anchomenus .	438
Copris . .	406	Agonum .	439
Ontophagus	406	Mormolyce .	439
Sisyphus	407	Cephalotes .	439
Ateuchus .	407	Amara .	440
8. Fam. Räuberkäfer .	409	Harpalus .	440
Stuhlkäfer (Hister)	410	Clivina .	442
Silpha . .	411	Brachinus . . .	443
Necrophorus . . . .	412	Bombardierkäfer .	443
Todtenträger (Pselaphus) .	412	Cicindela . . .	443
Claviger . . .	413	10. Fam. Weichkäfer .	445
Nitidula . . .	416	Coccinella . . .	446
Ips . . . . .	416	Siebenpunkt .	446
Speckkäfer (Dermestes) .	417	Clerus .	447
Pelzkäfer .	418	Trichodes .	448
Anthrenus . . . .	418	Immenwolf .	448
Wollkäfer (Byrrhus)	419	Notoxus .	448
Sphäridium .	420	Cantharis .	449
Hydrophilus	421	Malachius . . .	449
Elophrus .	422	Leuchtkäfer (Lampyris) .	450
9. Fam. Raubkäfer .	422	Johanniswürmchen .	450
Staphylinus .	423	Cerocoma . . .	451
Oxyporus .	424	Mylabris .	452
Omalius	424	Lytta . . . .	452
Tachinus .	424	gem. spanische Fliege .	452
Tachyporus	425	Maiwurm (Meloë) .	453
Lomechusa	425		

## Verbesserungen.

---

Seite Seite

5 16 v. u. st. Formeln l. Formale.  
 6 3 v. o. nach „das“ sehe: Werk.  
 6 14 v. o. st. wo l. war.  
 53 16 v. o. st. Venella l. Penella.  
 48 7 v. u. st. Triopthalmus l. Triophthalmus.  
 55 3 v. u. st. Kolloß l. Kollar.  
 72 24 v. o. st. die Alte l. die alte.  
 73 8 v. u. st. Squillorum l. Squillarum.  
 74 3 v. u. st. findet l. siedet.  
 74 13 v. o. st. Grenate l. Granate.  
 80 8 v. o. st. clephas l. Elephas.  
 81 12 v. o. st. acutus l. Arctus.  
 81 14 v. o. st. blatten l. platten.  
 84 5 v. u. st. Sametkrabbe l. Sammtkrabbe.  
 85 9 v. o. st. wieder l. weiter.  
 90 4 v. u. st. iωωεις l. ιππεύς.  
 92 15 v. o. st. Ulca l. Uca.  
 114 12 v. u. st. meist l. einst.  
 125 11 v. o. st. geben l. gaben.  
 133 9 v. o. st. Zucken l. Tucken.  
 134 10 v. u. st. Lyomet l. Lyonnet.  
 138 13 v. o. st. neuen l. neun.  
 142 14 v. o. st. locker l. lecker.  
 152 4 v. u. st. Glubiona l. Clubiona.  
 167 3 v. u. st. Streck l. Strack.  
 172 8 v. u. nach „Milben“ l. bestehend.  
 174 18 v. o. st. holosericum l. holosericeum.  
 190 19 v. o. st. Dunkel l. Dünkel.  
 193 10 v. o. st. Lustkäfer l. Leuchtkäfer.  
 197 26 v. o. st. Gastrus l. Oestrus.  
 205 7 v. o. st. gestaltet l. gestalten.  
 205 18 v. o. st. um l. nun.  
 205 23 v. o. st. nach: „ihnen“ l. das.  
 207 7 v. u. st. ihnen l. ihm.  
 233 20 v. o. st. weich l. weiches.  
 246 3 v. u. st. Werk l. Berg.  
 246 6 v. u. st. fast l. fest.  
 271 2 v. o. st. Schichten-Alveolen l. Schichten Alveolen.  
 349 3 v. o. st. Reiswurm l. Reißwurm.  
 349 8 v. o. st. Reis l. Reiß.  
 553 6 v. u. st. 4-5" l. 4-5".  
 364 13 v. o. st. stechender l. stehender.  
 364 14 v. o. st. der l. deren.  
 383 11 v. o. st. meist l. einst.  
 411 17 v. o. st. vierzackig l. vielzackig.  
 415 3 v. u. st. Stunden l. Sekunden.







OTANOX  
czyszczenie  
II 2009

**KD.4877.4**  
**nr inw. 6276**